

文淵閣
四庫全書
電子版



【子部】

傷寒直格方
——傷寒標本心法類萃



迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：傷寒直格方 __傷寒
標本心法類萃》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：<http://www.dheritage.com>
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted
by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording, or otherwise, without written permission
from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand版本，請瀏覽
迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

傷寒標本心法類萃卷上

宋 劉守真 撰

傷風

傷風之証頭疼項強肢節煩疼或目痛肌熱乾嘔鼻塞手足溫自汗出惡風其脉陽浮而緩陰浮而弱此為邪在表已上傷風之証皆宜桂枝湯第二次以解肌傷寒汗出怕風而加項強痛者桂枝葛根湯第三傷風及無汗者雖已服桂枝湯反煩不解而無裏証者先刺風池風府却與桂枝葛根湯服之不若通用雙解散五十一免致有桂枝麻黃之悞傷風自汗白虎湯二十二金匱方太陽病無汗而渴者不可與白虎湯

傷寒

傷寒之證頭項病疼腰脊強身體拘急惡寒不煩燥無自汗或致頭面目疼肌熱鼻乾或胸滿而喘手足指末微厥脉浮數而緊者邪在表以上傷寒之証皆宜麻黃

欽定四庫全書



傷寒直格方 卷上 一 傷寒標本心法類萃



迪志文化出版有限公司出版

湯第一以發其汗傷寒冒風頭目痛四肢拘倦比金散四十六不若通用天水散四十九或雙解散之類五十一甚佳無使藥不中病而加害也 白虎合涼膈散二十三乃調理傷寒之上藥傷風甚妙

中暑

中暑之證身熱頭痛背寒面垢自汗煩燥大渴口乾倦怠而身不痛或時惡寒或畏日氣脉虛而弱無問表裏通宜白虎夏月感冒發熱煩渴五苓散二十四桂枝甘露飲三十四黃連香薷飲五十二或雙解散或裏熱甚腹滿而脉沉可下者大承氣湯下之或三一承氣湯尤妙半表半裏者小柴胡涼膈天水散

中濕

中濕之證一身盡疼重者發黃關節煩疼發熱鼻塞時或腹滿脹大便利脉沉而緩以上中濕之証先用雙解散微微汗之次用五苓散或淡滲散桂苓甘露飲曾用甘露飲不愈却用黃連解毒則愈問曰若劑止土之甘

欽定四庫全書



傷寒直格方 卷上 一 傷寒標本心法類萃



迪志文化出版有限公司出版

此屬土故以火劑燥土其病則愈

風寒俱中

風寒俱中之証頭痛項強肢體疼手足溫為中風反無汗惡寒脉浮緊為傷寒也或頭項疼腰脊強身體拘急指末微厥不自汗為傷寒反煩燥而脉緩者為傷風也風則傷衛寒則傷榮榮衛俱傷則表裏熱甚者通宜以大青湯或雙解散最妙

內外傷寒

始得脉便沉而裏病表和者內傷也脉浮而表病裏和者外傷也病在身體四肢為表病病在胸腹之內為裏病內傷通解散外傷雙解散內外一切所傷通神散然不若雙解散以子和為之三法至神

一切汗候

風寒暑濕飢飽勞逸憂愁思慮恚恐悲怒四時中外諸邪所傷但覺身熱頭疼拘倦強痛無問自汗無汗增寒發熱渴與不渴微甚傷寒疫癘汗病兩感風氣雜病一

欽定四庫全書

傷寒直格方 卷上 一 傷寒標本心法類萃

切舊病發作三日裏外並宜雙解散設若感之勢甚本難解者常服雙解散三兩日間亦漸可減並無所損或裏熱極甚腹滿實痛煩渴譫妄須可下者三乙承氣湯為妙或下後未愈或下証未全或大汗前後逆氣或汗後餘熱不解或遺熱復勞或染他人病氣汗毒傳染或中瘴氣羊氣牛氣一切穢毒并漆毒酒毒食毒一切藥毒及墜墮打撲傷損疼痛或以患風眩頭疼中風偏枯破傷風洗頭風風癰病或婦人產後諸疾小兒驚風積熱瘡瘍疹痘無問日數但以雙解散服之周身中外氣血宣通病皆除愈然雙解乃通仙之藥但除孕婦及產後月經過多并泄瀉者勿與服之惟年老人最宜自有造化於中矣

傳染

凡傷寒疫癘之病何以別之蓋脉不浮者傳染也設若以熱藥解表不惟不解其病又甚而危殆矣其治之法自汗宜以蒼朮白虎湯無汗宜滑石涼膈散散熱而愈

欽定四庫全書

傷寒直格方 卷上 一 傷寒標本心法類萃



其不解者通其表裏微甚隨証治之而與傷寒之法皆無異也雙解散益元散皆為神方

表證

凡表證脉浮身體肢節疼痛惡風惡寒者可汗之不可下也傷寒無汗麻黃湯傷風自汗桂枝湯一法不問風寒通用雙解散或天水散最妙

裏證

凡裏證脉實而不浮不惡寒及惡風身不疼自汗譫語

欽定四庫全書

傷寒直格方 卷上 一 傷寒標本心法類萃

不大便或咽乾腹滿者可下之不可汗也以上之証宜小承氣湯大承氣湯調胃承氣湯選而用之一法不問風寒暑濕或表裏兩証俱不見但無表証而有可下者通用三乙承氣湯下之此藥發峻効使無表熱入裏而無結胸及痞之衆疾也或熱結極深而諸藥數下畢竟不能利不救成死者大承氣湯加甘遂一錢匕下之病在裏脉沉細者無問風寒暑濕或表裏証俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿譫妄煩燥畜熱內盛

但是脉沉者宜三乙承氣湯合解毒湯下之解毒調胃承氣湯能瀉大熱

表裏證

表裏俱見之證或半表或半在裏之証者謂前表裏二証病在相叅有欲汗之而有裏病欲下之而表病未解汗之不可吐之又不可法當和解傷風白虎湯傷寒中風或兩感小柴胡湯一法不問風寒暑濕用涼膈散天水散二藥合一服用煎解之或表熱多裏熱少天水一

欽定四庫全書

傷寒直格方 卷上 一 傷寒標本心法類萃

涼膈半或裏熱多表熱少涼膈一天水半表熱極裏有微熱身疼頭痛或眩或嘔不可汗吐下者天水涼膈散合和解之解之義不能退其熱者用黃連解毒湯表裏之熱俱微者五苓散表裏之熱俱盛者大柴胡湯微下之更甚者大柴胡合大承氣湯下之雙除表裏之熱服雙解散之後若不解病已傳變後三日在裏法當下之殊不知下之太早則表熱乘虛而入裏遂成結胸虛痞懊懷發黃之証輕者必危危者必死但宜平和之藥宣



散其表和解其裏病勢或有汗而愈或無汗氣和而愈用小茈胡涼膈天水合和主之病在半表半裏用小茈胡涼膈散合和而解之或小茈胡合解毒湯如服熱勢未退者大柴胡合三乙承氣湯表裏俱微半表半裏若裏微者宜大柴胡合黃連解毒湯合服諸小柴胡湯証後病不解表裏熱勢更甚而心下急鬱微煩或發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐不利或陽明病多汗或少陰病下利清水心下痛而口乾或太陰病腹滿而痛或無表

欽定四庫全書

傷寒直格方 卷上 一 傷寒標本心法類萃

裏証但發熱七八日雖脈浮而數而脈在肌肉實數而滑者並宜大柴胡湯病至七八日裏熱已甚表漸微脈雖浮數用三乙承氣湯合解毒下之下証未全不可下者用白虎湯或知母石膏湯脈洪燥裏有微熱不可汗者用黃連解毒湯

汗後不解

凡是表証法當汗之依法汗之其病又不解汗後不解其証前後別無異証者通宜涼膈散調之以退其熱無

使熱甚危極也除此之外遠勝小柴胡湯兩感至此而已汗後餘熱用益元散或小柴胡湯宣武人參石膏湯傷寒大發汗汗出不解反無汗脈尚浮者蒼朮白虎湯解之傷寒用桂枝湯發後半日許復熱煩脈浮者再宜桂枝湯汗後不解下証未全者白虎湯汗後煩躁不得眠微熱而渴五苓散汗後不解中外有熱口乾煩渴柴胡飲子解表之後尚未愈者解毒涼膈天水散能調順陰陽洗滌藏府

欽定四庫全書

傷寒直格方 卷上 一 傷寒標本心法類萃

下後不解

凡是裏証法當下之依法下之其病又不解或大下後或再三下後熱勢尚甚而不退本氣虛損而不能實擬更下之恐下晚而立死不下之則熱極而死寒涼諸藥不能退其熱勢之甚者或濕熱內餘下利不止熱不退者或因大下後濕熱利不止而熱不退脈弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小便赤澀大便澹泄頻併少腹而急痛者必欲作痢也通宜黃連解毒湯以解之傷寒



下之大過胃中無熱飲水無力白朮散又有大下之後其熱不退再三下之熱愈甚若下之不止其人脈微氣虛氣弱不加以法無可生之理至此下之亦死不下亦死但用涼膈合解毒湯調之陽熱退除陰脈漸生為之妙法下之前後無問日數餘熱不解小柴胡湯汗下後胃虛大橘皮湯汗下後胸膈滿悶赤茯苓湯

在上涌之

言病在膈者當用瓜蒂散吐之或表証罷邪熱入裏結

欽定四庫全書

傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷上

於胸中煩滿而飢不能食四肢微厥而脈乍急者宜瓜蒂散吐之傷寒頭疼久不愈令人喪明胸膈亦有宿痰故也當先涌之次以白虎湯加減

在下泄之

言病畜熱下焦則承氣抵當之類泄之而可也

合病

三陽合病腹滿身重難以轉側口燥而垢譫語遺尿如誤發汗則譫語益甚下之則便厥額上汗出額必發黃

宜白虎湯

兩感

兩感謂一日太陽少陰兩証俱見二日陽明與太陰俱病三日少陽與厥陰俱病前六經之証是也小柴胡湯涼膈散五苓散天水散通聖散雙解散大柴胡湯可選用之熱勢甚欲可下者三乙承氣湯或解毒合承氣湯

瘧病

瘧之為病發熱腹滿口噤頭搖瘕瘕不語項強背直腰

欽定四庫全書

傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷上

身反強或目痛或目赤或閉或反目或足溫或妄行其脈沈弦而遲或帶緊者無汗曰剛瘧有汗曰柔瘧通宜三承氣湯合解毒下之

頭疼

頭疼之証無問風寒暑濕雜病自汗頭疼俱宜白虎湯或加川芎荊芥尤妙頭疼久不愈必致喪明宜先涌痰次用白虎加減風眩痰逆喘嗽頭痛半夏茯苓湯頭痛肢體痛黃連解毒湯頭疼口乾桂枝甘露飲風痰喘嗽



頭痛白虎半夏橘皮湯風熱頭疼心煩昏憤人參石膏湯傷寒壯熱頭疼不卧散

身疼

身疼之証無問風寒通解散表熱甚頭項肢體疼痛黃連解毒湯傷寒瘟疫遍身疼痛少力頭旋腰脚麻重嘔噦壯熱減食三乙承氣減硝加貫衆紫河車入金銀煎名銀煎散中濕一身盡痛五苓散

腹脹滿痛

腹脹滿脈沈者以三乙承氣湯合解毒下之諸腹滿實痛煩渴譫妄脈實數而沈者無問日數三乙承氣湯少陽証腹中痛者小柴胡去黃芩加芍藥湯少陽証脇下痞鞭者小柴胡去棗子加牡蠣太陰証腹滿時痛桂枝加芍藥痛甚加桂枝大黃

往來寒熱

往來寒熱屬少陽一日二三作來往無期用小柴胡湯主之

欽定四庫全書

傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷上



潮熱

潮熱屬陽明一日一發日晡而作也陽明裏熱極甚或吐下後不解大便五六日至十餘日日晡潮熱心胸煩熱而懊憹如瘧狀脈沈實者三乙承氣湯陽明少陽合病下利日晡發熱如瘧者大柴胡湯通宜三承氣合解毒

自汗

自汗不發表解肌自出汗也傷風自汗也傷風自汗宜桂枝湯傷寒自汗脉沈數而實表裏俱熱者三陽合病自汗者厥逆自汗者頭疼自汗者傷寒自汗未解半入於裏者中暑自汗脈虛者俱宜白虎湯傷寒寢汗不止白虎湯加麻黃根浮麥傷寒汗下後自汗脈虛熱不已白虎加人參蒼朮服之汗止身涼通仙之法也中暑自汗白虎湯後以澹滲湯調之自汗多宣武人參石膏湯

自利并誤下

欽定四庫全書

傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷上



自利者不經下藥攻裏而自利也脈浮表不解自利或小便不利者五苓散一切瀉痢間作桂苓甘露飲溫濕內甚而作痢者黃連解毒湯或自利清水色純青心下痞痛口燥者皆濕熱相搏於腸胃之內而成下利者三一承氣湯當汗而反下及不成結胸而但下利清穀不化表証在表熱裏寒也急以四逆湯溫裏利止裏和急以桂枝解表或用巴豆熱藥下之而協熱利不止皆宜五苓散止利兼解表

欽定四庫全書

傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃
卷上

小便不利

小便不利者小便難而赤澀也中暑并傷寒大發汗後胃中乾煩燥不得眠脈浮小便不利微熱煩渴者口乾煩渴小便不利者小便赤澀通宜五苓散桂苓甘露飲主之

嘔吐

凡嘔吐者火性上炎也無問表裏通宜涼膈散傷寒雜病一切嘔吐調胃承氣湯煩悶乾嘔黃連解毒湯嘔吐

煩渴者桂苓甘露飲五苓散眩咳嘔者白虎加半夏橘皮傷寒嘔吐四肢厥逆清冷調胃散濕溫內甚惡心嘔吐者白虎合解毒湯

吐瀉

吐瀉者上吐下瀉亦名霍亂也一切吐瀉霍亂通宜五苓散益元散白朮散吐瀉霍亂煩渴并中外諸邪所傷而吐瀉腹滿痛悶者並皆桂苓甘露飲淡滲湯

喘嗽

大熱喘嗽而滿者黃連解毒湯或熱甚咳嗽悶亂三乙承氣湯少陽咳者小茈胡去人參大棗生薑加五味子乾薑喘嗽頭疼者伏苓半夏湯咳嗽者白虎湯加半夏桔梗咳嗽不已人參石膏湯或宣武人參石膏湯痰逆咳嗽半夏橘皮湯汗之後氣悶咳嗽五味子湯

渴

凡口乾煩渴者傷寒汗出而渴者飲水反吐名曰水逆俱宜五苓散少陰病二三日口燥咽乾三一承氣湯或

欽定四庫全書

傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃
卷上



裏熱燥甚傷寒怫鬱留飲不散煩渴不止則腹高起痛不可忍但嘔冷涎大渴不能飲飲亦不能止其渴喘急悶亂但欲死者三乙承氣湯熱下咽立止其渴有若無病之人須臾大汗而愈至此往往多有不利而汗出亦有藥力但隨汗之宣通不利而愈或汗吐下後煩渴口乾脈浮大白虎湯加人參煩燥多渴涼膈散加滑石

煩燥

傷寒煩燥多渴涼膈散加滑石中暑傷寒汗後煩燥五

欽定四庫全書



傷寒直格方 卷上 一傷寒標本心法類萃

苓散一切火熱狂躁喘滿黃連解毒湯煩躁而渴白朮散或加滑石甚者加薑汁

懊懷

虛煩

不得眠

懊懷煩心反復顛倒不得眠者煩熱怫鬱於內而氣不能宣通也或胸滿結痛或煩微汗出虛煩者梔子湯主之或氣少者加甘草一錢或嘔者及初悞以圓藥下者加生薑半兩凡懊懷虛煩者皆用涼膈散甚佳及宜湯濯手足使心曾結熱宣散而已心煩腹滿坐卧不安梔



迪志文化出版有限公司出版

子厚朴湯主之或陽明病下之後燥熱而懊懷者三乙承氣湯汗後煩燥不得眠五苓散或涼膈散口燥呻吟錯語不得眠五苓散黃連解毒湯煩心者涼膈散少陽証胸中煩而不嘔者小柴胡去半夏人參加瓜蒌實主之

留飲

一切留飲不散五苓散桂苓甘露飲黃連解毒湯涼膈散與白虎湯小陷胸湯三乙承氣湯選用傷寒表未罷

欽定四庫全書



傷寒直格方 卷上 一傷寒標本心法類萃

下有水氣乾嘔發熱而咳或嘔或利或噎或小便不利小腹滿或喘者小青龍湯

痞

傷寒表裏俱熱下証未全法當和解悞下之早則成痞心下痞滿而不痛按之虛軟者痞脈浮而尚惡寒者表未解也當先桂枝解表已而後用大黃黃連瀉心湯攻痞也或只用五苓散使除表裏甚良或痞惡寒而汗出者或痞而煩小便不利者或痞留飲濕熱下利者或已



迪志文化出版有限公司出版

成痞因藥尚不止以其痞滿悞更下之其痞轉甚嘔噦下利心煩燥者無問痞脈浮沈並宜生薑煎湯調下五苓散頻服之或痞不已則後亦濕熱煩滿或譫妄脈沈無他証者宜大黃黃連瀉心湯或小陷胸湯亦可下早成痞枳榔散

結胸

結胸之証有三不按而痛者名大結胸按之而痛者名小結胸心下怔忡頭汗出者名水結胸也汗下之後不大

欽定四庫全書



傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷上

便五六日舌乾而渴日晡少有潮熱從心下至小腹鞭滿而痛不可近而脈沈緊滑數或但關脈沈緊者宜大陷胸湯或陷胸圓下之或脈浮者表未罷也不可下下之則死宜小陷胸湯及小柴胡湯之類和解之表罷者方可下之或結胸雖脈浮而裏熱勢惡須可下者宜三乙承氣湯分作三次約三時許服訖得利甚良雖未稍減脈必沈病微者止用三乙承氣半服按法而下之裏熱甚者以大陷胸湯大半服而下之或但結胸別無大

段熱証但頭微汗出脈沈潛者水結胸也通宜大陷胸小結胸心下按之而痛脈浮而滑別無大段熱証及水結胸者小陷胸湯傷寒下之太早結胸黃連解毒湯加枳殼傷寒結胸虛痞涼膈散加枳殼桔梗或但自熱結胸者其胸高起腹雖不滿而但喘急悶結譫妄昏冒關脈沈數而緊者用大承氣湯加甘遂一錢匕下之表証罷熱入裏結於胸中煩滿而飢不能食微厥而脈乍緊者瓜蒂散吐之太陽中風下利嘔逆表証罷乾嘔短氣不惡寒熱汗發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛者十棗湯結胸而發黃者茵陳湯陷胸湯各半服下之協熱下利不止更結胸發黃茵陳湯五分陷胸湯三分大承氣湯二分下之為佳脈浮不可下者小陷胸湯合小柴胡湯

血証

太陽病日深表証仍在循經熱畜於下焦脈微而深不結胸而發狂者熱在下焦小腹當鞭滿小便自利也血

欽定四庫全書



傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷上



下而愈宜攻之或太陽病身黃脈沈者循經而畜熱下焦也小腹鞭小便不利為無血小便自利如狂者瘀血症或陽明畜熱內甚而喜妄或狂大便雖鞭而反易其色者有畜血也或無表裏証但發熱日深脈浮者亦可下或已下後脈數胃熱稍穀善饑數日不大便有瘀血也並宜抵當湯下之傷寒有熱小腹滿小便自利者為有血也當下未敢用湯用抵當圓最為穩當太陽病不解而畜熱下焦先以桂枝解表已而下血宜桃仁承氣湯或抵當圓攻之傷風汗下不解熱鬱經絡隨氣湧泄為衄或清道閉流入胃脘吐出血及鼻衄吐血不盡餘血停留以致面黃大便黑犀角地黄湯發狂加黃芩

欽定四庫全書

傷寒直格方 卷上 一傷寒標本心法類萃

大黃

譫語

譫語發狂三一承氣湯合解毒湯以下之若傷寒過經譫語以有熱也當以湯下之若利小便大便當鞭而下利脈和者醫以圓藥下之非其治也若自利者腹當厥今

反和此為內實調胃承氣湯或涼膈散通用

發黃

陽明病表熱極甚煩滿熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身體發黃其候但頭汗出身無汗臍頸而還小便不利渴飲水漿者身體發黃宜茵陳湯調下五苓散結胸而發黃者茵陳同陷胸湯各半下之或誤服熱毒圓藥下之反損陰氣遂協熱利不止更或結胸而發黃者用茵陳湯五分陷胸湯三分承氣湯一分下之或兩感發黃者用茵陳湯加黃連解毒湯一服急下之頭微汗小便利而發微黃者濕熱微也梔子蘘皮湯發黃甚者茵陳合三乙承氣湯

欽定四庫全書

傷寒直格方 卷上 一傷寒標本心法類萃

發斑

發斑下証未全涼膈散未曾下胃熱發斑白虎湯加人參白朮陽明胃熱發斑脈沈須可下者三乙承氣湯下之傷寒胃熱發斑涼膈散加滑石調五苓散甚妙傷寒七八日發黃有斑微熱腹滿者或痰實壅上雖諸承氣



湯不過者仲景曰寸脈浮者則可用瓜蒂散吐之

發狂

傷寒發狂奔走罵詈不避親疏此陽有餘陰不足三乙承氣湯加當歸薑棗名當歸承氣湯以利數行候微緩以三聖散吐之後用涼膈散洗心散黃連解毒湯調之謔妄發狂踰垣上屋赴井投河皆為陽熱極甚用三乙承氣合解毒下之驚悸顛狂三乙承氣湯發狂極甚投河入井者三下不過不可下攻便當涌之以瓜蒂散吐出

欽定四庫全書



傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃
卷上

痰涎宿物一掃而愈後以甘露飲之類調之

發戰

凡熱病大汗將出而反寒戰者表之証氣與邪氣併甚於裏火熱亢極而反兼水化制之反為寒戰脈微欲絕者三乙承氣湯或十棗湯下之凡欲作汗無問病之微甚或已經新下者或下証未全者但以涼膈散調之甚者黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脈沈實而有裏証者三乙承氣湯下之勢惡者加黃連解

毒湯或戰不快者或戰後汗出不快者或戰數次經大戰而汗不當者乃并之不甚而發之不達通宜三乙承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也

發厥

或表熱極甚而恐承氣不能退者或已下後而熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以陽氣怫鬱不能營運於身表四肢以致通身清冷痛甚不堪項背拘急目青睛疼昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩

欽定四庫全書



傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃
卷上

冤悶亂喘急鄭聲脈雖疾數以其畜熱極深而脈道不利反致脈沈細而欲絕俗未明其造化之理而反謂其傷寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此証候者或兩感熱勢甚者通宜解毒如大承氣湯下之熱不退者宜再下之然雖古人云三下之而熱未退即死矣亦有按法以下三五次利一二十行熱方退而得活者免致不下退其熱而必死也下後熱少退而未愈者黃連解毒湯調之或失下熱極以致身冷脈微而昏冒將死



者若急下之殘陰暴絕而死蓋陽氣後竭而然也不下亦死宜涼膈散或黃連解毒湯或二藥合服或白虎合涼膈散養陰退陽積熱漸以宣散則心胸溫煖脈漸以生至於脈復有力方可以三乙承氣湯下之或解毒加六一散調之愈後宜服退熱之藥忌發熱諸物裏熱脈厥者宜白虎湯熱極厥深而諸藥下畢竟不能利者不救必死黃連解毒湯更加甘遂末一錢匕下之

循衣摸牀

欽定四庫全書



傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷上

陽明病脈遲汗出不惡寒身重短氣狂語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安直視微喘三乙承氣湯

勞復食復

汗下後勞復柴胡飲子飲酒復劇黃連解毒湯或雙解加黃連在裏者三乙承氣湯在表者益元散或雙解散半表半裏大柴胡湯小柴胡湯涼膈散解毒湯隨證用之食服三乙承氣湯



欽定四庫全書



傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷上

傷寒標本心法類萃卷上



欽定四庫全書

傷寒標本心法類萃卷下

宋 劉守真 撰

麻黃湯 一

麻黃 錢六
桂枝 錢四
甘草 錢二
杏仁 錢七
枚

右作二貼水二鍾煎八分取汁麻黃性熱惟冬及春兼病人素虛寒者乃用正方夏至之後服之必發斑黃須加知母半兩石膏一兩黃芩一分桂枝加減月

欽定四庫全書

傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃
卷下

令同

桂枝湯 二

桂枝 錢各
芍藥 錢二
甘草 錢一
半

右作一貼薑三片棗一枚煎服取微汗倍加芍藥名桂枝芍藥湯加大黃名桂枝大黃湯金匱方曰太陽病自汗而小便數者不可與桂枝湯

桂枝葛根湯 三

桂枝 錢各
芍藥 錢二
甘草 錢四
生薑 錢二
大棗 錢二
葛根 錢二

五錢
二分

右作二服水煎取微汗

葛根湯 四

葛根 錢一兩
麻黃 錢三
生薑 錢三
桂枝 錢三
甘草 錢各
芍藥 錢二

棗 錢一
枚

右作二貼水煎服衣覆取汗為度

升麻葛根湯 五

升麻 錢各
乾葛 錢三
芍藥 錢三
甘草 錢三

欽定四庫全書

傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃
卷下

右作二服水煎若大段寒即熱服若熱即溫服身涼為度

大青龍湯 六

麻黃 錢各
石膏 錢四
桂枝 錢一
甘草 錢一
杏仁 錢三
上

右作二貼薑三片棗一枚水煎取微汗不可太過恐亡陽以溫粉撲之

小青龍湯 七

半夏 錢六
北五味 錢二
麻黃 錢二
芍藥 錢二
細辛 錢二
甘草 錢二



乾薑 桂枝 各一錢 八分	右作二貼生薑四片水煎諸方皆不用生薑	大柴胡湯 八	柴胡 三錢 黃芩 一錢 將軍 七錢 芍藥 半錢 半夏 一錢 枳實 二錢	右作一貼生薑五片棗一枚煎大柴胡合三乙承氣湯合黃連解毒湯合大承氣湯	小柴胡湯 九	柴胡 八錢 黃芩 甘草 人參 各三錢 半夏 二錢 半	右五錢生薑五片棗一枚煎溫服	一法本方合涼膈天水 一法本方合涼膈散	一法本方合解毒湯 一法本方去棗子加牡蠣	一法本方去人參大棗生薑加五味子乾姜	一法本方去半夏人參加括蕒實	大承氣湯 十	大黃 芒硝 各一錢 厚朴 四錢 枳實 三錢	右作一貼水二鍾先煎厚朴枳實次下大黃煎取八
-----------------	-------------------	--------	-------------------------------------	----------------------------------	--------	----------------------------	---------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------	--------	-----------------------	----------------------



分去滓入硝煎一二沸放溫服	一法本方加甘遂末一錢	調胃承氣湯 十一	大黃 三錢 芒硝 二錢 甘草 一錢 半	右作一貼水二鍾煎溫服	小承氣湯 十二	大黃 三錢 厚朴 一錢 半 枳實 一錢	右作一貼水二鍾煎溫服	三乙承氣湯 十三	大黃 二錢 芒硝 一錢 半 厚朴 錢 枳實 一錢 甘草 二錢	右作一貼水煎溫服	一法本方減硝加貫衆紫河車入金銀煎名銀煎散	一法本方加當歸姜棗名當歸承氣湯	桃仁承氣湯 十四	桃仁 去皮 芒硝 錢 半 大黃 二錢 桂 甘草 各一錢 半	右作一貼水煎空心服
--------------	------------	----------	---------------------	------------	---------	---------------------	------------	----------	--------------------------------	----------	----------------------	-----------------	----------	-------------------------------	-----------



犀角地黄湯 十五

犀角 白芍藥 牡丹皮 各五分 生地黃 四錢

右作一貼水煎有熱加黃芩一錢發狂血証加大黃
本方無大黃血証內有

大陷胸湯 十六

大黃 芒硝 各二錢 甘遂 一分 些

右作一貼水煎溫服未快再服勢惡不利以意加之

大陷胸圓 十七

欽定四庫全書 傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷下

大黃 芒硝 各二錢 葶藶 三錢 炒 杏仁 十二枚 炒

右大黃末下葶藶杵羅研杏仁芒硝如泥圓如彈子
大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一鍾煎至
半鍾溫服當一宿未利再服

小陷胸湯 十八

半夏 黃連 括蕒實 一枚 四分 用之二

右作一貼水煎溫服未利再服微利黃涎即愈

一法本方合小柴胡湯

抵當湯 十九

水蛭 炒 蜜蟲 各七箇 去足翅 炒 杏仁 七枚 大黃 二錢

右作二貼水煎再服

抵當圓 二十

水蛭 炒 蜜蟲 各七箇 去足翅 炒 杏仁 七枚 大黃 二錢

右細末煉蜜作二圓用水二鍾煎一圓至六分溫服
晡時血未下再服

黃連解毒湯 二十一

欽定四庫全書 傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷下

黃連 黃蘗 黃芩 梔子

每服五錢水煎溫服 本方合大承氣湯
一法本方加枳殼 本方合三乙承氣湯

一法本方加甘遂末一錢匕本方合調胃承氣湯

一法本方合涼膈天水散

白虎湯 金匱方云太陽病無汗而渴者不可服 二十二

知母 一兩 甘草 一兩 粳米 一石 膏 四兩

右五錢水煎溫服 一法本方加蒼朮



一法本方加人參蒼朮	一法本方加半夏橘皮
一法本方加半夏桔梗	一法本方合解毒湯
一法本方加人參白朮	一法本方合涼膈湯
一法本方加麻黃根浮麥	
涼膈散 二十三	
連翹 兩半	黃芩 兩半
梔子 兩半	甘草 兩半
朴硝 一分	薄荷 兩
大黃 兩半	
右五錢水煎入蜜少許	一法本方合解毒湯
一法本方加滑石	一法本方加桔梗只殼
一法本方合天水散	一法本方加滑石調五苓散
五苓散 金匱方云陽明病汗多而渴者不可服	二十四
猪苓 伏苓 白朮 錢各五	桂心 一分
澤瀉 兩	
右或調或煎	一法本方加生姜汁調服
澹滲湯 益元是也	二十五
瓜蒂散 炒 細剉	赤小豆 等分又用
茶少許	二十六
右為末豆豉半合水一錢半煮汁半錢調下一錢匕	



不吐加服	
頭痛加鬱金 脇痛蝎稍	
三聖散 門見吐	二十七
食前先食藿汁半錢後調藥服一半用鷲翎探引吐	
出如吐少更以熱藿汁投之不已用麝香煎湯服半	
錢立止	
梔子湯 二十八	
大梔子 七枚	豆豉 半合
右以水煎梔子至一盞半入豆豉煮至半盞溫服	
梔子藥皮湯 二十九	
大梔子 十五枚	黃蘗 兩半
甘草 兩半	錢
右咬咀水二鍾煎	
梔子厚朴湯 三十	
大梔子 七枚	厚朴 兩半
枳實 二錢	
右咬咀水煎	
十棗湯 三十一	



芫花 大戟 甘遂 等分	右為末水一觔棗十枚劈開煮汁半觔調藥末半錢
匕實者一錢匕	
茵陳湯 三十二	
茵陳 兩一 大戟 兩半 梔子 枚十	
右五錢水煎 本方合陷胸湯 本方合大承氣湯	
本方五分陷胸湯三分大承氣二分	
本方合解毒湯	
欽定四庫全書 傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷下	
大黃黃連瀉心湯 三十三	
大黃 黃連 黃芩 等分	
右五錢水煎	
一法加生姜甚良	
桂苓甘露飲 即五苓散加寒水石石膏 三十四	
右為末或溫湯或新水生姜湯調或煎	
一方不用猪苓 一方加甘草	
一方有人參藿香木香葛根滑石甘草共一十三味	

一名桂苓白朮散	
人參石膏湯 三十五	
人參 二錢半 白朮 兩半 知母 兩半 黃芩 二錢 川芎 兩半 茯苓 兩半	
半夏 山梔 錢三 甘草 兩一 石膏 兩三	
右咬咀姜煎	
崔宣武人參石膏湯 三十六	
人參 二錢 石膏 兩一 川芎 兩二 黃芩 二錢 茯苓 錢二 防風 錢三	
甘草 錢五	
欽定四庫全書 傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷下	
右五錢水煎	
半夏橘皮湯 三十七	
半夏 陳皮 甘草 人參 茯苓 厚朴 各二錢半	
葛根 兩半	
右五錢姜五片	
茯苓半夏湯 三十八	
茯苓 半夏 生姜 各一錢取汁素問藥証用水一大盞煎至四分絞汁却下	
汁服 生薑	



右水煎 一方加黃芩甘草陳皮各一錢	大橘皮湯 三十九	陳皮 甘草 各一兩 人參 二兩	右五錢姜三片	赤茯苓湯 四十	陳皮 甘草 各一兩 人參 二兩 半夏 白朮 川芎	赤茯苓 各半兩	右五錢姜五片	欽定四庫全書 傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷下	檳榔散 四十一	檳榔 枳殼 等分	右為末三錢黃連煎湯調下或黃連解毒湯調下或瀉心湯調下	白朮散 四十二	白朮 茯苓 人參 藿香 各半兩 甘草 葛根 各一兩	木香 二錢半	右末白湯調下二錢熱加滑石或加生姜
------------------	----------	-----------------	--------	---------	--------------------------	---------	--------	----------------------------	---------	----------	---------------------------	---------	---------------------------	--------	------------------

四逆湯 四十三	甘草 一錢 乾姜 一分 附子 中者半箇	水煎溫服	五味子湯 四十四	五味子 半兩 麥門冬 人參 杏仁 陳皮 二錢	右五錢姜棗煎	不卧散 四十五	川芎 一兩 石膏 七錢半 藜蘆 半兩 甘草 二錢半 人參 二錢半	欽定四庫全書 傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷下	細辛 二錢半	右為末口噙水搐鼻少時飲白湯半碗汗出而解	一方無人參細辛	川芎湯 川芎 藁朮 蒼朮 等分	右為末湯調三錢須臾嘔汗便解	茈胡飲子	柴胡 人參 甘草 大黃 當歸 芍藥	右剉五錢姜五片水煎 崔宣武加半夏五味子桔
---------	---------------------	------	----------	------------------------	--------	---------	----------------------------------	----------------------------	--------	---------------------	---------	-----------------	---------------	------	-------------------	----------------------



梗	劉廷瑞方 四十五	柴胡 甘草 _{二兩} 黃芩 當歸 芍藥 _{一人參}	半夏 大黃	大勞熱五七分以為度	北金散 四十六	荊芥 麻黃 白芷 細辛 菊花 何首烏	防風 石膏 薄荷 全蝎 草烏 川芎	欽定四庫全書 傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷下	右為末各等分每服一錢煎服或茶酒送下	調胃散 四十七	水銀 舶上硫黃	右研至黑服一錢米飲下重者二錢	通神散河間另有六神通解散於此加麻黃發汗最佳	和劑方中葱白散於此去黃芩滑石加川芎白	木乾葛亦妙方也 四十八	蒼朮 石膏 _{四兩} 甘草 黃芩 _{二兩} 滑石 _{六兩}
---	----------	---	-------	-----------	---------	--------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	---------	---------	----------------	-----------------------	--------------------	-------------	--

益元散 即天水散 四十九	滑石 _{六兩} 甘草 _{二兩}	右為末水調或加蜜或葱豉湯調一名天水散一名六一散	通聖散 五十一	防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷 _{各半兩}	麻黃 連翹 芒硝 _{各半兩} 石膏 滑石 _{各一兩}	黃芩 桔梗 _{各一兩} 甘草 _{二兩} 荊芥 _{二錢} 白朮 _{二錢半}	欽定四庫全書 傷寒直格方 一 傷寒標本心法類萃 卷下	梔子 _{二錢半}	右剉五錢薑五片水煎	雙解散 五十一	益元散 通聖散 _{各半兩}	右一兩薑葱豉水煎此藥雙解加減在通聖散註中	黃連香薷飲 五十二	香薷 _{一兩} 厚朴 _{半兩} 白匾豆 _{二錢半} 香連 _{三錢}	右剉五錢入酒少許水煎冷服
--------------	-----------------------------------	-------------------------	---------	----------------------------------	--	--	----------------------------------	-------------------	-----------	---------	------------------------	----------------------	-----------	---	--------------



治腰脚骨節痛不止

用葳靈仙煎酒食前溫服極妙

無憂丸 治一切食積氣積茶積酒積瀉痢氣蠱腹脹

膨悶肚腹疼痛

黑牽牛

一斤取末
十三兩

枳榔

好者
二兩

猪牙皂角
二三稜
二兩

莪朮

二兩各用
紙煨香熟
取出切碎

右同前藥晒乾為末又用大角二兩煎湯打麵糊為

丸每服二錢半白湯送下茶亦可或姜湯下

欽定四庫全書



傷寒直格方 一傷寒標本心法類萃
卷下

太乙神鍼

羌活

獨活

黃連

各四兩
為末

麝香

二錢
二錢

右用三月三日艾四月八日亦可曬乾打草入前藥

末和勻用好白紙卷包前藥如筋大治風痺或在腿

或在腰在肱灸七炷二七炷三七炷甚効

治風蟲牙疼方

防風

去蘆
草烏

去尖
細辛

去葉
巴豆

去殼
各等分

右各味等分為細末擦牙痛處涎出立止切勿嚥下

如食飲食以鹽湯灌漱飲無礙

神効追蟲取積感應丸

廣大至道高
士沈道寧傳

枳榔

樟柳根

管仲

大黃

以上俱
各半斤

三稜

四兩
醋煮

雷丸

四兩
醋炙

莪朮

四兩
醋炙

使君子

四兩
取肉

木香

二兩

芫花

一兩

苦楝根皮

八兩

黑牽牛

二斤半
末十兩為衣

皂角

茵陳

藿香

自枳榔至牽牛為末外用皂角等三味濃煎汁為丸

如梧桐子大每服三錢重

欽定四庫全書



傷寒直格方 一傷寒標本心法類萃
卷下

金刀如聖散

又名惡
瘡方

茅山蒼朮

六兩
一日一夜

白芷

二兩

川烏

四兩
去皮

防風

四兩
生用

細辛

三兩
去土淨

白朮

二兩
五錢

草烏

四兩

本方用兩頭尖無則

川芎

四兩
雄黃

五兩
細末入藥

右件俱各生用晒乾為末用之

一切金瘡及多年惡瘡用自己小便洗過貼藥立効破

傷風緊急用好酒調藥半錢或一錢服之蛇傷入枯



白礬少許調藥敷之蝎蜚傷用吐服蓋取汗也如汗不出再服或涎出亦驗傷處敷藥可

風狗咬傷處口噙水洗淨將藥貼傷處

湯火傷盪者以新汲水調藥敷之

雷頭風并乾濕癬麻痺每服半錢服之立効

蘆薈丸 治小兒痞疾疳癆肚大腹脹面黃肌瘦脾胃

不和驚積食積並皆治之

蘆薈 麥蘖 胡黃連 以上俱各一兩 黃連 五錢 蕪荑

欽定四庫全書 傷寒直格方 卷下 傷寒標本心法類萃

肉豆蔻 木香 龍膽草 各四錢 川練子 五十箇取肉

三稜 蓬朮 各六錢 枳榔 八錢 史君子 六十箇 陳皮

青皮 各八錢 麝香 一錢半 神麴 一兩 乾蝦蟇

右為細末薄荷猪膽汁為丸粟米大每服一錢空心

米湯下

無價寶一名壯陽丹 專治五勞七傷四肢無力脚腿

沉困骨節酸疼面目無光陽痿不起下元虛冷夢失

精液服至十夜面目光滑二十夜老轉少年一月後

陽道復原四十夜增進飲食至一百日萬病皆除冬不寒夏不熱鬚髮不白婦人服之強陰煖子宮陰陽有益最有功效

川練子 二兩 牛膝 一兩 浸 枳榔 一兩 兔絲子 一兩 另

蛇床子 一兩 乾姜 五錢 穿山甲 一大片 蓮肉 一兩 不

乳香 三錢 沉香 五錢 白檀香 五錢 鹿茸 一兩 炙

巴戟 一兩 大茴香 一兩 仙靈皮 三錢 破故紙 五錢 山藥 一兩

鳳眼草 三錢 胡蘆巴 五錢 人參 一兩 澤瀉 一兩 五味子 一兩

欽定四庫全書 傷寒直格方 卷下 傷寒標本心法類萃

熟地黄 一兩 麥門冬 白從蓉 茯苓 已上各一兩

白芍藥 五錢

右二十七味除乳香沉香白檀香兔絲子四味另研

為細末其餘二十三味各搗爛為細末同前四味煉

蜜為劑同搗一 一百千杵丸如梧桐子大每服三十

丸增至十九丸好酒送下以乾物壓之修合之日再

加丁香一錢

膏藥方 和尙傳



黃香 三斤半 麻油 半斤 穿山甲 白芨 二味各少許做點藥

華麻 四十九粒研細

定子藥

白礬 一兩火煨 信 一處 乳香 五錢 沒藥 二錢 辰砂 五分

麵糊為定

生肌散

龍骨 火煨 赤石脂 火煨各半兩 乳香 沒藥 輕粉

海鰓硝 全蝎 洗焙乾各一錢 血竭 二錢 黃丹 一錢

欽定四庫全書 傷寒直格方一傷寒標本心法類萃卷下

右為末待瘡頭落盡此藥填滿在瘡口上以膏藥貼

之一日甘草湯洗二次膏藥一二日一換

追風托裏散

甘草 黃耆 當歸 芍藥 白芷 防風

川芎 官桂 瓜蒌仁 金銀花 桔梗

每服水酒共二鍾煎至一鍾空心服

象牙丸

象牙 五錢 蜂房 三錢 蟬蛻 三錢 木香 三錢 沒藥 一錢 乳香 三錢

全蝎 一錢 姜蠶 三錢

先將黃蠟半斤化開待黑色過却將前藥為細末入

蠟內攪勻傾入水內取出冷定為丸如棗大每服空

心一丸滾酒化開連三日三服待藥從漏痕出隔三

日再一服第五日再服一丸後下定子藥

傷寒用藥加減賦

萬物之生也人為最靈四時有變兮百病兆生欲辨陰

陽之証必明天地之情稽寒溫表裏之疑式明標本施

欽定四庫全書 傷寒直格方一傷寒標本心法類萃卷下

汗下補吐之法溥濟羣生始而毫毛次傳膚腠惡風自

汗乃桂枝之証喘熱惡寒則麻黃之候陰陽俱虛而身

必痒各半同功 謂麻黃桂枝各半也 寒熱共作而脉尚虛一二共

奏 亦謂用桂枝與麻黃各一也 於是助以薑棗雜以豉葱便利惡風

者乾薑心悸腹痛者建中脉熱極而煩者入人參於白

虎脉煩盛而喘者加杏子以青龍恍惚下痢而陰虛朱

雀取効頭眩肉潤而水泄玄武當功致使桔梗寬咽甘

草平悸腹內脹滿兮厚朴薑心中懊懷兮梔子豉小便不



利則投之以猪苓。膈間有痰則吐之以瓜蒂。或乃熱作而腹脇脹滿，又若狂妄而潮熱發悸，或裏以入而表未除，或小便澀而大便秘，必明大小柴胡。直叙前後承氣結胸，多渴祝侍者議在陷胸。譫語發狂，委將軍此即指大黃也。功先調胃。當知青龍十棗，分水有表裏。三黃四逆，分利有寒溫。下利者，甘草煩躁者，茯苓病煩燥則用。亡血須人參失血者則用人參。汗出加附子汗多者則加。惡風入黃芩惡風者則加。臍下有黃芩瀉心湯。水則生姜治臍下水用。心中嘔逆，則人參治嘔逆則用。四者同歸於四逆。下四者乃同於瀉心。溫寒滯而散結，積惟三白之功。妙生津液而逐水道，加五苓之效。神唾血則黃耆宜服。便膿則桃仁可加。黃疸茵陳必求之。瓜蒂謂宜先用瓜蒂而後用茵陳也。斑毒紫雪宜用於升麻謂宜先用升麻而後。溫濕之中蒼朮可入。燥熱之內附子宜加。此外若青龍與柴胡有加減之餘，議身有餘熱者，桂枝可除。脇下鞭滿者，大黃可倍。多汗者，附子加。柴奔豚者，桂枝

欽定四庫全書



傷寒直格方 卷下 傷寒標本心法類萃

水則生姜

治臍下水用生姜瀉心湯

心中嘔逆則人參

治嘔逆則用人參瀉心湯

出加附子

汗多者則加附子泄心湯

惡風入黃芩

惡風者則加黃芩瀉心湯

臍下有

當歸

其脉有欲絕者則用當歸四逆湯治之

亡血須人參

失血者則用人參

汗

有寒溫下利者甘草煩躁者茯苓

病煩燥則用茯苓四逆湯脉絕用

功先調胃當知青龍十棗分水有表裏三黃四逆分利

結胸多渴祝侍者議在陷胸譫語發狂委將軍

此即指大黃也

除或小便澀而大便秘必明大小柴胡直叙前後承氣

而腹脇脹滿又若狂妄而潮熱發悸或裏以入而表未

利則投之以猪苓膈間有痰則吐之以瓜蒂或乃熱作

欽定四庫全書



傷寒直格方 卷下 傷寒標本心法類萃

加桂喘者小青龍加杏仁嗽者小柴胡加五味瓜蒂治煩渴未除茯苓醫小便不利內寒者茱萸外腫者防己生薑止嘔半夏療噦用枳殼分綠酒毒留胸有黃蘗分因衄血出鼻或得人參以除煩或取茯苓而愈悸頭疼如破葱白連鬚咳逆欲絕乾柿併蒂下利則乾姜身痛則梔豉豈二方之獨用亦衆藥之同推妙哉吾今精此四十餘年活人之功嘗識

傷寒標本心法類萃卷下

