

文淵閣
四庫全書
電子版



子部

宣明方論



迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：宣明方論》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：<http://www.dheritage.com>
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted
by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording, or otherwise, without written permission
from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand 版本，請瀏覽
迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

子部五

宣明方論

醫家類

提要

臣等謹案宣明方論十五卷金劉完素撰是

書皆對病處方之法首諸證門自煎厥薄厥
餐洩腹脹以及諸癥心疝凡六十一證皆采

用內經諸篇每證各有主治之方一宗仲景

次諸風次熱次傷寒次積聚次水濕次痰飲

欽定四庫全書

提要
宣明方論

次勞次洩痢次婦人次補養次諸痛次痔瘻

次眼目次小兒次襍病共十七門每門各有

總論亦發明運氣之理兼及諸家方論於軒

岐奧旨實有所闡發而多用涼劑偏主其說

者不無流弊在善用者消息之耳攷原病式

自序云作醫方精要宣明論一部三卷十萬

餘言今刊入河間六書者乃有十五卷其二

卷之菊葉法薄荷白檀湯四卷之妙功藏用

九十二卷之華澄茄丸補中丸楮實子丸皆

注新增字而七卷之信香十方青金膏不注

新增字者據其方下小序稱灌頂法王子所

傳併有偈呪金時安有灌頂法王顯為元明

以後之方則竄入而不注者不知其幾矣卷
增於舊殆以是歟乾隆四十六年十月恭校

上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

欽定四庫全書

提要
宣明方論

總校官臣陸費墀



欽定四庫全書

宣明方論卷一

金 呂完素 撰

諸證門

諸證總論

黃帝曰善言天者必驗於人善言古者必合於今善言人者必厭於已如道不惑所謂明也余問夫子言而可知視而可見捫而可得今驗於發蒙解惑可得聞乎

欽定四庫全書

宣明方論

岐伯稽首對曰何道之間也天覆地載萬物悉備莫貴於人人以天地之氣生四時之法成君王宰職黎庶盡欲全形貴賤雖殊寶命一矣好生惡死者是世人之常也若人有患如救水火莫待留滯日深著於骨髓所以難矣

素問諸證畧備具題

煎厥之狀陽氣煩勞精絕辟積於夏致目盲不可視耳閉不可聽薄厥之狀陽氣大怒形氣絕而血菀於上膩

脹飧泄寒熱不散升降上下頽疝心掣寒多下墜以為諸疝心熱內掣陰陽之結四肢浮腫便血不已蠱癰之病腎氣不足冤熱劖急白液出跳掣也膀胱不利致三焦約而遺溺腎精不足強上冥視唾之若涕惡風振寒

為之勞風雖近衣絮榮虛衛實名曰肉苛心移寒於肺則肺消肺移寒於腎為湧水心移熱於肺為膈消膽移熱於腦為肺淵膀胱移熱於小腸為口糜大腸移熱於胃為食慾熱盛則陽絡溢陽絡溢為劖癰醉以入房氣

欽定四庫全書

宣明方論

竭傷肝大脫其血月事衰少名曰血枯蘊熱怫鬱生於諸風寒濕風之三氣雜合而為諸癥宗劖縱發為白淫熱聚胃口而不散行故胃脘為癰面色白黑所謂瘀劖口苦積熱名之膽癰腎虛內奪則為瘡疳血氣竭少令人解㑊腹滿不食寒中腸泄斯病驚瘡腰股痛發附腫不便寒生濡泄聊敘此證不能備舉

煎厥證 主熱

陽氣煩勞積於夏令人熱厥目盲不可視耳閉不可聽



人參散	主之治煎厥氣逆頭目昏憤聽不聞目不明七氣善怒
人參	遠志 <small>去心</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 防風 <small>去苗各二兩</small> 芍藥
麥門冬	<small>去心</small> 陳皮 <small>去白</small> 白术 <small>一兩</small> 各
右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候日再服	右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候日再服
薄厥證	主肝
陽氣大怒則形氣絕而血脈菀於上令人薄厥於胸中	陽氣大怒則形氣絕而血脈菀於上令人薄厥於胸中
赤茯苓湯	主之治薄厥恭怒則傷肝氣逆胸中不和甚則嘔血軌跡也
赤茯苓	<small>去皮</small> 人參 <small>桔梗</small> 陳皮 <small>各兩</small> 芍藥 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>去心</small> 檳榔 <small>各兩</small> 各半
右為末每服三錢水一盞生薑五片同煎至八分去滓溫服不計時候	右為末每服三錢水一盞生薑五片同煎至八分去滓溫服不計時候
殮洩證	主冷
清氣在下則生殮洩清濁交錯食不化而清穀出矣	清氣在下則生殮洩清濁交錯食不化而清穀出矣



白术湯	主之治殮洩風冷入中洩痢不止脈虛而細日夜數行口乾腹痛不已
白术	厚朴 <small>生薑製</small> 當歸 <small>去苗兩</small> 龍骨 <small>各一兩</small> 艾葉 <small>半熟炒</small>
右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至八分去滓空心溫服	右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至八分去滓空心溫服
膈脹證	主心腹
濁氣在上則生膈脹此陰陽返則氣結不散脹滿常如飽	濁氣在上則生膈脹此陰陽返則氣結不散脹滿常如飽
吳茱萸湯	主之治膈脹陰盛生寒腹滿膈脹且常常如飽不欲飲食進之無味
吳茱萸	<small>湯炒</small> 厚朴 <small>生薑製</small> 官桂 <small>去皮</small> 乾薑 <small>炮各二兩</small> 白术
右為末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至八分去滓溫服不計時候	右為末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至八分去滓溫服不計時候
風消證	主心脾
二陽之病心脾不得隱曲女人月水病血不流脾病食	二陽之病心脾不得隱曲女人月水病血不流脾病食



不化風勝真氣消

黃耆羌活散 主之治心脾受病精血虛少氣力衰乏
日溢消矣

黃耆一兩半 蘆頭 羌活 石斛 防風 枳殼火炒去穰人

參 生地黃 牡蠣燒 黑附子炮 茯苓去皮去核 五味子

牛膝酒浸各半 繢斷 地骨皮三分

右為末每服三錢水一大盞煎至八分去滓溫服不

計時候日進

欽定四庫全書
卷一 宣明方論

心掣證 主心

一陽發病少氣嗽洩三焦不利上咳下洩心煩不寧其

動若掣

調中散 主之治心掣不定胸中刺氣痞壅上若咳嗽

下若洩利

白术 乾薑炮 當歸 人參 五味子 赤茯苓

甘草炙各半 官桂一兩

右為末每服三錢水一盞煎至八分溫服去滓稍熱

日二服臨卧

風厥證 主脾胃

一陽一陰病發驚駭背痛噫欠名風厥蓋胃土肝木為
木尅土風勝濕不製腎水故令上逆

遠志散 主之治風厥多驚背痛善噫善欠志意不樂

身背皆痛

遠志去心 人參 細辛去苗 白茯苓去皮 黃耆去頭 官桂

菖蒲各一半 熟乾地黃焙 白术 防風各半

欽定四庫全書
卷一 宣明方論

結陽證 主四肢

右末每服一錢至二錢溫酒調下空心食前日三服

四肢腫四肢熱勝則腫四肢者謂諸陽之本陽結者故
不行於陰脈陽脈不行故留結也

犀角湯 主之治結陽四肢腫滿熱菀不散或毒攻注
大便悶澀

犀角屑 玄參 連翹 柴胡去苗 升麻 木通

沉香剉 射干去毛 甘草炙 芒硝 麥門冬去心



兩一

右為末每服三錢水一大盞同煎至八分食前去滓溫服

厥疝證 主腹痛

脈至太虛積氣腹中隱而難見陰沉使脾弱寒於肢膜氣厥逆也

吳茱萸加減湯 主之治厥疝腹中冷痛積氣上逆致令陰冷於肢膜

欽定四庫全書
卷一 宣明方論

吳茱萸	二兩	川烏頭	去皮炮	細辛	去苗各三兩
澆炒	湯				良薑
當歸	乾薑	官桂	各一兩		
	炮				

右為末每服二錢水一盞同煎至七分去滓溫服日

進二服

結陰 主便血

結陰便血一升再結二升三結三升以陰氣內結故不得通行血氣無宗滲入陽下致使漸多

地榆湯 主之治陰結下血不止漸漸極多腹痛不已

地榆兩四甘草三兩炙半生縮砂仁七枚每服

右為末每服五錢水三盞縮砂同煎至一半去滓溫服

解㑊證 主腎實

冬脈太過緩而溢腎實精不運解者緩㑊疑寒熱類也利腎湯 主之治解㑊春脈動氣痛氣乏不欲言此為腎元有餘矣

澤瀉 生地黃 赤茯苓去皮各一兩半 檳榔 麥門冬

欽定四庫全書
卷一 宣明方論

心	柴胡	枳殼	去穰炒	牛膝	去苗酒浸	黃芩	去朽
去							

右為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不計時候

胃疽證 主胃熱

食已如飢胃熱能消穀陽明脈終心火上行心憎煩身黃小便赤澁也

茯苓加減湯 主之治胃疽積熱食已輒飢面黃瘦胸滿脇脹小便悶赤

赤茯苓 陳皮 白澤瀉 桑白皮 剉各三兩去白皮

赤芍藥

白术 各四兩 人參 官桂 各二兩 石膏 八兩 半夏 六兩 洗生薑

湯

培製

右為末每服三錢水一盞生薑十斤同煎至八分去

滓不計時候如病甚者加大黃朴硝 各二兩

鹽病證 主脾風

脾風傳腎一名疝氣小腹痛出白液名曰鹽左傳云以喪志名為鹽病乃真精不守也

欽定四庫全書

卷一 宣明方論

大建中湯 主之治鹽病小腹急痛便溺失精溲而出

白液

黃耆 遠志 去心當歸 澤瀉 各二兩 茯苓 人參

龍骨 甘草 炙各二兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片煎至八分去滓溫服不計時候

瘧病證 主効急

鹽腹痛腎傳心効脈相引而急精液少効脈不榮灌而

引急

建中加減湯 主之治瘧効病相引而急及五勞七傷

小便數腹痛難立

人參 甘草 炙官桂 白茯苓 去皮當歸 附子 炮

厚朴 生薑製各一兩 龍骨 黃耆 剉麥門冬 白芍藥

生地黃 各四兩

右為末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚錫少許煎至一盞溫服去滓

欽定四庫全書

卷一 宣明方論

勞風證 主諸風

發在肺下病強上冥視唾涕惡風腎肺入肺中振慄故俛仰成勞風

芎枳丸 主之治勞風強上冥視肺熱上壅唾稠喉中不利頭目昏眩

川芎 枳殼 麸炒去穰各等分

右煉蜜為丸如桐子大每服十九溫水送下食後日

三服

痺氣證 主陽虛陰實

身非衣寒中非受寒氣痺者氣血不行如從水中出不必寒傷而作也

附子丸 主之治痺氣中寒陽虛陰盛一身如從水中

出

附子 炮川烏頭 炮二味通剉碎炒為末入藥官桂 川椒 菖

甘草 各四 骨碎補 炒天麻 白术

兩各二

右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸溫酒下空

心食前日三服

骨痺證 主腎弱

身寒大衣不能熱腎脂枯涸不行髓少筋弱凍慄故攣急

附子湯 主之治腎藏風寒濕骨痺腰脊疼不得俛仰兩脚冷受熱不遂頭昏耳聾音渾

附子 炮獨活 防風 苗去川芎 丹參 草薢 菖

蒲 天麻 官桂 當歸 各一 黃耆 細辛 苗去山

茱萸 白术 甘菊花 牛膝

酒浸

甘草 炙

枳殼

炒熟

右為末每服三錢水一大盞生薑五片煎至七分去滓溫服不計時候日進三服

肉苛證 主榮虛胃寒

近衣絮肉苛也榮氣虛則不仁其證癟重為苛也

前胡散 主之治榮虛衛實肌肉不仁致令癟重名曰

肉苛虛其氣

欽定四庫全書
卷一
宣明方論

前胡 去苗白芷 剥細辛 去苗官桂

川椒 去目閉口者吳茱萸 湯洗附子 炮當歸

各二

兩

右剉搗以茶酒三升勻拌同窨一宿以煉成膏脂膏

五斤入藥微煎候白芷黃紫色漉出滓成膏病在處摩之病以熱調此藥櫻桃大癥瘕瘡瘍皆治并去諸風瘡痒疼痛傷折墜損故摩內皆可用之

肺消證 主心肺

迪志文化出版有限公司出版



心移寒於肺肺消飲少洩多當補肺平心死而可治乃 心肺為賊也	黃耆湯	主之治消肺飲少洩多補肺平心移寒在肺 痿劣
黃耆 <small>三兩</small> 五味子 <small>二兩</small> 人參 <small>一兩</small> 桑白皮 <small>二兩</small> 剉各一 枸杞子 <small>二兩</small> 熟地黃 <small>一兩</small>	涌水證	主水病
右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時	右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時	右為末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去
肺移寒於腎名曰涌水其證如溢囊裏裹將或徧身腫 滿按腹不堅疾行則濯濯有聲或咳喘不定	滿按腹不堅疾行則濯濯有聲或咳喘不定	人參 <small>二兩</small> 葛根 <small>一兩</small> 知母 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 生地黃 <small>一兩</small>
葶苈丸	右為末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去 滓溫服食後	右為末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去 滓溫服食後
主之治涌水腹滿不堅溢如囊裏裹漿疾行 則濯濯有聲	口糜證	口糜證
葶苈丸	主之治口糜生瘡損爛小腸有熱脹 滿不便宜服之	主之治口糜生瘡損爛小腸有熱脹 滿不便宜服之
右為細末煉蜜和丸如桐子大每服二十九葱白湯 下不計時候以利為度	柴胡地骨皮湯	柴胡地骨皮湯
右為細末煉蜜和丸如桐子大每服二十九葱白湯 下不計時候以利為度	柴胡 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 分等	柴胡 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 分等



膈消證	主肺門	心移熱於肺名曰膈消二者心膈有熱久則引飲為消 渴耳
麥門冬飲子	主之治膈消胸滿煩心津液燥少短氣 久為消渴	麥門冬飲子
人參	葛根	人參 <small>二兩</small> 葛根 <small>一兩</small> 知母 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 生地黃 <small>一兩</small>
右為末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去 滓溫服食後	右為末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去 滓溫服食後	右為末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去 滓溫服食後
口糜證	主口	口糜證
膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜心胃壅熱水穀 不化轉下小腸	膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜心胃壅熱水穀 不化轉下小腸	膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜心胃壅熱水穀 不化轉下小腸
柴胡地骨皮湯	主之治口糜生瘡損爛小腸有熱脹 滿不便宜服之	柴胡地骨皮湯
右為末每服三錢水一大盞煎至八分去滓食後如 下不計時候以利為度	柴胡 <small>一兩</small> 地骨皮 <small>一兩</small> 分等	右為末每服三錢水一大盞煎至八分去滓食後如 下不計時候以利為度



有病人大段實者加大黃朴硝可瀉熱甚

處瘕證
主女病

大腸小腸移熱名處瘕津液耗散不能滑利菀結而大

腸閟澁

檳榔圓
主之治大腸有遺熱津液壅滯腹痛悶澁名
曰處瘕證

檳榔
大黃
炒枳殼
剉麵炒去穰各二兩
木香
桃仁
去皮尖炒

大麻仁
另研各一兩

右為末煉蜜和圓如桐子大每服十圓至十五圓溫
酒下不計時候湯亦得

食亦證
主胃病

大腸移熱於胃善食而瘦或胃熱遺於膽能食善飲大
勝土也

參苓圓
主之治食亦胃中結熱消穀善食不生肌肉
此名食你

人參
菖蒲
遠志
赤茯苓
地骨皮
牛膝

欽定四庫全書

卷一
宣明方論

酒浸各
一兩

右為末煉蜜為圓如桐子大每服十圓至十五圓米
飲下不計時候

鼻淵證
主鼻門

膽移熱於腦則辛頻鼻淵濁涕不止如涌泉不滲而不
久不已効血為患

防風湯
主之治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已
必成効血之疾

欽定四庫全書

卷一
宣明方論

酒浸各
一兩

黃芩
人參
甘草
炙麥門冬
去心各一兩
川芎
去蘆一兩
防

風
去蘆一
兩半

右為末每服二錢沸湯點之食後服日三服

効蟻證
主失血

膽受胃熱循脈而上於腦陽絡溢血妄行在鼻空蟻目
瞑者

定命散
治膽受熱血妄行鼻中効蟻并血汗不止

朱砂
水銀
麝香
分等



右為末每服半錢新汲水調下不計時候如用藥看老幼虛實加減

鼓脹證 主胃病氣逆

病有心腹脹滿旦食不能暮食致令胃逆不散太陽不傳逆滿

雞屎醴散 治鼓脹旦食不能暮食痞滿古法用此可擇焉

大黃 桃仁 雞屎醴

乾者各等分

欽定四庫全書
卷一 宣明方論

臨卧服

血枯證 主婦人經病

年少醉入房室氣竭肝傷故經衰少不來肝傷則血涸脾胃相傳大脫其血目眩心煩故月事不來也

烏魚骨圓 主之治血涸胸脇交滿妨飲食變則聞腥臊之氣唾血出清液前後洩血

蕷茹 烏賊魚骨 各一

右為末雀卵不拘數和成劑圓如小豆大每服五圓至十圓煎飽魚湯下食後此日三服食壓之妙矣

右為末每服半錢新汲水調下不計時候如用藥看老幼虛實加減

鼓脹證 主胃病氣逆

病有心腹脹滿旦食不能暮食致令胃逆不散太陽不傳逆滿

雞屎醴散 治鼓脹旦食不能暮食痞滿古法用此可擇焉

大黃 桃仁 雞屎醴

乾者各等分

欽定四庫全書
卷一 宣明方論

臨卧服

血枯證 主婦人經病

年少醉入房室氣竭肝傷故經衰少不來肝傷則血涸脾胃相傳大脫其血目眩心煩故月事不來也

烏魚骨圓 主之治血涸胸脇交滿妨飲食變則聞腥臊之氣唾血出清液前後洩血

宣明方論卷一

欽定四庫全書

宣明方論卷二

金 呂完素 撰

諸證門

伏梁證 主心積

若梁之伏隱也居臍上逆臍下順不可移動為水溺故有二等

鼈甲湯 主之治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便

不利

欽定四庫全書

宣明方論

鼈甲去裙欄醋炙黃色京三稜 大腹子皮 芍藥 當歸 柴胡去苗生地黃兩各一官桂生薑作片子焙乾

右為末每服三錢水一大盞入生薑木香半錢同煎

至八分去滓空心溫服

瘡俳證 主腎虛

內奪而厥舌瘡不能言二足廢不為用腎脈虛弱其氣

厥不至舌不仁經云瘡瘍足不履用音聲不出者

黃飲子 主之治瘡瘍腎虛弱厥逆語聲不出足軟不

用

熟乾地黃 巴戟心去山茱萸石斛 肉蓯蓉酒浸附子炮培

五味子 官桂 白茯苓

麥門冬去心菖蒲 遠志去心等分

右為末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚薄荷

同煎至八分不計時候

欽定四庫全書

宣明方論

厥逆證 主心痛

膺腫頸痛胸滿腹脹上實下虛氣厥而逆陽氣有餘鬱於胸也不可鍼灸宜服順氣湯

小茯苓湯 主之治厥逆病三焦不調升降胸膈膺腫胸滿腹脹冷氣衝注刺痛

赤茯苓 人參 陳皮去白桔梗剉炒各等分

右為末每服三錢水一大盞半生薑五片同煎至八分

去滓不計時候



風成寒熱證 主風

因於露風寒熱之始腠理次入胃食不化熱則消中寒
慄振動也

解風散 主之治風成寒熱頭目昏眩支體疼痛手足
麻痺上膈壅滯

人參 川芎 獨活 麻黃 去節湯洗各一兩 甘草 一細
辛 半兩 苗

右為末每服三錢水一盞半生薑五片薄荷葉少許

欽定四庫全書
卷二 宣明方論

同煎至八分不許時候

風成寒中證 主風

風氣與陽明入胃循脈而上至目皆津液所生為泣也
當歸湯 主之治風邪所傷寒中目泣出自肌瘦洩汗
不止

當歸 人參 官桂 各三 錢 乾薑 炮白术 白茯苓
甘草 川芎 白芍藥 各半 細辛 半兩 陳皮 一
白去

右為末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎
至八分去滓熱服不許時候併三服

風成熱中證 主風

風氣與陽明入胃循脈而上目眥肥人氣不外洩為熱
中目黃之病也

青龍散 主之治風氣邪傳化腹內癥結而目黃風氣
不得泄為熱中煩渴引飲

地黃 仙靈脾 何首烏 去黑皮泔浸一宿竹防
刀子切焙各一分 風苗 荆芥穗 兩
欽定四庫全書
卷二 宣明方論

右為末每服一錢沸湯點調下食後每日三服

風 腦風證 主風氣

氣循風府而上則為腦風頂背怯寒腦戶極冷以此為
病

神聖散 主之治腦風邪氣留飲不散頂背怯寒頭疼
不可忍者

麻黃 去節細辛 去苗 乾蝎 一半 生藿香葉 各分 等

右為末每服二錢煮荆芥薄荷酒調下茶亦得并血風

又方 治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者用遠志末不以多少於鼻中噙與痛處柔之相兼前藥可用也

首風證 主新沐中風

中風為首風頭面多汗惡風當先一日甚至其風日則少愈

大川芎丸 主之治首風旋暉眩急外合陽氣風寒相

搏胃膈痰飲偏正頭疼身拘倦

川芎一斤
天麻四兩用
鄆州者

右為末煉蜜為丸每兩作十九每服一丸細嚼茶酒下食後

秘方茶酒調散 治一切諸風痰壅目澁昏眩頭疼心憤煩熱皮膚痛痒并風毒壅滯清爽神志通闢關竅消惡汗

石膏另
細末
為
菊花
細辛去
苗
香附子
各等分

欽定四庫全書

卷二
宣明方論

石膏二兩
燒研細末川芎一兩
炙甘草半兩
炙

右為末每服一錢葱白好茶同煎湯調下食後日二

服

漏風證 主酒風

飲酒中風或汗多不可單衣食則汗出多如液漏久不治為消渴疾

白术散 主之治漏不久虛風多汗食之汗出如洗少者瘦劣

牡蠣二錢
焙赤白术一分
防風二兩
半

右為末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍防風

右為末每服二錢溫茶酒調下食後每日三服

目風眼寒證 主眼門

風入系頭則血脈凝滯不能上下通流於目令風寒客之風眼寒也

石膏散 主之治目風眼寒及偏正頭疼夾腦風鼻出清涕目淚疼痛不已

欽定四庫全書

卷二
宣明方論

石膏二兩炭火
燒研細末川芎一兩
炙甘草半兩
炙

右為末每服一錢葱白好茶同煎湯調下食後日二

服

漏風證 主酒風

飲酒中風或汗多不可單衣食則汗出多如液漏久不治為消渴疾

白术散 主之治漏不久虛風多汗食之汗出如洗少者瘦劣

牡蠣二錢
焙赤白术一分
防風二兩
半

右為末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍防風



白术如汗多面腫倍牡蠣

胃風證
主風

因於失衣風感之頸汗多惡風膈塞不通寒則胃拽腹滿氣不通

大豆蔻丸胃風湯
主之治胃風頸多汗惡風飲食不下

下小腹善滿失衣則腹脹食寒則瀉形瘦

肉豆蔻 草豆蔻 陳皮 獨活 蒼芷仁 人參 川芎 各半
兩 半羌活 防風 桔梗 甘草 炙木

欽定四庫全書

宣明方論

香分各

右為末煉蜜為丸如桐子大每服四十丸米飲下不計時候日進三服

胃風湯
治風冷乘虛入客腸胃水穀不化腸脹虛滿

疔痛及腸胃泄毒或下瘀血

人參 白茯苓 去皮 芎芢 官桂 當歸 去苗 白芍藥

白术
分
各等

右為末每服二錢水一大盞入粟米百餘粒同煎至

七分去滓熱服空心食前

此藥與豆蔻丸為表裏也

行痺證
主痺

風寒濕三氣合而為痺風氣勝者行痺上下左右無留隨所至作

防風湯
主之治行痺行走無定

防風 甘草 當歸 赤茯苓 去皮 杏仁 去皮 炒熟桂各兩 黃芩 秦艽 葛根 錢各三 麻黃 去節半兩

右為末每眼五錢酒水合二盞乘三枚薑五片煎至

一盞去滓溫服

痛痺證
主痺

寒勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜通氣溫經而愈

茯苓湯
加減治痛痺四肢疼痛拘倦浮腫

赤茯苓 去皮 桑白皮 各二 防風 官桂 川芎 芍藥 麻黃 去節各一半半

右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分去滓溫服以薑粥投之汗泄為度效矣

著痺證 主痺

濕氣勝者為著痺濕地水氣甚重著而不去多汗而濡者

茯苓川芎湯 主之治著痺留注不去四肢麻拘攣浮腫

赤茯苓 桑白皮 防風 官桂 川芎 麻黃
芍藥 當歸 甘草炙各等分

右為末每服二錢水二盞棗三枚同煎至一盞去滓

欽定四庫全書

卷二
宣明方論

空心溫服如欲出汗以粥投之

周痺證 主痺

黃帝鍼經云在血脈之中隨上下本痺不痛今能上下周身故以名之

大豆孽散 主之治周痺注五臟留滯胃中結聚益氣出毒潤皮毛補腎氣

人豆孽一斤炒香熟

右為末每服半錢溫酒調下空心加至一錢日三服

胞痺證 主膀胱

小腹膀胱按之內痛若沃以湯澁於小便上為清涕太陽直行從巔入循於腦氣下灌於鼻時出清涕不止

腎著湯 主之治胞痺小便不利鼻出清涕者

赤茯苓去皮 白术各四兩 甘草三兩 乾薑炮二兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日三服

腸痺證 主痺

欽定四庫全書

卷二
宣明方論

雖多飲不得溲不成大便使糟粕不化故氣喘急而飧

洩

木香丸 主之治腸痺腹瀉痛時發飧洩氣不消化小便秘澀

木香 白术 官桂 蕃藶 良薑 訶子皮各一兩
附子炮去皮 厚朴生薑製 肉豆蔻各二兩 乾薑三分 甘草

兩半

右為末麪糊為丸如桐子大每服二十九薑湯下



兩半
甘草
炙一分

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候

新補又方 治陽厥若除煩下氣鐵洛為飲鐵漿湯飲之食後併服

息積證 主腹心

病脇下滿逆氣不已氣聚脇下息而不消積而不散氣

元在胃妨飲食不可鍼灸宜導引服藥爾

欽定四庫全書

卷二
宣明方論

白术丸 治息積脇下氣逆妨悶喘息不便呼吸引痛不已

白术 枳實 官桂
各半人參二兩陳皮 桔梗炒醋

甘草
錢各一

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九溫酒下日

三服

療効證 主肝

人有尺脈數甚効急而見腹必急數亦為虛効見以名

耳

柏子仁散 主之治療効肝虛生寒脈寒數効急腹脇痞悶効見於外

聖惠方中十五味
柏子仁丸亦治

柏子仁 茯苓 防風 細辛 白朮 官桂
枳殼 川芎
各三兩 附子 當歸 檳榔
各半兩

右為末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服不計時候

厥逆頭疼證 主胃

欽定四庫全書

卷二
宣明方論

腎虛犯大寒頭疼齒亦痛痛之甚數不已者是也

天南星丸 主之治厥頭痛齒痛骨寒胃脈同腎脈厥逆頭痛不可忍之

天南星
炮硫黃研石膏研消石等分

右為末麪糊為丸如桐子大却每服二十九溫酒下空心日午臨卧三時服

膽痺證 主肝

謀慮不決膽虛氣上衝口中上溢則口苦是清淨之府

濁擾之氣上溢

益膽湯 主之治膽痺肝虛熱氣上衝口中常苦洩熱不已藏府固虛致然

黃芩 去
甘草 炙
人參 各二
官桂 兩一
苦參 茯神 各半

右為末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服不計
計時候

濡洩證 主利

欽定四庫全書

卷二 宣明方論

內經云濕勝則濡甲乙經云寒客生濡胃洩如隨氣而
下利

豆蔻散 主之治濡洩不止寒客於脾胃故傷濕而腹
痛滑利不止

肉豆蔻 五個
甘草 炙
厚朴 各半

右為末每服二錢米飲一盞調下食前白湯亦得

鶩溏證 主利

脾虛風冷陰盛糟粕不化大便黃黑如鶩溏或大腸有

寒也

吳茱萸丸 治鶩溏洩瀉不止脾虛胃弱大腸有寒大
便青黑或黃利下

吳茱萸 炒
湯洗
乾薑 赤石脂 陳鞠熟炒當歸焙厚
朴錢各三

右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十九溫米飲下
空心服

三焦約證 主大小腸

欽定四庫全書

卷二 宣明方論

小腹痛不得大小便邪氣入客約而不行故穀氣不得
通也

枳殼丸 主之治三焦約調順三焦氣脈消痞滯利胸
膈治風通大小便

陳皮 一
檳榔 半
牽牛 四兩一半生一半熟搗木香
取頭末一兩半餘不用
一分 枳殼 二
兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十五丸生薑湯下
食後日三服



胃寒腸熱證 主胃

胃寒主收水穀不化洩瀉寒之氣在上腸熱之氣在下故脹而洩

妙應丸 主之治胃寒腸熱水穀不化腹脹痞滿洩利不已

川烏頭去尖半兩 桔子仁乾薑生各一分

右為末生薑汁麪糊為丸如桐子大每服五丸溫酒

下食前日進二服

欽定四庫全書

卷二 宣明方論

胃熱腸寒證 主胃

胃熱則消穀善食而飢奈腸寒則血凝脈重小便痛痛而脹

青橘皮丸 又云前胡香散亦治 水治胃熱腸寒善食而飢便溺小腹而脹痛大便或澀

青皮京三稜黃連蓬莪茂炮各一兩 芭荳霜分

右為末麪糊為丸如菉豆大每服三丸至五丸茶酒

下食後少與之不可多也

控睾證 主小腸

甲乙經云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺邪所系

茴香棟實丸 主之治小腸病結上而不下痛衝心肺

茴香炒練石去核炒石茱萸 馬棟花醋炒各陳皮一兩 芫花醋炒半兩

右為末醋麪糊為丸如桐子大每服十九至二十九溫酒下空心食前

陰疝證 主男病

欽定四庫全書

卷二 宣明方論

足厥陰之脈環器底小腹腫或痛腎虛寒水涸渴瀉邪

補脈為治

蒺藜湯 主之治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也嘻慾勞痛不可忍之

蒺藜炒去角附子炮去皮臍梔各等分

右為末每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前溫

服控罩證茴香練實丸 此證亦治



諸瘧證 主風

痺迺風寒濕三氣相合而為痺風者百疾之長善行數變當汗惡風目瞓脇痛或走注四肢皮膚不仁屈伸不便	升麻前胡湯	主之治肝風虛所中頭痛目眩胸膈壅滯心煩痛昏悶屈伸不便	升麻 前胡 <small>半一兩</small> 玄參 地骨皮 <small>各一錢</small> 羚羊角	葛根 <small>各二兩</small> 酸棗仁 <small>一錢</small>	右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓再煎三五沸食後溫服如行五六里更進一服	心疝證	主心痛	心脈急小腹有形心不受邪必傳於腑故小腹有形心氣逆不順當痛不已當兼心氣治不止為有寒邪所中木香散	主之治心疝小腹痛悶絕不已者	右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服
欽定四庫全書 卷二 宣明方論										



四聖散	治腎臟風并一切癬	白附子	白蒺藜	黃耆	羌活	各等分	右為末每服二錢鹽湯調下空心一日三服久癬不差十日大愈	赴筵散	治口瘡不已者	蜜陀僧	黃藥	青黛	各等分	右同研為細末每用乾糲於瘡上不過三二日即便愈	訶子湯	治失音不能言語者	訶子	四箇半生桔梗 <small>一兩半生甘草二寸半</small>	右為細末每服二錢用童子小便一盞同水一盞煎至五七沸溫服甚者不過三服即愈
欽定四庫全書 卷二 宣明方論																			





百病之首也其變乃乃為他病無常皆風氣所發也

以四時五運六氣千變萬化衝盪推擊無窮安得失時而絕也故春甲乙傷於風者為肝風夏丙子傷於風者為心風季夏戊己傷於風者為脾風秋庚辛傷於風者為肺風冬壬癸傷於風者為腎風

風中五臟六腑自愈而入為藏府之風肺風之狀多汗惡風色白時嗽短氣晝則微暮則甚心風之狀上善怒同色赤病甚則言不可快肝風善悲色微蒼嗌乾善怒時

欽定四庫全書

卷三
宣明方論

憎女子脾風身體怠惰四肢不收色薄微黃不嗜飲食腎風面龐而浮腫脊痛不能正立其色如隱曲不利又曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風大生於熱以熱為本而風為標風言風者即風熱病也氣壅滯筋脈拘倦肢體焦痠頭目昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嗽喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜卧

寢汗咬牙睡語觕惕驚悸或腸胃拂鬱結水夜不能浸潤於周身而但為小便多出者或濕熱內鬱而時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停濕而泄或燥濕往來而時結時泄

者或表之陽如正氣衛氣與邪熱相合并入於裏陽極似陰而戰煩渴者熱間寒故戰渴或虛氣久不已者經言與衛氣并入於裏則寒戰也并出之或風熱走注疼痛於表則發熱大則病作離則病已麻痺者或腎水真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒

欽定四庫全書

卷三
宣明方論

中久不語或一切暴瘡而不語語不出聲或暗風癰者或洗頭風或破傷或中風諸潮搐并小兒諸瘡積熱或驚風積熱傷寒疫癰而能辨者或熱甚怫結而反出不快者或熱黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑偏身黑黧紫白斑駁或面鼻生紫赤風刺癰瘍俗呼為肺風者或成風癰世傳為大風疾者或腸風痔漏并解酒過熱毒兼解利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身體疼痛者并兩感諸證兼治產後血液



損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚為諸熱證腹滿澀痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強口噤動

惕肉瞞一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿樰痛而昏者

吐者過多而不宜服之兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損痛疼或因而熱結大小便澀滯不通或腰腹急

痛腹滿喘悶者

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷葉

欽定四庫全書

卷三
宣明方論

麻黃 連翹 芒硝已上各半兩

桔梗各一兩 滑石三兩 甘草二兩 荆芥半兩 白朮 桔子各半兩

分

右為末每服二錢水一大盞生薑三片煎至六分溫

服涎嗽加半夏半兩

賈同知通聖散

防風 芍藥各二錢半 甘草三兩 荆芥三錢半 薄荷一兩 黃芩

白朮一兩 石膏二兩 川芎半兩 滑石三兩 當歸半兩 大黃兩半兩

麻黃半兩 山梔子分 連翹半兩 桔梗一兩 無芒硝 無縮

砂

崔宣武通聖散

防風 芍藥 荆芥 當歸 白朮 山梔子

一各

川芎 大黃 薄荷 連翹 黃芩 桔梗

分各半兩

縮砂各半兩 甘草各一兩 石膏各一兩 滑石三兩

劉庭瑞通聖散

此方有縮砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞於河間守真先

欽定四庫全書

卷三
宣明方論

生札師傳之隨從二年始受於方斯且取為端而可准憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中何以疑之因錄但庭瑞臨時以意加減一依前法嗽加半夏半兩生薑

製

防風天麻散 治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯強暴音不語內外風熱壅滯解昏眩

防風 川芎 天麻 羌活 香白芷 草烏頭

白附子 荆芥穗 當歸 焙 甘草各半兩 滑石二兩

右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸

或半丸細嚼白湯化下亦得散鬱結宜通氣如甚者更服

犀角丸 治風癇日發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末半兩赤石脂三兩朴硝二兩白僵蠶一兩薄荷葉一兩

右為末麪糊為丸如桐子大每服二十丸至三十九溫水下日三服不計時候如覺痰多即減丸數忌油

膩物風痘病目直卒中口禁背強如弓卧搖動手足
搐搦無汗名剛為陽痘有汗名柔為陰痘通三一承氣下妙

搜風丸 治邪氣上逆以致上實下虛風熱上攻眼目昏耳鳴鼻塞頭痛眩運躁熱上壅痰逆涎嗽心腹痞痛大小便結滯清利頭面鼻聰耳鳴宣通血氣

人參 茯苓 天南星半兩乾生薑 蘿香葉一分白
礬生各一兩蛤粉二兩寒水石一兩大黃 黃芩一兩牽牛四兩

薄荷葉半兩滑石四兩半夏一兩

右為末滴水為丸如小豆大每服十九生薑湯下加至二十九日三服

川芎石膏湯 治風熱上攻頭面目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋悶眼生翳膜清神利頭宣通氣血

中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

川芎 茜草 當歸 山梔子 黃芩 大黃

石二兩甘草三兩桔梗二兩縮砂仁一分石膏 滑石四兩寒水

菊花 荆芥穗 人參 白术各半兩山梔子

欽定四庫全書

卷三 宣明方論

翹 薄荷葉各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後水調亦得忌薑醋發熱物

川芎神功散 治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新頭面昏眩清神

川芎四錢甘草一分川烏頭 吳白芷 天南星 麻

黃各半兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片煎至半盞投清



酒半盞避風

換骨丹 治癱瘓中風口眼喎斜半身不遂并一切風
癇暗風並宜服之頌曰

我有換骨丹 傳之極幽秘 跖開病者心

扶起衰翁臂 氣壯即延年 神清自不睡

南山張仙翁 三百八十歲 槐皮芎朮芷

仙人防首蔓 十件各停勻 苦味香減半

龍麝即少許 朱砂作衣纏 勿令陰人見

夜卧服一粒 遍身汗津滿 萬病自消除

神仙為侶伴

麻黃膏煎 仙术 香白芷 槐角子取子川芎 人參

防風 桑白皮 苦參 威靈仙 何首烏

蔓荆子 木香 龍腦研 朱砂研 麝香研 五味子

右為末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千

下每兩分作十九丸每服一丸以硬物擊碎溫酒半盞

浸以物蓋不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣蓋覆當

自出汗即瘥以和胃湯及避風寒茶下半

鉛紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色刺癰癢呼
為肺風者以肺主鼻而又淺在皮膚之內皮膚屬於肺

船上硫黃 白礬灰半兩

右為末少許入黃丹染與病人面色同每上半錢津

液塗之洗嗽罷臨卧再効速

神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻并牙齒悶痛

川芎 鬱金各二錢 荆芥穗 薄荷葉 紅豆各一分

右為末入盆硝二錢研勻鼻內噙三二剜耳許力慢

加藥病甚兼夜啼

萬靈丸 治腎藏一切耳鳴腰疼筋骨痛

赤芍藥 五靈脂 防風 草烏頭炮 黃蓍

細辛 海桐皮 山茵陳 骨碎補 地龍各八錢

黑狗脊二兩 牛膝 何首烏 蔓荆子 白附子

川烏頭 巨勝子各八錢 仙术一兩 芫花三錢 黑牽牛

半兩 青皮二錢 御米子二錢 炒

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服十九至二十九

溫酒下空心食前服

伊祁丸 治腰脚拳彎鶴膝風筋縮

伊祁頭尾全者桃仁生白附子阿魏桂心白芷

當歸北漏盧安息香用胡桃研芍藥牛膝

地骨皮威靈仙羌活各等

右為末麪糊為丸如彈子空心每服溫酒化下一丸

祛風丸 治中風偏枯手足戰掉語言蹇澁筋骨痛

欽定四庫全書

卷三
宣明方論

菉豆粉川烏頭草烏頭炮天南星半夏各一

兩甘草川芎藿香葉苓苓香地龍竭

稍錢各三白殭蠶淘米泔浸去絲川薑炮半兩

右為末一兩用菉豆粉一兩又一用藥一兩以白麪

二兩滴水為丸如桐子大量人虛實加減細嚼茶酒

下五丸至七丸食後初服三丸漸加

舒筋散 治婦人血氣并產後風熱搐搦舒筋俗名雞爪風

人參川芎官桂丁香各半木香天麻酒浸

右為末每服一錢水一盞煎溫服酒茶亦得

勝金丸 治風熱驚駭不時旋運潮搐口吐痰沫忽然

倒地不省人事名曰癇病

覆汗出為效

勝金丸 治風熱驚駭不時旋運潮搐口吐痰沫忽然

倒地不省人事名曰癇病

白僵蠶真者好白礬枯桔梗歲靈仙何首烏

欽定四庫全書

卷三
宣明方論

草烏頭各荆芥穗川芎各二兩

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服十九食後溫酒

比金散 治傷寒胃風頭目痛四肢拘倦鼻塞

欽定四庫全書

卷三
宣明方論

麻黃白芷細辛荆芥穗菊花防風

石膏何首烏川芎薄荷乾蝎草頭烏

各等

右為末每服一錢水一盞煎溫服酒茶亦得



神白丹 治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不効此方不可盡述

鉛白霜 一輕粉半分 粉霜 一兩用白麪六錢和作餅子炙熱同研

右為末滴水為丸桐子大每服十九至十五丸米飲

下量虛實加減

桃仁丸 治一切風毒偏身疼痛四肢拘急

草烏頭 用生五靈脂三兩桃仁一兩取霜

右為末酒煮麪糊丸如桐子大以青黛為衣嚼胡桃

仁以溫酒下五丸食後加減

瓜蒂神妙丹 治頭目昏眩偏正頭痛等

焰硝 雄黃 川芎 薄荷葉 道人頭 梨蘆

各一
天竺黃一錢半如之
以蔚金代之

右為末研細含水鼻中噙壹字神驗

清風散 治頭目昏眩咽膈不利痰涎壅塞

石碌 一錢朱砂 牙硝 雄黃 各三 龍腦 一字 爪蒂 一錢二錢

滑石 赤小豆 半錢 皐角 一字去皮 炙黃 取末

右為極細末每服半錢新汲水調下如噤不省人事滴水鼻中或健者可治為驗

靈砂丹 治破傷風一切諸風等

歲靈仙

黑牽牛 何首烏

蒼朮 半兩 香附子 六兩

川烏豆 去尖 朱砂

沒藥 乳香 各三錢 陳阜角 四錢炙黃

皮去

右為末把阜角打破用酒二升半春夏三日秋冬七日取汁打麪糊為丸如桐子大每服五丸如破傷風

煎鰣酒下如牙疼赤眼搘碎研三五丸鼻噙之

天麻散 治頭頂痛頭面腫拘急風傷榮衛發燥熱

川芎 細辛 苦參 地骨皮 葛蒲 何首烏

蔓荊子 薄荷葉 杜錢黎 牛蒡子 荆芥

穂 蟎坡草 蔚靈仙 防風 天麻 一兩 甘草 二兩

炙

右為末每服二三錢研蜜水調下茶水任不計時

薄荷白檀湯 新補 治風壅頭目眩鼻塞煩悶精神不爽消

風化痰清頭目

白檀一兩 荆芥穗二兩 薄荷葉四兩 茴蔥根二兩 甘草四兩
白芷二兩 鹽四兩 縮砂仁半兩

右為末每服一錢百沸湯點食後臨卧稍熱溫服

菊葉湯 治一切風頭目昏眩嘔吐面目浮腫者

菊花梗去各等分 羌活 獨活 旋覆花 牛蒡子 甘草

右為末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去

滓溫服食後

者皆熱

黃帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也因熱少愈猶未盡除不戒飲食勞動情慾擾亂柰脾胃氣虛未能消化堅食故熱復生五臟

風論

欽定四庫全書
宣明方論卷四

金 刘完素 撰

欽定四庫全書

宣明方論

欽定四庫全書
卷四 宣明方論

宣明方論卷三

夫熱病者傷寒之類也人之傷於寒則為病熱寒毒藏於肌膚陽氣不行散發而內為怫結故傷寒者反病為熱熱雖甚不死柰巨陽為首巨陽者諸陽之屬也諸陽為熱以氣諸陰為寒以血熱病已愈其有復作謂病已衰而熱有作所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺緣熱也雖邪氣而不盡遺熱在故當復作五藏俱熱者皆視之肝熱左頰先赤心熱頤先赤脾熱鼻先赤肺熱右頰先赤腎熱頤先赤肝熱者小便黃腹

痛多卧身熱熱爭則狂驚脇滿手足躁而不得安卧心
熱者不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面
赤無汗脾熱者頭重頰痛煩心顏青欲吐身熱熱爭則
腰痛不可仰腹滿泄兩領痛肺熱者浙然厥起毫毛惡
風寒舌上黃身熱熱爭則唾咳痛走胸背不得太息頭
痛不堪汗出而寒腎熱者腰痛脢痠苦渴數飲食熱熱
爭則項痛而強脅寒且痠足下熱不欲言 經曰汗出
脉躁盛一死脉不與汗相應其病二死狂言失志者三
死皆是怫鬱結不能解散以致危殆

欽定四庫全書

宣明方論
卷四

素問諸熱瞀瘛暴瘖冒昧躁擾狂言罵詈驚駭附腫疼
痠氣逆皆手少陽相火心胞絡三焦之氣也

夫腎水真陰本虛心火狂陽積熱以甚以致風熱壅滯
頭面昏眩肢體麻痺皮膚瘡瘍筋脉拘倦胸膈痞滿時
或痛悶或鼻窒鼽衄口舌生瘡咽喉不利牙齒疳蝕或
偏身生瘡癬疥或睡語咬牙驚惕虛汗或健忘心忪煩
燥多睡或大小便澁滯或煩熱腹滿或酒過積毒勞役

過度中外一切勞損神狂氣心志不寧口苦咽乾飲食
減少變生風熱諸病虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛
人或脾胃經虛風熱燥鬱色黑齒宣身瘦焦痿或熱中
煩滿飢不飲食或癰或消中善食而瘦或消渴多虛頭
面腫小便數或服甘辛熱藥過度變成三消上則消渴
中則消中下則消腎小便白膏也

神芎丸 治一切熱證常服保養除痰飲消酒食清頭

目利咽膈能令偏身結滯宣通氣利而神強體健耐

欽定四庫全書

宣明方論
卷四

傷省病并婦人經病及產後血滯腰脚重痛小兒積熱
驚風潮搐藏用丸亦曰顯仁丸加黃連薄荷川芎各半
兩名曰神芎丸

大黃 黃芩 各二兩 牽牛 滑石 各四兩

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十九至十五
丸每服加十九日三服冷水下亦得或煉蜜丸愈佳
或久病熱鬱無問瘦悴老弱并一切證可下者始自
十九每服加十九以利為度如常服此藥但除腸垢



積滯不傷和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損頗遂病人心意或熱甚必須急下者便服四五十丸未利再服以意消息三五歲孩兒丸如麻子大凡此一法此藥至善常服二三十丸不利

藏府但有益無損或婦人血下惡物加桂枝半兩病微者常服病重者亦取利因而結滯開通惡物自下也此方除藏府滑泄者或重寒脉遲者或婦人經病產後血下不止者及孕婦等則不宜服除此以外一

一切風熱雜病悶壅塞神氣不和或平人保養常服自顯其功若以効驗觀其藥味則非明本草造化之理者不可得而知其然也猶孔子讚易道明顯應化萬仁之善而不見其大道之功用故曰顯諸仁藏諸用因以云藏用九亦其義也兼以世訛之久矣而反不喜此等妙方不肯服之每有久獲大効而誠懇求其方不得已而授之既見其方反生疑懼不復用焉亦有効而志信求其方務以廣傳救病因而衆議百端

擬疑妄生謗說使致俗醫皆畏之致道不能神但有妨病者後之君子但行其藥明顯諸人勿示其方而密藏諸用耳或以一法加黃連川芎薄荷等各半兩治一切頭目昏眩者愈佳

柴胡飲子 治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來

表裏和則發寒裏熱表和則發熱邪熱半在表半在裏出入進退無和即寒熱往來陰陽相勝也畜熱寒

戰表之陽和正氣與邪熱并畜於裏脈道不行故身冷脉絕寒戰而反煩渴也及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱未愈汗後勞

復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芩 甘草 大黃 當歸 芍藥

各半兩

右為末每服抄三錢水一盞生姜三片煎至七分溫服日三服病熱甚者加減之

崔宣武柴胡飲子 加半夏 五味子 桔梗

錢各三劉庭瑞柴胡飲子與前分用不同故以錄之

兩 柴胡 甘草 二 黃芩 當歸 芍藥 大黃

各一兩



人參半
兩半夏半
兩

右為大勞熱病五七錢以利為度未利更加使病不再發也

木香萬安丸 治一切風熱怫鬱氣血壅滯頭目昏眩
鼻塞耳鳴筋脉拘倦肢體焦癩咽嗌不利胸膈痞塞腹
脇痛悶腸胃燥澀淋閼不通腰脚重痛疝瘕急結痃癖
堅積腸滯胃滿久了絕走注疼痛瘡風癰病濕病腹

脹水腫

欽定四庫全書

卷四
宣明方論

木香 捻桂 甘遂各一牽牛二
兩 大戟半
兩 大黃

紅皮 檳榔各一皂角二
兩 要得肥好者洗淨水
下蜜漿再煮成稠膏
二沸便取出搗碎

右膏丸小豆大每服十九至十五丸生姜湯下小兒

丸如麻子大水腫癰病諸積快利為度

玉芝徐老丸 治一切風壅消痰利膈胸脇痞悶美飲

食調五味 徐老緩慢遲老

天南星 乾薑各半
兩 黃柏一
兩 牽牛四
兩 半夏半
兩 白

礬 大黃各一
兩 蛤粉半
兩

右為末滴水和丸如小豆大每服十九至二十九溫
水下食後日三服常服順氣調血令人徐老或已衰
大便結者除腸垢積物可漸加至三五十九孕婦滑

泄病忌服滑泄為牽牛大黃孕婦為南星半夏

消痞丸 治積濕熱毒甚者身體面目黃心脇腹滿嘔
吐不能飲食瘦弱難以運動咽嗌不利肢體焦尪眩悸
膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為咳血衄血下為

欽定四庫全書

卷四
宣明方論

大小便血腸風痔瘻三焦壅滯閼瘴熱中消渴傳化失常
小兒疳積熱

黃連 乾葛各一
兩 黃芩 大黃 黃蘖 梔子

薄荷 蕙香 厚朴 茴香炒各
半兩 木香 辣桂各

分青黛研牽牛二
兩

右為細末滴水丸如小豆大每服十九新水下溫水
亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內基本自利者去

大黃牽牛忌發熱諸物

和中丸 治口燥舌乾咽嗌不利胸膈痞滿心腹痛悶小便赤澀大便結滯風氣怫鬱頭目昏眩筋脉拘急肢體疼倦一切風壅常服寬膈美食消痰止逆

牽牛

一官桂
兩分

大黃

紅皮

黃芩

茴香
兩各半

木香

滑石
一分

兩

右為末滴水丸如小豆大每服二十九煎生薑湯下溫水亦得日三服

崔宣武和中丸 大黃
一兩 茴香 炒外七味同

欽定四庫全書

卷四
宣明方論

龍腦丸 治大小人一切蘊積熱毒氣不散及失瘡癰瘍

龍腦 朱砂 鵬砂 牛黃
各分

右為末鎔黃蠟為丸如米粒大每服三五丸以甘草人參湯下不計時候

大金花丸 治中外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋

闊咳衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘

金花丸 又名既濟解毒丸

黃連 黃蘖 黃芩 大黃
兩 各半

右為末滴水丸如小豆大每服三十九新汲水下自利去大黃加梔子小兒丸如麻子大三五丸

當歸龍膽丸 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搐搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞶脢胸膈痞寒嗌不利腸胃燥澁小便溺閼筋脉拘奇奇猶急也重也肢體痿弱暗風癇病小兒急慢驚風常服宣通血氣調順

陰陽病無再作

欽定四庫全書

卷四
宣明方論

當歸
焙龍膽草 大梔子 黃連 黃蘖 黃芩

兩 各一
大黃 蘆會 青黛
木香 分麝香 半錢
別研

右為末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下每服二十九忌發熱諸物兼服防風通聖散

軟金丸 治一切熱疾常服潤飢膚柰老諸熱證皆可服

大黃 牽牛 皂角
兩 各二 朴硝
兩 半

右為末滴水和丸如桐子大每服三十九白湯下自



十九服至三十丸食後服

妙香丸 治一切久遠沉積傷寒結胸太陽厥證燥鬱攻不開者皆可服此藥亦名大聖丸

芭豆皮不
出油 脂粉 磬砂 龍腦 麝香 牛黃
少
許
朱砂各
分水銀
結砂子
各一錢
錫

右為末煉蜜和丸又一方用蠅丸如皂子大用藥時急要動一丸分作三丸剗作眼子冷水浸煎大黃湯下然後服熱茶一盞便行也局方內無硇砂加金薄妙功藏用丸新補亦名顯仁丸又名神芎丸治嘔噦不食痿弱難運血溢血洩淋閟不通或泄利三焦壅滯傳化失常功不可遂並宜服之

大黃 黃芩 黃連各半
兩 黑牽牛一
兩 滑石二
分 荆芥
穗二
兩 防風一
兩 川芎一
兩 木香二
分 官桂三分
去皮
右為末滴水為丸如小豆大每服二十九三十丸生薑湯下日三服溫水亦得

宣明方論卷四

欽定四庫全書

宣明方論卷五

金 刘完素 撰

傷寒門

主療說

傷寒表證當汗而不可下裏證當下而不可汗半在表半裏則當和解不可發汗吐下在上則通之在下則泄之傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或天水散之類

欽定四庫全書
卷五
宣明方論

亦佳表不解半入於裏半尚在表者小柴胡湯和解之或天水涼膈散甚良表裏熱勢俱甚者大柴胡湯微下之更甚者大承氣湯下之表熱多裏熱少者天水一涼膈半和解之裏熱多表熱少未可下之者涼膈天水一半調之勢更甚者小承氣湯下之凡此諸可下者通宜大承氣湯下之凡此諸可下者通宜三一承氣湯下之發汗不解下後前後別無異證者通宜涼膈散調之以退其熱兩感倣此而已傷風自汗表病裏和者桂枝湯

解肌半在表半在裏白虎湯和解之病在裏者大承氣湯下之一法無問風寒暑濕有汗無汗內外諸邪所傷但有可下諸證或表裏兩證俱不見而日深但目睛不了了睛不和者或腹滿實痛者或煩渴或譫妄或狂躁滿者或畜熱極而將死者通宜大氣氣湯下之或三一承氣湯尤良傷寒大發汗汗出不解反無汗脈尚浮者蒼朮白虎湯再解之或中暑自汗大出脈虛弱頭痛口乾倦怠煩躁或時惡寒或畏日氣無問表裏通宜

欽定四庫全書
卷五 宣明方論

白虎或裏熱勢甚腹滿而脈沉可下者宜大承氣湯或三一承氣湯傷寒表熱極甚身疼頭痛不可忍或眩或嘔裏有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水涼膈之類和解恐不能退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚不能退本氣虛損而脈不能實擬更下之恐下熱暴甚而便有此證者或兩感勢甚者通宜解毒湯加大承氣湯下之熱不退者再下之然雖古人皆云三下熱不退即死矣亦有按法以下四五次利一二十行熱方退而救活者免致不下退其熱而必死也下後熱稍退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以至身冷脈微而昏冒將死者若急下之則殘陰暴絕陽氣後竭而立死不下亦死當以涼膈散或者黃連解毒湯養陰退陽畜熱漸以消散則

欽定四庫全書
卷五 宣明方論



心胸腹暖脈漸以生至陽脈復有力者方可以三一承氣湯微下之或解毒加大承氣湯尤良或下後微熱不解者涼膈散調之愈後但宜退熱之藥忌發熱諸物陽熱易為再作也

論風熱濕燥寒

諸風

風本生熱以熱為本風為標言風者即風熱病也

諸熱

熱甚而生風或熱微風甚即兼治風熱或風微熱甚但

治其熱即風自消也

諸濕

濕本土氣火熱能生土濕故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾也濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣行即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為兼證當云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而

欽定四庫全書

卷五
宣明方論

有水者以為畜熱入裏極深本非病寒也及夫寒熱吐瀉因得濕而成也

諸燥

燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛或風則皴揭風能勝濕熱能耗液皆能成燥故經云風熱火兼為陽寒濕燥同為陰又燥濕亦異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒濕燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒濕同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經云諸濕枯涸乾勁皴揭皆屬於燥也

諸寒

寒者上下所生水液澄澈清冷穀不化小便清白不澁身涼不渴本末不經有見陽熱證其脈遲者是也此因飲食冷物過多陰勝陽衰而為中寒也或冷熱相併而反陽氣怫鬱不能宣散怫熱內作以成熱證者不可亦言為冷當以成證辨之夫濕熱吐瀉當見陽脈若亡液氣虛亦能反見諸陰脈也當以標本明之不可妄治或

欽定四庫全書

卷五
宣明方論



熱證誤服白朮調中湯溫藥亦能開發陽氣宣通而愈別無加害也

傷寒表證

夫傷寒之候頭項痛腰脊強身體拘急表熱惡寒不煩躁無自汗或頭而痛肌熱鼻乾或胸滿而喘手足指末厥脈浮數而緊者邪熱在表皆麻黃湯發汗之證也或天水散之類甚佳

傷寒表裏證

欽定四庫全書
卷五 方論

傷寒身熱為熱在表引飲或小便黃赤熱在裏身熱渴或小便黃赤為表裏俱有熱涼不渴小便清白為表裏俱無熱身疼拘急表熱惡寒而脈浮者皆為熱在表也引飲譖妄腹滿實痛發熱而脈沉者皆為熱在裏也胸脇痞痛或嘔而實熱往來脈在肌肉者邪半在表半在裏也

内外傷

始得病脈便沉而裏病表和者內傷也脈浮而表病裏

和者外傷也病在身體頭面四肢為表病在胸腹之內為裏病也

傷寒論

夫風寒者百病之始也是四時八節不正疫癘之氣故云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰冷乃四時之正氣冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃傷耳春應煖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫非時而邪氣是以辛苦之人一歲

欽定四庫全書
卷五 方論

之中病無少長始自一日巨陽膀胱受之巨陽者三陽之首故先受之二日陽明胃受之三日少陽膽受之未入其藏可汗之四日太陰脾受之五日少陰腎受之六日厥陰肝受之其入藏可泄之經云其未滿三日汗而已其滿三日泄之而已故聖人論汗下大槩言之以脈分別三四日脈沉伏亦當下六七日脈浮滑亦可汗故傷寒傳足經不傳手經未詳耳且自人身十二經絡分布上下手足各有三陰三陽稟天地之氣天樞之上



同天之陽天樞之下同地之陰至真大論云身半以上其氣三矣天之分也天氣主之身半以下其氣三矣地之分也地氣主之注云當陰之分冷病歸之當陽之分熱病歸之有八節邪氣所中於人陽邪為病傳手經陰邪為病傳足經其邪自何而入自風池而入為脊骨兩傍一寸五分是十二經之俞穴春夏應陽秋冬應陰至真大論云寒暑溫涼盛衰之用其在四唯故陽之動始於溫盛於暑陰之動始於涼盛於寒春夏秋冬各差其

欽定四庫全書

卷五
宣明方論

分易云水流濕火就燥熱論云熱病者皆傷寒之類也人之傷於寒則為病熱熱雖甚不死太陰陽明論云陽受風氣陰受濕氣注云同氣相求耳又曰傷於風者上先受之傷於濕者下先受之注云陽氣炎上故受風陰氣潤下故受濕蓋同氣相合耳故風熱火為陽寒濕燥為陰刺熱論云五臟俱有熱病肝熱病左頰先赤心熱病頤先赤脾熱病鼻先赤肺熱病右頰先赤腎熱病顙先赤甲乙熱論云有手足太陰熱病有手足少陰熱病有

手足厥陰熱病熱論其三陰三陽五臟六府皆受病榮衛不行五臟不通則死矣未嘗則傳足經不傳手經麻黃湯治傷寒頭痛發熱體痛惡風無汗喘滿又治太陽病脈浮緊無汗發熱身疼八九日不解表證在此當發其汗其人發煩目瞑必劖劖者陽氣重也

麻黃一兩半桂枝一兩甘草半兩杏仁二十枚湯去節去皮炙剉浸去皮尖或濕病身煩痛小便自利者加白朮四分微汗之

右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不

欽定四庫全書

卷五
宣明方論

計時候衣覆以取汗

桂枝湯治傷寒發熱惡寒乾嘔頭痛太陽中風陽浮陰弱解肌脈浮緊鼻鳴者

桂枝三分芍藥三分甘草三分去皮

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑三片棗三箇煎至七分不計時候

小青龍湯治傷寒表未罷心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴利小便不利小腹滿喘



麻黃

去節湯炮去黃汗焙乾三錢利者去麻黃加芫花彈子大噎者去麻黃加附子

右剉如麻豆大每服五錢水一大盞煎至半盞生薑

棗同煎不計時候溫服

瓜蒂散

治傷寒表證罷邪熱入裏結於胸中項滿而飢不能食四肢微厥而脈乍緊者宜以吐之經云在上

吐之在下洩之

瓜蒂

赤小豆分等

右為末香豉半合

豆鼓是也水一盞半煮取汁半盞調下

欽定四庫全書

宣明方論卷五

錢七不吐加服

五苓湯

五苓散是也

治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不得眠脈浮小便不利微熱煩渴及表裏俱熱飲水反吐

名水或攻表不解當汗而反下之利不止脈浮表不解自逆利或一切留飲不散水停心下并兩感中濕而昏躁霍亂吐瀉驚風

猪苓

去皮茯苓皮白术各半桂一分澤瀉一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石二兩甚佳

喘嗽煩心不得眠者加阿膠半兩枯夏月大暑新水

調服立愈

欽定四庫全書

宣明方論卷五

宣明方論卷五

欽定四庫全書

宣明方論卷六

金 呂完素 撰

傷寒方

抵當湯 治傷寒日深表證乃甚畜熱下焦脉微沈不結胸發狂者小腹脹而硬小便自和者瘀血證也小便不和無血也或陽明畜熱內甚而喜忘或狂大便雖硬而反易其色黑者有畜血也無表裏證但發熱日深脉雖浮者亦可下之或已下後脉數胃熱消穀善飢數日不大便有瘀血也

桃仁七個 大黃一分 水蛭炒 蟎蟲各十個 去趨足炒

右剉如麻豆大分作二服水一盞煮半盞絞去滓溫服未下再服

抵當丸 治傷寒有熱小腹滿小便不利者為有血也當下之不可餘藥

桃仁八分 大黃一水蛭 炒 蟎蟲 各七 依前炒

右為末蜜和作二丸用水一小盞煮一丸至六分溫服時血未下再服

大承氣湯 治表裏俱熱病勢更甚者陽明脉遲汗出不惡寒身裏煩燥時或作譫語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視陽明裏熱極甚或吐下後不解大便五六日至十餘日日晡潮熱心胃燥熱而懊惱復如瘧狀脉沈實或小便不利大便乍難乍易喘冒不能卧或腹滿實痛煩渴譫妄脉實數而沈裏熱燥甚腸胃怫鬱留飲不散胸腹高起痛不忍但嘔冷夜大渴反不能飲強飲不能止喘急悶者

大黃半兩 芒硝半兩 厚朴去皮 半兩 枳實半兩

右剉如麻豆大分半水一盞半生薑三片煎至六分內納音硝煎去滓服

小承氣湯 治傷寒日深恐有燥屎腹中轉失乃可攻之不轉失者必初硬後溏未可攻之攻之則腹滿不能食飲水而噦其後發熱大便復硬若腹大滿不通或陽

明多汗津液外出腸胃躁熱大便必硬而譫語脉滑吐下微煩小便數大便結或下利譫語脉滑病二三日脉弱無太陽證柴胡證煩心心下結至四五日雖能食少少與承氣湯和之令小安

大黃半兩厚朴去皮三錢枳實三錢

右剉如麻豆大分作二服水一盞生薑三片煎至半盞絞汁服未利再服

調胃承氣湯 治諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸然

欽定四庫全書

卷六 宣明方論

者或日深心下溫溫欲吐胸中痛大便溏腹滿鬱鬱微煩先此時吐下者或日深裏熱譫語法當下之以銀粉巴豆燥熱大毒丸藥下之致真陰損虛邪熱轉甚因而協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成結胸但為熱利不止滿鞶或痛煩渴咽乾脉滑數而實諸腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便鞶脉滑實緊

大黃半兩芒硝各等甘草分

右剉如麻豆大分一半水一大盞煎至半盞絞去滓

內硝煎不利再煎服

三一承氣湯 治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿煩亂麌嚦譫妄心下按之硬痛小便赤澁大便沉滯肺痿痞或積久而為滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂躁反覆甚至舌腫喉癰瘍陽明胃熱發斑脈沈可下者小兒惡風驚涎痰須喘昏寒并斑疹黑色胸膈心腹刺痛欲死或斑疹後熱不退久不作癥或作斑紋瘡癬久不已

者怫熱內成疹癬堅積黃瘦痛疾久新卒暴心痛風痰

欽定四庫全書

卷六 宣明方論

酒膈腸垢積滯久壅風熱暴傷酒食煩心悶亂脉數沈實或腎水陰虛陽熱獨甚而僵仆卒中一切暴音不語失音畜一名畜熱內甚陽厥極深脉反沈細欲絕或表之冲和正虛寒邪熱并之於裏則裏熱亢極陽極似陰反為寒戰脉微而絕或風熱燥甚客於下焦而大小便澁滯不通者或產婦死胎不下及兩感表裏熱甚須可下者

大黃半兩芒硝半兩厚朴去皮半兩枳實半兩甘草一兩

右剉如麻豆大水一盞半生薑三片煎至七分內硝

煎二服去滓服

十棗湯 治太陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱熱汗出發作有時頭痛心下痞硬引下痛兼下水腫腹脹并酒食積脹垢積滯痃癖堅積畜熱暴痛瘧氣久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戰表氣入裏陽厥極深脉微而絕并風熱燥甚結於下焦大小便不通實熱腰痛及小兒熱結乳癖積熱作發驚風潮槁斑疹熱毒不能了絕者

欽定四庫全書

卷六 宣明方論

分各等

大戟

芫花 慢火炒作熑下凡言熑者皆乾炒也甘遂

右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢已實人每一錢

茵陳湯 治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利渴引水漿身心發黃

宜菌陳湯謂桂芩散

黃利大小便

茵陳蒿

一名茵陳一兩去莖

大黃

半兩

大梔子

好者稍小者用七箇色深堅實

箇十

右剉如麻豆大水二盞半慢火煮至一盞絞汁溫服以利為度甚者再作當下如爛魚肚及膿血膠膘等物及小便多出金色如皂莢汁或見證將發黃此一劑分作四服調五苓散三錢凡治發黃者無越此法妙

桂苓甘露散

一名桂苓白朮散一方甘草一兩半

治傷寒中暑胃風飲食

中外一切所傷傳受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不利間小便赤澁大便急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及

小兒吐瀉驚風

茯苓

一兩去皮

甘草

二兩炙

白朮

半兩澤瀉

桂

半兩去皮石膏

寒水石

二兩

滑石

四兩

猪苓

兩

右為末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良小兒每服一錢同上法

此藥下神丸止瀉痢無不驗也並解內外諸邪所傷濕熱又一方却不用猪苓或曰三服不計時候

梔子蘖皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相



搏微者宜服

黃蘖半兩甘草一錢大梔子十五箇

右剉如麻豆大水三盞煎至一盞絞汁分次作一日溫服之

梔子湯 治懊憹煩心反傷不得眠燥熱怫鬱於內而氣不宣通胸滿痛頭微汗虛煩

欽定四庫全書
卷六 宣明方論

大梔子 <small>七箇</small>	剉碎豆豉 <small>半合</small>	俗言鹽豉少氣者誤以丸藥下之者加甘草
生薑 <small>半兩</small>	或用溫湯灌手	
足使心胸結熱宣通而已		

右剉如麻豆大或先以水二盞煮梔子至一盞半內

豉煮至半盞絞汁溫服 凡加者皆用梔子先煮或吐人之藥以其燥熱鬱結之甚而藥頓攻之不能開通

則發熱而又吐發開鬱結則氣通津液宣行而已故不須再服也

大陷胸湯 治汗下之後不大便五六日舌乾而渴日

晡潮熱從心至小腹脹滿而痛不可近脉當沈緊滑數或但胸結則無大段熱頭微汗出脈沈濇者水結也

大黃三錢芒硝三錢甘遂末三

右剉如麻豆大分作二服每服水一盞煎大黃至六分內硝一二沸絞汁調甘遂一字七半溫服未快利再服勢惡不能利以意加服

小陷胸湯 治小結胸心下按之痛脉浮而滑無大段熱表未罷不可下之下之即死小結胸宜服

半夏四錢湯洗生薑二錢黃連二錢栝樓實大者半兩
欽定四庫全書
卷六 宣明方論

惟剉其殼子則不剉
若剉其中子者非也

右以水三盞煮栝樓汁一盞半內藥至一盞絞汁兩

次溫服以効

大陷胸丸 治發熱而下之太早熱入因作結胸者項亦強如柔症狀下之則和也

大黃半兩芒硝一錢杏仁十二箇去皮尖雙草灰炒變色葶藶三錢微炒

右大黃為末下葶藶杵羅研杏仁硝如泥和彈子大每服一丸入甘遂末三字白密半匙水一盞煮至半盞溫服當一宿許乃下未利再服

梔子厚朴湯 治傷寒下後心煩腹滿坐卧不安者

大梔子箇枳實二錢厚朴半兩
皮炙去

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服

檳榔散 治傷寒陰痛下之太早成瘡心下痞滿而不
痛按之軟虛也

檳榔 枳殼等分

右為末每服三錢煎黃連湯調下不計時候溫服

大黃黃連瀉心湯 治傷寒成病痞不已心腹亦實熱

煩滿或譫妄而脉沈無他證者

欽定四庫全書
卷六 宣明方論

大黃 黃連 黃芩各一分又一法加生薑一分甚良

右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁分三次溫服
黃連解毒湯 治傷寒雜病躁熱毒煩悶乾嘔口燥吟
呻喘滿陽厥極深畜熱內甚俗妄傳為陰毒者及汗下
吐後寒涼諸藥不能退熱勢兩感證同法

黃連去鬚黃芩 大梔子各半兩

右剉如麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞
去滓溫服或腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三箇

用生全厚朴二錢茯苓二錢剉去
水一盞半生薑三片

煎至半盞絞汁溫服名半夏黃連解毒湯

白虎湯加減白虎湯隨證用治傷風自汗桂枝證表未解半斑於

裏中暑自汗脉虛弱傷寒自汗脉滑數而實表裏俱熱
三陽合病腹滿身重口燥面垢譫語發黃厥逆自汗和
解兩感解頭痛止自汗雜病時疫未瀉發斑兼豆疮瘡
疹伏熱

知母一兩半甘草一兩炙粳米一兩石膏四兩石膏四兩末

欽定四庫全書
卷六 宣明方論

右剉如麻豆大抄五錢水一盞煎至六分去滓溫服
無時候日三四服或眩欬嘔者加半夏半兩紅皮半
兩每服生薑三片煎服傷寒發汗不解脉浮者加蒼
朮白虎湯 汗吐下後煩渴口乾脉洪大加人參半
兩名人參白虎湯

賈同知已効方

石膏兩知母一兩甘草一兩

劉庭瑞已効方

知母 一兩半 石膏 四兩 粳米 一合

崔宣武已効方

知母 一兩半 石膏 三兩 甘草 一兩半

右為末每服三錢水一盞入粳米二十五粒煎至六分未曾下胃熱發斑兼豆疱如液虛瘦加人參半兩白术半兩頭疼加川芎荆芥各三錢咳嗽加半夏三錢桔梗一兩恍惚加人參三錢茯苓半兩

涼膈散 一名連翹飲子 治傷寒表不解半入於裏下證

欽定四庫全書
卷六 宣明方論

未全下後燥熱怫結於內煩心懊惱不得眠藏府積熱煩渴頭昏唇焦咽燥喉閉目赤煩渴口舌生瘡欬唾稠粘譖語狂妄腸胃燥澀便溺閼結風熱壅滯瘡癬發斑驚風熱極黑陷將死

連翹 一兩 山梔子 半兩 大黃 半兩 薄荷葉 半兩 黃芩 半兩 甘草

一兩 朴硝 一分

右為末每服二錢水一盞密少許同煎至七分去滓溫服虛實加減咽喉痛涎嗽加桔梗 一兩 荆芥穗 半兩 嘴

而嘔者加半夏 半兩 生薑 三片 每服生血効嘔血加當歸 半兩 茯苓

藥 半兩 生地黃 一兩 淋者加滑石 四兩 茯苓 一兩去皮 風眩加芎

石膏 三兩 防風 半兩 酒毒加葛根 一兩 荆芥穗 半兩 赤芍藥

芎 半兩 防風 半兩 桔梗 半兩 甚黑陷腹滿喘急小便赤澁而將死者此一服更加大防風湯約以下之得和者立効凡言加者皆自本方加也以上之減退表裏熱加益元散効速

人參石膏湯 治傷寒咳嗽不已心煩及風熱頭痛精神不利惛憤宜服

欽定四庫全書
卷六 宣明方論

人參 一錢 石膏 三兩 川芎 半兩 半夏 二錢去滑 白术 半兩 茯苓 半兩 甘草 一兩 大梔子 三錢 知母 一兩 茶 三錢

右為末每服一錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服

崔宣武人參石膏湯 治傷寒頭痛心煩悶風熱并汗後餘熱自汗多清頭目定喘嗽

人參 二錢半 石膏 一兩 川芎 兩錢 黃芩 一錢 茯苓 三錢 甘草 兩錢 防風

風 三錢



右為細末每服五錢水一盞半煎至六分去滓溫服
不計時候

雙解散 治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷無問
自汗汗後雜病但覺不快便可通解得愈小兒生瘡疹
使利出快亦能氣通宣而愈

益元散七兩 防風通聖散七兩

右二藥一處相和名為雙解散益元散方在痢門通
聖散方在風門各七兩攪匀每服三錢水一盞半入

葱白五寸鹽豉五十粒生薑三片煎至一盞溫服

白朮散 治傷寒雜病一切瀉煩渴霍亂虛損氣弱保
養衰老及治酒積嘔噦

白朮 茯苓去皮人參各半兩 甘草一兩炙木香分 藿香

半葛根一兩

右為末白湯調下二錢煩渴者加滑石二兩甚者加

薑汗續續飲之

四逆湯 治傷寒表熱未入裏誤以寒藥下之太早表

熱不已入裏寒下利不止因表熱裏寒自利急以溫裏
利止又治少陰病脉沈下利厥逆煩渴嘔吐

甘草一錢炙 乾薑一分 附子半箇生去皮臍附子以半
惡非古方之宜也不但以美其大者要知古人之有則也

右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁溫服或畜熱
深極而手足厥冷者不宜此方當以下之

茯苓半夏湯 治傷寒雜病一切嘔吐或喘咳疼痛痞
滿頭痛者

茯苓一分去皮 半夏一錢生薑一分取汁

一方治風痰加 黃芩一分去腐 甘草一分紅皮去穰

右剉如麻豆大水一盞煎至四分空心下生薑汁溫

服不計時候

宣明方論卷六



欽定四庫全書

宣明方論卷七

金 刘完素 撰

積聚論

素問曰積聚留飲痞隔中滿濕積霍亂吐下瘕瘕堅硬
腹滿皆太陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也

積者不散
聚者不化

留者不行飲者停滯痞者不通隔者阻也中滿者濕為積霍亂吐下為留停瘕瘕者瘕也瘕假也斯疾

迺五藏六腑陰陽變化興衰之制也亢則害承迺制極

則反矣

謂水得燥則消散而得濕則不消乃為積飲也謂人形精神與榮衛血氣津液出入流通謂夫腠理閉密乃為痞也謂腸胃隔絕傳化失常而乃滯也土主形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也癥者腹中主硬按之應手然水體柔順而今乃堅硬如此者亢則害承乃制也瘕者中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及癥也 經曰血不流而滯故血內凝而乃

欽定四庫全書

宣明方論

欽定四庫全書

宣明方論

小腸移熱於大腸乃為虛瘕大腸移熱於小腸謂血熱相搏則血溢而為伏瘕血溢不利月事沈滯而不行故行為虛瘕為虛與伏同瘕與疝同為傳寫誤也世傳冷病然瘕病亦有熱或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者世傳為寒瘕瘕也或堅痞腹滿急痛寒主筋縮急主痛寒極血凝泣而反兼土化制之故堅痞之腹滿或熱鬱於內而腹滿堅結痛不可忍者皆可為寒誤矣誤矣

何不以脉證辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳之五藏六腑四季皆有積聚心之積名曰伏梁在於臍上大如臂上至於心橫於心上如屋梁故曰伏梁肝之積名曰賁奔音氣在左脇下覆如杯有頭足久不愈令人痃瘶脾之積名曰痞氣在胃腕覆大如杯久不愈令人四肢不收發黃疽食不為膚肌肺之積名曰息賁結在右脇下覆大如杯久不愈令人灑淅寒熱喘咳發為肺癰腎之積名曰賁奔音竈在於小腹上至心下如肫賁走往



來無定久不愈令人喘逆發為骨痿少氣乏力此為五藏之積也嘗究斯義未可悉也

傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五藏之氣

虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積聚其脉沈細而微者是也

木香三稜丸 治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問久新

欽定四庫全書

卷七
宣明方論

青木香	破故紙	茴香	黑牽牛	甘遂	芫花
大戟	荆三稜	蓬莪茂	川棟子	葫蘆	巴戟
一兩	巴豆	去皮不出油二分	陳米豆一處同	三合將芭	已上各
炒黑縮砂仁半					

右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末醋麪糊和丸如菉豆大每服五七丸食後加減看虛實隨湯水下導氣枳殼丸 治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣

逐風功不可述

枳殼 去穰 炒木通 剉青皮 去陳皮 白桑白皮 炒剉蘿蔔

子微 炒白牽牛 炒黑牽牛 炒莪茂 煥蕕茴香 炒荆三稜 煥等分

右為末生薑汁打麪糊為丸如桐子大每服二十九粒橘皮湯下不計時候

透膈寬腸散 治腸上壅實膈熱難行者

白牽牛一兩 芒硝兩 川大黃二兩 甘遂半

欽定四庫全書

卷七
宣明方論

右為細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減疎動止密補固真丹 治皮腎真元損虛泄痢痰嗽噦痞水穀酸臭飲食無味臍腹冷痛肢體麻痺下虛瘧厥上實壅滯腎虛耳鳴脾虛困憊耳焦齒槁面黧身悴唇黃口燥髮墮爪退風虛偏枯中滿膈氣一切脾胃虛證常服補養宜通氣血

天南星	半夏	神麵	麥糵	茴香	荆三稜
炮各一兩	半夏	製			
白附子	乾生薑				
川烏頭	生各一兩				
巴豆	七				
牽	箇				



癬塊及一切心腹暴痛

延胡索 當歸 茜草 京三稜 川苦棟 蓬

莪朶 官桂 厚朴 木香 川芎 各一
半 甘草 一錢 檳榔 二錢

黃芩 大黃 各半
兩 甘草 兩 檳榔 二錢

右為麌末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食

前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良

後常服

欽定四庫全書

卷七
宣明方論

三稜湯 治癥瘕痃癖積聚不散堅滿痞膈食不下腹脹

荆三稜 一
兩 白术 一
兩 蓬莪朶 半
當歸 半
焙 檳榔 木

香
錢 三

右為末每服三錢沸湯點服食後每日三服

消飲丸 治一切積聚痃癖氣塊及大小結胸痛不能仰按

天南星 半夏 芫花 自然銅
等分 生用

右為末醋煮麪糊為丸如桐子大每服五七丸食前

溫水下良久葱粥投之相虛實加減

除濕丹 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝滯便溺不利赤癰瘍疽癰發背疥癬走注脚氣

無首尾瘡癧功效不可盡述

檳榔 甘遂 茴靈仙 赤芍藥 澤瀉 蕃歷

已上各 乳香 没藥 別研 黑牽牛 半
二兩 大戟 二
兩 陳

皮 四
去白 兩

欽定四庫全書

卷七
宣明方論

右為末麪糊為丸如桐子大每服五十九至七八十丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥後忌濕麪

食溫粥補暖

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛及邊臍腹痛不可忍者

川大黃 三
蒸熟切片子
乾薑 一
炮 大附子
半
臍甲 一
兩半

右為末取三年米醋一大升先煎四五回然後和藥

丸如桐子大每服十九至二十丸空心服或酒米飲
下後取積如魚腸膿血爛肉汁青水當下

開結妙功丸 治怫熱內盛痃癖堅積腸腹癥瘕聚
疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸滑泄逆氣煩心不
得眠咳喘噦逆不能食或風濕內攻肢體麻痺腫脹黃

瘦眼澁昏暗一切所傷心腹暴痛神思煩鬱偏正頭疼
筋脉拘癭肢體麻痺走注疼酸兩目昏眩中風偏枯邪
氣上逆上實下虛脚膝疲軟不通氣血

欽定四庫全書

卷七 宣明方論

荆三稜 炮 茴香 各一 川烏頭 兩 神鞠 麥芽 大
黃 各一兩 好醋半升熬成稠膏 不破堅積不須熬膏水九
四 積用 瓢 半夏 兩 桂錢 牽牛 二
大

右為末膏丸小豆大生薑湯下十九十五丸溫水冷
水亦得或心胃間稍覺藥力緩性却涼尤數以加至
快利三五行以意消息病去為度
木香分氣丸 治積滯癥塊不消心腹痞結疼痛搶刺
如覆杯狀

陳皮 白檳榔 各一 破故紙 兩 木香 一兩 黑牽牛 十
兩炒香熟取末 五兩半餘不用

右為末滴水為丸如桐子大每服二三十丸生薑湯

下食後臨卧服

開胃生薑丸 治中焦不和胃口氣寒水穀不化噫氣
不通噎塞痞滿口淡吞嚥食時膨脹噦逆惡心嘔吐痰
水宿食不消中滿膈氣刺痛寬中開胃導飲食

桂心 一兩 陳皮 白甘草 炙各二兩 砂仁 四十
九箇 廣茂 當歸 各半

欽定四庫全書

卷七 宣明方論

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前細嚼沸
湯化下
導滯定功丸 治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消
食止逆定疼痛

大椒 木香 各一錢 蝎梢 三巴豆 八箇出
油為度

右為末後入芭豆霜研勻醋麪糊和丸如菉豆大朱
砂為衣每服五丸至十九丸淡醋湯下
積氣丹 治一切新久沈積氣塊面黃黑瘦諸氣無力

癥瘕積聚口吐酸水

檳榔二箇 芫花一兩 磨砂二錢 芭豆二半生 青皮去白 陳皮各三錢

蓬莪茂一箇 雞爪黃連三錢 京三稜三錢 章柳根牛膝兩 各一肉豆蔻三箇 大戟三錢 川大黃各半 甘遂半 白牽牛半

乾薑半 青礞石半 乾漆各半 木香二錢 石菖蒲二錢

錢三錢

右為末醋麪和為丸如桐子大每服一丸臨卧燒棗湯下每夜一丸或二丸候肚內作聲病退為度

欽定四庫全書
卷七 宣明方論

金露紫菀丸 治一切脾積兩肋虛脹臍疼痛

草烏頭去尖炒 黃連半兩 官桂半兩 桔梗乾地黃 乾

生薑去皮 川椒去皮 蕎蕓紫菀 柴胡去皮 防風厚

朴甘草 人參川芎 鱷甲酒浸 貝母枳殼

甘遂去根 各一巴豆 三兩 醋煮入研 磨砂

右為末水煮麪糊為丸如桐子大每服五丸空心臨卧米飲湯下或微疎動詳虛實加減

信香十方青金膏 灌頂法王子所傳十二上願云藥

師瑠璃光如來應當供養正徧知明行足善遊世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊方境授治周身中外陰陽不調氣血壅滯變生百病乃至虛羸困倦偏攻酒食內傷心腹滿塞急痛或

酒積食積癥瘕積聚痃癖堅積中滿膈氣食臭酸醋嘔吐翻胃或膈癰消中善食而瘦或消渴多飲而數色角也

小便或腸風下血痔瘻疼痛或胃癰瘀或偏身癰痘惡瘡或瘡毒已入於裏腹滿嘔吐或成瀉痢或出惡瘡

欽定四庫全書
卷七 宣明方論

癰肉或下痢腹痛或一切風氣肢體疼痛及中風偏枯或痰逆生風痰涎嗽兼產後腹痛及小兒疳疾諸風潮搐但平人常服補養宣行榮衛調飲食

信砒 乳香 輕粉 粉霜 芭豆已上各一 龍

腦半 麻香半 青黛二錢 同研 黃蠟三錢

右研細末鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菉豆至小豆

大先服小丸病在上食後在下食前在中不計時候面東頂禮一丸淨器盛水送下如合藥即淨處面東

每一丸密念呪三遍或病人不能呪請人呪

或師氏呪過 呪曰

信香十方青金膏

藥師圓成蜜遍拋

普濟有緣除百病

仰吞一粒體堅牢

密呪曰

但言八金剛

莫說十方佛

五蘊六根俱不道

十二上願自然成

金黃丸 治酒積食積諸積面黃痘積硬塊

欽定四庫全書
卷七 宣明方論

欽定四庫全書
卷七 宣明方論

荆三稜 香附子 半兩 澤瀉 半錢 巴豆 四十九粒 粒出 黍米

牽牛 二錢

右為末用梔子煎湯和丸如菉豆大每服三丸至五丸如心痛艾醋湯下七丸

逆氣丸 治心胸滿悶脇肋刺痛不思飲食常服寬膈進美飲食

薑黃 四兩 香附子 四兩 縮砂 甘草 廣茂 各二兩 丁皮 甘松 木香 荆三稜 各一兩 白檀 半兩 蘿香葉 半兩

右為末入菉豆粉二兩用湯浸蒸餅為丸如桐子大每服三二十丸細嚼曰湯下食後日進三服

丁香散 治痃癖氣脇下痞滿息而不消積而不散元氣在胃不妨食者

好丁香 二十五箇 白丁香 七十箇 蜜陀僧 舶上硫黃

黃鶯調 各五分

右為細末每服一字皂子煎湯調下不計時候治肚內生硬物黑瘦如柴嘔吐積滯日三服食後

聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃 三兩 黑牽牛頭末 一磚砂 三兩 山梔子 半兩 輕粉 二錢

右為末煉蜜和丸捻作餅子如小錢大厚樣食後每服三餅子細嚼溫酒下臨卧如行粥補之虛實加減

無憂散 一名萬病散 治風疾瘡腫疥癬或臓腑積冷壅滯氣結風勞膀胱宿冷臓腑虛衰面色痿黃內有癥癬氣並當有疳蟲蛇蟲攻心腹俱痛忽中傷寒頭痛不忍狀若山嵐時氣瘟疫之疾並宜急服此藥宣通三五行立瘥

或中風口喎語多蹇澁睡後口中涎出不限時節不問

男子女人但五日一服不過三服永瘥人患腰膝疼痛

脚氣腫滿運動艱難飲食無味并小兒疳痢脫肛者量

大小與服利三五行自瘥大人久泄氣痢狀若休息痢

止有時俱一服取下冷膿一二升當日見効藥無四時冷

熱老幼衰弱病患悉皆除之任服他藥無妨若服常時

蓋緣搜出藏府中積滯蟲膿故也無孕婦人久患血虛

氣弱痿黃無力者亦可依方服宣通氣候殊不困倦無

妨此藥凡有百病並皆治之其功不可具載有孕婦人

或遇陰晦時即不可服天道晴明可進若雖復疾而未

愈者再可服

黃耆 木通 桑白皮 陳皮 各一
胡椒 白木

木香 各半 白牽牛 四兩炒別
取頭末

右七味為細末每服二錢牽牛末二錢生薑二錢切

作片子煎生薑湯一大盞調藥須臾又用生薑湯或

溫湯送下平明可行三五次快利無妨如病瘥後

欽定四庫全書

卷七 宣明方論

以白粥補之痊矣

五積丹 治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者

皂莢一錠(一尺二寸火燒留性淨盆合之四面土壅合物令出煙)巴豆十二

炒麵一兩五錢同令黃色為度

右為末醋麵糊為丸菉豆大每服十九鹽湯下食後

加減

欽定四庫全書

卷七 宣明方論

宣明方論卷七



欽定四庫全書

宣明方論卷八

金 刘完素 撰

木濕門

夫諸濕者濕為土氣火熱能生土濕也故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕物燥乾也濕病本不自生因於大熱怫鬱水液不能宣通即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為兼證云濕熱亦猶風熱義同雖

欽定四庫全書

宣明方論

病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而有水者以畜熱入裏極深本非病寒也

三花神祐丸 治中滿腹脹喘嗽淋閼一切水濕腫滿

崔宣武神祐丸

加黃柏一兩牽牛四兩大黃二兩輕粉二錢甘遂 大戟

芫花各一分
依前法

劉庭瑞神祐丸 用此藥治水氣常得効 賈同知稱之不已乃神仙奇絕之藥也

辨或汎常只為轉動之藥兼瀉久新腰痛并一切下痢及小兒驚疳積熱乳癬滿並宜服之

甘遂 大戟 芫花各半兩 醋拌濕炒牽牛二兩大黃一兩為細

末輕粉一錢

右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利利後却常服病去為度設病愈後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進酒食病癖悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶

欽定四庫全書

宣明方論

則初服兩丸每服加兩丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法



葶藶木香散 治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澁大便滑洩

葶藶 茯苓 去皮 猪苓 去皮 白术 各半錢 木香 半錢 澤瀉 六分
木通 甘草 各半兩 辣桂 一分 滑石 三兩

右為末每服三錢白湯調下食前 此藥下水濕消

腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃濕熱痞悶極熱而攻之不開是能反為注泄此

正氣已衰而多難救也慎不可攻之而無益耳

欽定四庫全書

卷八
宣明方論

白术木香散 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢食小便閼者

白术 木猪苓 去皮 赤茯苓 甘草 澤瀉 各半兩 木香 檳榔 三錢 陳皮 二錢 官桂 二錢 滑石 三分

右為末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分食

後去滓溫服

大橘皮湯 治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩

橘皮 一兩去白 木香 一分 滑石 六兩 檳榔 三錢 茯苓 一兩去皮 木猪

芩 去皮 澤瀉 六分 白术 各半錢 官桂 二兩 甘草 二錢
溫服 大小便秘先服十乘湯 二三日後再服此藥

葶藶膏 治水腫腹脹

牛黃 麝香 龍腦 各半錢 昆布 海藻 上同 三分 洗牽牛 桂心 各八分 椒目 三分 葶藶 六分炒

右為末別搗葶藶熬成膏丸如桐子大每服十九日

欽定四庫全書

卷八
宣明方論

再服稍利小便為度詳虛實加減
茯苓散 治諸般氣腫等疾

芫花 醋拌 澤瀉 郁李仁 甜葶藶 漢防己 各二錢 陳皮 去白 檳榔 三錢 瞿麥 各半錢 藥本 二半錢 滑石 三分

大戟 炒三分

右為細末每服一錢取桑白皮濃煎湯空心調下取

下碧瀉水如爛羊脂即瘥如未盡隔日又服腫消如故不用服忌鹽百日

調胃散 治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹

半夏製 甘草炙 厚朴去皮 陳皮去白 薤香各分

右為末每服一錢生薑三片棗二枚水一盞同煎溫服食前

二氣散 治水氣脹滿

白牽牛 黑牽牛錢各二

右為末用大麥麪四兩同一處為燒餅臨卧用茶湯一盞下降氣為驗

雄黃神金散

雄黃 蕃蘆一兩用糯米和炒半熟米不用澤瀉 二兩 檳榔目半兩 大戟去心

巴戟去心 荸苓去黑皮 芫花醋一日炒五升浸 甘遂 桑白皮

已上各一兩

右為末從發時加減一分空心用井花水調下每服一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷毒物油膩血

物

從腳腫根在心加蕃蘆 從肚腫根在腹加椒目

欽定四庫全書

卷八 宣明方論

萬勝散 治十種水氣不可愈者

海帶 海藻 海蛤 芫花醋炒浸 甘遂 大戟

右為末每服三錢至五錢溫酒調下臨卧間日再服

牽牛丸 治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石分各等

右為細末酒煮麪糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑湯下食後虛實加減

梔子蘖皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相搏微者宜服

大梔子十五箇 黃蘖半兩 甘草一分

右剉如麻豆大水三盞煮至一盞緩汁分三次作一

從陰腫根在胸加澤瀉

從膝腫根在肝加芫花

從面腫根在肺加桑白

從心腫根在肋加雄黃

從肢腫根在脾加甘遂

從口腫根在小腸加巴戟

從腰腫根在腎加大戟

從四肢腫根在胃加茯苓

日服溫喫不計時候

大戟丸

治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞悶

背項拘急膀胱緊腫於小腹小便不通反轉大便溏泄不能坐卧

大戟

芫花炒醋甘遂海帶海藻郁李仁

續隨子

各半樟柳根一兩已上八味為末每料抄藥末十五錢七分便入後藥抄

硇砂

輕粉各一粉霜各一水銀砂子一皂龍腦

巴豆

半錢二十去皮一箇生用

欽定四庫全書

卷八宣明方論

右八味已下同研勻用棗肉為丸如菉豆大每服五丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實加減

粉霜丸 治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便悶不進

飲食

粉霜 硇砂 海蛤 寒水石 烧粉 玄精石 白丁

香頭白麪 錢 輕粉 三海金沙 錢 一

右研勻著紙裹數重上使麪裹又紙裹冷酒蘸了桑柴火燒麪熟為度宿餌餅和丸如桐子大每服三丸

生薑湯下一日三服二日加一丸至六日不加即止

以補之妙

苦葶藶丸 治一切水濕氣通身腫滿不可當者

人參一兩苦葶藶上炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前 此藥恐君子不信試驗之

肉豆蔻丸 治水濕脹如鼓不食者病可下


欽定四庫全書

卷八宣明方論

肉豆蔻 檳榔 輕粉各一黑牽牛一兩半

右為末麪糊為丸如菉豆大每服十九至二十九煎連翹湯下食後日三服

宣明方論卷八



欽定四庫全書	宣明方論卷九	金 刘完素 撰
	痰飲門	
	痰飲論	
欽定四庫全書 卷九 方論	夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾胃外感風邪皮毛痺 肺風寒隨玄府而入腠理開張內外相合先傳肺而入 遂成咳嗽迺肺熱也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉 中介介如梗壯甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛稠粘皆肺 氣熱也	
大人參半夏丸	治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可盡 述嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅頭目昏眩 耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞滿筋脉拘倦肢體麻痺疼 痛中風偏枯咳嗽唾稠粘肺痿勞虛人保養宣通氣血調 和臟腑進飲食	
人參 茯苓 去皮 天南星 薄荷葉 各半 半夏 乾		

生薑 白礬 生 寒水石 兩各一 蛤粉 一兩 霽香葉 一分

右為末麪糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸食

後溫水亦得一法加黃連半兩黃芩二兩水丸取効

愈妙治酒病調和藏尤宜服之

新添半夏瓜萎丸 治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏 生
製 瓜萎 杏仁 去皮尖 麻黃 白礬 枯秤 款冬

花 分等

右為末生薑汁打麪糊為丸如梧子大每服二十九丸

煎生薑湯下不計時候

白术厚朴湯 治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白术 甘草
炙 葛根 各一
兩 厚朴 半
兩

右件為末每服一二錢水一大盞生薑五片煎至六

分去滓食前服顯仁丸仙术芎散大人參半夏丸

橘皮半夏湯 治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥

解肌熱止咳嗽

橘皮 半
兩 半夏 二
錢 洗七次半湯

欽定四庫全書

卷九 方論

右為末分作二服每服水一盞半入生薑十片同煎至七分去滓溫服

知母茯苓湯 治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗

茯苓 皮去
甘草
兩各一 知母 五味子 人參 薄荷

半夏 洗次
七
錢 柴胡 白术 款冬花 桔梗 麥

門冬 黃芩 半
兩 川芎 三
錢 阿膠 三
錢 炒

右為末每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至七分去滓稍熱服

欽定四庫全書

卷九 方論

人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭

疼增寒壯熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷 麻黃 去
節 乾葛 白术 甘

草 各一
兩
炙 白薑 半
兩

右為末每服二錢水一大盞生薑三片葱白二寸煎至八分如出汗連進二服通口溫服

杏仁半夏湯 治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者往來寒暑

杏仁 <small>去皮</small>	桔梗	陳皮 <small>去白</small>	茯苓 <small>去皮</small>	漢防己	白礬
桑白皮 <small>各三錢</small>	薄荷葉 <small>一錢</small>	甘草 <small>二寸</small>	猪牙皂角 <small>一錢</small>		
右為末作二服水二盞生薑三片煎至六分去滓食後溫服					
防已丸	治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎				
欽定四庫全書 卷九 方論	防已 <small>二錢</small>	杏仁 <small>三錢</small>	木香 <small>二錢</small>		
	右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九丸煎桑白皮湯下如大便悶加葶藶一兩食後服				
葶藶散	治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食				
苦葶藶	蛤粉 <small>各三錢</small>	桑白皮	山梔子	人參	
荆芥穗	薄荷葉	赤茯苓 <small>去皮</small>	陳皮	桔梗	杏
仁 甘草 <small>各兩</small>					
右為末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至六分去滓溫服食後					
保安半夏丸	治久新諸嗽或上逆涎喘短氣痰鳴咽				

乾煩渴大小便澀滯肺痿勞劣心腹痞滿急痛中滿膈氣上竇下虛酒食積聚不消補養氣血宣行榮衛	半夏	天南星 <small>各半兩</small>	牽牛 <small>一兩</small>	大黃 <small>半兩</small>	黃蘆 <small>一兩</small>
欽定四庫全書 卷九 方論	人參保肺湯	治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸			
	人參	柴胡	當歸	芍藥	桑白皮
	白术	川芎	黃耆	紫苑	荆芥
	分 茯苓 <small>去皮</small>	黃芩	連翹	大黃	地骨皮 <small>各半兩</small>
	甘草	桔梗 <small>各一兩</small>	石膏	滑石	薄荷 <small>各半兩</small>
右為末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至七分去滓溫服泄者去大黃同人參半夏丸服					
神應丹	治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼婦				



人帶下病一切肋脇痛滿

薄荷葉 甘草 四
豆 燈燒
存性 盆硝 各二
錢 輕粉 二
豆 錢

豉火炒慢 五靈脂
錢二

右為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸溫瀉汁下續後空嚥津三五次禁飲食少時覺咽喉微緩効心腹急痛溫酒下二丸未効再服得利尤良帶下以溫酒下二丸或大便流利再服

人參散 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰

欽定四庫全書

卷九 宣明方論

膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫痛或風昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者

石膏 甘草 各一
兩 滑石 四
兩 寒水石 二
兩 人參 半
兩

右為末每服二錢溫水調下早晚食後兼服梔子金花丸 一名既濟解毒丸

寧神散 治一切痰嗽不已者諸藥無効世傳極驗

御米囊 一
筋 酸炒 生
烏梅 兩

右為末每服二三錢沸湯點常服食後日三服

賈同知方 御米殼一
兩 炒 烏梅肉 半
兩 依前法服之

康少尹傳 煎烏梅湯尤妙

桂苓白朮丸 治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開堅結痛悶推進飲食調和藏無問寒濕濕熱嘔吐瀉痢皆能開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈解酒毒療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服之利止為度隨證調之

揀桂 乾生薑 分一
茯苓 去皮 半夏 一
兩 白朮 紅皮

欽定四庫全書

卷九 宣明方論

去澤瀉 各半
兩

右為末麪糊為丸如小豆大生薑湯下二三十九日三服病在膈上食後在下食前在中不計時候或一法更加黃連 半
兩 黃蘗 二
兩 水丸取効愈妙

潤肺散 治小兒膈熱咳嗽痰喘甚者久不瘥者

爪蔓實 一枚
子用穰 去

右為末以寒食麪和為餅子炙黃為末每服一錢溫水化乳糖下日三服効乃止



又方 治寒嗽

麻黃 四兩 官桂 一錢
官桂 一錢 二錢

右為末以蠣同煎每服一二錢溫服

寧肺散 治一切寒熱痰盛久新咳嗽不止者

御米殼 四兩 木瓜 三兩
木瓜 二兩 御米殼 一處用蜜
水化同炒微黃 五味子 一兩

人參 一兩 皂角 二兩

右為末每服二錢烏梅同煎臨卧食服大効

鱉甲丸 治吐血咳嗽神効

欽定四庫全書

卷九 方論

鱉甲 一箇九肋
者醋炙黃 柴胡 一兩酒浸一宿
杏仁 一兩童子小便浸炒甘遂

一兩 人參 半兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十九至十五丸煎生薑湯下

又方 用厚朴 一兩生薑 製

石膏散 治熱嗽喘甚者

石膏 一兩 甘草 半兩
甘草 炙

右為末每服三錢新汲水下又生薑汁蜜調下

人參半夏丸 治一切痰飲喘嗽不已

白礬 天南星 半夏 各半
甘草 二錢 半炙 人參 二錢

小豆 四十粒 杏仁 四十粒
杏仁 九粒 猪牙皂角 一錠

右為末用多年小米一升熬粥和丸如桐子大每服

十五丸炒蘿蔔子湯臨卧下

仙人肢丸 治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服松花膏下過多服此藥無不効

人參 沙參 玄參 紫團參 丹參 白朮

欽定四庫全書

卷九 方論

牡蠣 知母 甘草 各二兩
蛤蚧 一對頭尾全用河水淨洗文武火酥

炙黃 色

右為末用麻黃十五斤去根枸杞子三斤熬成膏丸如彈子大磁合子內盛臨卧煎生薑自然汁化下一丸小兒量數加減

松花膏 治三十年勞嗽預九月間宣利一切痰涎

肺積喘嗽不利

防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子 甘



草 蒼术 黃精

右為末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子大每服細嚼一丸冷水化下臨卧不喫夜飯服藥一粒辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞滿公忪煩悶痰涎不利呀呷有聲

半夏 洗半兩 茆蕘 水研成膏 杏仁 各半兩研成膏炒 朱砂 五靈脂 各一兩微炒

右為末更研勻生薑汁煮麪糊為丸如桐子大每服十五丸生薑湯下

大百勞散 治一切勞疾肌劣喘息不卧痰涎不食

蛤蚧 蜜炙一對 元州鱉甲 一箇去裙醋炙 附子 一箇去皮 人參 柴胡

川乾薑 白茯苓 去皮 白术 苗香 青皮 去白 杏仁

知母 去皮 貝母 去皮 陳皮 去白 官桂 甘草 炙半夏
製 生薑湯浸各一兩蘇木龍膽各半兩

右為末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十粒不用鐵

欽定四庫全書

卷九
宣明方論

煎

小百勞散 治勞喘嗽不已自汙者

御米殼 少炒

右為末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有汗加小麥三十粒同煎溫服

五味子湯 治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣

五味子 九兩 良薑 半兩 紅皮 去白 苗香 炒各一兩 乾薑 半兩 甘

欽定四庫全書
卷九
宣明方論

草 炙

七兩 鹽炒一斤

右為末每服一錢百沸湯點空心食前甚者日進三服

安神散 治遠年近日喘嗽不已

御米殼 蜜炒一兩 人參 陳皮 去白 甘草 炙一兩

右為末每服一錢煎烏梅湯調下臨卧服

勞門

白术黃耆散 治五心煩自汙四肢痿劣飲食減少肌



瘦昏昧

白术 黃耆 當歸 黃芩去皮 芍藥各半兩 石膏
甘草各二兩 茯苓 寒水石各一兩 官桂一分 人參 川芎各三兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前一日三服

人參白术湯方 在消渴門第一方是也此乃為同不復錄耳

黃連丸 治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭目

欽定四庫全書

卷九 方論

黃連好者不拘多少

右為末酒麪糊為丸如小豆大每服二十九溫水下不計時候日三服

必効散 治五勞七傷勞役肌瘦不思飲食喘嗽不已

川烏頭一兩生 天南星半兩生

右為末每服二錢蘿菔八塊如母指大以水煮熟去滓食後服嚼

當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不

調月水過多喘嗽者

當歸 芍藥 川芎 白术 染槐子 黃藥子
生地黃 甘草 茯苓去皮 黃芩 白龍骨各半兩

兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食前紫菀散 治勞體熱心寒脉滑短咳嗽婦人多有此疾

口乾眼澀骨痿短氣皆因腸胃燥滯榮衛不能開發玄府閉塞熱鬱內餘可以開發陰陽宣通滯滯和榮衛順

欽定四庫全書

卷九 方論

三焦兼服人參白术湯

紫菀 桑白皮 桔梗 繢斷 甘草 五味子
赤小豆各一兩合

右為末水一大盞藥末五錢青竹茹彈子大同煎至七分溫服去滓

枳實飲子 治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃痺經候不調四肢煩倦心腹滿悶狀似勞氣

枳殼一兩 吳半夏一兩浸三日火炒黃色用半夏 紅芍藥

柴胡各一
黃芩半一兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服及治五心煩熱及身體壯熱潮熱續服桃仁煎丸又治月經不調阻滯不通

桃仁二兩
洗火炒 川大黃 川朴硝各二
兩 蟲蟲一兩去翅頭足

右為末用醋五升入金銀鑄內以慢火熬成膏可丸如桐子大當日晚不食夜飯溫酒下一丸不嚼破午

際取下赤小豆汁似雞肝小蝦蠶衣未再服候鮮紅

即住服

盧同散 治男子婦人一切咳嗽喘急

欬冬花 井泉石 鵝管石 鍾乳石 官桂

甘草 白礬 佛耳草各等分

右為末每服一錢竹筒子吸喫日三服立效

焚香透膈散 治一切勞咳嗽壅滯胸膈痞滿

雄黃 佛耳草 鵝管石 欱冬花各等分

右為末每服用藥一錢安在香爐子上焚著以開口

吸烟在喉中立効

鳶粟神聖散 治男子婦人久新日夜咳嗽不止者

御米殼蜜炒一兩用烏梅肉 捻人參 呵子肉 蔘

蘆桑白皮各半兩

右為細末每服二三錢百沸湯潑臨卧調下

新添三黃丸 治五勞七傷流濕潤燥消渴煩熱甚者

大黃 黃芩 黃連各等分

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二三十丸加至五

十丸生薑湯下不計時候日三服妙

當歸木香湯 治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩讏語

聲沉重舌根強硬言語蹇澁口苦不思飲食白日閒睡夜發虛汗神思恍惚夢寐狂言面色痿黃頻發喘咳遍身疼痛骨節氣走注四肢沉重背脾拘急發寒熱五心煩燥唇乾多渴胸膈不利喉咽噎塞眩贏瘦弱經曰脉大為勞宜服此藥

青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮 陳皮 地

骨皮 丁香皮 牡丹皮 棕櫚皮 已上諸藥全
燒為灰末用

十大當歸一木香 紅芍藥半
錢秤兩

右為細末每服一錢水一盞入小油二點錢一文同
煎至七分溫服如婦人血臟脣下冷痛似刀攬遍身
腫滿室女經脈不通用斑貓一兩大黃一兩炒剉二
味為末用黃狗膽汁以溫酒送下一錢如脣下痛止
心間痰未止不服二味

欽定四庫全書
卷九 方論

欽定四庫全書
宣明方論卷十

金 劉完素 撰

燥門

燥乾者今肺之本燥金受熱化以成燥澀也兼火熱致
金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液
故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也
金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也

欽定四庫全書
卷十 方論

又加大便乾澀乃大腸受熱化成燥澀經云諸澀枯渴
又如癰瘍中風皆因火熱耗損血液玄脈閉塞不能浸
潤金受火鬱不能發聲經云肺主聲 肢痛緩戾者風熱濕相
致而遂以偏枯語音澀手足不隨也然中寒吐瀉亡液
而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相鬱榮衛不能開發貫注
多成偏枯經曰諸澀枯涸勁皴揭屬於燥也 又如
胃膈癰熱煩滿饑不欲食或癰成消中善食而瘦或燥
熱鬱甚而成消渴多飲而數小便或因熱病或恣酒欲誤服熱藥以致脾胃

真陰陽損虛
肝心衰弱也 狂陽火燥其三焦腸胃燥熱怫鬱而水液

不能宣行也 周身不得潤澤故瘦悴黃黑也 而燥熱消

渴日夜狂飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外湯不能

止渴徒注為小便多出俗未明妄為下焦虛冷誤人多

矣 又如周身熱燥鬱故變為雀目或內障癰疽瘡瘍

上為咳嗽喘下為痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化

者變為水腫濕脹也 世傳消渴病及消瘦弱或小便有

脂液者為消腎也 此為三消病也 消渴消中消腎經意

欽定四庫全書

卷十
宣明方論

但皆熱之所致也

人參白朮湯 治胃膈癉熱煩滿饑不欲食癉成為消

中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼療

一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積

毒一切腸胃燥澀倦悶壅塞瘡疥瘻瘧并傷寒雜病產

後煩渴氣液不得宣通

人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山梔子

荆芥穗 薄荷 桔梗 知母 澤瀉 各半
茯苓

皮連翹 瓜蔞根 乾葛各一 甘草兩 三
藿香葉

青木香 官桂各一 石膏四 寒水石二
滑石半斤

右為細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生薑

三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢

得臟腑流利取効如常服以意加減兼服

者去了大黃芒硝

絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神効

黃芩 黃丹 漢防己 括萎實各等

欽定四庫全書

卷十
宣明方論

右為細末每服二錢湯漿水調下臨卧時併進三二

服即止

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參三錢白朮 澤瀉 瓜蔞 桔梗 梔子 連

翹各半 葛根 黃芩 大黃 薄荷 白茯苓各

甘草一兩石膏二兩滑石 寒水石各三

右為末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分
入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服消痞丸



大黃甘草飲子 治男子婦人一切消渴不能止者

大豆五升 先煮三沸出淘苦水再煮半 大黃一兩 甘草大龜者四兩長四指

碎打

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少候大豆軟盛大盆中故冷令病人食豆渴食豆湯無時停止腑臟自然清潤如渴尚不止再服前藥不三五日自愈

痢門

欽定四庫全書

宣明方論
卷十

總論

夫痢者五臟窘毒結而不散或生冷物或冒寒暑失饑不能開發又傷冷熱等食更或服暖藥過鬱化成利自古人三口白利為寒赤利乃熱其三口悞也今人瘡癆初發刺開乃血多日成膿何為先熱而後寒也



受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣色白黃者脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色蒼也三口蒼曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極頻并窘痛或久不愈諸藥不能止者須下之以開除濕熱痞閉積滯而使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱也

益元散 治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白癰閉淋痛利小便偏主石淋乃服金石熱藥多待為砂石從小便淋出者也腸胃中積聚寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結消畜水止渴

欽定四庫全書
宣明方論
卷十

寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補益五藏大養脾胃之氣此腎水之藏非為王之府也理內傷陰痿安魂定魄補五勞七傷一切虛損主癟痙驚悸其季切驚動貌健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通經脉和血氣消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐勞役渴宣熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延壽及解中暑傷寒疫癟餓飽勞損憂愁思慮恚怒驚恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能令遍

身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生產後損益血衰陰虛熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此神驗之仙藥也惟孕婦不宜服滑胎也

桂府膩白滑石

六兩甘草一兩

右為末每服三錢蜜少溫水調下無蜜亦得日三服欲冷

飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎葱豆湯調下四錢五十粒煮取汁一盞調服併合服効為度此藥

是寒涼解散鬱熱苦澀甚不解多服此藥無害但有

益而無損俗惡性寒兼喜得之賤物而不明素問造化之理故不能體會神驗之言而多不用焉若以隨證用之知此方之仙藥也不可闕之

傷寒邪熱太甚照用分兩而不下皆由風熱燥澀繫飲結滯不能舒緩不得自然開也其藥力至則熱結頓開而產矣慎不

一承氣湯

前後俱下胎可活產母也凡難產或死胎不下者煎三服

日三服宜食

肉麪羹粥

濟衆云青龍散

或青龍散欲更加入滑石與蒼术倍最為發汗之妙藥也唯正可汗者即用此服

大通毒散

或解利兩感同

更兼涼膈散

調下益元散四錢或下乳用豬肉麪羹或

煎

後諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或

麻黃

二兩去節如法煎服世云神白散散與逼毒散與加麻黃蒼朮各等分

濟衆云青龍散

或青龍散欲更加入滑石與蒼朮倍最為發汗之妙藥也唯正可汗者即用此服

大通毒散

或解利兩感同



麻黃二兩去節如法煎服世云神白散散與逼毒散與加麻黃蒼朮各等分

濟衆云青龍散

或青龍散欲更加入滑石與蒼朮倍最為發汗之妙藥也唯正可汗者即用此服

大通毒散

或解利兩感同

更兼涼膈散

調下益元散四錢或下乳用豬肉麪羹或

煎

後諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或

麻黃

二兩去節如法煎服世云神白散散與逼毒散與加麻黃蒼朮各等分

濟衆云青龍散

或青龍散欲更加入滑石與蒼朮倍最為發汗之妙藥也唯正可汗者即用此服

大通毒散

或解利兩感同

見渴甚者不少飲水本為善心為害多矣豈知治之之道俱在臨時審其藏府六氣虛實明其標本如法治之而已矣此藥之常多用雖為効至大俗以病異藥同將為妄行反招悔慢今以加黃丹令桃仁色若青黛令輕粉碧色名碧玉散若薄荷葉是以名之紅玉散加青黛碧色名碧玉散若薄荷葉末一分雞蘇散主療並同但以遭同研名雞蘇散愚俗之妄悔慢耳

玄青丸

治下痢勢惡頻并窘痛或久不愈諸方不能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣得宣行者宜以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中虛水腫腹脹兼

加蒼朮末二分同葱豉煎湯調服滑石麻黃桂枝發汗當甘草一兩同為末每服二錢水一盞半更加入葱白五寸豆豉五十枚同煎至六分去滓逼毒散

汗當即用甘草兩錢水一盞半更加入葱白五寸豆豉五十枚同煎至六分去滓逼毒散

非孕婦可服

太白散

加入



療小兒驚癇積熱乳癖諸證唯泄瀉者勿服

黃連 黃蘖 大黃 甘遂 芫花
炒 酢 麪 大戟 各半
牽牛 四兩取末二兩 已上同細末 輕粉 三分 青黛 一兩

右為末勻水丸小豆大初服十九每服加十九空腹日午臨卧三服以快利為度後常服十五二十丸數日後得食久病未痊除者再加取利利後却常服以意消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍米或麻子大退驚癇熱積不下者須常服十九

欽定四庫全書

卷十
宣明方論

阿膠梅連丸 治下痢無間久新赤白青黑疼痛諸證

金井阿膠 淨草灰炒透明白別研不細者再炒研細 烏梅肉 去核炒 黃蘖

分

炒黃連 剉 當歸 焙 赤芍藥 乾薑 炮 赤茯苓 半兩各等

右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十九食前兼夜五六服小兒丸如菉豆忌油膩脂肥諸物也牛黃神金丸 治大人小兒嘔吐瀉痢無間久新赤白諸色或渴或不渴小便澁或不澁并小兒驚癇積熱瘡

癖堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消食

輕粉 粉霜 碩砂 以上別研 雄黃 研 朱砂 信砒
巴豆 去皮一錢 黃丹 蠟三錢

右先研粉霜次旋入碩砂研細下雄黃朱砂信砒再研下丹粉研勻別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新水下一丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調甘露散

散 是桂苓甘露飲或益元散亦得

欽定四庫全書

卷十
宣明方論

芍藥蘖皮丸 治一切濕熱惡痢頻年窘痛無間膿血

並宜服之

芍藥 黃蘖 各一兩 當歸 各半兩 黃連 各半兩

右為末水丸如小豆大溫水下三四十九每日兼夜

五六服忌油膩脂肥發熱等物
二勝丸 治瀉痢虛損久新者加減服之

淡豉 二兩 白术 三錢 甘草 五分

右同杵為膏丸如桐子大每服三丸或四丸以米飲湯



下如未愈及赤白痢腹滿脇痛者加一二丸

杏仁丸 治一切赤白瀉痢腹痛裏急後重諸證

杏仁 四十箇 芭豆 四十箇去皮

右以藥同燒存性研細如泥用蠟鎔和為丸如桐子

大每服一二丸煎大黃湯間日下之

白术聖散子 治一切瀉痢久不瘥并滯積疼腫者亦

治

御米殼 二兩蜜炒 當歸 肉豆蔻 縮砂 石榴皮

欽定四庫全書

卷十
宣明方論

訶子 乾薑 炮 陳皮 白术 甘草 芍藥 各等分

右為細末每服二錢水一大盞入乳汁少許去滓服

勝金膏 治一切泄瀉痢不已胃脉浮滑赤白疼痛不

已者微小者立止

芭豆皮 楠實葉 同燒存性等分

右為末鎔蠟丸如菉豆大每服三四丸米飲湯下

大聖金真散 治一切寒熱赤白瀉痢諸證

御米殼 半斤炒 甘草 一兩炙 乾薑 當歸 各三錢 醋石榴

皮 一兩炒 陳皮 去白 白茯苓 錢各五

右為末每服二錢水一盞小兒半盞每一盞煎至七

分食前忌油膩生冷毒物等

車前子散 一斷痢散 治一切痢不止者

車前子 少炒香

右為末每服二錢米飲調下食前空心服

象骨散 治脾胃虛弱心腹脹滿水穀不消黃瘦疼酸

食輒嘔吐霍亂泄瀉膿血四肢沉重一切後重裏急夜

起頻併不思飲食皆可治之

象骨 四兩炒

訶子 取肉二兩 肉豆蔻 一枳殼一乾薑兩半

右為末每服三錢水一盞半煎至八分微冷溫服食

前日三服

海蛤玉粉散 治血痢解藏中積毒熱

海蛤 二十箇焦研末炒

右為末每服二錢入蜜少許冷水調服不拘時候

宣明方論卷十

欽定四庫全書

宣明方論卷十一

金 刘完素 撰

婦入門

總論

素問曰目得血而能視耳得血而能聽指得血而能攝掌得血而能握足得血而能步藏得血而能液腑得血而能氣然血所通流則氣亦然也氣血宣行其中神自清利而應機能用矣

素問氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血藏為基本也夫婦人之病手太陽足少陰小腸心之經絡為裏表起自任衝之脉於經脉之下以上毛際循腹裏關元上至咽喉頤循面目過帶脈貫臍而止以婦人月水一月一來如期謂之月信其不來則風熱傷於經血故血在內不通或內受邪熱脾胃虛損不能飲食既不克榮衛凝滯肌膚黃燥面不光澤或大腸虛變為下痢

欽定四庫全書

宣明方論
卷十一

流入關元致絕子嗣為子藏冷虛勞損而病帶下起於胞內則夫帶下之造化但分經絡標本殊異為病之本氣也其病所發正在過帶脉之分而淋瀝以下故曰帶下也赤白之說者無定也法曰頭目昏眩口苦舌乾咽喉不利小便赤色大小便秘澁滯脉實而數者皆熱證也凡白帶下者亦多有之為病寒豈能然素問亢則害承廻制謂亢過極而反兼勝已之化制其甚也則如火煉金熱極則反化為水及六月熱極則物反出液而濕

欽定四庫全書
宣明方論
卷十一

潤林木流津故肝熱則哭泣心熱則出汗脾熱則出涎肺熱則出涕腎熱甚則唾 大凡俗論已煎熱湯煮極則沸溢及熱氣重蒸於物而生津液也故下部任脉濕熱甚者津液涌而溢已為帶下見俗醫白帶下者但依方論而用辛熱之藥雖有誤中致令鬱結熱聚不能宣通舊病轉加世傳誤之久矣

人參白朮散 治偏身燥濕相搏玄府緻密遂令公悸發渴飲食減少不為肌膚



人參 錢三 白术 錢七 薄荷 兩半 縮砂仁 錢三 生地黃 錢半 茯苓
去皮 甘草 兩半 黃芩 錢一 滑石 兩半 藿香 三錢 石膏 一兩
右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前日進二三服
白术湯 治妊娠血液虛衰痿弱難以運動氣滯痺麻榮衛不能通宣常服養液潤燥開通結滯令血昌盛
白术 寒水石 當歸 黃芩 芍藥 人參 石膏 乾葛 防風 乾薑 藿香 甘草 茯苓 苓 木香 崔宣武方 用白术 一兩
右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至五分去滓溫服食前日三服
二氣湯 治月水不調斷絕不產面黃肌瘦恒不思美食有燥熱以柴胡飲子相參服之
大黃 升慢火熬成膏子 四兩別為末 當歸 兩 白芍 藥 兩 右為末以膏子和丸如桐子大每服二十九丸淡醋湯



下食前日進三服 如月水通加入 乾漆 焦用三錢炒 沒藥 半磣
砂 研 三錢 官桂 錢二 斑蝥 三錢 去頭足炒熟用本草云 當歸龍骨丸 治月事失常經水過多及帶下淋瀝無
問久新赤白諸證并產後惡物不止或孕婦惡露胎痛動不安及大小兒痢瀉並宜服之
當歸 芍藥 黃連 染槐子 艾葉 炒各 半兩 龍骨 黃藥 兩各 一 茯苓 兩半 木香 一分 當歸人參散 治產後虛損痿弱難以運動疼痛胸滿不思飲食
當歸 白术 黃芩 芍藥 大黃 茯苓 當歸 白术 黃芩 芍藥 大黃 茯苓 皮 各半 人參 黃耆 剉 川芎 厚朴 去皮 官桂肉 錢各三 甘草 一 枳殼 四錢 去 穢炒 右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓不計時候溫服如大便闊以此散下和中丸



增損四物湯 治月經不調心腹疼痛補血臟溫經注

顏

川芎 當歸 芍藥 熟地黃 白朮 牡丹皮
兩 各半 地骨皮 兩

右為末每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服食前
當歸川芎散 治風壅頭目昏眩痛悶筋脉拘倦肢體
麻痺保護胎氣調和榮衛

當歸 川芎 兩 各半 甘草 半 二兩 黃芩 四
兩 薄荷 兩 縱砂

欽定四庫全書

宣明方論
卷十一

仁 分

右為末溫水調下一錢漸加至二錢食後日進三服

辰砂大紅丸 治產後寒熱運悶血氣塊硬疼痛不止

朱砂 藥一兩一半入附子炮 沒藥 半海馬半錢 乳香

蕤蓉 肉桂 玄胡 薑黃 磅砂 各半 斑蝥 一
兩 分

生地黃 兩

右為末酒煮麪糊為丸如酸棗大每服一丸煎當歸
酒下放溫經水不行煎紅花酒下

三聖散 治產後下血痢不止

烏魚骨 炒燒綿灰 血餘灰 汗脂者各等分

右為細末每服煎石榴皮湯調下熱服一錢
沒藥丹 治產後惡血不下月候不行血刺腰腹急痛

或一切腸垢沉積堅滿痞痛作發往來或燥熱煩渴喘
急悶亂肢體疼倦大小人心腹暴痛孕婦自利惡物過
多不宜服燥熱極甚血液衰竭不可强行宜調氣養血

細詳證用

欽定四庫全書

宣明方論
卷十一

沒藥 錢一兩 當歸 大黃 一兩牽牛二兩 輕粉 一錢 官桂 一分
末 同研 磅砂 一錢

右研勻醋麪糊為丸如小豆大每服五丸至十九溫
水下以快利取積病下為度雖利後病未痊者後再
加取利止心腹急痛煎乳香下未止取大便利
黃藥子散 治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體困
倦不美飲食

黃藥子 當歸 芍藥 生地黃 黃芩 人參



白术 知母 石膏 各一
兩 紫菀 槐花子 柴胡 各一
分

右為麌末抄三錢水一盞煎至七分瀝汁溫服食前

但一服

大延胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶

或癥瘕癩塊及一切心腹暴痛

蓬莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎 各一
當歸 當歸 赤芍藥 京三稜 川棟子

延胡索 當歸 赤芍藥 京三稜 川棟子
各一
桔梗 分

黃芩 大黃 各半
兩

甘草 一
兩

檳榔 一
錢

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前

日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥子染槐子

龍骨各半兩如前法或平人心胃急痛如本方煎服

得利尤好

枳實檳榔丸 治安養胎氣調和經候癥瘕痞塊有似

妊娠可以久服血氣通和兼寬膈美食

枳實 檳榔 黃連 黃藥 黃芩 當歸 阿

膠 細研 木香 各半
灰炒 兩

右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十丸不計時

候日進三服

軟金花丸 治心胸腰腹急痛或淋病并產前後經病
刺痛乾嘔氣勞往來寒熱四肢困倦夜多盜汗者兼治

血積食積

當歸 半兩
焙 乾漆 二錢
生 輕粉 斑貓 生全用
錢 各一 芭豆 二錢
去油 破砂

粉霜 錢各半
焙 乾漆 二錢
生 輕粉 斑貓 生全用
錢 各一 芭豆 二錢
去油 破砂

當歸 當歸 赤芍藥 京三稜 川棟子
各一
桔梗 分

右為末同研細棗肉為膏旋丸如菉豆大每服一丸

新水下病甚者加服看虛實

大紅花丸 治婦人血積聚癥瘕經絡注滯

川大黃 紅花 各二
兩 蟲蟲 十
足 翅 足

右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五

七丸溫酒下食後日三服

黃芩湯 治婦人孕胎不安

白术 黃芩 各半
分

右為末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍

溫服

海蛤丸 治婦人小便濁敗赤白帶下五淋臍腹疼痛

寒熱口乾舌澀不思飲食

海蛤 半夏 芫花 醋紅娘子 去翅 訶子 炒玄胡

索 川棟子 麪裏煨 茴香 炒各 乳香 錢三碉砂 半硃

砂 半入藥 半為衣 没藥 各一兩 研當歸半

右為末醋煮麪糊為丸如小豆大每服五丸至十九丸

醋湯下量人病虛實加減

烏金散 治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾

烏金子 肉桂 蒲黃 當歸 蟲蟲 血餘灰

水蛭 鯉魚灰 木香 青皮 皂角 大者半兩 芍

藥 半 芫花 三兩 醋浸 芭豆 一錢 出油 碎砂 少許 棕皮灰 紅花

一川烏頭 半兩

右為末每服半錢加至一錢煎生薑湯調下空心食

前忌油膩物

伏龍肝散 治婦人血崩不止或結作片者

芎藶 一生地黃一錢 阿膠八錢 當歸一錢 繢斷兩分 地榆

刺薊根 一兩 伏龍肝 七錢 青竹茹 八錢

右為末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服日五服

不計時候後服補藥

阿膠丸

阿膠 鱉甲 六分 繢斷五分 龍骨 一兩 芎藶 六分 地膽 分

鹿茸 五分 烏魚骨 八錢 丹參 六錢 龜甲 一錢

右為末醋麪糊為丸如桐子大每服三十九艾湯下

日進三四服

麝香杏仁散 治婦人陰瘡

麝香 少許 杏仁 不以多少 燒存性

右為細末如瘡口深用小布袋子二箇盛藥滿繫口臨上藥炙熱安在陰內立愈

硃砂斑蝥丸 治婦人產後喫硬食變作血氣食塊無

問久新



皂角末

錢二
芭豆去油一
硃砂一
磚砂一
大塊一
皂子一
乾蝎一
箇三

金斑猫十紅娘子五水蛭三

右為細末蜜和丸分作十五丸每服一丸至二丸三
九溫酒下初更喫平明取下血化水十年之病皆治
之或大便或小便不多出也

欽定四庫全書

卷十一
宣明方論

欽定四庫全書

宣明方論卷十二

金 刘完素 撰

補養門

補養寒論

素問云諸寒收引皆屬於腎腎者少陰也少陰者至陰
也至者為極也少陰者冬脉所旺居北而屬水為寒為
歸藏為周密寒中收引拘縮寒之用也其病上下所生

欽定四庫全書

卷十二
宣明方論

水澄澈冷清者不濁其氣寒冷水穀不消化吐利清冷
為病則如天氣寒而水自清也

素問云太陽受寒血凝為瘕太陰受寒氣聚為疝但脉
急而寒之象也急主於痛故緊急也又內經云數則為
熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒脉當遲緩寒毒內鬱
洪數為熱所養心之脉也寒氣生清水清就於濕故以
下利清白此乃腸胃寒化物失常熱則壅澁不通寒勝
則火衰火衰金旺吐利腥穢腥者金肺之屬也熱則喜

宣明方論卷十一



酸寒則水腥只如四肢逆冷堅痞腹滿屈伸不便禁固戰慄謂陰水主之舒倦不便診其脉沉伏而遲病之證也若身涼不渴而寒踰足而卧惡聞人聲不欲言皆陰證也陰陽停則和偏則病如陽氣暴絕陰氣獨勝則為寒證陰氣暴絕陽氣獨勝則為熱證

經曰陽盛陰虛汗之而死陰勝陽虛下之而死若陽實外熱陰虛內寒陰實內熱陽虛外寒陽實伐其陽當涼膈散承氣湯主之陰實伐其陰當白朮散四逆湯主之

論曰

大凡治病必求標本受先者為本次者為標此為兼證故知逆與從正行無問知標本者萬舉萬當不知標本者是謂妄行也本病相傳先以治其急六氣為本三陰三陽為標故病氣為本受病經絡藏府謂之標也

補養類

防風當歸飲子 治脾腎真陰損虛肝心風熱鬱甚陽陰虛內寒陰實內熱上實下虛怯弱不耐或表熱而身

熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表半在裏進退出入不已而為寒熱往來或表多則惡寒裏多則發熱或表之陽分陽和正氣與邪相助并甚於裏畜熱極深而外無陽氣裏熱極甚陽極似陰而寒戰腹滿煩渴者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱痛者或熱結極甚陽氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜涼畏熱者或熱極悶寒不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒

欽定四庫全書
卷十二
宣明方論

者或躁熱煩渴者或濕熱極甚而腹滿不渴者或一切風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭疼口乾鼻塞耳鳴及聾咽嗌不利或目赤腫痛口瘡舌癰或上氣痰嗽心脇鬱痞腸胃燥澀小便溺淋閼或是皮膚瘙痒手足麻痺又或筋脉拘急肢體倦怠或渾身肌肉跳動心忪驚悸或口眼喎斜語言蹇澁或狂妄昏惑健忘失志及或腸胃燥熱怫鬱而飢不欲食或濕熱內餘而消穀善飢然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物過

多而耗損脾胃則風熱鬱甚而多有如此不必全見也
無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順
飲食久服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功
驗自可知矣

當歸
大黃 柴胡 人參 黃芩 甘草 炙芍藥
兩各一 滑石 六兩

右停每服三錢至五錢水一大盞生薑三片同煎至七分去渣溫服下補校此方未為至當恐當時傳寫之誤

雙芝丸 治補精氣填骨髓壯筋骨助五臟調六腑久服注顏不老

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九至三四十

丸溫酒下鹽湯米飲亦可
凡年五十歲已上加入黑附子
以青鹽湯

備添也。煉令角膠汁出，盡其角如霜，以手捻如膩粉。

內固丹 治諸補養腎氣調和脾臟壽高者常服筋骨
乃盛之服用勿令稱汗也

勁健渾如壯士

肉蓯蓉酒浸茴香炒兩宣明方論一破故紙胡蘆巴炒巴戟心去四庫全書

黑附子 炮
川棟子 胡桃仁 各四兩
鷄炒 卷十二

右為末研桃仁為膏餘藥末和匀酒麯糊為丸如桐

子大每服十九至三十丸溫酒鹽湯下食前虛者加至五七十丸比藥明目補腎烏鬚進美食空心

大補丸 治男子脾腎不足不問久新者

陳葷子 陳蘿蔔子 已上
炒 蕤仁 去皮 各半兩
川山甲 片

右為細末用蜜和丸如櫻桃大每服一丸溫酒送下

食前空心

蛤蚧散 治脾胃氣攻心刺痛者

蛤蚧一對酒炙乳香 木香 白茯苓 丁香 茴香

錢各一川山甲二錢

右為細末每服一錢好溫酒調下空心食前

金鑑丹 治男子本藏虛冷夜夢鬼交者

龍骨水飛兔絲子一兩破故紙 荚子 澤瀉 牡蠣

兩各半麝香少許

欽定四庫全書

卷十二
宣明方論

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服三十九溫酒下

空心食前日三服

調中丸 治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈

青皮 紅皮各一兩大黃一兩牽牛兩

右為細末滴水和丸如桐子大每服三十九溫水

下空心食前

水中金丹 治元藏氣虛不足夢寐陰人走失精氣

陽起石研木香 乳香研青鹽分茴香炒骨碎

補炒杜仲

生薑炙絲盡白龍骨一兩熟者搗碎綃袋盛大豆蒸熟取皮

出焙黃戌腎

一對酒熟切作片子培入白茯苓一兩腎為末

右為細末酒麪糊和丸如皂子大每服二丸溫酒下空心忌房室

和氣地黃湯 治沉積氣結不散調養榮衛補順陰陽常服以代湯茶酒果

木香一錢揀桂去皮茯苓去皮白芥子各一錢白术乾

山藥 川芎

當歸各一分培桂花縮砂仁各半錢甘

欽定四庫全書

卷十二
宣明方論

草半兩炙

右為細末入麝香少許研勻用數重油紙或甕器內密封起每用蜜二斤餳飴一斤溫好甜水五升化勻開抄前藥并杏仁十枚去皮尖洗淨炒香燒搗碎濕地黃根計切長寸約取汁半盞溫服

白术調中湯 治中寒痞悶急痛寒濕相搏吐瀉腹痛

上不所出水液澄澈清冷穀不化小便清白不澁身涼渴本末不經有見陽熱證其脉遲者是也此因飲食冷物過多陰勝陽衰而為中寒也或冷熱相擊而氣鬱不能宣散佛熱內作以成熱證者不可亦言為

冷當以脉證別之夫濕熱上瀉常見陽脉若亡液氣虛亦能反見諸陰脉也當以標本之不可治或熱證誤服此白术調中湯溫藥亦能開發陽氣一通而愈別無加害無問寒熱久新並宜服之

或有口瘡目疾孕婦等吐瀉者以畏乾薑官桂不服

白术 茯苓 去紅皮白澤瀉各半 乾薑 炮 官桂 去皮

縮砂仁 薤香 各一 甘草 兩

右為末白湯化蜜少許調下二錢每日三服煉蜜和就每兩作十九名白术調中丸小兒一服分三服

人參白术散 此方證同調中湯治法

欽定四庫全書

卷十二
宣明方論

人參 白术 茯苓 甘草 橘皮 葛根 澤瀉 滑石 薤香 各半

右為末每服三錢水一盞煎至六分溫服姪婦加蒼术三五片熱服

白术散 治傷寒下後餘熱以藥下之大過胃中虛熱飲水無力也當生胃中津液多服此藥

人參 白术 木香 白茯苓 甘草 炙 薤香葉

乾葛 剉各二兩

右為末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時也

丁香附子散 治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止

附子 一兩 母丁香 四十 生薑 半斤 取自

九箇生薑然汁半碗

右用附子鑽孔四十九以丁香刺上面填內將生薑汁用文武火熬盡又用大蘿蔔一箇取一穴子入附子又填內將蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟為度取出切附子作片子焙乾搗為細末每服一錢米

欽定四庫全書
卷十二
宣明方論

湯一盞調下日進三服

何首烏丸 治男子元藏虛損髮白再黑填精

何首烏 半斤 肉蓴蓉 六兩 牛膝 四兩

右將何首烏半斤用棗一層何首烏瓶內蒸棗軟用切焙同為末棗肉和丸如桐子大每服五七丸嚼馬練子服酒送食前一服加一丸日三服至四十九即止却減至數効如神妙

煨腎丸 治男子腰膝疼夜多小便者

川棟子 馬棟花 破故紙 胡蘆巴 苗香各炒
分等

右除茴香外四味酒浸同為末煮麪糊為丸如桐子大每服十九至二十九溫酒下空心食前

神仙楮實丸 治積冷氣衝心胸及背有蛇蟲疼痛痔瘻

瘻癰癬氣塊心腹脹滿兩肋氣急食不消化上逆氣奔於心并疝氣下墜飲食不得吐水嘔逆上氣咳嗽眼

花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡起則頭眩男子冷氣腰疼膝痛冷痺風頑陰汗盜汗夜多小便洩利陽道衰弱婦人月水不通小便冷痛赤白帶下一切冷疾無問大小能明目益力輕身補髓益精

楮實子一升淘泥微炒去皮官桂四兩去皮牛膝半斤酒浸三日乾薑兩炮

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服二十九溫酒空心食前鹽湯亦得
補中丸 治一切氣疾心腹汚痛嘔吐氣逆不思美食



厚朴生薑製香乾薑炮白陳皮去皮白茯苓去皮甘草炙紫等分各

右為末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心白湯化下細嚼亦得

華澄茄丸 治中焦痞塞氣逆上攻心腹疼痛吐逆下痢美飲食

華澄茄半兩良薑二兩神麴炒青皮白官桂去皮一兩各阿魏半兩熟

右為末醋麪糊為丸如桐子大每服二十九生薑湯下不計時候

欽定四庫全書
宣明方論卷十二



欽定四庫全書

宣明方論卷十三

金 呂完素 撰

諸痛門

總論

夫痛者經脉流行不止環周不休寒氣入經而稽遲血泣凝而不行客於脉外血少客脉中氣不通故卒然而痛其痛者卒然而止或痛甚而不休或痛甚而可按或

欽定四庫全書

宣明方論
卷十三

按之而痛止或按之而無益或喘痛動應手或與心背相引而痛或脇肋與少腹相引而痛或腹痛或引陰股宿昔而成積或卒然而痛死不知人而少間復生或痛而閉不通者諸痛各不同形經日寒氣客於脉外則脉寒脉寒則蜷縮蜷縮則脉絀督音脈絀急則外引小腹衛氣不得通流故卒然而痛得炅則痛止寒氣客於經脉之中相薄則脉滿滿則血氣亂故痛而不可按寒氣客於腸胃之間膜原之下血不得散小腹急引故痛按之

血氣散痛乃止也脇肋痛者寒氣客於厥陰之絡脉也背與心相引痛者寒氣客於背俞之脉注於心相引痛

寒氣客於陰股血泣在小腹相引痛卒然而痛死者寒氣客於五臟厥逆上壅陰氣竭陽氣未入故卒然痛死

氣復反則生矣視其五色黃赤為熱白青則為寒青黑為痛經日感虛乃陷入其留於筋骨之間寒多則筋彎骨痛熱則骨弛肉消但痛痒瘡瘍痛腫血聚者皆屬心火熱也不可一例傷寒凡治痛者先察本次明經絡

神砂一粒丹 治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

欽定四庫全書

宣明方論
卷十三

附子一兩炮 鬱金 橘紅 等附子停用

右為末醋麪糊為丸如酸棗大以朱砂為衣每服一丸男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子

神聖代鍼散

乳香 沒藥 當歸 香白芷 川芎 各半
兩 芫青

足翹 一兩去



右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一
盞次掺藥末在茶上不得吹攬立地細細急呷之心
驚欲死者小腸氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺
虛痛并婦人血癆血迷血暈血刺血衝心胎衣不下
難產但一切痛疾服之大有神効只是要詳疾證用
藥

茴香丸 治男子婦人臍腹疼痛刺胸膈不止者

茴香 炒良薑 官桂 各半
蒼朮 一兩
汁 浸

右為末酒煮麪糊和丸如桐子大每服十九生薑湯

止痛溫酒下空心食後

趁痛丸 治一切走注疼痛婦人經脈住滯水腫腹脹

甘遂 大戟 芫花 黑牽牛 各半等分

右為末以蕎麥同末和作餅子扞切為棋子煮熟服

之得利為度每服一錢加減相虛實

六合散 治一切燥結汗後餘熱宣轉不通亦名金鑰

匙散并治小腸氣結心腹滿胸中結痞走疰疼痛

欽定四庫全書

卷十三
宣明方論

大黃 一兩 紙裹煨 白牽牛 半兩 生
黑牽牛 炒 甘遂 各半 微微
柳生 三錢 輕粉 一錢

右為細末每服一錢密水調下服量虛實加減

定痛丸 治打撲損傷筋骨疼痛等如打撲骨損者先
整骨定用竹夾然後先用好酒下麻黃三錢然後服藥
大効

乳香 一分 川椒 當歸 没藥 赤芍藥 川芎

自然銅

欽定四庫全書
卷十三
宣明方論

右為末鎔蠟為丸如彈子大細嚼酒下一丸骨碎者

先用竹夾夾定三五日依舊小可與服

香殼散 治小腸氣臍腹攬痛急陰股中疼悶不省人事

事

船上茴香 炒枳殼 各一 用鹽
沒藥 半兩

右為末每服一錢溫熱酒下不計時候併二三服

金鍼丸 亦名 陸神丸 治陽絕痞氣心腹不忍者

丁香 木香 乳香 阿魏 輕粉 骨碎補 去毛



檳榔 官桂 桂心 芭豆 去皮
肉豆蔻 陽起石 珠砂 各分等

右為細末水麪糊為丸如小豆大每服一丸針穿作孔子小油內裹過燈焰內燎遍於油中蘸死嚼生薑下不計時候日三服虛實加減

一粒金丹 治腰膝走注疼痛如虎嚙

草烏頭 五靈脂 各一 木鼈子 四兩 白膠香 半錢
土炒 四兩 去 細墨 一兩 乳香 一兩 當歸 二兩 沒藥 二兩
當歸 烘焙 地龍 半錢 麝香 一錢

欽定四庫全書

卷十三
宣明方論

右為末再研一千下糯米麪糊和丸如桐子大每服一丸至二丸溫酒下喫藥罷遍身微汗立驗
沒藥散 治一切心肚疼痛不可忍者

沒藥 乳香 別研 各三錢 川山甲 五錢 炙 木鼈子 四錢

右為細末每服半錢一錢酒大半盞同煎溫服不計時候

痔門

痔瘻總論

夫腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸為表裏主為傳道以行糟粕腸風痔病有五種其證亦異蓋因陽氣虛而玄腑疎風邪乘而熱自生風濕邪熱攻於腸中致使大便澀而燥熱鬱血熱散而流溢衝浸浚腸裏故以先血後便熱在下先便後血熱在上血後便久而不愈乃作痔

素問云因而飽食動脈橫解房室勞傷腸癖為痔風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核

欽定四庫全書
卷十三
宣明方論

甚者而變成瘻也五臟切宜保養勿令受邪

香殼丸 治濕熱內甚因而飽食腸癖成痔久而成瘻速服悉愈之

木香 黃蘖 各三錢 枳殼 去穰 厚朴 各半錢
炒 皮燒 一箇 當歸 四錢 荆芥穗 三錢

右為末麪糊為丸如桐子大每服二十九溫水食

前日三服

檳榔子丸 治腸風瀉血濕熱內甚因為諸痔久而不

治乃變成瘻

黃耆 枳實 槐花 荆芥穗 凤眼草 已上各
炙 一對 簡炙 三百兩

檜藤子 炙 皂子 簡炙

右為細末麪糊為丸如桐子大每服二三十丸空心

酒下米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血物等

烏荊丸 治腸風痔疾大腸閟澁

川烏頭 炮 二兩 荆芥穗 兩四
炮 二兩

右為末醋麪糊為丸每服二三十丸如桐子大溫水

下日三服

黃耆葛花丸 治腸中久積熱痔瘻下血疼痛

黃耆 葛花 黃赤小豆花 各一 白芍 赤芍藥

黃芩 當歸 分各三 丹皮 一 檳榔 白蒺藜 皂

角子仁 炒半兩 生地黃 煥 一
各半兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九至三十九

煎桑白皮湯下食前槐子煎湯下亦得

黃連散 治腸風下血疼痛不止

欽定四庫全書

卷十三 宣明方論

鷄冠花 黃連 貫衆 川大黃 烏梅 各一甘
兩 各三分

草 炙 三分

右為末每服二錢用溫米飲調下日三服不計時候

乳香沒藥散 治五種腸風痔瘻無問久新

宣黃連 白礬 各一穀精草 半石榴 割下蓋子裏
面取子三停一停次將黃連白礬碎內入石榴內用元蓋子合用

右以濕紙一張裹了後用膠溼拍作餅子裏石榴以炭火燒通赤為度取出去溼紙次將穀精草於銚子

內炒焦黃為度與石榴研細後入麝香一錢乳香二錢沒藥一錢研細拌勻每服一錢熱酒小半盞調下

日三服

木香厚朴湯 治痔瘻脫肛腸胃間冷腹脇虛脹不思

飲食

木香 桂心 桃仁 陳皮 厚朴 各一肉豆蔻

赤石脂 各半 皂角子 三兩去皮子醋炙黃 大附炮 三分
各半兩

右為末每服二錢溫粥飲調下食前

瘧門

瘧疾總論

素問云瘧瘧皆生於風其蓄作有時何氣使然夫陰陽

上下交爭虛實相移也陽併於陰陰實陽虛寒慄鼓領

此皆夏傷於暑熱氣藏於皮膚之內腸胃之外腠理開

得秋氣汗出遇風得之與衛氣併衛氣晝行陽夜行陰

氣得陽外出得陰內薄外內相薄是以日作也 其有

間日者氣深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭

不得出是以間日作也其作晏與早者邪氣客於風府

循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其日下一節先

客於脊背每至風府則腠理開腠理閉邪氣入

則病作晏也

大寒者陰氣也風者陽氣也先傷寒而後傷風故曰先

寒而後熱名曰寒瘧先傷於風後傷寒故曰先熱而後

寒名曰溫瘧其熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨勝少氣

煩冤手足熱欲吐名曰苦瘧有餘則瀉不足則補熱為有

欽定四庫全書

卷十三

宣明方論

餘寒為不足已得火不能溫熱已冰水不涼氣陰勝併
於陽陽勝併於陰陰勝則寒陽勝則熱故瘧者陰陽風
寒虛實邪氣不常之所作也

辟邪丹 治嵐嶂鬼瘧食瘧併月頻日者

菉豆 雄黑豆 各四十信砒別研黃丹一錢硃砂

粒

二

右為末同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一
粒已用東南桃心取七枝研汁將井花水早辰日欲

出不出向日吞之醋湯亦得已發日服

斬邪丹 治諸般瘧疾無時不止者

菉豆 小豆 三十粒口退皮再入硃砂 信砒各一

錢

一

右為末同研細滴水和丸勻分作十九每服一丸已
早辰服夜間於北斗下香水獻至早晨用新倒流水

送下

斷魔如聖丹

信砒一錢蜘蛛三箇雄黑豆四十粒

右為末滴水和丸如豌豆大如來日發於今晚夜北

斗下獻於早晨已紙裹於耳內扎一丸立見愈神聖

一粒可醫三人

辰砂丸 治一切脾胃虛瘧邪熱毒者

信砒 甘草 各一 硃砂 錢二 大豆 四十

右為末滴水和丸勻分作四十九服發日早晨日欲

出煎桃心湯下忌熱物

瘧神丹 治諸般瘧疾

欽定四庫全書

卷十三

欽定四庫全書

卷十三

右以於五月重五日用餳子尖拌勻研三千下日未
出不令鷄犬婦人見丸如桐子大未發前一日面東
冷水下一丸

趨鬼丹 治一切瘧疾神効

信砒 一 大豆 七 雄黃 輕粉 荷葉 各半 甘草 一
錢

右為末滴水為丸如小豆大重午日未出不見鷄犬
婦人修合每服一丸無根水下平日夜視北斗來日

服忌熱物

宣明方論卷十三



欽定四庫全書

宣明方論卷十四

金 刘完素 撰

眼目門

眼科總論

素問云目得血而能視手得血而能握其證足厥陰之經絡所主肝臟受虛而即補腎實而即瀉心夫人之眼目者似天地之日月也若人無雙目豈能別辯賢愚

天無日月萬物安能照耀是以眼通五臟氣貫五輪外

應肝候肝臟虛而風邪鬱風邪鬱而熱蘊衝火炎上行故攻目昏滲澁疼痛赤絲皆發榮衛實則能視榮衛虛則昏暗凡人多食熱物或嗜五辛坐濕當風凌寒冒暑將息失度皆喪目之源也

黃連膏 治一切眼目瘡肉攀睛風癢淚落不止

朴硝 一斗以水半斗淘淨去土陰乾用

黃連

半

白丁香

五升

淘淨

去土攪

細用

欽定四庫全書

宣明方論
卷十四

右取水入硝香盆內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出挖乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁曬乾硝用猪羊膽和加蜜妙點之效矣滌昏膏 治一切風眼疼痛不可忍者洗之妙矣

好崖蜜一兩黃連一兩沒藥半兩黃丹一兩炒

右入蜜同熬黑煎黃連成稠汁入二味藥內煎熬稠更入沒藥末同熬數沸濾去滓洗甚妙後更用通天

散喘鼻

欽定四庫全書
宣明方論
卷十四

通天散 治偏正頭疼并夾腦風通一切壅滯明目

赤芍藥 川芎 黃連 黃芩 玄胡索 草烏

頭當歸 乳香

別研各等分

右為細末每服少許紙搘子蘸藥任之鼻噙神效
神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞眼昏并牙齒悶痛

川芎

鬱金

各二錢

荆芥穗

一錢

薄荷葉

一分

盆硝

二錢

紅

豆一錢已上為細末後入盆硝

右研勻鼻內噙三兩剜耳力慢加藥病甚者兼夜噙之丸熱多風少隨證選用諸藥

金絲膏 治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼或痛

宣黃連

蓋半兩剉碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞浸滓經半日許取汁與前汁放別用水

蜜

半兩白礬字井鹽一分如無以青鹽代之山梔子二錢好

蜜

與黃連漬同煮五十沸取盡力子濾去滓與前黃連汁一處入篩藥

右用銀器內同熬十餘沸用生絹上細紙數重再

濾過用時常點

欽定四庫全書

卷十四
宣明方論

白藥子散 治一切疳眼赤爛目生翳膜內外瘴疾并小兒吐痢

白藥子
兩一甘草半兩

右為末用猪肝一葉批開移藥五錢水一大盞煮熟食後服

胡黃連

檳榔各半麝香少許研

人口瘡

右為細末研細點之如口瘡每服半錢麝香一字勻口瘡大小貼之忌食魚猪油膩物

碧霞丹 點一切惡眼風赤者

龍腦

麝香

碉砂

各二錢

血竭

沒藥

乳香

銅青

各一錢

鵬砂

三錢

右為末滴水和丸如桐子大每服一丸新水化開點之立效

菩薩散 治遠年近日一切眼疾

欽定四庫全書

卷十四
宣明方論

菩薩石 金精石 銀精石 太陰石 太陽石

雨餘石 河洛石 磬礦石 雲母石 盧甘

石 井泉石 白滑石 紫英石 寒水石 陽

起石 猪牙石 代赭石 碧霞石 烏魚石

青鹽 各一磚砂半蜜陀僧一銅青一黃丹四

兩一錢半鵬砂三錢乳香二錢雄膽一錢白砂

蜜

二

右為細末以井花水九大碗熬就作四碗點水內落



下錢許大不散可如散者再熬濾滓過露旋點

石膏羌活散 治久患雙目不覩光明遠年近日內外

氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活

治腦熱頭風

蜜朦花

治羞明怕日

木賊

退翳障

香白芷

利清風頭

目細辛

倒睫起二味乾菜子

麻子

起毛拳川芎

荳白芷

利清風頭蒼石

术水藏

明目暖頭風

甘菊花

荆芥穗生瘡黃芩

荳白芷

利清風頭蒼石

膏味藁本

治偏正頭痛各等分

甘草

解諸藥毒

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或茶清或淘米第二遍泔亦得日進三服至十日漸明服至二十日大驗此方醫數十餘人矣

重明散 治一切風熱內外障氣眼疾

川獨活 川羌活 川芎 吳射干 仙苓脾

防風 甘草 井泉石 蒼术

各半

丹參 白术

石決明 草決明

各三分

右為末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日進三服

服食後

雷巖丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出差明怕日多見黑花生障翳膜遮睛臉生風粟或痒或痛隱澁難開兼久患偏正頭疼牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能溉濟於肝水此藥久服大補腎藏添目力

肉蓯蓉 一牛膝 一芭豆 一兩浸一宿菊花二黑附子 同煮青鹽二錢以河水三升去皮臍一兩拘杞子二川椒三兩

右為末元浸藥酒煮麪糊為丸如桐子大每服十九丸

空心酒下世人服藥不知多少根源往往不效耳

丁香復光丸 治一切遠近目疾

丁香二巴豆一錢去皮油 半夏二烏梅半兩南鵬砂錢三

腦子二盆硝半縮砂仁二錢

甘草半兩

荆芥穗二錢

右為末醋煮麪糊為丸如棗豆大每服十九至十五丸米泔下食後日三服

已上諸方係先生親驗可錄

小兒門



小兒科論

素問云身熱惡寒戰慄驚惑皆屬熱證為少陰君火暴強直支縛戾裏急筋縮也皆屬風證為厥陰風木大小兒六歲之上為小兒十八歲已上為少年其六歲已下者諸經不載是以乳下癭兒有病難治無可定也然小兒與大人不可一例各異治之雖小兒誕生襁褓之後骨肉脆軟腸胃細微可以乳食調和臟府迺得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以綿衣之故生壅滯內有積熱熱乘

欽定四庫全書

宣明方論
卷十四

於心心受邪熱乃發為驚驚不止返為潮搐則為病也大槩小兒病者純陽熱多冷少故引 素問少陰厥陰證以小兒病驚風熱多矣小兒驚風者皆由心火暴甚而制金不能平木故風火相搏而昏冒驚悸潮熱此證皆謂熱甚而風生 素問驚駭驚愕少陰君火也

小兒脾疳瀉者皆熱甚急驚瀉痢色多青為熱證明矣痢色黃者何為火甚則水衰而脾土旺故痢色黃也痢色紅赤者為心火熱甚深也痢色黑者為火熱過極

則反兼水化制之故色黑也

五臟皆言熱證無寒冷證亦有謂瀉痢小便青白不澁為寒水穀不化而色不變吐痢腥穢澄澈清冷白不澁身涼不渴脉遲細而微者寒證也

穀雖不化而色變非白煩渴小便赤黃而澁者為之熱證世傳大人小兒吐痢霍亂食乳未及消化而痢尚白便言論為寒證誤矣候別之仲景邪熱不化穀豈為寒

也

大人亦同

欽定四庫全書

宣明方論
卷十四

小兒方類

龍腦地黃膏 治小兒急慢驚風涎痰上潮心胸天吊驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神效如病不已與分肢散一二服吐利得快常服此藥

川大黃別搗甘草橫文者麝香一錢雄黃水窟者一錢研

生腦子別研一錢

右五味各修製了再入乳鉢內同研細煉蜜為膏油單裹如有前病煎薄荷湯下旋丸如皂子大化下如



小兒大人睡驚及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服 新汲水下大解暑毒如孕婦人常服新生男女永無 疾病如有大人陽毒傷寒加輕粉 <small>二子一厘許水化</small> 下一丸杏核大小兒看年紀大小加減服立效	分肢散 治小兒卒風大人口眼喎斜風涎裏心驚癇 天弔走馬喉閉急驚一切風熱等疾	巴豆 <small>半兩不出油</small> 川大黃 <small>一兩朴硝半兩</small>	右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油貼起 如有前患每服半錢熟茶下吐下頑涎立愈如小兒 脣喉驚弔等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字 茶下時上吐下瀉以吐利得快為效大人半錢小兒 一字看虛實加減只是一兩服見效不宜頻服如吐 瀉不定以葱白湯立止	欽定四庫全書 卷十四 宣明方論
續隨子 <small>二十四箇去皮</small> 粉霜 <small>一錢半</small>	珍珠丸 治小兒虛中積熱驚癇等疾	巴豆霜 <small>二錢滑石二錢天南星一錢</small> 蝎稍 <small>二十箇</small>	右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油貼起 如有前患每服半錢熟茶下吐下頑涎立愈如小兒 脣喉驚弔等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字 茶下時上吐下瀉以吐利得快為效大人半錢小兒 一字看虛實加減只是一兩服見效不宜頻服如吐 瀉不定以葱白湯立止	欽定四庫全書 卷十四 宣明方論
續隨子 <small>二十四箇去皮</small> 粉霜 <small>一錢半</small>	鬱金散 治小兒急慢驚風等疾	鬱金散 <small>一枝巴豆七箇去皮</small>	右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油貼起 如有前患每服半錢熟茶下吐下頑涎立愈如小兒 脣喉驚弔等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字 茶下時上吐下瀉以吐利得快為效大人半錢小兒 一字看虛實加減只是一兩服見效不宜頻服如吐 瀉不定以葱白湯立止	欽定四庫全書 卷十四 宣明方論
續隨子 <small>二十四箇去皮</small> 粉霜 <small>一錢半</small>	右研為細末每服一字煎竹葉湯放溫下把藥抄盞	巴豆霜 <small>二錢滑石二錢天南星一錢</small> 蝎稍 <small>二十箇</small>	右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油貼起 如有前患每服半錢熟茶下吐下頑涎立愈如小兒 脣喉驚弔等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字 茶下時上吐下瀉以吐利得快為效大人半錢小兒 一字看虛實加減只是一兩服見效不宜頻服如吐 瀉不定以葱白湯立止	欽定四庫全書 卷十四 宣明方論

右為末研令極細以糯米粥為丸如黃米大小兒二 歲已下每服三丸至一丸十五歲每服五丸至十九 點茶湯下荆芥湯亦得虛實加減	牛黃散 治小兒上焦壅熱諸眼疾	肉桂 鬱金 <small>各一兩</small> 馬牙硝 <small>四兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	右為末如患眼三五年喫三五兩便瘥每服一錢新 汲水調下垂枕卧片時若是小兒十歲服半錢五歲 已下服一字永無驚瘡風患服之立效	欽定四庫全書 卷十四 宣明方論
右為末研令極細以糯米粥為丸如黃米大小兒二 歲已下每服三丸至一丸十五歲每服五丸至十九 點茶湯下荆芥湯亦得虛實加減	牛黃散 治小兒上焦壅熱諸眼疾	肉桂 鬱金 <small>各一兩</small> 馬牙硝 <small>四兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	右為末如患眼三五年喫三五兩便瘥每服一錢新 汲水調下垂枕卧片時若是小兒十歲服半錢五歲 已下服一字永無驚瘡風患服之立效	欽定四庫全書 卷十四 宣明方論
右為末研令極細以糯米粥為丸如黃米大小兒二 歲已下每服三丸至一丸十五歲每服五丸至十九 點茶湯下荆芥湯亦得虛實加減	牛黃散 治小兒上焦壅熱諸眼疾	肉桂 鬱金 <small>各一兩</small> 馬牙硝 <small>四兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	右為末研令極細以糯米粥為丸如黃米大小兒二 歲已下每服三丸至一丸十五歲每服五丸至十九 點茶湯下荆芥湯亦得虛實加減	欽定四庫全書 卷十四 宣明方論



唇上放以湯充下喉咽為妙

澤瀉散 治小兒齁膈膈上壅熱涎潮

澤瀉 一錢 分蟬殼 十一箇 全者二箇 黃明膠 手掌大一錢 炙令焦

右為細末每服一大錢溫米湯調下日進二服未愈

再服

鎮庭散 治小兒一切驚喘肚脹咳嗽

鬱金 大黃各半 甘草 三錢 輕粉 一錢

右為末每服半錢用薄荷汁硃砂細研冷水以木匙

瀝下

定命散 治小兒天吊驚風不能哭泣

梨蘆 川芎 蔚金 各分

右研為細末鼻中噙之如哭可醫

金肺散 治小兒諸般喘嗽急驚風神效

錫灰 一錢 漢防已 二錢 鬱金 半錢 砒黃 二錢 半夏 一錢 湯洗七半

次

右為細末每服半錢加一錢小兒加減煎豬肉湯下

日進二服食後

厚朴散 治小兒虛滑瀉痢不止

厚朴 一兩 呵子皮 半兩 史君子 一箇 捲丁香 十箇 茯苓 吳

白术 青皮各二錢 甘草 一寸炒

右為末每服一字一歲加減用清米湯下

人參散 治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止及躁轉

人參 半兩 茯苓 二兩 牛犀 二錢 甘草 半兩 乾葛 半兩 桔梗

右為末每服二錢水一大盞入燈心五莖同煎至六

分放溫不計時候煩渴者以新竹湯下量年紀加減
人參散 治小兒驚風有涎

碧雲散 膽礬半兩 銅青一分 粉霜 輕粉各一錢

右為細末每服一字薄荷湯下中風將水下如吐多
不定煎葱白湯投之立止效

桃符丸 治小兒風熱

大黃 郁李仁 黃柏 宣連 蔚金各一
芭豆

二七箇去皮輕粉二
錢

右為細末滴水為丸如菉豆大以硃砂為衣每服二
丸用桃符煎湯下看大人小兒加減

欽定四庫全書
宣明方論卷十五

金 劉完素 撰

雜病門

雜論

素問云痛痒瘡瘍癰疽痘疹癰氣結核怫鬱甚者皆熱
五臟不和九竅不通六府不和留結為癰近於火氣微
熱則痒熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也

欽定四庫全書
宣明方論

人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡
腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風
濕所乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣
客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頭
無根氣血相搏作者即有頭有根結壅盛則為膿赤核
腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實痒則為虛非謂
虛為寒也正謂熱之微甚也痒者羨疾也故火旺於夏
而萬物蕃鮮榮美也炙之以火潰之以湯而其痒轉甚

欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	如意散 治癩無時痛痒愈發有時不問久新者
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	吳茱萸 牛蒡子 荆芥 各一 牡蠣 半錢 粉半錢 信
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	右為細末研勻每臨卧抄一錢油調偏身搓摩上一
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	半如後有痒不止更少許塗之股髀之間聞香悉愈
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	信效散 治風熱上客陽明之經牙齒疳蝕斷宣腐臭
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	血出色黃氣腐注悶動搖疼痛作發有時兼解中金石
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	一切毒藥
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	信砒 一錢 黃丹 二錢 千古石灰 如無但以陳久者炒細研四錢



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	右研細末入青鹽一分麝香少許如無此二味亦得 每上抄三兩大豆許先洗漱淨以手指蘸藥捺上下 牙齒斷瀝涎勿嚥之須臾漱淨或有蝕處再上少許 日三四次常用如意一上以頻為妙或服金石藥致 病便一日三四上更不上牙齒如神或已上牙齒者 傳之即愈或平人常用頗能清利頭目寬膈羨食使 鬚髮遲白久用亦能固牙齒便遲老人氣於面而手 足陽明經絡貫注憂思則氣結而血液不行燥拂鬱 而血衰不能榮養藏府故早蒼黃而班白也此藥能 使陽明氣血宣通故效能然也 又方使龍骨不用 石灰
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	神聖餅子 治一切打撲傷損金石刀刃血出不止者 立效此藥上無膿退瘀便愈
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	烏魚骨 一兩 五月五日 前先准备下 萬苣菜 一握 握 韭菜 一握 青薊草
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	一握約一虎口人 石灰 兩 手取團圓是也
欽定四庫全書 卷十五 宣明方論	右以五月五日未出本人不語將取三味同杵爛



迪志文化出版有限公司出版

次後下餘藥味杵得所搏作餅子曬乾用時旋刮敷之

芙蓉膏 治偏滿頭面大小諸癰子或身體者

料炭灰 桑柴灰 蒜麥薑灰 各半

右灰用熱湯淋取 升熬至五分又用

獨角仙 一箇不
用角 紅娘子 半錢不
去翅足 糯米 四十粒 石灰 一兩

風化
者

右為末將前項灰汁調如麪糊相似在甕合子內於

欽定四庫全書

卷十五
宣明方論

土底埋五七日取出使用取癰痕膿內刺破用細竹

簽子點之放藥用濕紙揩藥再點至三上見癰痕時

冷水淋洗忌薑醋魚馬肉

鉆白霜散 治大小人口瘡牙齒腐蝕氣臭血出者

鉆白霜 二錢銅錄二
錢白礬大許

右為末以翎羽掃上瘡以溫漿水漱之

麝香散 治大小人口齒腐蝕出血斷根宣爛者

上好鹹土 不以真好者
多少麝香少許

右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬乾刮下再與麝香同研勻摻於瘡上以紙貼神效

乳香散 治一切瘰疬瘡新久遠近不已者

乳香 一錢
砒霜一錢
硝砂半
紅娘子去翅足一十四箇 黃丹

半錢

右為末糯米粥和作餅子如折三錢厚小銅錢裏捲大破瘡上白麪糊如不破者炙柴炷大者不過一月

其瘰疬核自下

欽定四庫全書

卷十五
宣明方論

後斂瘡生肌藥 黃藥 不以
多少

為細末麪糊塗患處甚妙

五香丸 治一切惡瘡瘰疬結核無首尾及諸瘡腫

沉香 木香 鷄舌香 各一
兩 薰陸香 麝香 錢各三
錢

連翹 一兩
半

右研為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時

紫參丸 治熱毒瘰疬腫痛已內消瘡已破出膿水服此藥



紫參 苦參 各一錢
別研 滑石 二兩

連翹 二兩
丹參 一兩
膩粉 三錢
麝香

右為末別用玄參一觔搗碎以酒三碗浸三日採取
汁去滓用皂角子三伯枚煨熟搗為末用玄參酒熬
皂子未成膏和前藥如桐子大每服一丸以黃耆湯
下一日加一丸至患人歲數即止如四十則二十每
日却減一丸瘡自乾有結內消

麝香雄黃散 治十七般惡蟲咬傷人及瘡腫者

欽定四庫全書

卷十五
宣明方論

麝香 雄黃 乳香 磺砂 各二錢
土蜂窩 露蜂 窩燒

右研為細末以醋調少許塗咬着處或不辨認得多

凝是惡瘡三五日不療即毒入心難瘥忌鷄魚油膩

物

礮砂散 治一切疔瘡

礮砂 雄黃 天南星 砒霜 各等
分 蘆香 少許

右研為細末用竹針針開用藥到黃水出瘡已

聖力散 治諸疔瘡腫

草烏頭 白及 白斂 木鼈子 去皮地龍 金毛
狗脊 錢半 麝香 三錢 黃丹 少許

右研為細末用針針到生肉痛者用藥黃水出為度
川山甲散 治一切通氣破瘡腫行膿血如神效

川山甲 木鼈子 烏龍角 各等分
燒存性

右為末每服一錢半空心熱酒調下至中午瘡破膿
血便行

欽定四庫全書

卷十五
宣明方論

守癰丸 治癰瘤結硬

通草 二兩 杏仁 一大合 去皮尖研 牛蒡子 一合
布 去鹹 呵梨勒 海藻 各四兩 出油吳射干 昆

右為末煉蜜為丸如彈子大含化咽津下日進三服

鬼代丹 治打着不痛

無名異 研 没藥 研 乳香 研 自然銅 醋淬
地龍 去木

右為末煉蜜為丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

龍腦潤肌散 治杖瘡熱毒疼痛

黃丹一兩 蜜陀僧半兩 輕粉一錢 半兩 麝香半錢 龍腦一字

右為細末摻藥在瘡上用青白子塗之內留一眼子

香藥丸 治癰瘡

硇砂 乳香 沒藥 半夏 輕粉 赤石脂等各分

右為末糯米粉為丸如桐子大每服十九丸加至二十丸

皂角子臨卧

紅玉梃子 治一切牙疳

砒霜一塊 皂角子大 黃丹半兩 魏魯土

右為細末餽餅和作劑子任牙

桃花散 治一切瘡生肌藥

白及 白斂 黃柏 黃連 乳香別研 麝香別研 黃丹 分各等

右為細末摻於瘡上三二日生肌肉滿
追毒散 治生瘡發悶吐噦霍亂

欽定四庫全書

卷十五 宣明方論

螺兒青 捣甘草各一兩 白礬二錢

右為細末每服一錢新汲水調下立止

膽礬丸 治男子年少而鬢髮班白

土馬驥燒存石馬驥燒存半夏兩各一生薑兩胡桃

箇十真膽礬半兩 川五倍子一兩

右為末和作一塊絹袋子盛如彈子大熱酒水各少許浸下藥汁淋洗頭髮一月神效

伏神散 治膽熱多睡神思不安昏悶

欽定四庫全書

卷十五 宣明方論

伏神去皮麥門冬 地骨皮 茯苓各一兩 白蘚皮

酸棗仁 沙參 甘草炙半兩

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服

鐵脚丸 治大小便不通

皂角炙去皮不以多少去却子

右為末酒麪糊為丸如桐子大每服三十九酒服

全聖散 治小腸胱膀氣痛不忍者

地膽半兩去足微炒 滑石一硃砂錢半

右為末每服二錢用苦杖酒調下食前服

琥珀散 治五淋

滑石兩木通 當歸 木香 尉金 扁竹兩各一

琥珀二兩

右為末每服三五錢用蘆葦葉同煎食後日三服

葵子散 治小便不通

葵子 荀苓去黑皮各等分

右為末每服四錢水一盞煎三沸食前

倒換散 治無間久新癰閼不通小腹急痛肛門腫疼

大黃小便不通減半荆芥穗大便不減半各等分

右件藥味各別為末每服一二錢溫水調下臨時加減服

敗毒散 治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血運

大黃 黃藥子 紫河車 赤芍藥 甘草各分

右為末每服一錢如發熱冷水下如發寒煎生薑茶

蔥湯同調下此藥偏治婦人

欽定四庫全書

宣明方論 卷十五

補真丹 治男子元藏虛冷興陽固腎不虛

黑附子一兩陽起石火燒酒淬三錢海馬二錢乳香 雄黃

衣血竭為錢三石蓮子去殼皮心黑錫子炒去砂子半兩石鷺子以燒

淬醋麝香一分

右為細末麪糊為丸每服二十九丸用五香湯空心下

五香湯

沉香 箟香 乳香 麝香 檀香

右為細末每服半錢煎湯下

欽定四庫全書

宣明方論 卷十五

新添 一醉烏法 治頭鬚白再黑方

訶藥勒十箇去核不研石榴三箇大者取汁碌礬分五生地黃汁

升硝砂研各一錢

右藥同入甕瓶內用二味汁浸密封勿令透氣至四

十九日後取出其訶子狀若黑梅至夜臨卧含一枚
嚥津到曉爛嚼以酒一盞下之三二日後再服忌葱

大蒜蘿蔔

宣明方論卷十五