

文淵閣
四庫全書
電子版



【子部】

仁齋直指
——
仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：仁齋直指 __仁齋傷寒類書》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：<http://www.dheritage.com>
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand 版本，請瀏覽迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷一

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

活人證治賦

理內通微
攻取陰陽

論風寒暑濕溫熱諸種脉證治法

風緩寒緊

太陽病自汗脉浮緩為傷風用桂枝湯無汗脉浮緊

為傷寒用麻黃湯傷風證見寒脉傷寒證見風脉則

欽定四庫全書



仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

二藥兼用○張氏云凡服桂枝湯而吐者其後必吐

膿血諸可汗證服麻黃湯之後發煩目瞤□者必衄

血衄乃解○尋常感冒不換金正氣散加川芎燥實

內熱者人參敗毒散與之世俗多以五積散為常用

之劑然其用藥溫燥但可施之寒濕其他證候服之

誤人

暑虛熱洪

中暑與夏月熱病外證皆相似但中暑脉虛弱肢節

不疼熱病脉洪盛肢體痛重○中暑與香薷散小柴

胡湯小便不通五苓散○夏月熱病用藥不可太溫

如表證當用桂枝湯麻黃湯之類須以黃芩升麻佐

之其有表裏俱熱經日不解而脉數者竹葉湯可量

與之○中暑何以脉虛暑傷氣而不傷形熱則氣散

也夏月登途十神湯亦能解暑

春日溫斑曰毒

春病曰溫脉浮緊其病輕夏至以前是也○春病發

欽定四庫全書



仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

斑疹者曰溫毒寸脉洪數尺脉實大其病重蓋陰氣

衰而陽氣盛也○春溫升麻葛根湯熱多者小柴胡

湯○溫毒用敗毒散葛根橘皮湯並加紫草芍藥

壞如瘡瘡如風

壞病曰溫瘧尺寸脉弦盛先熱後寒吐汗下積之餘

證也溫瘧先熱後寒及寒熱相等者並小柴胡湯先

寒後熱小柴胡湯加桂若脉緊實大便秘大柴胡湯

下之○瘡如風癰脉沉遲弦細項背強急身體反張



剛瘧無汗柔瘧有汗先譏語者發剛瘧先手足冷者發柔瘧並屬太陽蓋先傷風又感寒濕致之陽沉於陰之中故其脉沉細瘧最難瘧十救一二濕家發汗太過亦作瘧剛瘧麻黃葛根湯柔瘧桂枝加葛根湯風溫濕溫自汗多發汗逆

風溫脉浮張氏云寸脉浮滑尺脉濡弱蓋素傷於風因而傷熱所致也濕溫寸脉濡弱尺脉小急素傷於濕因而傷暑所致也外證並多自汗謹勿發表表汗

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 一 仁齋傷寒類書

則逆○風溫人參羌活散小柴胡湯萎蕤湯○濕溫通用除濕湯五苓散濕氣勝身痛大便滑與木附湯暑氣勝煩渴大便秘白虎加蒼朮湯風濕中濕有便秘與便通

風濕脉浮虛大便秘小便利身痛微腫風氣與濕氣相搏然也○中濕脉沉緩大便利小便秘身痛發黃風雨襲虛山澤蒸氣然也○風濕通用敗毒散小便利者五苓散○中濕通用除濕湯五苓散大便利



小便亦自利木附湯已上總名傷寒

二 論陰陽虛盛表汗裏下及表裏餘證

原夫陽虛則陰從內出而惡寒陰虛則陽自外入而結熱

經云陽虛則外寒陰虛則內熱陽虛於表故陰出而乘之所以惡寒而支膚怯冷也○陰虛於裏故陽入而乘之所以結熱而燥胃乾而大便鞭秘也出入之間寒暑則變

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 一 仁齋傷寒類書

惡寒者為表邪汗則必愈結熱者為裏病下之隨徹陽虛陰盛表病裏和汗之而愈屬桂枝湯麻黃湯葛根解肌湯○陰虛陽盛裏病表和下之而愈屬小承氣湯大柴胡湯大承氣湯隨輕重而度用之不過除邪輔正而已○原韻四句汗下綱領表證脉浮裏證脉實有能察脉以辨其表裏驗證以審其汗下治法無餘蘊矣○脉微遲壞病虛煩咽乾諸血諸動氣並不可汗○脉浮濇小便清或少嘔吐厥逆喉塞諸動



氣並不可下

非汗候又不可下表裏無證但解和

非汗證又非下證小柴胡湯隨證加減為良解表加

桂通裏加枳殼半表半裏證亦主之敗毒散和解散

可以參用○若經多日不大便目中不明瞭或熱不

止脉雖浮數可小承氣湯大柴胡湯下之

有浮脉復作裏煩內外俱見惟滲泄

滲泄以五苓散利小便若以不大便而小便反清者

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

與桂枝湯○若心下滿大便鞭頭汗出微惡寒與小

柴胡湯○又桂枝人參湯即理中湯加桂可以解表

和裏桂枝加大黃湯可以解表攻裏皆主治表裏俱

見之證

三 論隨變隨應不可拘以日數及榮衛府臟受病

淺深

意曰脉以證別證因脉尋

據脉以驗證問證而對脉證如此脉亦如此一依條



迪志文化出版有限公司出版

例用藥證與脉畧同則加減於其間證與脉大異則

消息揣量俟其形見然後以某證某藥條例主之凡

治傷寒貴乎纖悉問證

陽脉浮長弦而盛陰家細微緩而沉

太陽脉浮陽明脉長少陽脉弦太陰脉沉細少陰脉

沉帶緊厥陰脉微緩尺寸俱如此手六經足六經經

有十二傷寒只傳足六經

始證遽陽盛即下胃府

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

始得病便為陽盛入內之證即屬陽明陽明即胃府

也用小承氣湯下之不必拘以一二日在太陽

初得若臟病直溫少陰

陽受病則在腑陰受病則入臟發於陽則先屬太陽

發於陰則先屬少陰此二經受病最多○若初得病

便作脉沉厥冷惡寒即是少陰用乾姜甘草湯四逆

湯溫之○少陰反發熱證麻黃細辛附子湯○少陰

屬腎太陽屬膀胱合為臟腑此二經受病最多者諺



迪志文化出版有限公司出版

曰傷寒偏打下虛人是也

如脉浮多日以有表但病在太陽宜究心

張氏云凡病至十餘日太陽證猶在而脉浮者但治

太陽不可拘以日數桂枝麻黃各半湯主之

皮膚為衛血脉為榮榮行中衛行外

衛行脉外在皮膚榮行脉中在血脉風傷衛氣其病

淺故用桂枝湯以解肌寒傷榮氣其病深故用麻黃

湯以發汗合而謂之太陽表證也

欽定四庫全書
仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

肌肉屬胃陰證屬臟胃入裏臟尤深

榮衛之下為肌肉陽明主之肌肉之下為臟三陰主

之胃者陽證之裏臟者陰證之裏入胃當下入臟當

溫胃府為裏臟則又深於裏者矣

四
論一證之中有表有裏

豈不以惡寒一也外熱屬陽無熱屬陰

太陽惡寒脉浮有熱用桂枝湯麻黃湯○少陰惡寒

脉沉無熱用理中湯四逆湯○太陰厥陰皆不惡寒

然厥陰只有一證大汗出熱不去中拘急肢體疼下

利厥逆不惡寒者四逆湯主之

發熱一也不渴為表見渴為裏

表有熱不渴小柴胡加桂○裏有熱口燥煩渴身熱

四肢厥而脉滑白虎加人參湯欲知內有熱內無熱

但以飲食喜冷喜熱試之○太陽發熱則惡寒陽明

發熱則自汗少陽發熱則嘔

有先溫乃汗之證

欽定四庫全書
仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

厥陰下利腹滿身疼先溫裏乃發表溫裏用四逆湯

發表用桂枝湯

有先解後攻之理

太陽病不解熱結膀胱其人善忘如狂而血自下下

者愈若外不解可先與桂枝湯外已解但小腹結急

乃以桃仁承氣湯攻之

身疼作熱診之浮則腑候外應體痛自利沉而得則臟

家病起



均是身體疼痛脉浮發熱者表未解用桂枝湯○脉沉自利者裏不和用四逆湯○凡下利須辨陰陽三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身冷熱而忪滿噦曰支飲涼而脇堅嘔為裏水

身熱乾嘔喘微利心下忪忪此為表有水小青龍湯汗之○身涼乾嘔汗出短氣微噦微利心下痞滿引脇鞭痛此為表已解而裏有水十棗湯下之經云諸有水氣目下微腫

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

體如火反欲被寒在骨髓熱在皮膚身極冷猶惡衣寒在皮膚熱在骨髓

表熱裏寒者脉沉而遲先與陰旦湯寒已用小柴胡湯加桂○裏熱表寒者狀如熱厥脉沉而滑先與白虎加人參湯熱已用桂枝麻黃各半湯○又少陰惡寒而踈時煩不欲厚衣大柴胡湯下之

五

論病在三陰當溫病在胃膈可吐及合病併病治法誤汗誤下失汗失下諸變證



大抵無身熱無頭疼則溫以陰經之劑

身熱頭疼多是陽證三陰證例無身熱無頭疼蓋諸陰經絡上至頸而不至頭故也理中湯甘草乾姜湯四逆湯溫之○惟厥陰嘔吐涎沫有頭疼而無身熱用吳茱萸湯○少陰有反發熱而無頭疼然其脉沉不可誤下以麻黃細辛附子湯溫而表之○但陰證終無大熱亦無汗縱有微熱亦或下利手足厥也世俗不識陰證者多每遇傷寒必欲發汗請以上數條

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

例鑒之

有痰妨有胃滿則吐其膈上之忪

病在胃膈或多痰或邪氣妨滿而忪忪者可吐之用瓜蒂散梔子豉湯或鹽湯脉微者不可吐只用半夏茯苓枳殼桔梗陳皮之劑

三陽明俱可下惟合病惡寒者有表當汗

太陽陽明本太陽病因汗下利小便後胃中燥大便堅小便數屬脾約圓不惡寒反惡熱大便秘或譫語



屬調胃承氣湯○少陽陽明本少陽病因發汗利

小便後胃中燥大便難亦屬調胃承氣湯○正陽陽

明即本經自病屬小承氣湯大承氣湯三者俱可下

○惟太陽陽明合病而有惡寒之證此則病在表却

當汗之用麻黃桂枝各半湯○又喘條太陽陽明合

病喘而胃滿者不可下可與麻黃湯蓋麻黃主喘故

也○少陽陽明合病下利脉弦者木剋土名曰負不

治

欽定四庫全書
仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

併太陽在外解若歸根入胃者本條用攻

太陽陽明先合病然後併歸一經但見太陽證者可

汗但見陽明證者可下

所以陽盛有桂枝之斃陰多戒承氣之衝

桂枝下咽陽盛即斃以火濟火也承氣入胃陰盛以

亡以水濟水也

當下而汗為無陽為厥竭為譫語當汗而下為痞氣為

懊懷為結胸

當下而誤汗則外泄其正氣內之邪氣乘虛而出焉

當汗而誤下則內泄其正氣外之邪氣乘虛而入焉

又有伏陽證候而脉沉伏尤不可誤用熱藥溫之輕

則變證重則害人常須體認○下厥上竭者由其妄

汗動血口鼻耳目有血出也○懊懷者真氣內虛客

氣動膈懊惱煩鬱之狀

失下則血凝氣滯以熱厥

當下不下血氣不通故熱深則厥深也熱厥初得病

欽定四庫全書
仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

身有熱其脉沉滑指爪時溫小承氣湯主之

失汗則熱閉狂忘而蓄膿

當汗不汗蓄熱化為毒血善忘如狂昏迷譫語心忪

語短眼閉目紅漱水燥煩喘滿痛悶骨熱膚閔背冷

足寒小便多大便黑小腹結急皆血證也輕者犀角

地黃湯重者桃仁承氣湯三黃圓抵當湯負取盡黑

物為度○若外不解者用先解後攻條例經云血在

上則忘血在下則狂



下後脉數大便堅當解瘀紅之毒

無表裏證已下後脉數不解消穀易饑至六七日不

大便內有瘀血也屬抵當湯

少者熱壯與斷下轉加熱悶之凶

少實人壯熱下利若用藥止之則轉加熱悶而死矣

六 論審證投藥三可輕用

嘗攷夫無汗煩燥而脉浮緊者可服青龍

無汗脉緊為傷寒煩燥脉浮為傷風若無汗而煩燥

其脉浮緊比為傷風見傷寒證候風寒俱盛小青龍

湯汗之

無汗喜渴而脉單浮者勿投白虎

無汗脉浮表未解而陰氣盛雖渴不可用白虎太寒

可小柴胡湯若汗後脉洪大而渴則為裏有熱乃可

用白虎湯或脉浮滑而渴則為表裏皆熱亦可用白

虎湯蓋滑在浮之下生血氣實滑脉當作裏證大抵

白虎湯主病在太陽陽明之間若全謂太陽則表證

欽定四庫全書
仁齋直指 卷一 一 仁齋傷寒類書

已解全謂陽明則大便不結若表裏之間有熱故用

之然而當用白虎湯者可且與竹葉湯

用熱遠熱之為當用寒遠寒而後愈

冬溫夏清用藥亦然謂如夏月桂枝湯加黃芩冬月

柴胡湯加桂是也嗜飲酒者不可用桂枝熱嘔者不

可用生薑○傷寒服藥中病即止後服不必盡劑

陽明自汗引飲則五苓散非可輕進

陽明汗多以利小便為戒汗多則胃燥雖渴不可用

欽定四庫全書
仁齋直指 卷一 一 仁齋傷寒類書

五苓散恐利其小便胃愈燥也可竹葉湯此渴證與

其他不可

太陽自汗數尿則桂枝湯不容妄取

桂利小便自汗數尿津液已泄故不可與桂枝湯誤

服桂枝得之便厥但用甘草乾薑湯芍藥甘草湯甘

辛以表之皆去桂甘

發散為陽藥以甘辛湧泄為陰劑惟酸苦

陽虛陰盛汗之則愈故用甘辛發散以助陽甘辛之



藥為能復其陽氣也○陰虛陽盛下之則愈故用酸苦湧泄以助陰酸苦之劑為能復其陰氣也

口噤咬齒大承氣

剛瘕咬齒口禁胃滿脚攣大承氣湯主之

吐取豉行

瓜蒂散梔子豉湯皆用豉

奔豚動氣用桂心

動氣曰奔豚桂利小便而泄之故動氣藥中多用桂

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

大抵水結不散氣與之搏即發奔豚治法多利小便

勿汗下或用理中湯去朮加桂蓋腎惡燥故去朮也

嘔由薑主

嘔家聖藥是生薑千金之說信矣然氣逆作嘔生薑

散之痰與水作嘔半夏逐之嘔有熱有寒生薑於寒

證最便若遇熱嘔不可無烏梅

七 論脉證順逆及諸惡證不治

又當知陰病陽脉與汗後而平靜者活陽病陰脉兼汗

已而疾洪者亡

陰病陽脉則不成陽病陰脉則不水得汗而脉靜者生汗已而脉燥疾者死故汗後復熱其脉燥疾狂言不食曰陰陽交不治○凡汗後復熱脉浮數或洪大者為表證猶在當再汗之若脉沉實則下之○尺寸脉俱虛而熱不止者不治七八日已上發大熱者難治大發濕家汗則成瘧熱而瘧者不治又厥逆胃脉無脉服藥後脉不至或脉暴出者並死

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

厥而煩加吐瀉腎證未易保

少陰證四肢厥冷吐利煩燥不治蓋真陽氣絕而虛

陽獨用也

厥而利反能食除中何以當

厥陰證厥逆下利當不能食反能食者曰陰中不治

張氏云胃中如蟲齧粥入則出蓋暴多食一頓而絕

也

或氣出嘔悶或肢冷臍硬



張口出氣乾嘔或目眶陷不治上氣喘粗心下疰悶
不治四肢冷臍下絞痛如石硬者逆

或口噤汗戰或肝弦土傷

汗出如油口噤肉戰伸吟喘促者死○六七日傳厥
陰經脉來浮緩此為胃氣全其病欲愈榮衛將復寒
熱作而大汗解若脉弦為厥陰肝經移氣尅土肝受
賊邪不治故有耳聾舌卷囊縮之證○又陽明少陽
合病下利脉弦本尅土不治

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一
一仁齋傷寒類書

兩感之與臟結臟厥

兩感乃陰陽二經雙傳最惡不治有本條○臟結者
證如結胃舌上胎滑雖能飲食然時時下利臍腹引
陰筋急痛不治有本條○臟厥者七八日肌膚冷下
利發燥無時暫安不治

多日而為毒陰毒陽

陽氣暴絕病為陰毒陰氣暴絕病為陽毒非得汗不
能復其正氣然此二毒隨氣逆上結伏於胃中皆令

人心腹築痛有自利者有用藥而不得利者並要隨
其寒溫而利逐之庶幾毒泄則暴絕之氣復榮衛流
行自然大汗而解矣藥證詳見本條凡陰陽二毒急
作救療過六七日者不治

煩燥結胃

結胃證具更加煩燥者逆蓋陰氣內絕而孤陽不生
也

重暈尋衣而直視

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一
一仁齋傷寒類書

誤發濕溫汗曰重暈不治目直視口鼻黑手尋衣縫
最逆形體黯慘直視搖頭為心絕不治狂言直視遺
尿為腎絕不治喘滿下利妄言直視亦死○又日晡
潮熱獨語直視如慳甚則循衣摸床但譫語者承氣
湯下之下後脉弦者生脉濇者死弦為陽濇為陰是
陽病見陰脉也

縮囊咳逆

厥陰唇青舌卷黑而腎囊縮者死傷寒腹滿而泄或



咳逆不止者死

離經代脉以皆戕

損脉離經一呼一至為不及至脉離經一呼二至為太過惟陰易陽易二證有之○代脉動而中止不能自還因而復動元氣絕也並不治張氏曰脉乍數乍疎者死又曰傷寒脉結代心動悸灸甘草湯主之

八 論變例法當通變

斷之曰陽明無汗少陰反熱取表以溫

欽定四庫全書



仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

陽明反無汗皮上如蟲行此為以虛用朮附湯建中湯溫之又陽明脉浮無汗而喘可發汗用麻黃湯又陽明脉遲汗出多微惡寒者表未解也用桂枝湯○少陰反發熱脉雖沉麻黃細辛附子湯微汗之又少陰反發熱自利厥逆無脉用通脉四逆湯又少陰病二三日常見少陰無陽熱中滿之證用麻黃附子甘草湯少陰亦有反自汗之證見無陽咽痛條○太陰腹滿脉浮與桂枝湯

少陰口燥陽明汗多急攻其內

少陰口燥咽乾而渴恐腎汁乾大承氣湯急下之者口燥自利心下痛則為積證亦用承氣湯少陰惡寒而踈時煩不欲衣被為表塞裏熱大柴胡湯下之少陰多日脉腹滿不大便可與承氣湯○陽明發熱汗出多恐胃汁乾大承氣湯急下之○又太陽結熱在裏往來寒熱太陽發熱吐利心下痞便太陽無表裏證發熱多日大便難並用大柴胡湯下之此亦

欽定四庫全書



仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

變例

下腹滿下縮囊皆陰證之下劑

太陰腹滿時痛桂枝加大黃湯若腹滿而脉浮則表證猶在只用桂枝湯微汗之○厥陰舌卷囊縮為毒氣入臟承氣湯下之厥陰下利譫語脉不微細與小承氣湯

溫漏虛溫瀋脉乃陽家之溫輩

太陽證發汗漏不止拘急惡風太陽風濕八九日身



煩疼脉虛浮濇通用桂皮加附子湯芍藥甘草附子湯太陽七八日脉細惡寒為陰陽俱虛黃耆建中湯太陽風濕身體腫疼汗出短氣惡風小便不利甘草附子湯太陽心中悸而煩燥小建中湯太陽汗後或下後病不解而煩燥茯苓四逆湯

至若陰極發燥

脉沉遲

熱極發厥

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

脉沉滑

與夫陰證似陽

脉沉微

陽證似陰

脉沉滑

又當識脉之所在

物極則反寒暑則變證雖疑似脉可推尋數熱遲

寒陰陽別矣○又陰盛膈陽證身冷煩燥而不飲



水者是霹靂散主之○厥有二證初得病身熱煩燥大小便秘以至於厥者為熱厥其脉沉滑可下之初得病身不熱大小便利常淒清而厥者為冷厥其脉沉遲可溫之又有發寒熱而厥者面色不澤眩冒無脉急與麻黃甘草附子湯以汗之汗解則生服藥無汗或脉不至者不治○凡當汗當下者如更有他證相妨切須且用和解俟其他證已退即依汗下法謂如脉來微遲虛濇不可汗下且

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

與建中湯輦四肢厥冷不可汗下且與通和血脉臍間動氣不可汗下且與理中湯去朮加桂俟其脉不微遲虛濇俟其四肢已和俟其動氣不作然後詳審表裏而汗下之至若結胸當下厥冷脉微即未可下且與枳梗湯之屬熱厥當下疑似未辨且以理中湯試之謹勿尚急急則誤誤則不可救解戒之哉○妊娠傷寒產前安胎產後調血川芎香附為要藥發熱以小柴胡主之汗下溫法酌量


而已○傷寒多日忽覺渾身癢疹發越而痒此乃用藥中病陰陽分別榮衛流行病氣自毛竅中出也他病亦然小兒驚風發熱將產亦如是

傷寒格法張長沙開其源朱奉議導其流前哲後賢發明秘妙吾儒之孔孟矣世有謂傷寒論其辭艱深亦有以問答繁多增益意度議活人書者多見其不知量也活人宗師張朱作古是篇刊布不敢名稱使學者稽為驗為決以邇古人之用心皆知起敬

欽定四庫全書

仁齋直指
卷一
一
仁齋傷寒類書

附司天在泉五運六氣之圖



云先立其年以明其氣是知司天在泉上見下臨為其始也如子午卯酉陰陽互換六氣在其中矣勝復之理補瀉之法可從而推之 訣曰

子午少陰君火天陽明燥金應在泉丑未太陰溫土
上太陽寒水兩連綿寅申少陽相火旺厥陰風木地
中聯卯酉却與子午比辰戌巳亥亦同然

欽定四庫全書

仁齋直指
卷一
一仁齋傷寒類書

五 運 之 圖




歲會者甲巳化土而遇辰戌丑未之歲乙庚化金而遇申酉歲之類也太乙天符如乙酉歲乙庚化金而遇酉又上見燥金司天也天符者如丙戌歲丙辛化水上見寒水司天是也司天符者如庚子庚午歲下臨燥金在泉同歲會者如辛丑辛未歲下臨寒水在泉是也歲遇天符歲會則為卑氣陽干陽辰則為太過陰干陰辰則為不及也

欽定四庫全書
仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

天以六氣動而不息上應乎客

六氣之圖



地以五行靜而守位下進乎主



迪志文化出版有限公司出版

六氣圖說曰太陽寒水治宜熱陽明燥金宜苦溫少陽相火治宜鹹寒太陰濕土治宜苦熱少陰君火治宜鹹寒厥陰風木治宜辛涼六氣之行各居六十日有奇以真時而化其氣過猶不及病乃生焉故察其盛衰以味折之以正其氣經云必折其還氣而取化源益其歲元使邪勝使暴過不生奇疾不起是理歲之大要也

欽定四庫全書
仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

附傷寒脉法指掌圖

陽脉陰病見陽脉則生

大	浮	數	動	滑
滿指大為血虛大為病進大為氣盛	浮而大為血虛大為病進大為氣盛	浮而大為血虛大為病進大為氣盛	浮而大為血虛大為病進大為氣盛	浮而大為血虛大為病進大為氣盛
虛而大為血虛大為病進大為氣盛	虛而大為血虛大為病進大為氣盛	虛而大為血虛大為病進大為氣盛	虛而大為血虛大為病進大為氣盛	虛而大為血虛大為病進大為氣盛
中而大為血虛大為病進大為氣盛	中而大為血虛大為病進大為氣盛	中而大為血虛大為病進大為氣盛	中而大為血虛大為病進大為氣盛	中而大為血虛大為病進大為氣盛
大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛
大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛
大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛
大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛
大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛
大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛	大為血虛大為病進大為氣盛



迪志文化出版有限公司出版

陰脉陽病見陰脉則死

沉	輕按不足按之重者為沉細夜加沉則榮氣微也為水
瀋	榮氣不足也為少血為亡汗
弱	無氣弱名曰瀋榮氣弱名曰卑卑相搏名曰瀋
弦	脈浮緊名曰弦為痛為寒
微	為水氣純弦勁急死脉也

欽定四庫全書

仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

結	往來脈來不絕時正復來名曰結陰盛則結結者陰
促	脈來急數時正復來名曰促陽盛則促促者陰
濡	脈來浮大而濡尺中也
緩	脈來浮大而濡尺中也
緊	脈來浮大而濡尺中也

遲	極緩遲為在臟遲為寒
芤	榮氣不足也為虛為失血
散	傷寒咳逆上氣其脉散
革	脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛
代	真氣衰極脉不能自動因

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書

六經本脉	陽太尺寸俱浮	陰太尺寸俱沉
四時脉	春脉肝	秋脉肺
六經本脉	陽少尺寸俱弦	陰少尺寸俱沉
四時脉	夏脉心	冬脉腎
六經本脉	陽明俱長	厥尺寸
四時脉	脾脉中緩分旺	於辰戌丑未之月各一十八日共七十二日也



殘 弦緊浮滑沉濇此六者名曰殘賊能為諸脉作病也風則脉浮寒則脉緊中暑脉滑中濕脉濇傷於陰則脉沉傷於陽則脉浮	同 弦為痛純弦為死脉寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解此脉陰陽為和平雖劇必愈	浮 諸浮為在表 為陽 沈 諸沈為在裏 為陰 遲 諸遲為在藏 為寒 數 諸數為在府 為熱	微 脉散散如羹上肥者陽氣微也脉索如蜘蛛絲者陽氣衰也脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血也脉浮而洪身汗如油喘而天休北氣命絕
---	--	--	---

時 立夏得洪大脉是其本位其人病身體舌疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗澌自出者明日便解一何以言之立夏得洪大脉是其時脉故便然也四時故妃
--

或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩何也曰雜病以弦為陽者脉近乎浮實也傷寒以弦為陰者弦乃陽為陰所鬱如養時寒氣尚凜陽不得發越故春脉弦經云厥陰之至其脉弦是也若緩者傷寒以大為病進緩為邪退邪退病際則氣脉和緩故為欲愈之脉雜病以緊為七表傷寒以緊急少陰蓋緊者仲景多言咽痛下利虛損多汗等證然在陽經則浮而緊在陰經則沈而緊也若時疫流行經所謂天地之氣勝復之作不行於証診當於運氣內詳之
--

仁齋傷寒類書卷一

欽定四庫全書 仁齋直指 卷一 仁齋傷寒類書

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷二

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

傷寒總括

調理傷寒統論

傷寒汗下溫之法最不可輕據脉以驗證問證而對脉
太陽者陽證之表也陽明者陽證之裏也少陽者二陽
三陰之間太陰少陰厥陰又居於裏總而謂之陰證也

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書

發於陽則太陽為之首發於陰則少陰為之先太陽惡
寒而少陰亦惡寒但太陽之脉多浮少陰之脉沉細與
其他證狀亦自異也發熱惡寒身體疼痛或自汗或無
汗是為表證可汗不惡寒反惡熱手掌心并腋下澀上
而汗口燥胃乾壯熱腹滿小便如常不白不少而大便
秘鞭是為裏證可下厥冷拳默自利煩燥而無身熱頭
疼是為陰證可溫單浮與浮洪浮數浮緊者此表病之
脉滑實弦緊中間數盛者此裏病之脉沉而微細緩弱



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

者此陰病之脉在表者邪傳於榮衛之間在裏者邪入

於胃府之內胃府而下少陽居焉若傳次三陰則為邪

氣入臟矣

胃府如府庫之府故謂之裏少陽一證惟小
柴胡湯和解之三陰之經曰臟大抵以剛劑

溫榮與衛均為表也亦均可汗也然自汗者為傷風風

傷衛氣衛行脉外其脉浮緩而病尚淺則以桂枝湯助

陽而汗之輕無汗者為傷寒寒傷榮氣榮行脉中其脉

浮緊而病稍深則以麻黃湯助陽而汗之重榮衛固為

表也胃府亦可以為表也然以府臟而分表裏則在府

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書

者謂之表在臟者謂之裏胃取諸府可以表言若合榮
衛府臟而分之則表者榮衛之所行裏者胃府之所主
而臟則又深於裏者矣榮衛屬太陽經胃府屬
陽明經臟屬三陰經審脉問
證辨名定經真知其為表邪則汗之真知其為裏邪則
下之真知其為陰病則溫之表有邪則為陽虛陰盛而
發表之藥溫裏有邪則為陰虛陽盛而攻裏之藥寒陰
經受邪則為臟病而溫陰之藥熱是三者貴乎得中否
則寧可不及亦不可太過得中者上也不及者次也夫

苟太過則斯為下矣蓋得中者如此而汗如彼而下又如彼而溫桂枝承氣投之不差蓋附理中發而必中重者用藥繁輕者用藥微不背陰陽深合法度故曰得中者上也寧可不及者證與脉大同而小異名與證似異而實同當五分取汗而三分之劑散之當五分轉下而三分之劑導之當純剛溫裏而略溫之劑扶持之未可汗下者與之和解未可遽溫者且安其中若猶未也則增減於其間細細而加消詳徐徐而就條理雖未遽安亦無傳變故曰寧可不及者次也太過者粗工不知深淺輕舉妄動者為之或問證而不知脉或執脉而不對證或名實之不辨或日數之為拘遂有汗下太早之失甚者諉曰不問陰陽當汗而反下則為痞為結胷為懊懣當下而反汗則為譫語為無陽動經為下厥上竭至於陽厥似陰之類誤以剛劑投之舌黑發狂悶亂可畏性命至貴可輕試哉故曰夫苟太過則斯為下矣大抵治傷寒有法與治他病不同條例審的藥進病除除劑

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書



少差生死立異古之人處方立論曰可汗曰可下曰可溫曰和解曰少與曰急下曰隨證滲泄與夫先溫其裏乃發其表先解其表乃攻其裏謂知音者若網在綱有條不紊此固得中者之事也若班固所謂有病不服藥常得中醫許仁則以為守過七日最為得計此非寧可不及之意乎王叔和善脉而且以承氣為戒初虞世善方而論傷寒一節且謂麻黃桂枝非深於其道則莫之敢為又非所以為太過者之戒乎論而至此則知古人之立論甚嚴而傷寒汗下溫之法其不可輕也信矣雖然汗下溫之法固自有定論也經云傷寒六七日目不了了無表裏證脉雖浮亦有可下者少陰二三日無証亦有可汗者陰證四逆法當用溫而四逆散輩中有柴胡枳殼此豈厚誣哉曰醫在九流之中非圓機之士不足與語也何者脉雖浮而亦可下者無表裏證謂六七日大便難也藉使大便不難其敢輕下之乎少陰病亦有發汗者謂陰證初病便屬少陰而反發熱少陰

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書



本無熱今反發熱者是表猶未解故用溫藥微取其汗也藉使身不發熱其敢輕汗之乎四逆湯用薑附四逆散用枳柴一熱一寒並主厥逆固不侔矣然傳經之邪與陰經受邪初病便厥者不同故四逆散用藥寒主先陽而後陰也四逆湯用藥熱主陽不足而陰有餘也其敢例視陰逆一切溫之乎不特此爾傷寒有始得病其脈沉數外證腹滿口燥煩渴即為陽盛入內之證醫法以下劑攻之不可藥以一二日太陽而發表也前所謂陰證傷寒初病以來便見脈沉厥冷惡寒更無頭痛即是少陰受病之證醫法以乾薑附子輩溫之又不可概以三陰傳次先太陰而後少陰也若張氏之論日數則曰日數雖多但有表證而脈浮者猶可發汗日數雖少若有裏證而脈沉實者即須下之是日數之不可拘也如此孫思邈云服承氣得利謹不中補熱氣得補復成此所以言實熱也王叔和有曰虛熱不可大攻熱去則寒起此所以言虛熱也二人之言殊途同歸是虛實之

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

不可不辨也如此又況寒溫熱同實而不同名暑濕風異種而有兼病異氣之相乘他邪之並作表證中之有不可汗裏證中之有不可下三陰可溫而攻積證者不同表裏俱見與半表裏無表裏者有異中暑熱病疑似難明傷寒傷風脈證互見陽明本多汗而有反無汗之形少陰本無汗而有反自汗之證或陰極發燥熱極發厥陰證似陽陽證似陰差之毫釐繆以千里又有痰證食積虛煩脚氣證似傷寒不可以傷寒之法拘之自非心領意會達變知幾體認之精發用之審則縱橫泛應幾何而不誤哉孔子曰可與適道未可與立可與立未可與權是說也亦在夫人權之而已矣

陰陽虛盛用藥寒溫辯義

外有脈內無脈為外實內虛外無脈內有脈為內實外虛虛實之義隨其脈之有無者言之人所共知也若夫傷寒一書所謂陰陽虛盛則精微之義不無辯析於其間四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實蓋外有

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

脉者表之真陽氣虛故陰邪以盛出而乘陽是以脉浮於外其病在表法當汗之當其陰邪出表脉浮於外之時不可自惑以為陽脉盛也內有脉者裏之真陰氣虛故陽邪以盛入而乘陰是以脉實於內其病在裏法當下之當其陽熱入裏脉實於內之時不可自惑以為陰脉盛也是說非古人之立意也蓋使人知如此之為陰盛則抑陰而助陽如彼之為陽盛則抑陽而助陰陰盛而邪出於外者發表之藥當性溫以助陽如桂枝湯之類是也陽盛而邪入於內者攻裏之藥當性寒以抑陽如承氣湯之類是也或曰陰出而乘於外是陽之不足也發汗則亡陽而汗之何哉是大不然陰邪傳於外不汗之則邪何由去桂枝之性溫溫之乃所以助陽陽有所助而長則陰邪之所由以消甘辛發散為陽者此也張氏所謂承氣入胃陰盛以亡者正恐陰盛出外而誤以承氣下之外得寒以助邪內攻虛而損正安得而亡或者又曰陽入而乘於內是陰之不足也陰受病則

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書

表裏虛實辯義

當有以溫養而下之何哉是又不然陽邪入於內不下之則邪何從出承氣之性寒寒之乃所以抑陽陽有所抑而微則真陰之所由以長酸苦湧泄為陰者此也張氏所謂桂枝下咽陽盛即斃者正恐陽盛入內而誤以桂枝汗之內得熱以助邪外撤虛而損正又安得而不斃觀古人發表之藥多溫攻裏之藥多寒則知陰陽虛盛之意微非止為汗下設正所以為用藥寒溫設也可不明辯哉

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書

桂枝湯黃湯夏月用之須加黃芩
升麻柴胡湯冬月用之須加官桂



按脉虛如急救表裏之類下利身疼先與四逆湯清溫自調後與桂枝湯是也表裏俱實則舉按脉實如表裏俱見之類脉浮尿赤與五苓散設下腹痛與桂枝大黃湯是也大抵出入傳變各有處所淺深輕重時刻異同精對無差立當見效

六經用藥格法

太陽屬膀胱非發汗不能愈必用桂枝麻黃以助陽却邪陽明屬胃非通泄不能痊必用大黃芒硝以疏利陽

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書

熱少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗消解血熱黃芩佐之太陰脾土性惡寒濕非乾薑白朮不能溫燥少陰腎水性惡寒燥非附子不能溫厥陰肝木藏血榮筋非芍藥甘草不能滋養此用藥經常之道也然三陽汗下和解人皆知之至若太陰溫燥不行則亦當溫利如桂枝加大黃之類是太陰自陽明而出也少陰雖用附子亦有麻黃細辛之證是少陰自太陽而出也厥陰類例其間有用桂者是厥陰自少陽而出也其或太陽

少陽二經鬱閉則三陰皆自陽明出焉故三陰皆有下證如太陰腹滿時痛為有積少陰咽乾口燥為腎汁乾厥陰煩滿耳聾舌卷囊縮為毒氣入臟皆當下之知乎此則傷寒用藥之法隨變隨應而不窮矣雖然傷寒七日傳遍六經此約法也或首尾只在一經或間傳一二經而止又不可拘但據脉與外證驗之是為活法是篇用字膀胱即太陽胃即陽明膽即少陽太陰曰脾少陰曰腎厥陰曰肝蓋取其音律正耳

欽定四庫全書

仁齋直指 卷二 一 仁齋傷寒類書

傷寒內實大熱通利之後已得輕瘥且量進白粥兩三日未可遽與和胃之劑熱氣得之又復作也繼此旋以易簡溫膽湯入竹茹與之或二陳湯加前胡亦可矣二藥傷寒瘥後通用無熱者只守本方世俗以四君子湯為貴細循習用之不思內有白朮溫而閉氣往往因此而燥閔矣

仁齋傷寒類書卷二



欽定四庫全書

子部
仁齋傷寒類書卷三

詳校官太醫院使臣張聲基

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱 鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張 炳

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷三

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

傷寒證治

表裏汗下二證

發熱憎寒體痛時

脉浮解表定無疑

不憎寒却頻憎熱

多汗咽乾裏下之

○表證脉浮身體肢節疼痛惡風惡寒○裏證脉實

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

而不浮不惡風寒反惡熱身不疼自汗譫語不大便

或咽乾腹滿○表裏俱見證張氏用五苓散真人用

桂枝大黃甘草湯一塊生薑兩箇棗肉桂大黃等甘

草滿盞水煎存七分表裏傷寒只一掃

岳陽樓
降筆

三陽三陰脉

陽屬膀胱胃膽間

陰居脾腎更連肝

浮長弦細沉微緩

審脉仍將外證看

三陽外證

足之三陽
從頭走足



腰脊頭疼熱惡寒

目疼汗熱鼻中乾

耳聾口苦時乾嘔

胃脇堅疼寒熱干

○太陽證腰脊強頭項痛發熱惡寒若傷風則鼻塞惡風○陽明證目疼身熱鼻乾不惡寒反惡熱自汗出不得卧內實大便難○少陽證耳聾胃脇痛或口苦咽乾目眩或往來寒熱而嘔○陽病體輕脉輕外證壯熱煩渴大小便秘頭面有汗昏漬氣麤揚手擲足

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

三陰外證

足之三陰
從足走腹

腹滿肢溫利不煩

舌乾燥渴或憎寒

唇青舌卷多煩滿

筋急囊間縮又攣

○太陰證腹滿或痛手足溫自利不渴喉下乾○少陰證口燥舌乾而渴或口中和則惡寒常默默欲寐不欲見光明有時腹痛又有咽痛二證○厥陰證唇青舌卷煩滿筋急囊縮婦人則乳縮或消渴饑不欲食食即吐蛔○陰病體重脉重外證厥冷唇青腹滿不渴



迪志文化出版有限公司出版

大小便自利惺惺而靜引衣自蓋足攣而卧三陰病無身熱無頭痛其或渴者陰極發躁也○陰證唇青舌黑或白胎或卷強者用生薑頻擦唇口續又易之薑能回陽生胃解毒溫血散氣擦之後陰消陽長黑轉而紅最為良法

汗下溫正法

○太陽傷風自汗惡風桂枝湯傷寒無汗惡寒麻黃湯風寒俱盛則以桂枝麻黃湯兼用自汗小便數者勿用桂枝可乾薑甘草湯芍藥甘草湯桂枝湯麻黃湯夏月用之須加黃芩○陽明不惡寒反惡熱自汗大便難用小承氣大柴胡汗多者胃汁乾急下大承氣無汗惡寒升麻湯有汗脉遲微惡寒為表未解桂枝湯無汗脉浮發喘麻黃湯○少陽並屬小柴胡湯柴胡湯輩冬月用之須加官桂○太陰自利不渴為臟寒理中湯四逆湯陰證手足必微厥若手足溫便是太陰胃膈脹滿枳實理中圓腹滿脉浮桂枝湯腹

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

滿時痛桂枝加芍藥湯痛甚桂枝加大黃湯○少陰

脉沉口不乾舌不燥及背惡寒者並用四逆湯小便

白者亦用四逆始得病脉沉反發熱麻黃細辛附子

湯口燥咽乾而渴急下之用大承氣○厥陰脉微浮

為欲愈不浮未愈小建中湯脉浮緩如瘧狀者囊不

縮亦欲愈桂枝麻黃各半湯脉沉短者囊必縮為毒

氣入臟可承氣湯下之利不止用四逆湯○三陰中

寒微則理中湯稍厥或中寒下利則乾薑甘草湯大

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

段重者用四逆湯無脉者用通脉四逆湯六經惟少

陰難治大要以口燥而渴知其熱脉沉而遲別其寒

然亦有表裏無熱但煩憤默默不欲見光明其脉沉

細或時腹痛此可以四順湯增加乾薑對之增損理

中圓亦可矣凡陰證白通湯四逆湯通脉湯條例未

敢遽用者且以理中湯甘草乾薑湯代之雖然陰寒

亦有毒乃病氣也滯須行之養正丹金液丹半硫圓

皆可流利又為要藥

變汗法

○陽明與太陽合病有惡寒證屬表可汗用升麻湯

又太陽陽明合病脅滿而喘麻黃湯○陽明本多汗

若脉浮無汗而喘可發汗亦用麻黃湯又陽明病脉

遲汗出多微惡寒者表未解也可與桂枝湯又陽明

煩熱汗出如瘧或日晡發潮熱而脉浮虛者並與桂

枝湯若脉實者當用承氣○太陰腹滿脉浮桂枝湯

凡太陰證有用五積散者非謂發汗蓋去積耳○少

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

陰初得病脉沉反發熱者溫之而微取其汗用麻黃

細辛附子湯下利手足冷而身熱者非屬通脉四逆

湯又少陰病二三日常見少陰而無陽熱中滿之證

者用麻黃附子甘草湯微汗之二藥皆陰證傷寒解

表之劑陰證初病便屬少陰不待傳次

變下法

○太陽發熱汗出不解嘔吐下利而心中痞硬者大

柴胡下之又太陽病十餘日熱結在裏往來寒熱亦



用大柴胡湯無表裏證發熱七八日脉雖浮數可下
大柴胡若大便難身微熱者大柴胡急下○太陰腹
滿時痛甚者桂枝加大黃湯○少陰口燥咽乾而渴
大承氣急下之若口乾燥下利清水心下痛者為積
證亦用承氣湯又少陰證六七日腹脹滿不大便用
承氣湯又少陰惡寒而踈時煩不欲衣被為表寒裏
熱大柴胡下之○厥陰脉沉短舌卷囊縮為毒氣入
臟承氣湯下之若厥冷耳聾囊縮而脉沉弦者為少

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

陽厥陰兩感不治有本條又厥陰下利譫語脉不微
細與小承氣湯

變溫法

○太陽發汗漏不止惡風小便難四肢急難屈伸桂
枝加附子湯太陽發汗後病不解而惡風者虛也芍
藥甘草附子湯又太陽汗後或下後病不解而煩燥
者伏苓四逆湯又太陽心中悸而煩燥小建中湯又
太陽七八日脉細惡寒為陰陽俱虛並不可汗下其

人素無熱者芍藥甘草附子湯素有熱者黃耆建中
湯又太陽病八九日風濕相搏身煩疼難轉側不嘔
渴脉浮虛而漚桂枝附子湯若大便硬而小便自利
者去桂加白朮又太陽風濕相搏骨節疼痛身體微
腫不能屈伸汗出短氣惡風而小便不利者甘草附
子湯○陽明病反無汗皮上如蟲行者為火虛可溫
之用朮附湯黃耆建中湯此非冬陽明無汗證也當
加體認

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

傷寒傷風脉證

傷寒無汗惡寒攻 緊漚浮兮慘在容

自汗惡風浮緩脉 面光不慘是傷風

○傷風脉浮而緩自汗惡風頭疼面光發熱煩燥手
足不寒熱勝於寒耳風傷衛氣表虛自汗法當解肌
桂枝湯敗毒散獨活散人參羌活散可選用之若項
背強桂枝加葛根湯裏寒不飲水者桂枝去芍藥加
附子湯或加乾薑臍滑者和解散若鼻塞通關散



或發汗漏不止而惡風四肢拘急桂枝加附子湯壯熱煩燥人參羌活散參蘇飲或天麻防風丸薄荷泡湯調下脉濡緊自汗勿用桂枝湯當用小建中湯○傷寒脉浮而緊無汗惡寒頭疼面慘發熱拘急手足

微寒寒勝於熱耳寒傷榮氣表實無汗法當發汗麻黃湯麻黃葛根湯人參順氣散可選用之頭痛甚者葱白湯或熱多寒少脉弱無陽只用桂枝二越婢一湯或喘急者可與麻黃湯尺脉遲而血少者黃耆建

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

中湯○淋家衄家瘡家虛家四動氣不可汗可與小柴胡湯○太陽脉浮有汗為傷風脉緊無汗為傷寒○陽明善饑為傷風不食為傷寒○少陽耳聾目赤胷煩滿為傷風口苦咽乾目眩為傷寒○三陰傷風但四肢煩疼

傷風見寒傷寒見風脉證

熱盛而煩手足溫

風生寒脉緊浮全

不煩少熱肢微厥

寒證兼風浮緩然

○傷風見寒脉傷寒見風脉為榮衛俱受邪用大青龍湯然大青龍不可輕用須是風寒俱盛又加煩躁一證方可與之叙易簡者謂二證交攻則桂枝麻黃湯兼用尤為穩當

二陽合病

太陽合胃脉浮長

若是浮弦合少陽

膽合胃時弦不短

更將外證互推詳

○太陽陽明本太陽病若汗若下若利小便無津液

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

胃中燥轉屬陽明故大便秘堅小便利是為脾約脾約圓麻子仁圓主之若惡寒則用升麻葛根湯不惡寒反惡熱大便秘可少與白虎湯不惡寒反惡熱大便秘或譫語調胃承氣湯下之喘而胷滿者不可下用麻黃湯○太陽少陽頸項強急脇下鞭滿目眩往來寒熱諸證並小柴胡湯○少陽陽明本少陽病因發汗利小便後胃中躁大便秘難屬調胃承氣湯○正陽陽明本經風盛氣實也大柴胡湯大小承氣湯主



之○又三陽合病腹滿身重面垢譫語遺尿口中不
仁屬白虎湯或舌乾口燥不仁背惡寒者通用○太
陽陽明少陽陽明正陽陽明無表證者俱可下惟惡
寒中寒為太陽陽明合病未過經却屬表可發汗用
桂枝麻黃各半湯蓋在經則汗過經則下也○三陰
無合病

太陽陽明併病

太陽已汗併陽明 不惡寒兮裏未寧

欽定四庫全書



仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

全入陽明須下劑 汗之猶在太陽經

○太陽陽明併病本太陽初病發汗而汗出不徹轉
屬陽明續微汗自出不惡寒是併歸陽明也○若太
陽證尚在桂枝麻黃各半湯○若太陽證已退但有
陽明者大承氣湯下之

春溫夏熱

春溫浮緊易輕安 發熱頭疼渴嗽干
夏月傷寒為熱病 脉來洪盛療應難



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

溫病發於春間及夏至以前是也發熱咳嗽頭痛身
疼口中燥渴脉來浮緊特其病輕耳○熱多者小柴
胡湯熱少者升麻湯解肌湯微熱不渴者小柴胡加
桂○渴者小柴胡去半夏加人參瓜蒌根脉實煩渴
大柴胡微利之以其實而大便秘也虛煩用竹葉湯
○嗽者小柴胡加五味子○夏月傷寒是為熱病發
熱頭疼肢體痛腫或惡寒或惡熱其脉洪盛用藥不
可太溫如桂枝麻黃青龍湯之屬須以黃芩升麻佐

欽定四庫全書



仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

之○熱病二日外脉仍數邪猶在經絡未入臟腑者
桂枝石膏湯三月至夏謂之晚發栝子升麻湯

風溫濕溫

風溫熱汗脉多浮 喘渴癡眠體不收
腹滿脚寒頭目痛 濕溫譫熱汗頻流
風溫尺寸俱浮素傷於風因而傷熱風與熱搏即發
風溫惟其有風則四肢緩縱而不收也其證身熱自
汗頭疼喘息發渴昏睡或體重不仁謹勿發汗汗之

則譊語燥擾目亂無精張氏又云寸脉浮滑尺脉濡弱亦不可下下之則失洩直視若被火則發黃瘵癰狀如驚癰皆變逆之証耳○病在少陰厥陰二經用萎蕤湯人參敗毒散○身灼熱知母乾葛湯○渴甚括萎根湯○脉浮身重汗出漢防己湯誤汗用防己黃耆湯救之○龐氏用葛根龍胆湯證治論用小柴胡湯未醒湯柴胡桂枝湯取微汗○痰壅金沸草散咳嗽加杏仁細辛五味子○濕溫寸濡而弱尺小而

欽定四庫全書



仁齋直指 卷三 一仁齋傷寒類書

急素傷於濕因而中暑濕與熱搏即發濕溫其狀胃腹滿頭目痛發壯熱苦妄言身上汗多兩脛逆冷倦怠惡寒苦若忘發其汗使人不能言耳聾不知痛處其身青面色變是重暈而醫殺之○濕溫病在太陰經用白虎加蒼朮湯更加官桂○濕氣勝則一身盡痛發熱身黃小便不利大便反快用除濕湯五苓散臟腑虛大便濕者理中湯加蒼朮白茯苓虛滑甚者朮附湯○暑氣勝則壯熱煩燥小便不利大便閉澀用

香薷散治要六和湯臟腑閉而煩渴者白虎加蒼朮湯

風濕中濕

風濕浮兮額汗微 腫疼發熱喜重衣

身黃熱痛沉而緩 中濕腸踈小腑稀

風濕脉浮先傷濕而後傷風故也外證肢體腫痛不能轉側額上微汗怯寒而不欲去衣大便難小便利熱至日晡而劇治法但微解肌若發正汗則風去濕

欽定四庫全書



仁齋直指 卷三 一仁齋傷寒類書

在非徒無益而又害之○治法微解肌用麻黃杏子意苾甘草加白朮防己黃耆湯不嘔不渴脉虛浮濇者桂枝附子湯○濕多身痛小便不利甘草附子湯煩渴小便不利五苓散○外不熱內不渴小便自利朮附湯緩弱昏迷腹滿身重自汗失音下利不禁白通湯多加白朮少用甘草○身腫痛微喘惡風杏仁湯○通用人參敗毒散熱而煩渴者加括萎根若誤下之小便必不利可與五苓散○中濕脉沉而緩風



欽定四庫全書



仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

雨襲虛澤潤蒸氣人多為濕所傷也一身盡痛重着發黃關節煩疼發熱鼻塞時或脹滿大便利小便難其外證可汗濕家不可汗汗之則發瘥熱而瘥者死亦不可下下之則額汗胷滿微喘而噦小便不利全濟亦難經云治濕之法不利小便非其治也○中濕小便不利大便自利甘草附子湯五苓散或除濕湯加茯苓主之大小便皆自利則與朮附湯身體痛或鼻塞黃耆建中湯小建中湯寒濕交攻疼痛重著易簡

溫毒中暑

溫毒春間斑發瘡

嘔而咳悶透心腸

背寒面垢虛表脉

自汗焦煩是暑傷

欽定四庫全書



仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

溫毒者冬間感受寒毒乖氣至春而發也表證未退毒氣不散所以發斑肌肉疹紋心下煩悶嘔逆咳嗽後必下利寸脉洪數尺脉實大其為病重蓋陽氣盛耳○治法通用玄參升麻湯黑膏亦主之或用敗毒散加紫草咳悶而嘔清汁者葛根橘皮湯證治論黃連橘皮湯○中暑脉虛弱或沉伏身熱背寒面垢自汗煩燥大渴手聳惡寒昏昏倦怠而身不痛經云寒則腠理閉暑則腠理開開則洒然寒閉則熱而悶體認不精以傷暑為熱病誤人多矣○內外俱熱口燥煩渴四肢微冷而不痛白虎湯○痰逆惡寒橘皮湯熱悶不惡寒竹葉石膏湯○頭疼惡心煩燥心下不快五苓散消暑圓○霍亂吐瀉香需散溫服○信効方中暑用小柴胡湯脉芤遲腠理開洒然毛聳口前開而板齒燥用白虎加人參湯○傷暑發大熱頭痛自汗咽疼煩燥腹中熱緩諸藥不効者小柴胡湯最良小便不利五苓散○熱病中暑濕溫雖皆因暑所



致然脉証不同當明辨之熱病者冬間感寒至暑氣盛而後發此即夏月傷寒但熱多而脉洪盛是也中暑者病在太陽外證與熱病相似但熱病脉盛肢節痛腫中暑脉虛肢節不疼兼面垢背寒而手足微冷是也濕溫者濕熱相搏致之病在太陰其脉寸濡而弱尺小而急外證胃腹滿頭目痛身熱汗多而足脛逆冷是也以上三證夏月病多有之須別其名庶無毫釐千里之繆○凡夏月傷暑雖則熱毒作恙皆因脾胃虛怯而得之胃虛然後伏暑伏暑然後煩燥其有飲水過多及用解暑冷藥太過傷動其中真氣內虧嘔吐不食自利不渴六脉沉微按之隱隱是為裏寒外熱如陰盛隔陽之類不可更泥中暑伏熱之說急以理中湯甘草乾姜湯與之縱或微煩小便不利斷不可以為熱也又有冷藥過度胃寒停水潮熱而嘔或身熱微煩此亦陽浮外而不內可與小半夏茯苓湯或加前胡脾胃素弱者二陳湯主之雖然抑猶

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書



有戒也夏月病多傷暑暑家脉虛面鰲冷汗手足微寒苟不揣其裏熱之證妄以剛劑投之抱薪救焚不發黃則發斑甚至蓄血悶亂而死矣可不邇源徂流而精審云○假如夏月泄瀉不止胃脘閉隔飲食不進或心腹痛滿大抵因暑得之泄瀉中滿者香需散加縮砂下消暑圓心腹刺痛者香需散加縮砂下蘇感圓俱得其便○假如夏月下痢或赤或白煩渴嘔逆腹中攪痛小便不利是亦因暑致之可與五苓散香需散小柴胡湯黃龍圓之屬若以此嘔證為脾胃虛寒則誤矣

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

瘧病溫瘧疫癘

瘧甚風癘強體肢

柔剛二證汗譖推

後寒先熱名溫瘧

疫癘之邪責四時

瘧者先傷於風又感寒溫致之發熱腹痛口噤頭搖瘰癧不語項強背直腰身反張或目疼或目赤或閉目或反目或足冷或足溫或妄行其脉沉弦而遲亦



或帶緊此為惡候不救者多若脉如雨濺散出於指外者旦暮殂也傷風頭痛發熱常出微汗又自嘔逆汗之必發瘧新產血虛汗出傷風亦致發瘧大發濕家汗亦作瘧熱而瘧者死瘧初發來多有腹痛之證內經曰戴眼反折痙瘲汗出如珠着身不流太陽絕也其謂是乎○發熱無汗惡寒譫語為剛瘧曰陽葛根湯麻黃葛根湯○發熱有汗不惡寒為柔瘧曰陰桂枝加葛根湯桂枝栝蒌葛根湯○二瘧通用小續命湯陽瘧去附子陰瘧去麻黃○剛瘧胃滿口噤咬齒脚攣卧不着席大承氣湯下之○柔瘧桂心白朮湯附子防風散八物白朮散桂枝煑散○溫瘧即壞病也尺寸俱盛先熱後寒吐汗下後重感於寒得之寒多者其脉弦遲熱多者其脉弦數寒熱乃陰陽之爭也或者談論傷寒誤藥壞病吐汗下後續生寒熱則曰瘧未必死所幸分而成之不思古人一藥對一病藥進病除安有所謂分為寒熱者哉噫此可為智

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

者道也○先熱後寒及寒熱相等並小柴胡湯先寒後熱小柴胡湯加桂○多熱但熱而燥少與白虎湯或白虎加桂湯○多寒但寒者柴胡桂薑湯治中湯加桂虛人寒甚七棗湯○熱多痰多嘔不入食二陳湯加烏梅○小便赤澀汗出煩渴素有瘴氣不伏水土而嘔五苓散○大便秘嘔吐寒熱無時脉小緊者大柴胡下之○瘧脉自弦弦數多熱弦遲多寒遲弱可溫緊浮可汗緊實可下浮大而胃滿者可吐○經云夏傷於暑秋必病瘧固非傷寒之謂然壞傷寒有溫瘧一證若纏綿不已腹中必有癥瘕用藥對治或者殊途而同歸活人書以祛邪丸取吐以不愈者服瘧母煎丸亦諸瘧中通用之劑耳惟癥瘕能生寒熱凡瘕皆有水惡血包裹而成也瘧母煎丸中有逐水破血之劑為能下之痰水在上者祛邪圓中有常山為能吐之瘧家多蓄黃水若水不在於上焦則常山亦能下之也一法常山檳榔一倍草果烏梅炙甘草

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

各半新汲水隔宿煎凌晨服又法青蒿革丹等為細末研蒜入蠟圓如桐子凌晨三十粒棗湯下此皆勝藥嘔者可與二陳湯痰飲中節致生寒熱者亦與二陳湯餘見似瘧條例○疫癘傳染老幼皆相似調治一也寸濡弱尺弦緊或肝脉濡細是雖積邪四時然發汗吐下條例通行故曰明知逆順正行無問雖然陰陽表裏條例通行固也然其毒癘之氣蘊蓄于中亦須隨其溫涼權其輕重而利導之庶毒有所泄則易為力也○病源云挾毒癘之氣壯熱煩毒發為心腹脹滿者不治○春感清邪在肝升麻葛根湯解肌湯○夏感寒邪在心調中湯射干湯半夏桂枝甘草湯○秋感熱邪在肺白虎加蒼朮湯發黃瘧茵陳調五苓散○冬感溫邪在腎亦名冬溫萎蕤湯○土無正刑因火而名當隨經取之此大槩然耳○寒證者聖散子熒火圓神明散可選用聖散子內用朮附豆蔻良薑只可施之寒濕毋惑於通用之說○溫疫通

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

用敗毒散

痰證傷食類傷寒

有痰頭項皆和暢

外熱憎寒寸浮上

頭疼右數身不疼

左手脉平傷食狀

痰證寸口脉浮發熱憎寒惡風自汗胃膈妨滿氣上衝咽不能喘息頭不疼項不強為異耳○有熱用柴胡半夏湯金沸草散易簡參蘇飲無熱二陳湯溫膽湯○非次頭痛者胃膈滿發寒熱亦是痰證但脉緊

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

而不大瓜蒂吐之此不可謂痰證例無頭疼當以他證參之也○傷食右手關脉緊盛而數頭痛發熱惡寒但身體不疼中脘痞悶噯噎食臭為異耳熱邪伏於脾胃則食不能消經云人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食人迎主外風寒入之氣口主中飲食傷之是以有左右手之別○中脘痞悶嘔而熱者二陳湯加生薑烏梅○寒多不甚熱者治中湯五積散○心腹滿痛者大柴胡下之○胃膈實而嘔吐者食在上脘



瓜蒂散吐之○夾食傷寒證候按病源云下後六七日不大便煩熱腹滿而痛為胃中有乾糞挾宿食故也審如是則夾食傷寒即太陰積證腹滿時痛桂枝湯加大黃者是爾所以太陰受病主胃膈脹嘔吐飧泄朱氏以為飲食得之如曰太陰證飲食不節胃膈不快用理中湯加青皮陳皮或枳實理中圓或二陳湯皆其治也今推明治法有表者與治中湯去白朮多用青皮有表復有裏者與桂枝加大黃湯若表證已解但有裏證者小承氣湯與之可也張氏云傷食者剉大黃三五粒入湯劑中正此意耳雖然夾食傷寒則脾胃已傷暴加轉下不可也妄發其汗亦不可也識者於此又當權衡餘見霍亂條例○夾食傷寒便見吐利厥逆而不挾表證者依陰病及霍亂等治之若吐利厥逆而挾表證者即依先救裏後救表之法

虛煩脚氣類傷寒

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

虛煩身首全無痛 脉自和平多熱壅
轉筋惡食大便難 脚氣酸疼而弱腫
虛煩諸虛煩熱也不惡寒身不痛頭不疼脉不浮不緊數為異耳傷寒亦有虛煩見胃滿煩燥條例○重者竹葉湯輕者小柴胡湯嘔者大橘皮湯並不可汗下○陰證虛煩外熱內寒肢節疼痛陰旦湯○脚氣初病發熱憎寒頭痛嘔噦惡聞食臭肢節酸疼大便艱難或胃滿腹痛卒起而脚轉筋屈弱攣痛腫重痺頑為異耳○脚氣通用三和散降氣湯大流氣飲烏藥順氣散分氣紫蘇飲木瓜散只可二仁圓石南圓枳殼散用木瓜煎湯調下○毒氣入腹衝心作痛吐涎者降氣湯下養正丹或用吳茱萸製炒煎熱入生薑汁主之○寒多者越婢湯小續命湯加生薑汁○熱多者人參羌活散敗毒散並加木瓜或追風毒剉散加大黃○風多者小續命湯加獨活或越婢湯○溫多者除濕湯五苓散○痰多者除濕湯下白圓子挾寒者養正丹



○煩燥者竹瀝湯或紫雪○大便秘者脾約圓神功
圓麻仁圓或五積散加大黃○風毒腫痛排風湯檳
榔散○筋急掣痛南木香煎湯調乳香趁痛散○又
法香蘇散三錢川練子兩箇取皮肉剉新瓦上焙降
真香碎三節和之新汲水煎空心熱服腳氣風癱痛
痒皆作效更加川芎

腳氣證候直與傷寒無異或發熱頭痛或身體冷疼
或寒熱往來或自汗惡風或無汗惡寒或大小便秘

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

澀腹痛下利胃滿氣短怔忡煩悶嘔噦涎沫惡聞食
臭大類傷寒但卒起腿腳屈弱頑痺肢節攣急酸疼
或歷節及踝脛間焮然赤腫為異耳傷寒傳足六經
腳氣亦傳足六經在太陽則頭痛項強腰背酸重在
陽明則口燥鼻乾惡熱譫語在少陽則耳聾口苦胃
脇俱疼在太陰則胃腹滿痞肢體浮腫在少陰則咳
喘恐惕咽痛面鰲在厥陰則癱緩筋攣陰器脹痛六
經所傳又有合病併病外證與傷寒並同凡遇發熱

煩燥大便不通嘔噦痰涎而惡食者須審問之脉浮
而弦者起於風風則汗而愈濡而弱者起於濕濕則
滲而愈洪而數者起於熱熱則下而愈遲而澀者起
於寒寒則濕而愈風寒暑濕證狀不同然風為走注
寒為疼痛暑為熱煩濕為重着必有可驗之迹治法
總要貴乎疎導大便但不可過劑其補湯淋洗則醫
家之大戒也雖然腳氣漸入頓深非藥力相接不可
也治之亦當究其源或因丹砂發動則為之解丹砂

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

或因飲食釀成則為之消飲食氣觸而作者與之調
氣續生他病者則以他病方藥理之所患氣實而死
未有服藥致虛而殂甚者喘嗽上氣衝築心疼嘔吐
無已腹脇脹滿臍下頑痺不仁最為惡候大槩然爾
所謂寒則溫之熱則寒之在表則散在裏則下太虛
氣乏扶養其中是為不刊之法○千金熨法食鹽并
竈中灰等和炒熱重帛盛而熨
傷寒傳經之邪病至厥陰其脉微帶浮緩之狀是則



脾氣將復邪無所容必寒熱作而得汗解若尺寸俱

沉短此為毒氣入臟土敗木賊脾受肝邪必有囊縮

舌卷耳聾不知人之證當急下之五救其一或脉來

弦亦賊邪也○許學士云輕手脉浮為在表表實浮

而兼有力但浮無力表中虛自汗惡風常淅淅重手

脉沉為在裏裏實脉沉來有力重手無力大而虛此

是裏虛理端的氣口緊盛食必傷人迎緊盛寒邪熾

跌陽胃脉定死生太谿腎脉為根蒂○之熱入血室

欽定四庫全書

仁齋直指 卷三 一 仁齋傷寒類書

血熱留滯小柴胡湯加生地黃治血結胃按之痛活

人書海蛤散蓋血聚膈中則小腸必壅小便通則胃

次之血散矣○凡小便或赤或澁皆其裏有熱也

仁齋傷寒類書卷三

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷四

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

發熱

發熱初陽冷必憎 陽明發熱汗之形

少陽脉細仍兼嘔 反熱而沉屬腎經

發熱多屬三陽太陰厥陰皆不發熱惟少陰有反熱

之證然少陰發熱終是脉沉或下利手足冷也三陽

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

發熱何以明之太陽發熱則惡寒陽明發熱則自汗

少陽發熱必有乾嘔之證矣熱邪在表病屬太陽此

表熱而裏不熱也熱邪在裏病屬陽明此裏熱盛而

達於表也若表證未罷邪氣傳裏裏未作實病在表

證裏證之間若傳經之邪至於少陽病在二陽三陰

之間其熱皆輕於純在表純在裏者也然而陽明裏

實熱盛固當攻之以寒太陽風寒外搏陰盛惡寒雖

熱尤當溫散少陽和解雖屬小柴胡微熱不渴者又



當加桂是不可無以權之雖然傷寒發熱病之常也
脉陰陽俱虛熱不止者仆下利發熱者殂汗後復熱
其脉躁疾為陰陽交此皆不治之證其可例視之乎
○太陽發熱惡風有汗桂枝湯惡寒無汗麻黃湯○
吐利發熱惡寒是為霍亂○發熱而渴自汗不惡寒
是為風溫若誤汗之必身灼熱煩渴獨語各有本條
○陽明發熱汗出脉實調胃承氣湯脉浮桂枝湯汗
多者胃汁乾急下之用大承氣湯○少陽發熱脉細
而嘔小柴胡湯○少陰反發熱有二證脉沉發熱者
麻黃細辛附子湯若下利厥逆裏寒外熱脉不出者
通脉四逆湯○身熱而不渴則為表熱小柴胡湯加
桂身熱而燥渴則為裏熱白虎加人參湯○無表裏
證發熱七八日脉雖浮數可大柴胡湯下之若下後
脉數不解消穀易飢不大便則為瘀血屬抵當湯

潮熱

熱潮屬胃下之和

大結胷家本例圖

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

咳逆利瀉并表證 勿攻則用小柴胡
潮熱屬陽明一日一發日晡而作也若非日晡所發
是謂其熱不潮蓋陽明旺於未申故爾惟屬陽明故
潮熱為可下之證苟其脉或弦或浮大便秘或利
小便艱澀外證猶有惡寒則其熱未全入府並不可
下但以小柴胡和解之是必表證已退大便秘結小
便如常乃可攻也

○日晡潮熱屬陽明經脉實可下證用小承氣湯大
柴胡湯脉虛不可下者與桂枝湯○大結胷潮一證
却屬太陽用大陷胷湯○咳逆潮熱○大便秘利潮
熱○表證潮熱並用小柴胡湯○腹滿不大便只用
小承氣湯微利之勿令大泄○日晡潮熱甚者循衣
摸床獨語如怪直視微喘脉弦者可治脉濇者不治
脉不實不虛但用小柴胡湯
○冬陽明潮熱有時脉浮緊者無汗脉但浮必盜汗
並用黃芩湯



寒熱

往來寒熱鬪陰陽

大小柴胡及桂薑

結熱心煩仍喜嘔

渴而頭汗用之良

陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒寒熱往來者陰陽相勝邪正交爭而作也蓋陽不足則陰邪出於表而與之爭故陰勝而為寒陰不足則陽邪入於裏而與之爭故陽勝而為熱若邪氣在半表半裏之間則外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱出入無拘所以乍往乍來而間作也大抵邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪在半表半裏則寒熱相半此又可知其受病之處用藥固自有條然小柴胡湯最主寒熱寒多者加桂熱結者加大黃脉不甚實而大便澀者加枳殼寒熱相半只守本方是亦活法雖然寒熱之方來如波濤之洶湧其勢有不容遏者當遲之一二日候少定而圖之經所謂其盛者可待衰而已是又不可不知

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

○病至十餘日結熱在裏往來寒熱大柴胡湯下之
○心煩喜嘔胃脇滿不欲食寒熱往來小柴胡湯或
血氣弱腠理開邪正交爭痰嘔甚者二陳湯○汗下
後不嘔而渴頭汗出胃脇滿小便不利寒熱往來柴
胡桂薑湯

寒熱似瘧

似瘧膀胱桂可醫

清便不嘔半麻枝

陽明實下浮須汗

血室柴胡小者奇

似瘧一名瘧狀作止有時非若寒熱往來或疎或數而作止無定時也凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋節搜攣百骸鼓撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者此即溫瘧不必謂瘧脉自弦或洪數或緊實或虛緩或刮濇皆為瘧狀但以外證別之用藥固有本條然小柴胡湯如前斟酌加減亦是活法雖然血虛能生寒熱敗血亦作寒熱陰陽相勝雖一證各有一方其間當以川芎為佐

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書



○太陽似瘧證脉洪浮與桂枝湯○清便自可不嘔
日一二發桂枝麻黃各半湯其脉微緩微浮則欲愈
也○陽明似瘧證煩熱汗出日晡發熱脉浮虛與桂
枝湯脉實與承氣湯○病人熱入血室其血必結如
瘧狀者小柴胡湯主之○瘧後寒熱或潮熱見瘧後
昏沉條○諸瘧通用二陳湯熱多者加川芎前胡寒
多者加川芎草果○餘見溫瘧

熱多寒少

欽定四庫全書
仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

熱多寒少治膀胱

不嘔清便各半湯

及脉若遲為血少

脉皆微弱號無陽

熱多寒少陽乘陰也其間三證並屬太陽脉浮緊者
可汗或遲或弱皆和解之清便自可謂大便如常也
○不嘔清便自可桂枝麻黃各半湯○尺脉遲血少
者先以小建中加黃耆以養血俟脉不遲即以小柴
胡桂枝二越婢一輩主之○諸脉皆微弱無陽者用
桂枝二越婢一湯不可正汗

汗後寒熱

汗餘寒熱脉中論

若見憎寒法用溫

沉實當攻浮再表

風溫誤汗熱而煩

汗後寒熱邪氣未解徹也脉浮洪者邪在太陽法當
再汗脉沉實者邪在陽明又須下之若厥陰餘熱加
以下利厥逆惡寒四逆湯溫之無疑矣

○憎寒者屬厥陰大汗出熱不去拘急體疼下利厥
逆四逆湯溫之○脉沉實者屬陽明得汗後如瘧狀

欽定四庫全書
仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

日晡而發大柴胡湯承氣湯下之若只惡寒則為虛
用芍藥甘草附子湯只發熱則為實大承氣湯○脉
浮洪者屬太陽汗後寒熱桂枝二麻黃一湯○風溫
不惡寒若誤發汗必身灼熱煩渴獨語姜蕤湯○溫
家汗後火熱脉躁名陰陽交不治熱病已得汗而脉
躁盛亦不治詳見陰陽交條有再汗再下之劑

下後有熱
勞食
復附

下於汗後致傷榮

陰氣衰兮熱又生



瘥後熱名勞食復 心中痛者豉梔平

○大汗則損氣損氣則陽微脉虛而惡寒大下則傷血傷血則陰弱脉濇而發熱誤汗誤下亦猶是爾且陰以陽為主陽以陰為根血陰也氣陽也血非氣使不能自行令也下之亡陽是陽不主陰矣陰無所主而寒氣搏之所以脉濇寒極血虛所以發熱方方之劑其可輕乎

○汗後陽微而惡寒可四逆湯或用芍藥甘草附子

欽定四庫全書 仁齋直指 卷四 一仁齋傷寒類書

湯○下後陰弱而發熱是為內熱可葶藶苦酒湯○

瘥後勞復發熱小柴胡湯枳殼梔子湯嘔鼠糞湯

鼠糞兩頭尖者若脉浮則汗之用麻黃湯葱白湯脉實則下

之用承氣湯大柴胡湯證治論瘥後餘熱用柴胡桂

枝湯下利腹鳴痞滿者生薑瀉心湯小便不利麥門

冬湯○交接勞復外腎腫腹中絞痛竹皮湯勞役心

力復熱用枳殼梔子湯小柴胡湯餘見陰陽易條○

瘥後食復發熱枳實梔子湯加大黃粥飯傷飽或食

肉或餅脯硬物不消皆復熱也傷食必有痞滿噯氣吞酸腹鳴下利等證可與生薑瀉心湯○下後身熱而心中結痛梔子湯○飲酒復熱有本條

惡風

惡風汗出怯風吹 脉緩而浮但解肌

發汗亡陽成漏者 溫經之法莫遲疑

惡風者見風則怯密室之中無所惡也風傷衛氣衛

虛則腠理不密由是而汗出焉證雖屬表不可發汗

欽定四庫全書 仁齋直指 卷四 一仁齋傷寒類書

但微解肌而已衛者陽也惡風陽證也所以表怯而

惡風蓋亦陽虛故陰邪出而乘之特其病在皮膚邪

氣尚淺耳

○桂枝湯桂枝加葛根湯主之壯熱者與參蘇飲○

發汗太過衛虛亡陽汗漏不止而惡風者法當溫經

用桂枝附子湯或小便難四肢微急難以屈伸並用

桂枝附子湯○身熱惡風項強脇滿手足溫而渴小

柴胡湯○風濕惡風不欲去衣骨節間煩疼掣痛不



得屈伸汗出短氣小便不利或身微腫甘草附子湯
惡寒

惡寒發熱屬於陽

陰病憎寒體自涼

浮數桂枝并越婢

沉而細者理中湯

惡寒者不見風而怯寒身雖灼熱亦不欲去衣被也
此陰邪出而乘陽致之蓋寒傷榮氣榮行脉中居衛
之下是為表邪已深法當發汗間有一二自汗則其
表已虛但與解肌可也然而發熱惡寒者屬陽無熱

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

惡寒者屬陰在陽則發汗在陰則溫裏常須識之大
要惡寒皆為表證或裏證悉具而微惡寒者是表猶
未解當先解表俟不惡寒然後可以攻裏惡寒家不
可近火氣
及過覆衣被則寒熱相搏脉道沉伏愈
令寒不可過但服和表等劑溫而散之○發於陽者
脉浮數桂枝湯桂枝二越婢一湯麻黃湯青龍湯酌
量輕重用○太陽證發熱或未發熱皆惡寒有汗用
桂枝湯無汗用麻黃湯○陽明證固當下之惟惡寒
中寒者係與太陽合病在經屬表可汗用麻黃湯若



迪志文化出版有限公司出版

脉遲汗多微惡寒者表未解也雖陽明病可桂枝湯
○少陽證頭汗出微惡寒小柴胡湯加桂○發熱微
惡寒柴胡桂枝湯○汗後反惡寒者為虛芍藥甘草
附子湯○下後復發其汗心下痞而惡寒者表未解
也當先解表用桂枝湯表解然後攻痞用三黃瀉心
湯入生薑汁○發於阴者脉沉細理中湯四逆湯○
少陰證脉沉細用理中湯四逆湯若下利惡寒而蹇
手足溫者可治用小建中湯若惡寒而蹇時時自煩
不欲厚衣可大柴胡湯下之

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

背惡寒

背上憎寒值少陰

口和附子本條尋

舌乾口躁三陽合

白虎湯中好酌斟

背負陽腹抱陰背寒者陽弱也然背寒有陰臥二證
何以別之少陰一證以其陰寒氣盛不能消耗津液
故口中和三陽合病以其陽氣陷入津液為之乾焦
故舌乾口燥陰寒陽熱識者以口中潤燥推之思過



迪志文化出版有限公司出版

半矣

○口中和而背惡寒者屬少陰附子湯○舌乾口躁
內有熱證口中不仁而背惡寒者為三陽合病白虎
湯經云腹滿身重面垢譫語遺尿口中不仁為三陽
合病白虎加人參湯主之若自汗者亦用白虎加人
參湯○又陽明證背微惡寒無大熱口中燥渴者亦
用白虎加人參湯○中暑亦有背惡寒證但面垢自
汗脉虛而伏自有本條○凡脾胃素虛之人遇暑月
間或飲冷水或多喫茶或餐雪菓之屬易致生冷壞
脾寒氣蓄聚陰上乘陽故寒從背起冷如掌大此當
以溫藥主之

四逆

四逆須將腎證詳

病家手足但微涼

枳柴芍藥傳經劑

邪中陰經四逆湯

手足不溫謂之四逆陰經之邪主之太陰受病手足
自溫傳至少陰則有手足四逆之證四逆之與厥冷

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

實相遠也或曰均是四逆耳而四逆湯散一寒一熱
用藥何不類耶蓋手足自熱而至溫由溫而至四逆
是傳經之邪非虛寒之候也四逆散主之若得病以
來手足不溫便成厥逆此則陰經受邪陽氣之不足
也可以四逆湯溫之脉診要當審此雖然吐利煩燥
惡見四逆四逆下利惡寒而踈並屬少陰又為不治
之診故併及之○少陰四逆其人或欬或悸或小便
不利或腹中痛滿或泄利下重並用四逆散○初病
以來厥冷四逆即用四逆湯○濕溫兩足脛逆冷有
本條

厥

冷厥初來厥有源

沉遲而弱冷常存

熱深發厥初身熱

沉滑時手指爪溫

陽氣伏藏陰氣越出陰陽不相順接所以厥也其手
足逆冷之證乎蓋諸陽會於四末陽微而為陰所勝
初病便厥者是為冷厥其脉沉遲按之則弱醒醒而

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

靜惡寒引衣足多攣卧或身上粟形或下利清穀也熱伏於內先熱而後厥者是為熱厥脉必沉滑按之則數昏塞狂言發渴引飲露手揭衣或燥不得眠或大小便不利也外證皆可驗焉若先厥而後得熱是則陰邪退而陽氣復矣傷寒熱多厥少其病當愈厥多熱少其病則進下利發厥一條亦以厥者復熱為有瘳熱者復厥為已甚蓋下虛則厥陰實使之陽長陰消其可也雖然傷寒血證亦有四肢發厥以至昏迷悶絕者此又不可不知至若少陰下利惡寒而拳手足厥冷與夫臟厥一證皆為不治之診厥之為厥可無辯乎○冷厥初病便作四肢逆冷足攣惡寒引衣自蓋不渴大小便滑泄外證默默而醒四逆湯理中湯通脉四逆湯白通加猪膽湯當歸四逆加茺朮生薑湯可選用○又痰厥氣厥腎厥用易簡芎辛湯○熱厥初病身熱然後發厥其人畏熱揚手擲足煩燥飲水頭汗大便秘小便赤怫鬱昏憤蓋當下失下

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

血氣不通故四肢逆冷所謂熱深則厥深所謂下證悉具而見厥逆者此也與大承氣湯大柴胡湯或白虎湯○熱厥與冷厥相類但指爪時溫為異耳若疑似未明且以四順圓試之陽厥則有熱陰厥則無熱○寒熱而厥者一手或兩手無脉面色昏昧不澤急與五味子湯并麻黃細辛甘草湯人參調血通脉可以為佐服無汗解則生投藥無汗或脉不至者不治○水氣厥者心下怔忡茯苓甘草湯○邪氣結胃中而厥者脉乍緊乍結心煩滿飢不欲食瓜蒂散吐之○臟厥者七八日逆冷下利發躁無時暫安不治○痰飲厥逆眩運少與三生飲

頭痛

頭疼惡冷太陽先 惡熱陽明膽細弦

濕鼻塞兮痰膈滿 厥陰乾嘔吐清涎

頭痛屬三陽陽明少陽皆有之而太陽則專主是也太陽專主頭痛則頭痛之屬表證者居多陽明少陽



欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

又次而輕耳三陰經絡上不至頭故無頭痛惟厥陰循喉嚨之後上連目系頂巔有頭痛乾嘔吐涎吳茱萸湯一證却無身熱亦與陽證不同也雖然太陰少陰其經從足至胷並無頭疼是固然爾然風溫病在少陰濕溫病在太陰而頭反痛至於陰毒亦是又某病則有某證脉絡相通不可拘也若夫頭痛劇甚入連於腦手足俱寒此則真痛神丹在手其能救乎○太陽頭疼發熱惡寒無汗麻黃湯有汗桂枝湯已汗未汗頭痛如破連鬚葱白湯服之痛不止葛根葱白湯○陽明頭疼不惡寒反惡熱胃實氣實攻於頭也少與調胃承氣湯○少陽頭疼發熱脉弦細小柴胡湯○濕頭疼鼻塞頭中寒濕也瓜蒂末納鼻中黃水出則愈○痰涎頭疼胷膈滿發寒熱脉緊不大瓜蒂散吐之可以痰證條參驗○厥陰頭疼乾嘔涎泳吳茱萸湯若脉微浮為欲愈脾氣將復邪無所容不愈用桂枝湯小建中湯若發熱似瘧亦欲愈桂枝麻黃各半湯

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

諸頭疼無熱如聖餅用生薑葱白煎湯下
項強
項強葛根主表強 表虛桂葛去麻黃
結胷須進陷胷劑 桂入括萆瘥反張
傷寒頸項強急太陽表證也當發散而解之若誤下太陽邪氣乘虛入裏則為結胷項強
○太陽病項背強無汗惡風為表實葛根湯項背強發熱汗出惡風為表虛桂枝湯加葛根不加麻黃○誤下太陽結胷項強大陷胷圓○太陽傷風復感寒濕身熱足寒頭搖口噤頸項強背反張其脉沉遲此為發瘥桂枝加括萆根湯○項強脇下滿小柴胡湯
咽痛
咽疼陽毒發成斑 肢冷咽瘡腎證看
脉緊無陽咽亦痛 脉微下利腎傷寒
咽喉不利或痛或瘡穀不入而嘔吐者毒氣上衝所致也陽毒必然發斑少陰四肢必冷其有下利者可



與甘桔湯半夏散入甘草生薑佐之其不利或小
便赤而去衣者可與甘桔湯入玄參枳殼使大便順
導則黑臭之毒泄矣續以甘草生薑煎湯調之甘草
生薑解其毒也腎病咽痛下利身猶熱者未可用四
順湯且與黃連龍骨湯即黃連雞子湯去雞子加龍
湯

○陽毒咽痛發斑唾膿血脉洪數用藥有本條○少
陰咽痛咽瘡脉沉遲厥冷或吐利又陰陽脉俱緊反

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

自汗為無陽法當咽痛而後吐利亦屬少陰並不可
汗下熏熨汗出以藁本粉傅之咽痛用甘桔湯猪膚
湯若沉冷甚者半夏散通脉四逆去芍藥加北梗與
之○咽疼通用甘桔湯上焦壅熱加枳殼北前胡○
腎傷寒一證乃非時暴寒中人伏於少陰之經頭疼
腰痛其脉微弱初咽痛以傷寒次必下利非咽閉之
比咽痛半夏桂甘湯即半夏散是也下利四逆湯或
四順湯下之○證治論口瘡赤爛用蜜浸黃檗一宿



迪志文化出版有限公司出版

取汁含嚥熱甚升麻六物湯咽中閉塞烏扇湯○傷
寒六七日大下之寸脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾
膿血手足厥利不止者難治麻黃升麻湯

身痛

身疼浮緊太陽臨

自利肝并腎帶沉

中濕毒陰與風濕

汗餘霍亂本條尋

○局方大柴胡證云邪結在裏大便秘澀心腹痛鞭
者可服若身體疼痛是表證未解不可與之然則身

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

體疼痛不脉沉不自利太陽之表證明矣其或自利

脉沉此則陰證之身痛臟家之裏病云

身痛大抵多是表證

○太陽身痛脉浮緊無汗麻黃湯以汗之或尺脉遲
者血不足也先用小建中湯以養之俟其尺脉浮即
用麻黃湯太陽病七八日脉細惡寒為陰陽俱虛吐
汗下並不可至再其人素無熱可芍藥甘草附子湯
素有熱可黃耆建中湯○厥陰少陰身痛其脉沉必
自利四逆湯真武湯附子湯○中濕一身盡痛不可



迪志文化出版有限公司出版

汗下但利小便有本條○陰毒身痛如被杖腹中絞痛脉沉而疾有本條○風濕一身痛重但微汗不可大發汗有本條○發汗後身痛脉沉遲桂枝加芍藥人參湯汗後身痛為寒邪在表脉沉遲為在裏用芍藥入榮人參安和真氣或用黃耆建中湯又汗後霍亂身痛不休少與桂枝湯

腹痛脹

腹痛腎分通脉湯

脾兼表證桂加黃

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

實疼便結虛疼利

脹則陳皮梗夏良

陰邪在裏陽邪入裏與正氣搏則為腹痛所以痛者有異焉脉實腹滿而大便秘者實痛也脉虛腸鳴而大便泄者虛痛也陰陽異證用藥不同大抵痛為邪氣實法當疏利陰受病則金液詠養正丹輩溫而利之○少陰腹痛四逆或欬或悸或小便不利或泄利下重四逆散下利清穀脉微欲絕通脉四逆湯腹痛小便不利用真武湯○誤下太陽因而腹滿時痛是

有表復有裏為太陰太陽俱病用桂枝加芍藥湯痛甚桂枝加大黃湯○實痛者關脉實煩燥腹滿大便秘結桂枝加大黃湯小承氣湯胃中熱胃中邪氣腹痛欲嘔吐則用黃連湯○虛痛者寸脉濡尺脉弦腸鳴泄利先與小建中湯不瘥小柴胡去黃芩加芍藥與之易簡用建中湯加遠志腹中冷痛四肢厥逆用萸附湯○腹脹者陰陽不和也桔梗半夏湯最良

奔豚動氣

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

奔豚動氣數般

闕

左右高低細揣量

玄术理中并

闕

不堪汗下例中詳

動氣者臟氣不調築觸而動隨臟所主而形見於臍之左右上下也大抵真氣內虛水結不散氣與之搏即發奔豚以其走痛衝突如豚之奔雖有發表攻裏之證汗之下之並不可也然而不言當臍動氣者何耶蓋胃為中州以主津液妄施汗下必先動脾是以不言而喻也舉此動氣非問證何以知之然則調理



傷寒貴乎纖悉問證

動氣諸藥詳見不可汗不可下條例中

○太陽病下之後氣上衝者桂枝湯若不上衝不可與也若從小腹上衝於心桂枝加桂湯○發汗後臍下悸者欲作奔豚伏苓桂甘大黃湯○動氣通用理中湯去朮加桂蓋桂利小便泄奔豚故也奔豚一名腎氣白朮燥腎閉氣是以去之○吐汗下後心下逆滿氣上衝脅起即頭眩其脈沉緊誤汗之則動經故其身振振搖動伏苓桂甘白朮湯主之此方用白朮者蓋以誤汗動經故用白朮閉其汗也○奔豚動氣脈沉弱肢體冷可與養正丹○動氣証治論用柴胡桂枝湯

腹滿

腹滿脾家及胃家

三陽合病口頑麻

入邪吐汗下之後

腎証便堅承氣加

腹滿多屬太陰蓋脾為中央土所以主腹滿之候腹中常滿者裏實而可下時滿時減者裏虛不可下當

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

以溫藥和之其有吐汗下後因成腹滿者此則邪氣乘虛而入或踈利或溫散或湧吐條例又不同焉審其邪氣之所起知其邪氣之所在斯可矣雖然太陰主腹滿固也陽熱為邪必腹滿而咽乾陰寒為邪必腹滿吐食而自利一熱一寒又不可以無別若夫腹滿而泄難以有瘳

○太陰腹滿吐食不可下枳實理中丸主之誤下太陽因而腹滿時痛為太陰太陽俱病桂枝大黃湯重者桂枝加大黃湯○陽明發熱腹滿微喘口苦咽乾或不大便譫語火迫者亦有此證並小柴胡湯噦而小便難加伏苓又陽明腹大滿不大便小承氣湯微下之陽明脈遲腹滿時喘潮熱亦用小承氣湯發黃證有本條○三陽合病腹滿身重難以轉側譫語口中不仁少與白虎湯○吐後腹脹滿常不減者胃中之邪下傳入胃擁而為實也少與調胃承氣湯○汗後腹脹滿者胃虛而不能敷布諸氣壅滯也厚朴生

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

萸半夏人參甘草湯若滿而痛則小承氣湯微下之
○妄下後腹脹滿心煩而卧起不安者表邪乘虛而入鬱於胃中也梔子厚朴湯○少陰病六七日腹脹滿不大便承氣湯急下之○腹脹通用桔梗半夏湯
○腹皮痛者脾不勝水故水與氣搏於皮肉之間觀其腸鳴漉漉可知矣小半夏茯苓湯加官桂伏苓○腹脹滿而短氣者邪在裏而為實也腹濡滿而短氣者邪在裏而為虛也見氣短條

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

○腹滿用藥皆去白朮朮溫燥而閉氣也

胃脇滿

胃滿多將表証看

半居表裏脇間堅

虛煩客熱須梔豉

瓜蒂拈來吐冷涎

胃滿者胃膈間氣塞滿悶非心下滿也脇滿者脇肋下氣脹填滿非腹中滿也胃滿多帶表証脇滿多在半表半裏之間○太陽病下後脉促胃滿桂枝去芍藥湯病在衛氣芍藥入榮其性利故去之○陽明喘



迪志文化出版有限公司出版

而胃滿此猶帶表証不可下可與麻黃湯○胃脇俱滿或脇下鞭痛此半表半裏之証並用小柴胡湯和解之○胃中虛煩客熱或經汗下後煩熱窒塞氣逆搶心並梔子豉湯吐之若氣乏則與梔子甘草湯若嘔則與梔子生薑湯○胃中痰實宿寒瓜蒂散吐之○又陽明病心下鞭滿不可下下之遂利不止而死法當湧吐詳見結胃解題此則胃中虛而氣痞也或用半夏瀉心湯生薑瀉心湯○孫用和云胃滿則諸瀉心湯審証用○邪氣留於胃中法當湧吐其高者因而越之是爾然有吐汗下後邪氣乘虛入而為煩是則胃中客熱以梔子豉湯吐之此吐劑之輕者也不經發汗吐下邪氣留聚煩滿痰實是則胃中宿寒以瓜蒂散吐之此吐劑之重者也均之為吐又當權衡

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

脇疼

脇疼多屬少陽家

燥糞陽明並小柴



迪志文化出版有限公司出版

裏水痞堅須十棗

陰脇引痛臟中乖

脇肋痛滿者邪氣在半表半裏之間也邪方傳裏未留為實氣鬱不行法當和解若夫裏水痛堅非下之不可也

○少陽病脇痛耳聾寒熱乾嘔或脇下堅滿並用小柴胡湯和解之○陽明病不解轉入少陽脇下堅滿乾嘔小柴胡湯又陽明燥糞不大便脇下堅滿舌上胎滑小柴胡湯○太陽病咳嗽乾嘔微利心下痞鞭

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

引脇下痛身涼汗出或時頭疼此為表解裏有水十棗湯下之○病者脇下痛素有痞積在於臍傍引小腹入陰筋俱作痛此為臟結不治

自汗

自汗傷風暑不消

風溫風濕衛難調

無陽霍亂并柔痊

更與陽明共九條

衛氣所以蜜腠理而固津液也衛為邪所干不能護衛於見而汗出焉寒傷榮氣汗獨無之惟風暑濕之

邪有干於衛皆為自汗之証也若夫寒已入裏寒極生熱熱則榮衛通腠理開又為陽明自汗是其熱越而汗出矣治法各自有條然而汗出以至髮潤或汗出如油或汗出如珠凝而不流此皆不救他病見之亦然

○太陽傷風自汗脉浮緩者桂枝湯汗出而渴或小便難者五苓散不渴者伏苓甘草湯自汗小便數者勿用桂枝惟芍藥甘草湯主之自汗小便不數心煩

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

微惡寒脚攣急桂枝附子湯加人參參以調榮脚必伸也○太陽中暑汗出惡寒身熱而渴香薷散白虎湯或用小柴胡湯○風溫多眠喘息自汗若誤汗之必身灼熱譫語並用萎蕤湯○風濕額上自汗關節痛重恒微解飢通用敗毒散
餘見本條○衛不和者臟無他病時發熱自汗出桂枝湯○亡陽者太陽証發汗多漏不止而惡風用桂枝加附子湯又少陰証尺寸脉緊反有汗出額上手背冷汗為亡陽主咽痛吐利



欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

四肢疼急厥逆惡寒用四逆湯汗多不止溫粉撲之
若汗不止惡風煩燥不得卧先服防風白朮牡蠣湯
次服小建中湯咽痛通用甘桔湯猪膚湯○霍亂吐
利汗出發熱惡寒手足拘急厥冷四逆湯又中暑霍
亂煩渴香薷散○柔痙太陽病身項反張口噤瘈瘲
發熱汗出小續命湯○陽明汗多而渴發熱譫語大
便硬調胃承氣湯若小便自利而汗出者為津液少
不可攻但用蜜導若汗多者胃汗乾急下大承氣湯
陽明汗多而渴勿用五苓散陽明反無汗脉浮而喘
麻黃湯

無汗

無汗因寒中太陽

三陰剛痙証中詳

冬陽明病兼陰易

七例推尋各有方

腠理為風暑溫所干皆令自汗惟寒邪中經腠理密
緻則津液內滲獨無汗焉此特傷寒在表然耳若陰
病若水飲與夫亡陽以虛亦皆無汗隨証各自有條

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

惟熱病脉躁盛而不得汗此陽亢也當汗無汗與麻
黃湯三數劑而汗不出者此亦不可活也知其可進
則進知其不可則已之君請擇斯二者○小柴胡湯
証云陰病不得有汗蓋三陰證本無汗其或有汗者
亡陽也○冬陽明脉浮緊者必發潮熱脉但浮者必
有盜汗黃芩湯主之○盜汗者邪氣方侵於裏尚連
於表睡則衛氣行裏而表陽不緻因其表陽不緻故
津液得泄覺則氣散而週於表腠理閉焉汗復止也
是之謂盜汗此邪在半表半裏之間法當和表○餘
証無汗治法各有本條

頭汗出

頭汗諸陽氣上蒸

身黃尿秘引漿頻

心忪水結譫言血

表裏柴胡小是珍

諸陽之經循於頭三陰則至頸而還也裏虛表實腠
理蜜緻熱不得越故陽氣上騰津液上湊而汗出於
頭抑亦胞虛內涸使然耳夫裏虛則不可下內涸則



欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

不可汗頭汗之証無所謂表邪汗之斷不可也若夫陽明熱入血室燥糞譫語俟其過經利之以小承氣湯是可無以權之哉大抵寒濕相博與夫邪在半表半裏之間則有頭汗設或小便不利內外關格頭汗則為陽脫誤下濕家額上汗出而喘或小便不利大便自利亦為陽脫二者皆不可活臨診又當審斯

○發黃証頭汗及頸而止小便難引水漿此受濕也茵陳湯五苓散主之○水結胃証心下忪滿無大熱頭汗出小半夏加茯苓湯○譫言頭汗是為血熱病屬陽明可承氣湯若心中懊憹而頭汗者梔子豉湯○半在表半在裏及餘証並小柴胡湯寒熱往來微惡寒為表脇下滿大便堅為裏○汗下後胃滿微結寒熱心煩嘔渴為表未解柴胡桂枝乾薑湯或柴胡桂枝湯

手足汗

手足如何汗不休

胃中熱聚液旁流

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

熱家燥糞為譫語 寒証難教水穀留手足汗者熱聚於胃而津液之旁達也亦有寒聚於胃致之挾寒則水穀不分蘊熱則燥糞譫語

○陽明病手足皴皴汗出譫語大便難此熱証也與承氣湯下之

○陽明中寒不能食小便不利手足澀然汗出大便初鞭後溏水穀不分則不可下少與理中湯

不得汗

汗之不得亦須蒸

躁盛還無未必生

身痒浮遲惟各半

陽明虛証若蟲行

傷寒欲得汗與麻黃湯數劑而汗不出者不治熱病脉躁盛而不得汗諸陽之極亦不治二者蓋真病也亦有寒熱而厥忽兩手或一手無脉是猶重陰欲雨之時必澌澌然大汗而解其或投藥無汗而脉不至者亦不可活也是可以容易談哉雖然諸虛少血津液中乾亦不能作汗病人有挾宿恙如痰飲癥癖之



類又隔汗而不能出也少血者養血以汗之痰癖者開關散氣以汗之是為活法若夫汗出如油喘而不休未有能生者也

○服藥不得汗當用蒸法燒地令熱去其火以水洒之用桃栢葉蚕沙糠麸夾和鋪地厚三寸許上鋪席令病人仰卧衣被覆之片時周身至脚心皆汗出乃用溫粉撲即移上床○身痒脉浮遲為氣虛亡陽不能作汗桂枝麻黃各半湯主之○陽明反無汗皮中

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

如蟲行以久虛也木附湯黃耆建中湯○凡發汗須令上下周遍身上衣被如常腰以下厚蓋之若蓋覆不周汗出不匝不流必致肢體攣搐可與牛蒡根散不可汗

不堪汗者脉微遲

溫濕虛煩壞病推

經水忽來兼失血

臍間動氣並如之

病在表而脉浮者可汗表證悉具若發渴若脉不浮是表猶帶裏也未可汗之傷寒不可汗條例最多其

可汗者大抵脉證全在表也表固可汗然汗之太早太過或者津液泄而變生焉至於當下而誤汗則為亡陽為譏語為下厥上竭等證其害人又速耳設或誤汗則真武湯以救解之羸甚者去芍藥有熱者去附子吁此救兵也謹之謹之

以小辛之劑微汗而溫散之

表中風寒裏則不消裏病表熱者雖無陽證可

○脉微弱為亡陽不可汗用桂枝二越婢一湯尺脉遲為血少榮氣不足也不可發汗先與黃耆建中湯

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

以養血俟其脉不遲即以小柴胡湯桂枝二越婢一湯和解之○風溫濕溫各有本條○虛煩似傷寒却不惡寒身不疼脉不緊並不可汗下可竹葉湯或小柴胡湯○壞病者此汗下溫不解知犯何逆以法治之並不可汗下小柴胡加減○經水適下表裏俱虛不可汗小柴胡湯主之衄血下血雖脉浮緊無汗然衄者欲愈下者亦欲愈不愈則用桂枝湯但不可發汗○腹中左右上下動氣築觸並不可汗下證治論



欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

用柴胡桂枝湯動在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉
瞤為逆先服防風白朮牡蠣湯汗止以建中湯與之
動在右發汗則衄而渴心苦煩飲則吐先五苓散次
竹葉湯動在上發汗則氣上衝心棗根湯動在下發
汗則心中大煩骨節煩疼頭痛目運入食即吐先用
大吉皮湯止吐次小建中湯○下利清穀用理中湯
或大便不通者皆不可汗○惡寒脈浮此為表證若
渴則邪欲入裏不可汗○咽乾喉塞亡血淋家衄家
瘡家動氣並不可汗證治論皆用小柴胡湯厥逆不
可汗當歸四逆湯

不可下

不可攻浮及細虛

惡寒嘔吐與之俱

小便自利并清少

有表仍兼失氣無

病在裏而脈實者可下裏証悉具若惡寒若脈不實
是裏猶帶表也未可下之傷寒不可下條例最多其
可下者大抵脈証全在裏也裏固可下然下之太早

欽定四庫全書

仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書

太過或者水穀脫而變生焉至於當汗而誤下則為
痞氣為懊憹為結胸等証其害人又速耳設或誤下
則理中湯丸以救解之或裏煩則少加烏梅或轉損
厥逆則兼與四逆湯輩吁此救兵也謹之謹之○脈
來細小固不可下若細小而牢緊又可下也
○脈浮病在表不可下結胸脈浮大不可下○脈細
虛或遲緩或尺部濇弱此凡皆為血氣衰不可下也
○惡寒者表之虛証雖陽明惡寒則與太陽合病屬
表可汗不可下若少陰証惡寒則溫之○嘔吐者雖
有陽明證謹不可下小柴胡加生薑主之○小便自
利汗出者津液竭糞雖硬屬陽明但用蜜導而出也
猪膽汁亦可導也○脾約証大便堅小便數者枳實
脾約丸○大便堅小便清者熱不在裏雖不大便不
可下可桂枝湯汗之○少陰証小便白為下焦虛寒
用四逆湯○大便堅小便少者津液還入胃必先鞭
後澹不以自出惟小便如常乃可下之○有表証脈



帶浮或惡寒或猶生寒熱並不可下○不轉失氣謂不下泄也不下泄則先鞭後澹不可下大抵陽明躁糞欲下之先與小承氣湯若轉失氣則必先澹後鞭更進一劑不轉失氣則止又陽明譫語潮熱脉疾與小承氣湯不轉失氣則與小柴胡湯若次日又不大便而脉澹則為裏虛黃耆建中湯主之凡陽証而脉澹謹不可下○頭汗出為津液少胞中虛不可下唯陽明譫語血熱頭汗則可下○諸虛少血厥逆喉閉嘔吐亡陽陰實動氣皆不可下虛家附予湯厥逆當歸四逆湯咽痛閉塞烏扇湯嘔吐小半夏加吉皮湯無陽陰實而大便鞭者下之必清穀腹滿但用蜜導○左動氣下之則腹滿拘急氣愈動身雖熱反欲拳先甘草乾薑湯次小建中湯○右動氣下之則津液竭咽鼻乾頭眩心悸竹葉湯○上動氣下之則握掌熱煩汗出欲灌水竹葉湯○下動氣下之則腹滿清穀心痞頭眩甘草瀉心湯

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

仁齋傷寒類書卷四

欽定四庫全書



仁齋直指 卷四 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

子部
仁齋傷寒類書卷五

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱 鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張 炳

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷五

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

懊懷
懷平仄
兩音

懊懷心堅用陷胃 舌間胎白豉梔供

發黃須與茵陳輩 燥糞陽明承氣攻

懊懷者懊惱鬱悶之狀蓋由表証誤下正氣內虛於是客氣乘虛入而動膈煩鬱微疼特未至結胃之甚

欽定四庫全書
仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

也由懊懷而結胃亦不難矣

○短氣煩燥胃中懊懷心下困鞭則為結胃用陷胃

湯○舌上白胎虛煩不得眠心下懊懷或飢不能食

頭汗出此邪熱鬱於胃中也並梔子豉湯吐之○陽

明病下之後懊懷而煩胃中有燥糞此熱結於胃也

承氣湯攻之○陽明無汗小便不利心中懊懷者必

發黃用茵陳湯是則胃中邪熱前後二部俱泄之也

痞



痞滿關沉痛不侵

關浮肝熱用連苓

惡寒勿下先投桂

痞利餘糧及瀉心

當汗誤下或病屬陰而反下之輕則為痞其狀心下滿而不痛按之則濡是其虛邪留滯故但滿而不痛也通用枳殼桔梗最良若欲攻之亦須表証已解則可矣

○痞滿關脉多沉枳實理中丸半夏瀉心湯主之桔梗枳殼湯尤妙○關脉浮而痞此為肝熱用三黃湯

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

瀉其肝若或惡寒汗出三黃湯加附子名附子瀉心湯服湯後痞不去煩渴小便不利五苓散主之○下後復汗心下痞而惡寒者表未解不可攻痞當先與桂枝湯表解乃可攻痞用三黃湯表未解而心下妨悶曰支結用柴胡桂枝湯胃脇滿而微結小柴胡加乾薑牡蠣湯表証在數下之協熱而利心下痞鞭表裏俱病桂枝人參湯○下利心下痞鞭乾噎食臭腹鳴甘草瀉心湯生薑瀉心湯証治論用桂枝人參

湯若利不止則治下焦用赤石脂禹餘糧湯又不止即利小使用五苓散○發熱汗出不解嘔吐下利心中痞鞭用大柴胡湯下之此太陽証○吐汗下後噯氣痞鞭旋覆代赭湯若咳逆氣虛則先用四逆湯胃寒則先用理中丸後用旋覆代赭湯若虛煩心下痞薄氣上衝胃頭眩經脉動身振搖伏苓桂枝白朮甘草湯○十棗湯証須是身涼表解脇疼而痞則可用

結胃

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

結胃痛硬滿其中

大小隨名用陷胃

熱實多煩寒不熱

水兼浮脉豈容攻

凡病發於陽而下之早或當汗而誤下外証項強心下滿硬而痛者結胃也結胃痛硬是為實邪在裏法當下之若脉浮大若表証若水氣戒不可下亦有未經下劑而心下鞭滿者此又有可吐可下不同焉經曰病人手足厥脉乍緊邪結胃中心滿而煩飢不入食當吐之是則病在胃中故也經曰陽明病心下鞭



滿不可下下之遂利不止而死是則邪氣自表傳重留於心下未全為實法當吐之故有此戒也審如是則經所謂高者因而越之是爾吐下界限判然天壤安可以結胃裏實例論之乎要之結胃治法大要審其邪氣所在而已矣或曰結胃証具加煩燥而不治者何此胃氣絕也胃氣既絕安能布藥力以勝邪也哉○凡病在胃膈者上脫澎湃痰壅氣促粥藥不能下咽

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

○結胃寸脉浮關尺皆沉或沉緊俱當下若脉浮大或有表証則先用小柴胡湯表已解即下之○大結胃不按而痛胃連臍腹痛硬不可近大陷胃湯陷胃湯太峻合用者只與陷胃丸○小結胃按之而痛只心下硬用小陷胃湯○熱實結胃懊懣煩渴心下痛少與大陷胃湯○寒實結胃無熱証三物白散枳實理中湯丸○水結胃心下怔忡頭汗出無大熱小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加干礪湯○臟結亦是結

胃一種但舌上胎滑時時下利陰筋引痛有本條○病人血結胃此熱入血室見譌語條下膿血條○結胃先理其氣用桔梗枳殼湯枳實理中湯渴者加括萆根證治論諸藥不愈用增損理中丸凡結胃理氣已平旋腹大便澀者須利導之否則熱邪結為塊血○誤下後未成結胃急與理中湯救解○陰毒陽毒隨氣逆上伏於胃中亦有結胃痛硬之證治法詳見本條

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

氣短

氣短裏實熱來潮 風濕洩難汗自流
停水心間并裏水 太陽誤下結胃痞
氣短者呼吸短促而不能相續是也其間呼多吸少皆不救焉千金曰少氣不足以息者危金匱曰短氣不足以息者實大抵短氣為實亦有表裏虛實之差心腹脹滿而短氣者邪在裏而為實也心腹濡滿而短氣者邪在表而為虛也其或怔忡氣短此則心下



停水致之體認不精其差千里信矣哉○氣短潮熱腹滿而喘此為外欲解而裏實小承氣湯大柴胡湯○風濕相搏汗出短氣小便不利惡風不欲去衣其邪在表甘草附子湯○食少飲多水停心下亦令氣短小半夏湯○身涼乾嘔短氣汗出不惡寒此表解而裏有水十棗湯○誤下太陽短氣煩燥心中懊懣因鞭硬為結胸大陷胸湯丸

更發黃一證

喘

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

喘不繫繫解表家

汗多潮熱裏攻邪

滿胸合病尤須汗

水嗽青龍杏去麻

內經云肺氣實則喘逆上氣所以氣逆者邪氣為實耳傷寒發喘邪氣在表者心腹濡而不堅外證無汗法當汗之邪氣在裏者心腹脹而為滿外證有汗法當下之又有水氣作喘心下怔忡即水為邪是以有小青龍之證若經汗下逐水不獲痊愈喘促上攻壅塞而不得息可以瓜蒂散從權吐之吁喘特病之常

也其或直視譫語而喘汗出髮潤而喘身汗如油而喘皆不可救此邪氣內盛而正氣欲絕也臨機對境盡消息焉○麻黃寧主喘喘家湯劑多用麻黃○太陽證無汗而喘麻黃湯或誤下之利不止脉促有汗而喘葛根黃芩黃連湯下之微喘者桂枝加厚朴杏仁湯發汗後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草石膏湯○陽明證汗出不惡寒氣短腹滿潮熱而喘小承氣湯若脉浮無汗而喘即汗之用麻黃湯○太陽陽明合病喘而胸滿勿下可麻黃湯○水氣嗽喘乃太陽汗後飲水多而水停心下小青龍去麻黃加杏仁主之小腹滿者小青龍去麻黃加茯苓○陰證喘則必促脉伏而厥返陰丹五味子湯○鼻息鳴喘氣逆上衝孫用和用麻黃湯加吉皮杏仁以喘咳嗽感冒鼻涕易簡九寶湯

咳嗽

嗽家嘔喘屬膀胱

寒熱胃堅值少陽

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書



若是少陰頻下利

四肢沉重更清涼

凡肺主氣氣逆而不下則嗽熱邪乘之氣則燥鬱寒邪乘之氣則冷滯水飲乘之又與氣搏熱寒水飲皆生痰壅嗽之所從始乎陰陽治法固自有條其間水咳三證不可無辨小青龍湯太陽之表水也十棗湯太陽之裏水也真武湯陰證之水氣也常須識之雖然古人一藥對一病所主安在哉曰水與表寒相合而咳則小青龍法之水與裏寒相合而咳則真武湯溫之裏癖合水動肺而嗽焉十棗所以下之也

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

○太陽病身熱嗽喘心下怔忡乾嘔微利此水氣在表小青龍湯小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓發熱惡寒身體痛者只依本方若身涼咳嗽乾嘔微利心下痞滿引脇疼痛為裏有水十棗湯○少陽病寒熱往來胃脇鞭滿而痛咳嗽小柴胡湯或微利去人參生薑棗加五味子乾姜○少陰病水氣咳嗽四肢痛重腹痛下利或嘔真武湯加五味子乾姜細辛少



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

呿咳而四逆或腹痛或泄利或悸四逆散加五味子乾姜少呿咳而嘔渴心煩不得眠下利猪苓湯○熱咳金沸草散或唾膿血小柴胡加黃芩或黑豆入生姜煎湯○咳嗽頭痛不惡寒身大熱若臍腹亦有熱而內作痛者須下之用大柴胡湯張氏曰發汗不解腹滿痛者急下之可大承氣湯又曰腹中滿痛此為實大柴胡下之○咳嗽中滿而嘔用大半夏湯解利以後胃寒不食則理中湯加橘皮半夏茯苓細辛五味子痰多二陳湯加細辛五味子治嗽通用大橘皮湯

咳逆

咳逆垂危苦胃寒

橘姜苓夏勝靈丹

不痊乳下應須灸

腹滿之時療已難

咳逆俗謂之噫古人謂之噦蓋胃氣本虛吐下太過或復與之水以發其汗胃虛氣逆噫噦生焉病勢至此極矣雖然咳逆出於胃寒固也其有水挾寒氣擊



迪志文化出版有限公司出版

搏而成者則茯苓半夏逐水主噫官桂丁香下氣禦寒又有熱氣擁鬱氣不得通而成者則小柴胡加生姜自有條例惟是噦而腹滿不得小便或後部不通此為真病雖有神醫末如之何

○橘皮乾姜湯羌活附子散半夏生姜湯退陰散主之以意擇用不瘥即炙乳下其法婦人屈乳頭向下盡處骨間三壯丈夫乳小以一指為率亦三壯男左女右艾員如小豆許大抵乳直下陷中有動脈處是

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

詳見下膿血條○證治論嘔噦手足逆冷小橘皮湯若加胃滿虛煩不安大橘皮湯○陽證咳逆潮熱小柴胡湯加生姜吉皮竹茹湯仍視其大小便何部不調即通利之○噦而腹滿大便不利小承氣湯噦而腹滿小便不利猪苓湯○秋明傷風脈弦浮小便難潮熱而噦小柴胡加茯苓湯○易簡論傷寒咳逆為篤證他病見之亦然以半夏生姜湯主之又方丁香甘草煎湯調蘇合香丸大抵咳逆不止者不可救藥

○水氣乘肺亦主噫逆微咳當以表水裏水法治之見咳嗽條

乾嘔

乾嘔身熱小青龍

涎沫茱萸汗桂供

下利白通并四逆

脇疼十棗裏之攻

乾嘔者嘔而無物出也大抵熱在胃脘與穀氣并熱氣上熏心下痞結則嘔而無所出焉少陰下利姜附主下利也厥陰吐沫茱萸主涎沫也汗出乾嘔桂枝

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

主自汗也邪去則嘔者定矣若夫水氣二證又當以表裏分之發熱欬喘而乾嘔者此則水氣在表與青龍湯不發熱不惡寒脇痛咳利而乾嘔者此則水氣在裏與十棗湯是又不可無別然而表水裏水皆有欬嗽何耶曰水氣乘肺也

○表不解心下水氣身熱乾嘔微喘或利小青龍汗之○乾嘔吐涎沫頭痛一云少陰一云厥陰並吳茱萸湯得湯反劇者則與小柴胡湯○汗出頭痛乾嘔



桂枝湯○少陰下利乾嘔脉微白通湯利不止乾嘔而煩厥逆無脉白通加猪苓關湯裏寒外熱脉微欲絕或乾嘔通脉四逆湯○身涼汗出脇疼乾嘔心下痞硬短氣欬而微利不惡寒無表證此裏有水十棗湯下之○膈上有寒飲乾嘔亦屬少阴用四逆湯○證治論乾嘔而利黃芩半夏生姜湯○胃中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦憤憤然無奈者生姜半夏湯

嘔吐

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

嘔吐陽明氣逆行

數為胃熱緩寒生

太陽合病利不利

腎證三條各有評

表邪傳裏裏氣上逆則為嘔吐水穀不下是也傷寒嘔吐有胃熱有胃寒有水氣有膿血辨是四者而已胃熱者脉數或緊必有口苦舌乾煩渴之證胃寒者脉弦而遲必有逆冷不食大小便自利之證水氣者先渴後嘔膈滿怔忡若胃脘膿血則腥氣燥氣奔逆上衝經所謂嘔家有癰膿不須治膿盡自愈又謂服

桂枝湯吐者其後必吐膿血是矣大抵嘔吐皆有所出已下咽而出者嘔也未下咽而出者吐也吐特甚於嘔耳若槩以嘔無所出則其間所謂乾嘔者獨何耶嘔吐多屬陽明氣逆而上行戒不可下汗後水藥不入口者逆嘔而脉弱小便自利微熱而厥者虛極難調也生薑嘔家聖藥熱燥者烏梅代之

○陽明嘔吐小柴胡湯加生薑主之陽證通用嘔而發熱小柴胡湯嘔而渴猪苓湯先嘔後渴此為欲解急與水解先渴後嘔為心下停水赤伏苓湯汗後或瘥後胃脘餘熱虛煩嘔吐竹葉湯加生薑汁吐汗下後虛煩不得眠而嘔梔子生薑湯○寸脉數煩熱而吐為胃熱五苓散竹茹湯小柴胡湯○汗下後關脉遲緩而吐為胃寒理中湯正氣散加生薑寒多不飲水而吐理中湯去朮加生薑○太陽少陽合病自利而嘔黃芩加半夏生薑湯○太陽陽明合病當自利若不利但嘔葛根加半夏湯胃中有熱胃中有邪氣

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書



腹痛氣逆欲嘔黃連湯○太陽發熱汗出心下煩鬱痞鞭下利嘔吐大柴胡湯○少陰嘔證四逆湯加生薑水氣或欬或悸身痛自利真武湯去附子加生薑膈上寒飲乾嘔吐涎沫四逆湯若更吐利手足逆冷煩躁甚者吳茱萸湯又手足寒心中溫溫欲吐不得吐脉弦遲為胃中實可吐之或用半夏湯入生薑汁並屬少陰○溫毒發斑心悶而嘔身熱足冷有本條○水逆證渴欲飲水水入即吐小腸不利故也五苓

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

散小半夏茯苓湯○金匱云諸嘔吐穀不下小半夏湯似嘔似噦似喘心中澀澀生薑汁半夏湯大小橘皮湯○傷寒屢經吐下寒氣隔塞食入口即吐乾薑黃芩黃連人參湯○汗後水藥不入口者逆半夏茯苓湯○嘔吐膿血見吐血條

吐血

吐血諸陽受熱邪

表之不發咎鑒家

因而熱毒流於臟

地血三黃數劑嘉



迪志文化出版有限公司出版

諸陽受熱其邪在表當汗不汗致使熱毒入臟積瘀於內遂成吐血蓋傷寒失汗則邪熱化為惡血或蘊毒不除亦能蒸腐其血凡眼閉目紅神昏語短心忪痛悶眩冒迷忘漱水燥煩嘔吐喘促驚狂譫語鼻衄唾紅背冷足寒骨熱膚閏四肢厥逆多汗頑痰脅脇小腹滿急大便黑而微利小便多而不禁此等皆瘀血證也男女均有此血脉婦人傷寒尤多見之以其得病於經水來去之期或受病中間經水適至耳血

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

之為病大抵夜重日輕或晝明了而暮譫語血屬陰從其類也前證不必悉具但見其一二分曉便作血證主張犀角地黄湯小柴胡湯桃仁承氣湯三黃湯丸酌量輕重用瘀血結其抵當湯丸主之諸湯皆以川芎為佐取盡大便黑物則佳雖然傷寒咯血猶難救療况吐血乎凡吐血皆非美恙初病猶可用工有陸續而來或經數時而復吐者斷不可救藥也○方藥詳見解題通用蘿蔔汁一小盞入新汲水煎



迪志文化出版有限公司出版

茅花主之血熱者黃連阿膠湯證治論用地血散槩
皮湯三黃瀉心湯○大下後寸脉沉遲尺脉不至咽
喉不利唾膿血者麻黃升麻湯此有兩證一陽毒一
少陰在陽毒則或用陽毒升麻湯在少陰則或用甘
梗湯加半夏生薑汁○服桂枝湯吐者其後必吐膿
血犀角地黄湯○非傷寒證而吐血者與蛤粉散若
虛勞咳嗽吐血口苦咽乾真黃耆湯主之

衄血

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

衄血膀胱病欲瘳

脉微發表病家愁

緊而無汗麻黃進

浮緩紮紮以桂投

經絡熱盛陽氣擁重迫血妄行出於鼻者為衄其熱
在表也是雖表熱邪猶在經然亦不可發汗汗之則
額上陷脉緊急直視而不得卧古人戒之所以無汗
用麻黃有汗用桂枝者非治衄也散其經中邪氣耳
若邪氣不得發散擁迫於血而衄復不止也太陽衄
血固為飲解或有衄血不止但頭面汗出其身無汗

及發汗不至足者又為惡證當明辨之

○太陽證衄血及服桂枝湯後致衄者皆陽氣盛長
病欲解也屬犀角地黄湯○衄而脉微不可發汗與
犀角地黄湯黃芩芍藥湯衄不止茅花湯○無汗而
衄脉尚浮緊可再與麻黃湯○有汗而衄脉尚浮緩
可再與桂枝湯○衄而煩渴欲飲水水入即吐者先
服五苓散次服竹葉湯○陰證本無衄若少陰厥而
無汗強發汗必動血血從耳目口鼻而出是為下厥
上竭不可治治要方用黑錫丹○千金云凡時行衄
血不可斷之如或過多即可斷以龍骨末吹入鼻九
竅出血通用○陽明發熱口燥漱水者必衄見漱水
條謹不可汗

膿血

下膿血室必譫言

濕毒無如腸垢鮮

消穀糞堅臍下蓄

膀胱熱結六條全

凡衝脉為血之海即血室也男女均有此血氣亦均

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書



有此衝脉衝之得熱血必妄行在男子則為下血譫語在婦人則於經水適來適去之時經氣尚虛邪乘虛入或熱退而胃滿譫語或蓄血而寒熱似瘧皆謂之熱入血室私竊怪夫世俗常談凡病皆先調氣而血之一字念不到焉其間一二亦知理血則曰婦人有之不思血氣即陰陽也負陰抱陽中兩間而為人誰獨無此血氣哉否則張朱之書所謂桃仁承氣湯抵當湯丸之類是特為婦人設耳然而血證之脈何

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五
一 仁齋傷寒類書

如曰挾血者脉來乍澀乍數閃灼明滅或沉細而隱伏也若夫血熱交攻則寸關洪盛大抵多於左手見之左手主血固如是爾經云血上逆則忘血下蓄則狂下焦蓄血小便必自利血結之處又當以此推之外證具于吐血汗解

○陽明病下血譫語或胃脇滿如結胃暮夜如見怪狀此為熱入血室頭汗出者刺期門以瀉肝若不刺合用小柴胡湯加生地黄枳殼梔子仁○腹痛身熱

下膿血如魚腦如爛肉汁曰濕毒桃花湯地榆散黃連阿膠丸治要方用胃風湯加木香或除濕湯○熱氣乘虛入於腸胃臍下有熱泄汗赤黃白腸垢黃芩湯白頭翁湯藥皮湯○無表裏證已下後脉數不解消穀易飢多日不大便此有瘀血桃仁承氣湯抵當湯或小柴胡加桃仁大黃又脾約證胃熱消穀有本條○下焦蓄血其人如狂小腹結急小便必自利與抵當丸或小柴胡加桃仁大黃抵當湯大峻合用者

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五
一 仁齋傷寒類書

只與抵當丸○太陽病不解熱結膀胱其人如狂而血自下下者愈不愈用桂枝湯○瘀血炙甘草半錢川芎香附倍之枳殼又倍之新汲水煎入醋下○失血少血或尺脉遲或諸脉不出湯劑中須以人參為佐

期門即三焦之府取穴以病人中指中節為寸令仰卧從臍心正中向上五寸以墨點定從墨點兩邊橫量各二寸半大約直兩乳是期門穴也針入四分此



證治論穴法可與咳逆條乳下穴參用

發黃

發黃尿秘引清漿

便黑尿多血證黃

身熱盡疼為中濕

鼻乾腹滿胃風傷

發黃者濕氣在裏復瘀熱於脾胃蒸濕不散而得之或病屬陽而用溫內熱而被火亦發黃也濕氣勝則如熏黃而晦熱氣勝則如橘黃而明傷寒至於發黃單陽無陰病勢已極不可以尋常目之如所謂寸口

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

無脉鼻出冷氣如所謂形如煙熏搖頭直視如所謂環口鰲黑柔汗發黃不治者亦多矣然而發黃之與瘀血大抵相類又何以辨之曰小便不利者為黃小便自利則瘀血也○千金云酒疸下之終為黑疸土瓜連根搗取汁效

○黃痺證脉浮滑而緊數尿秘頭面汗出及頸而止渴引水漿茵陳湯五苓散夾和茵陳湯或五苓散下酒蒸黃連圓○血證發黃如狂小便多大便黑桃仁



迪志文化出版有限公司出版

承氣湯犀角地黃湯抵當圓○太陽中濕發黃身熱盡痛頭汗目黃蓋寒濕在裏致之可五苓散梔子蘖皮湯若欲解散則用麻黃連翹赤小豆湯餘見中濕條中濕與發黃不利小便非其治也○陽明傷風發黃易飢氣短腹滿鼻咽乾心脇痛小便難潮熱咳嗽咽痛息短頭眩嗜卧脉弦浮大小柴胡加茯苓○初發黃急用瓜蒂末口含水搐一字許入鼻中出黃水次服茵陳五苓散

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

發斑

斑如溫毒黑膏良

熱病重陽別有方

裏實表虛因發出

若還發汗愈增瘡

病證屬陽誤投溫藥或當汗不汗或當下不下或汗下未解陽熱內然蒸滯外迫熱毒入胃皆致發斑蓋熱必傷血血熱不散裏實表虛由是熱氣乘虛出於皮膚輕則如疹子重則如錦紋是爾斑家謹勿發汗汗之重令閔泄瘡爛又加多也凡斑畧見一二須早



迪志文化出版有限公司出版

圖之日子稍延獨陽絕陰不可救藥其發黑斑者熱劇胃爛無及矣然而斑之方萌與蚊迹類焉又不可誤用藥也發斑多見於脅腹蚊迹多在手足之間關前陽脉洪大病人昏潰先紅後赤者斑也陽脉不洪病人自靜先紅後黃者蚊也發斑屬陽陽毒具而陰脉形或大便利或怫鬱氣短而燥糞以不得通盧扁復生莫能施其巧

○溫毒發斑冬月冒寒至春間陽氣盛則發病經吐

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

汗下而表未解毒未消也黑膏主之肌肉斑爛咳而心悶下利嘔吐清汁下部瘡或口瘡黃連橘皮湯葛根橘皮湯○熱病發斑時氣發斑大青四物湯猪膽雞子湯○陽毒曰重陽發斑有本條○咽痛者玄參升麻湯○發斑通用升麻葛根湯敗毒散犀角地黄湯熱多者玄參升麻湯加生姜烏梅又黃連一物湯青木香一物湯可擇用有下證者少與調胃承氣湯孫兆用紫靈一劑證治論用白虎加人參湯○發斑

湯劑須以紫草川芎為佐血熱內結者與小柴胡湯○發斑小點稀疏色常鮮紅者易治或如錦紋隱起餅搭者難治若初發色紅漸次微黯良久黯又轉甚面色肌肉黧晦者斷不可救初發便如黑誌者亦然赤斑五死一生黑斑十死凡內外熱熾汗下不解煩悶咳嘔足冷耳聾便是發斑之證

舌白胎

舌胎大熱療應難 利腹疼兮嘔惡寒

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

燠懷脇堅并中濕 更兼臟結六條看

病家邪氣在表舌上無胎目傳入裏津液結搏則舌生白膜如胎之狀是亦丹田有熱也熱初傳裏其舌胎滑熱氣漸深其舌胎澁熱聚於胃舌為之黃若舌間黑色則病已深而熱已極矣經云熱病口乾舌黑者不治蓋舌屬心心屬火黑者腎家賊熱所勝五臟反尅其能生乎

○尺寸脉緊口中熱氣而乾燥足冷踈卧鼻中涕出



欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

舌上胎滑勿妄治也到七八日以來微熱手足溫為欲解或七八日以上反大熱者難治若腹痛者必欲利與理中湯若惡寒者必欲嘔與小柴胡湯加人參括婁根○太陽誤下胃中空虛客熱動膈懊懣舌胎梔子豉湯或陽明證具其脉浮緊下之而懊懣舌胎用藥同○陽明脇下鞭滿不大便而嘔舌上白胎小柴胡湯○陽明中濕舌上生胎以丹田有熱脅中有寒濕也五苓散主之○臟結亦屬陽明舌上白胎有本條○舌黃者法當下之舌黑者不治

口燥咽乾

口燥陽明背乍寒

人參白虎療咽乾

少陽專以柴胡治

腎證應須急下安

脾胃有熱津液涸少所以口燥舌乾然而口中乾燥汗之將何如曰汗之重無津液其咽乾者尤不可汗也治法固自有條或依條用藥而口中尚更不和則當以瘀血推之蓋焦煩漱水口燥唇乾血證有之矣



迪志文化出版有限公司出版

○陽明口燥咽乾無大熱背微惡寒煩渴白虎加人參湯渴欲飲水者用藥同○少陽口燥咽乾小柴胡湯○少陰口燥咽乾而渴者急下之用承氣湯○血證口燥唇乾見漱水條○狐惑咽乾唇瘡聲啞有本條

煩燥

煩燥來時熱氣升

陰為陽勝太陽經

陽明躁糞連臍痛

腎候陽虛陰燥乘

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

心主火腎主水心熱則煩腎熱則燥此通論也傷寒煩燥則有陰陽虛盛之別焉陰虛而陽勝則為煩陽虛而陰勝則為躁有先煩而漸加躁者有先躁而後復煩者煩其熱之輕燥其熱之甚也或邪在表或邪在裏或陽勝或陰勝或火邪條例不一當詳審而調理之設若結胃證具而煩燥吐利四逆而煩燥下利發熱厥逆而燥不得眠惡寒踈攣脉不出而燥此皆不治之證或者見幾而作聲之可乎



迪志文化出版有限公司出版

○太陽證煩燥寸關脉浮數身熱是也風寒俱盛其脉浮緊無汗而煩燥當汗不汗其人煩燥並用大青龍湯心中悸而煩燥小建中湯熱六七日渴欲飲水五苓散無熱但狂言煩燥五苓散水調服刺吐之自汗心煩小便數不可與桂枝湯只用芍藥甘草湯服桂枝後汗出煩渴甚脉洪大白虎加人參湯○陽明證煩燥以多日不大便有躁糞故遶臍痛而煩燥也以承氣湯隨輕重用○少陰證煩燥尺寸俱沉厥冷

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

自利是也心煩不得卧黃連雞子湯黃連阿膠湯吐利厥逆煩躁欲死吳茱萸湯伏苓四逆湯下利咽痛心中煩滿猪膚湯下利嗽嘔煩渴不得眠猪苓湯惡寒而蹇時時自煩欲去衣被大柴胡湯○太陽病以火熏之而不得汗亦致煩燥或火熨其背令人汗出大熱入胃而煩燥並黑豆煎湯解之○汗後煩不得眠欲水者少與之小便不利與五苓散○下後晝煩夜靜不嘔不渴無表證脉沉微乾薑附子湯若兼懊

懷即與梔子豉湯發汗若下之病仍不解而煩燥伏苓四逆湯吐汗下後虛煩心下痞滿氣上衝胃頭眩經動身為振搖伏苓桂枝白朮甘草湯虛煩附入胃滿條○瘥後胃弱不能勝穀亦致微煩減穀則愈仍與小柴胡湯○陰極發燥或陰毒用火熨灸及投熱藥以致發燥者並不可誤用涼藥燥甚仍與熱劑用四逆湯返陰丹○陰盛隔陽身冷大燥欲飲水不入口不得睡脉細沉緊有本條

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

渴

渴為浮脉太陽臨

汗是陽明利少陰

陽毒熱多并中暑

其人引飲喜盃深

熱氣薰蒸津液耗少所以發渴熱邪深淺條例不同然是渴者大抵裏有熱也或曰六經外證獨少陰曰渴厥陰曰煩何耶少陰屬腎主水熱氣既深腎水易竭安得而不渴厥陰屬肝心之母也病主消渴飲水多而小便少是其裏熱已極子氣乘母於是挾心火



以為煩惟煩則消矣凡渴證用藥並去半夏以其性燥而逐水也若先嘔後渴則為欲解當與之水先渴後嘔則為水停心下屬赤茯苓湯故併述之

○太陽發渴則脉浮表不解心下水氣小青龍湯去半夏加括萎根服桂枝湯汗出後煩渴甚者白虎加人參湯小便不利而渴五苓散身熱惡風手足溫脇滿而渴小柴胡去半夏加人參括萎根太陽病無汗而渴勿用白虎湯可小柴胡若得汗後脉洪大而渴

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一仁齋傷寒類書

可少與白虎湯○風溫灼熱而渴括萎根湯○陽明發渴則有汗脇下鞭不大便而嘔舌上白胎小柴胡去半夏加人參括萎根陽明病汗多而渴勿用五苓散可竹葉湯若汗少小便不利脉浮而渴與五苓散一云猪石湯然本方內有阿膠滑石其性尤利又當審之發黃證頭汗出小便不利渴引水漿茵陳湯茵陳五苓散○少陰發渴則自利咳而嘔引水飲猪苓湯下利而渴欲飲白頭翁湯脉微細欲吐不吐心煩

但寐小便白下利而渴四逆湯○陽毒大熱大渴黑效圓主之○中暑渴者白虎加人參湯若渴不已與酒蒸黃連圓○渴欲飲水水入則吐曰水逆五苓散

漱水不嚥

漱水陽明衄血時

頭疼口燥熱生肌

發狂瘀血無寒熱

犀角桃仁類例推

唇燥口乾血證類有之必欲取水而灌漱也然漱水而不飲水何哉蓋渴者易為飲陽熱入裏胃中液乾

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一仁齋傷寒類書

患不與水耳惟夫上焦瘀血下焦蓄血乘肺發燥渴證獨無是以漱水而不欲下咽也漱水條例惟血證有焉

○陽明身熱頭疼口躁漱水不欲入咽必衄血脉微者犀角地黃湯棠花湯○無表證不寒熱胃腹滿唇躁口乾漱水不嚥小便多此為瘀血必發狂輕者犀角地黃湯桃仁承氣湯甚者抵當圓取盡黑物為度可與水



可水除煩使胃和 常須少與勿令多

若還不與無由汗 強與還因水致病

病非大渴不可與水渴不與水無由作汗則喘而殂也傷寒飲水是為欲愈之候若渴者與之過多或小渴而強與之飲腹中熱少一不能消停飲作害者多矣曰水結曰喘悸曰咳噎曰嘔噦曰腫滿曰下利曰小便不利安有不自水氣得之診視又當識此

○太陽病發汗後大汗出胃中燥不得眠其人欲飲

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

水當少與之胃和則愈○厥陰病渴欲飲水者與水則愈○霍亂發熱頭痛身疼熱多飲水者與五苓散○嘔吐病在膈上後必思水者與猪苓湯○水逆證見嘔吐條○水結證見頭汗出條○飲水多水停心下氣上乘心則為悸水氣結於胃脇則為水結胃胃中虛冷則為嘔噦冷氣相搏為噎上迫於肺則為咳嗽漬入腸中則為下利邪熱所搏畜於下焦則為小便不利小腹滿而裏急溢於皮膚則為腫痛○飲水

過多者五苓散導之

小便自利

小便自利血相干 蜜導陽明腎證寒

脾約譴言脚攣厥 太陽汗下大便難

小便自利非血證則腎虛也惟血證則小腹結而如狂惟腎與膀胱俱虛則不能約制水液是二者小便皆自利也若腎虛而挾熱焉故乍瀝乍旋謂之小便數

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

○傷寒下焦有熱小腹必滿應小便不利今反自利者此血證也法當下之又有病在太陽遍身發黃其脉沉結小腹雖堅而小便不利此則非血若或小便自利其人如狂血證諦矣下之抵當湯圓○陽明自汗應小便少而反自利者津液竭也糞雖硬但以蜜導猪膽汁亦可以導○少陰四逆小便自利為虛寒用四逆湯或真武湯去伏苓若小便白亦是下焦寒與四逆湯○小便數大便鞭此為脾約脾約圓麻仁



圓主之張氏云跌陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數是為脾約跌陽胃脉也此證消穀引飲蓋胃壯而熱矣○傷寒脉浮自汗小便數若胃不和而譫語少與調胃承氣湯○太陽自汗四肢拘急心煩微惡寒脚攣急小便數誤服桂枝得之便厥可與甘草乾薑湯芍藥甘草湯○太陽吐汗下後小便數大便因鞭小承氣和之○小便尿血證治論用延胡索散

遺溺

欽定四庫全書
仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

遺溺風溫戒利腸

腹澎身重合三陽

下焦不攝兼停血

腎絕狂言五證詳

水液之餘者入胞而為小便胞中虛寒不能約制水液加以邪氣乘之故旋溺自遺而不禁也

○風溫脉浮自汗體重多眠鼻鼾喘息恬不欲言誤下則小便不利直視失溲○三陽合病腹滿身重口中不仁面垢譫語遺尿並不可汗下少與白虎湯○膀胱瀦水下焦不攝則亦遺溺經云邪中下焦陰氣

為慄足膝逆冷便溺妄出合用四逆湯○下焦蓄血小腹結急小便自利不禁輕者桃仁承氣湯重則抵當湯圓○狂言直視遺尿腎絕不治

小便難

小便汗竭胃乾空

多汗陽明並戒通

引飲濕黃須要利

澁難虛熱客胞中

汗自外泄津液中乾此小便所以不通也或陰虛而陽湊之小腸伏熱亦令旋溺赤黃數且難矣素問曰

欽定四庫全書
仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

陽入陰分則膀胱熱而小便難其謂是乎多汗者以利小便為戒伏熱者以涼劑行之若夫中濕發黃不利小便非其治也

○發汗多亡津液胃中乾小便不利及陽明汗多小便不利者並不得利之小便自利則愈○引飲過多下焦有熱小便不利脉浮者五苓散脉沉者猪苓湯○中濕發黃家並與利小便○小便難者陰虛而陽湊之故小便黃為下焦熱以瞿麥滑石輩利之木通



散亦可太陽汗後漏不止而惡風四肢急小便難桂枝加附子湯陽明中風脉浮弦大身黃鳥乾氣短腹滿潮熱時噦心脇痛嗜卧小便難小柴胡加茯苓○表有水氣身熱而咳表不解心下停水小腹滿小便不利小青龍湯去麻黃加茯苓汗下後發熱頭項強痛無汗心下滿微泄小便不利桂枝湯去桂加茯苓白朮嘔而發熱胃脇滿心下怔忡小便不利小柴胡去黃芩加茯苓少陰虧小便不利四逆散加茯苓

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

○瘥後腰下有水氣牡礪澤瀉散主之

大便下利

利惟膽胃負時殂

不渴脾寒渴腎虛

腸垢鴨澹并濕毒

譌言備載古人書

下利須別陰陽三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身涼無熱此大槩也自利不渴小便色白脉微清穀厥冷惡寒凡此皆寒渴欲飲水尿色如常泄下赤黃發熱後重凡此皆熱要之風邪入胃木



來勝土故大腸暴下其裏虛協熱者下利尤多或解散或和解或攻泄或溫中或固下焦或利小便隨證有條但不容發汗蓋邪氣內攻若外復泄其津液則胃氣轉虛必脹滿矣然則下利之脉何如曰身涼脉小者順身熱脉大者逆大則為虛微弱則自止滑而數者是又有宿食也若夫下利譌語而目直視下利厥燥而不得眠下利發熱汗不止或厥不止下利厥冷無脉灸之身不溫而脉不回下利日十餘行其脉

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

反實皆邪擁正氣而下脫五奪之最急者也雖有工巧將焉用哉

○太陽陽明合病下利頭疼目疼鼻乾脉浮長葛根湯○太陽少陽合病下利頭疼胃滿乾嘔脉浮弦黃芩湯嘔者加半夏生薑○少陽陽明合病下利身熱胃脇滿乾嘔往來寒熱脉長大而弦為負負者死但長大而不弦為順又脉滑而數則有宿食小承氣湯下之遲而滑者亦少下之○太陰自和不渴四逆湯



理中湯朮附湯○少陰自利必渴腎虛引水自救脉微者白通湯厥逆無脉白通猪膽汁湯通脉四逆湯若渴而嘔嗽心煩不得眠猪苓湯自利清水色青心下必痛口中乾燥此不可溫須下之用大承氣湯三陰下利法當用溫若自利清水心下痛口乾燥須下之下利發渴屬少陰固也然三陽亦有飲水者乃有熱也○協熱利者曰腸垢臍下必熱便中垢膩赤黃或飲水乃熱也黃芩湯白頭翁湯薛翁湯此證惟黃芩最妙凡協熱下利通用之○胃寒利者曰鴨溏臍下必寒腹脹滿便中黃白青黑或清穀四逆湯理中湯白通加附子湯寒毒下利面戴陽者下虛也○濕毒利者腹必滿下膿血如魚腦如爛肉汁桃花湯地榆散黃連阿膠湯或用除濕湯冒風湯加木香○下利譌語有燥尿也脉不微細可下之用小承氣湯○三部脉平心下硬而下利者腸胃有積結也急下之○下利心下痞者詳見痞條○陰毒陽毒亦有下利

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書



有本條○下利身痛腹滿清穀急救裏用四逆湯服藥後清穀止但身痛者急解表用桂枝湯○固下焦利小便方論見痞條風邪入胃下利熱則敗毒散冷則不換金正氣散或加乾姜木香○假如他病腸風失血崩中漏血之人繼而下利大腸裏急痛不可忍雖與巴粉取積已行疎導其痛獨存者此非積也榮血虧少陽剛勝陰故爾役藥當以川芎為佐榮氣一調其痛立止設或小便不通五苓散不能作效當以分心氣飲加川芎麥門冬與之自然快利或蘊熱血痢腹中痛甚踈通滌熱痛未得平亦當為之調血

霍亂

霍亂渴來用五苓 寒多不水理中尋
憎寒厥熱姜甘附 中暑焦煩腹痛侵

張氏但稱吐利者非霍亂也霍亂邪在中焦以飲食無節居處不常得之夾食傷寒陰陽乖隔上吐下利而燥擾痛悶是其候爾偏陽則多熱偏陰則多寒卒

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書



然而來危甚風燭許仁則謂濕霍亂死者少乾霍亂死者多蓋以所傷之物或因吐利而出泄泄盡則止其死少也未上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣關隔陰陽煩燥喘脹其死多也夫飲食起居當以此為戒○霍亂吐利熱多而渴五苓散○寒多而不飲水理中湯圓或有寒腹滿而痛四肢拘急轉筋下利者剉理中湯加生附子官桂○吐利汗出發熱憎寒手足厥冷拘急其脉沉細四逆湯○中暑霍亂煩燥大渴心腹撮痛四肢冷冷汗出脚轉筋香需散千金云轉筋者用理中湯加煨石膏○汗後霍亂雖吐利已止而身痛不休少與桂枝湯吐利已止汗出四肢厥而拘急脉微欲絕通脉四逆加猪膽湯○霍亂通用霍香正氣散腹痛加桂痛甚去霍香加茱萸小便不利加伏苓瀉而不吐除濕湯加桂吐而不瀉除濕湯去蒼朮加桂丁香○乾霍亂心腹作痛欲吐不吐欲下不下先以鹽湯一盞頓服候吐出令透即以

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書



迪志文化出版有限公司出版

剉理中湯倍加橘紅與之凡氣痞于中不吐不瀉害人甚急可蘇合香圓用枳殼散下或用霍香正氣散加官桂茯苓倍加枳殼大抵風雨寒濕邪自外入霍香正氣散除濕湯為要飲食居處邪由內發治中湯主之其或吐瀉不止面青厥冷者震靈丹研開木香乾姜煎湯調下○大柴胡湯一證云發熱汗出不解嘔吐下利而心中痞者大柴胡主之此則非霍亂也

失音

欽定四庫全書

仁齋直指 卷五 一 仁齋傷寒類書

失音發瘕反張弓

狐惑唇瘡啞似聾

風濕血迷并舌卷

更兼中暑語難通

言心聲也而聲音道路出於喉嗌肺亦主之若風若痰若血若熱與夫邪毒之氣伏於心竅或滯於喉間皆令人失音或語短而聲蹇澁也活人書惟有發瘕狐惑條例風濕而下諸家之正說附焉○瘕證口噤頭搖掣癱不語項強背直腰身反張有本條○狐惑即濕蠱也蟲食下部為狐下唇有瘡其咽乾蟲食其



迪志文化出版有限公司出版

臟為惑上唇有瘡其聲啞有本條○風濕內有一證
緩弱昏迷腹滿身重自汗失音下利不禁白通湯加
白朮甘草○血證心忪語短眩冒迷忘詳見吐血下
膿血條○厥陰舌卷囊縮毒氣入臟或有不語此用
小承氣湯○伏暑發熱汗渴暑入心胞絡亦或不語
此用小柴胡湯熱渴甚者用竹葉湯○風纏喉啞不
語細辛皂角末入鼻通關次用南星略炮加生薑紫
蘇熟煎與之

欽定四庫全書

仁齋直指
卷五
一仁齋傷寒類書

失音亦須調導大小便

仁齋傷寒類書卷五



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

子部
仁齋傷寒類書卷六

詳校官太醫院院使臣張鑒基
編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈴
校對官主簿臣汪日贊
臚錄監生臣張炳



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷六

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

怫鬱

怫鬱陽蒸聚體膚

便堅為實噦為虛

二陽併病顏容赤

火迫身黃惕惕如

怫鬱者陽氣蒸越形見於頭面體膚之間聚赤而散也其證則有異焉大便鞭而氣短者實也汗下後

而得噦者虛也若虛若實當詳審之

○小便不利時有微熱大便乍難怫鬱而不得卧此燥糞裏實也承氣湯主之○吐下後極虛而汗之其人怫鬱復與之水以發其汗因而得噦此胃中寒也桂枝人參湯加茯苓○太陽初得病發汗不撤併歸陽明續自微汗面色赤者陽氣怫鬱也解飢湯主之或汗又不撤其脉緊濇與麻黃湯○陽脉浮陰脉濡弱妄以火熏熨欲令汗出客熱得火內則驚惕外則

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

怫鬱蒸肌身目發黃小柴胡湯加黑豆與之

胃眩

胃因虛極有寒傷

頭痛胃堅屬二陽

吐汗下餘苓桂朮

脉沉自利理中湯

冒者蒙冒之謂眩者眩運之謂上虛則眩諸虛極而乘寒則冒二者皆相似眩其輕而冒其重也婦人新產血虛挾寒必冒冒家自汗則愈若少陰病下利止而頭眩時時自冒者此虛極而脫也其與諸逆發汗劇者言亂目眩設遇歧扁其能起之乎

○太陽少陽併病頭項強痛或眩胃中痞鞭刺太饑戒不得發汗少陽本證亦有目眩見本條○陽明傷風頭眩見發黃條○吐汗下後虛煩脉微或沉緊心下痞脇下痛氣衝咽喉眩胃身搖筋脉動惕久而成萎伏苓桂枝白朮甘草湯○脉沉遲面微赤身微熱下利清穀者必鬱冒汗出證屬少陰理中湯甘草乾薑湯四逆湯隨輕重用○太陽病若下之不愈因

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書



復發汗以此表裏俱虛其人必胃冒家汗自出而愈
○又痰飲眩胃厥逆少與易簡三生飲感濕頭重眩
暈芎朮除眩湯○金匱曰產婦亡血復汗寒多故胃
又曰產婦厥胃其脉微弱不能食大便堅蓋血虛則
厥厥而必胃皆是虛寒

心動悸

心悸三陽證自詳

糞堅譫語胃調湯

胃旋甘桂朮真武

小建中兼炙草方

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

動悸多生於停水或陽氣尚弱心下虛空正氣內動
致之或汗下以後正氣內虛邪氣與之擊搏而然也
此蓋心悸而氣動其與驚惕不同焉

○太陽病小便利者以飲水多故心下悸小便少者
必膀胱裏急也並用五苓散小半夏茯苓湯主之○
陽明病壯熱往來心下悸小便不利心煩喜嘔小柴
胡湯傷風往來寒熱或心下悸小柴胡湯○少陽病
脉弦細頭痛發熱誤汗之必譫語轉屬胃胃和則愈



胃不和則煩悸而大便鞭屬調胃承氣湯然調胃承
氣湯太峻證治論只用小柴胡湯糞鞭者可加大黃
煩燥者可入芒消些少凡調胃承氣證以此法代之
尤為穩當○太陽發汗過多其人叉手自旋冒心下
悸欲得按者桂枝甘草湯○太陽病發汗不解仍發
熱心下悸頭眩肌體瞤動振振欲擗地者真武湯主
之或理中湯加茯苓○傷寒二三日心中悸而煩與
小建中湯經云先煩而後悸者為熱先悸而後煩者
為虛惟虛則小建中主之○少陽病耳聾目赤曾滿
而煩妄加吐下則悸而驚可與小建中湯如有熱證
即以小柴胡繼之○傷寒脉結代心動悸炙甘草湯
○少陰四逆證其人或悸以四逆散加桂主之○心
下水氣厥而悸當先治水茯苓甘草湯然後治厥有
本條不然水入胃必下利也○傷寒多因吐下或火
熏或溫針以致驚惕○太陽病若下之曾滿煩驚小
便不利譫語身重難以轉側用柴胡牡蠣龍骨湯不

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書



可發汗○風溫妄用火薰以致發狂劇則如驚癇時時瘳癡此為逆也金匱風引湯

發狂

發狂面赤屬重陽

葶藶升麻及大黃

血證身黃仍漱水

尿多承氣地黃湯

陰邪併於陰則顛陽邪併於陽則狂傷寒熱毒在胃併入於心遂使神志昏亂言動急速而發狂也狂之發作少卧不飢妄語妄笑妄倨妄辯妄起妄行棄衣

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

而走登高而歌甚則踰垣上屋皆獨陽亢熱使之非吐下不能止亦有當汗不汗瘵熱在裏下焦蓄血而如狂者小便必利特如狂而未至於狂耳其或重熨迫汗灼艾燒針令人煩燥卧起不安則謂之火邪驚狂凡是數者各有條例若夫狂言直視旋溺自遺其與汗後熱多脉躁狂言不食智者寒心焉

○重陽即陽毒脉實數狂走錯語煩燥乾嘔面赤咽痛潮熱發斑亭廔苦酒湯陽毒升麻湯梔子仁湯三

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

黃湯大黃散升麻葛根湯加大黃狂走者水調瓜蒂末吐痰瓜蒂散亦可吐○血證如狂脉微而沉身黃唇燥漱水不欲下咽無寒熱小腹鞭滿小便利大便微利而黑輕者犀角地黃湯重者桃仁承氣湯或抵當圓取盡黑物為効張云太陽病不解熱結膀胱其人如狂而血自下下者愈若外不解可與桂枝湯外已解但小腹結急乃以桃仁承氣湯攻之大抵傷寒當汗不汗熱蓄在裏熱化為血故喜忘如狂○陽狂寒水石黃連末各一錢冷水調下皆效發斑妄語未可下者龍膽草一物湯

○火邪驚狂者醫家以火熏熨迫汗及燒針灼艾而然也其人亡陽煩燥卧起不安金匱風引湯柴胡加龍骨牡蠣湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯柴胡加龍骨牡蠣湯

又火劫腹滿微喘口乾咽爛或不大便譫語用小柴胡湯黑豆解火邪湯



直視

直視無神不轉睛

衄兼少血汗猶輕

遺尿喘泄搖頭證

脉瀋循衣並卒傾

水之精為志火之精為神五臟六腑之精皆上注於目病人邪氣極盛胃其正氣遂使神志不慧目不轉睛而為之直視傷寒至於直視證候最逆不救者多亦有反目倒竄眼睛上騰此則腎絕雖昌陽引年亦不及新矣

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

○衄血不可汗汗之則額上陷脉緊急直視不能眴不得眠○少血者肝氣虛目力弱若又發汗亡陽則陰陽俱虛必至直視二者雖逆猶未甚也○狂言遺尿反目直視腎絕不治○直視譫語喘滿者不治下利者亦不治○搖頭直視形如煙熏心絕不治○循衣摸床惕惕不安微喘直視日晡潮熱下之後脉弦者生脉瀋者不治弦為陽瀋為陰是陽病見陰脉邪盛而正脫也○無表裏證目中不了了睛不和大便



迪志文化出版有限公司出版

譫語

難身微熱此非直視蓋內實也小承氣湯大柴胡湯

譫言脉數鄭聲虛

胃實身和熱有無

下利濕溫并血證

三陽合病各殊途

實則譫語虛則鄭聲經曰邪氣盛則實精氣奪則虛傷寒胃中熱盛上乘於心心為熱胃則神識昏迷呢喃譫妄此邪氣盛而語言差也若汗後若病久本音失而正氣虧則鄭重語散不知高下此精氣奪而聲

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

不正也譫語為熱獨語亦熱若狂語則其熱加多至於言亂惡罵又劇甚而難制矣大抵大熱入胃水涸糞燥必發譫語當下誤汗當汗過多亦發譫語譫語屬陽見陰證者逆譫語喘滿氣逆而上奔也譫語下利氣脫而下奪也真氣離絕謂之何哉
○譫語為實脉洪數大便秘小便赤手足溫少與調胃承氣湯陽實譫語脉短促者不治若逆冷而脉沉細者即死○鄭聲為虛脉微細大小便自利手足冷



迪志文化出版有限公司出版

用白通湯○胃實譫語身熱汗多胃中燥大便硬或潮熱少與調胃承氣湯大小承氣湯酌量用○身和譫語以發汗多亡陽津液不和致之不可下只與柴胡桂枝湯○下利譫語為有燥屎脉不微細即須下之用小承氣湯譫語而利不止則不治又汗出譫語者風也須俟其過經乃下之○濕溫苦妄言證有本條○瘀血譫語狂言漱水大便黑小便多遍身黃小腹痛緣當汗不汗蓄熱在裏熱化為血故爾輕者犀角地黄湯重者桃仁承氣湯抵當圓○熱入血室譫語晝靜夜譫如見鬼狀速與小柴胡湯稍遲則熱入胃津液燥中焦上焦不榮必為血結胃當針期門或脉遲身涼無熱胃滿如結胃狀亦刺期門若血熱犯於胃氣小腹急滿小便自利喜忘如狂晝夜譫語抵當圓主之○三陽合病譫語脉滑實身重難以轉側口中不仁而垢遺尿不可汗下少與白虎湯○發少陽汗則譫語經云汗之則譫語甚謂有少陽也下之

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書



則額上汗手足逆冷謂下之早也○太陽病八九日下之胃滿煩驚小便利不利譫語身重不可轉側柴胡龍骨牡蠣湯○發汗多亡陽譫語不可下柴胡桂枝湯主之○火劫譫語口乾煩燥喘滿小柴胡加黑豆
搖頭
搖頭直視似煙熏 真病心家已絕根
瘞證反張并口噤 頭中痛者戰而言
頭者諸陽之會陽脉有乖則頭為之搖動然有心絕而搖頭者有風盛而搖頭者有裏痛而搖頭者形證皆不類焉蓋陰根於陽陽根於陰陰陽互根氣血所以周流而無間若心絕則神去而陰竭陽獨無根不能自主是以頭搖經法謂陽反獨留形體如煙熏直視搖頭者此也至於太陽發瘞則風盛於上風主乎動是以頭搖經所謂獨搖頭卒口噤項背反張者此也言而搖頭者頭中有痛言則痛甚痛則必搖經所謂搖頭言者裏痛也又謂言者為虛不言者為實是

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書



也合是言之均是搖頭耳析而分之曰實邪曰虛邪曰真病又當明其臧否云○搖頭直視形如煙熏心家絕也真病不治○太陽發瘧搖頭噤口領背反張身熱足冷有本條○搖頭言者其裏有痛言者虛也可與如聖餅易簡芎辛湯

戰慄

戰動於身慄動心

正邪勝負兩般尋

振振汗出將痊愈

鼓領虛寒病已深

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一仁齋傷寒類書

戰慄皆陰陽之爭戰者身為之搖也慄者心戰而惕也邪氣外與正氣爭則為戰邪氣內與正氣爭則為慄戰者正氣勝慄者邪氣勝戰則欲愈慄其已甚乎○振振汗解者蓋邪氣欲出其人不虛故邪與正爭發為振戰正氣勝則得汗而解矣○傷寒六七日欲愈必振振汗出而解其有身不戰而但鼓領心慄者遂成寒逆此陰氣內盛正氣內虛不能勝邪反為邪所勝當以四逆湯薑附湯併禦文禦之理至明矣經

云陰中於邪心內慄也又云邪中下焦陰氣為慄足脛逆冷便溺妄出此合用四逆湯薑附湯仍與養正丹

瘕瘕

瘕為引縮瘕為伸

熱極風生併在經

滌熱祛風猶可望

火熏發表定歸冥

瘕則急而縮瘕則緩而伸病軀瘕瘕熱氣極矣熱極生風風主乎動故筋脉相引而伸縮不寧傷寒至於

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一仁齋傷寒類書

瘕瘕疾勢過甚診視調理難乎否乎內經曰太陽終者戴眼反折瘕瘕汗出不流瘕瘕之為絕證也如此○瘕瘕最難療理能用滌熱祛風之劑以折其熱間有可活之者滌熱如柴胡山梔輩祛風如防風羌活輩是也○風溫妄以火熏必然發黃劇則狀如驚癇時瘕瘕經云一逆尚引日再逆促命期設或為醫所誤只得與金匱風引湯火邪用黑豆解

筋惕身瞤



筋惕身瞤發汗多

酌量真武更無過

左邊動氣如輕汗

此證難醫奈命何

發汗過多津液涸少陽氣偏虛筋肉失其所養故惕惕瞤瞤而跳動也張氏特設真武湯以救之然本方不特溫經助陽而已其間朮苓薑附皆於胃氣有關焉素問云脾中風則肌肉瞤蓋脾主肌肉胃為津液之海是雖過汗法當溫經助陽又不可不以胃氣為本也雖然已經吐下而復汗汗下而復燒針得之尤

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

甚逆也經曰傷寒吐下後發汗脉微心脇痞痛虛煩眩胃氣上衝咽筋脉動惕者久而成痿又曰太陽汗後復下表裏俱虛更加燒針因胃煩面黃膚瞤者難治以至汗出如油口噤肉戰伸吟喘促者不治然則吐汗下可輕乎

○陽氣之柔者養筋發汗過多病軀無陽筋必戰動或虛人微取汗或傷風自汗妄用大青龍湯便有厥逆筋惕肉瞤之證俱屬真武湯羸甚者去芍藥有熱

證者去附子尤當酌量用之○應發汗證而腹中左

右上下有動氣者並不可汗若汗之即筋惕身瞤其

左邊動氣者尤不可汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤其候最逆且先服防風白朮牡蠣散次服小建中湯十救一二○太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤欲擗地真武湯○吐下後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩脉沉緊身振搖者伏苓桂枝白朮甘草湯以而成痿者通用若心下滿痞兼與枳梗湯加茯苓甘

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

草

不仁

不仁口腹及膚皮

痛癢寒溫總不知

正氣重為邪氣伏

榮虛衛弱厥如尸

經曰諸邪乘寒則為厥爵胃不仁蓋其血氣虧少不能周流於一身於是正氣為邪氣所伏故肢體頑痺不知痛癢寒溫厥如尸而鬱且胃也苟其不仁脉或浮洪發喘無已水漿不下汗出如油是氣絕於命門束



手待盡而已

○甘草乾姜湯桂枝芍藥湯加乾姜或桂枝麻黃各半湯以意度用○少陰脉不至腎氣微精血少寒氣上奔血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令其身不仁是為尸厥

不得眠

不眠腎證利而順

大汗膀胱胃裏乾

吐汗下餘煩懊懣

熱多熱少數般看

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

按素問云胃不和則卧不安所以不和者津液乾焦

熱邪煩燥陽獨盛而陰偏虛故爾蓋夜以陰為主陰氣盛則目閉而卧安惟夫陰為陽所勝故終夜煩擾而不得寧所謂陰虛則夜爭者此也若陽虛而陰勝焉又有夜靜晝煩之證耳

○少陰下利而渴不得眠猪苓湯此停水也若二三日以上心煩不得眠黃連阿膠湯主之○太陽發汗多或大汗出胃中乾躁煩不得眠欲飲水者少與之

胃和即愈若脉浮小便不利而渴五苓散○吐汗下後心中懊懣虛煩顛倒不得眠梔子豉湯或酸棗湯○大熱乾嘔呻吟錯語不得眠黃連解毒湯凡陽毒熱病皆不得眠○下後發汗無大熱脉沉微不嘔渴無表證夜靜晝煩而不得眠乾姜附子湯○陽勝陰則狂眠亂夢用梔子豉湯陰勝陽則驚悸昏沉用酸棗湯○產後不得眠者熱氣與諸陽相并陰氣未復故也梔子烏梅湯或易簡溫膽湯加竹茹此可通用

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

多眠

多眠神思苦沉昏

自汗風溫默默然

狐惑唇瘡沉細腎

太陽浮細亦癡眠

陰邪勝陽人多昏默昏昏閉目者陰司闔也默默不言者陰主靜也多眠四證二者病在經若太陽惡寒其脉浮細是陽氣未盡復也若狐惑淹沉素得之下利則其亡陽可知矣此所以為陰勝歟

○風溫證尺寸俱浮自汗喘息體重不收嘿嘿欲眠



欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

不可發汗可萎蕤湯病在少陰厥陰二經○狐惑證四肢沉重咽乾聲啞上下唇瘡害人甚急有本條○少陰證尺寸俱沉細但欲寐急與四逆湯復其陽氣又少陰欲吐不吐煩而多寐五六日自利而渴張氏無治法若小便白者可用四逆湯張氏又云少陰病脉微細沉多寐汗出不煩欲吐若變證五六日自利煩燥反不得寐者死少陰證變難辨難治貴在審詳○太陽證頭項痛惡寒嗜卧脉浮細或胃脇滿者小

柴胡湯脉但浮麻黃湯○胃傷風發黃嗜引有本條

瘥後昏沉

瘥後昏沉似怪妖

或時寒熱或時潮

語言錯謬精神少

毒在心胞汗未消

傷寒瘥後半月以來終不惺惺錯語少神或無寒熱或寒熱似瘧或潮熱煩赤醫以風魅治之非也是由發汗不盡餘毒在心胞絡間致之

○瘥後昏沉不惺知母麻黃湯再取微汗○瘥後勞

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

復食復見下後有熱條○瘥後胃脘餘熱虛煩而嘔竹葉湯加生薑○瘥後喜唾不已膈上有寒理中圓○瘥後從腰以下有水氣牡礪澤瀉散○瘥後日暮微煩以其病方瘥強與穀食而不消也節飲食則愈

飲酒復

飲酒還教病復來

悶煩口燥舌生胎

妄言不寐仍乾嘔

解毒黃連湯妙哉

極陰變陽寒盛生熱古人以傷寒為大病大病之後

可與酒乎有勞復而發熱者有食復而發熱者飲酒

致劇其熱尤甚於勞食復也

○傷寒已得汗解因飲酒而復劇煩悶口燥乾嘔伸

吟妄語不得睡黃連解毒湯龍膽草煎湯或吉皮為

佐

尋衣摸空

尋衣妄語晡熱潮

下後陽弦病有瘳

脉濇為陰終不救

發黃須要小便流



華陀云病人手循衣縫不治間有一二活者幸也

○吐下後不解多日不大便日晡潮熱不惡寒獨語如見怪劇者不識人循衣撮空怵惕不安微喘直視微者但發熱譫語並用大承氣湯下之若得大便秘後脈弦者生脈濇者死弦為陽濇為陰是陽病見陰脈也○太陽病用火熏之以致發黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰陽俱虛身體枯燥頭汗及頸口乾咽爛腹滿微喘或不大便譫語甚者嘔噦循衣摸床此證小

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

便利則可治

百合

百合昏如祟物厭

或時喜食或時嫌

似寒不冷熱無熱

欲步難行卧不恬

百合者百脉一宗舉皆受病無所謂經絡傳次也皆因傷寒虛勞大病之後臟腑不平變而成此其狀似寒無寒似熱無熱意中欲食復不能食默默欲卧復不得卧強欲出行復不能行崇朝口若小便赤黃藥

入即吐利也病源所載證狀一同其脉微數每尿則頭痛者六十日愈若尿不頭痛但淅淅如寒者四十日愈若尿則快然而但眩者二十日愈○百合知母湯百合地黃湯滑石代赭湯雞子湯百合洗方選用之

臟結

臟結無陽舌白胎

陰筋急痛引臍來

雖然飲食全如故

下利頻頻不可回

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

臟結者臟氣閉結而不復流布也一息不運機絨窮一毫不續穹壤判臟其可結乎外證有如結胃但飲食如故時時下利為異耳其脉寸浮關沉細而緊無陽舌胎陰筋引臍腹俱痛是也病人脇下宿有痞氣連於臍傍痛引小腹而入陰筋者亦名臟結於此而圖其痊濟豈不難矣哉

○臟結無陽證不往來寒熱或寒而不熱其人反靜舌白胎者皆不可下也蓋其邪未全成熱猶帶表寒



可刺關元穴仍與小柴胡湯加生姜

兩感

兩感膀胱對少陰

頭疼口燥大而沉

胃脾肝膽二三日

脉證雙傳准例尋

傷寒惟兩感不治兩感者半屬於陰半屬於陽臟腑俱受病也一日太陽少陰俱病則頭疼口乾煩滿而渴脉大而沉二日陽明太陰俱病則身熱鼻乾譫語腹滿不食脉長而沉三日少陽厥陰俱病則耳聾囊

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

縮厥冷水漿不入脉弦而沉或三日而僵或六日而仆張氏無治法但曰兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同雙鍾以意消息謂如下利不止身體疼痛急先救其裏與四逆湯如不下利但身體疼痛急先救其表與桂枝湯此為治有先後其達權識變之論也謝復古釋張氏治有先後之說亦以為陽先受病在乎表則先解表陰先受病在乎裏則先救裏是亦一意然先表者裏不可緩先裏者表亦不可緩也歟



迪志文化出版有限公司出版

蚘厥狐惑

蚘厥烏梅及理中

臟寒胃冷吐長蟲

咽乾聲啞名狐惑

濕蠱唇瘡限數終

蚘厥證屬厥陰病家有寒妄發其汗或汗後身熱又復汗之以致胃中虛冷故長蟲逆上飢不欲食食即吐蟲其乍靜乍煩者蟲或上而或止也蟲聞食臭必出所以食則吐蟲也張氏有言厥陰為病消渴氣上衝心飢不欲食食則吐蚘吐蚘既出於胃令役有消

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

渴之證何哉蓋熱在上焦而中焦下焦虛寒無熱耳設或大便鞭結是亦蘊毒使然又不可指為燥糞但用生料理中湯加大黃入蜜以利之白朮乾薑所以輔大黃也○治法先脉理中圓次用烏梅圓若誤下之利不止則用四逆湯又法理中圓加伏苓枳殼烏梅渴者加括萋根○狐惑與溫蠱皆蟲證也狀如傷寒多因傷寒下利變壞成之蓋腹中有熱入食無多腸胃空虛故三蟲求食而食人之五臟也其候四肢



迪志文化出版有限公司出版

沉重並惡飲食默默欲眠目不能閉舌白齒晦面目
間赤白黑色變易不當蟲食下部為狐下唇有瘡其
咽乾蟲食其臟為惑上唇有瘡其聲啞溫蠱條例是
雖調理有方此越人所以望而驚也○治蠱桃仁湯
黃連犀角湯雄黃硃散備用而已金液丹方狀治溫
蠱蓋硫黃能殺腹中諸蟲無陽者與之

陰陽易陰陽交

陽易陰根腫痛深

腹連腰胯痛為陰

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一仁齋傷寒類書

溫家脉躁重生熱

陰與陽交汗莫禁

男子陽易婦人陰易病新產而動淫慾也一名女勞
復感於情者亦然其候身重氣乏小腹絞痛頭不能
舉足不能立四肢拘急百節解散眼中生花熱上衝
曾在男子則陰腫入裏腹內攻刺在婦人則裏急腰
腫引腹俱疼若手足拳攣其脉離經皆不可活或榮
衛虛精髓竭翕翕少氣著席不能動搖者引歲月死
吁內傷六氣外傷七情其為害若是歟

○損脉離經一呼一至是為不足至脉離經一呼三
至是為有餘○燒棍散假鼠糞湯竹皮湯乾薑湯青
竹茹湯當歸白朮湯以意擇用○陰陽交者溫病不
得發汗若汗之復大六熱狂言不食其脉躁疾是也
大抵不治若脉浮數則表證猶在可再汗之若脉沉
實或狂語則為胃實陽盛又當下之發汗後復熱者
通用此例○再汗用桂枝湯○再下用承氣湯

陰毒陽毒

欽定四庫全書



仁齋直指 卷六 一仁齋傷寒類書

陰毒身如擊撲然

疾沉汗渴痛臍咽

身斑面赤多煩燥

陽毒狂言洪數弦

陰氣獨盛陽氣暴絕則為陰毒身冷有汗其脉沉細
而疾是也沉而右疾者升有初病遽然而成者有服藥數日
變而成者蓋以腎氣極損生冷傷脾內已伏陰外又
感寒致之或先感外寒而後伏陰於內內外皆陰陽
氣不守故爾陽氣獨盛陰氣暴絕則為陽毒身熱無
汗其脉弦洪促數是也有初病遽然而成者有已經



吐下變而成者蓋以酒麪過度丹砂僭燥腸胃極熱致之或病證屬陽誤投溫藥助熱為邪內外皆陽陰氣不守故爾陰陽二毒皆有頭疼微利之證抑陰用熱抑陽用寒固有條例然此二毒隨氣逆上結伏於胃中皆令人心下痛硬非常法所能通也當急作規摹以泄之陰毒泄則陽氣復陽毒泄則陰氣復陰陽升降榮衛流行自然大汗而解矣若心下已結延至六七日間斷不可活外證治法詳于後篇○陰毒外

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

證面目唇爪青黑口開氣短咽喉不利手足厥冷身不甚熱痛腫如打撲或數慄而寒頭目俱疼腰重背強毒氣攻心心下堅悶腹中絞痛外腎並臍下冷硬額上及手背間冷汗不止嘔吐下利燥渴陰極發燥精神恍惚言語醒醒聲音鄭重舌上黑色陰病回陽服藥未透亦須外借火氣但勿迫燿也生薑良薑能解散寒邪發越陽氣亦要藥也○陰毒沉細而疾身冷有汗陰毒甘草湯白朮散附子散正陽散肉桂散



回陽丹返陰丹天雄散正元散退陰散金液丹可選用之令陽氣復而大汗解矣○陰毒已深則灸氣海關元二穴以手足和為効仍以前項藥濟之若六脉附骨疾勢困甚者臍中用先艾後葱法方訣詳具于後凡治陰毒得陽氣乍復者皆生煩燥切勿誤投涼藥躁甚與返陰丹輩○陽毒外證身量大熱面目俱赤無汗頭疼腰背四肢疼痛發斑如錦紋心下結悶煩燥咽痛喘齎唾吐膿血下利赤黃小便亦赤黃錯

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

語驚狂或走甚者舌卷而焦黑鼻如煙煤○陽毒弦洪促數身熱無汗陽毒升麻湯葶歷苦酒湯即米醋大黃湯梔子紅湯黑奴圓太乙牛黃膏用竹葉湯調下或研生地龍大者三條入生薑汁薄荷汁生蜜腦子各少許新汲水調灌下可選用之令陰氣復而大汗解矣陽毒大熱煩渴譫語赤斑衄血不止白虎湯一服効○陽毒已深脉洪大內外結熱舌卷黑鼻中如煙煤用新汲水浸濕布數重搭於臍上續又換新水



浸布漬冷熱勢纔減即已之詳法于後○太師陳北山方訣治陰毒心下結伏按之極痛大小便秘澀累日用藥不下但出氣稍煖亦可療治急取巴豆肉十粒研爛入麪一錢許捻作一餅堅實安頓臍心立小艾柱灸五七壯覺腹中鳴良久自通利其次用葱白一束緊扎切作數餅灸令溫熱貼於臍下以熨斗火熨其上續又易之漸覺體溫即以五積散二錢附子末一錢薑七片棗二枚鹽少許水大盞煎七分溫服連併二三劑即汗出而瘥又法以大蒜一枚搗研捏作餅子炙熱置於臍心灸十壯大小便即通○治陽毒累經藥下不通結胃堅硬按之極痛或稍通而復再結喘促極熱大燥狂亂即取大活地龍四條洗淨砂盆內研如泥入生薑自然汁少許蜜一匙薄荷汁少許新汲水小盞調和徐徐灌盡漸次涼快若熱熾者加腦子少許如未効再作一劑自然汗出而解或用竹葉湯調太乙牛黃圓灌下二毒灌藥少頃以手

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

揉其心膈即得藥下○本事方灸結胃巴豆肉七粒黃車七寸搗細津唾調膏安於臍心艾灸其上不拘壯數以腹中有聲為効灸畢即以湯蘸軟帛拭之恐成瘡爛此方與集驗神助散一同陰陽二毒但有微氣者皆可灸臍間有聲即得汗解○尚藥孫用和破結丹治陰陽伏逆變為結胃五六日大便結攻之不及達之不可以此主之用錦辰砂銀青磁石北脂肉豆蔻木香官桂牽牛生黑附炮巴豆肉不去油各半兩輕粉半分麝半錢金五箔右件將法醋半升入硃砂附子牽牛三末熬成膏次入徐藥打和得所圓如皂子大輕粉衣每二圓蜜湯調下

陽證似陰陰證似陽

陽證如陰冷四肢 滑沉尿赤大便秘

面紅煩燥身微熱 陰證如陽沉更微

陰極發燥熱極發厥物極則反也重陽必陰重陰必陽寒暑之變也四肢冷小便赤大便秘或糞色黑眼

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書



開言動脉沉而滑謂之陽證似陰面赤煩燥身有微熱眼閉穀熱脉沉而微謂之陰證似陽欲知的定當推原反本察色聽聲辨以六經參以外證徐徐焉據脉驗之數熱遲寒陰陽別矣○陽之體輕陰之體重陰家脉重陽家脉輕○陽盛旦靜陰盛夜寧陽虛暮亂陰虛夜爭○陽證似陰白虎湯熱極生寒則四肢逆冷水或用承氣湯○陰證似陽四逆湯加葱白主之陰盛則燥下虛則而赤衰寒則身微熱也

欽定四庫全書

仁齋直指 卷六 一 仁齋傷寒類書

陰盛隔陽

凡陰盛隔陽脉細沉疾身冷大煩燥嗜卧泥水之中欲飲水而不欲入口者是飲水者非可服霹靂散少焰散丹砂圓亦効孫用和以半兩黑附子一枚燒存性候冷為末入真腦茶一大錢錢和為二服每服水一盞蜜半匙煎六分冷服躁止得睡汗出皆藥之驗也

仁齋傷寒類書卷六

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷七

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

小柴胡湯加減法

傷寒諸方惟小柴胡為用最而諸家屢稱述之蓋以柴胡半夏能利能汗凡半表半裏之間以之和解皆可用也抑不知小柴胡非特為表裏和解設其於解血熱消惡血誠有功焉蓋傷寒發熱一二日間解撤不去其

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七 一 仁齋傷寒類書

熱必至於傷血不問男女皆然小柴胡湯內有黃芩柴胡最行血熱所以屢獲奇功但藥性差寒用之貴能加減今推明活法凡表發熱裏又有燥渴糞鞭熱證者是為內外俱熱小柴胡加大黃裏無熱證但發熱在表者小柴胡加桂枝主解表可以溫血所謂陰盛惡寒甘辛發散者此也大黃主攻裏可以蕩滌血熱所謂陽盛內熱酸苦湧泄者此也是又別其解表以溫攻裏以寒之義若遇少陽本證及無表裏證或表裏不分之證但依



本方用之並不須加減此為正訣虛者少與尤在酌量予每見後學數輩療治傷寒輒用當歸其意蓋為調血計不思一滯中脘二動痰涎三壞胃氣而血熱又非當歸之所能除惑之甚矣否則熱入血室張氏特以小柴胡主之何哉雖然均是和解耳局方以和解散平穩之劑為和解張氏以小柴胡差寒之劑為和解意安在哉蓋局方和解散為尋常感冒和平解散設也若夫熱在半表半裏既不可汗又不可下并小柴胡一劑孰能內和而外解之乎然而學者亦不可以輕心而用小柴胡也脉之不審證之不詳縱橫泛應執小柴胡以為公據脉遇浮熱似陽其不誤人性命幾希矣甚者僅以小柴胡收效一二而乃不遵格法輕用大柴胡立意一差禍不旋踵吁可畏哉

傷寒諸篤證

搖頭直視形如煙熏心絕○唇脣反青四肢多汗肝絕○反目直視狂言遺尿腎絕○汗出髮潤喘而不休肺

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七
一仁齋傷寒類書

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七
一仁齋傷寒類書

絕○環口鰲黑柔汗發黃脾絕○汗出如油喘促無已水漿不下形體不仁命絕○大發濕家汗則成痙熱而痙不治○發濕溫汗身青面變耳聾不語曰重暈不治○發風溫汗必譫語並不治○發風濕中濕汗並逆○發動氣汗不治○發少陰汗九竅出血曰下厥上竭不治○發少陽汗則膽語○發汗只在頭面不至遍身鼻衄不止者逆○發汗不至足者逆○諸逆發汗劇者言亂目眩並不治○當汗無汗服麻黃數劑汗不出者不治○汗出如珠不流不治○汗出如油口噤肉戰聲吟喘促不治○汗後嘔吐水藥不入口者逆○熱病脉躁盛而不得汗不治○汗後不為汗衰復大熱躋躁疾狂言不食曰陰陽交不治○忽冒脉無脉服藥後汗解則生若無汗脉不至者不治○少陰厥逆無脉服藥通脉其脉漸續則生暴出則不治○下利厥逆無脉灸之脉不回身不溫不治○少陰四逆下利惡寒而拳發躁無脉不治○下利日十餘行其脉反亢者逆○少陽陽明



合病下利脉長大而弦曰負不治○陽病見陰脉不治○發斑屬陽見陰脉不治○代脉不治吐血衄血脉反浮大而牢不治○陰易陽易脉離經外腎腫腹中絞痛手足拳攣不治○欬逆上氣脉散者不治○譫語脉反沉微四肢厥冷不治○脉陰陽俱虛熱不止者不治○七八日以上發大熱難治○舌木爛熱不止者逆○下利發熱或汗不止厥不止並不治○下利發熱厥逆燥不得眠不治○譫語直視或喘滿或下利並不治○譫語屬陽見陰證者逆○傷寒脉乍疎乍數不治○發斑先赤後黯面色黧晦不治○發斑大便自利不治○發黃而變黑不治○口乾舌黑不治○口張目陷不治○口張口出氣乾嘔骨骸熱痛者逆咳逆不止者不治○心下痞悶上氣喘麤者逆○霍亂喘脹煩燥不治○誤下濕家額汗喘促或小便不利大便自利不治○頭汗內外開格小便不利此為陽脫不治○腹滿咳逆不得小便不治○腹大滿而下泄不治若脉洪緊而滑尤可慮

欽定四庫全書

仁齋直指
卷七
一仁齋傷寒類書

傷寒別名

○臟結如結脅舌白胎陰筋引臍腹痛時時下利不治○結脅證其加煩燥不治○臟厥七八日發厥膚冷煩燥下利無時暫安不治○少陰吐利厥逆煩燥不治○厥而下利反能食者曰除中不治○四肢厥逆臍下絞痛石硬眼定者逆○厥陰唇青舌卷黑而耳聾囊縮不治○頭連腦痛甚手足俱寒不治○陰毒陽毒過六七日不治○兩感不治○狐惑咽乾聲啞唇瘡不治○赤斑五救其一○黑斑十救其一○尋衣摸空者逆

欽定四庫全書

仁齋直指
卷七
一仁齋傷寒類書

傷寒別名

清便自調自可謂大小便如常也○大便秘而堅則曰鞭○小便不利小便少下利清穀皆謂水穀不分○得大便曰更衣○大便堅小便利曰脾約○下利曰飧洩○腸僻謂痔也○寒而利曰鴨溏熱而利曰腸垢○轉失氣謂氣轉而響時時失下即後分泄氣蓋腹中有積○大汗傷氣大下傷血或火邪逼迫驚狂或尺寸脉緊而反有汗或發汗後汗不止而漏風或陰病本無汗而



反有汗或其脉浮遲微弱不能作汗皆曰亡陽○吐汗下溫針以後其病不解曰壞病曰何逆○瘥後更發熱

曰遺熱○脉相尅賊曰負○兩手無脉曰雙伏一手無

脉曰單伏○左關脉曰人迎右關脉曰氣口足跌上動

脉曰衝陽足後根上陷中動脉曰太谿○婦人乳頭直

下近腹處曰期門○臍下一寸曰氣海二寸曰丹田三

寸曰關元○玄府即汗空也○臍間動氣曰奔豚○筋

惕肉動曰瞤○中暑曰中暈○妄發濕溫汗曰重暈○

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七 一 仁齋傷寒類書

渴欲飲水水入即吐曰水逆○心下停水怔忡身無大

熱頭額微汗曰水結胃○乾嘔曰哕咳逆曰噦○目中

不了了謂不明了也睛不和謂不和平如常也○三月

至夏方發病曰晚發

傷寒戒忌

傷寒新瘥後但少喫糜粥常令稍飢不得飽食反此則

復○又不得早起不得梳頭洗面不得多言不得勞心

費力反此則復○瘥後百日内氣體未得平復犯房室

者死○忌食猪羊雞鴨狗肉肥魚油膩諸骨汁及鹹藏
鮓脯餅麪果物

藥有寒溫相濟

黃連湯用乾薑黃連柴胡桂薑湯用黃芩薑桂麻黃升

麻湯用桂枝石膏返陰丹用附子膩粉陰旦湯用乾薑

黃芩與夫桂枝石膏湯桂枝大黃湯乾薑黃連黃芩人

參湯某藥性寒某藥性溫溫以調陰寒以調陽蓋使陰

陽調而得其正其有陽證當下而表怯者陰證當溫而

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七 一 仁齋傷寒類書

帶熱者皆可以前例推之亦當權其冷熱重輕為之增

減斯可矣雖然古之分劑與今之分劑多寡又不同焉

藥則秤三四錢為一服水則用一大盞取七分為一劑

此亦通今之論也所謂利藥不嫌生溫湯須要熟又當

權衡於此云

據脉

傷寒治法據脉為要問證次之證如此脉亦如此條例

徑行若證熱而脉遲證寒而脉數切不可自惑於倉卒



須是畧去外證專以脉為主領斟酌而調理之庶無差
誤雖然偏陽之脉又何耶曰人稟陰陽二氣陰根於陽
陽根於陰往來流通而無間斷者也一或偏勝百病生
焉蓋偏陽則多熱偏陰則多寒偏陰則六脉虛濡按之
無力頗有細澹輕澹之狀病主沉寒法當溫散人所易
知若夫病軀内外有熱其脉不數不洪但指下急澹而
小緊如枝條刮刮之狀此則為陽勝陰當用寒涼之劑
以解陽熱愆伏之邪以行血熱凝結之毒不可錯認以

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七
一仁齋傷寒類書

警省

傷寒證候頃刻傳變傷寒治法繩尺謹嚴非可以輕心
視之也其間種類不一條例浩繁是固難矣至於陰極
發燥熱極發厥陰證如陽陽證如陰脚氣似乎傷寒中
暑似乎熱病與夫蓄血一證上熱下冷乍閔乍寒甚至



迪志文化出版有限公司出版

四肢發厥昏迷悶絕凡此等類尤當審思而明辯之若
疑似未別體認未明姑且試探切不可妄投決病之劑
方方雖微死生之係也謹之哉

藥方

本祖南陽活人書其詳見於傷寒百問

凡下證不得用圓子藥謂水銀硃巴粉霜之類作圓
以為轉下藥性有毒只取積滯傷動臟腑不能蕩滌
邪熱以去病也○小兒傷寒節度如大人法但分劑

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七
一仁齋傷寒類書

少異其間用藥小冷耳

產婦傷寒

或問婦人傷寒可得聞乎曰傷寒三百九十七條一百
一十三方此張氏截然之筆削也於某證則有某藥曷
嘗以男女為別哉要之月事去來產前產後男子所無
請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人以血為主發熱惡
寒經水適來經日熱除而胃滿譫語者是則邪氣結於
胃脇當刺期門隨其實而取之傷風經日續生寒熱發



迪志文化出版有限公司出版

作似瘧而經水適斷者是則血結而不行當以小柴胡湯散之所謂治之而愈者此也至如傷寒發熱經水適來晝醒暮譫如見怪狀是則裏無留邪熱隨血散所謂不治自愈者此也前乎吐血下血兩條併以犀角地黄湯桃仁承氣湯抵當湯圓之類言之詳矣抑產前產後治法將何擇焉曰產前安胎產後消瘀於是遵依條例斟酌輕重而調理之安胎者何桑寄生阿膠縮砂為要藥他如桂枝半夏桃仁大黃墮胎及燥熱等輩則不可輕用也消瘀者何川芎蒲黃赤芍藥生地黃為要藥他如內補攔住敗血之劑則不可輕進也朱氏以阿膠桑寄生人參伏苓白朮等而細末糯米飲調劑為孕婦安胎以紅花一分官桂芍藥甘草半之姜棗同煎為解表消瘀以蔥白生姜大劑濃汁為產前發散以小柴胡湯去半夏和解熱入子宮郭稽中以枳殼防風一度甘草減半末之點服主大便秘澀又以蜜導一法真可活人然則產婦證治觀此可以問津索塗矣雖然知安胎則

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七
一 仁齋傷寒類書



不可不調氣知消瘀則不可不扶虛枳殼香附陳皮以調氣也當歸川芎黃耆人參以扶虛也退熱則柴胡黃芩解肌則紫蘇乾葛滋腸則麻仁枳殼助陽則乾薑良薑其間採摭雖未備古人之經然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人之意姑存之篇末以便學者之觀覽云

小兒傷寒

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒與大人法度則同但分劑少異用藥少冷已略陳於前矣然而驚風瘡豆亦嘗贅布此尤不可闕請發明藥證而條析之惡風惡寒者必隈人藏身引衣密隱是為表證可微取其汗也惡熱內實者必出頭露面揚手擲足煩渴燥糞掀衣氣竈是為裏證可畧與疎利也至若頭額冷手足涼口中冷氣面色黯淡大便瀉青此則陰病裏虛當以溫藥救其裏也舉是三者汗下溫之法可以類推矣發汗用桂枝麻黃各半湯加黃芩解肌用香蘇散加乾葛通利四順清涼飲微利人參敗毒散溫裏理中湯厥冷甘草

欽定四庫全書

仁齋直指 卷七
一 仁齋傷寒類書



乾薑湯尋常感冒惺惺散或參蘇飲傷風發熱人參羌活散或天麻防風圓壯熱者升麻葛根湯潮熱者生犀散小柴胡湯加大黃小便不通者導赤散五苓散甘露飲表裏俱熱如表裏俱見之證洗心散主之咳嗽則人參潤肺散加紫蘇夾食則異香散紫霜圓輩然亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知裏熱之輕重幼而嬰孩則以虎口指紋之紅色驗之長而童孺則以一指按其三關據左手人迎之緊盛者斷之所謂七十二證某證某方皆無越張朱格例特不過小小分劑而中病則止也不然幼幼新書駢集小兒傷寒雖略舉巢源一二而終篇以活人書為法果何意哉故附于卷末以備學者之觀覽云

欽定四庫全書

仁齋直指
卷七
一仁齋傷寒類書

仁齋傷寒類書卷七



迪志文化出版有限公司出版