


電子版



【子部】

迪志文化出版有限公司 出版  
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：仁齋直指》

出版：迪志文化出版有限公司  
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓  
電話：(+852) 2735 1263  
傳真：(+852) 2730 8686  
網址：<http://www.dheritage.com>  
電郵：[dvm.customer@dvm.com.hk](mailto:dvm.customer@dvm.com.hk)  
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing  
All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand 版本，請瀏覽迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

子部五

仁齋直指

醫家類

提要

臣等謹案仁齋直指二十六卷傷寒類書七

卷俱宋楊士瀛撰士瀛字登父仁齋其號也

福州人始末無考前有自序題景定甲子甲

子為景定五年次年即度宗咸淳元年則宋

末人矣此本為嘉靖庚戌所刻前有佘鏗序

欽定四庫全書

仁齋直指  
提要

稱直指列為二十八卷析七十九條今考七

十九條之數與序相符而其書止二十六卷

焦竑國史經籍志載有此書亦作二十六卷

蓋序文偶悞然士瀛所撰本名仁齋直指其

每條之後題曰附遺者則明嘉靖中朱崇正

所續加崇正字宗儒徽州人即刊刻此本者

也焦志既題曰仁齋直指附遺方乃惟註楊

士瀛撰則併附遺歸之士瀛亦未免小誤也

其傷寒類書七卷焦志不著錄據仁齋直指

自序其成書尚在直指前此本以卷帙較少

故刻於後卷首標題亦稱朱崇正附遺然核

其全編每條皆文義相屬絕無所謂附遺者

惟卷一活人證治賦後有司天在泉圖五運

六氣圖傷寒脉法指掌圖標目上冠一附字

耳或因此一卷有附遺而牽連題及七卷或

因直指有附遺而牽連題及此書均未可定

欽定四庫全書

仁齋直指  
提要

宋槧舊本既已不存今亦無從考正姑疑以

傳疑可矣乾隆四十二年五月恭校上

總纂官 臣紀昀 臣陸錫熊 臣孫士毅

總校官 臣陸費墀



仁齋直指原序

余始撰活人總括嬰兒指要俗皆以沽名譏及脈書一行於是斂肅而相告曰誠不易也誰肯傾困竭廩以徇人哉余曰而亦知有天乎天將富夫濟人利物之心故資我以心通意曉之學既得於天還以事之是蓋造物初心之所期也或者隙光自耀藏諸已而不溥諸人政恐玉毀櫝中草木俱腐矣雖然人有四百四病或出於前三冊之外者可不原證擇方揭為直指之捷徑乎明白

欽定四庫全書

仁齋直指  
原序

易曉之謂直發蹤以示之謂指剖前哲未言之蘊摘諸家已效之方濟以家傳參之肘後使讀者心目瞭然對病識證因證得藥猶繩墨誠陳之不可欺庶幾仁意周流疊疊相續非深願歟余嘗慨而作曰天之予人以是物必使之有以用是物有是物而不能用非唯咈天抑亦自棄其天者也併書此為同志勉景定甲子良月朔三山楊士瀛登父序

醫家者流自有神農本經粵傳於茲聖賢師授格言星



迪志文化出版有限公司出版

煥於是洩陰陽之祕運變化之機窺盛衰之理操從逆之宜可以事親養生可以仁民愛物故自一指之外而兼乎六合之內至德要道偕需於此拘方之士不可以同語也允矣鼎湖既昇越人亦逝長沙不作叔和遂湮思邈東垣子微守真相繼名世生逢之者宜若可以盡年而乃有不蒙其澤不嫌其術者豈其猶未通於要妙之理耶景定時楊仁齋以濟人利物之誠得心通意曉之學著書總括爰修直指指列為二十八卷析之七十九

欽定四庫全書

仁齋直指  
原序

條刻以遺世予自嘉靖庚子得善本閱之不欲釋手考其撰次旨遠義陳類分語悉上自本草素難之微言下及脈病證治之肯綮搜元別訣燦若珠璣晬盤示兒隨其所取乃若自序任重之言豈其矜哉噫仁齋已矣其如蒼生何今其說存使擅醫業者皆仁齋之學讀仁齋之書者皆不欲釋手心存理得而直達要妙不難矣將以同躋斯民於仁壽之域豈小補之功爾耶昔朱丹溪沒世其門人戴元禮刻心法附以方論而朱氏之學益



迪志文化出版有限公司出版



光仁齋於丹溪為先達師表鮮有能繼之者然猶幸斯文之未喪也今朱氏惠齋校而刻之附之以所遺其用心亦勤矣繼仁齋之學者將不在於茲舉乎披覽新刻樂而玩之致敬以序嘉靖庚戌夏日徽郡余鉉撰

欽定四庫全書

仁齋直指  
原序

欽定四庫全書

仁齋直指卷一

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

五臟所主論

夫在天之風在地為木在人為肝惟肝則主風在天之熱暄暑熾燠熱之用也在地為火在人為心惟心則主熱在天之

濕在地為土在人為脾惟脾則主濕在天之燥在地為金在人為肺惟肺則主燥在天之寒在地為水在人為

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

腎惟腎則主寒吁此天地自然之氣也氣之愆伏乘虛入人而人不能克百病之所由生故風喜傷肝熱喜傷心濕喜傷脾燥喜傷肺寒喜傷腎而暑氣傷心包絡絡曰膻中在膺膈間蓋心主暑故暑氣伏於三焦膈胃之間其或風氣之勝木邪乘土則脾病生焉熱氣之勝火邪乘金則肺病生焉濕氣之勝土邪乘水則腎病生焉燥氣之勝金邪乘木則肝病生焉寒氣大來心火亦為腎水所乘矣左關為人迎可以知風寒暑濕熱燥所從入之門右關為氣口可以



別臟氣鬱暢與食氣聚散盈虛之候若乃憂愁思慮易耗心神恚怒氣逆易損肝氣縱慾強志腎之戕形寒飲冷肺之害飢飽勞倦脾之傷外之六氣相乘內之七情相感凡是數者皆為五臟之邪因其所主而尋其某臟所受之處則得之矣心主血所藏者神上應舌外應諸掌其聲言其色赤其臭焦其味苦其液汗肝主筋所藏者竈上應眼外應爪甲其聲呼其色青其臭臊其味酸其液泣腎主骨所藏者精與志上應耳外應腰背其聲

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

呻其色黑其臭腐其味鹹其液唾

腎冷多唾  
腎熱多渴

肺主氣所

藏者魄上應鼻外應皮毛其聲哭其色白其臭腥其味辛其液涕脾主肌肉所藏者意與智上應口外應四肢其聲歌其色黃其臭香其味甘其液涎故心肺在上主脈氣也肝腎在下藏精血也脾居中州又所以為精血脈氣之養也心之平脈浮大而散肝之平脈弦細而長腎之平脈沈濡而滑肺之平脈短濇而浮脾之平脈和緩而大平者五臟本然之正脈也春弦夏鈞

叔和云夏  
洪取火脈

來盛之義秋毛冬石以其四時當旺者象之木火金水四時

各旺七十有二日土為季脈每季之月寄旺一十八日春則弦緩夏則洪緩秋則微緩冬則沈緩合四季而論則亦七十有二日矣春弦者端直之狀細弱而長是也夏鈞者浮大而散來疾去遲是也秋毛者稀軟之狀輕虛以浮是也冬石者沈濡而滑舉指來疾是也土之脈溫厚氣行乎臟腑之中平和不可得見其衰則現焉所謂弦鈞毛石蓋應時而畧見耳其中須有穀神胃氣之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

和若弦如張弓弦鈞如操帶鈞毛如風吹毛石來如奪索去如彈石此皆危脈也此絕無胃氣也胃氣虧絕其能以乎若夫春得金脈夏得水脈秋得火脈冬得土脈四季得木脈其與心之脈尅肺肺之脈尅肝肝之脈尅脾脾之脈尅腎腎之脈尅心此皆賊邪也一臟無氣況可以為人乎然則諸府之脈可得聞歟曰小腸微洪大腸微濇膀胱微沈胃微緩而膽微弦急此無他腑與臟合氣同氣相求斯有得其近似者矣抑古人所謂九臟



者又何如耶曰形臟四一者頭角二者耳目三者口齒  
四者胃中神臟五在心藏神在肝藏魂在腎藏志肺藏  
魄而脾藏意然臟者神之舍色者神之旗五臟已敗其  
色必夭槁怪異常天必亡矣抑猶有說焉微遲濡弱其  
候雖不同而為寒為虛一也數實長洪其形雖不類而  
為熱為實一也諸脈皆弦吾知其病出於肝諸脈皆緩  
吾知其病出於脾諸脈皆濇吾知其病出於肺脈皆浮  
洪病不在心乎脈皆沈滑病不在腎乎若合腑臟而觀  
欽定四庫全書 仁齋直指 卷一

五臟病證虛實論

五臟各有所主至其病證莫不隨所主而見焉面赤喜  
笑舌破口乾煩燥掌熱心痛而腕脰上有動氣者心家  
病也面青多怒脇下痛硬欬逆目眩肢節攣急轉筋洩

難臍左有動氣者肝家病也肝乘脾厥陰下終於陰器故欬逆足  
面黑而恐呵欠呻吟齒痛骨痿耳鳴精泄足脛寒腰脊  
痛小腹急疼痼泄而裏急後重臍下有動氣者腎家病  
也面白善嚏憂愁欲哭喘嗽氣逆咽喉不利洒淅惡寒  
時作寒熱臍右有動氣者肺家病也面黃善思善噫善  
嗜中脘脹滿飲食不消身體腫重肢節酸疼怠惰嗜卧  
四肢不收當臍動氣是非脾家之病乎東萊先生有曰  
肝受病則目不能視腎受病則耳不能聽脾受病則口  
不能食心受病則舌不能舉五臟病證以此觀之不待  
智者而後知也然而心之惡熱者何熱則脈潰濁也肝  
之惡風者何風則筋燥急也腎何以惡燥燥則精涸竭  
也肺何以惡寒寒則氣留滯也脾何以惡濕濕傷肌肉  
肉傷則痿腫也五臟之病推原及本安有不從所受中  
來哉是以臟氣有餘謂之實臟氣不足謂之虛心實之  
候口乾喜笑身熱汗血痛滿乎胛脇膺背之間肝實之  
候目赤多怒頭眩耳聾痛引乎兩脇小腹之下腎實之



候腹膨腫少氣不言骨痛飧泄而小便黃肺實之候喘促咳嗽上氣鼻張脛股肩疼而胃中滿脾氣一實必至肢體重著而不舉腹脹尿秘而苦饑故曰臟氣有餘謂之實者此也心虛則恍惚多驚憂煩少色咳唾舌強腰背酸疼肝虛則眼昏胃痛筋脇拘攣恐懼面青如人將捕腎虛則心懸如饑胃痛引脊厥逆洩變眇冷耳鳴肺虛則呼吸少氣鼻涕乾肺中聲鳴喘乏咳血唾中有紅縷者此肺損為熱氣所傷也若脇下痛而唾鮮血者此熱氣傷肝也其或吐逆泄利飲食不消腹脹腸鳴四肢無力則脾虛之證生焉故曰臟氣不足謂之虛者此也大抵實者瀉之虛者補之無過不及以平為期否則實實虛虛損不足而益有餘如東坡先生所謂至虛有盛勢大實有羸狀差之毫釐疑似之間便有死生禍福之畏吁可畏哉至若心病而直視面鰲肝病而舌卷囊縮腎病而腰折骨枯肺病而毛焦氣出脾病而臍突唇反此則五臟之氣絕也絕者無復生之理脫遇岐扁亦未如之何雖然病亦有虛實之證不

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

縷者此肺損為熱氣所傷也若脇下痛而唾鮮血者此熱氣傷肝也其或吐逆泄利飲食

肺虛則呼吸少氣鼻涕乾肺中聲鳴喘乏咳血

唾中有紅

同耳邪氣盛則實精氣奪則虛脈盛皮熱腹脹前後不通曰五實脈細皮寒氣少前後泄利飲食不進曰五虛諸病出者為虛入者為實陰出乘陽陽入乘陰言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實陰主靜則緩陽主燥則急濡者為虛堅者為實癢者為虛痛者為實外痛內快者外實內虛外快內痛者外虛內實其有心腹皮膚內外俱痛則按之而止者虛也按之而痛者實也經所謂皮虛則熱脈虛則澹驚肉虛則重筋虛則急骨虛則痛髓虛則墮腸虛則澹泄三陽實三陰虛汗不出三陰實三陽虛汗不止與夫脈浮而緩自汗惡風法當解肌脈浮而緊無汗惡寒法當發汗此表病之一虛一實脈伏而牢腹痛秘結法當下之脈沈而弱厥冷自利法當溫之此裏病之一實一虛內實之證心下牢強腹中痛滿前後不通乾嘔而無物出者死內虛之證厥逆煩燥而吐痢不止者亡是又不可不知也故併及之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

驚肉虛則重筋虛則急骨虛則痛髓虛則墮腸虛則澹

泄三陽實三陰虛汗不出三陰實三陽虛汗不止與夫

脈浮而緩自汗惡風法當解肌脈浮而緊無汗惡寒法

當發汗此表病之一虛一實脈伏而牢腹痛秘結法當

下之脈沈而弱厥冷自利法當溫之此裏病之一實一

虛內實之證心下牢強腹中痛滿前後不通乾嘔而無

物出者死內虛之證厥逆煩燥而吐痢不止者亡是又

不可不知也故併及之

諸陰諸陽論





稟五行之氣而為萬物之最靈者人也人稟五行之氣而生曰陰與陽誰獨無是哉心為手少陰腎為足少陰肺為手太陰脾為足太陰肝為足厥陰心包絡為手厥陰此手三陰足三陰之經也小腸曰手太陽膀胱曰足太陽大腸曰手陽明胃曰足陽明膽曰足少陽三焦曰手少陽此手三陽足三陽之經也陰六陽六合而為人身之十二經是經者所以周環一身自上至下往來流通而無間斷也其脈則於兩手三部應焉故自其身者

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

言之腑為陽臟為陰外為陽內為陰上為陽下為陰頭戴陽足履陰背負陽腹抱陰氣屬陽而陽為衛血屬陰而陰為榮陽根於陰陰根於陽陰陽互根榮衛不息陽動所以為陰之役使陰靜所以為陽之鎮守呼出心與肺吸入肝與腎呼者因陽出吸者隨陰入呼吸之間脾受穀味是則一身之陰陽也自其脈者推之關前為陽陽得九分關後為陰陰得一寸所以有主治之分浮之實大沈之損小曰陽盛陰虛沈之實大淨之損小曰陰

盛陽虛所以有表裏之別脈居陽部而陰脈形脈居陰部而陽脈見陽虛則陰出而乘之陰虛則陽入而乘之及所以見寒暑則變之機至若陽生於尺動於寸陰生於寸動於尺牢長促數之為陽虛短結代動細之為陰浮芤滑實弦緊洪之為表微沈緩濇遲伏濡弱之為裏陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死是則六脈之陰陽也自其病者求之寸口浮疾陽中之陽病主身熱頭痛煩滿內熱寸口沈細陽中之陰病主少氣汗出悲傷不

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

聊尺脈浮滑陰中之陽病主小腹痛滿大小便難尺脈沈細陰中之陰病主兩股酸疼陰癢遺瀝陰出於陽其病怒陽入於陰其病靜腑病欲得寒掀衣氣竄又欲見人者為陽臟病欲得溫惡聞人聲閉戶獨處者為陰腑病屬陽陽主動故其痛多走注而不止臟病屬陰陰主靜故其痛有常處而不移陽病旦靜陰病夜寧陽虛暮亂陰虛夜爭陰勝則寒陽勝則熱陰動則發熱陽動則有汗賊風客邪陽受之飲食居室陰受之陽受風氣傷



風者先於上陰受濕氣傷濕者先於下其或邪居陽脈之間則四肢熱盛而為狂邪入陰脈之內則六經凝澁而為痺無陽即厥無陰即嘔陽微不能呼陰微不能吸陽病不能俯陰病不能仰重陽者狂重陰者顛脫陽者見鬼脫陰者目盲是則諸病之陰陽也噫是固然矣抑古人所謂陰陽維蹇覆溢闕格者又何如哉曰脈有陽維陰維陽蹇陰蹇衝督任帶凡此奇經八脈別道而行如設溝渠以備水潦之溢病非自生蓋諸經溢出而流

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

入之也維者總持諸脈之綱維陰陽不相維則悵然失志蹇者健足

行走之關要督言其都陽脈之會也任取其姪生養之原也衝者陰脈之通自足至頭通受諸經之氣血帶者迴繞於身總束諸脈取束帶之義焉故陽維之病苦寒熱陰維之病苦心痛陽蹇之病陽急而狂奔陰蹇之病陰急而足直衝病則氣逆而裏急督病則脊強而折厥任病則男疝氣而女帶瘕帶病則腹脹滿而腰溶溶其衝任二經是又婦人乳血月候之所從出奇經之脈其



迪志文化出版有限公司出版

如是乎闕前為陽脈當九分而浮若連併而上至魚際者為溢溢則外關內隔是為陰乘闕後為陰脈當一寸而沈若連併而下入尺澤者為覆覆則內關外隔是為陽乘寸脈皆虛為陽虧尺脈皆虛為陰虧寸脈下不至闕為陽絕尺脈上不至闕為陰絕虧猶庶幾絕與闕隔真危脈也覆溢虧絕其如是乎雖然人事不可不知也暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁不意氣多厥逆七情所發病家謹焉甘辛之劑以之助陽酸苦之劑以之助陰有志

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

活人者又當識此

### 血榮氣衛論

人之一身所以得全其性命者氣與血也蓋氣取諸陽血取諸陰人生之初具此陰陽則亦具此血氣血氣者其人身之根本乎血何以為榮榮行脈中滋榮之義也氣何以為衛衛行脈外護衛之意也然則榮與衛豈獨無所自來哉曰人受穀氣於胃胃為水穀之海灌溉經絡長養百骸而五臟六腑皆取其氣故清者為榮濁者



迪志文化出版有限公司出版

為衛榮衛二氣周流不息一日一夜脈行五十度平旦以來復會于肺口所謂陰陽相貫如環之無端則是二氣者常相隨而不相離也夫惟血榮氣衛常相流通則於人何病之有一室礙焉百病由此而生矣故氣之作恙發而為寒熱恚怒喜憂愁聚而為積痞疝瘕癥瘕癖上為頭旋中為五鬲下為臍間動氣或喘促或咳噫聚則中滿逆則足寒凡此者氣使之然也血之為患其妄行則吐衄其衰涸則虛勞蓄之在上其人忘蓄之在下其人狂逢寒則筋不榮而攣急挾熱則毒內瘀而發黃在小便者為淋痛在大便者為腸風其於婦人月事進退漏下崩中病尤不一凡此者血使之然也夫血譬則水也氣譬則風也風行水上有血氣之象焉蓋氣者血之帥也氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以導達病原於氣區區調血何加焉故人之一身調氣為上調血次之是亦先陽後陰之意也若

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



迪志文化出版有限公司出版

夫血有敗瘀滯泥乎諸經則氣之道路未免有所壅遏又當審所先而決去之經所謂先去其血而後調之又不可不通其變矣然而調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣而乖張如木香如官桂如細辛如厚樸以至烏藥香附莪朮三稜之類治氣可也治血亦可也若以當歸地黃輩論之施之血證無以逾此然其性纏滯每於胃氣有虧焉胃氣既虧則五臟六腑之氣亦餒矣善用藥者其間劑量而佐助之

大凡治病當識本末假如嘔吐痰涎

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

胃虛不食以致發熱若與涼劑退熱則胃氣愈虛熱愈不退惟先以助胃止吐為本其熱自退縱熱不退但得胃氣已正亦可旋與解熱之劑又有傷寒發大熱屢經寒涼疏轉其熱仍前但用和調胃氣自然無事雖

然心為血之主肝為血之藏肺為氣之主腎為氣之藏誠哉是言也學者苟知血之出於心而不知血之納於肝知氣之出於肺而不知氣之納於腎用藥摸稜往往南轅而北轍矣假如血痢作恙以五苓門冬等劑行其心以巴豆大黃等劑逐其積而其痛獨存者血之所藏無以養也必佐以川芎或芎歸湯輩則其痛止假如喘



迪志文化出版有限公司出版

嗽氣鳴以薑橘枳梗蘇桂調其氣以南星半夏細辛豁其痰而終不下降者氣之所藏無以收也必佐以補骨脂或安腎圓輩則其氣歸元病有標本治有後先綱舉而目斯張矣噫此傳心喫緊之法也耳目所接敢不本衛生之家共之

經云腎間動氣五臟六腑之本十二經脈之根呼明之門生氣之原也

### 脈病逆順論

岐伯曰凡人形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大而胷中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病誠哉

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

是言脈病逆順之不可不蚤辨也盖人有強弱盛衰之不等而脈實應焉脈有陰陽虛實之不同而病實應焉脈病形證相應而不相反每萬舉而萬全少有乖張良工不能施其巧矣故脈之於病有利浮大而不利沈小者有利沈小而不利浮大者有大小無拘而以浮沈滑澀堅軟為順逆者又有五行反尅而賊邪乘虛為深患者請條析而縷陳之壯熱脈浮大而疾者生沈小者死顛癇脈堅大而數者生沈細者死譫語脈洪大者生厥



迪志文化出版有限公司出版

逆而脈微者死暴忤脈實大者生虛濡而小伏者死諸藥中毒可洪大緊急不可微小而不齊疝瘕積聚可堅急實強不可沈小而虛弱腹脹者浮大則順虛小則逆頭痛者浮大則安短濇則危瘠渴之診貴乎數大緊實不貴乎微細浮短

小急不可治 水氣之診貴乎浮而洪大不

貴乎虛細沈微擊墜瘵血順則脈堅強反則脈小弱中惡吐血反則脈沈細順則脈浮洪所謂利浮大而不利沈小者此也傷寒已得汗沈小之脈安浮大之脈危自

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

汗漏不止虛細之脈安躁盛之脈危中惡腹脹緊細則可洪急則否心腹痛沈細則可堅洪則否厥逆之脈順則沈而濇逆則大而浮痿緩之脈順則散而虛逆則堅而疾唾衄血順者小弱沈滑逆者堅燥浮洪金瘡血多順者微細而虛逆者燥實而大久嗽尿血羸瘦者其正則脈微其反則洪急大腸澼泄筋攣者其正則脈細其反則堅洪泄瀉注穀下痢其正者緩細小結其反者弦數浮洪金瘡與諸下血其正者細滑而沈其反者



迪志文化出版有限公司出版



緊急疾大

發熱亦反

蝕肛陰可虛小而不可緊急產後出

血可沈小而不可疾浮所謂利沈小而不利浮大者此

也傷寒脈躁盛而不得汗者陽之極其治也難傷寒已

得汗而脈躁盛者陰之極其候即死中風口噤四肢不

收脈浮遲而恬靜者存脈洪數而氣竈者亡上氣喘急

面目浮腫脈浮滑而手足溫者存脈澀濇而四肢厥者

亡加痢即死

心下牢強勝則脈緊負則沈濡水病腹腫勝則

脈實負則虛散病黃疸者勝則緩大負則弦急而堅卒

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷一

中惡者勝則洪緩負則堅急而駛腹脹便血活者脈滑

殂者脈絕腸癰腫結活者脈浮殂者脈沈膿血諸疾活

以滑細殂以堅強腸澀下膿活以其沈殂以其浮有遲

滑而無緊數則崩中漏下不必慮有滑實而無浮虛則

月經閉塞何足憂諸腸澀身不熱而脈和滑者易愈身

熱而脈弦澀者難痊諸咳嗽聲不焦而脈浮軟者易安

弦絕沈堅或伏而大者難保逆而堅澀順而濡滑其於

上氣為可推反則急堅正則虛緩其於厥逆為可驗耳

聾之脈沈而滑者可療浮而濇者難療蠱毒之脈數而

軟者可甦數而堅者難甦

凡蠱毒脈類如釵股其人吐甚心下切痛如嚙而面目黃

或吐血不止者皆死

所謂大小無拘而以浮沈滑澀堅軟為順逆

者此也心病面赤喜笑心煩掌熱口乾開目妄語臍上

動氣脈當洪緊而數反得沈濡而微者水之尅火一不

治肝病面青筋急多怒目痛目閉不欲見人臍左動氣

脈當弦急而長反得浮濇而短者金之尅木二不治腎

病面黑恐欠足寒逆氣腹痛飧泄後重腹下動氣脈當

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷一

沈而滑反得緩而大者土之尅水三不治肺病面白悲

愁噎哭吐衄交血喘咳寒熱臍右動氣脈當沉細而濇

反得浮大而牢者火之尅金四不治五者脾病面黃善

思善嗜體重節疼四肢不收怠墮喜卧腹滿泄痢飲食

不消當臍動氣脈來緩大者脾家正形也設或反是弦

長而緊是非木邪之尅土乎所謂五行反尅而賊邪乘

虛為深患者此也雖然健人之脈病病人之脈健陽病

得陰脈陰病得陽脈凡此皆反也而劉元賓以為形病



脈和人不死張長沙以為陰病見陽脈者生其言豈厚  
誣哉經云脈病人不病曰行尸人病脈不病曰內虛此  
二者雖皆非順然形病而脈和猶可用力形和而脈病  
其死無疑况脈和之與脈健本自不同剛駛暴躁之謂  
健調平而有胃氣之謂和毫釐疑似之間學者當於此  
而致其辨矣經云忽陽病得陰脈陰病得陽脈者死此  
二者雖皆非正然張長沙之論特為傷寒設謂如傷寒  
心腹煩滿而脈浮大之類是爾腹滿病在太陰浮大之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

脈屬陽亦脾家之本體故能生焉學者當於此而通其

故矣逆順之說故備論之以俟大賢之折衷云

老者脈  
陽羸陰

強順陰弱陽強逆大人得小兒脈不治左病右痛上病

下痛不治下痢手足溫易治手足寒難治手足厥冷脈

不至者死吐衄血發嗽上氣脈數有熱不得卧者死凡病

人眼無翳朦白雲如外障並不治病人脈和軟者生

刮瀉如枝梗  
草根者死

### 男女氣血則一論

血氣即陰陽也不論男女長幼均具之人之有病皆知  
調氣而血之一字念不到焉至於調氣不愈加消痰



迪志文化出版有限公司出版

逐水無所不至其病自如是皆血之為患伏於冥冥之  
中而不可測識矣假如婦人得病於經水來去之時固  
有可驗而知者其若經脈久遏而不行與夫協熱而傷  
血變生他證如之何而見之况世俗循習其能以男子  
之診為血證乎夫肝藏血而心主之動則血運於諸經  
靜則血歸於肝臟肝受血則能視足受血則能步掌受  
血則能握指受血則能攝故血凝於膚者為痺凝於脈  
者為泣凝於足者為厥凡神志昏昏驚狂冒悶煩渴嘔

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

吐語短內疼鼻衄唾紅眼紅面赤骨熱膚閤腸垢尿多

胃滿頑痰譫語多汗甚至四肢厥冷憊不知人不問男

子婦人皆血證耳據脈驗之挾血者脈來乍澀乍數閃

灼明滅或沈細而隱伏也若夫血與熱交攻則左手寸

關按之洪盛盖心主血肝藏血固如是爾經云血上逆

則忘血下蓄則狂上焦瘀血小便必難下焦瘀血小便

必自利血之所在當以此推活人總括所載小柴胡湯

犀角地黄湯桃仁承氣湯皆其要藥血結者湯劑中入



迪志文化出版有限公司出版

醋為佐特於此而申言之然猶有所謂血驚氣驚酒驚者又不可不知也蓋平時酷酒血入於酒則為酒驚平時任氣血凝於氣則為氣驚虛勞瘕冷敗血化生則為血驚搖頭掉尾如蟲之行上侵人之喉下蝕人之肛或附於背脇或隱於胃腹其大則如驚其小則如錢良可怪也治法用蕪荑炒煎為妙或生硫黃為末老酒調下二者可以殺其毒嗣此則以理中湯沈香降氣湯各半溫胃益血常常服餌以消勝之如其不以溫和為主日

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

從事於雷圓錫灰之劑焉君子未保其往

活人書云傷寒太陽證衄

血者病欲愈熱結勝脫而血自下者亦欲愈以此觀之他病伏熱之人上焦瘀血而作吐者亦其病之有瘳也雖然血既吐而自止則可矣

### 問病論

東坡先生嘗曰吾平生求醫蓋於平時默驗其工拙至於有疾必先盡告以所患而後診視使醫者了然知厥疾之所在虛實冷熱先定于中則脈之疑似不能惑也故雖中醫療疾常愈吾求疾愈而已豈以困醫為事哉



迪志文化出版有限公司出版

誠哉斯言真警迷濟世之砭劑也何者脈之與證相依而行脈者所以剖其證之未明證者所以索其脈之猶隱據脈以驗證所謂得手應心者是爾問證以參脈所謂醫者意也是爾烏可舉一而廢一哉私竊怪夫近世以來多秘所患以求診以此驗醫者之能否醫亦不屑下問孟浪一診以自挾其所長甚者病家從前誤藥或飲食居處有所諱悔雖問之而不以盡告遂至索病於冥漠之間辨虛實冷熱於疑似之頃毫釐千里寧不委

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

命一擲與人試伎乎此余於終篇所以特舉前輩格言

以解世俗之惑不然難經有謂問其所欲五味以知其病之所起所在者又果何意邪大人小兒諸病瘥後飲食且須旋進常若不足毋使食氣傷胃其病復來大熱方退尤不可飽小兒傷乳熱復則同

### 論易簡方論

易簡方論前後活人不知其幾近世之士類以春秋之法繩之曰易簡繩愆曰增廣易簡曰續易簡論借古人之盛名以自伸其臆說吁王氏何負於人哉余謂易簡



迪志文化出版有限公司出版

方論後學指南四時治要議論似之自有入心權度存焉耳況王氏晚年劑量更定者不一日月薄蝕何損於明若夫索癥洗垢矯而過焉或者公論之所不予也

附原脈論

出保命集

道之渾淪莫知其原然至道無言無以明其理大象無形非立象無以測其奧道象之妙非言不明嘗試原之脈者何也非氣非血動而不息榮行脈中衛行脈外經曰脈者血之府也自素問而下迄於今經所不載無傳

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

記而莫聞其名焉然而玄機奧妙聖意幽微雖英俊明哲之士非輕易可得而悟也夫脈者果何物乎脈者有三名一曰命之本二曰氣之神三曰形之道經謂天和者是也至於折一支瞽二目亦不為害生而脈不可須臾失失則絕命害生矣經曰春弦一曰夏洪一曰秋毛一曰冬石一曰此言正脈同天真造化之元氣也巡於春夏秋冬木火水金之位生長收藏參和相應故稟二儀而生不離於氣故于脈有生死之驗經曰五運陰陽

者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也既陰陽為神明之府脈為血之府而明可見焉血之無脈不得循其經絡部分週流於身滂派奔迫或散或聚氣之無脈不能行其筋骨臟腑上下或暴或蹶故經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故氣化則物生氣變則物易氣盛則物壯氣弱則物衰氣絕則物死氣正則物和氣亂則物病皆隨氣之盛衰而為變化也脈字者從肉從永從辰從血四肢百骸得

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

此真元之氣血肉筋骨爪髮榮茂可以倚憑而能生長也長以永固道故從肉從永者是也從辰從血者巡之如水分流而布遍週身無有不通也釋名曰脈脈幕也如幔幕之遮覆幕絡一體之形導太一真元之氣也元氣者在氣非寒非熱非煖非涼在脈者非弦非洪非濇非沈不為氣而浮沈不為血而流停乃冲和自然之氣也故春溫夏熱秋涼冬寒所以然者為元氣動而不息巡於四方木火金水之位溫涼寒暑之化生生相續新





新不停日月更出四序迭遷脈不為息故人有身形之後五臟既生身中元氣即生焉故春弦夏洪秋毛冬石此四時之氣也而脈者乃在其中矣道經曰視之不見聽之不聞搏之不得迎之不見其首隨之不見其後此如脈之謂也又云埏埴以為器當其無有器之用故有之以為利無之以為用又曰吾不知名字之曰道強為之名曰大斯立脈之名之本意也故道者萬物之奧脈者百骸之靈奧靈之妙其道乃同元氣者無器不有無所不至血因此而行氣因此而生故榮行脈中衛行脈外瞻之在前忽焉在後而不匱者皆由於脈也分而言之曰氣曰血曰脈統而言之惟脈運行血氣而已故經曰血氣者人之神不可不謹養也陰陽別論曰所謂陽者胃脘之陽也此陽者言脈也胃者土也脈乃天真造化之氣也若土無氣則何以生長收藏若氣無土何以養化萬物是無生滅也以平人之氣常稟於胃正理論曰穀入於胃脈道乃行陰陽交會胃和脈行人稟天地

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



迪志文化出版有限公司出版

之候故春胃微弦曰平得弦而無胃曰死夏胃微鉤曰平但鉤而無胃曰死長夏微稟曰平但弱而無胃曰死秋胃微毛曰平但毛而無胃曰死冬胃微石曰平但石而無胃曰死陰者真臟也見則敗敗則必死五臟為陰肝脈至中而無外急如循刀乃責責然如按琴弦心脈至堅而博如循薏苡仁累累然肺脈至大而虛如毛羽中人皮膚腎脈至博而絕如以指彈石辟辟然脾脈弱而乍數乍疎夫如此脈者皆為臟脈獨見而無胃脈五臟皆至懸絕而死故經曰別於陽者知病亡時別於陰者知生死之期故人性候躁急懷促遲緩稟弱長短大小皮堅肉厚各隨其狀而脈應之常以一息四至為準者言呼出心與肺吸入腎與肝五者胃兼主四旁在呼吸之間也數則為熱遲則為寒如天之春秋二分陰陽兩停晝夜各得五十度自此添一遭則熱減一遭則寒脈之妙道從此可知矣或如散葉或如燃薪或如泥泥或如絲縷或如湧泉或如溢吐頰或如偃刀或如轉索

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



迪志文化出版有限公司出版

或如遊魚假使千變萬化若失常者乃真元之氣離絕矣經曰積陽為天積陰為地陽化氣陰成形此言一氣判而清濁分也元氣者天地之本天和者血氣之根華佗云脈者謂血氣之先也孔子曰天不言而四時行焉百物生焉而脈亦如之又經曰自古通天者生之本皆通乎天氣也通天者謂通元氣天真也然形體者假天地之氣而生故奉生之氣通計於天稟受陰陽而為根本天地合氣命之曰人天氣不絕真靈內屬動靜變化

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

脈不得獨浮沈獨大小獨盛衰獨陰陽須可沈中有浮浮中有沈大中有小小中有大盛中有衰衰中有盛陰中有陽陽中有陰充塞一身之中盈溢百骸之內無經絡不有無氣血不至養筋骨毛髮堅壯膩澤非心非腎非肝非脾五臟之盛真氣固密不為邪傷若憂愁思慮饑飽勞逸風雨寒暑大驚卒恐真氣耗亂氣血分離為病之本噫夫萬物之中五常皆備審脈之道而何獨無五常邪夫仁固衛一身充盈五臟四肢百骸亦皆得榮

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



藏伏匿一一得察有餘不足而愈其病此智之謂也春弦夏洪秋毛冬石太陽之至其脈沈太陰之至其脈大而長少陰之至其脈浮陽明之至其脈濇而短少陽之至其脈鉤厥陰之至其脈弦四序不失其期六氣為常準者此信之謂也非探賾索隱鉤深致遠學貫天人旁通物理未能達於此矣

附論五篇

出丹溪  
心法

不治已病治未病

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

與其救療於有疾之後不若攝養於無疾之先蓋疾成而後藥者徒勞而已是故已病而不治所以為醫家之法未病而先治所以明攝生之理夫如是則思患而預防之者何患之有哉此聖人不治已病治未病之意也嘗謂備土以防水也苟不以閉塞其涓涓之流則滔天之勢不能遏備水以防火也若不以撲滅其熒熒之光則燎燎之焰不能止其水火既盛尚不能止遏况病之已成豈能治歟故宜夜卧早起於發成之春早起夜卧

於蕃莠之夏以之緩形無怒而遂其志以之食涼食寒而養其陽聖人春夏治未病者如此與雞俱興於容平之秋必待日光於閉藏之冬以之斂神匿志而私其意以之食溫食熱而養其陰聖人秋冬治未病者如此或曰見肝之病先實其脾臟之虛則木邪不能傳見右頰之赤先瀉其肺金之熱則金邪不能盛此乃治未病之法今以順四時調養神志而為治未病者是何意耶蓋保身長全者所以為聖人之道治病十全者所以為上

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

工之術不治已病治未病之說著於四氣調神大論厥有旨哉昔黃帝與天師難疑答問之書未嘗不以攝養為先始論乎天真次論乎調神既以法於陰陽而繼之以調於四氣既曰食飲有節而又繼之以起居有常諄諄然以養生為急務者意欲治未然之病無使至於已病難圖也厥後秦緩達乎此見晉侯病在膏肓語之曰不可為也扁鵲明乎此視齊侯病至骨髓斷之曰不可救也噫惜齊晉之侯不知治未病之理



亢則害承迺制

氣之來也既以極而成災則氣之乘也必以復而得平  
物極則反理之自然也夫抵寒暑燥濕風火之氣木火  
土金水之形亢極則所以害其物承乘則所以制其極  
然則極而成災復而得平氣運之妙灼然而明矣此亢  
則害承迺制之意原夫天地陰陽之機寒極生熱熱極  
生寒至神不測有以斡旋宰制於其間也故木極而似  
金火極而似水土極而似木金極而似火水極而似土  
蓋氣之亢極所以承之者反勝於已也夫惟承其亢而  
制其害者造化之功可得而成也今夫相火之下水氣  
承而火無其變水位之下土氣承而水無其裁土位之  
下水承而土順風位之下金乘而風平火熱成其燥金  
自然金家之疾陰精承其君火自然火家之候所謂亢  
而為害承而迺制者如斯而已且嘗考之六元正紀大  
論云少陽所至為火生終為蒸溽火化以生則火生也  
陽在上故終為蒸溽  
是水化以承相火之意太陽所至為寒雪冰雹白埃是

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



迪志文化出版有限公司出版

土化以承寒水之意也霜雪水電水也  
白埃下承土也以至太陰所至  
為雷霆驟注烈風雷電驟注土也  
風下承之木氣也厥陰所至為風生  
終為肅風化以生則風  
生也肅靜也陽明所至為散落溫散落經也  
溫下承之  
火氣也少陰所至為熱生中為寒熱化以生則熱生也  
精承上故中為寒也  
豈非亢為害則承迺制者歟昔者黃帝與岐伯上窮天  
紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難以作內經  
至於六微旨大論有及於六氣相承之言以為制則生  
化外別盛衰害則脈亂生化大病諸以所勝之氣來於  
下者皆折其標盛也不然曷以水發而電雪土發而驟  
飄木發而毀折金發而清明火發而曠昧此皆鬱極迺  
發以承所亢之意也嗚呼通天地人曰儒醫家者流豈  
止治疾而已當思其不明天地之理不定以為醫工之  
語

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

審察病機無失氣宜

邪氣各有所屬也當窮其要於前治法各有所歸也當  
防其差於後蓋治病之要以窮其所屬為先苟不知法



迪志文化出版有限公司出版



之所歸未免於過差爾是故疾病之生不勝其衆要其所屬不出乎五運六氣而已誠能於此審察而得其機要然後為之治又必使之各應於運氣之宜而不至有一毫差誤之失若然則治病求屬之道庶乎其無愧矣至真要大論曰審察病機無失氣宜意蘊諸此嘗謂醫道有一言而可以盡其要者運氣是也天為陽地為陰陰陽二氣各分三品謂之三陰三陽然天非純陽而亦有三陰地非純陰而亦有三陽故天地上下各有風熱

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

火濕燥寒之六氣其幹旋運動乎兩間者而又有木火土金水之五運人生其中臟腑氣穴亦與天地相為流通是知衆疾之作而所屬之機無出乎是也然而醫之為治當如何哉惟當察乎此使無失其宜而後可若夫諸風掉眩皆屬肝木諸痛痒瘡皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土諸氣膈鬱皆屬肺金諸寒收引皆屬腎水此病屬於五運者也諸暴強直皆屬於風諸嘔吐酸皆屬於熱諸躁擾狂越皆屬於火諸瘧強直皆屬於濕諸澁枯



迪志文化出版有限公司出版

涸皆屬於燥諸病水液澄徹清冷皆屬於寒此病機屬於六氣者也夫惟病機之察雖曰既審而治病之施亦不可不詳故必別陰陽於疑似之間辨標本於隱微之際有無之殊者求其有無之所以殊虛實之異者責其虛實之所以異為汗吐下投其所當投寒熱溫涼用其所當用或逆之以制其微或從之以導其甚上焉以遠司氣之犯中焉以辨歲運之化下焉以審南北之宜使小大適中先後合度以是為治又豈有差殊乖亂之失

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

耶又考之內經曰治病必求其本本草曰欲療病者先察病機此審病機之意也六元正紀大論曰無失天信無逆氣宜五常大論曰必先歲氣無伐天和此皆無失氣宜之意也故素問靈樞之經未嘗不以氣運為言既曰先立其年以明其氣復有以戒之曰治病者必明天道地理陰陽更勝既曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工矣諄諄然若有不能自己者是豈聖人私憂過計哉以醫道之要悉在乎此也觀乎原病



迪志文化出版有限公司出版

式一書比類物象深明乎氣運造化之妙其於病機氣宜之理不可以有加矣

能合色脈可以萬全

欲知其內者當以觀乎外診於外者斯以知其內蓋有諸內者形諸外苟不以相參而斷其病邪之逆順不可得也為工者深燭厥理故望其五色以青黃赤白黑以合於五臟之脈窮其應與不應切其五脈急大緩濇沈以合其五臟之色順與不順誠能察其精微之色診其

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

微妙之脈內外相參而治之則萬舉萬全之功可坐而致矣素問曰能合色脈可以萬全其意如此原夫道之一氣判而為陰陽散而為五行而人之所稟皆備焉夫五脈者天之真行血氣通陰陽以榮於身五色者氣之華應五行合四時以彰於面惟其察色按脈而不偏廢然後察病之機斷之以寒熱歸之以臟腑隨証而療之而獲全濟之效者本於能合色脈而已假令肝色如翠羽之青其脈微弦而急所以為生若浮濇而短色見如

草滋者豈能生乎心色如雞冠之赤其脈當浮大而散所以為順若沈濡而滑色見如衄血者豈能順乎脾色如蟹腹之黃其脈當中緩而大所以為從若微弦而急色見如枳實者豈能從乎肺色如豕膏之白其脈當浮濇而短所以為吉若浮大而散色見如枯骨者豈能吉乎以至腎色見如烏羽之黑其脈沈濡而滑所以為生或脈來緩而大色見如焰者死死生之理夫惟診視相參既以如此則藥証相對厥疾弗瘳者未之有也抑嘗

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

論之容色所見左右上下各有其部脈息所動寸關尺中皆有其位左頰者肝之部以合左手關位肝膽之分應於風木為初之氣顏為心之部以合於左手寸口心與小腸之分應於君火為二之氣鼻為脾之部合於右手關脈脾胃之分應於濕土為四之氣右頰肺之部合於右手寸口肺與大腸之分應於燥金為五之氣頤為腎之部以合於左手尺中腎與膀胱之分應於寒水為終之氣至於相火為三之氣應於右手命門三焦之分



也若夫陰陽五行相生相勝之理當以合之於色脈而推之也是故脈要精微論曰色合五行脈合陰陽十三難曰色之與脈當參相應然而治病萬全之功苟非合於色脈者莫之能也五臟生成篇云心之合脈也其榮色也夫脈之大小滑濇沈浮可以指別五色微甚可以目察繼之以能合色脈可以萬全謂夫赤脈之至也喘而堅白脈之至也喘而浮青脈之至也長而左右彈黃脈之至也大而虛黑脈之至也上堅而大此先言五色

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

治病必求於本

將以施其療治之法當以窮其受病之源蓋疾病之原不離於陰陽之二邪也窮此而療之厥疾弗瘳者鮮矣良工知其然謂夫風熱火之病所以屬乎陽邪之所客

病既本於陽苟不求其本而治之則陽邪滋蔓而難制濕燥寒之病所以屬乎陰邪之所客病既本於陰苟不求其本而治之則陰邪滋蔓而難圖誠能窮原療疾各得其法萬舉萬全之功可坐而致也治病必求於本見於素問陰陽應象大論者如此夫邪氣之基久而傳化其變証不勝其衆也譬如水之有本故能洊至汪洋浩瀚派而趨下以漸大草之有本故能荐生莖葉實秀而在上以漸蕃若病之有本變化無窮苟非必求其本而治之欲去深感之患不可得也今夫厥陰為標風木為本其風邪傷於人也掉搖而眩轉瞤動而癱瘓卒暴強直之病生矣少陰為標君火為本其熱邪傷於人也瘡瘍而痛痒暴注而下迫水液渾混之病生矣少陽為標相火為本其火邪傷於人也為熱而脅癭躁擾而狂越如喪神守之病生矣善為治者風淫所勝平以辛涼熱淫所勝平以鹹寒火淫所勝平以鹹冷以其病本於陽必求其陽而療之病之不愈者未之有也太陰為標濕

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



土為本其濕邪傷於人也腹滿而身腫按之而沒指諸  
瘕強直之病生矣陽明為標燥金為本其燥邪傷於人  
也氣滯而臍鬱皮膚以皴揭諸澁枯涸之病生矣太陽  
為標寒水為本其寒邪傷於人也吐利而腥穢水液以  
清冷諸寒收引之病生矣善為治者濕淫所勝平以苦  
熱燥淫所勝平以苦溫寒淫所勝平以辛熱以其病本  
於陰必求本陰而治之病之不愈者未之有也豈非將  
以施其療疾之法當以窮其受病之源者哉抑嘗論之  
邪氣為病各有其候治之之法各有其要亦豈止於一  
端而已其在表者汗而發之其入裏者下而奪之其在  
高者因而越之謂可吐也慄悍者按而收之謂按摩也  
藏寒虛奪者治以灸炳脈病攣痺者治以針刺血實畜  
結腫熱者治以砭石氣滯痿厥寒熱者治以導引經絡  
不通病生於不仁者治以醪醴血氣凝泣病生於筋脈  
者治以熨藥始焉求其受病之本終焉蠲其為病之邪  
者無出於此也噫昔黃帝處於法宮之中坐於明堂之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



迪志文化出版有限公司出版

上受業於岐伯傳道於雷公曰陰陽者天地之道也綱紀  
萬物變化生殺之妙蓋有不測之神斡旋宰制於其間  
也人或受邪生病不離於陰陽也病既本於此為上者  
豈可他求哉必求於陰陽可也至真要大論曰有者求  
之無者求之此求其病機之說與夫求於本其理一也  
大抵四時以胃氣為本然治病必須先診六脈皆有胃  
氣外證雖重病亦可治胃氣未絕則藥力運行而輪散  
於皮毛經絡故易治而生胃氣既絕則藥雖對證不能  
使其運用以輸精於皮毛經絡真臟獨見而藥不及矣  
遂成不治之證也東垣曰脈貴有神有神者有胃氣之  
謂也故諸經方論皆曰有病早治療不令邪氣深入所  
以聖人治未病不治已病正謂此也

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

### 附十二經脈歌

○手太陰肺中焦生下絡大腸出貴門上膈屬肺從肺  
系系橫出腋膈中行肘臂寸口上魚際大指內側爪  
甲根支絡還從腕後出接次指屬陽明經此經多氣



迪志文化出版有限公司出版



而少血是動則病喘與咳肺脹膨膨缺盆痛兩手交  
脅為臂厥所生病者為氣咳喘渴煩心脅滿結臑臂  
之外前廉痛小便頻數掌中熱氣虛肩背痛而寒氣  
盛亦疼風汗出欠伸少氣不足息遺失無度溺變別  
○陽明之脈手大腸次指內側起商陽循指上連出合  
谷兩筋歧骨循臂肪入肘外廉循臑外肩端前廉柱  
骨傍從肩下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆  
上入頸斜貫頰前下齒當環出人中交左右上俠鼻

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

孔注迎香此經血盛氣亦盛是動頸腫并齒痛所生  
病者為鼻衄目黃口乾喉痺生大指次指難為用肩  
臑外側痛相仍

○胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出俠口繞承  
漿頤後大迎頰車裏耳前髮際至額顱支下人迎缺  
盆底下膈入胃絡脾宮直者缺盆下乳內一支幽門  
循腹中下行直合氣沖逢遂由髀關抵膝臢腓□中  
指內關同一支下膝注三里前出中指外關通一支

別走足跗指大指之端經盡矣此經多氣復多血是  
動欠伸面顏黑淒淒惡寒畏人忽聞木聲心振懼  
登高而歌棄衣走甚則腹脹乃貴響凡此諸疾皆髀  
厥所生病者為狂瘧濕溫汗出鼻流血口喎唇裂又  
喉痺膝臢疼痛腹脹結氣膺伏兔臢外廉足跗中指  
俱痛徹有餘消穀溺色黃不足身前寒振慄胃房脹  
滿食不消氣盛身前皆有熱

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

○太陰脾起足大指上循內側白肉際核骨之後內踝  
前上臑循臢脛膝裏股內前廉入腸中屬脾絡胃與  
膈通俠喉連舌散舌下支絡從胃注心宮此經氣盛  
而血衰是動具病氣所為食入即吐胃脘痛更兼身  
體痛難移腹脹善噫舌木強得後與氣快然衰所生  
病者舌亦痛體重不食亦如之煩心心下仍急痛泄  
水瘡痂寒瘧隨不卧強立股膝腫疽發身黃大指痠  
○手少陰脈起心中下膈直與小腸通支者還從肺系  
走直上咽喉繫目瞳直者上肺出腋下臑後肘內少



海從臂內後廉抵掌中兌骨之端注少冲多氣少血屬此經是動心脾痛難任渴欲飲水咽乾燥所生脇痛目如金脇臂之內後廉痛掌中有熱向經尋

○手太陽經小腸脈小指之端起少澤循手外廉出踝中循臂骨出肘內側上循臑外出後廉直過肩解繞肩甲交肩下入缺盆內向腋絡心循咽嗑下膈抵胃屬小腸一支缺盆貫頸頰至目兌骨却入耳復從耳前仍上頰抵鼻升至目內眥斜絡於顴別絡接此經

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

少氣還多血是動則病痛咽嗑領下腫兮不可顧肩如拔兮臑似拆所生病兮主肩臑耳聾目黃腫腮頰肘臂之外後廉痛部分猶當細分別

○足經太陽膀胱脈目內眥上顴額尖支者巔上至耳角直者從巔腦後懸絡腦還出別下項仍循肩膊俠脊邊抵腰脊腎膀胱內一支下與後陰連貫臀斜入委中穴一支膊內左右別貫胛俠脊過髀樞臂內後廉膕中合下貫腓內外踝後京骨之下指外側是經

血多氣少也是動頭疼不可當項如拔兮腰似折髀強痛徹脊中央膕如結兮臑如裂是為踝厥筋乃傷所生瘡痔小指廢頭顫頂痛目色黃腰尻膕脚疼連背淚流鼻衄及顛狂

○足經腎脈屬少陰小指斜透湧泉心然骨之下內踝後別入跟中臑內浸出膕內廉上股內貫脊屬腎膀胱臨直者屬腎貫肝膈入肺循喉舌本尋支者從肺絡心內仍至膕中部分深此經多氣而少血是動病

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

饑不欲食喘嗽唾血喉中鳴坐而欲起面如垢目視晄晄氣不足心懸如饑常惕惕所生病者為舌乾口熱咽痛氣賁逼股內後廉并脊疼心腸煩痛疽而澀痿厥嗜卧體怠墮足下熱痛皆腎厥

○手厥陰心主起胸屬包下膈三焦宮支者循胸出脇下脇下連腋三寸同仍上抵腋循臑內太陰少陰兩經中指透中冲支者別小指次指絡相通是經少氣原多血是動則病手心熱肘臂攣急腋下腫甚則胸



脇支滿結心中澹澹或大動善笑目黃面赤色所生之者為心煩心痛掌熱病之則

○手經少陽三焦脈起自小指次指端兩指歧骨手腕表上出臂外兩骨間肘後臑外循肩少陽之後交別傳下入缺盆臆中分散絡心膈高裏穿支者臆中缺盆上上項耳後耳角旋屈下至頤仍注頰一支出耳入耳前却從上關交曲頰至目內眥乃盡焉斯經少血還多氣是動耳鳴喉腫痺所生病者汗自出耳

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

後痛兼目銳眥肩臑肘臂外皆疼小指次指亦如癢  
○足脈少陽膽之經始從兩目銳眥生抵頭循角下耳後腦空風池次第行手少陽前至肩上交少陽右上缺盆支者耳後貫耳內出走耳前銳眥循一支銳眥大迎下合手少陽抵項根下加頰車缺盆合入胸貫膈絡肝經屬膽仍從脇裏過下入氣街毛際縈橫入髀厭環跳內直者缺盆下腋膺過季脇下髀厭內出膝外廉是陽陵外輔絕骨踝前過足跗小指次指分

一支別從大指去三毛之際接肝經此經多氣乃少血是動口苦善太息心脇疼痛難轉移面塵足熱體無澤所生頭痛連銳眥缺盆腫痛併兩腋馬刀挾癭生兩旁汗出振寒痠瘕疾胸脇髀膝至髻骨絕骨踝痛及諸節

○厥陰足脈肝所終大指之端毛際叢足跗上廉太沖分踝前一寸入中封上踝交出太陰後循臍內廉陰股充環繞陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽逢上貫膈裏

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

布脇肋俠喉項頰目繫同脈上巔會督脈出支者還生目系中下絡頰裏還唇內支者便從膈肺通是經血多氣少焉是動腰疼俛仰難男疝女人大腹腫面塵脫色及咽乾所生病者為胸滿嘔吐洞泄小便難或時遺溺并狐疝臨証還須仔細看

#### 火溫分治論

肥人氣虛生寒寒生濕濕生痰瘦人血虛生熱熱生火火生燥故肥人多寒濕瘦人多熱燥也夫以人形分寒



濕熱燥此得之於外然其中臟腑為病亦有寒濕熱燥之殊不可不知玉匱金鑰曰肝臟由來同火治三焦包絡都無異脾胃常將濕處求肺與大腸同濕類腎與膀胱心小腸寒熱臨時旋商議惡寒表熱小膀胱發熱表寒心腎熾十二經最端的四經屬火四經濕四經有熱有寒時攻裏解表細消息裏熱表寒宜越竭表熱表寒宜汗釋濕同寒火同熱寒熱到頭無兩說六分分來火熱寒寒熱中停真浪舌熱寒格拒病機深亢則害兮承

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

迺制緊寒數熱脈正邪標本治之真妙訣休治風休治燥治得火時風燥了當解表時莫攻裏當攻裏時莫解表表裏如或兩可攻後先內外分多少治濕無過似決川此箇筌蹄最分曉感謝軒岐萬世恩爭柰醯雞笑天小

### 虛實分治論

夫疾病之生也皆因外感內傷生火生濕濕而生熱火而生痰四者而已審其為少壯新病是濕則燥之是火



迪志文化出版有限公司出版

則瀉之是濕而生熱則燥濕而兼清熱是火而生痰則瀉火而堅豁痰無餘蘊矣審其為老衰久病又當半攻半補焉如氣虛而有濕熱痰火則以四君子湯補氣而堅燥濕清熱豁痰瀉火如血虛而有痰火濕熱則以四物湯補血而堅瀉火豁痰清熱燥濕如此則補攻兼施庶乎可也予故曰少壯新病攻邪為主老衰久病補虛為先若夫陰虛火動脾胃衰弱真陰者水也脾胃者土也土雖喜燥然太燥則草木枯槁水雖喜潤然太潤則

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一

草木濕爛是以補脾胃補腎之劑務在潤燥得宜亦隨病加減焉

### 附病機賦

竊謂醫雖小道迺寄生死最要變通不宜固執明藥脈病治之理藥性脈訣悉望聞問切之情望色聞聲寒熱溫涼平和之氣辛甘淡苦酸鹹之味升降浮沉之性宣通瀉補之能脈究浮沉遲數滑濇之形表裏寒熱實虛之應阿阿嫩柳之和弦鈎毛石之順藥用君臣佐



迪志文化出版有限公司出版



使次之病之謂君最多輔君之謂臣脈分老幼瘦肥老人  
小兒脈數瘦者藥過天地之精藥宜切病則切病矣脈  
者氣血之表脈貴有神謂脈中有神也病有外感內傷風寒  
暑濕燥火之機治用宣通瀉補滑澀溫燥重輕之劑外  
感異乎內傷內傷乃有餘之症寒證不同熱證傷寒直  
為寒傷熱傳外感宜瀉而內傷宜補寒證可溫而熱證  
可清補瀉得宜須臾病癒溫清失度頃刻人亡外感風  
寒宜分經而解散外感風寒傳變不一內傷飲食可調  
胃以消溶內傷飲食只在一處胃陽主氣司納受陽常  
有餘脾陰主血司運化陰常不足胃過六府之本受能納  
化方可液脾為五臟之源能運化氣脈胃氣弱則百病生  
脾陰足而萬邪息調理胃脾為醫中之王道節戒飲食  
過却病之良方病多寒冷鬱氣氣鬱發熱寒謂風寒外  
冷謂生冷內傷午後發熱或出七情動火火動生痰有因行藏動靜  
以傷暑邪或是出入雨水而中濕氣亦有飲食失調而  
生濕熱倘或房勞過度以動相火已上六條制伏相火

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



迪志文化出版有限公司出版

要滋養其真陰已下六條祛除濕熱須燥補其脾胃外  
濕宜表散內濕宜淡滲陽暑可清熱陰暑可散寒尋火  
尋痰分多分少而治究表裏或汗或下而施是風寒  
謂溫散也是生冷痰因火動治火為先火因氣生理氣  
則下之謂溫利也痰因火動治火為先火因氣生理氣  
為本治火輕者可降重者從其性而升消理氣微則宜  
調甚則究其源而發散實火可瀉或瀉表而或瀉裏指內  
感虛火宜補或補陰而或補陽傷也暴病之謂火怪病  
之謂痰寒熱濕燥風五痰有異溫清燥潤散五治不同  
寒痰溫之熱痰清之濕痰有因火而生痰有因痰而生  
燥之燥痰潤之風痰散之  
火或鬱久而成病或病久而成鬱金水木火土五鬱當  
分泄折達發奪五法宜審金鬱泄之水鬱折之木鬱  
則生火生痰而成病病則耗氣耗血以致虛病有微甚  
治有逆從微則逆治以寒藥治熱甚則從攻以寒藥治  
藥以熱藥治病有本標急則治標緩則治本分攻補  
寒佐以寒藥虛而用補實而用攻少壯新邪專攻則是老衰久病兼  
為補為規久病兼補虛而兼解鬱陳癥或蕩滌而或消

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷一



迪志文化出版有限公司出版

溶積在胃腸可下而瘕塊居經絡宜消而痊女人氣滯  
於血宜開血而行氣男子陽多乎陰可補陰以配陽莖  
蓉山藥男子之佳珍補陰故也香附縮砂女人之至寶行氣故也  
氣病血病二者宜分陽虛陰虛兩般勿紊陽虛氣病晝  
重而夜輕自子至巳為晝血病陰虛晝輕而夜重自午至亥為夜陽虛  
生寒寒生濕濕生熱陽為真火陰虛生火火生燥燥生風  
陰為真水陽盛陰虛則生火火逼血而錯輕妄行陰盛陽  
虛則生寒寒滯氣而週身浮腫陽虛畏外寒陽虛不能外故畏  
欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷一  
外陰虛生內熱陰虛不能配補陽補氣用甘溫之品  
滋陰滋血以苦寒之流調氣貴用辛涼氣屬陽無形者也氣鬱則發熱  
故宜用辛涼之藥以散之和血必須辛熱血屬陰有形者也血積則  
之陽氣為陰血之引導陰血遇陽氣之依歸陽虛補陽  
而陰虛滋陰氣病調氣而血病和血陰陽兩虛惟補其  
陽陽生而陰長氣血俱病只調其氣氣行而血隨藏水  
發水以節陽氣之燔滋水養水以制心火之亢火降水  
升斯人無病陰平陽秘我體長春小兒純陽而無陰老

者多氣而少血肥人氣虛有痰宜豁痰而補氣瘦者血  
虛有火可瀉火以滋陰膏梁無厭發癰疽熱燥所使痰  
薄不堪生腫脹寒濕而然北地聳高宜清熱而用燥南  
方洿下可散濕以溫寒  
欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷一  
仁齋直指卷一



欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷二

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣唐作梅

欽定四庫全書

仁齋直指卷二

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

證治提綱

得病有因

治病活法雖貴於辨受病之證尤貴於問得病之因風則走注寒則拘攣暑則煩渴濕則重滯此受病之證然爾或耗於交淫或觸於驚怒或傷於酒食或深居簡出

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二

而受暑自非委曲尋問其因則以意治病豈不繆耶有

人喉間麻癢醫問其平日所嗜曰常喫鴿子乃知鴿食半

夏苗以生薑治之而愈有人痰熱昏迷不醒醫問其喜食

者何有曰酷好煎炙飛禽乃用紅圓子小七香圓和之而

入朱砂膏為小圓薄荷泡湯灌下須臾即甦有人暑月深

藏不出因客至于窻下忽爾倦怠力疲自作補湯得之反

劇醫問其由連進兩服香薷飲作效舉此為例其他可推

古云醫者意也苟不究其得病之因其何以為意會



治病當先救急

治病如奕碁當先救急急者何救其重而略其輕也假如病人發熱經日服通利之劑泄瀉不止嘔吐大作粥藥不入而熱猶未已治法略去發熱一節且以定嘔進食為先惟人參生薑入些炙甘草煎湯調蘊合香圓嚙下養正丹斟酌圓數與之進劑以還嘔吐自定飲食漸進泄瀉亦自不作是元氣既正縱有微熱特假熱耳人參川芎柴胡甘草調理之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

治病如操舟

操舟在手當風波震蕩之衝一有轉移則舟覆矣醫權藥衡主持在我不可偏徇病家所欲尤不可張皇使病人驚間有病家粗識皮膚辨難反覆萬物惑焉又有瘥後觸犯再復隱諱不言須詰問其由庶得對病施藥

用藥中病不必盡劑

治寒以溫治熱以涼但中病即止矯枉則過正也蓋涼藥頻施必至於嘔惡沈冷溫藥頻施必至於煩燥開熱

所貴酌量權度一毫無過用焉是為活法

經常用藥自有奇功

人有中年以上素挾風痰腹中時痛忽爾感冒雖已發散寒邪無復發熱頭疼之苦柰何風痰嘔吐俱作諸藥罔功但用茯苓二陳湯加南木香白豆蔻作劑入生薑烏梅同煎調蘇合香圓貳粒嚙下白圓子貳拾圓連續兩服嘔止痰消自然思食繼是以北參川芎橘皮白豆蔻炙甘草調之若通小便則於內加麥門冬若通大便

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

則於內加枳殼以嚙神保圓肆伍圓大小腑一通頓遂勿藥之喜

論肝脾主病

經曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食蓋肝脈可以知風寒之出入脾脈可以驗飲食之盈虧肝亦主血脾亦主痰以其脈之虛實而益損之以其病之關繫而對治之君請擇斯二者

病人尺脈洪大





此病在下部也當疎利而出之脈洪大主熱多是大小便不通或小腹結急臍下蓄血或腎氣攻刺發作奔豚或下焦停水外腎虛腫或風邪攻腎脚痺腰疼或腎臟風毒身下瘡癢當隨證體認以對病之劑主之大槩通利為第一義臨診精思而熟審焉

### 水氣腎氣血氣風毒擒縱治法

此等證候先以青皮陳皮枳殼北梗半夏紫蘇生薑甘草解其寒邪調其衛氣然從斟酌用十棗湯吞養正丹

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

輕者却只用神保圓夾青木香圓以五靈脂入烏梅濃蜜煎湯嚥下錢氏宣風散亦可以疎利風毒俟大便通快流行其痛已減繼是二陳湯加當歸川芎木香縮砂輩調理之

### 治痢要訣

痢出於積滯積物積也滯氣滯也物積欲出氣滯而不與之出所以下墜裏急乍起乍止日夜凡百餘度病家所請莫不求其止孰知物積氣滯致有如是之證耶繼



迪志文化出版有限公司出版

人但見有上項證候不論色之赤白脈之大小壹皆以通利行之物積用巴豆大黃輩氣滯用枳殼桔梗青皮蓬朮輩二者兼濟必能收功其間佐以黃連阿膠圓效驗尤著蓋痢疾多因傷暑伏熱酒麵炙煇醞釀而成其阿膠尤大腸之要藥有熱毒留滯則能疎導無熱毒留滯則能安平市肆或無圓子即以炒阿膠當歸青皮赤茯苓黃連作劑入烏梅濃蜜同煎最能蕩滌惡穢積滯既去遍數自疎嗣是却以木香茯苓縮砂白豆蔻陳皮甘草調之自然喜食食則糟粕入於大腸然後真人養臟湯易簡斷下湯可止則止矣

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

### 簡徑治痢

諸熱痢血痢及痢後大腸裏痛用蘿蔔截碎研細濾清汁壹小盞蜜水相半壹盞同煎早午食前服日晡以米飲下黃連阿膠圓百粒無蘿蔔蘿蔔子代之○又法熱痢舊年白梅并好茶蜜水各半煎服冷痢生薑汁蜜水各半煎服仍兼木香生肉豆蔻為佐蜜最治痢



迪志文化出版有限公司出版

薑茶治痢法

薑能助陽茶能助陰二者皆能消散又且調平陰陽況於暑毒酒食毒皆能解之也不問赤白冷熱通用之老生薑切如豆許與茶葉等分用新水煎服東坡醫文潞公作效

禁口痢

下痢禁口不食雖曰脾虛蓋亦熱氣閉隔心胸所致也俗用木香則失之溫用山藥則失之閉惟真料參苓白朮散加石菖蒲末以道地粳米飲乘熱調下或用人參茯苓石蓮子肉入些菖蒲與之曾次一開自然思食

瘧痢用常山罌粟殼

常山治瘧罌粟殼治痢人皆薄之固也然下痢日久腹中無痛當澀腸則豈容不澀瘧以痰水作恙法當吐痰逐水又豈容不為之吐下於斯時也不有罌粟殼

以為對治乎但中間有藥輔之耳

治瘧要訣

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二

凡瘧皆因腹中停蓄黃水惟水不行所以寒熱不歇此瘧家受病之處也治法暑瘧純熱以香薷散加青皮北大黃兩箇烏梅同煎侵晨溫服寒瘧多寒以二陳湯加青皮良薑多用薑同煎侵晨吞神保圓五粒並欲取下毒水則去其病根寒熱自解

發瘧嘔吐勿用常山

有中年人臟腑以虛大便常滑忽得瘧疾嘔吐異常惟專用人參為能止嘔其他瘧劑並不可施遂以茯苓二

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二

陳湯加人參縮砂而倍用白豆蔻進一二服病人自覺氣脈頗消於是寒熱不作蓋白豆蔻能消能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平繼今遇有嘔吐發瘧之證或其人素嘔而發瘧謹勿用常山惟以生蘿蔔生薑各研自然汁半盞入蜜三四匙烏梅兩箇同煎吞局方雄黃圓三四粒候其利下惡血痰水即以人參川芎茯苓半夏縮砂甘草調之萬一嘔不止而熱不退却用真料小柴胡湯多加生薑主治其或嘔吐大作而又發熱且先與



治瘧生熱飲嘔定以小柴胡湯繼之

瘧有冰有血

水即水飲也血即瘀血也惟水飲所以作寒熱惟瘀血所以增寒熱常山逐水利飲固也苟無行血藥品佐助其問何以收十全之效耶繼自今瘧家或衄血或唾血或大便血絲或月候適來適去皆是血證當以常山草果檳榔青皮烏梅甘草作劑於內加五靈脂桃仁為佐入生薑濃蜜同煎以主治之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

瘧證寒熱不歇有根

凡瘧固當以風寒暑濕別而治之或汗或下或吐或溫活人書之格法雖虛扁不能達矣然嘗見瘧之經久而不歇其故何耶有根在也根者何曰飲曰水曰敗血是爾惟瘧為瘧之母惟敗血為暑熱之毒惟飲與水皆生寒熱故暑之脈虛水與飲之脈沈脈瘧之脈結聚挾水飲者為之逐水消飲結瘧者脇必痛為之攻瘧不敗血暑毒隨證而疎利之寒熱不除吾未之信

常山治瘧須用大黃為佐

瘧家多蓄痰涎黃水常山為能吐之利之是固然爾其有純熱發瘧或蘊熱內實之證投以常山大便點滴而下似泄不泄須用北大黃為佐大泄數行然後獲愈或曰巴豆圓子相依而行亦能泄也是又不然巴豆攻於下積苟欲蕩滌血熱不可以無大黃凡瘧方來與正發不可服藥服藥在於未發兩時之先否則藥病交爭轉為深害

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

寒熱似瘧

此傷寒一證而實非瘧瘧也其人肝脈浮盛頭痛怯風大抵小柴胡湯加青皮紫蘇主之嘔者多用生薑渴者多加烏梅其或傷暑兼之小柴胡湯加香薷入生薑烏梅同煎可也抑猶有說焉寒熱之根非通利不能除也萬一其根未鋤又當以麻仁圓神保圓輩與之是亦先解後攻之意

吐汗下治瘧



治瘧總要不過吐汗下而已當下而下不盡腹中尚有餘痛或大便一泄之後不復再泄但時時點滴而出者須再下之大黃以佐常山可也當汗而汗不匝或頭汗至脅而手足無汗者須周浹一身而汗之青皮以佐紫蘇可也所謂吐者須出盡其水飲若作吐劑常山豈容輟哉能於三者究竟焉收效必矣

瘧後調理

瘧之為厲大抵連綿有病瘵以後或飲食失節或恚怒

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

傷中或梳洗感風又再發者何以處之曰熱多者二陳湯加青皮甘草熱少者二陳湯加青皮草果堅守胃氣而已二藥並用生薑烏梅蜜水同煎空心進劑其間幹運更用巴豆圓子藥疎利大便以泄毒氣其何厲之有或服巴藥過多以致腹痛可用生薑甘草煎湯溫和解之甘草生薑解諸藥毒

退熱

退熱用涼藥不可十分盡或餘熱些少未去不足關心



自然無事否則熱去則寒起古人戒之一方多用川芎茯苓甘草少用白朮麤末水煎病後和胃收斂浮陽屢試得效

柴胡退熱不及黃芩

若藥弗瞑眩厥疾弗瘳世俗治熱例用柴胡最為穩當至若黃芩一輩則指為大寒不敢用之不思藥病不相當鮮克有濟繼今退熱而熱不去者須用黃芩

退熱有法

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

凡壯熱煩燥用柴胡黃芩大黃解利之其熱乍輕而不退盍用黃芩川芎甘草烏梅作劑或用黃連生地黃赤茯苓同煎臨熟入燈心壹捻主之其效亦速蓋川芎生地黃皆能調血心血調其熱自退

小兒風證解熱有三

痰盛搐掣大便秘結當以枳殼大黃靈脂甘草利之小便赤澁心熱狂吼當以辰砂五苓散入燈心行之既利大腸矣利小便矣而風證乍作面色乍紅常有怫鬱之





狀何耶表熱表邪猶未解也人參羌活散加青皮紫蘇薄荷主之參蘇飲亦可矣

滯血發熱

其人脈濇必有漱水之證必有嘔惡痰涎之證必有兩脚厥冷之證亦必有小腹結急之證或唾紅或鼻衄此皆滯血作熱之明驗也用藥不止於柴胡黃芩當以川芎白芷桃仁五靈脂甘草佐之大便秘結者於中更加大黃濃蜜使滯血一通黑物流利則熱不復作

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

佐助小柴胡湯

傷寒留蓄惡血內外俱熱昏潰譫語亦有耳聾虛鳴之證與少陽經受病相似如服小柴胡湯不效當以黃連壹分赤茯苓半分剉細入燈心煎與之男女通用凡大小產熱入血室小柴胡湯力所不及者於內加五靈脂仍以黃連赤茯苓湯佐之蓋心生血黃連茯苓皆清心涼血之劑所以收功若夫疏利血毒則活人書桃仁承氣湯有餘勇矣



迪志文化出版有限公司出版

腎熱用五苓散

腎氣內虛邪熱流入於腎經其脈洪大小便頻數所出澀少赤濁而痛此不可以牽牛行之治法瞿麥燈心煎湯調真料五苓散滲泄其熱邪水竇一通勿藥有喜

下後大腸熱腫墜重

諸有裏熱法當通利大便然下後腸頭熱腫而墜重者此更有熱有瘀血挾氣而蓄在下焦也更用黃連黃芩大黃輩下之於內以炒阿膠炒枳殼百藥煎為佐多入

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

濃蜜并烏梅同煎薑錢四五片可也

通利大便有法

凡通利大便若用大黃巴豆等藥而大便不通者陰陽關隔水火不升降故也有熱者來復丹夾三黃圓薄荷泡湯下無熱者養正丹夾神保圓橘皮煎湯下

飯後隨即大便

脾腎交濟所以有水穀之分脾氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而大腑為之餐泄也治法二神圓用故紙肉



迪志文化出版有限公司出版

豆蔻修合或不換金正氣散吞安腎圓主之蓋脾腎之氣交通則水穀自然尅化此所謂妙合而凝者也

### 脾泄腎泄

有脾泄有腎泄脾泄者肢體重著中脘有妨面色虛黃腹肚微滿腎泄者膚腠怯冷腰脊酸疼上咳面鰲臍腹乍痛治脾泄用蒼朮白朮厚樸乾薑木香生肉豆蔻輩治腎泄用補骨脂及安腎圓震靈丹輩

### 腎泄

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

諸有泄瀉用不換金正氣散除濕湯之類以去風濕以安腸胃此上品藥也次則溫脾養胃之劑投之是為正法然用之而不作效抑且腹痛走上走下或臍間隱痛腰脊痠骨節軟弱面色鰲悴尺脈虛弱病安在哉曰此腎泄也當以炒故紙生薑薑官桂木香當歸輩主之仍以安腎圓為佐其或腎水下涸心火上炎燥渴溺多引飲無度此陰陽離絕也識者憂焉

### 大便脫泄白膿

大人小兒泄痢無已其後變作白膿點滴而下或於糞尾見之為之溫脾不愈法當溫腎蓋腎主骨髓白膿者骨髓之異名也要之始作白痢其氣腥臭已經轉下而且淹延日久無所謂痢矣今之白膿全無腥臭面色微黑骨力羸弱的見腎虛合用炒故紙當歸木香乾薑官桂主之嗣是少與震靈丹或玉華白丹為佐雖然又有婦人一證似痢非痢泄下白膿心腹暴痛吼不忍聞此當為之通血投通血之劑却以養正丹輔之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

### 脫肛

脫肛一證氣聚不散也裏急而不得出外脹而不得入先以枳殼散作劑又以枳殼燒灰存性細末摻傳或津唾調傳氣散則腫消矣仍用生薑汁調五苓散如膏入新水研散略煎吞黃連阿膠圓雖然此論肛門挾熱而腫脹也其或腸中虛薄不收則理中湯釣腸圓養臟湯輩主治烏賊骨木賊草傳之

詳見脫  
肛類

### 小便不通



大凡水道不行其本在腎合用牽牛澤瀉其末在肺合用葶藶桑皮二者得兼必然中病其間更以木通滑石佐之又能透達雖然大便小便脈絡相貫也人有多日小便不通但用神保圓北亭圓輩大瀉數行小腸自利

石淋

沙淋凝脂而易散石淋結塊而難消攻療石淋專以枳殼散空心食前吞來復丹為妙但恐太陰玄精石不得其真惟得真料而常服之關絡開通忽爾大便洞泄石

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

塊自小便出

轉胞

轉胞證候孕婦多有之患在忍縮小便或喜食煎燂或飽後為熱所迫遂使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯外水不能入膀胱內水不能出膀胱淋瀝急數每欲尿時痛不可言大便亦裏急頻併似痢非痢必以手從胷間按至臍下庶可立出小便否則逆上出而不禁甚者因此腹脹浮腫治法用涼藥疎利小腸中熱仍

與通泄大腸迨其腹中攪痛大便下則溺胞隨即歸正於是小便順流葵子散見附婦人摘竒方

孕婦胎熱似痢

孕婦七八箇月傷暑傷熱以致子煩胎氣迫近於上咽喉窒礙心腹脹滿下墜似痢每登廁時坐一炊久忽爾氣下方得大便一通世俗率用痢藥不知病在胎熱子煩可小柴胡湯下黃連阿膠圓或用炒阿膠淨黃連各一分枳殼北黃半之分作兩劑烏梅薑蜜煎服俟其

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

大便調導却以川芎茯苓縮砂甘草繼之若五苓散感應圓香連駐車非其治也

下焦蓄血

血之為病冒悶煩燥迷忘驚狂痰嘔汗多骨熱肢冷此外證然爾何以知其蓄在下焦曰臍下結急外熱內痛尺脈洪而數也桃仁靈脂生地黃北大黃甘草利而逐之

產婦血塊築痛



此候因產斷趕血未盡所致世俗收生多就踏板趕血不思生產之時已坐草近地以矣產畢臟腑虛空又且近地趕血冷濕乘之風邪入之使敗疼凝為血塊是謂血母衝築硬痛非乳香沒藥延胡索五靈脂輩所能療也治法不換金正氣散加辣桂川芎白芷蓬朮乾薑同煎乘熱入法醋連進兩服冷濕風邪一散其塊自消散瘀皆從大小便而出凡新產須就床上趕血下帳避風

身體血滯作痛

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

身體疼痛非濕則痰固也人有挾刀鋸之驚而又餒在其中為風寒水濕所傷致使心竅凝滯於是經絡壅閉血不流行腸肉骨節為之刺痛治法當歸川芎芍藥白芷靈脂大黃甘草利之黑物小片而下其痛有瘳

身體胃腹隱熱隱疼拘急足冷

此血之為病也以其飲酒嗜慾伏熱受暑得之惟熱毒暑毒酒毒為能傷血瘀血未去新血不榮身體所以隱痛拘急其裏熱足冷者血之證也用柴胡黃芩青皮枳

殼靈脂桃仁木通甘草作劑多入大黃以利之俟其流利已盡小腹略無結急即以當歸川芎壹倍橘皮半夏枳殼北梗木通甘草平之調其氣血於是有瘳血屬於心木通以通其心竅心竅既通經絡之流行可知矣

血滯

人之一身不離乎氣血凡病經多日療治不痊須當為之調血血之外證痰嘔燥渴昏潰迷忘常喜湯水漱口不問男女老少血之一字請加意焉用藥川芎蓬朮桃

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

仁靈脂生地黃北大黃為要嘔甚者多加生薑以先利其宿瘀嗣是茯苓茯神川芎甘草調理之

血崩

素問云陰虛陽搏謂之崩此即血得熱則宣流之意也四物湯可以助陰生料枳殼散可以抑陽其間更以茯苓二陳湯和之使陰陽兩得其平血自循於經絡矣若夫衝任不固下元以虛以致血無關鎖則用膠艾湯加當歸木香嚙下震靈丹為妙





吐血

血隨氣行氣逆而上奔則血不循於經絡而湧吐矣人知吐血出於上焦有熱固也然能用柴胡黃芩蒲黃茅花等輩而不能用枳殼北梗青皮生薑烏梅佐之又不能用通利圓子以開其中脘導其大便則氣如何而下降血如何而下行吾恐逆奔而上有不可得而止之者若夫依前治法血止而後又當以人參川芎當歸茯苓橘皮半夏甘草為之調理虛則加木香熱則加柴胡壅則加桑皮荊芥尤在權衡

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

治渴有法

凡病人兼有燥渴之證用烏梅瓜蒌根乾葛甘草數輩皆不作效遂致引飲過多兩脚浮腫此證不可以為裏熱蓋腎水不上升心火不下降故也須用交感丹為主却以烏梅濃蜜生薑甘草煎湯嚥之腎水一升心火一降其渴自止脚亦不復腫矣

酒家有病勿用溫藥

有人飲酒過多因酒作病胃脘不快其氣捫隔服無數二陳湯竟無寸效由是不喜飲食復以調氣散投之致發大熱自後只用薄荷煎雞蘇圓麻仁圓日就痊愈乃知胃脘閉隔熱在上焦使然耳又有人酷好飲酒復感寒邪服不換金正氣散以致內熱愈熾煩渴且悶汗出如雨身體怯寒續後以小柴胡湯加枳殼白芍藥解之柴胡黃芩退熱枳殼寬中芍藥調榮止汗頓然痊愈然則酒家抱病其可妄以溫藥嘗試一中乎

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

傷寒筋惕肉瞤治法

筋惕身瞤發汗太過所致也古人以真武湯主之然真武湯能止其汗而不能定其瞤瞤者動也汗出表虛外風必入於腠理人知風以動之所以惕惕而自瞤而不知汗多則傷血血虛無以榮筋筋愈急而四體百骸愈為之瞤動治法不用驅風并發散等輩惟人參當歸川芎芍藥半夏茯苓甘草作劑以五靈脂為佐入生薑烏梅同煎自有神效右藥專於生血生血乃所以收汗其



或大便秘澀少加大黃以導之血脈一和不反掌而靜定矣

發瘥詳證

廬江劉寶云產寶所載方藥甚詳獨無產後中風角弓反張一證按產後中風因懷胎時多啗生冷脾胃受濕復經乳卧之後津液內竭履地太早脫著不時以致風邪乘虛入於足太陽之經其證發熱頭疼或時不熱喘息痰咳言語不倫漸覺牙關緊急十指微動如摸物之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

狀加以項背強直或啞或叫目睛直視腸滑不禁身如反弓轉側不仁如此十無一生活人書謂太陽發瘥是爾凡產後初得發熱常須審視若唇急舌蹇手指微動便以中風藥品急治之用藥歸荆湯獨活酒附在濕門獨荆散防風散續命湯見附婦人方中男女通用

胃脇痛引背上頭面兩手浮腫

腎虛不能納氣歸元氣逆而上奔故胃膈滿痛以手摩掌痛走背上又從背摩掌則其氣循脇泄於後分而痛

不作矣此氣之為病固也柰何腎虛又不能行水故水隨氣奔上乘於肺頭面兩手浮腫氣短而喘由是血化為水與之俱滯況其人舊來有風曰風曰水曰血曰氣四者合而為病其痛非常如沈香木香烏藥檳榔之類不能施其巧治法將何如曰先以二十四味流氣飲加獨活枳殼五靈脂炒牽牛入薑蜜烏梅同煎嚥下養正丹貳拾粒雄黃圓拾粒升降水火引導大便次用桑皮紫蘇木通阿膠當歸桃仁青皮桔梗炒芫花生大黃作劑依前煎以薑蜜烏梅取盡大便黑物即收全功

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

肚皮痛

腎虛不能行水加之酒麵無度醉後輒睡酒與水交聚於腹中而麵毒復纏滯其氣是以水滲於肚皮而作痛矣治法錢氏宣風散用蜜水煎嚥下神保圓俟其大便流利然後以青木香圓壹分安腎圓倍之用二陳湯入少鹽并生薑同煎空心嚥下脾腎氣復自然向安

胃堂氣隔



有肺經伏熱而氣隔者有痰水在上而氣隔者大槩以茯苓半夏枳殼桔梗為治法其肺熱者如聖湯加桑白皮佐之心下水氣者小半夏茯苓湯效曾煩活人書用山梔子

附證治賦

麻黃湯發臘月寒傷榮桂枝湯散冬天風傷衛九味羌活湯發三時之表三時傷寒春夏秋也六神通解散理晚發之邪三月天行謂之晚發香蘇散十神湯參蘇飲發表調中平和之藥外感內傷

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

兼治葛根湯解肌湯小柴胡和解半表大柴胡三承氣攻熱邪傳裏理中湯四逆湯散寒中陰經○已上治外感補中益氣湯治飽饑勞役升陽順氣湯療怒恐憂思調中益氣湯調胃脾失協參朮調中湯治脾肺俱傷升陽散火湯升散熱邪凡言熱者指外熱也升陽益胃湯分消濕氣○已上治內傷和解散金沸草散治時行寒疫神朮散定風餅子療暴中風邪人參敗毒散升麻葛根湯解瘟疫而身熱陽毒升麻湯雄黃解毒丸散天行而咽疼宣明

雙解散主溫熱始終之要藥藿香正氣散治暑濕內外之良方香薷飲清暑益氣湯人參白虎湯益原散縮脾飲能驅實虛暑氣平胃散羌活勝濕湯升陽除濕湯五苓散朮附湯善解外內濕邪生料五積散解濕溫寒治表裏之熱燥搜風順氣丸神芎

裏之寒濕防風通聖散清熱潤燥治表裏之熱燥丸潤大腸燥症黃連解毒湯三黃丸瀉三焦火邪凡言火也當歸六黃湯瀉火滋陰防風當歸飲補虛退熱舟車丸三花神祐丸能除濕熱濕則生熱秦艽湯羌活愈風湯

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

生燥風則善解燥風胃苓湯主傷暑泄瀉腹疼柴苓湯治傷寒泄瀉身熱桂苓白朮散療霍亂而口發渴加減理中湯治吐瀉而咽不乾蒼朮湯胃風湯治濕傷氣分白痢便膿地黃湯芍藥湯主熱傷血分赤痢下血萬安散七寶飲治瘧無汗而寒多熱少清脾飲六和湯療瘧有汗而寒少熱多華蓋散五拗湯主喘嗽因寒外襲洗肺散貝母散治咳嗽由火内生○已上發表和中已治風寒暑濕燥火白虎湯瀉胃火有餘八珍湯補脾陰不足白朮



和胃丸能養脾胃寬中進食丸喜滋形氣治中湯枳木  
丸和中丸大安丸保和丸健脾消食香穀丸香稜丸積  
氣丹妙攻丸消塊丸破積除癥木香枳殼丸療食停以  
發黃神妙列仙散治酒積陳成疸木香枳朮丸化滯湯  
調氣進食七轉靈應丹萬應丸取積追蟲丁香脾積丸  
妙應丸治心腹諸疼大黃備急丸三陽散主卒暴百病  
三稜消積丸治新傷生冷硬物內用巴豆木香檳榔丸療以  
患氣食痞膨內用大黃巴豆斬關去時新之冷積可仗大黃  
欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二

而瀉火六君湯豁痰補氣調胃六物湯降火補血滋陰  
四物湯加黃當歸龍會丸善降陰火兼治脇痛人參養  
胃湯能開結痰併療以瘕太平丸消化丸治痰嗽有攻  
左金丸香連丸除熱疼必效洗心散洗肝散瀉心肝之  
火滾痰丸化痰丸蠲熱燥之痰四七湯黑錫丹開痰結  
心胸清空膏涼膈散除火升頭腦石膏羗活散祛風明  
目川芎石膏湯瀉火定眩川芎茶調散治風熱上攻頭  
目葛花解醒湯療濕痰中滿胃腸龍腦雞蘊丸除肺心  
欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二

虛煩人參瀉肺湯散胸膈實火犀角地黄湯桃仁承氣  
湯茯苓補心湯阿魏丸小建中湯治火載血而上出當  
歸承氣湯瑞竹蒲黃散當歸和血散聚金丸伏龍肝散  
療陽逼陰而下行紅花當歸散千金桃仁煎六合湯理  
經脈不通涼血地黃湯解毒四物湯膠艾湯治崩漏不  
止金匱當歸散清熱安胎而易產丹溪天麻丸活血保  
產而無驚女金丹烏雞丸調氣血令老婦妊娠天一丸  
連翹飲瀉火濕主小兒百病醒脾散玉餅子肥兒丸香





稜丸治嬰孩脾氣不足而致疾瀉青丸奪命散抱龍丸  
檳榔丸療童穉肝邪有餘而生災金箔鎮心丸金箔鎮  
心丹安神定驚五福化毒丹犀角消毒飲清熱解毒異  
攻散補痘瘡之虛寒通聖散瀉痢疹之實熱內疎黃連  
湯千金瀉蘆湯主陽癰腫掀向外內托復煎散淵然奪  
命丹治陰疽毒蘊于中立馬回疔丹萬靈奪命丹療疔  
瘡而有殊攻神效太乙膏散腫潰堅湯治癰瘰而收實  
效紫金丹治藥食衆毒兼癰疽疔腫

主解  
利

如聖散療風

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

濕諸邪及癰瘰癧痛風

主發  
散

香殼丸芎歸丸療痔而清熱

涼血槐角丸烏王丸治漏而散濕補虛清心蓮子飲八  
正散治小便淋濁有虛實之分導滯通幽湯三和散療  
大腸燥結有血氣之異海藏五飲湯散五等之飲開結  
枳實丸消諸般之痰導痰湯三生丸豁痰疎風千縉湯  
四磨湯下氣定喘蘓子降氣湯消痰利氣三因七氣湯  
解鬱開心瓜蒂散稀涎散四靈散吐涎而祛風蘓青丹  
星香湯滌痰湯豁痰而順氣蘓合香丸烏藥順氣散勻



迪志文化出版有限公司出版

氣散善開結氣小省風湯青州白丸子搜風丸能散風  
痰牛黃清心丸治諸痰熱而類風諸小續命湯療真中  
風而在脈三化湯主風入腑推陳潤燥至寶丹治邪入  
臟散熱消風龍星丹疎風清熱豁痰愈風丹潤燥祛風  
瀉火換骨丹續命丹治風痰充塞經絡而為癰瘰清燥  
湯健步丸療濕熱薰蒸筋骨而成痿痠南星治風痰蒼  
朮治濕痰天花粉治熱痰海石治燥痰半夏治寒痰柴  
胡瀉肝火黃連瀉心火白芍藥瀉脾火黃芩瀉肺火黃

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二

栝瀉腎火天門麥門知母石膏竹茹童便玄明粉上清  
丸能散虛火荆瀝竹瀝貝母瓜蒌薤汁姜汁霞天膏二  
瀝湯善開虛痰氣虛加以四君血虛加以四物○已上  
治痰火氣風四君補氣併益脾四物補血兼滋腎八物  
湯十全大補湯補氣血兩虛固本丸秘傳補元丸補心  
腎不足錢氏白朮散參苓白朮散竹葉石膏湯補脾胃  
諸虛丹溪補陰丸金匱腎氣丸三一腎氣丸滋真陰以  
損崔氏八味丸補陰興陽天王補心丹寧神定志硃砂



迪志文化出版有限公司出版

安神丸涼血清心八味定志丸補虛開竅茯苓丸華蘼  
分清飲除濁止淋固精丸固真太寶丸秘精收脫保和  
湯知母茯苓湯黃芪驚甲湯止嗽寧肺保真湯十味人  
參散人參養榮湯除熱補虛一秤金七仙丹烏髮駐顏  
瓊玉膏固本酒延年益壽○已上補氣血臟腑以方加  
減存乎人要審病而合宜用藥補瀉行於味須隨時而  
換氣奇偶復七方須知七方者奇偶復  
大小緩急也初中末三治要

察初則發攻中則  
調和末則收補寒因熱用熱因寒用通用塞因

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二

塞用通因通用者通其積滯  
而下焦自然閉密也高者抑之下者舉之外者

發之內者奪之塞因塞用者塞其下流  
而上焦自然開豁也寒則兼凝熱則

開行風能勝濕濕能潤燥辛能散結甘能緩中淡能利

竅苦以泄逆酸以收耗鹹以軟堅升降浮沉則順之謂順

其升降浮  
沈之性也寒熱溫涼宜逆也謂以寒治熱  
以熱治寒也病有淺深治

有難易初感風寒乍傷飲食一藥可愈舊存痼癖久患

虛勞萬方難瘳履霜之疾亟療无妄之藥勿試病若伏

虛宜半攻而半補醫稱多術或用灸而用針針有切病

之功灸獲回生之驗針能去氣病而作痛灸則消血癥  
以成形臟寒虛奪者治以灸熯脈痼攣痺者療以針刺  
血實畜結腫熱者宜從砭石氣滯痿厥寒熱者當做導  
引經絡不通病生於不仁者須覓醪醴血氣凝泣病生  
於筋脈者可行熨藥病慄悍者按而收之謂按  
摩也乾霍亂  
者刮而行之謂刮  
沙也醫業十三科宜精一派病情千萬變  
仔細推評姑撮碎言以陳管見後之學者庶達迷津

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二

仁齋直指卷二



欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷三

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張炳

欽定四庫全書

仁齋直指卷三

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

諸風

風論

氣血痰水受病於內者也風寒暑濕致寇于外者也人之一身血氣既虛陰陽不守飲食居處嗜慾無節衝風卧地調護不加於是經絡空疎腠理開徹風邪乘其虛

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

而入之中風諸風皆是物耳風之為病善行數變其中人也卒其眩人也暈激人之涎浮昏人之神亂挾熱則痿瘳緩弛挾寒則急痛拘攣自其邪氣之入人也邪氣反緩正氣反急正氣引邪為喎僻為竄視為掣縱為搐搦為癱瘓為反張在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急緩則四肢不能收急則一身不能仰皆隨其邪氣所至表裏淺深而有證也種類雖多大要有四血氣偏虛半身不遂肌肉枯瘦骨間疼痛謂之偏枯神智不亂身體



無痛四肢不舉一臂不隨謂之風痺

能言則可治

忽然迷仆

舌彊不語喉中窒塞噫噫有聲謂之風癰

身軟有汗則生

風寒

濕三氣合而為痺其人肉厚身頑不知痛癢風多則走

注寒多則疼痛濕多則重着在筋則筋屈而不伸在脉

則血凝而不流在肉則不仁在骨則癢重夫是之謂風

痺傷風一證發熱煩燥頭疼面光惡風自汗蓋風能散

氣故有汗也風家脈浮者病在表脈實者病在裏脈虛

者病在臟脈促者病在上浮則發散實則疎導虛則溫

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

之促於上而病人壯盛曾喉澎湃者瓜蒂散少少吐之  
俗謂熱則生風大綱然爾多有胃虛氣虛血虛虛極而  
生風者若諸虛證候天雄附子官桂川烏又不可闕治  
法大要盡以消痰順氣為先順氣用南木香蘇合香圓  
輩消痰用南星半夏細辛僵蠶輩如石綠鐵燄水銀輕  
粉鉛霜朴消等劑謹勿妄施寒毒入胃則血脈凝澁真  
氣消鑠不旋踵而廢人治風良劑小續命湯為上排風  
湯次之然二藥主風不主氣須以人葭順氣散烏藥順

氣散佐助其間氣一流行則風亦疎散矣至若口開手  
散瀉血遺尿眼合不開汗出不流吐沫氣竈聲如鼾睡  
面緋面黑髮直頭搖手足口鼻清冷口噤而脈急數皆  
為不治之證其餘諸風種類余於嬰兒驚風指要備論  
之

### 諸風證治

#### 心中風

心風偃卧熱而瘡

脣赤其身有汗生

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

白黑青黃脣上見

停停時悚扁醫驚

心中風偃卧不能顛倒發熱失音其舌焦赤汗流脣  
赤者可治灸心俞若脣上白黑青黃乃心壞為水面  
目停停時時悚動者並不治心俞二穴在第五椎骨  
下兩傍各一寸半五臟俞穴千金翼所載與六十七  
難注同取分寸法男左手女右手以中指第一節為  
一寸

#### 肝中風





肝家踞怒不低頭

左脇偏疼筋急搜

額目脣青為可療

目黃目白使人愁

肝中風踞坐不能低頭上視多怒左脇偏疼諸筋攣

急頭目睜動其目青遠兩目連額微青面黃者可治

灸肝俞若大勢青黑其目一黃一白者不治肝俞二

穴在第九椎骨下兩傍各一寸半

### 腎中風

腎中踞而腰脊疼

面浮耳黑賊風生

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

脇無黃迹能全愈

直髮泥容旦暮傾

腎中風踞坐腰脊痛引小腹面上浮腫其耳黑視左

右脇未有點點黃色者可治灸腎俞若脇上黃點面

如土色鬢髮直齒黃赤者不治腎俞二穴在第十四

椎骨下兩傍各一寸半

### 肺中風

肺風喘促滿胃堂

偃卧熱熱燥異常

口鼻之間須要白

尋衣肺壞色憂黃

肺中風偃卧胃滿氣短喘息時嗽燥悶汗出其鼻白

目下及鼻四圍以至於口色白者可治灸肺俞若色

黃乃肺壞為血其與尋衣摸空者並不治肺俞二穴

在第三椎骨下兩傍各一寸半

### 脾中風

脾中風兮肌肉睜

踞而腹滿吐鹹酸

脣并肢體通黃瘥

手足眸青療已難

脾中風踞坐腹滿皮肉睜動四肢放縱其脣黃身通

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

黃吐鹹汁者可治灸脾俞若手足青且冷或目下青

並不治脾俞二穴在第十一椎骨下兩傍各一寸半

### 胃中風

胃病根源飲食來

擡肩喘息氣難開

口張額汗腹中滿

浮診雙關脈大哉

胃中風腹滿填脹隔塞不通張口喘息額上多汗孫

地仙所謂新食竟取風為胃風是也或曰風中諸臟

不關諸府是亦一說然胃為水穀之海五臟皆取氣



於胃故並存之三因云胃俞二穴在第十二椎骨下兩傍各一寸半

中風惡證

中風惡證細推求

口噤須遲脈數憂

眼合不開并竄瞪

面緋面黑手難收

口開吐沫氣麓大

髮直搖頭汗不流

鼾齁喉鳴兼鼻冷

遺尿瀉血並皆休

中風多是惡風自汗心風脈浮洪肝風脈浮弦腎風

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

脈浮滑肺風脈浮濇脾風脈浮緩或以三部候之或

以本臟取之不可一槩論也醫者當明辨之

治卒中法

圓白天南星

濕紙裹煨

南木香

蒼朮

生

白羊眼半夏

用百沸湯就跳蘼少頃各一錢半

辣細辛

甘草

生

石菖蒲

細切各一錢

右件剉散分作二服水一盞半生薑七厚片煎取其

半乘熱調蘇合香圓三圓灌下痰盛者加全蝎二枚



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

灸治一切卒中不論中風中寒中暑中濕中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此先以皂角去弦皮細辛或生南星半夏為末搗以管子吹入鼻中俟其噴嚏即進前藥牙噤者中指點南星細辛末并烏梅肉頻擦自開

又法

南木香

細剉二錢

生南星

七片

生薑

七片

石菖蒲

二寸搗碎

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

右煎取清汁乘熱調南木香末壹錢蘇合香圓三圓

與之

小續命湯治中風諸風迷仆涎潮舌彊語蹇或昏漬痿

弛或厥冷拘攣不論表裏淺深服之皆驗

麻黃

去節

人葠

防己

官桂

黃芩

杏仁

去皮尖焙

白芍藥

芎藭

甘草

炒各壹兩

防風

壹兩半

附子

炮去皮臍只用半兩

右剉散每服三錢薑五厚片棗二枚水盪半煎一盞  
溫服恍惚加白茯苓骨節煩疼素有熱去附子倍芍  
藥煩燥大便秘去附子倍芍藥加竹瀝大便利素有  
寒去黃芩加白朮附子骨肉冷疼加辣桂附子嘔逆  
腹脹加人蔘半夏自汗去麻黃加芍藥大便秘結去  
附子加枳殼大黃痰多加南星炮切數片風虛加當  
歸渴加栝蒌根身疼加秦艽喘急加炒桑白皮  
排風湯治五臟風諸風亦治風毒脚氣腫痛

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

白鮮皮

白朮

白芍藥

辣桂

當歸

川芎

杏仁

去皮尖  
微炒

防風

甘草

各貳  
兩炒

獨活

麻黃

去節

白茯苓

各叁  
兩

右麓末每服三錢水盪半薑四片煎一盞溫服

良方人蔘順氣散治諸風戰掉拳攣眩暈嘔邪麻痺疼  
痛

川芎

桔梗

白朮



迪志文化出版有限公司出版

白芷 陳皮 枳殼炒  
甘草各壹兩炒 麻黃去節 天台烏藥去心各壹兩半  
人蔘 白薑炮各兩半  
右為末每二錢薑棗煎服  
烏藥順氣散證治同前亦主脚氣

烏藥

去心

麻黃

去節

陳皮

各貳兩

川芎

枳殼

炒

北梗

白芷

直僵蠶

炒去絲

甘草

炒各壹兩

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

白薑

炮半兩

右為末每二錢薑棗煎服

攝生飲治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰厥

飲厥氣厥之類初作即用此

圓白南星

濕紙裹煨

南木香

半夏

用百沸湯洗少頃就

壹錢半

辣細辛

蒼朮

生

甘草

生

細節石菖蒲

各壹錢

右剉分貳服每服水盪半薑七厚片煎取其半乘熱



迪志文化出版有限公司出版

|                                         |  |                      |  |                      |  |     |  |                       |  |         |  |                                                                    |  |                        |  |                       |  |         |  |                                            |  |                      |  |      |  |         |  |                                           |  |
|-----------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----|--|-----------------------|--|---------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|---------|--|--------------------------------------------|--|----------------------|--|------|--|---------|--|-------------------------------------------|--|
| 調蘇合香圓 <small>方具諸氣門</small> 參圓灌下痰盛加炙全蝎貳枚 |  | 先以阜角肉細右為末管子竭些吹入鼻中候噴嚏 |  | 即進藥牙噤者烏梅肉揉和南星細辛末以中指頻 |  | 擦自開 |  | 三生飲治卒中昏迷痰盛喉鳴口眼喎斜半身不遂但 |  | 脈沈無熱者可服 |  | 南星 <small>壹兩</small> 川烏 <small>生</small> 附子 <small>生各去皮臍半兩</small> |  | 南木香 <small>貳錢半</small> |  | 右呖咀每服三錢水壹盞半薑十厚片煎取半微溫服 |  | 附香飲證治如前 |  | 附子 <small>生四錢</small> 木香 <small>貳錢</small> |  | 右呖咀分兩服每用水盞半薑十片煎取半微溫服 |  | 虛人可用 |  | 星香飲證治如前 |  | 南星 <small>捌錢</small> 木香 <small>貳錢</small> |  |
|-----------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----|--|-----------------------|--|---------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|---------|--|--------------------------------------------|--|----------------------|--|------|--|---------|--|-------------------------------------------|--|

|                         |  |                   |  |                                               |  |                          |  |                   |  |     |  |                                                                 |  |                                         |  |                       |  |                                                                        |  |                                                               |  |         |  |                      |  |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------------|--|
| 右剉分生服每用水盞半薑十片煎六分溫服氣盛人用此 |  | 大醒風湯治卒中諸風涎潮痰厥語澁神昏 |  | 附子 <small>生</small> 南星 <small>生各參分</small> 全蝎 |  | 川芎 防風 <small>各壹分</small> |  | 右剉散每三錢薑十片煎服氣不和加木香 |  | 省風湯 |  | 南星 <small>壹兩</small> 防風 <small>半兩</small> 甘草 <small>炒壹分</small> |  | 右剉每服三錢薑十片煎服氣虛人加生附子沈香氣逆加紫蘇木香頭痛而暈加全蝎多痰加半夏 |  | 左經圓治諸風癱瘓拘攣直疼痛或跌撲傷損亦主之 |  | 草烏 <small>炮去尖四兩</small> 川烏 <small>炮去皮臍貳兩</small> 沒藥 <small>壹兩半</small> |  | 乳香 <small>壹兩</small> 黑豆 <small>生壹升以班貓貳拾壹箇去頭足翅同煮候豆熟為度去</small> |  | 班猶取豆焙乾用 |  | 右細末醋和豆為糊圓桐子大每服三十圓溫酒下 |  |
|-------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|---------|--|----------------------|--|





|                |  |      |  |      |  |     |  |
|----------------|--|------|--|------|--|-----|--|
| 鐵骨丹治諸風癱瘓拳攣半身不遂 |  | 川烏頭  |  | 草烏頭  |  | 川芎  |  |
|                |  | 當歸   |  | 辣桂   |  | 川續斷 |  |
|                |  | 華陰細辛 |  | 補骨脂  |  | 烏蛇  |  |
|                |  | 直僵蠶  |  | 木鼈子  |  | 天麻  |  |
|                |  | 巴戟   |  | 防風   |  | 滴乳香 |  |
|                |  | 沒香   |  | 麻黃   |  | 羌活  |  |
|                |  | 獨活   |  | 堅白南星 |  | 白蒺藜 |  |
|                |  | 薏苡仁  |  | 蒼朮   |  | 萆薢  |  |
|                |  | 杜仲   |  | 牛膝   |  |     |  |
|                |  | 虎脰骨  |  | 自然銅  |  | 秦艽  |  |
|                |  | 白附子  |  | 川五靈脂 |  |     |  |
|                |  | 全蝎   |  | 麝香   |  |     |  |

右細末乳香沒藥麝別研漸入拌和以浸藥酒調飛  
麪煮糊研築圓彈子大每服一圓溫酒磨下或宣木  
瓜煎湯下黑豆淋酒下不拘時服仍間用高良薑碎

|                      |  |                      |  |                       |  |                   |  |
|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|
| 壹升煎湯圍燠盪浴最妙未服藥前須以班貓二十 |  | 一箇去翅足用黑豆一建盞慢火同炒焦只用七箇 |  | 并豆入全蝎十四枚微炒五靈脂二錢半為末糕糊  |  | 圓麻子大每二十一圓老酒下先去其風根 |  |
| 鐵彈圓治諸風癱瘓             |  | 川烏                   |  | 川五靈脂                  |  | 乳香                |  |
|                      |  | 沒藥                   |  | 麝                     |  |                   |  |
|                      |  | 右乳香以乾竹葉包裹用熨斗火熨過即研成末餘 |  | 藥末之拌和再碾滴水為圓彈子大每一圓薄荷酒  |  | 磨下                |  |
|                      |  | 拒風丹治一切風              |  | 川芎                    |  | 防風                |  |
|                      |  |                      |  | 甘草                    |  | 細辛                |  |
|                      |  |                      |  | 右末煉蜜和杵每兩作三十圓每服一圓細嚼荊芥  |  | 酒下傷風鼻塞項彊頭疼薑湯下     |  |
|                      |  |                      |  | 麝香圓治白虎癰癰風走注疼痛遍身瘙痒如蟲啗晝 |  |                   |  |



靜夜劇

川烏

大八角  
者三箇

全蝎

二十一箇

地龍

半兩

黑豆

並生用  
二錢半

麝香

半字

右細末糯米糊圓菜豆大每服七圓甚者十圓夜卧令

膈空溫酒下微出冷汗便瘥

增味五痺湯治風寒濕合而為痺肌體麻木不仁

羌活

防己

片子薑黃

白朮

海桐皮

當歸

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

白芍藥

各一兩

甘草

炒七錢半

右剉每服三錢薑十厚片煎服病在上食後病在下

食前

瓜蒂散吐法

右瓜蒂末一錢熟水調下若風顛證須以瓜蒂散吐

痰

稀涎散治風涎潮塞上膈氣閉不通

猪牙皂角

四條肥實不蛀者去黑皮

光明晉礬

一兩

右細末輕者半錢重者三字熟水調下但少吐之弱

者不可吐用養正丹三十圓研細南木香煎湯調下

仍與南星附子豁痰歸經雞心賓榔亦能疎風順氣

鶴膝風攣方真紫金皮老酒煎候溫常服

急風方

朱砂

一字

輕粉

一點

巴豆

去油如霜些兒

全蝎

一枚

蟬殼

兩枚去土

右末之研和大人盡劑用薄荷泡湯調下小兒分半

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

用乳汁調下或吐痰或泄毒物皆效

烏龍丹治諸風癱瘓口眼喎斜語言蹇澀

真川烏

生去皮臍

好五靈脂

各二兩

右末入腦麝半錢同研滴水圓小彈大陰乾每一圓

先薑汁研開次好酒調下空心食前日兩服似鐵彈

圓

廬江劉寶治瘧良方

歸荊湯治風瘧昏迷吐沫抽掣背脊彊直產後中瘧通



用

當歸 荊芥穗

右等分末之每二錢水一盞酒少許煎七分灌下如牙緊用銅匙幹以雞羽蘸藥入口或用童尿調下或以川芎代當歸亦妙

又方

黑豆 炒焦好酒淋之取清汁

右每酒一盞獨活剉三錢煎七分溫服又連續進劑

欽定四庫全書 仁齋直指 卷三

以瘥為度

太陽風痙證候始則發熱腹痛喘息涎浮次則牙緊頭搖十指微動漸加項背彊直轉側不仁甚者昏困失音目睛直視滑泄不禁身腰反張如此則十不救一新產血虛汗出傷風亦作痙證凡產後發熱若舌蹇脣急手指微動便急作風痙療之荊歸湯獨活酒 方見在濕門

人為邪氣所干則發而為病若氣若血若痰若水若風若寒若暑若濕腑臟表裏冷熱虛實各有受病之

處用藥之法必究其原而後可以起病否則前賢所謂獵不知兔廣絡原野冀一人獲之術亦疎耳是以人試技乎哉

附諸賢論

病機機要曰治風須分在臟在腑在經之異云風本為熱熱勝則風動宜以靜勝其燥是養血也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮宜治在經雖有汗下之戒而有中臟中腑之分中腑者多著四肢有表

欽定四庫全書 仁齋直指 卷三

證而脈浮惡風拘急不仁中臟者多滯九竅脣緩失音耳聾鼻塞目瞽大便結閉中腑者宜汗之中臟者宜下之表裏已和宜治之在經當以大藥養之

發明云中血脈則口眼喎斜中腑則肢節癱中臟則性命危三治各不同中血脈外有六經之形證則從小續命加減中腑內有便溺之阻隔宜三化湯等通利之外無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦芎湯羌活愈風湯主之



劉宗厚曰按此分在表在裏在經之三證立汗下調養之三法可謂開後世之盲聾但所用諸方學者宜詳審之河間曰風病多因熱甚俗云風者言末而忘其本也所以中風有癱瘓者非謂肝木之風實甚而卒中之也亦非外中於風良由將息失宜而心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無知也多因喜怒悲憂恐五志過極而卒中者皆為熱甚故也若微則但僵仆氣血流通筋脈不攣緩

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

者發過如故或熱氣大盛鬱滯不通陰氣暴絕陽氣後竭而死○痰涎者由熱甚則水化製火而生○偏枯者由經絡一側得通否者痺而癱瘓也○口筋噤急者由風熱太甚以勝水濕又津液滯于胸膈以為痰涎則筋太燥然燥金主于收斂勁切故也○或筋反緩者乃燥之甚血液衰少也諸筋攣易愈諸筋痿難復以見燥之微甚也

丹溪云案內經已下皆謂外中風邪然地有南北之殊

不可一途而論往劉守真作將息失宜水不能制火極是由今言之西北二方亦有真為風所中者但極少爾東南之人多是濕土生痰痰生熱熱生風也邪之所軋其氣必虛風之傷人在肺臟為多○許學士謂氣中者亦有此七情所傷脈微而數或浮而緊緩而遲必也脈遲浮可治大數而極者死若果外中者則東垣所謂中血脈中府中藏之理其于四肢不舉亦有與痿相類者當細分之局方風痿同治大謬發揮甚詳子和用三法

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

如的係邪氣卒中痰盛實熱者可用否則不可

河間曰中風之人不宜用龍麝闕硃譬之提鈴巡於街使盜者伏而不出益使風邪入於骨髓如油入而莫能出也此之類焉若痰潮不省昏憤不知事宜用藥下其痰涎故風者乃百病之長雖審經意故莫不有疑者也吁醫之不明運氣造化地理病機之微而欲行通變之法者難矣哉

附諸方





防風通聖散

宣明方

論曰風寒熱諸疾之始生也人之

藏府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風火生於熱以熱為本而風為標凡言風者即風熱病也氣壅沸筋脈拘倦肢體焦痿頭目昏眩腰脊彊痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗑不利脅隔痞悶咳嘔喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜臥寢汗咬牙唾語筋惕驚悸或腸胃拂鬱結水液不能浸潤於週身而

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

但為小便多出者或濕熱內餘而時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停濕而泄或燥濕往來而時結時泄者或表之陽和正氣是衛氣也與邪熱相合并入于裏陽極似陰而戰煩渴者表氣寒故戰或虛氣人不已者經言與衛氣并入于裏則寒戰也并出邪熱或風熱走注疼痛麻痺者或腎水真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒中久不語或一切暴瘡而不語語不出聲或暗風



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

癰者或洗頭風或破傷風或中風諸潮搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷寒疫癘不能辨者或熱甚怫結而反出不快者或熱極黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑偏身黑黧紫白斑駁或面鼻生紫赤風刺癢疹俗呼為肺風者或成風癘世傳為大風疾者或腸風痔漏并解酒過熱毒兼解利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身體疼痛者并兩感諸證兼治產後血液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚為諸熱証腹滿澀痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌彊口噤筋惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿撮痛而昏者惡物過多而不吐者不宜服兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損疼痛或因熱結大小便澀不通或腹急痛腹滿喘悶者並皆治之

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷葉



迪志文化出版有限公司出版



|                                                                                                                                                                                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>緋絹袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近○凡人痰氣及中風痰涎壅上喉中有聲不能下者用青州白丸子同丸生薑自然汁化下立効○產婦中風小兒驚風牙關緊硬不開及不省者擦牙即開然後用風藥治之○小兒吐瀉驚疳先用火焙此藥然後用生薑白自然汁化開白湯調灌○脚氣衝心用葶蘇子去殼槌碎和丸敷則脚心疼痛立止○心腹絞痛中滿嘔吐薑湯化服○大人小兒傷風咳嗽薑葱汁白湯調下○中風狂亂如見鬼神白湯調服</p> |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>白圓子<small>和劑方</small>治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫及小兒驚風並皆治之<small>方見痰類</small></p>                                                                                                                |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>大秦芎湯<small>拔粹方</small>治中風外無六經之形証內無便溺之阻隔知為血弱不能養於筋故手足不能運動舌彊不能言宜養血而筋自榮</p>                                                                                                             |                    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦芎                                                                                                                                                                                     | 石膏                 | 甘草 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        | <small>各三兩</small> |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 川芎                                                                                                                                                                                     | 當歸                 | 羌活 |  |  |  |  |  |  |  |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

方見咳嗽門

|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>獨活 防風<small>去蘆</small> 黃芩</p>                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>白芍藥 吳白芷 白朮</p>                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>生地黃 熟地黃 白茯苓<small>各二兩</small></p>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>細辛<small>五錢</small></p>                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服如天陰雨加生姜七片如心下痞加枳實一錢煎服羌活愈風湯<small>拔粹方</small>治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏潰及治風濕內弱風熱體重或瘦而一股偏枯或肥而半身不遂心亂則百病生靜則萬病息此藥能安心養神調陰陽無偏勝</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>羌活 甘草<small>炙</small> 防風<small>去蘆</small></p>                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>黃芪<small>去蘆</small> 人葎<small>去蘆</small> 蔓荊子</p>                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>川芎 細辛<small>去蘆</small> 枳殼<small>去穢炒</small></p>                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>地骨皮 麻黃<small>去根</small> 知母<small>去皮</small></p>                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>獨活 白芷 杜仲<small>炒斷絲</small></p>                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>秦芎<small>去蘆</small> 柴胡<small>去苗</small> 半夏<small>湯洗姜制</small></p>                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三



|                                                                                                                                     |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 厚樸<br><small>姜製</small>                                                                                                             | 防己                      | 熟地黄                     |
| 前胡<br><small>各二兩</small>                                                                                                            | 芍藥<br><small>去皮</small> | 黃芩<br><small>去腐</small> |
| 白茯苓                                                                                                                                 | 石膏                      | 生地黄                     |
| 蒼朮<br><small>各四兩</small>                                                                                                            | 桂<br><small>一兩</small>  |                         |
| 右剉每服一兩水二盞煎至一盞去查溫服如遇天陰加生薑三片煎空心一服臨卧再煎查服○常服之藥不可失四時之輔如望春大寒之後加半夏柴胡人蔘各二兩望夏穀雨之後加石膏黃芩知母各二兩季夏之月加防己白朮茯苓各二兩望秋大暑之後加厚樸藿香各二兩桂一兩望冬霜降之後加附子官桂各一兩當歸二兩 |                         |                         |
| 大烏藥順氣散 治諸風氣手足癱瘓                                                                                                                     |                         |                         |
| 歸芍地黄芎烏藥陳地龍香附縮砂枳芩半與防風蘇桔并甘草乳沒沈香停姜棗均煎服諸風氣立通                                                                                            |                         |                         |
| 當歸                                                                                                                                  | 芍藥                      | 生地黄                     |
| 川芎                                                                                                                                  | 烏藥                      | 陳皮                      |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

|                         |                                     |    |
|-------------------------|-------------------------------------|----|
| 地龍                      | 香附子                                 | 砂仁 |
| 枳殼                      | 黃芩                                  | 半夏 |
| 防風                      | 紫蘇                                  | 桔梗 |
| 甘草                      | 乳香                                  | 沒藥 |
| 沉香                      | 各二錢五分此三味為末煎熟藥加內服                    |    |
| 右用姜棗同煎                  |                                     |    |
| 勻氣散                     | 瑞竹方 治腰腿疼痛手足攣拳及治中風不語口眼喎斜半身不遂等證前代曾服有效 |    |
| 白朮                      | 天台烏藥                                | 天麻 |
| 煨                       | 二兩                                  | 一兩 |
| 沈香                      | 青皮                                  | 白芷 |
|                         | 去穢                                  |    |
| 人蔘                      | 甘草                                  | 紫蘇 |
|                         | 去蘆                                  |    |
| 木瓜                      | 各二錢半                                |    |
| 右咬咀作十服每服水一盞生姜三片煎至半盞去查溫服 |                                     |    |
| 換骨丹                     | 宣明方 治癱瘓風中風口眼喎斜半身不遂并一切風癰暗風并宜服之       |    |



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版



|                                                                                                                                    |  |                      |                        |                       |                       |                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----|
| 我有換骨丹傳之極幽秘疎開病者心扶起衰翁<br>臂氣壯即延年神清日不睡南出張仙翁三百八<br>十歲槐皮芎朮芷仙人方首蔓十伴各停勻苦味<br>香減半龍麝即少許硃砂作衣纏麻黃煎膏丸大<br>小如指彈脩合在深房勿令陰人見夜卧服一粒<br>遍身汗津滿萬病自消除神仙為侶伴 |  | 麻黃 <small>煎膏</small> | 仙朮                     | 槐角子 <small>子取</small> | 桑白皮                   | 川芎                       | 香白朮 |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷三                                                                                                               |  | 威靈仙                  | 人蔘                     | 防風                    | 何首烏                   | 蔓荊子 <small>各一兩</small>   | 苦蔘  |
|                                                                                                                                    |  | 五味子                  | 廣木香 <small>各半兩</small> | 麝香                    | 龍腦 <small>少許研</small> | 硃砂 <small>研為衣不拘多</small> |     |
| 右為末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千<br>下每兩分作十九每服一丸以硬物擊碎溫酒半盞<br>浸以物蓋不可透氣食後臨卧壹呷嚥之衣蓋覆當<br>自出汗即差 <small>和胃湯調補</small> 及避風寒茶下半丸蓋出汗入                    |  |                      |                        |                       |                       |                          |     |



|                                               |  |                             |                        |                                         |                          |                        |                      |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 膏時如稠再入水少許煎動入藥唯少為妙其麻黃<br>膏不可多其麻黃膏煉法見後<br>祕傳祛風散 |  | 羌活                          | 獨活                     | 山梔                                      | 半夏                       | 蒼朮                     | 蒼耳子                  |
|                                               |  | 甘草                          | 茯苓                     | 陳皮                                      | 當歸                       | 生地黃                    | 防風                   |
| 荊芥                                            |  | 漢防己                         | 白芍藥                    |                                         | 牙皂                       | 威靈仙 <small>各等分</small> |                      |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷三                          |  | 右咬咀每服水二盞薑三片煎至一盞不拘時服加<br>減于後 | 禦風丹 <small>聖惠方</small> | 治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎<br>斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺 | 川芎                       | 白芍藥                    | 桔梗                   |
|                                               |  | 細辛                          | 白殭蠶                    | 川羌活                                     | 天南星 <small>姜製各半兩</small> | 麻黃 <small>去根節</small>  | 防風 <small>去蘆</small> |



|                      |       |     |    |       |        |                 |                  |  |       |
|----------------------|-------|-----|----|-------|--------|-----------------|------------------|--|-------|
| 白芷                   | 各一兩半  | 乾生薑 | 甘草 | 炒各七錢半 |        |                 |                  |  |       |
| 硃砂                   | 二錢半為衣 |     |    |       |        |                 |                  |  |       |
| 右為細末煉蜜為圓如彈子大每服一圓熟酒化下 |       |     |    |       |        |                 |                  |  |       |
| 食前日三服神昏有涎者加硃砂二錢半     |       |     |    |       |        |                 |                  |  |       |
| 續命煮散                 |       |     |    |       | 大全良方   | 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼 |                  |  |       |
| 潤動或時搐搦亡失津液渴欲飲水此藥能扶榮衛 |       |     |    |       |        |                 |                  |  |       |
| 去虛風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之   |       |     |    |       |        |                 |                  |  |       |
| 防風                   |       |     |    |       | 獨活     |                 | 當歸               |  |       |
| 欽定四庫全書               |       |     |    |       | 仁齋直指卷三 |                 |                  |  |       |
| 人蔘                   |       |     |    |       | 細辛     |                 | 葛根               |  |       |
| 芍藥                   |       |     |    |       | 川芎     |                 | 甘草               |  |       |
| 熟地黃                  |       |     |    |       | 遠志     |                 | 荊芥               |  | 各五錢   |
| 官桂                   |       |     |    |       | 半夏     |                 | 汗多不止加牡蠣粉         |  | 七錢半錢五 |
| 右咬咀每服一兩生姜三片水二盞煎至一盞去滓 |       |     |    |       |        |                 |                  |  |       |
| 通口服                  |       |     |    |       |        |                 |                  |  |       |
| 獨活湯                  |       |     |    |       | 良方     |                 | 治虛風昏憤不自知覺手足痠癱坐卧不 |  |       |
| 寧或發寒熱若血虛不能服發汗藥及中風自汗尤 |       |     |    |       |        |                 |                  |  |       |

|                                                                                                                        |                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 宜服之                                                                                                                    |                          |                         |
| 川獨活                                                                                                                    | 羌活                       | 人蔘<br><small>去蘆</small> |
| 防風                                                                                                                     | 當歸                       | 細辛                      |
| 茯神<br><small>去木</small>                                                                                                | 半夏                       | 桂心                      |
| 白微                                                                                                                     | 遠志                       | 菖蒲<br><small>去毛</small> |
| 川芎                                                                                                                     | 甘草<br><small>各五錢</small> |                         |
| 右咬咀每服一兩水一盞生姜五片煎至八分去滓                                                                                                   |                          |                         |
| 食後溫服                                                                                                                   |                          |                         |
| 欽定四庫全書<br><br><small>仁齋直指卷三</small> |                          |                         |
| 川芎石膏湯<br><small>宣明方</small>                                                                                            | 治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘           |                         |
| 嗽鼻塞口瘡煩渴淋悶眼生翳膜此藥清神爽志宣                                                                                                   |                          |                         |
| 通氣血治中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳                                                                                                   |                          |                         |
| 染                                                                                                                      |                          |                         |
| 川芎                                                                                                                     | 芍藥                       | 當歸                      |
| 山梔子                                                                                                                    | 黃芩                       | 大黃                      |
| 菊花                                                                                                                     | 荊芥穗                      | 人蔘                      |
| 白朮<br><small>各半兩</small>                                                                                               | 滑石<br><small>四兩</small>  | 寒水石                     |



|                           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 桔梗<br><small>各二兩</small>  | 甘草<br><small>三兩</small>  | 砂仁<br><small>二錢半</small> |
| 石膏                        | 防風                       | 連翹                       |
| 薄荷葉<br><small>各一兩</small> |                          |                          |
| 右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服水      |                          |                          |
| 調亦得忌姜醋發熱物                 |                          |                          |
| 保命丹<br><small>千金方</small> | 治諸風痙瘓不能語言心忪健忘恍惚去         |                          |
| 來頭日暈眩胃中煩鬱痰涎壅塞抑氣攻心精神昏      |                          |                          |
| 憤又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘蹙虛      |                          |                          |
| 煩少睡喜怒不時或發狂顛神情昏亂及小兒驚癇      |                          |                          |
| 驚風抽搐不定及大人暗風并羊顛猪顛發叫        |                          |                          |
| 硃砂<br><small>一兩</small>   | 珍珠<br><small>二錢</small>  | 南星<br><small>一兩</small>  |
| 麻黃<br><small>去根節</small>  | 白附子<br><small>炮</small>  | 雄黃                       |
| 龍腦<br><small>各半兩</small>  | 琥珀<br><small>三錢</small>  | 殭蠶<br><small>炒</small>   |
| 犀角<br><small>鎊</small>    | 麥門冬<br><small>去心</small> | 枳殼                       |
| 地骨皮                       | 神曲                       | 茯神                       |
| 遠志<br><small>去心</small>   | 人蔘                       | 柴胡<br><small>各一兩</small> |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

|                              |                              |                            |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 金箔<br><small>一百片</small>     | 牛黃<br><small>三錢</small>      | 天麻<br><small>半兩</small>    |
| 腦子<br><small>少許</small>      | 麝香<br><small>少許</small>      | 膽礬<br><small>半兩</small>    |
| 牙硝<br><small>四錢</small>      | 毫車                           | 天竺黃                        |
| 防風                           | 甘草                           | 桔梗                         |
| 白朮                           | 升麻<br><small>各一兩</small>     | 蟬蛻<br><small>半兩</small>    |
| 黃芩<br><small>二兩</small>      | 荊芥<br><small>二兩</small>      |                            |
| 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一圓薄荷湯化         |                              |                            |
| 下不拘時候忌猪羊鰕核桃動風引痰之物及猪羊         |                              |                            |
| 血更加大川烏炮去皮臍姜製半夏白芷川芎各壹         |                              |                            |
| 兩猪牙皂角一兩和前藥丸服尤妙               |                              |                            |
| 神効活絡丹治風濕諸痺肩臂腰膝筋骨疼痛口眼喎        |                              |                            |
| 斜半身不遂行步艱辛筋脈拘攣能清心明目寬膈         |                              |                            |
| 宜通氣血年逾四十預服十數丸至不生風病           |                              |                            |
| 白花蛇<br><small>酒浸焙乾二兩</small> | 烏梢蛇<br><small>酒浸焙乾半兩</small> | 麻黃<br><small>二兩去節</small>  |
| 細辛<br><small>去土一兩</small>    | 全蝎<br><small>去毒一兩半</small>   | 兩頭尖<br><small>二兩酒浸</small> |
| 赤芍藥<br><small>一兩</small>     | 貫芎<br><small>二兩</small>      | 防風<br><small>二兩半</small>   |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三



|                |              |             |
|----------------|--------------|-------------|
| 葛根<br>半一兩      | 沒藥<br>另研一兩   | 血竭<br>另研七錢半 |
| 硃砂<br>另研一兩     | 烏犀骨<br>兩半    | 地龍<br>去半兩   |
| 甘草<br>皮二兩去炙    | 丁香<br>去一枝    | 白殭蠶<br>炒一兩  |
| 乳香<br>研一兩      | 麝香<br>另研半兩   | 片腦<br>另研一錢半 |
| 官桂<br>粗皮二兩去    | 草荳蔻<br>兩     | 川羌活<br>兩    |
| 虎脰骨<br>一兩酥炙    | 玄參<br>兩      | 牛黃<br>另研二錢半 |
| 天麻<br>兩        | 威靈仙<br>酒一兩半浸 | 藿香<br>去土兩   |
| 天竺黃<br>兩       | 敗龜板<br>炙一兩   | 人蔘<br>兩     |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷三 |              |             |
| 何首烏<br>兩       | 白芷<br>兩      | 烏藥<br>兩     |
| 安息香<br>兩       | 青皮<br>兩      | 黑附子<br>皮一兩去 |
| 香附<br>兩        | 白荳蔻<br>兩     | 骨碎補<br>各一兩  |
| 黃連<br>兩        | 茯苓<br>兩      | 黃芩<br>兩     |
| 白朮<br>兩        | 熟地黃<br>兩     | 松香脂<br>兩半   |
| 大黃<br>兩        | 當歸<br>半兩     | 木香<br>兩     |
| 沈香<br>兩        | 金箔<br>為衣     |             |

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒

|                      |                   |           |
|----------------------|-------------------|-----------|
| 茶清漱下隨証上下食前後服頭風搐茶下    | 川芎<br>細辛          | 藜蘆        |
| 搐鼻通天散治卒暗中風倒地牙關緊急人事昏沈 | 白芷<br>防風          | 薄荷<br>各一錢 |
| 猪牙皂角<br>刮去皮三箇        | 右為細末用蘆筒納藥每用少許吹入鼻中 |           |
| 麻黃膏<br>宣明方           | 治中風不省人事卒然倒地       |           |
| 右須旺日乙卯者採麻黃一秤揀去根一寸長取東 |                   |           |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷三       |                   |           |
| 流水三石三斗以無油膩鐺量大小盛五七斗者可 |                   |           |
| 先煮五沸掠去滓逐旋添水盡至三五斗以來漉去 |                   |           |
| 麻黃淘在盆中澄定良久用細羅子濾去滓取清者 |                   |           |
| 鐺內再熬至一斗再澄再濾取汁再熬至升半已來 |                   |           |
| 為度只是勤攪勿令着底恐焦了熬時忌雞犬陰人 |                   |           |
| 澄時須蓋覆不得飛入塵土其藥放一二年不妨如 |                   |           |
| 膏稠用水解熬再勻凡中風卒倒用此膏加入湯藥 |                   |           |
| 內服或用此膏丸藥             |                   |           |





三化湯 拔粹方 治中風外有六經之形証先以加減續命

湯隨証治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚樸 姜製 大黃 枳實

羌活 等分

右咬咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一

欽定四庫全書 仁齋直指 卷三

旬之通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛

自和矣

附預防中風 出乾坤生意

夫聖人治未病之病知未來之疾此其良也其中風者必有先兆之證覺大拇指及次指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣者此先兆也三年內必有大風之至經云急則治其標緩則治其本宜調其榮衛先服八風散愈風湯天麻丸各一料為効宜常服加減防

風通聖散預防其病則風疾不作而獲其安矣  
愈風湯 初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之聖藥也

又治中風症內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此乃常服之法也久則清濁自分榮衛自和矣

欽定四庫全書 仁齋直指 卷三

羌活 甘草 防風

當歸 蔓荊子 川芎

細辛 黃耆 枳殼

人蔘 麻黃 香白芷

甘菊花 薄荷 枸杞

柴胡 知母 地骨皮

獨活 杜仲 秦艽

黃芩 芍藥 各三兩 石膏



蒼朮

生地黃

各四兩

肉桂

一兩

右剉每服一兩水二鍾生姜三片煎空心服臨卧煎  
滓服空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨卧一服吞  
下四白丹謂之輕劑立其法是動以安神靜以清肺  
○假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻  
作四服加生姜空心服以粥投之得微汗則住○如  
一旬之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦勻作四  
服如前服臨卧服得利為度此藥常服之不可失四  
時之輔○如望春大寒之後本方中加半夏人蔞柴  
胡各二兩通前四兩謂迎而奪少陽之氣也○如望  
夏穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各二兩通四  
兩謂迎而奪陽明之氣也○季夏之月本方中加防  
己白朮茯苓各二兩通前四兩謂勝脾土之濕也○  
望秋大暑之後本方中加厚樸二兩藿香二兩桂一  
兩通前四兩謂迎而奪大陰之氣也○望冬霜降之  
後本方中加附子官桂各一兩當歸二兩通前四兩

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

謂勝少陰之氣也○如得春氣候減冬所加四時類  
此此雖立四時加減更宜臨病之際審察虛實寒熱  
土地之宜邪氣靈少此藥具七情六欲四氣無使五  
臟偏勝及不動於榮榮衛如風秘服之永不結滯此  
藥與天麻丸相為表裏治未病之聖藥也若已病者  
更宜常服無問男女老幼驚癇搐搦急慢驚風四時  
傷寒等病服之神効

八風散

和劑方

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚瘙

痒癰疹成瘡及治寒熱不調鼻塞聲重

藿香

去土半斤

白芷

前胡 去蘆各一斤

黃耆

去蘆

甘草

煙

人蔞

去蘆各二斤

羌活

去蘆

防風

去蘆各三斤

右為末每服貳錢水一鍾入薄荷少許煎湯調下食  
後服之

天麻圓治風因熱而生熱勝則動宜以靜勝其躁是養  
血也



|                                                                                                                                                                                                         |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 天麻                                                                                                                                                                                                      | 牛膝    | 二味用酒同浸三日焙乾 |
| 玄蔘                                                                                                                                                                                                      | 革薢    | 各六兩別研      |
| 附子                                                                                                                                                                                                      | 羌活    | 十四兩        |
| 兩炮一                                                                                                                                                                                                     | 川歸    | 十兩         |
| 生芩                                                                                                                                                                                                      | 一方有獨活 | 五兩腎間風      |
| 右為末蜜為丸如梧桐子大每服五七十丸空心溫酒白湯下予按用藥治病之法寒因熱用熱因寒用正治也今中風癱瘓之証本風火陽邪而用烏附等熱藥治之何哉蓋中風癱瘓乃濕痰死血結滯於臟腑經絡之間非烏附等熱藥而能開散流通之乎此非正治乃從治也書云從少從多各觀其事則從治之藥只可為引經而已丹溪云肥白人多濕少用烏附行經是也此方既用附子又用側子官桂助之其理安在哉本欲削去姑存以待肥白多濕之人減而用之中病則已不可過肥白多濕之人不可用也 |       |            |
| 灸法                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| 風池百會曲池合谷肩髃風市絕骨環跳三里等穴                                                                                                                                                                                    |       |            |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三



迪志文化出版有限公司出版

|                                                          |       |                  |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 皆可灸之                                                     | 附胃風   | 胃風方論             |
| 丹溪云此因初飲食訖乘風涼而致其証脹滿食飲不下形瘦腹大惡風頭多汗膈塞不通胃風湯正始此然亦看挾証加減脈右關弦而緩帶浮 |       |                  |
| 胃風湯                                                      | 拔粹方   | 治虛風証能食麻木牙關急搐目內蠕睨 |
| 胃風面腫                                                     |       |                  |
| 白芷                                                       | 二錢    | 葛根               |
| 當歸身                                                      | 各一錢   | 升麻               |
| 柴胡                                                       | 藁本    | 羌活               |
| 黃柏                                                       | 草薢    | 各三錢              |
| 蔓荊子                                                      | 一分    | 麻黃               |
| 右咬咀水貳盞薑三片棗一枚煎至壹盞去滓溫服                                     |       |                  |
| 胃風湯治風冷入于腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒下如豆汁或瘀血                               | 方見瀉痢門 |                  |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三



迪志文化出版有限公司出版

附傷風

傷風方論

內經曰風為百病之長又曰風勝則動又曰賊虛邪者陽受之又曰傷於風者上先受之

丹溪云傷風屬肺者多宜辛溫或辛涼之劑散之如桂枝湯葳蘇飲消風散羌活散究證施治

附諸方

桂枝湯治太陽經傷風頭疼身痛或翕翕發熱或洒洒

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

惡風自汗  
無汗者不可服

桂枝  
芍藥  
甘草  
各三兩  
炙一兩

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎七分去滓溫服不拘時服惟春初依此方自春末夏至已前加黃芩半兩夏至後加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒不用加減

神術散  
和劑方  
治四時瘟疫頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

蒼朮  
米泔浸  
藁本  
香白芷

細辛  
去土  
羌活  
去蘆  
川芎

甘草  
炙各二兩

右為細末每服三錢水一盞薑三片葱白三寸煎七分溫服不拘時如傷風鼻塞用蔥茶調下二錢

定風餅子  
簡易方  
治風客陽經邪傷腠理背脊彊直言語

蹇澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪

川烏  
南星  
川芎

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

乾薑  
甘草  
半夏

天麻  
白茯苓  
生各等分  
加白附子

右為末薑汁丸如龍眼大作餅子生朱砂為衣每服一餅細嚼熱生薑湯下不拘時服

金沸草散  
和劑方  
治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾

稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花  
去梗  
荆芥穗  
四兩  
麻黃  
去節

前胡  
去蘆各三兩  
甘草  
炙  
赤芍藥





|                                             |  |                                                       |  |                                                                     |  |                                                                        |  |                                                       |  |                                                                     |  |                                                                        |  |                                                                     |  |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| 半夏 <small>湯洗七次姜汁浸各一兩</small>                |  | 右咬咀每服五錢水一盞薑三片棗一枚煎八分溫服                                 |  | 茯苓 <small>去皮各七錢半</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 桔梗 <small>去蘆</small> |  | 甘草 <small>炙</small> 陳皮 <small>去白各半兩</small>                            |  | 右咬咀每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎六分去滓熱服不拘時 <small>易簡方以氣盛不用木香</small> |  | 冲和散 <small>簡易方</small> 治感冒風濕之氣頭目不清鼻塞聲重肢體倦怠欠伸出淚                      |  | 蒼朮 <small>米泔浸炒六兩</small> 荊芥穗 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩一錢半</small> |  | 右咬咀每服五錢水壹盞煎八分去滓熱服不拘時                                                |  |
| 木香                                          |  | 紫蘇葉                                                   |  | 乾葛 <small>洗</small>                                                 |  | 半夏 <small>湯泡七次姜製</small> 前胡 <small>去苗</small> 人參 <small>去蘆</small>     |  | 欽定四庫全書 仁齋直指 卷三                                        |  | 茯苓 <small>去皮各七錢半</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 桔梗 <small>去蘆</small> |  | 甘草 <small>炙</small> 陳皮 <small>去白各半兩</small>                            |  | 右咬咀每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎六分去滓熱服不拘時 <small>易簡方以氣盛不用木香</small>               |  |
| 荳蔻飲 <small>和劑方</small> 治感冒風邪發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠     |  | 粘此藥大解肌熱寬中快膈或欲成勞瘵潮熱往來並能治之                              |  | 木香                                                                  |  | 紫蘇葉                                                                    |  | 乾葛 <small>洗</small>                                   |  | 半夏 <small>湯泡七次姜製</small> 前胡 <small>去苗</small> 人參 <small>去蘆</small>  |  | 欽定四庫全書 仁齋直指 卷三                                                         |  | 茯苓 <small>去皮各七錢半</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 桔梗 <small>去蘆</small> |  |
| 甘草 <small>炙</small> 陳皮 <small>去白各半兩</small> |  | 右咬咀每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎六分去滓熱服不拘時 <small>易簡方以氣盛不用木香</small> |  | 冲和散 <small>簡易方</small> 治感冒風濕之氣頭目不清鼻塞聲重肢體倦怠欠伸出淚                      |  | 蒼朮 <small>米泔浸炒六兩</small> 荊芥穗 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩一錢半</small> |  | 右咬咀每服五錢水壹盞煎八分去滓熱服不拘時                                  |  | 欽定四庫全書 仁齋直指 卷三                                                      |  | 茯苓 <small>去皮各七錢半</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 桔梗 <small>去蘆</small>    |  | 甘草 <small>炙</small> 陳皮 <small>去白各半兩</small>                         |  |

|                                                                   |  |                            |  |                                                                  |  |                                  |  |                                            |  |                                                                     |  |                                                                    |  |                                             |  |                         |  |                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| 消風百解散 <small>和劑方</small> 治四時傷寒頭疼發熱惡寒及風壅咳嗽鼻塞聲重                     |  | 荊芥 白芷 陳皮 <small>去白</small> |  | 麻黃 <small>去節</small> 蒼朮 <small>各四兩</small> 甘草 <small>炙二兩</small> |  | 右咬咀每服五錢水一盞薑三片蔥白三莖煎七分不拘時服如咳嗽再加烏梅煎 |  | 川芎茶調散 <small>和劑方</small> 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重 |  | 薄荷 <small>去梗不見火八兩</small> 川芎 <small>四兩</small> 羌活 <small>二兩</small> |  | 甘草 <small>二兩</small> 細辛 <small>去葉一兩</small> 防風 <small>去蘆半兩</small> |  | 白芷 <small>二兩</small> 荊芥 <small>去梗四兩</small> |  | 右為末每服二錢食後茶清調下常服清頭目一方無細辛 |  | 消風散 <small>和劑方</small> 治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲重耳作蟬鳴及皮膚頑麻瘙癢癰疹婦人血風頭痛腫痒並皆治之 |  |
| 消風百解散 <small>和劑方</small> 治四時傷寒頭疼發熱惡寒及風壅咳嗽鼻塞聲重                     |  | 荊芥 白芷 陳皮 <small>去白</small> |  | 麻黃 <small>去節</small> 蒼朮 <small>各四兩</small> 甘草 <small>炙二兩</small> |  | 右咬咀每服五錢水一盞薑三片蔥白三莖煎七分不拘時服如咳嗽再加烏梅煎 |  | 川芎茶調散 <small>和劑方</small> 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重 |  | 薄荷 <small>去梗不見火八兩</small> 川芎 <small>四兩</small> 羌活 <small>二兩</small> |  | 甘草 <small>二兩</small> 細辛 <small>去葉一兩</small> 防風 <small>去蘆半兩</small> |  | 白芷 <small>二兩</small> 荊芥 <small>去梗四兩</small> |  | 右為末每服二錢食後茶清調下常服清頭目一方無細辛 |  | 消風散 <small>和劑方</small> 治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲重耳作蟬鳴及皮膚頑麻瘙癢癰疹婦人血風頭痛腫痒並皆治之 |  |
| 消風散 <small>和劑方</small> 治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲重耳作蟬鳴及皮膚頑麻瘙癢癰疹婦人血風頭痛腫痒並皆治之 |  | 荊芥 白芷 陳皮 <small>去白</small> |  | 麻黃 <small>去節</small> 蒼朮 <small>各四兩</small> 甘草 <small>炙二兩</small> |  | 右咬咀每服五錢水一盞薑三片蔥白三莖煎七分不拘時服如咳嗽再加烏梅煎 |  | 川芎茶調散 <small>和劑方</small> 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重 |  | 薄荷 <small>去梗不見火八兩</small> 川芎 <small>四兩</small> 羌活 <small>二兩</small> |  | 甘草 <small>二兩</small> 細辛 <small>去葉一兩</small> 防風 <small>去蘆半兩</small> |  | 白芷 <small>二兩</small> 荊芥 <small>去梗四兩</small> |  | 右為末每服二錢食後茶清調下常服清頭目一方無細辛 |  | 消風散 <small>和劑方</small> 治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲重耳作蟬鳴及皮膚頑麻瘙癢癰疹婦人血風頭痛腫痒並皆治之 |  |



|                                                                       |  |                                             |  |                                          |  |                      |  |                      |  |                                                                        |  |                                              |  |                                                                   |  |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷三                                                  |  | 昏眩項背拘急皮膚瘙癢並皆治之                              |  | 大辰砂圓 <small>御藥院方</small> 清頭目化痰涎及感冒風寒聲重頭目 |  | 湯茶清調下遍身瘡癰溫酒下         |  | 右為細末每服二錢感風頭痛鼻流清涕者用荊芥 |  | 蟬蛻 <small>去土炒各一兩</small> 厚樸 <small>去皮薑製半兩</small> 羌活 <small>一兩</small> |  | 防風 <small>去蘆</small> 芎藭藿香葉 <small>去梗</small> |  | 人蔘 <small>去蘆</small> 茯苓 <small>去皮用白者</small> 白殭蠶 <small>炒</small> |  | 荊芥穗甘草 <small>炒各二兩</small> 陳皮 <small>半兩白</small> |  |
| 天麻 <small>去苗一兩</small> 防風 <small>去蘆二兩</small> 細辛 <small>去葉土半兩</small> |  | 薄荷葉 <small>兩半</small> 川芎甘草 <small>炙</small> |  | 吳白芷朱砂 <small>各一兩為衣</small>               |  | 右以七味為細末煉蜜丸如彈子大朱砂為衣每服 |  | 一九細嚼食後生薑湯下茶清亦可       |  | 人蔘敗毒散 <small>和劑方</small> 治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽                                |  | 鼻塞聲重如心經蘊熱口舌乾燥者加黃芩                            |  | 柴胡 <small>去苗</small> 甘草 <small>炙</small> 桔梗                       |  |                                                 |  |

|                                                                 |  |                            |  |                                                                  |  |                                                                |  |                         |  |                      |  |                         |  |                                                                  |  |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷三                                            |  | 風雨頓覺不安                     |  | 羌活散 <small>和劑方</small> 治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘                          |  | 急及風邪塞壅頭痛項彊鼻塞聲重肢節煩疼天陰                                           |  | 分去滓溫服                   |  | 右咬咀每服三錢水一盞薑三片薄荷少許同煎七 |  | 獨活 <small>去蘆各等分</small> |  | 茯苓 <small>去皮</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 前胡 <small>去苗洗</small> |  | 人蔘 <small>去蘆</small> 羌活 <small>苗去</small> 芎藭 |  |
| 前胡 <small>去蘆</small> 羌活 <small>去蘆</small> 麻黃 <small>去節根</small> |  | 白茯苓 <small>皮去</small> 川芎黃芩 |  | 甘草 <small>炙</small> 蔓荊子 <small>皮去白</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> |  | 細辛 <small>去苗</small> 石膏 <small>研別</small> 菊花 <small>去梗</small> |  | 防風 <small>去蘆各一兩</small> |  | 右咬咀每服一兩薑四片薄荷三葉水二盞煎至一 |  | 盞溫服                     |  | 附破傷風                                                             |  |                                              |  |



破傷風方論

病機云破傷風者同傷寒證治通於表裏分別陰陽有在表有在裏有在半表半裏者在裏宜下在表宜汗在表裏之間宜和解不可過其治也

河間曰破傷風者從外至內甚于內者則病也因此卒暴傷損風襲之間傳播經絡至使寒熱更作身體反彊口噤不開甚者邪氣入臟則分汗下之治諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入于瘡為破

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

傷風之候故諸瘡不瘥吁世皆言着灸為上是為熱瘡而不知火熱客毒逐經諸變不可勝數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口噤目邪皆因瘡鬱結於榮衛不得宣通而生亦有破傷不灸而病此者瘡着白痴瘡口閉塞氣難通泄故陽熱亦為鬱結而熱甚則生風也故表脈浮而無力太陽也脈長而有力者陽明也脈浮而弦小者少陽也太陽宜汗陽明宜下少陽宜和若明此三法而治不中病者未之有也



迪志文化出版有限公司出版

羌活防風湯 方 拔粹 治破傷風邪初傳在表

羌活 防風 川芎

藁本 當歸 芍藥

甘草 兩 各一 地榆 兩 各二

右咬咀每服五七錢水一盞半同煎至七分去粗熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃二兩大便秘則加大黃一兩緩緩令過

白朮防風湯 方 拔粹 若服前藥之過有自汗者宜服此藥

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

白朮 黃芪 兩 各一 防風 兩 二

右咬咀每服五七錢水一盞半煎至一盞去粗溫服不拘時候○臟腑和而有自汗可用此藥○破傷風臟腑秘小便赤自汗不止者因用熱藥汗出不休故知無寒也宜速下之先用芎黃湯三二服後用大芎黃湯下之

芎黃湯 方 拔粹

川芎 兩 一 黃芩 錢 六 甘草 錢 二



迪志文化出版有限公司出版

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 右咬咀每服五七錢水一盞半同煎至七分去滓溫服不拘時候三服即止再用下藥 |     |
| 大芎黃湯                              | 拔粹方 |
| 川芎                                | 羌活  |
| 黃芩                                |     |
| 大黃                                | 各一兩 |
| 右咬咀依前煎服宜利為度                       |     |
| 羌活湯                               | 拔粹方 |
| 治半在表半在裏                           |     |
| 羌活                                | 去蘆  |
| 菊花                                | 去梗  |
| 麻黃                                | 去節根 |
| 欽定四庫全書                            |     |
| 仁齋直指                              |     |
| 卷三                                |     |
| 川芎                                | 白茯苓 |
|                                   | 去皮  |
| 防風                                | 去蘆  |
| 石膏                                | 研   |
| 前胡                                | 去蘆  |
| 黃芩                                |     |
| 蔓荊子                               | 細辛  |
|                                   | 去葉  |
| 甘草                                | 炙   |
| 枳殼                                | 薄荷  |
| 各一兩                               | 香白芷 |
|                                   | 各半兩 |
| 右咬咀每服一兩水二盞生薑五片煎至一盞去滓通口服食後滓再煎服     |     |
| 白朮湯                               | 拔粹方 |
| 治破傷風大汗不止筋攣搐搦                      |     |
| 白朮                                | 葛根  |
| 芍藥                                |     |

|                                                                      |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| 升麻                                                                   |  | 黃芩   |  | 甘草               |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  | 錢 各五 |  | 炙 二              |  |  |  |  |  |
| 右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時                                                |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |
| 江鰮丸                                                                  |  | 方 拔粹 |  | 治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在裏 |  |  |  |  |  |
| 可用江鰮丸下之                                                              |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |
| 江鰮                                                                   |  | 炒 剉  |  | 野鴿糞              |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |      |  | 炒                |  |  |  |  |  |
| 雄黃                                                                   |  | 兩 一  |  | 蜈蚣               |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |      |  | 對 一              |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |      |  | 天麻               |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |      |  | 兩 一              |  |  |  |  |  |
| 右為末作三分二分用燒飯丸桐子大硃砂為衣一分巴豆霜二錢半亦燒飯丸桐子大每服硃衣丸三十丸加巴豆霜丸一丸第二服加貳丸加至利為度再服硃砂丸病愈止 |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |
| 蜈蚣全蝎散治破傷風搐搦角弓反張                                                      |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |
| 蜈蚣                                                                   |  | 去 毒炒 |  | 全蝎               |  |  |  |  |  |
| 一條                                                                   |  |      |  | 毒 一對炒去           |  |  |  |  |  |
|                                                                      |  |      |  | 並頭足              |  |  |  |  |  |
| 右為細末如發時用一字或二字擦牙縫內或吹鼻中                                                |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |
| 防風湯                                                                  |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |
| 方 拔粹                                                                 |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |
| 治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜急服                                                     |  |      |  |                  |  |  |  |  |  |





|                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| 此藥                   |  | 防風                   |  | 羌活                   |  | 獨活                   |  |
| 川芎                   |  | 分 各等                 |  | 右咬咀每服五錢水一鍾半煎至七分去滓溫服二 |  | 三服後宜調蜈蚣散大効           |  |
| 蜈蚣散                  |  | 方 拔粹                 |  | 蜈蚣                   |  | 對 一                  |  |
| 江鰮                   |  | 錢 三                  |  | 右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺轉入 |  | 裏當服左盤龍圓微利看大便硬軟加巴豆霜服之 |  |
| 左盤龍                  |  | 方 拔粹                 |  | 左龍丸                  |  | 錢 一                  |  |
| 白薑蠶                  |  | 鰮 各五                 |  | 雄黃                   |  | 錢 一                  |  |
| 右為細末燒餅為丸如桐子大每服十五丸溫酒下 |  | 如裏證不已當于左龍丸一處半內入巴荳霜半錢 |  | 燒餅為丸如桐子大每服一丸同左龍丸一處合服 |  | 每服藥中一丸如此漸加服至利為度若利後更服 |  |

|                  |  |      |  |                      |  |                      |  |           |  |                       |  |
|------------------|--|------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|
| 後藥若搐瘥不已亦宜服後藥羌活湯也 |  | 羌活湯  |  | 方 拔粹                 |  | 羌活                   |  | 獨活        |  | 防風                    |  |
| 地榆               |  | 兩 各一 |  | 右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去粗溫服如 |  | 有熱加黃芩○有涎加半夏○若病日久氣血漸虛 |  | 邪氣入胃宜養血為度 |  | 養血當歸地黃湯               |  |
| 當歸               |  | 地黃   |  | 芍藥                   |  | 防風                   |  | 川芎        |  | 藁本                    |  |
| 白芷               |  | 兩 各一 |  | 細辛                   |  | 錢 五                  |  | 右咬咀依前煎服   |  | 地榆防風散治破傷中風半在表半在裏頭微汗身無 |  |
| 汗不可發汗宜表裏治之       |  | 地榆   |  | 防風                   |  | 地丁香                  |  | 馬牙莧       |  | 分 各等                  |  |

右為細末每服三錢溫米調下

秘傳止血定痛生肌散專治跌打損傷牙咬刀傷出血

諸般腫毒出膿後肌肉不生痛不止者並皆治之

真龍骨 錢三 煨三 白芷 二錢 五分

黃丹 飛過 五錢

軟石膏 煨去火 錢二 血結 二錢

乳香 三錢

沒藥 三錢 朝腦 少許

右為細末磁礮摻患處血止痛定肌生累用應効如

神如若腫毒頑瘡收口先用此藥摻瘡口再用白膏

欽定四庫全書 仁齋直指 卷三

藥貼之肌生收口 方見腫 毒門

秘傳破傷風方

初覺有風急取熱糞堆內蟻螬蟲一二箇用手捏住

待蟲口中吐出水就抹在破處身穿稍厚衣裳待少

時瘡口覺麻兩脇微汗風出立効如風緊急速取此

蟲三五箇剪去尾肚內黃水自出塗瘡口再滴些少

入熱酒飲之汗出立効

秘傳獨聖散治破傷風五七日未愈已至角弓反張牙

關緊急服之立有神効

蟬退 去頭足土 淨五錢

右為末用好酒壹碗煎滾服之立甦為妙

已上三方秘傳累用得効故附于末

如聖散 聖惠方 治破傷風止血定痛

蒼朮 六兩 川烏頭 炮去皮 四兩 防風

草烏頭 炮去皮 兩各二 細辛 兩各二 兩頭尖 炮去皮 四兩

天麻 川芎 白芷 各兩 半

欽定四庫全書 仁齋直指 卷三

蝎稍 微炒 雄黃 各半 兩 損骨加乳香 半兩

右為細末每服一錢酒調下不拘時服

蜈蚣散治破傷風搐搦角弓反張

蜈蚣 去毒炒 一條 全蝎 一對炒 去毒

右為細末如發時用一字或二字擦牙縫內或吹鼻

中

一方治破傷風欲死者

川烏 南星 半夏 並生



天麻 去蘆  
等分

右為細末每服一錢豆淋酒調下稍溫服次以酒三盞投之

寒

中寒方論

寒者嚴凝殺厲之氣也人以腎為根本惟腎則受寒惟寒則傷腎腎氣一虛寒邪交作急痛拘攣戰掉彊直昏迷厥冷口噤失音此中寒也無汗惡寒頭疼面慘發熱

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

拘急手足微寒此傷寒也霍亂轉筋洞泄下痢乾嘔吐逆積飲停痰此寒邪入腸胃也以至為咳嗽為虛勞為疝瘕為脚氣為帶漏為遺精為咳瘧為諸痛寒亦主之人惟腎氣不充疎于謹護非特霜凝冰泣之謂寒或者炎天暑月當風取涼卧地受冷使寒邪之氣自皮膚而達經絡自經絡而入臟腑如前數證皆得以恣睢四出矣溫腎禦寒如乾薑附子川烏天雄輩佐之以養正靈砂此固藥籠中物然寒傷榮氣徒知溫腎而不知溫血

恐未必有十全之功是則官桂當歸又溫血之上藥也不然古人何以致意於寒泣血云

中寒證治

不換金正氣散解散寒邪

蒼朮 炒

橘紅

半夏麴

厚樸 製

藿香葉 各一兩

甘草 炒三分

右剉散每服三錢薑五片棗二枚煎服

養胃湯治外感寒邪內傷生冷

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

蒼朮 炒

厚樸 製

半夏麴 各一兩

人蔘

茯苓

草果

藿香 各半兩

橘紅 七錢半

甘草 炒三錢半

右剉每服三錢加桂半錢薑七片烏梅半箇煎服

薑桂散溫中散寒生

乾薑

良薑 各半兩

辣桂

木香

半夏麴

甘草 炒各二錢半

右剉散每服三錢薑五片棗二箇煎服



附諸方

生料五積散

和劑方

治感冒寒邪頭疼身痛項彊拘急惡

寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內

傷生冷外感風寒及寒濕客於經絡腰脚酸疼及婦

人經泄腹痛並皆治之

蒼朮

米泔浸去粗皮二十四兩

桔梗

去蘆十兩

陳皮

去白

麻黃

去節根

枳殼

去穰麩炒各六兩

厚樸

乾薑

各四兩

白芷

欽定四庫全書



仁齋直指卷三

川芎

甘草

炙

茯苓

去皮

肉桂

芍藥

當歸

各三兩

半夏

湯泡七次二兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片蔥白三根煎

七分熱服冒寒用煨薑挾氣加吳茱萸婦人調經則

用艾醋

按此藥氣味辛溫發表溫中開鬱行氣有殊功去寒

濕之聖藥也夫寒濕屬陰熱燥屬陽人之為病不過

二者而已矣善用藥者以苦寒而瀉其陽以辛溫而

散其陰病之不愈者未之有也予嘗以防風通勝散

瀉熱燥之藥也生料五積散為散寒濕之藥也不識

明哲以為何如

理中湯

和劑方

治臟腑中寒口噤失音四肢彊直兼治胃

脘停痰冷氣刺痛

人蔘

乾薑

炮

甘草

炙

白朮

各等分

欽定四庫全書



仁齋直指卷三

右咬咀每服四錢水一盞煎服

四逆湯

和劑方

治傷寒自利脈微欲絕手足厥冷

四逆名者四肢

逆冷也

甘草

炙二兩

乾薑

半兩

附子

去皮半兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分溫服不拘時

白朮散

活人方

治陰毒傷寒乾煩燥四肢逆冷

川烏

炮去臍皮

桔梗

去蘆

白朮

附子

炮去臍皮

細辛

各一兩

乾薑

炮半兩





|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 右為末每服二錢水一盞煎六分熱服不拘時       |                       |
| 補中益氣湯                    | <small>方見內傷</small>   |
| 附子理中湯治中寒中濕嘔逆虛弱           |                       |
| 人蔘                       | 白朮                    |
| 熟附子                      | <small>各一兩</small> 甘草 |
| 右咬咀每三錢薑五片食前煎服少血加當歸       |                       |
| 沈附湯治虛寒無陽胃弱乾嘔             |                       |
| 熟附子                      | 乾薑                    |
|                          | <small>炮各半兩</small>   |
|                          | 沈香                    |
| 白朮                       |                       |
| <small>各一分</small>       | 甘草                    |
|                          | <small>炒一錢半</small>   |
| 右剉每三錢薑五片煎食前服             |                       |
| 薑附湯治中寒厥冷彊直失音口噤吐沫或陰盛發燥    |                       |
| 熟附子                      | 乾薑                    |
|                          | <small>炮等分</small>    |
| 右咬咀每服三錢水盞半煎半空心溫和服亦治洞泄嘔吐  |                       |
| 附子散傷寒陰證脣青面黑身背彊痛四肢厥冷及諸虛沈寒 |                       |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| 熟附子                   | 官桂  | 當歸  |
| 分三                    |     |     |
| 白朮                    | 乾薑  | 半夏麴 |
| 分各二                   | 炮   | 分各一 |
| 右剉每服三錢薑五片棗二枚食前煎服      |     |     |
| 五丹圓治沈寒痼冷方見血證類         |     |     |
| 應夢人蔘散治傷寒身熱頭疼亦主痰嗽      |     |     |
| 人蔘                    | 白朮  | 白芷  |
| 乾葛                    | 北梗  | 青皮  |
|                       |     | 分各三 |
| 甘草                    | 乾薑  |     |
| 兩炒一                   | 半錢  |     |
| 右為末每服二錢薑棗煎服           |     |     |
| 敗毒散傷寒熱證通用             |     |     |
| 人蔘                    | 赤茯苓 | 川芎  |
| 北梗                    | 羌活  | 獨活  |
| 前胡                    | 柴胡  | 枳殼  |
|                       |     | 製   |
| 甘草                    |     |     |
| 分炒等                   |     |     |
| 右剉散每服三錢薑五片煎服人參羌活散用藥亦同 |     |     |
| 傷寒證治格法活人摠括備述其詳        |     |     |



暑  
附 暑風  
注夏

中暑論

人有常言傷暑做出百般病其果厚誣哉蓋暑之入人伏於三焦腸胃之間至有兼旬累月而不可測識者如嘔吐如中滿如泄瀉如下痢如焦渴如發瘧如腹痛如下血以至諸熱等證苟因暑得之其根未除雖百藥遍嘗難施其巧夫人心胞絡與胃口相應胃氣稍虛或因饑冒暑故暑氣自口鼻而入凝之於牙頰達之于心胞

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

絡如響應聲遇暑以還急漱口而勿嚥可也若覺暑毒逼塞咽喉尤當灌滌而吐之傷暑脈虛面垢自汗身熱背寒煩悶大渴倦怠少氣毛聳惡寒或頭疼或霍亂或四肢厥冷但身體無痛經云熱則諸毛孔開故灑然惡寒體認不精妄以傷暑為傷寒誤人不小然而暑家何以脈虛暑能消氣氣消則血散脈安得而不虛其或六脈沈伏冷汗自出悶絕而昏不知人此則中暑證候又加重耳治法大要雖貴于驅暑尤貴于和中二者並行

則其間雜證不戰而自屈若汗若下若用藥差冷古人戒之雖然夏月伏陰在內暑家氣虛脈虛或飲水過多或冷藥無度傷動其中嘔吐不食自利不渴此則外熱裏寒無惑乎傷暑伏熱之說非理中湯不可也又有冷藥過度胃寒停水潮熱而嘔或身熱微煩此則陽浮外而不內非小半夏茯苓湯不可也抑猶有戒焉暑家脈虛面鰲冷汗灑然毛聳手足微寒苟不明辨其裏熱之證誤以剛劑投之抱薪救焚不發黃則發斑甚者蓄血

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

悶亂而斃矣吁可畏哉

中暑證治

五物香薷湯驅暑和中通用

香薷 三兩 白扁豆 薑製 厚樸 製

白茯苓 各一兩半 甘草 炙一兩

右剉每服三錢水煎溫服

香薷縮脾飲驅暑和中除煩止渴

縮砂仁 二兩 草薢仁 烏梅肉



|                       |                         |                    |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 香薷                    | 甘草                      | 白扁豆                |
| <small>兩 炒各</small>   | <small>兩 半</small>      | <small>製 薑</small> |
| 白乾葛                   |                         |                    |
| <small>兩 各一</small>   |                         |                    |
| 右剉每服三錢薑五厚片水煎微溫服       |                         |                    |
| 香薷剉散解暑毒止霍亂            |                         |                    |
| 香薷                    | 厚樸                      | 茯苓                 |
| <small>兩 二</small>    | <small>兩 製一</small>     |                    |
| 陳皮                    | 甘草                      | 良薑                 |
|                       | <small>半 炙各</small>     | <small>錢 三</small> |
| 右剉細每服二錢半鹽一捻水煎服        |                         |                    |
| 五苓散治傷暑煩渴引飲過多小便赤澀心下水氣  |                         |                    |
| <small>見方</small>     |                         |                    |
| 欽定四庫全書                | 仁齋直指                    |                    |
| 卷三                    |                         |                    |
| 水飲                    |                         |                    |
| 小柴胡湯治傷暑外熱內渴           |                         |                    |
| <small>方見血</small>    |                         |                    |
| 妙                     |                         |                    |
| 竹葉石膏湯治伏暑內外熱熾煩燥大渴      |                         |                    |
| 石膏                    | 半夏                      |                    |
| <small>斤 半</small>    | <small>一 盪洗七次切焙</small> |                    |
| 麥門冬                   | 人蔘                      |                    |
| <small>七 去心二兩</small> |                         |                    |
| 甘草                    |                         |                    |
| <small>一 炒各</small>   |                         |                    |
| 右麤末每服二錢薑五片青竹葉七片粳米百粒水  |                         |                    |

|                        |                     |                     |    |                   |
|------------------------|---------------------|---------------------|----|-------------------|
| 煎服                     | 六和湯治暑證身熱嘔不甚渴        | 人蔘                  | 半夏 | 杏仁                |
|                        |                     |                     |    | <small>去皮</small> |
| 甘草                     | 甘草                  | 縮砂仁                 | 茯苓 |                   |
| <small>炒</small>       | <small>炒</small>    | <small>兩 各一</small> |    |                   |
| 藿香                     | 宣木瓜                 | 扁豆                  |    |                   |
|                        |                     | <small>製各</small>   |    |                   |
| 厚樸                     | 香薷                  |                     |    |                   |
| <small>兩 製三</small>    | <small>兩 四</small>  |                     |    |                   |
| 右剉每服三錢薑五片煎服內傷生冷通用      |                     |                     |    |                   |
| 二陳湯                    | 治傷暑復感冷及內傷生冷         |                     |    |                   |
| <small>見痰類</small>     |                     |                     |    |                   |
| 欽定四庫全書                 | 仁齋直指                |                     |    |                   |
| 卷三                     |                     |                     |    |                   |
| 半夏                     | 橘紅                  | 茯苓                  |    |                   |
| <small>製一</small>      | <small>兩 各五</small> | <small>兩 三</small>  |    |                   |
| 甘草                     |                     |                     |    |                   |
| <small>兩 炙一</small>    |                     |                     |    |                   |
| 右咬咀每服三錢薑七片小烏梅一枚煎服感冷更   |                     |                     |    |                   |
| 添生薑                    |                     |                     |    |                   |
| 小半夏茯苓湯                 |                     |                     |    |                   |
| <small>方見水</small>     |                     |                     |    |                   |
| 消暑圓治傷暑伏熱生痰以致頭痛中痞       |                     |                     |    |                   |
| 半夏                     | 茯苓                  |                     |    |                   |
| <small>半 斤洗淨醋二</small> |                     |                     |    |                   |
| 甘草                     |                     |                     |    |                   |
| <small>四 生各</small>    |                     |                     |    |                   |

右末之用醋并薑汁調半夏煮糊圓桐子大每服七十圓熟水下暑藥皆可下

來復丹均平陰陽治中暑昏迷霍亂吐瀉

透明硫黃

硝石

各一兩並為細末入定磁內以微火慢炒用柳兔不住

手攪令陰陽氣相入再研極細

元精石

一兩研飛

五靈脂

五臺山者水澄去砂

石日乾

陳橘皮

去白

青橘皮

去白各二兩

右靈脂二橘皮為細末次入元精末及硫黃硝石末和畢以好醋打糊圓豌豆大每服五十圓空心米飲

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

下或五苓散下或水研灌亦得

大黃龍圓治中暑昏潰眩暈分利陰陽

透明硫黃

硝石

各一兩

白礬

枯

雄黃

滑石

各半兩

飛羅白麪

四兩

右為細末入麪拌和滴水圓桐子大每服十五圓至

二三十圓新汲水下昏塞者水研灌下如無硝石以

盆硝代來復黃龍大抵性溫

道途中暑昏仆即扶起以手巾蘸熱湯煖其臍腹即

漸蘇醒次以來復丹為末井水調下無中則以大蒜細研新水調與之仍以蒜少許置鼻中或謂中暑最忌得冷來復黃龍并蒜以水調下者何蓋其藥性溫因寒而發用也

附諸方

香薷飲

和劑方

治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之

之

一方加黃連四兩用薑汁同炒令老黃色名黃連香

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

薷飲

厚樸

去皮薑汁炙熟半斤

白扁豆

微炒半斤

香薷

去土一斤

右咬咀每服三錢水一鍾入酒少許煎七分沈冷不

拘時服熱則作瀉香薷須陳者佳

縮脾飲

和劑方

消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

縮砂仁

四兩

乾葛

二兩

白扁豆

二兩

烏梅肉

草果

炒去皮

甘草

炙各四兩

一方無乾葛有乾薑



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版



|                      |                      |                      |                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 欽定四庫全書               |                      | 仁齋直指                 |                  |
| 卷三                   |                      |                      |                  |
| 右咬咀每服四錢水一大椀煎七分以水洗冷服  | 加味五苓散                | 治伏暑熱二氣及冒濕泄瀉注下或       | 煩或小便不利           |
| 赤茯苓                  | 澤瀉                   | 豬苓                   | 車前子              |
| 皮去                   |                      | 皮去                   | 各半               |
| 白朮                   | 官桂                   | 火                    | 不見               |
| 兩各一                  |                      |                      |                  |
| 生脈湯生津止渴              | 麥門冬                  | 五味子                  |                  |
| 人蔘                   |                      |                      |                  |
| 右剉水煎服                |                      |                      |                  |
| 人蔘白虎湯                | 治伏暑發渴嘔吐身熱脈虛自汗        |                      |                  |
| 徐同知方                 |                      |                      |                  |
| 人蔘                   | 知母                   | 石膏                   |                  |
| 半一錢                  | 二錢                   | 半兩                   |                  |
| 甘草                   |                      |                      |                  |
| 錢一                   |                      |                      |                  |
| 右咬咀入粳米一合水二鍾煎至一鍾不拘時熱服 | 如伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎服伏熱後或 | 冷水沐浴或喫冷物清氣在脾不覺散令日晡作寒 | 慘壯熱渾身洒淅宜加桂煎服出汗便解 |
| 大順散                  | 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀下     |                      |                  |
| 和劑方                  |                      |                      |                  |

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 欽定四庫全書               |                      | 仁齋直指                 |                      |
| 卷三                   |                      |                      |                      |
| 分霍亂嘔吐臟腑不調            | 甘草                   | 乾薑                   | 杏仁                   |
|                      | 三斤                   |                      | 去皮                   |
| 肉桂                   | 去皮各六兩四錢              |                      |                      |
| 右先將甘草用白砂蜜炒及八分黃熟次入乾薑同 | 炒却入杏仁候杏仁不作聲為度用篩篩淨後入內 | 桂一處搗羅為末每服三錢水一盞煎至七分溫服 | 如煩燥并花水調下不拘時候以沸湯點服亦可  |
| 十味香薷飲                | 消暑氣和脾胃               |                      |                      |
| 百一選方                 |                      |                      |                      |
| 香薷                   | 人蔘                   | 陳皮                   | 白扁豆                  |
| 一兩                   | 去蘆                   | 去                    | 炒去                   |
| 白朮                   | 黃芪                   | 厚樸                   | 乾木瓜                  |
|                      | 去蘆                   | 去皮薑汁                 |                      |
| 甘草                   |                      |                      |                      |
| 炙                    |                      |                      |                      |
| 白茯苓                  | 去皮各半兩                |                      |                      |
| 右為末每服二錢熱湯冷水任調下       | 清暑益氣湯                | 治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦       | 精神減少懶於動作胃滿氣促肢下疼痛或氣高而 |
| 東垣方                  |                      |                      |                      |
| 喘身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便澹而頻或 |                      |                      |                      |



|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 痢或渴不思飲食自汗體虛                         |                           |
| 黃芪                                  | 蒼朮<br><small>米泔制</small>  |
| 人蔘                                  | 白朮                        |
| 陳皮                                  | 澤瀉<br><small>各五分</small>  |
| 酒柏                                  | 麥門冬                       |
| 葛根<br><small>三分</small>             | 五味子<br><small>九粒</small>  |
| 右咬咀作一服水二大鍾煎至一鍾去查大溫服食                |                           |
| 遠                                   |                           |
| 益元散<br><small>即天水散又</small>         |                           |
| 治中暑身熱小便不利此藥性涼                       |                           |
| 除胃脘積熱又淡能滲濕故利小便而散濕熱也                 |                           |
| 滑石<br><small>六兩桂府者為効非桂府則不為佳</small> | 甘草<br><small>微炒一兩</small> |
| 右為末每服三錢蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗                |                           |
| 以蔥白豆豉湯調下                            |                           |
| 桂苓甘露散治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利                |                           |
| 白朮                                  | 茯苓<br><small>去皮</small>   |
| 甘草<br><small>炙</small>              |                           |
| 葛根                                  | 澤瀉                        |
| 石膏                                  |                           |

欽定四庫全書 仁齋直指 卷三



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                                                                    |     |    |    |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----|
| 寒水石                                                                                                                | 各一兩 | 官桂 | 半兩 | 人蔘 | 去蘆  |
| 藿香                                                                                                                 | 各半兩 | 滑石 | 一兩 | 木香 | 二錢半 |
| 暑病治例                                                                                                               |     |    |    |    |     |
| 出明醫雜著                                                                                                              |     |    |    |    |     |
| 王節齋曰夏至日後病熱為暑暑者相火行令也夏日人感之自口齒而入傷心包絡之經其脈虛或浮大而散或弦細芤遲蓋熱傷氣則氣消而脈虛弱其為症汗煩則喘渴靜則多言身熱而煩心痛大渴引                                   |     |    |    |    |     |
| 飲頭疼自汗倦怠少氣或下血發黃生斑甚者火熱制金不能平木搖擗不省人事治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補真氣為要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不省而為霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉利此則非暑傷人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病然治法不同也 |     |    |    |    |     |
| 若行人或農夫於日中勞役得之者是動而得之陽證也其病必苦頭痛發燥熱惡熱捫之肌膚大熱                                                                            |     |    |    |    |     |

欽定四庫全書 仁齋直指 卷三



迪志文化出版有限公司出版

必大渴引飲汗大泄無氣以動乃天熱外傷元氣也宜清暑益氣用香薷黃連扁豆人葎黃芪五味知母石膏之類

暑熱發渴脈虛用人葎白虎湯或用竹葉石膏湯亦

好俱見前

東垣清暑益氣湯治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神少胸滿氣促肢節痛或氣高而喘身熱而煩心下痞悶小便黃而數大便溏而頻或痢或渴

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

不思飲食自汗體虛此湯最好見前

若暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大廈涼臺冷館大扇風車得之者是靜而得之陰證也其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗此為陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒用厚樸紫蘇乾葛藿香羌活蒼朮之類若外既受寒內復傷水水生冷瓜果之類前藥再加乾薑縮砂神曲之類此非

治暑也治因暑而致之病也

若外不受寒止是內傷冰水冷物腹痛泄瀉或霍亂

吐逆宜縮脾飲見前或理中湯見中寒類加神曲麥芽縮

砂蒼朮此專治內溫中消食也

若吐瀉脈沈微甚者不可用涼藥可用大順散見前加

熟附子等分或附子理中加炒芍藥

夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故

治暑藥多用溫脾消食治濕利小便之藥醫者要

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

識此意

若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消食次治其外清暑補氣而以理脾為主於前陰陽二條內相兼取用東垣清暑益氣湯已兼此意其用黃芪升麻人葎白朮甘草麥門冬當歸五味黃柏葛根是清暑補氣也蒼朮陳皮神曲澤瀉青皮是治內補脾也

附暑風



治暑風卒倒法○凡人中暑先著於心一時昏迷切不可與冷水飲并卧濕地其法先以熱湯灌或童便灌及用布蘸熱湯熨臍并氣海續續令暖氣透徹臍腹俟其甦省然後進藥若旅途中卒然暈倒急扶在陰涼處掬路中熱灰土作窩於臍中令人尿其內即甦却灌以人尿或攪地漿飲之半碗或車輪土五錢冷水調澄清服皆可○一方用大蒜三兩瓣細嚼溫湯送下禁冷水即愈

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

丹溪云挾火挾痰用二陳湯加黃連實者可用吐法

戴氏曰暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也内外合而炎爍所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而鼓激痰飲塞礙心之竅道則手足不知動躡而卒倒也此二者皆可吐內經曰火鬱則發之吐即發散也量其虛實而吐之吐醒後可用清劑調治之

附注夏



迪志文化出版有限公司出版

注夏屬陰虛元氣不足夏初春末頭疼脚軟食少體熱者是宜  
補中益氣湯去柴胡升麻加炒柏白芍藥挾痰者加南星半夏陳皮煎服又或用生脈湯  
補中益氣湯 方見內傷門

濕

中濕論

天氣下降地氣上騰二氣薰蒸此即濕也豈必水流濕

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

而後為濕哉且風之撼動人知其為風寒之嚴凝人知其為寒暑之炎熱人知其為暑惟濕之入人行住坐臥實薰染於冥冥之中人居戴履受濕最多况夫濕能傷脾脾土一虧百病根源發軔於此矣滯而為喘嗽漬而為嘔吐滲而為泄瀉溢而為浮腫濕瘀熱則發黃濕遍體則重著濕入關節則一身盡痛濕聚痰涎則昏不知人至于為身熱為鼻塞為直視為鄭聲為虛汗為脚氣為腹中脹臍下堅為小便難大便自利皆其證也濕家



迪志文化出版有限公司出版



不可汗汗之則發瘥熱而瘥者斃又不可下下之則額汗脅滿微喘而噦小便淋閉難以有瘳治濕之法通利小便為上益脾順氣次之半夏茯苓蒼朮白朮官桂乾薑皆要藥耳其若小便挾熱不利則赤茯苓防己輩自有奇功大抵濕之為病易至沈深漸潤之餘淪肌浹髓於斯時也須以朮附薑桂作大劑與之藥力根按病當漸解不可以旦暮而責效焉要之治濕莫若生附蒼朮為快

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

中濕證治

加劑除濕湯治氣虛傷濕身重腰疼四肢微冷或嘔逆或澹泄並主之

蒼朮炒

白朮

甘草炙各一兩

乾薑炮

茯苓各二兩

橘紅

辣桂

厚樸製各半兩

右剉每服三錢薑棗煎服

茯苓白朮湯治受濕身體痛重

茯苓乾薑炮  
甘草炙  
白朮辣桂  
蒼朮炒等分  
右剉每三錢水煎服  
腎著湯治腎虛受濕小便自利腰冷而痛重  
乾薑炮  
茯苓各二兩  
甘草炙  
白朮各一兩  
右剉每二錢半水煎服加桂亦得  
黃耆建中湯治傷濕鼻塞身痛

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

黃耆微炙

辣桂各三兩

甘草炙二兩

白芍藥六兩

右麤散每服三錢薑四片棗一枚煎食前服

不換金正氣散治濕益脾順氣加茯苓生薑方見寒類

神朮圓治濕消飲六見痰涎類可用正氣散送下

生附除濕湯治寒濕交攻身體冷痛

附子生一兩

蒼朮製一兩半

白朮

厚樸製半兩

宣木瓜

甘草炙各三錢半



右剉每服四錢水二盞薑十厚片煎一盞食前微溫服

桂枝附子湯治風濕相搏汗出氣短身體煩疼微腫惡風不欲去衣

辣桂 二兩

白朮

附子 熟各一兩半

甘草 炙一兩

右剉散每服二錢半水盞半薑七片棗二枚煎一盞食前微溫服小便不利悸氣加茯苓痺加防己腹痛

欽定四庫全書

仁齋直指卷三

加芍藥

甘草附子湯治中濕小便不利大便自利

附子 熟一箇七錢淨者

白朮

甘草 炙各一兩

辣桂 二兩

右剉每服三錢薑七片煎食前微溫服汗出加防風悸氣加茯苓

朮附湯治傷濕大小便皆自利

白朮 二兩

甘草 炒一兩

附子 熟七錢半

右剉細每服三錢薑七片水盞半煎一盞食前微溫服

五苓散治濕證小便不利經云治濕之法不利小便非其治也 方見水飲類

茵陳湯治濕氣瘀熱發黃小便秘澀渴引水漿

茵陳蒿 一兩半

大黃 半兩

小紅梔子 十枚

右剉每服三錢水煎服五苓散亦治發黃二藥夾煎尤穩

欽定四庫全書

仁齋直指卷三

濕瀉身痛方五苓散加蒼朮煎點隨意

附諸賢論

賈真孫曰濕為土氣火熱能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則萬物乾燥濕病本不自生因熱而怫鬱不能宣行水道故停滯而生濕也况脾土脆弱之人易為感冒豈必水不流而後為濕哉人只知風寒之威嚴不知暑濕之炎暄感人於冥冥之中也病式云諸瘕彊直積飲等證皆屬於濕或附腫體寒而有水氣裏必小便赤



少不通或渴是蓄熱入裏極深非病寒也大抵治法宜理脾清熱利小便為上故治濕不利小便非其治也宜桂苓甘露木香葶藶木通治之守真師曰葶藶木香散下神芎丸此藥下水濕消腫脹利小便理脾胃無出乎此也腹脹腳腫甚者舟車丸下之濕熱內深發黃茵陳湯下之或佐以防己黃芪一身盡腫痛或無汗是濕流關節邪氣在表宜五苓散加官桂蒼朮微汗之不可大汗若自汗出多熱燥津液內水不利切勿利之重損津

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

液也宜防風白朮甘草湯主之其濕證有二濕熱證多濕寒證少當以脈證明辨之如脈滑數小便赤澀引飲為濕熱證若小便自利清白大便瀉利身疼自汗為寒濕證治之宜五苓散加生附蒼朮木瓜主之

附諸方

防己黃芪湯

金匱方

治風濕脈浮身重汗出惡風或痛少

力

防己

一兩

甘草

炙半兩

白朮

七錢



迪志文化出版有限公司出版

黃芪

一兩

右咬咀每服一兩入薑棗煎喘者加麻黃胃氣不和加芍藥氣上衝加桂枝下有寒加細辛

按濕勝身重陽微中風則汗出惡風故用黃芪甘草實表防己白朮勝溫也足三陰例藥

五積散

和濟方

治外感風寒冒寒濕身體重痛

見寒類

按海藏云麻黃桂芍甘草即麻黃桂枝各半湯也蒼朮甘草陳皮厚樸即平胃散也枳殼桔梗陳皮茯苓

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

半夏即桔梗半夏等湯也又川芎當歸治血兼乾薑厚樸散氣此數藥相令為解表溫中泄濕之劑去痰消痞調經之方雖為內寒外感表裏之分之所制實非仲景表裏麻黃桂枝薑附之的方也至于積冷嘔泄時疫項背拘攣如蔥白豆豉厥逆加吳茱萸寒熱欬逆加棗婦人之產加醋始知用之非一途也惟知活法者其擇之

滲濕湯

和劑方

治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或



迪志文化出版有限公司出版

|                    |  |      |                  |    |     |     |
|--------------------|--|------|------------------|----|-----|-----|
| 澁大便秘澀泄皆坐臥濕地或陰雨所襲之也 |  | 蒼朮   | 白朮               | 甘草 | 各一兩 |     |
| 乾薑                 |  | 茯苓   | 各二兩              | 陳皮 |     |     |
| 丁香                 |  | 錢各二半 |                  |    |     |     |
| 右咬咀每服四錢入棗煎         |  |      |                  |    |     |     |
| 按此足陽明太陰藥也溫中勝濕之劑    |  |      |                  |    |     |     |
| 茵陳五苓散治濕熱勝發熱黃疸      |  |      |                  |    |     |     |
| 茵陳蒿                |  | 分十   | 五苓散              | 分五 |     |     |
| 右二物和勻水煎服           |  |      |                  |    |     |     |
| 桂苓甘露散              |  | 方宣明  | 治濕熱內甚煩渴瀉利小便澁大便   |    |     |     |
| 急痛霍亂吐下頭痛口乾         |  | 方暑門  | 暑門               |    |     |     |
| 清燥湯                |  | 方東垣  | 治表裏有濕熱痿厥癱瘓不能行走或足 |    |     |     |
| 踝膝上背腫痛口乾瀉痢         |  | 方痿門  | 痿門               |    |     |     |
| 三花神祐丸              |  | 方宣明  | 治一切水濕腫病大腹實脹喘滿    |    |     |     |
| 輕粉                 |  | 錢一兩  | 大黃               | 一兩 | 牽牛  | 二兩  |
| 芫花                 |  | 醋炒   | 甘遂               |    | 大戟  | 各半兩 |

|                      |        |     |                    |                 |    |                      |    |                    |    |                      |    |                    |                                     |       |                    |         |                         |                |                     |                        |         |                      |                                                             |    |    |                    |    |                   |
|----------------------|--------|-----|--------------------|-----------------|----|----------------------|----|--------------------|----|----------------------|----|--------------------|-------------------------------------|-------|--------------------|---------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|----|-------------------|
| 右為末滴水丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水 | 下無時日三服 | 平胃散 | <small>和劑方</small> | 治脾胃不和不進飲食常服暖胃消痰 | 蒼朮 | <small>米泔浸五斤</small> | 厚樸 | <small>薑製炒</small> | 陳皮 | <small>各三斤二兩</small> | 甘草 | <small>炒三兩</small> | 右為末每五錢薑三片棗一枚煎服入鹽一捻沸湯點服亦得一方加草薺名平胃草薺散 | 升陽除濕湯 | <small>東垣方</small> | 升陽除濕防風湯 | <small>東垣方俱見泄瀉門</small> | 煮酒應効方治諸般濕氣筋骨疼痛 | <small>方見風門</small> | 秘授仙方萬應膏貼一切濕氣襲于肌肉入于筋骨疼痛 | 痛不常貼之神効 | <small>方見癰疽門</small> | 神芎導水丸治濕熱內鬱胸膈痞滿嘔衄口舌生瘡咽喉不利牙疳齒蝕口臭或遍身生濕瘡乾疥睡語咬牙驚惕怔忡大小便滯澁風熱酒毒蘊熱等症 | 大黃 | 黃芩 | <small>各二兩</small> | 牽牛 | <small>頭末</small> |
|----------------------|--------|-----|--------------------|-----------------|----|----------------------|----|--------------------|----|----------------------|----|--------------------|-------------------------------------|-------|--------------------|---------|-------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|----|-------------------|





滑石 各四兩

右為末水丸如桐子大每服四五十九溫水下虛實

隨証臨時加減

舟車圓

大黃 二兩

甘遂

大戟

芫花

青皮

陳皮 各一兩

牽牛 頭末四兩

木香 五錢

右為細末水丸如梧桐子大每服六七十九白沸湯

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

下隨時加減

經驗祛濕煮酒方治風濕相搏遍身手足疼痛者服之

神効

川芎

威靈仙

荆芥

麻黃

防風

天麻

青木香

金毛狗脊

羌活

獨活

枳殼 各五錢

川烏

草烏 各四錢

蒼朮

陳皮

川當歸 各五錢

右咬咀用好頭酒五壺將藥用絹袋懸於壺口再用

重紙裹壺口再用面糊蜜糊勿令泄氣用文武火煮

熱每服五盞為度

附瘟疫

瘟疫方論

內經曰蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固雖有

賊邪弗能害也又曰冬不藏精者春必病瘟是以多感

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

於房勞辛苦之人安樂者未之有也俗名瘟疫病雜著云

冬溫為病此乃天時不正陽氣反泄藥忌溫熱時行寒

疫却在溫暖之時時本溫暖而寒反為病此亦天時不

正陰氣反逆藥忌寒涼又云此病多發於春夏一槩相

同者此天地之厲氣當參運氣而施治也

東垣云陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之視其種

勢在何部隨經治之當緩勿令重劑過其病所陽明為

邪首大腫少陽為邪出於耳前後先以酒炒芩連炙甘



|                                                                                                   |                    |                       |                      |                                 |                                           |                                                                                 |                         |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|
| 草煎少少不住服再用大黃鼠粘子煎入芒硝等分時呷之毋令飲食在後及邪氣已只服前藥未已再煎次第服之取大便秘邪氣已即止陽明渴加石膏少陽渴加瓜蒌根陽明行經升麻芍藥葛根甘草太陽行經羌活防風荊芥並與上藥相合用之 | 升麻葛根湯治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱 | 柴胡升麻湯治時瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷三 | 乾咳嗽涕唾稠粘<br><small>俱見傷寒門</small> | 小柴胡湯治瘟疫內虛發熱胃脇痞悶渴加瓜蒌仁<br><small>方見</small> | <small>血門</small><br>竹葉石膏湯傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶得汗已解內無津液虛羸少氣欲吐<br><small>方見暑門</small> | 大青丸治時行瘟疫發熱並勞役發熱上膈一切結熱神効 | 薄荷 | 甘草 | 梔子 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|

|    |                          |                         |     |                          |                                              |                                                          |                            |                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |                          |                         |                         |                        |                                 |                               |
|----|--------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 黃芩 | 黃連<br><small>錢各三</small> | 大黃<br><small>錢八</small> | 玄明粉 | 連翹<br><small>錢各六</small> | 右為細末用青蒿自然汁為丸如菉豆大用雄黃為衣治雜病發熱者硃砂青黛為衣每服五六十丸白滾湯送下 | 黃連解毒湯治時役三日已汗解或因飲酒復劇若煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不睡<br><small>方見眼目門</small> | 荊防敗毒散<br><small>方要</small> | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷三 | 獨活 | 前胡 | 人蔘 | 茯苓 | 川芎 | 枳殼 | 桔梗 | 甘草 | 荊芥 | 牛蒡子 | 薄荷<br><small>錢各一</small> | 防風<br><small>錢半</small> | 羌活<br><small>錢一</small> | 右咬咀水煎服如內熱加黃芩一錢口渴加天花粉一錢 | 四君子湯四物湯<br><small>俱見補損門</small> | 補中益氣湯<br><small>方見內傷門</small> |
|----|--------------------------|-------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|



嶺南諸病

出明醫  
雜著

春秋時月人感山嵐瘴霧毒氣發寒熱脇膈飽悶不思

飲食此毒氣從鼻口入內也治當清上焦解內毒行

氣降痰不宜發汗

黃連

一錢  
薑水洗

升麻

蒼朮

各一錢  
薑汁浸鹽水炒

黃芩

酒拌炒

木香

厚樸

薑製

枳實

麩炒

半夏

湯泡七次

桔梗

蘆去

柴胡

木通

各一錢

生甘草

七分

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

生薑五片水一鍾半煎七分食前熱服滓煎四分繼

服

寒溫不節汗身脫衣巾感冒風寒之氣氣閉發熱頭疼

此傷寒類也但嶺南氣溫易出汗故多類瘧重則寒

熱不退輕則為瘧南方氣升故嶺南人得此病者卒

皆胃滿痰涎壅塞飲食不進與北方傷寒只傷表而

裏自和者不同治當解表清熱降氣行痰此方用於

寒涼時月及雖在溫暖時而感冒風寒者

羌活

一錢半

蒼朮

薑汁浸

柴胡

黃芩

橘紅

去白

半夏

湯洗

枳實

甘草

炙

川芎

各一錢

生薑五片水一鍾半煎七分食前溫服渣煎四分隨

服取汗出止服

瘧瘧時瘧寒熱往來

柴胡

知母

炒

半夏

湯洗各一錢半

蒼朮

薑汁洗

黃芩

酒炒

乾葛

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

陳皮

川芎

甘草

炙七分

生薑三大片烏梅肉二箇水一鍾半煎七分食前清

晨服滓煎四分午前服

瘧久者加人蔞

一錢半

當歸

一錢

汗多者去蒼朮換白朮

加酒炒白芍藥

各一錢半

後變成痢疾瘧後之痢從虛治用補脾胃藥

黃連

炒

木香

宿砂

黃芩

炒

橘皮

當歸

酒洗各一錢



|                                                                                      |                       |                              |          |                                                                                    |                                                                    |                                                                                      |                                                        |                               |                             |                                           |                                       |                            |                                                  |                                                                   |                                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>白朮<small>一錢半</small></p> <p>白芍藥<small>炒二錢</small></p> <p>甘草<small>炙五分</small></p> | <p>生薑三片水二鍾煎八分食前熱服</p> | <p>溫暑之月民病大行瘟疫熱病治宜清熱解毒兼治內</p> | <p>外</p> | <p>枯黃芩<small>炒酒</small></p> <p>知母<small>炒酒</small></p> <p>乾葛<small>各一錢</small></p> | <p>石膏</p> <p>白芍藥<small>炒酒</small></p> <p>人蔘<small>各一錢半</small></p> | <p>黃連<small>炒酒</small></p> <p>生地黃<small>酒洗各五分</small></p> <p>升麻<small>一錢</small></p> | <p>生甘草<small>七分</small></p> <p>羌活<small>三錢</small></p> | <p>欽定四庫全書<br/>仁齋直指<br/>卷三</p> | <p>生薑三片水一鍾半煎七分食前熱服滓煎四分繼</p> | <p>服若胸膈痞悶痰涎壅塞者加枳實半夏<small>各一錢</small></p> | <p>汁四五匙若脾胃不實加白朮<small>一錢半</small></p> | <p>時氣發熱變為黃病所謂瘟疫也宜治內瀉濕熱</p> | <p>茵陳</p> <p>黃連<small>薑水炒</small></p> <p>山梔仁</p> | <p>白朮</p> <p>白茯苓<small>去皮</small></p> <p>厚樸<small>薑水炒</small></p> | <p>木通<small>去皮</small></p> <p>人蔘<small>各一錢</small></p> <p>白芍藥<small>炒酒</small></p> | <p>乾葛<small>各一錢半</small></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                             |          |                                  |                                                                                                                   |                               |                |                               |                               |                |                |                             |                             |                             |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>生薑三大片水二鍾煎七分食前溫服查煎四分繼</p> | <p>服</p> | <p>附運氣證治<small>出乾坤生意</small></p> | <p>運氣證治者所以參天地陰陽之理明五行衰旺之機<br/>考氣候之寒溫察民病之凶吉推加臨補瀉之法施寒<br/>熱溫涼之劑古人云治時病不知運氣如涉海問津誠<br/>哉言也今遵先賢圖訣撮其要領使人一覽而知其悉<br/>也矣</p> | <p>欽定四庫全書<br/>仁齋直指<br/>卷三</p> | <p>五運配十干之年</p> | <p>甲巳得合為土運</p> <p>乙庚得合為金運</p> | <p>丁壬得合為木運</p> <p>丙辛得合為水運</p> | <p>戊癸得合為火運</p> | <p>六氣為司天之歲</p> | <p>子午少陰君火</p> <p>丑未太陰濕土</p> | <p>寅申少陽相火</p> <p>卯酉陽明燥金</p> | <p>辰戌太陽寒水</p> <p>己亥厥陰風木</p> |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|





南政北政

甲巳土運為南政蓋土居中央君導南面而行餘四運以臣事之面北面受令所以有別也

十二支年分運氣

子午年少陰君火司天歲氣熱化之候

司天者天之氣候也

君火者手少陰心經也心者君主之官神明出焉

君火乃主宰陽氣之本餘象生土乃發生萬物之

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

源

陽明燥金在泉

在泉者地之氣候也

初之氣厥陰風木用事子上父下益辛瀉苦

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 寒風切冽霜雪水冰蟄蟲伏藏

民病 關節禁固腰腿疼中外瘡傷

二之氣少陰君火用事火盛金衰補肺瀉心

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 風與時寒雨生羽蟲

民病 淋氣鬱于上而熱令人目赤

三之氣少陽相火用事君相二火瀉苦益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 大行熱氣生羽蟲不鳴燕百舌杜宇

之類

民病 厥熱心痛寒更作咳喘目赤

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

四之氣太陰濕土用事子母相順瀉肺補腎

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 大雨時行寒熱互作

民病 黃疸衄血咽乾嘔吐痰飲

五之氣陽明燥金用事心盛肺衰火怕水復

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 溫氣乃至初冬尤暖萬物尚榮

民病 寒熱伏邪於春為瘧



六之氣太陽寒水用事火衰心病瀉鹹益苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 暴寒勁切火邪恣毒寒氣暴止

民病 生腫咳喘甚則血溢下連小腹而作寒

中

丑未年太陰濕土司天歲氣濕化之候

太陰濕土者足太陰脾經也脾屬中央戊己土每

季寄旺一十八日合為七十二日以應一歲六六

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

三十六日之成數也

太陽寒水在泉

初之氣厥陰風木用事主旺客衰瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至閏二月驚蟄終止

天時 大風發榮羽生毛蟲

民病 血溢經絡拘攣關節不利身重筋痛

二之氣少陰君火用事以下生上瀉甘補鹹

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 大火至疫癘君令宣行濕蒸相搏暴雨

時降

民病 瘟疫盛行遠近咸若

三之氣少陽相火用事土旺冠水補腎瀉脾

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 雷雨電地氣騰濕氣降

民病 身重跗腫胸腹滿感冒濕氣

四之氣大陰濕土用事甘旺鹹衰補胃益膀胱

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 炎熱沸騰地氣升濕化不流

民病 腠理熱血暴溢寒瘧心腹脹浮腫

五之氣陽明燥金用事土能生金益肝瀉肺

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 大涼霧露降

民病 皮膚寒瘧痢甚行

六之氣太陽寒水用事以上尅下瀉脾補腎



自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時 大寒凝冽

民病 關節禁固腰腿拘痛

寅申年少陽相火司天歲氣火化之候

少陽相火者三焦浮流之火火邪炎上上尅肺金

金受尅腎水失母則上盛下虛虛陽上攻變生諸

疾致傷元氣

厥陰風木在泉

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

初之氣厥陰風木用事子父相逢瀉苦益辛

自年前十二月大寒節起至二月驚熱終止

天時 熱風傷人時氣流行

民病 寒熱交作咳逆頭痛血氣不調心腹不

快

二之氣少陰君火用事肺衰心盛制苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 暴風疾雨溫濕相蒸

民病 上熱咳逆胸膈不利頭痛寒熱

三之氣少陽相火用事夏旺火熾補肺益大腸

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 炎暑亢旱草萎河輪

民病 煩熱目赤喉閉失血熱渴風邪人多暴

死

四之氣太陰溫土用事火能生土瀉甘補鹹

自六月大暑節起至八月白露終止

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷三

天時 風雨時降炎暑未去

民病 癰痢交作寒熱頭疼

五之氣陽明燥金用事肺金受邪瀉苦補辛

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 寒熱風雨草木黃落

民病 寒邪風熱君子周密

六之氣太陽寒水用事心火受尅瀉鹹補苦

自十月小雪節起至十一月小寒終止



天時 寒溫無時地氣正寒霜露乃降

民病 感冒寒邪關節不利心腹痛

卯酉年陽明燥金司天歲氣燥化之候

陽明燥金者肺與大腸之氣象庚辛金也

少陰君火在泉

初之氣厥陰風木用事金木相尅補酸瀉辛

自年前十二月大寒節起二月驚蟄終止

天時 陰始凝風始肅水乃冰寒雨多花開遲

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

民病 寒熱浮腫失血嘔吐小便赤淋

二之氣少陰君火用事火盛金衰瀉苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 臣居君位大熱早行

民病 疫癘流行人多卒暴

三之氣少陽相火用事主盛客衰瀉心補肺

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 燥熱交合風雨暴至

民病 寒熱頭疼心煩作渴

四之氣太陰濕土用事以下生上瀉辛益酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 早秋寒雨有傷苗稼

民病 卒暴寒熱風邪傷人心疼浮腫瘡瘍失

血

五之氣陽明燥金用事金盛木衰瀉肺補肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

天時 冬行春令草木生青風雨生蟲

民病 寒熱作痢氣血不和

六之氣太陽寒水用事客來助主益苦瀉鹹

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 氣候反溫蟄蟲出現反行春令

民病 疫癘溫毒寒熱伏邪

辰戌年太陽寒水司天歲氣寒化之候

太陽寒水者足膀胱經也與足少陰腎經合為表





裏屬北方壬癸水

太陰濕土在東

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉鹹助甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 氣早暖草早榮溫風至

民病 瘟疫寒熱頭痛嘔吐瘡瘍

二之氣少陰君火用事心火受邪瀉鹹補甘

自二月春分節起至四月立夏終止

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

天時 春寒多雨寒濕無時

民病 氣鬱中滿浮腫寒熱

三之氣少陽相火用事以上尅下瀉鹹助苦

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 暴熱乍涼疾風暴雨

民病 寒熱吐利生煩悶亂癰疽瘡瘍

四之氣太陰濕土用事木旺土衰瀉甘補酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 風濕交爭雨生羽蟲暴風疾雨

民病 大熱短氣赤白痢瀉

五之氣陽明燥金用事金生水旺制鹹益苦

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 濕熱而行客行主令

民病 氣虛客熱血熱妄行肺氣壅盛

六之氣太陽寒水用事水盛火衰瀉鹹助苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷三

天時 凝寒雨雪地氣正濕令行

民病 病乃淒慘孕婦多災脾受濕肺旺肝衰

己亥年厥陰風木司天歲氣風化之候

厥陰風木者足厥陰肝經也肝屬東方甲乙木春

旺七十二月也

少陽相火在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止



|     |                 |
|-----|-----------------|
| 天時  | 寒始肅客行主令殺氣方至     |
| 民病  | 寒居右脇氣滯脾胃虛壅      |
| 二之氣 | 少陰君火用事火旺金衰瀉心補肺  |
| 自二月 | 春分節起至四月立夏終止     |
| 天時  | 寒不去霜雪水殺氣施水草焦寒雨至 |
| 民病  | 熱中氣血不升降         |
| 三之氣 | 少陽相火用事肺氣受邪瀉苦益辛  |
| 自四月 | 小滿節起至六月小暑終止     |
| 天時  | 風熱大作雨生羽蟲        |
| 民病  | 淚出耳鳴掉眩          |
| 四之氣 | 太陰濕土用事木土相刑瀉酸孟甘  |
| 自六月 | 大暑節起至八月白露終止     |
| 天時  | 熱氣返用山澤浮雲暴雨溽溫    |
| 民病  | 心受邪黃疸面為浮腫       |
| 五之氣 | 陽明燥金用事以金刑木瀉肺益肝  |
| 自八月 | 秋分節起至十月立冬終止     |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 天時  | 燥濕更勝沈陰乃布風雨乃行        |
| 民病  | 寒氣及體肺受風脾受濕發為瘡       |
| 六之氣 | 太陽寒水用事主助客勝瀉酸補甘      |
| 自十月 | 小雪節起至十二月小寒終止        |
| 天時  | 畏火司令陽乃火化蟄蟲出現流水不     |
| 水地氣 | 大發草乃生               |
| 民病  | 瘟疫心腎相制              |
| 謹按  | 運氣之說內經言之詳矣夫人在氣交之中與  |
| 天地相 | 為流通苟不先立其年以明其氣臨病施治   |
| 之際  | 烏乎以用補瀉之藥哉此運氣證治不可不知  |
| 也   | 又嘗按而驗之多有不應何則陰陽之消長寒暑 |
| 之更易 | 或失其常在智者通其活變豈可膠柱鼓瑟   |
| 按圖  | 索驥也耶                |
| 仁齋  | 直指卷三                |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷三



欽定四庫全書

仁齋直指卷四

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

風緩 附 痿証

風緩方論

風緩者風邪深入而手足為之緩弛也夫人四肢百脈逢寒則攣急遇熱則柔緩病在陽經氣行遲而關以縱病在陰經氣行疾而關以收此物理之常然也然脾主

欽定四庫全書 仁齋直指 卷四

肌肉四肢胃為水穀海所以流布水穀之氣周養一身脾胃既虛肢體失其所養於是風邪襲虛由腠理而入肌肉由肌肉而入脾胃安得不為之緩廢乎若曰驅風之劑與助胃之劑不同亦顧吾活法用之何如耳抑余聞人之一身筋骨為壯肝主筋骨主骨肝腎氣虛風邪襲之亦有肢體緩弱之證然則先散其風而後益之於此尤當加意

風緩證治

排風湯續命湯 方見風類 加製半夏雞心大檳榔增薑煎先

以此散風毒邪氣

蘇合香圓用沸湯泡生薑汁調開吞真料白圓子二十

圓日二服治手足風緩或白圓子安腎圓夾用食前服

方見嗽門○身疼門○水飲門

不換金正氣散 方見寒類 加川芎官桂煎食前吞安腎圓治

脾胃肝腎俱虛風入四體筋骨緩弱不仁仍早晨常服

炒黑豆淋酒

欽定四庫全書 仁齋直指 卷四

大聖一粒金丹治中風昏仆舌彊涎潮癱瘓偏枯頑痺

麻痺癱倒地閉目作聲項彊反張口噤直視

大川烏 炮

大附子 炮去皮臍 新羅白附子 炮各

川五靈脂

白僵蠶 炒去絲 白蒺藜 炒去刺各一兩

白礬 枯

朱砂 沒藥

麝香 別研各半兩

右細末合和用松煙墨半兩新汲水磨汁搜圓每兩作六圓金箔二百片為衣令自乾每服一圓以生薑



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 半兩取自然汁磨開溫酒半盞調服蓋取微汗為効       |           |
| 大鐵彈圓治中風癱緩口眼喎斜筋骨攣疼肢體麻木      |           |
| 自然銅                        | 燒紅醋淬七次一兩半 |
| 虎脰骨                        | 酒浸炙黃      |
| 當歸                         | 酒浸焙       |
| 白附子                        | 炮         |
| 川烏                         | 炮去皮臍      |
| 五靈脂                        | 炒         |
| 麻黃                         | 去節各一兩     |
| 沒藥                         |           |
| 乳香                         |           |
| 全蠍                         | 焙         |
| 安息香                        |           |
| 白芷                         |           |
| 直僵蠶                        | 炒去絲各半兩    |
| 烏蛇肉                        | 酒浸焙乾三分    |
| 木鼈                         | 二十一箇去殼炒熟  |
| 朱砂                         |           |
| 麝香                         | 各一分       |
| 右為末以酒煮安息香入飛白麪為糊圓彈子大每一圓溫酒磨下 |           |
| 蝎附散治肝腎氣虛風入筋骨手足緩弱           |           |
| 小附子                        | 去皮        |
| 生草烏頭                       | 炮去皮臍      |
| 蒼朮                         | 炒         |
| 牛膝                         | 酒浸焙       |
| 川芎                         |           |
| 當歸                         |           |
| 天麻                         | 各半兩       |
| 防己                         |           |
| 白芷                         |           |
| 黃耆                         | 蜜炙        |
| 全蝎                         | 焙各一分      |
| 右末每一錢黑豆淋酒調下兼用核桃肉研酒下食       |           |

欽定四庫全書



仁齋直指卷四



迪志文化出版有限公司出版

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 前服                                   |                 |
| 四斤圓治風寒濕毒與血氣搏筋骨緩弱四肢酸疼痺                |                 |
| 宣木瓜                                  | 去穢切焙            |
| 天麻                                   | 剉               |
| 茯苓                                   | 洗切焙四味各一斤用酒五升浸三日 |
| 熟附子                                  |                 |
| 虎骨                                   | 酥炙各二兩           |
| 牛膝                                   | 剉焙              |
| 右為末用浸藥酒調麪糊圓桐子大每服三四十圓食前溫酒或豆淋酒下        |                 |
| 又方加當歸三分乳香沒藥五靈脂各半兩麝香一錢名大四斤圓用木瓜煎湯下亦治脚氣 |                 |
| 虎骨酒治諸風緩弱及歷節風骨節酸疼                     |                 |
| 虎脰骨                                  | 酥炙黃             |
| 右槌碎如米每骨一升以酒三升浸五日空心服一盞冷則煖之            |                 |
| 鐵骨丹鐵彈圓                               | 方並見風類           |
| 治諸風緩弛其他用藥風類甚詳也矣                      |                 |

欽定四庫全書



仁齋直指卷四



迪志文化出版有限公司出版



附痿證

痿證方論

內經曰肺熱乘焦五臟因而受之發為痿蹶心氣熱生脈痿故脛縱不任地肝氣熱為筋痿故宗筋弛縱脾氣熱生肉痿故痺而不任腎氣熱生骨痿故足不任身然治痿獨取陽明陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也云云故陽明則宗筋縱帶脈不引故足痿不用也或曰手陽明大腸經肺之腑也足陽明

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷四

胃經脾之腑也治痿之法取陽明一經何也願明以告我丹溪先生曰內經云諸痿生於肺熱只此一句便見治法大意經曰東方實西方虛瀉南方補北方此固是就生尅言補瀉而大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方火心也北方水腎也五行之中惟火有二腎雖有二水居其一陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然肺金體燥而居上主氣畏火者也脾土性濕而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作矣瀉南方則肺經清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱隆吉亦曰風火既熾當滋腎水東垣先生取黃柏為君黃芪等補藥之輔佐以治諸痿而

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷四

無一定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病製方其善於治痿者乎雖然藥中肯綮矣若將理失宜聖鑒不治也天產作陽厚味發熱先哲格言但是患痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也

丹溪云痿證斷不可作風治而用風藥有濕熱濕痰氣虛血虛瘀血濕熱東垣健步丸加燥滋降陰火藥蒼朮黃芩黃柏牛膝之類濕痰二陳湯加蒼朮白朮黃

|                                     |  |                                                                    |                                                  |                                                   |                                  |                                                   |                                                   |                     |                                     |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <p>欽定四庫全書</p> <p>仁齋直指</p> <p>卷四</p> |  | <p>黃芪 <small>半一錢</small></p> <p>蒼朮 <small>錢一</small></p> <p>白朮</p> | <p>橘皮</p> <p>澤瀉</p> <p>五味子 <small>九箇</small></p> | <p>人參</p> <p>白茯苓</p> <p>升麻 <small>各三分</small></p> | <p>麥門冬</p> <p>當歸身</p> <p>生地黄</p> | <p>麴末</p> <p>豬苓</p> <p>酒黃柏 <small>各二分</small></p> | <p>柴胡</p> <p>黃連</p> <p>甘草 <small>炙各一分</small></p> | <p>右咬咀每半兩水煎空心熱服</p> | <p>健步圓治膝中無力伸而不得屈屈而不得伸腰背腿脚沈重行步艱難</p> |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|

|                                     |  |                                                                                                            |                                                                    |                                                                       |                                                                                       |                                                            |                                |                                                                                                                                                     |                               |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>欽定四庫全書</p> <p>仁齋直指</p> <p>卷四</p> |  | <p>愈風湯 <small>方見風門</small></p> <p>二陳湯 <small>方見癰門</small></p> <p>四君子湯</p> <p>四物湯 <small>方並見虛勞門</small></p> | <p>羌活</p> <p>柴胡 <small>各半兩</small></p> <p>防風 <small>三錢</small></p> | <p>川烏頭 <small>錢一</small></p> <p>炒滑石</p> <p>炙甘草 <small>各半兩</small></p> | <p>防己 <small>一兩</small></p> <p>苦參 <small>一錢酒製</small></p> <p>肉桂 <small>半錢</small></p> | <p>瓜蒌根 <small>半兩酒製</small></p> <p>澤瀉 <small>三錢</small></p> | <p>右為末酒糊圓如桐子大每服七十圓煎愈風湯空心送下</p> | <p>謹按風痿之別痛則為風不痛則為痿經曰痛則為實不痛則為虛曰風曰痿虛實二者而已矣東垣曰氣盛病盛氣衰病衰何則人之氣血充實而風寒客於經絡之間則邪正交攻而疼痛作矣人之氣血弱虛而痰火起于手足之內則正不能勝邪而痿痺作矣丹溪先生曰痿症切不可作風治而用風藥蓋以風為實而痿為虛也曰散邪曰補虛豈可紊亂矣乎</p> | <p>歷節風 <small>附痺証</small></p> |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

歷節風方論

歷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身體魁癭其腫如脫漸至摧落其痛如掣不能屈伸蓋由飲酒當風汗出入水或體虛膚空掩護不謹以致風寒濕之邪偏歷關節與血氣搏而有斯疾也其痛如掣者為寒多其腫如脫者為濕多肢節間黃汗出者為風多遍身走癢徹骨疼痛晝靜夜劇發如蟲啗者謂之白虎歷節治法當以溫藥解其風寒濕之毒或用和平則獨活寄生

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷四

湯輩可也其白虎歷節遊走癢痛蟲實為之況夫脾主肌肉虛則為癢遇癢而進飲食尚庶幾焉而蟲亦饜飫其間不至於頻頻啗也書曰若藥弗瞑眩厥疾弗瘳似此證候一名厲風須當大作湯圓未可拘以平常淺近之劑

歷節風證治

虎骨散治白虎歷節走注痺痛不得屈伸

虎脰骨

酒炙黃  
一兩半

白花蛇

酒浸取  
肉炙黃

天麻

自然銅

用醋淬  
七次

防風

白附子

炮

檳榔

官桂

當歸

羌活

牛膝

白芷

川芎

僵蠶

炒去絲  
各一兩

全蝎

焙

地龍

去土

乳香

沒藥

雄黃

各半  
兩

麝香

一分

右末每服二錢食前以煖豆淋酒調下

雄麝圓治歷節風骨節疼痛攣急痺頑

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷四

安息香

五靈脂

天麻

各一  
兩半

地龍

淨

白僵蠶

微炒  
三分

全蝎

微炒

雄黃

各半  
兩

麝香

一分

烏蛇

酒淨取  
肉炙

天雄

炮去  
皮臍

當歸

川烏

炮去  
皮臍

川芎

南星

炮

官桂

虎脰骨

酒炙黃  
各一兩

川獨活

二兩

右末煉蜜杵圓桐子大每服十五圓食前溫酒下

海桐皮散治歷節走注骨節疼痛



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                   |                      |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 獨活                                                                | 草薢                   | 川芎                |
|                                                                   | <small>鹽水浸焙</small>  |                   |
| 當歸                                                                | 桃仁                   | 天麻                |
| <small>各三分</small>                                                | <small>去皮焙</small>   |                   |
| 辣桂                                                                | 牛膝                   | 麻黃                |
|                                                                   |                      | <small>去節</small> |
| 枳殼                                                                | 海桐皮                  | 白芍藥               |
| <small>製</small>                                                  |                      |                   |
| 川烏                                                                | 松節                   | 防風                |
| <small>炮去皮臍</small>                                               |                      |                   |
| 杜仲                                                                | 甘草                   | 麝香                |
| <small>薑製</small>                                                 | <small>炙各半兩</small>  | <small>一分</small> |
| 虎脰骨                                                               |                      |                   |
| <small>酒炙黃一兩</small>                                              |                      |                   |
| 右麤末每服二錢薑五片棗二枚食前煎服                                                 |                      |                   |
| <small>欽定四庫全書</small><br><small>仁齋直指</small><br><small>卷四</small> |                      |                   |
| 獨活寄生湯治歷節風亦治脚氣                                                     |                      |                   |
|                                                                   | <small>方見腰疼門</small> |                   |
| 麝香圓治白虎歷節遊走癢痛狀如蟲嚙                                                  |                      |                   |
|                                                                   | <small>方見風類</small>  |                   |
| 虎骨酒治歷節諸風百節疼痛                                                      |                      |                   |
|                                                                   | <small>方見風類</small>  |                   |
| 硫黃酒治惡風頭面肢體癢疹疔羸                                                    |                      |                   |
| 透明鋒芒硫黃                                                            |                      |                   |
| 右每服三錢乳鉢內研細入醇酒再研空心飲其清者滓又研細入酒飲之連日如是硫黃能殺惡蟲自大便下                       |                      |                   |

|                                                                   |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| 必用歷節厲風方治手指攣曲骨節間痛甚                                                 |                           |  |
| 草麻子                                                               | 黃連                        |  |
| <small>去皮二兩</small>                                               | <small>去鬚剉如豆一兩</small>    |  |
| 右用新水二升於磁瓶內浸二藥密封七日取出逐日侵晨面東以浸藥水吞草麻仁一粒七日後添兩粒微利不妨以療大風亦效               |                           |  |
| 返魂追命再造散治大風厲風                                                      |                           |  |
| 川大黃                                                               | 獨生阜角刺                     |  |
| <small>錦紋一兩</small>                                               | <small>一兩半</small>        |  |
| 右末每服二錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄蟲如蟲口黑色乃是多年蟲口赤色是為方近三數日又進一服直候無蟲則絕根也               |                           |  |
|                                                                   | <small>聽疹若喫醋則風疹食人</small> |  |
| 神授圓治風寒濕合而為痺遍身或半身麻木不仁最能殺蟲                                          |                           |  |
|                                                                   | <small>方見虛勞門</small>      |  |
| 用增味五痺湯下空心服                                                        |                           |  |
|                                                                   | <small>方見風類</small>       |  |
| 白虎風走注癢痛方                                                          |                           |  |
| 雞子揩患處呪三遍願送糞堆頭蓋白虎是糞神愛喫雞子患者下飯用黃脚雞為妙亦可抱雞來壓之其癢自止                      |                           |  |
| <small>欽定四庫全書</small><br><small>仁齋直指</small><br><small>卷四</small> |                           |  |





麝香圓治白虎風歷節風遊走疼痛遍身瘙癢狀如蟲  
齧晝靜夜劇方見風類

附諸方

四炒散治歷節痛風走注

威靈仙酒浸五錢

羊角灰二錢

白芥子一錢

蒼耳一錢半云蒼朮

右為末每服一錢生薑一大片搗汁入湯調服

洗藥方治一切風氣濕氣足脛羸腫疼痛並皆有效

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷四

荊芥

番白草

防風

蒼耳草

苦參

地榆

青藤

威靈仙

麻黃

蒼朮

生蔥

煨鹽各一兩

右件用水一桶煎熱於桶內薰蒸痛處出微汗待湯

稍溫再洗痛處一二次覺痛減如或貧者只用柘柳

榆桑椿六件杙枝煎湯洗之亦有神効

大補元丸

人參去蘆二兩

黃芪去蘆四兩

白朮四兩去酒浸

當歸酒洗二兩

生地黄酒洗三兩

陳皮去白二兩

白芍酒炒一兩

黃柏酒炒二兩

知母酒炒二兩

山藥二兩

山茱萸淨肉二兩

枸杞二兩

牛膝酒洗二兩

杜仲薑汁炒一兩五錢

遠智去心二兩

石菖蒲去毛二兩

巴戟去心三兩

破故紙炒二兩

兔系子炒二兩

桔梗二兩

右件共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十

丸用白滾湯送下或淡酒薑湯清米飲送下亦可

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷四

祛風丸

防風去蘆二兩

防己二兩

荊芥二兩

當歸酒洗二兩

川芎二兩

生地黄酒洗三兩

陳皮白去二兩

白朮炒二兩

桑寄生

薏苡仁各二兩

梔子仁一兩

牙皂二兩

何首烏二兩

川烏二兩

白芍藥酒炒二兩

羌活

獨活

黃苓酒炒一兩半



|                                          |                            |                             |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 半夏<br><small>煮便</small>                  | 木瓜                         | 青藤                          |
| 牛膝<br><small>洗酒</small>                  | 沈香                         | 白荳蔻<br><small>各二兩</small>   |
| 木香<br><small>一兩</small>                  | 桂枝<br><small>一兩</small>    | 光烏<br><small>酒浸去皮二兩</small> |
| 右件共為細末酒打米糊為丸如梧桐子大每日五更時用清茶送下七八十丸少許時再服前大補元 |                            |                             |
| 丸                                        |                            |                             |
| 愈風化痰丸                                    |                            |                             |
| 何首烏<br><small>酒浸</small>                 | 僵蠶                         | 光烏<br><small>酒浸去皮</small>   |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四                     |                            |                             |
| 全蝎                                       | 南星<br><small>薑製</small>    | 半夏<br><small>煮便</small>     |
| 桑寄生                                      | 荊芥                         | 牙皂<br><small>炒瓦</small>     |
| 破故紙<br><small>炒</small>                  | 陳皮<br><small>去白</small>    | 兔絲子<br><small>炒各二兩</small>  |
| 地黃<br><small>去土八兩</small>                | 木香<br><small>一兩</small>    | 沈香<br><small>一兩半</small>    |
| 白芍藥<br><small>酒炒</small>                 | 川烏<br><small>酒浸去皮</small>  | 天麻<br><small>一兩二錢</small>   |
| 黃芩<br><small>酒炒二兩</small>                | 防風<br><small>去蘆</small>    | 漢防己                         |
| 白朮<br><small>炒</small>                   | 當歸<br><small>酒洗各二兩</small> | 羌活                          |
| 獨活<br><small>各一兩五錢</small>               | 杜仲<br><small>薑汁炒四兩</small> | 巴戟<br><small>去心三兩</small>   |

|                                          |                          |                           |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 右件共為細末酒打米糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心食前酒送下日服二次        |                          |                           |
| 諸風應効酒治一切諸般風氣濕痺遍身骨節疼痛紫白癰風神効               |                          |                           |
| 當歸                                       | 川芎                       | 何首烏<br><small>各三錢</small> |
| 蒼朮<br><small>四錢</small>                  | 白芷                       | 苦參                        |
| 防風                                       | 胡麻                       | 石南藤                       |
| 石連藤                                      | 僵蠶<br><small>各二錢</small> | 細辛<br><small>一錢</small>   |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四                     |                          |                           |
| 川山甲                                      | 黃柏                       | 知母                        |
| 白芍藥                                      | 生地黃                      | 牛膝                        |
| 白朮                                       | 藁本                       | 木瓜                        |
| 大風子                                      | 威靈仙                      | 羌活<br><small>各二錢</small>  |
| 川烏<br><small>一錢</small>                  | 八角風                      | 五加皮                       |
| 紫荊皮<br><small>各二錢</small>                | 木香<br><small>一錢半</small> | 薏苡仁<br><small>三錢</small>  |
| 右件共為粗末用好酒一壺將藥用絹袋之懸於亮口下用文武火煮一二時辰取出放於濕泥去火毒 |                          |                           |



|                       |  |     |    |     |
|-----------------------|--|-----|----|-----|
| 入酒末藥方每服煎藥一鍾加此末藥八分入酒服之 |  | 烏藥  | 白芷 | 木香  |
| 末藥方於後                 |  | 荊芥  | 甘草 | 何首烏 |
| 川烏                    |  | 青藤  | 藁本 |     |
| 天麻                    |  | 金銀花 | 蒼朮 |     |
| 全蝎                    |  | 細辛  | 防風 |     |
| 草烏                    |  | 川芎  | 人參 |     |
| 當歸                    |  | 石斛  | 麻黃 |     |
| 兩頭尖                   |  |     |    |     |
| 右件共為細末入煎藥酒服之効         |  |     |    |     |
| 又煮酒方 治一切腫風白虎歷節疼痛      |  | 當歸  | 川芎 | 蒼朮  |
| 白朮                    |  | 白芍藥 | 枳殼 |     |
| 生地黃                   |  | 半夏  | 甘草 |     |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷四



迪志文化出版有限公司出版

|                       |  |     |     |
|-----------------------|--|-----|-----|
| 烏藥                    |  | 麻黃  | 茯苓  |
| 防己                    |  | 陳皮  | 木通  |
| 薏苡仁                   |  | 五加皮 | 木香  |
| 桑寄生                   |  | 黃芩  | 羌活  |
| 獨活                    |  | 牛膝  | 木瓜  |
| 海風藤                   |  | 蘇葉  |     |
| 右件共為粗末煮法照前            |  |     |     |
| 秘傳煮酒應效方治諸風氣歷節插腿風年高者亦可 |  |     |     |
| 服神効                   |  | 人參  | 茯苓  |
| 當歸                    |  | 砂仁  | 杏仁  |
| 川烏                    |  | 草烏  | 何首烏 |
| 五加皮                   |  | 枸杞子 | 川椒  |
| 木香                    |  | 牛膝  | 枳殼  |
| 乾薑                    |  | 虎骨  | 香附子 |
| 白芷                    |  | 厚樸  | 麥門冬 |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷四



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                   |                           |                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 陳皮<br><small>去白</small>                                           | 白朮                        | 川芎                         |
| 麻黃                                                                | 獨活                        | 羌活                         |
| 半夏                                                                | 肉桂                        | 白芍藥                        |
| 生地黃                                                               | 熟地黃                       | 防風                         |
| 天門冬                                                               | 五味子                       | 小茴香                        |
| 細辛<br><small>已上一錢半</small>                                        | 蒼朮                        | 破故紙                        |
| 甘草<br><small>錢各五</small>                                          | 核桃肉                       | 紅荳                         |
| 酥油<br><small>各五錢五分</small>                                        | 蜜<br><small>八兩</small>    | 沈香<br><small>一錢五分</small>  |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷四</small>                                     |                           |                            |
| 葡萄<br><small>二錢</small>                                           | 荊芥                        | 地骨皮                        |
| 山茱萸                                                               | 巴戟                        | 知母<br><small>各一錢五分</small> |
| <p>右為細末分作二袋用礶盛酒袋懸於礶內封灌口<br/>安噉內煮熟過五七日方用每服隨量飲病在上食<br/>後服病在下食前服</p> |                           |                            |
| <p>金刀如聖散治三十六種風七十二般氣口眼歪斜半身不遂遍身遊風白虎歷節疼痛立効</p>                       |                           |                            |
| 川烏<br><small>炮</small>                                            | 草烏<br><small>炮各四兩</small> | 硃砂<br><small>另研</small>    |

|                                              |                            |                             |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 雄黃<br><small>另研</small>                      | 荊芥                         | 麻黃<br><small>去根</small>     |
| 天麻                                           | 當歸                         | 何首烏                         |
| 細辛                                           | 石斛<br><small>去蘆</small>    | 人參                          |
| 全蝎<br><small>去足</small>                      | 川芎                         | 甘草                          |
| 防風<br><small>已上一錢五分</small>                  | 蒼朮<br><small>泔浸炒一兩</small> |                             |
| <p>右研為細末每服五分臨臥溫茶送下如病長者初服三分徐徐加至七分看人肥瘦大小加減</p> |                            |                             |
| <p>又法治証同前</p>                                |                            |                             |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷四</small>                |                            |                             |
| 蒼朮<br><small>泔浸炒一兩半</small>                  | 防風<br><small>去蘆</small>    | 細辛                          |
| 荊芥穗                                          | 何首烏                        | 蟬退                          |
| 全蝎                                           | 硃砂<br><small>另研</small>    | 白僵蠶<br><small>水洗微炒</small>  |
| 麻黃<br><small>去根</small>                      | 藁本                         | 當歸<br><small>酒洗</small>     |
| 天麻<br><small>各一錢七分</small>                   | 人參                         | 川芎                          |
| 石斛<br><small>去根各三錢三分</small>                 | 川烏<br><small>煨</small>     | 草烏<br><small>煨各一錢三分</small> |
| 乳香                                           | 沒藥                         | 烏藥                          |
| 青藤<br><small>各二錢</small>                     | 白芷<br><small>五錢七分</small>  | 甘草<br><small>微炒一兩</small>   |





|                                                                          |                         |                                       |                                       |             |                                                      |                                                     |                      |                          |     |      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 兩頭尖 <small>錢一</small><br>雄黃 <small>另研錢</small><br>蜂房 <small>二錢五分</small> | 白芍藥 <small>一錢五分</small> | 右為極細末臨臥時用溫茶送下諒人虛實有力者服八分起至一錢止老弱者只服五六分止 | 羌活湯治白虎歷節風毒注骨髓疼痛不定 <small>方見痺門</small> | 烏頭湯治歷節痛不可伸屈 | 川烏 <small>一枚用蜜四合煮二合去烏</small><br>甘草 <small>炙</small> | 麻黃 <small>節去</small><br>芍藥<br>黃芪 <small>各等分</small> | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四 | 右水煎蜜一合再煎至八分去渣空心服最治腳氣不可屈伸 | 附痺症 | 痺証方論 | 袖珍方曰凡痺疾病目有五種筋痺脈痺骨痺皮痺肌痺是也多由體虛之人腠理空疎為風寒濕三氣所侵不能隨時驅散流注經絡久而為痺病者也風多則引注寒多掣痛濕多則重着治之當辯其所感風寒濕三 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                           |                                   |                                                      |                                 |                      |                                                             |                |                                                                         |                                   |                        |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 氣注於何部分其表裏須從偏勝者主之藥餌如有此証治之宜早為貴乎 | 五痺湯 <small>方和劑</small> 治風寒濕之氣各留肌體手足緩弱麻頑不仁 | 羌活<br>白朮<br>防己 <small>各一兩</small> | 片子薑黃 <small>一兩洗去灰土</small><br>甘草 <small>微炙半兩</small> | 右咬咀每服四錢水一盞半薑七片煎八分去粗病在上食後服病在下食前服 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四 | 防風湯 <small>方宣明</small> 風寒濕三氣合為痺風氣勝者行痺上下左右無留隨所至作防風湯主之治行痺行走無定 | 防風<br>甘草<br>當歸 | 赤茯苓 <small>去皮</small><br>杏仁 <small>炒熟去皮</small><br>桂 <small>各一兩</small> | 黃芩<br>秦艽<br>葛根 <small>各三錢</small> | 麻黃 <small>去節半兩</small> | 右為末每服五錢酒水各二盞棗三枚薑伍片煎至 |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|



|      |  |                                         |  |                     |  |       |  |                                                 |  |        |  |                          |  |                      |  |            |  |                                         |  |                     |  |             |  |          |  |        |  |                            |  |                      |  |
|------|--|-----------------------------------------|--|---------------------|--|-------|--|-------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------|--|----------------------|--|------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|--|----------|--|--------|--|----------------------------|--|----------------------|--|
| 一盞溫服 |  | 茯苓湯 <small>宣明方</small> 寒氣勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜 |  | 通氣溫經而愈茯苓湯加減主之治痛脾四肢疼 |  | 痛拘倦浮腫 |  | 赤茯苓 <small>去皮</small> 桑白皮 <small>各二兩</small> 防風 |  | 官桂川芎芍藥 |  | 麻黃 <small>去節各一兩半</small> |  | 右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分溫服以 |  | 薑粥投之汗泄為度効矣 |  | 茯苓川芎湯 <small>宣明方</small> 濕氣勝者為著痺濕地水氣甚重著 |  | 而不去多汗而濡者茯苓川芎湯主之治著痺留 |  | 注不去四肢麻木拘攣浮腫 |  | 赤茯苓桑白皮防風 |  | 官桂川芎麻黃 |  | 芍藥當歸甘草 <small>炙各五分</small> |  | 右為末每服四錢半水二盞棗三枚同煎至一盞去 |  |
|------|--|-----------------------------------------|--|---------------------|--|-------|--|-------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------|--|----------------------|--|------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|--|----------|--|--------|--|----------------------------|--|----------------------|--|

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷四



迪志文化出版有限公司出版

|               |  |                                         |  |    |  |                                                |  |                                                 |  |                       |  |                      |  |      |  |                                |  |                                                                     |  |                                                |  |                                                                      |  |                         |  |                      |  |     |  |                                      |  |
|---------------|--|-----------------------------------------|--|----|--|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|-----|--|--------------------------------------|--|
| 淨空心溫服如欲出汗以粥投之 |  | 蠲痺湯 <small>濟生方</small> 治手足冷痺腰腿沈重及身體煩疼背項 |  | 拘急 |  | 當歸 <small>去蘆酒洗</small> 赤芍藥黃芪 <small>去蘆</small> |  | 防風 <small>去蘆</small> 片子薑黃羌活 <small>各一兩半</small> |  | 甘草 <small>炙半兩</small> |  | 右咬咀每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎八分 |  | 去粗溫服 |  | 防風湯 <small>濟生方</small> 治血痺皮膚不仁 |  | 川當歸 <small>去蘆洗</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 川獨活 <small>各一兩</small> |  | 甘草 <small>炙半兩</small> 防風 <small>一兩</small> 赤芍藥 |  | 黃芩 <small>各一兩</small> 杏仁 <small>去皮尖半兩</small> 秦艽 <small>去蘆一兩</small> |  | 桂心 <small>不見火半兩</small> |  | 右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎七分去粗溫服 |  | 不拘時 |  | 續斷丸 <small>本事方</small> 治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺 |  |
|---------------|--|-----------------------------------------|--|----|--|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|-----|--|--------------------------------------|--|

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷四



迪志文化出版有限公司出版

|                       |       |                |     |     |
|-----------------------|-------|----------------|-----|-----|
| 當歸                    | 炒     | 川續斷            | 草薺  | 各一兩 |
| 川芎                    | 七錢半   | 乳香             | 天麻  |     |
| 防風                    |       | 附子             | 沒藥  | 半兩  |
| 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九丸溫酒呆飲 |       |                |     |     |
| 任下                    |       |                |     |     |
| 黃耆酒                   | 濟生方   | 治風濕痺痛筋脈攣急或身體頑痺 |     |     |
| 當歸                    | 去蘆    | 雲母粉            | 茵芋葉 |     |
| 白朮                    |       | 虎骨             | 草薺  |     |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四  |       |                |     |     |
| 木香                    | 不見火   | 仙靈皮            | 川續斷 |     |
| 甘草                    | 炙     | 白芍藥            | 黃耆  | 去蘆  |
| 防風                    | 去蘆    | 官桂             | 天麻  |     |
| 石斛                    | 去根各一兩 |                |     |     |
| 右咬咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七  |       |                |     |     |
| 冬十日每服一盞溫暖服之常令酒氣相續為佳   |       |                |     |     |
| 茯苓湯                   | 濟寸方   | 治停蓄支飲手足麻痺多睡眩冒  |     |     |
| 半夏                    | 湯洗七次  | 赤茯苓            | 陳皮  | 各一兩 |

|                       |      |                  |       |     |      |
|-----------------------|------|------------------|-------|-----|------|
| 枳實                    | 去穰炒  | 桔梗               | 去蘆    | 甘草  | 炙各兩  |
| 右咬咀每服四錢水一盞半薑七片煎七分溫服   |      |                  |       |     |      |
| 損續斷丸                  | 本事方  | 治寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛    |       |     |      |
| 人參                    |      | 防風               |       | 鹿角膠 |      |
| 白朮                    | 炮各七兩 | 麥門冬              |       | 乾地黄 |      |
| 黃芪                    |      | 續斷               |       | 薏苡仁 |      |
| 山芋                    |      | 牡丹皮              |       | 桂心  |      |
| 山茱萸                   |      | 白茯苓              |       | 石斛  | 各二兩  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四  |      |                  |       |     |      |
| 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒空心 |      |                  |       |     |      |
| 下                     |      |                  |       |     |      |
| 羌活湯                   | 濟生方  | 治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不 |       |     |      |
| 定                     |      |                  |       |     |      |
| 羌活                    | 去蘆二兩 | 附子               | 炮臍皮   | 秦艽  | 去蘆   |
| 桂心                    |      | 木香               | 不見火   | 川芎  |      |
| 當歸                    | 去蘆   | 牛膝               | 者去蘆酒洗 | 甘草  | 炙各兩  |
| 桃仁                    | 去皮尖炒 | 骨碎補              |       | 防風  | 去義各兩 |



右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎七分溫服

虎骨散

濟生方

治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎方見白歷節

風門

謹按痺病蓋因風寒溫三氣客於經絡為病不一或為痛或為痒或為麻痺不仁或為手足緩弱所以然者有新久輕重之分有溫痰死血之異濟生防風湯茯苓湯所治已露端倪也學者細心求之仁齋先生不言痺病蓋已中風白虎歷節風條內矣但所言病之見証古人所言病之原因即中庸費隱之義也

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷四

脚氣

脚氣方論

腎司於下一身之根本繫焉脚者腎之外候也夫人為嗜慾所戕苦不自覺腎氣內虛真元不守凡驟立冷地久坐卑濕暴熱濯水凌晨履霜感受四氣於冥冥之中不為脚氣者鮮矣脚氣為病雖起於足實周乎身或壯熱頭痛或身體冷疼或百節拘攣或十指走注或轉筋



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

急痛或小腹不仁以至脅滿喘息煩悶怔忡昏潰羞明誤忘錯語腹痛下利嘔噦痰涎食氣惡聞見食即吐大便小便多是秘澀自腿至膝自脛及踝屈弱頑痺攣急酸疼或焮不焮或腫不腫皆其候也其自汗惡風無汗惡寒乍寒乍熱傳足六經外證與傷寒類焉但卒然脚痛為異耳治法究其所自來挾風者遊走有汗挾寒者掣痛攣疼挾暑者大渴熱煩挾濕者腫滿重滯其間四氣兼有則惟其多者解之對病施藥固在權衡然古人

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷四

以此名為緩風謂其感於風毒所致則總治之法大要疏導大便使毒氣得泄而後愈但分劑不可過焉其補湯淋洗皆醫家之大戒也雖然脚氣治法以疏利毒氣為先蓋慮乎氣實而死矣然表裏之有異經冷熱之有異證或因他病而後發或致他病之續生又不可以不通其變所謂寒則溫之熱則寒之在表則散在裏則下太虛氣乏扶養其中凝陰蘊毒為之溫利是又曾中之活法矣其或療治不早使毒氣入復衝心攻築作痛喘

|                     |  |      |  |              |  |                       |  |                      |  |       |  |                       |  |                      |  |                      |  |                      |  |                           |  |                                       |  |         |  |    |  |    |  |
|---------------------|--|------|--|--------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------|--|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---------|--|----|--|----|--|
| 滿上氣嘔吐異常此則漸入頓深或者自貽奄忽 |  | 脚氣證治 |  | 二十四味輕脚圓治脚氣通用 |  | 當歸 <small>酒浸</small>  |  | 羌活 <small>薑製</small> |  | 薏苡仁   |  | 枳殼 <small>各一兩</small> |  | 防風                   |  | 牛膝 <small>酒浸</small> |  | 木香                   |  | 川五靈脂 <small>別研各三分</small> |  | 右細末酒浸雪糕為圓桐子大每服五十圓細剉辣桂荊芥穗食前煎湯下或枳殼木瓜煎湯下 |  | 木瓜散脚氣通用 |  | 大腹 |  | 木香 |  |
|                     |  |      |  |              |  | 川芎                    |  | 杜仲                   |  | 大雞心檳榔 |  | 蒼朮 <small>炒</small>   |  | 獨活                   |  | 威靈仙                  |  | 木瓜                   |  | 沒藥 <small>別研各三分</small>   |  |                                       |  | 紫蘇      |  | 茯苓 |  |    |  |
|                     |  |      |  |              |  | 草薢 <small>鹽水乾</small> |  | 石南葉                  |  | 華陰細辛  |  | 五加皮                   |  | 續斷 <small>洗曬</small> |  | 海桐皮                  |  | 麻黃 <small>去節</small> |  | 滴乳香 <small>半兩</small>     |  |                                       |  | 羌活      |  | 陳皮 |  |    |  |

|                        |  |                        |  |            |  |         |  |                          |  |                     |  |                       |  |                           |  |            |  |                        |  |                                 |  |          |  |                                                      |  |                      |  |
|------------------------|--|------------------------|--|------------|--|---------|--|--------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|------------|--|------------------------|--|---------------------------------|--|----------|--|------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| 甘草 <small>炙各半兩</small> |  | 宣木瓜 <small>乾一兩</small> |  | 右細末每三錢薑棗煎服 |  | 降氣湯脚氣通用 |  | 半夏 <small>製</small>      |  | 厚樸 <small>製</small> |  | 肉桂                    |  | 右剉散每三錢薑五片棗兩枚煎服如無蘇子以蘇葉二兩代之 |  | 檳榔散治風毒脚氣腫痛 |  | 橘葉                     |  | 右童子尿一盞醇酒半盞煎六分濾清乘熱調檳榔末二錢食前服排風湯通用 |  | 生木瓜圓脚氣通用 |  | 宣州生木瓜 <small>就蒂切一蓋取出穰以生艾葉塞蒲合蓋竹針插定蒸透去艾其木瓜去爛皮研</small> |  | 右入五積散末和圓桐子大日乾每服七十圓食前 |  |
|                        |  |                        |  |            |  |         |  | 真蘇子 <small>微炒各五兩</small> |  | 甘草 <small>炙</small> |  | 陳皮 <small>各三兩</small> |  |                           |  |            |  | 杉木節 <small>各一握</small> |  |                                 |  |          |  |                                                      |  |                      |  |



|     |              |                   |                 |       |                                                     |               |     |     |     |                     |    |                      |                      |                          |                       |                                 |                |    |    |      |
|-----|--------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----|----|------|
| 醇酒下 | 止嘔湯治脚氣嘔逆吐瀉轉筋 | 宣木瓜一味細剉每服四錢新水煎服神効 | 檳榔一物湯治脚氣攻注手足不能舉 | 雞心大檳榔 | 右末每服三錢用紫蘇七葉連梗橘皮一全箇不去白薑五片煎湯乘熱調下治脚氣衝心痛悶用童尿煎服治脚心串痛溫酒調下 | 海桐皮酒治風毒脚氣膝脛疼痛 | 海桐皮 | 五加皮 | 川獨活 | 枳殼 <small>製</small> | 防風 | 杜仲 <small>薑製</small> | 牛膝 <small>酒浸</small> | 薏苡仁 <small>炒各一兩半</small> | 生地黃 <small>二兩</small> | 右末用綿裹以醇酒一斗春浸七日秋浸十四日每日空心溫服一盞午前一盞 | 杉節湯治脚氣攻心痛悶脹滿不食 | 青皮 | 陳皮 | 天台烏藥 |
|-----|--------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------|----|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----|----|------|

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷四



迪志文化出版有限公司出版

|      |     |      |                     |                     |     |                        |    |                      |     |                       |                       |    |                        |           |                               |                           |                           |                           |      |         |                       |                        |                                  |       |            |                      |                        |                     |                     |                       |                         |                      |
|------|-----|------|---------------------|---------------------|-----|------------------------|----|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 雞心檳榔 | 宣木瓜 | 乾杉木節 | 半夏 <small>製</small> | 枳殼 <small>製</small> | 縮砂仁 | 赤茯苓 <small>各半兩</small> | 丁香 | 茴香 <small>炒微</small> | 大腹皮 | 紫蘇子 <small>炒微</small> | 羅蔔子 <small>炒微</small> | 北梗 | 甘草 <small>炙各一分</small> | 右剉每三錢薑五片煎 | 三和散加木香枳殼 <small>方見水飲門</small> | 和劑流風散 <small>方見滿門</small> | 分氣紫蘇飲 <small>方見喘門</small> | 烏藥順氣散 <small>方見風門</small> | 脚氣通用 | 枳殼散疏導毒氣 | 枳殼 <small>製五兩</small> | 甘草 <small>炙一兩半</small> | 右末每服二錢濃煎木瓜湯調下如要 <small>闕</small> | 利更加麻仁 | 脾約圓治脚氣大便秘澀 | 麻仁 <small>別研</small> | 杏仁 <small>浸去皮炒</small> | 枳實 <small>製</small> | 厚樸 <small>製</small> | 芍藥 <small>各半斤</small> | 大黃 <small>一斤蒸切曬</small> | 右末煉蜜圓桐子大每二十圓食後熟水下或敗毒 |
|------|-----|------|---------------------|---------------------|-----|------------------------|----|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|----|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------|---------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷四



迪志文化出版有限公司出版

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 散加大黃通用                                      |                                  |
| 大黃湯治脚氣風熱煩悶發渴大便不通                            |                                  |
| 木香                                          | 大黃<br><small>各半兩</small>         |
| 升麻                                          | 黑豆<br><small>一兩</small>          |
| 右剉每服三錢烏梅二箇新水煎服                              |                                  |
| 追風毒剉散治脚氣熱多證疎泄風毒                             |                                  |
| 羌活                                          | 雞心檳榔<br><small>一兩</small>        |
| 桑白皮                                         | 防風                               |
| 郁李仁                                         | 大黃<br><small>生各一分</small>        |
| 右剉散每服三錢黑豆百粒煎服熱甚大便秘更加                        |                                  |
| 大黃                                          |                                  |
| 敗毒散<br><small>方見寒類</small> 治脚氣熱證或自汗惡風則加桂無汗惡 |                                  |
| 寒則加去節麻黃又治風濕脚氣發熱焮腫加蒼朮檳                       |                                  |
| 榔大黃微利為效                                     |                                  |
| 竹茹湯治脚氣胃熱煩燥嘔吐<br><small>方見熱門</small> 加烏梅煎    |                                  |
| 豆蘇                                          | 加生甘草治熱證脚氣<br><small>方見血類</small> |
| 木香飲治脚氣入腹攻心嘔悶                                |                                  |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| 南木香                      |                                             |
| 甘草<br><small>炙</small>   |                                             |
| 青木香                      |                                             |
| 吳茱萸                      | 宣木瓜                                         |
| 真橘皮                      | 紫蘇莖葉                                        |
| 雞心檳榔                     | <small>各一兩</small>                          |
| 右剉散每服三錢薑五片烏梅一枚煎服         |                                             |
| 降氣湯                      | 治脚氣衝心築痛嘔吐<br><small>方見前</small>             |
| 涎沫和劑流氣飲通用                | <small>方見滿門</small>                         |
| 椒瓜圓治脚氣寒證                 |                                             |
| 大生木瓜                     | 就蒂切蓋以正川椒去目碾末<br><small>納實其中用竹針插其蓋炊熟</small> |
| 右研二味為圓桐子大每四十圓溫酒下扶虛用核     |                                             |
| 桃肉煎湯下                    |                                             |
| 越婢湯治脚氣風多證                |                                             |
| 麻黃                       | 爛石膏<br><small>去節一兩半</small>                 |
| 白朮                       | <small>一兩</small>                           |
| 熟附子                      | 甘草<br><small>炙各半兩</small>                   |
| 右剉散每服三錢薑五片棗一枚煎服          |                                             |
| 小續命多用薑片治脚氣寒多證加獨活治脚氣風多    |                                             |
| 證<br><small>方見風類</small> |                                             |



|                       |                             |                                     |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 乾薑甘草湯                 | 方見脾<br>疼門                   | 加製吳茱萸官桂治寒證脚氣                        |
| 香薷剉散加木瓜煎吞消暑圓治暑證脚氣     | 方並見<br>暑門                   |                                     |
| 獨活寄生湯加陳皮治風證脚氣無熱者皆可服最除 |                             |                                     |
| 風毒消惡血                 | 方見腰<br>疼門                   |                                     |
| 石南圓治風毒脚腫生瘡或筋攣痛重       |                             |                                     |
| 石南葉                   |                             | 薏苡仁<br>杏仁 <small>浸去皮<br/>微炒</small> |
| 牽牛 <small>炒</small>   | 大腹子 <small>連皮<br/>用</small> | 川芎                                  |
| 川續斷                   | 赤芍藥                         | 赤小豆                                 |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四  |                             |                                     |
| 陳皮                    | 當歸                          | 麻黃 <small>去節各<br/>二兩</small>        |
| 五加皮                   | 牛膝 <small>各三<br/>兩</small>  | 宣木瓜                                 |
| 獨活                    | 萆薢                          | 杜仲 <small>薑製炒<br/>各四兩</small>       |
| 右細末以酒浸蒸餅研糊圓桐子大每服三十圓煎  |                             |                                     |
| 木瓜湯下                  |                             |                                     |
| 加劑除濕湯加檳榔              | 方見<br>濕門                    | 五苓散 <small>方見水<br/>飲門</small> 治脚氣渴多 |
| 證                     |                             |                                     |
| 換腿圓治風濕脚氣緩弱痺痛上攻肩背      |                             |                                     |

|                             |                            |                             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 石南葉                         | 南星 <small>炮</small>        | 石斛 <small>酒浸<br/>曬</small>  |
| 牛膝 <small>酒浸<br/>曬</small>  | 羌活                         | 薏苡仁 <small>炒</small>        |
| 防風                          | 萆薢                         | 黃耆 <small>蜜炙</small>        |
| 天麻                          | 當歸 <small>酒浸<br/>曬</small> | 續斷 <small>各一<br/>兩半</small> |
| 檳榔 <small>二兩<br/>半</small>  | 宣木瓜 <small>四兩</small>      | 加蒼朮 <small>炒</small>        |
| 川芎 <small>各一<br/>兩半</small> |                            |                             |
| 右末酒麪稀糊圓桐子大每五十圓食前橘皮煎湯        |                            |                             |
| 下                           |                            |                             |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四        |                            |                             |
| 獨活湯                         |                            |                             |
| 羌活                          | 麻黃 <small>去節</small>       | 熟附子                         |
| 生地薑                         | 川芎                         | 牛膝                          |
| 白芍藥                         | 白茯苓                        | 黃耆 <small>蜜炙</small>        |
| 人參                          | 杜仲 <small>薑製<br/>炒</small> | 甘草 <small>炙</small>         |
| 辣桂                          | 當歸                         | 白朮                          |
| 木香 <small>等分</small>        |                            |                             |
| 右麤末每服三錢薑五片棗二枚同煎吞活血應痛        |                            |                             |



|                                          |              |                      |          |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| 圓                                        |              | 活血應痛圓                |          |
| 蒼朮                                       | 炒六兩          | 香附                   | 炒杵淨七兩    |
| 威靈仙                                      | 二兩           | 陳皮                   | 五兩半      |
| 草烏頭                                      | 二十四兩<br>炮去皮臍 | 沒藥                   | 一兩<br>別研 |
| 狗脊                                       | 煨去毛四兩        | 右末酒麪稀糊圓桐子大每服二十圓用獨活湯下 |          |
| 治腎受風冷脚氣酸疼及久痢登廁風冷入于腸胃以致兩脚削小成鼓槌風而痢又不止用此兩藥俱 |              |                      |          |
| 效                                        |              |                      |          |
| 不老地仙丹治腎臟風毒輕脚壯筋                           |              |                      |          |
| 當歸                                       | 牛膝           | 薏苳                   | 各酒浸焙乾    |
| 虎骨                                       | 酒炙           | 真川椒                  | 去目出汗     |
| 川草薺                                      | 鹽水           | 白附子                  | 炮        |
| 黃耆                                       | 蜜炙           | 圓白南星                 | 炮        |
| 何首烏                                      | 杜仲           | 薑製                   |          |
| 獨活                                       | 沒藥           | 赤小豆                  |          |
| 防風                                       | 三別分研         |                      |          |

|                         |             |       |              |
|-------------------------|-------------|-------|--------------|
| 地龍                      |             | 茴香    |              |
| 土去                      |             | 炒     |              |
| 血竭                      | 乳香          | 別研各半兩 |              |
| 右細末河麪稀糊圓桐子大每服四十圓木瓜橘皮煎湯下 |             |       |              |
| 烏蛇圓治風寒脚氣隱痛痺             |             |       |              |
| 烏蛇                      | 四兩酒浸<br>取肉焙 | 虎骨    | 醋浸洗淨<br>酒炙二兩 |
| 石斛                      | 令作末         | 薏苳    | 酒浸           |
| 黃松柏節                    | 酒浸<br>研     | 巴戟    | 去心           |
| 官桂                      | 防風          | 獨活    |              |
| 續斷                      | 五加皮         | 薏苳仁   |              |
| 當歸                      | 木香          | 川芎    | 各半兩          |
| 乳香                      | 生乾薑         | 各二分   |              |
| 右末酒麪稀糊圓桐子大每服四十圓木瓜橘皮煎湯下  |             |       |              |
| 慈濟圓治脚氣遊走兩足轉上腰腿疼痛不能轉側    |             |       |              |
| 宣木瓜                     | 二兩          | 川烏    | 炮去皮臍         |
| 黃耆                      | 當歸          | 防風    |              |
| 蒺藜                      | 炒去刺         |       |              |



|                                                                                                        |       |                 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----|
| 草薺                                                                                                     | 牛膝    | 天台烏藥            | 各一兩 |
| 赤小豆                                                                                                    | 茴香    | 地龍              | 去土  |
| 老白膠                                                                                                    | 川五靈脂  | 各三分             |     |
| 右細末酒麪稀糊圓桐子大圓數四十食前紫蘇湯送下                                                                                 |       |                 |     |
| 四斤圓治脚氣緩弱隱疼及腎虛感受風寒濕痺                                                                                    | 方見風緩  |                 |     |
| 大流氣飲加當歸下                                                                                               | 方見服滿門 |                 |     |
| 欽定四庫全書<br> 仁齋直指<br>卷四 |       |                 |     |
| 虎骨散                                                                                                    | 方見歷節門 | 脚氣筋急掣痛用木瓜橘皮煎湯調下 |     |
| 金液丹                                                                                                    | 方見脾疼門 | 治凝陰蘊毒溫而利之養正丹通用以 |     |
| 枳殼木瓜檳榔煎湯下                                                                                              |       |                 |     |
| 二陳湯加檳榔細辛製枳殼治脚氣痰多證                                                                                      | 方見瘡門  | 無熱              |     |
| 者二陳湯下養正丹艾瓜圓                                                                                            | 方見腎氣門 |                 |     |
| 脚痛緩弱患在風濕風證以烏藥順氣散加麻黃白芷                                                                                  |       |                 |     |
| 主之濕證以不換金正氣散加茯苓生乾薑主之一匕                                                                                  |       |                 |     |
| 收功容易事也若夫腎虛為病脚弱而痛又當何如曰                                                                                  |       |                 |     |

|                       |     |                |         |
|-----------------------|-----|----------------|---------|
| 腎主骨故爾惟安腎圓最良以不換金正氣散送下仍 |     |                |         |
| 夾和白圓子佐之余每見脚氣緩弱人多服四斤圓亦 |     |                |         |
| 安腎圓輩也然則腎氣充則骨氣彊骨氣彊則無緩弱 |     |                |         |
| 之患治法要當究其原             |     |                |         |
| 附諸方                   |     |                |         |
| 麻黃左經湯                 | 方三因 | 治風寒暑溫流注足太陽經腰足攣 |         |
| 痺關節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛  |     |                |         |
| 眩暈                    |     |                |         |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷四  |     |                |         |
| 麻黃                    | 去節  | 乾葛             | 細辛      |
| 白朮                    | 米泔浸 | 茯苓             | 防己      |
| 桂心                    | 不見火 | 羌活             | 甘草<br>炙 |
| 防風                    | 各等分 |                |         |
| 右為末每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎空心服  |     |                |         |
| 自汗去麻黃加肉桂芍藥重者加白朮陳皮無汗減  |     |                |         |
| 桂加杏仁澤瀉並各等分            |     |                |         |
| 半夏左經湯                 | 方三因 | 治之小腸經為風寒暑濕流注發熱 |         |





|                      |  |          |                                   |     |    |
|----------------------|--|----------|-----------------------------------|-----|----|
| 腰脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食         |  | 半夏       | 湯洗七次                              | 乾葛  | 細辛 |
| 白朮                   |  | 麥門冬      |                                   | 柴胡  |    |
| 茯苓                   |  | 桂心       | 不見火                               | 防風  |    |
| 乾薑                   |  | 黃芩       | 炮                                 | 小草  |    |
| 甘草                   |  | 炙各等分     |                                   |     |    |
| 右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空 |  |          |                                   |     |    |
| 心服熱悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮      |  |          |                                   |     |    |
| 大黃左經湯                |  | 方三因      | 治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗 |     |    |
| 細辛                   |  | 去苗       | 茯苓                                | 羌活  |    |
| 大黃                   |  | 蒸        | 甘草                                | 炙   | 前胡 |
| 枳殼                   |  | 去穰炒      | 厚樸                                | 去皮炒 | 黃芩 |
| 杏仁                   |  | 去皮尖別研各等分 |                                   |     |    |
| 右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空 |  |          |                                   |     |    |
| 心熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫 |  |          |                                   |     |    |

欽定四庫全書

仁齋直指卷四

欽定四庫全書

仁齋直指卷四

|                      |  |         |                |                             |    |
|----------------------|--|---------|----------------|-----------------------------|----|
| 蘇小便澀少加澤瀉四肢瘡瘍浸淫加升麻並等分 |  | 大料神秘左經湯 | 方三因            | 治風寒暑濕流注三陽經腰足拘攣大小便秘澀喘滿煩悶並皆治之 |    |
| 半夏                   |  | 湯洗七次    | 乾葛             | 細辛                          |    |
| 麻黃                   |  | 去節      | 麥門冬            | 去心                          | 小草 |
| 白薑                   |  |         | 厚樸             | 薑製炒                         | 茯苓 |
| 防己                   |  |         | 枳殼             | 去穰炒                         | 甘草 |
| 桂心                   |  |         | 羌活             |                             | 防風 |
| 柴胡                   |  |         | 黃芩             |                             |    |
| 右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服自汗 |  |         |                |                             |    |
| 加牡蠣白朮去麻黃黃腫加澤瀉木通熱甚無汗減 |  |         |                |                             |    |
| 桂加橘皮前胡升麻腹痛或利去黃芩加芍藥附子 |  |         |                |                             |    |
| 大便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁藥白皮紫蘇竝等 |  |         |                |                             |    |
| 分對證加減尤宜審之            |  |         |                |                             |    |
| 六物附子湯                |  | 方三因     | 治四氣流注於足太陰經骨節煩疼 |                             |    |
| 四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫   |  |         |                |                             |    |



|                                                                                                        |           |                |        |         |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|---------|---------|----------------|
| 附子                                                                                                     | 炮去<br>皮臍  | 桂心             | 防己     | 各<br>四兩 |         |                |
| 甘草                                                                                                     | 炙二<br>兩   | 白朮             |        | 三兩      |         |                |
| 右咬咀每服四錢水一盞薑七片煎六分食前溫服                                                                                   |           |                |        |         |         |                |
| 當歸拈痛湯                                                                                                  | 拔粹<br>方   | 治濕熱為病肢節煩疼肩背沈重胸 |        |         |         |                |
| 不利及遍身疼痛下疰于足脛痛不可忍                                                                                       |           |                |        |         |         |                |
| 羌活                                                                                                     |           | 甘草             | 炙      | 黃芩      | 酒<br>浸  |                |
| 茵陳                                                                                                     | 酒炒<br>各五錢 | 人參             | 去<br>蘆 | 升麻      |         |                |
| 苦參                                                                                                     | 酒洗        | 葛根             |        | 蒼朮      | 各二<br>錢 |                |
| 欽定四庫全書<br> 仁齋直指<br>卷四 |           |                |        |         |         |                |
| 防風                                                                                                     | 去<br>蘆    | 當歸身            | 知母     | 酒洗      |         |                |
| 茯苓                                                                                                     | 炒         | 澤瀉             | 豬苓     | 各三<br>勺 |         |                |
| 白朮                                                                                                     | 半一<br>勺   |                |        |         |         |                |
| 右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓空心服                                                                                    |           |                |        |         |         |                |
| 烏藥平氣湯<br>三因<br>方                                                                                       |           |                |        |         |         | 治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行 |
| 步艱苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之                                                                                        |           |                |        |         |         |                |
| 茯神                                                                                                     | 去<br>木    | 甘草             | 炙      | 白芷      |         |                |
| 當歸                                                                                                     |           | 白朮             |        | 川芎      |         |                |

|                             |                            |                          |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 五味子                         | 紫蘇子                        | 乾木瓜                      |
| 人參                          | 烏藥<br><small>去木各等分</small> |                          |
| 右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚煎七分溫服       |                            |                          |
| 東垣羌活導滯湯治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛       |                            |                          |
| 便溺阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯           |                            |                          |
| 羌活                          | 獨活                         | 防己                       |
| 當歸<br><small>各三錢</small>    | 大黃<br><small>酒浸煨一兩</small> | 枳實<br><small>炒二錢</small> |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷四              |                            |                          |
| 右咬咀每服五錢或七錢水煎服               |                            |                          |
| 金匱八味丸治足少陰經脚氣入腹腹脹疼痛上氣喘       |                            |                          |
| 急腎經虛寒所致也此證最急以腎乘心水尅火死        |                            |                          |
| 不旋踵<br><small>方見補損門</small> |                            |                          |
| 加味敗毒散治足三陽經受熱毒氣流注脚踝上焮赤       |                            |                          |
| 腫痛寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒             |                            |                          |
| 羌活                          | 獨活                         | 前胡                       |
| 柴胡                          | 枳殼                         | 桔梗                       |



|                           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 甘草                        | 人參                       | 茯苓                       |
| 川芎                        | 大黃                       | 蒼朮<br><small>分等</small>  |
| 右咬咀每半兩入薑煎                 |                          |                          |
| 五積散<br><small>方和劑</small> | 治寒濕流注兩脚酸疼有兼痰氣者用之         |                          |
| 尤宜內加木瓜                    | <small>方見中寒門</small>     |                          |
| 健步丸<br><small>方見痿</small> |                          |                          |
| 生苳<br><small>兩半</small>   | 歸尾                       | 芍藥                       |
| 陳皮                        | 蒼朮                       | 牛膝<br><small>兩各一</small> |
| 吳茱萸                       | 條芩<br><small>兩各半</small> | 桂枝<br><small>錢二</small>  |
| 大腹子<br><small>三箇</small>  |                          |                          |
| 右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白朮      |                          |                          |
| 木通湯下                      |                          |                          |
| 防己飲<br><small>方丹溪</small> | 木通                       | 防己                       |
| 白朮                        | 川芎                       | 甘草稍                      |
| 檳榔                        | 蒼朮<br><small>炒鹽</small>  | 生苳                       |
| 犀角                        |                          |                          |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 黃柏<br><small>各酒炒</small> | 大便實加桃仁小便澀加杜牛膝有熱加黃芩黃連  |
| 大熱及時令熱加石膏有痰加竹瀝薑汁如常腫者     | 專主乎濕熱先生別有方            |
| 脚氣治例                     | 心法附錄曰脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕 |
| ○勝濕以仙朮白朮防己川芎為主或六物附子湯     | 或當歸拈痛湯○脚氣氣鬱甚者舟車丸除濕丹有  |
| 飲者東垣開結導飲丸○脚氣解表用麻黃左經湯     | 等藥隨經選用有兼痰氣寒濕者五積散加木瓜   |
| 若雙解以大黃左經湯東垣羌活導滯湯         | 若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加  |
| 黃柏南星或健步丸                 | 若疎風養血用獨活寄生湯最效○春夏氣溢腫而  |
| 痛者用香蘇散加五加皮木瓜檳榔川練子○熱而     | 紅腫者敗毒散加木瓜蒼朮○秋冬已後用五積散  |



加木瓜牛膝檳榔吳茱萸

附足跟痛

丹溪曰○有痰有血熱○血熱四物加黃柏知母牛膝之類有痰唾者五積散加木瓜

四物湯

方見補損門

五積散

方見中寒門

舟車丸

除濕丹

俱見濕類

欽定四庫全書

仁齋直指卷四

開結導飲丸

方見痰涎門

治脚轉筋疼痛攣急用松節二兩剉細乳香一錢以銀石器內慢火畧炒焦存性研細每服一錢至二錢木瓜酒調下

治脚氣筋骨疼痛用金銀花為末每服二錢熱酒調下或剉碎同木瓜白芍藥官桂當歸甘草酒水各半鍾煎去滓空心熱服

仁齋直指卷四

欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷五

詳校官太醫院吏目臣宋桂  
編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱 鈐  
校對官主簿臣汪日贊  
謄錄監生臣張 炳



欽定四庫全書

仁齋直指卷五

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

諸氣 附 梅核氣積聚癥瘕痞塊

諸氣方論

人以氣為主一息不運則機絨窮一毫不續則穹壤判陰陽之所以升降者氣也血脈之所以流行者亦氣也榮衛之所以運轉者氣也五臟六腑之所以相養相生

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷五

者亦此氣也盛則盈衰則虛順則平逆則病氣也者獨非人身之根本乎人有七情病生七氣七氣者寒熱怒悲喜憂愁或以為喜怒憂思悲驚恐皆通也然則均調是氣將何先焉曰氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯以半夏主治而官桂佐之蓋良法也況夫冷則生氣調氣雖用豁痰亦不可無溫中之劑其間用桂又所以溫其中也不然七氣相干痰涎凝結如絮如膜甚如梅核窒礙於咽喉之間咯不出嚥不下

或中滿艱食或上氣喘急曰氣隔曰氣滯曰氣秘曰氣中以至五積六聚疝癖癥瘕心腹塊痛發即欲絕殆無往而不至矣○冷氣者生冷傷脾風冷入胃或血海虛冷冷則生氣用和劑七氣湯治中湯沈香降氣湯大沈香圓○痰結者三因七氣湯指迷七氣湯易簡二陳湯○中滿者痞滿不食水氣腫脹面目俱浮枳殼散加南木香大流氣飲指迷七氣湯順氣木香散三和散五皮散加半夏茯苓○上氣者氣逆而上呼吸喘促分氣紫

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷五

蘇湯蘇子降氣湯或嚼蘇合香圓以秘傳降氣湯送下○氣隔者陰陽不和中脘室塞五隔吐噎食不能下五鬲寬中散和劑七氣湯加木香縮砂間以紅圓子佐之○氣滯者滯於胃膈則脹滿滯于手足則浮腫滯于腰間則墜痛脹滿用異香散調氣散沈香降氣湯仍與神保圓或少蓬煎圓利之浮腫用三和散夾生料五苓散或五皮散加桂吞青木香圓局方流氣飲加赤茯苓枳殼腰痛俞山人降氣湯局方七氣湯加橘核或辣桂煎





湯點調氣散吞青娥丸○氣秘者停宿不消腸胃留滯大便不通蘇合香圓夾和感應圓或楊氏麝香圓局方麻仁圓並用枳殼散送下○氣疾之人多因氣不歸元遂成氣中狀如中風仆倒昏迷牙關緊急只是無痰此為氣中不得誤用風藥及通關利膈等輩先以薑汁泡湯調蘇合香圓次用七氣湯大流氣飲加石菖蒲繼之氣順而蘇即以治中湯加木香以和其中使氣歸常道若更不能調則氣逆而厥又有變證○五積者五臟之

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷五

所積其病難醫六聚者六腑之所聚其病易治挾水為癖挾血為癥氣血水飲皆能結塊輕者神保圓以麝香湯送下或少與蓬煎圓撞氣阿魏圓三稜煎圓重者如意圓頂珠圓酌量用○又一證漉漉作聲腹中纏滯他無所苦此為水飲消飲圓倍術圓方並見水飲類二薑圓夾和用之○人有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常一種婦人平時任氣易為七情所傷適月事經季不行一身百病胃臆氣填嘔惡全不入食入食則吐痰涎或一塊

如核室塞脅喉而痛或一塊如卵築觸心下而疼或腹中塊物動而作痛攻刺腰背時發悶熱四肢乏力脚不能行小便白濁浮油帶下淋瀝日就瘦弱全似虛勞然而穀雖不入果子雜物常喜食之却只是有孕諺所謂孕婦做得百般病者此也用藥但以二陳湯加縮砂桔梗薑棗烏梅同煎半夏理氣消痰縮砂安胎順氣北梗以開胃喉之隔服之自然安平若妄以剛劑溫胃胎氣必煩病無由愈白濁一節謹勿燥澁二陳湯加白茯苓

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷五

以下白圓子方並見痰涎類可也若夫七情所發逆氣填胸不惟核膜上塞咽喉甚者攻擊滿悶欲絕產後尤多有之故曰產前安胎產後調氣男女或有胸喉間梅核作恙者觸事勿怒飲食勿冷

諸氣證治

和劑七氣湯治七氣所傷痰涎結聚心腹刺痛不能飲

食

半夏製焙五兩

人參

辣桂去麋皮各一兩

甘草炙半兩





|                        |      |
|------------------------|------|
| 加半夏                    | 製三分  |
| 右剉散每服三錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不時服 |      |
| 順氣木香散治冷證腫脹泄瀉           |      |
| 良薑                     | 乾薑炮  |
| 縮砂仁                    | 辣桂   |
| 厚樸                     | 薑汁焙  |
| 甘草                     | 燂    |
| 蒼朮                     | 炒    |
| 丁皮                     | 桔梗   |
|                        | 各等分  |
| 欽定四庫全書                 | 仁齋直指 |
| 卷五                     |      |
| 右末每二錢半薑棗煎食前服           |      |
| 三和散和暢三焦治痞脹浮腫           |      |
| 大腹皮                    | 炒    |
| 紫蘇莖葉                   | 沈香   |
| 宣木瓜                    | 各一兩  |
| 羌活                     | 白朮   |
|                        | 炒    |
| 川芎                     | 甘草   |
|                        | 炒    |
| 陳橘皮                    | 去白   |
| 檳榔                     | 濕紙煨  |
|                        | 各三分  |
| 右麓末每二錢煎服加赤茯苓可以和氣利水     |      |
| 五皮散治皮膚水氣               |      |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷五



迪志文化出版有限公司出版

|                         |                         |     |     |                          |          |                |                            |                        |    |     |                          |     |                          |                           |                      |                                               |                |                         |                              |                          |                         |                         |                             |                               |                             |                      |
|-------------------------|-------------------------|-----|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------------------|------------------------|----|-----|--------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 大腹皮<br><small>炒</small> | 桑白皮<br><small>炒</small> | 茯苓皮 | 生薑皮 | 陳橘皮<br><small>等分</small> | 右麓末每三錢煎服 | 分氣紫蘇湯治腹脅疼痛氣促喘急 | 五味子<br><small>去梗洗淨</small> | 桔梗<br><small>剉</small> | 茯苓 | 大腹皮 | 陳橘皮<br><small>洗淨</small> | 草果仁 | 桑白皮<br><small>炙剉</small> | 甘草<br><small>炙各三斤</small> | 右八味咀咀為麓末秤二十斤淨入揀嫩枝葉乾紫 | 蘇十五斤搗碎同一處拌勻每服四錢水一大盞薑錢三片入鹽少許同煎至七分去滓空心食前服常服和胃進食 | 蘇子降氣湯治心腹脹滿喘促短急 | 蘇子<br><small>淨炒</small> | 半夏<br><small>洗七次各二兩半</small> | 甘草<br><small>炙二兩</small> | 前胡<br><small>去蘆</small> | 陳皮<br><small>去白</small> | 厚樸<br><small>薑汁製各一兩</small> | 桂<br><small>皮一兩去蘆皮不見火</small> | 川當歸<br><small>去蘆一兩半</small> | 右為咀咀每服二錢至三錢水一大盞生薑三片煎 |
|-------------------------|-------------------------|-----|-----|--------------------------|----------|----------------|----------------------------|------------------------|----|-----|--------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷五



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 至七分去滓溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食                                                            |            |
| 蘇合香圓療症忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴                                                            |            |
| 瘧赤白暴利瘀血月閉痲痺丁腫驚癇鬼忤中人小兒                                                            |            |
| 吐乳大人狐狸等疾                                                                         | 方見嗽類       |
| 祕傳降氣湯治同前                                                                         |            |
| 五加皮                                                                              | 半兩酒浸半日炒黃色  |
| 枳殼                                                                               | 洗浸去穢炒      |
| 柴胡                                                                               | 去蘆洗各一兩     |
| 骨碎補                                                                              | 燎去毛括淨剉炒半兩  |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷五                                                                   |            |
| 地骨皮                                                                              | 半兩炒黃       |
| 桔梗                                                                               | 半兩炒黃色      |
| 桑白皮                                                                              | 二兩剉炒       |
| 陳皮                                                                               | 一兩炒黃色      |
| 訶子                                                                               | 半兩炮取肉炒     |
| 甘草                                                                               | 一兩炒        |
| 半夏                                                                               | 半兩生薑汁為餅再碎炒 |
| 草果                                                                               | 去皮膜半兩淨洗炒黃  |
| 右為麤散和勻以碗盛就飯甑上蒸一伏時傾出攤                                                             |            |
| 令冷收之每服二錢紫蘇三葉薑錢三片水一盞同煎七分食後通口服痰嗽加半夏麴煎心肺虛加人參茯苓煎上膈熱加北黃芩煎下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸煎 |            |

|                                                      |      |       |          |
|------------------------------------------------------|------|-------|----------|
| 五膈寬中散治七氣留滯飲食不下穀脹氣脹通用                                 |      |       |          |
| 白豆蔻仁                                                 | 丁香   | 木香    |          |
| 縮砂仁                                                  | 甘草   | 青皮    |          |
| 陳皮                                                   | 各二兩  | 川厚樸   | 薑汁炙焙     |
| 右麤末每三錢薑三片鹽一點煎服                                       |      | 香附    | 淨各四兩     |
| 紅圓子治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶酒積不食婦人脾血積氣諸般血癥氣塊                       |      | 方見瘕瘕門 |          |
| 異香散治腹脇膨脹痞悶噎塞噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛                             |      |       |          |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷五                                       |      |       |          |
| 蓬莪茂                                                  | 煨    | 益智仁   | 煨        |
| 京三稜                                                  | 煨各六兩 | 青皮    | 去白各      |
| 石蓮肉                                                  | 一兩   | 厚樸    | 去麤皮薑汁浸二兩 |
| 右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚鹽一捻煎七分通口服不計時或鹽湯點或鹽酒調皆可服調氣散治氣滯不勻宿食不消 |      |       |          |
| 白豆蔻                                                  | 用仁   | 丁香    | 檀香       |
|                                                      |      |       | 剉        |



|                                                                                                                                                                  |          |     |         |         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|---------|----------------|
| 木香                                                                                                                                                               | 各二<br>十兩 | 藿香葉 | 甘草      | 各<br>五兩 |                |
| 縮砂仁                                                                                                                                                              | 二斤<br>半  |     |         |         |                |
| 右為細末每服一錢入鹽一捻沸湯點服不計時或用薑棗略煎服                                                                                                                                       |          |     |         |         |                |
| 神保圓                                                                                                                                                              |          |     |         |         |                |
| 木香                                                                                                                                                               |          | 胡椒  | 各一<br>分 | 巴豆      | 十枚<br>去<br>皮心研 |
| 乾蝎                                                                                                                                                               | 七<br>枚   |     |         |         |                |
| 右件湯釋蒸餅圓如麻子大朱砂為衣每服三粒心                                                                                                                                             |          |     |         |         |                |
| 欽定四庫全書                                                                                                                                                           |          |     |         |         |                |
|                                                                                 |          |     |         |         |                |
| 卷五 仁齋直指                                                                                                                                                          |          |     |         |         |                |
| 脇痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下肺氣盛者白礬蛤粉各三分黃丹一分同研為散煎桑根白皮糯米飲調三錢下小喘止用桑皮糯米飲下腎氣脇下痛炒茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治獨此藥輒能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不瘥乃流入背脊久之又注右脇攣痛甚苦乃合服之 |          |     |         |         |                |

|                                                                         |              |     |                    |     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------|-----|------------------|
| 蓬煎圓利大腑去積氣                                                               | 一投而瘥後嘗再發又一投瘥 |     |                    |     |                  |
| 舶上茴香                                                                    | 炒            | 附子  | 炮去<br>皮臍           | 枳殼  | 浸一宿<br>去<br>穢炒   |
| 川練子                                                                     | 去<br>核       | 檳榔  |                    | 山藥  | 各二<br>兩          |
| 礪砂                                                                      | 半<br>兩       | 京三稜 |                    | 蓬莪術 | 二兩<br>味各四<br>醋煮令 |
| 透切焙<br>為末                                                               |              | 豬胰  | 一具入礪砂并三<br>稜莪術末同熬膏 |     |                  |
| 右為末入膏內同醋麪糊為圓如梧桐子大每服十圓至十五圓生薑湯下婦人淡醋湯下不拘時候更量虛實加減常服順氣寬中消積滯化痰飲生料五苓散去水退腫      |              |     |                    |     |                  |
| 澤瀉                                                                      | 剉二十<br>五兩    | 豬苓  | 去<br>皮             | 赤茯苓 | 去<br>皮           |
| 白朮                                                                      | 去蘆各一<br>十五兩  | 桂   | 去<br>麤皮            |     |                  |
| 右為細末每服二錢熱湯調下不拘時又治療熱在裏身發黃疽濃煎茵陳蒿湯下食前服疽病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛熱加綿黃耆人參末少許 |              |     |                    |     |                  |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷五                                                          |              |     |                    |     |                  |





俞山人降氣湯治氣不升降痰實喘滿

紫蘇子炒微

前胡去蘆

厚樸薑汁浸一宿炒香

半夏炙

甘草炙

橘皮去白

五加皮薑汁塗炙

當歸洗去蘆

桂心不見火

黃耆去蘆各一兩

人參去蘆

附子炮去皮尖

桔梗炒

羌活

乾薑炮各半兩

右麤末每服三錢水一盞半紫蘇三葉生薑三片棗

子一枚同煎七分去滓食後服

欽定四庫全書

仁齋直指卷五

青娥圓治氣滯不散兼治腰痛

破故紙酒浸炒八兩

胡桃二十箇去皮殼

蒜熬四兩膏

杜仲薑汁浸炒十六兩去皮

右為細末蒜膏為圓每服三十圓空心溫酒下婦人

淡醋湯下常服壯筋骨活血脈烏髭鬚益顏色

感應圓治積冷傷胃腹脇脹痛方見脹滿門

麻仁圓順三焦潤五臟治大便秘塞不通年高人尤宜

服之

白檳榔半生煨

羌活去蘆

木香各一兩

肉桂去蘆皮

兔絲子酒浸一宿別研為末

山茱萸

車前子

枳殼去穰炒

防風去蘆頭及叉枝

山藥各一兩半

麻仁別搗研

大黃半生蒸

郁李仁去皮別搗碎各四兩

右為細末入別研藥勻煉蜜和圓如梧桐子大每服

十五圓至二十圓溫水吞下臨臥服

撞氣阿魏圓治五種噎疾九般心痛痞癖氣塊冷氣攻

欽定四庫全書

仁齋直指卷五

刺

茴香炒香

陳橘皮洗

青橘皮洗

川芎

丁香皮炒

蓬莪朮炮

甘草炒各一兩

縮砂仁

肉桂去蘆皮

白芷炒各半兩

生薑四兩切作片子用鹽半兩淹一宿炒黑色

胡椒二錢半

阿魏二錢半醋浸一宿以麪同為糊

右為末用阿魏糊和圓如雞頭大每藥圓一斤用朱

砂七錢為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下一粒至二粒婦



人血氣醋湯下常服一粒爛嚼茶酒任下

三稜煎圓治中脘氣痞心腹堅脹胃中痞塞喘滿短氣

大便不調或泄或秘

京三稜

生細剉半斤搗羅為末以好酒三升石器內熬成膏

青橘皮

白去

杏仁

湯浸去皮微炒令黃

蘿蔔子

微炒

乾漆

炒各二兩

神麴

炒

麥蘖

炒各三兩

礪砂

研飛一兩

右為末以三稜膏搜和圓如梧桐子大每服十五圓

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷五

至二十圓溫米飲下食後服

二薑圓養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼痛寬胃下氣

一切冷物所傷

良薑

去蘆

乾薑

炮

右件等分為細末麪糊為圓如梧桐子大每服十五

至二十圓食後橘皮湯下孕婦不宜服

香橘圓治七情所傷中脘不決腹脇脹滿

香附

炒

半夏

製

橘紅

各二兩

甘草

炒三分

右剉散每三錢薑五片棗二枚煎服

桔梗枳殼湯治諸氣痞結滿悶

枳殼

製

桔梗

各二兩

甘草

炒半兩

右剉散每四錢水盞半薑五片煎至中盞溫服

薑桂散治心中卒痛腹脇氣滯

辣桂

川白薑

不炒各一兩

蓬莪術

半兩

右末每一錢溫酒調下

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷五

沈香開膈散治五膈五噎痞滿嘔吐心腹刺痛脇肋脹拒

沈香

荆三稜

蓬莪術

白豆蔻仁

華澄茄

縮砂仁

草果仁

益智仁

川白薑

丁香

人參

丁皮

各半兩

木香

白茯苓

香附

炒

霍香葉

半夏麴

青皮



|                           |                             |                        |          |                           |                           |                            |                         |                           |                          |                    |                                 |                                |                           |     |                         |                             |                         |                          |                           |                           |                                    |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 陳皮<br><small>兩 各一</small> | 甘草<br><small>炒一分 一兩</small> | 右麤末每三錢水盪半薑五片棗二枚煎至中盪食前服 | 良薑湯治冷氣腹痛 | 良薑<br><small>兩 各一</small> | 辣桂<br><small>兩 各一</small> | 半夏<br><small>製三分 三</small> | 木香<br><small>當歸</small> | 厚樸<br><small>製各半兩</small> | 甘草<br><small>炒一分</small> | 右麤散每三錢薑四片水大盪煎六分食前服 | 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷五</small> | 白豆蔻散治七氣所傷滯於胸膈窒於咽喉脹痛于心下噫氣吞酸不能飲食 | 白豆蔻仁<br><small>縮砂</small> | 華澄茄 | 丁香<br><small>木香</small> | 甘草<br><small>炒各一分 各</small> | 青皮<br><small>陳皮</small> | 辣桂<br><small>各二分</small> | 厚樸<br><small>製各三分</small> | 香附<br><small>炒各三分</small> | 右末每三錢水一盪薑三片鹽一捻煎七分不時服如意圓治積聚塊痛疝瘕癰癖等疾 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|

|    |    |     |     |     |    |                         |                        |                         |                           |    |    |    |                          |                            |                            |                           |                                 |                  |    |    |    |                              |                            |                            |                                                   |                               |
|----|----|-----|-----|-----|----|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----|----|----|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----|----|----|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 沈香 | 木香 | 大丁香 | 華澄茄 | 史君子 | 辣桂 | 川白薑<br><small>炒</small> | 桃仁<br><small>炒</small> | 五靈脂<br><small>炒</small> | 礪砂<br><small>醋浸半月</small> | 雄黃 | 沒藥 | 大戟 | 牽牛<br><small>炒取末</small> | 巴豆<br><small>去油各一兩</small> | 肉豆蔻<br><small>炮各半兩</small> | 右末研細水煮麵糊圓麻子大每服二圓加至三圓止溫酒送下 | 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷五</small> | 頂珠圓治積氣塊痛久年脾積癖瘕之疾 | 木香 | 丁香 | 淡豉 | 礪砂<br><small>醋浸半日並日乾</small> | 朱砂<br><small>研細各一分</small> | 巴豆<br><small>去油一錢半</small> | 右末陳米飯為圓桐子大輕者一圓重者二圓臨睡先嚼煨薑如指許嚥下次以冷熱水吞藥不得嚼破上項兩圓子請酌量用 | 楊氏麝香圓治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛最難治此藥主之 |
|----|----|-----|-----|-----|----|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----|----|----|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----|----|----|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|



|                                                                    |                                                               |                             |                             |                       |                              |                         |                     |                                     |                              |          |                                                 |                                                                    |                             |          |                              |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|
| <p>麝香 <small>錢一</small></p> <p>木香</p> <p>胡椒 <small>各一兩</small></p> | <p>全蝎 <small>去毒微炒</small></p> <p>巴豆 <small>去皮心各四錢</small></p> | <p>右為末湯泡蒸餅糊圓麻子大朱砂衣每三圓常服</p> | <p>熱水下心腹痛研煨薑泡湯下血痛炒薑醋泡湯下</p> | <p>腎氣脇疼茴香酒下大便秘蜜湯下</p> | <p>橘皮一物湯治諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證通用</p> | <p>凡酒食所傷中脘妨滿嘔吐吞酸悉療之</p> | <p>陳橘皮洗淨新汲水煎服屢效</p> | <p>欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷五</small></p> | <p>氣塊石燕散治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又攻左</p> | <p>脇</p> | <p>車蛾殼</p> <p>蛤蜊殼 <small>並燒灰存性為末各一兩</small></p> | <p>乾薑 <small>生</small></p> <p>官桂</p> <p>甘草 <small>炙各一分</small></p> | <p>右為末每服二錢臨發時沸湯點服車蛾蛤蜊殼治</p> | <p>塊</p> | <p>分心氣飲真方治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯通利大小</p> | <p>便</p> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|

|                                                                                         |                                                   |                                                                    |                                                  |                                                  |                                                                     |                             |                             |                                     |                                                |              |             |              |                              |                              |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <p>紫蘇莖葉 <small>兩三</small></p> <p>半夏 <small>製</small></p> <p>枳殼 <small>製各一兩半</small></p> | <p>青皮 <small>白去</small></p> <p>陳橘皮</p> <p>大腹皮</p> | <p>桑白皮 <small>炒</small></p> <p>木通 <small>去節</small></p> <p>赤茯苓</p> | <p>南木香</p> <p>檳榔</p> <p>蓬莪朮 <small>煨</small></p> | <p>麥門冬 <small>去心</small></p> <p>桔梗</p> <p>辣桂</p> | <p>香附</p> <p>藿香 <small>各一兩</small></p> <p>甘草 <small>炙一分</small></p> | <p>右剉散每服三錢水大盞薑三片棗二枚燈心十莖</p> | <p>煎七分不時服里人瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽</p> | <p>欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷五</small></p> | <p>以此藥吞溫白圓 <small>見浮腫門</small> 初則小便數次後則大便盡</p> | <p>通其病頓愈</p> | <p>附梅核氣</p> | <p>梅核氣方論</p> | <p>梅核氣者窒礙于咽喉之間咯之不出嚥之不下如梅</p> | <p>核之狀者是也始因恚怒太過積熱蘊隆乃成厲痰鬱</p> | <p>結致有斯疾耳治宜導痰開鬱清熱順氣如半夏陳皮</p> | <p>香附川芎山枝仁黃芩枳殼蘇子之類是也如老痰凝</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|



結不開以鹹軟之堅海石是也

加味二陳湯

半夏

陳皮

茯苓

甘草

黃芩

枳殼

真蘇子

桔梗

白豆蔻仁

山梔子仁

各等分

右咬咀每服五錢加生薑一片水一盞煎六分食後

徐徐服

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷五

附積聚癥癖痞塊

積聚癥癖痞塊方論

內經云積者蓋厥氣生足悅悅生脛寒脛寒則血脈凝  
滯凝滯則寒氣上入于腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁  
沫迫聚不得散日以成積卒然多飲食則腸滿起居不  
節用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄  
血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血  
溢於腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而

成積矣或外中於寒內傷于憂怒則氣上逆氣上逆則  
六輸不通溫氣不行凝血蘊裹不散津液凝滯滲著而  
不去而成積矣故曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆  
杯有頭足久不愈令人發欬逆瘧瘧連歲不已心之積  
名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心  
脾之積名曰痞氣在胃脘右側覆大如盤久不愈令人  
四肢不收發黃疸飲食不為肌膚肺之積名曰息奔在  
右脇下大如覆杯久不愈令人洒淅寒熱喘咳發肺壅  
腎之積名奔豚在小腹上至心下若豚狀或下或上無  
時久不愈令人喘逆骨痿少氣  
難經曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沈而伏陽浮而  
動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所  
生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛  
不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也  
其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故  
以是別知積聚也矣

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷五





原病式曰癥者腹中堅硬按之應手然水體柔順而今反堅硬如地者亢則害承乃制也瘕者腹中雖硬而忽聚忽散無其常故其病未及癥也經曰血不流而滯故血內凝而為瘕也小腸移熱于大腸乃為虛瘕大腸移熱於小腸謂兩熱相搏則血移而為伏瘕血澁不利月事沈滯而不行故云為癥瘕為癥與伏同傳寫誤爾陳無擇云癥瘕屬肝部積聚屬肺部夫癥者堅也瘕者假也假物而成形然七癥八瘕之名經論亦不詳出雖

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷五

有蛟蛇鼈肉髮蟲米等七證初非定名偶因食物相感而致患爾若婦人癥瘕則由內外不內外因動傷五臟氣血而成古人謂為痼疾以蛟蛇等為生瘕然亦不必泥此並屬血病蛇髮等事皆出偶然但飲食間誤中之留聚假血而成自有活性亦猶永徽中僧病噎者腹中有一物其狀如魚即生瘕也潔古云養正積自除譬如滿座皆君子縱有一小人自無容地而出令其真氣實胃氣彊積自消矣潔古之言豈欺我哉內經曰大積大

聚衰其大半而止滿實中有積氣大毒之劑尚不可過況虛中有積者乎此乃治積之一端也邪正虛實宜詳審焉丹溪云凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積藥使之融化則根除矣又云氣不能作塊成聚塊乃有形之物也痰與食積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左為死血大法鹹以軟之堅以削之行氣開痰為主用海石三稜蓬朮已上俱用醋煮香附桃仁紅花五靈脂之類為丸石礮白朮湯送下

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷五

凡婦人腹中有塊多屬死血

丹溪方治一婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷

鳴嘈雜眩運身熱時作時止

黃連

一兩半以吳茱萸半兩同炒去

菜菔子

一兩半炒

台芎

梔子

三稜

莪朮

醋煮

麥麴

桃仁

去皮尖各五錢

香附

童便浸焙乾

山查

各一兩

右為末蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸薑湯下



撞氣阿魏圓治五種噎疾九般心痛瘕癖氣塊冷氣攻刺如意圓治積聚塊痛疝瘕癥癖等疾頂珠圓治積氣塊痛久年脾積癖瘕之疾蓬煎圓利大腑去積氣調氣散治氣滯不勻宿食不消紅圓子治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶酒積不食婦人脾血積氣諸般血瘕氣塊氣塊石燕飲治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又攻左脇楊氏麝香圓治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛最難治此藥主之

已上八方並見前諸氣門

欽定四庫全書

仁齋直指卷五

肥氣圓東垣方治肝之積在脇脇下如覆杯有頭足久不

愈令人發欬逆痞瘕連歲不已

厚樸錢五

黃連錢七

柴胡兩二

川烏頭一炮

去皮臍一分

巴豆霜分五

椒錢四

乾薑炮五分

皂角去皮弦煨一分

白茯苓半一錢

甘草炙三錢

廣木炮

人參

昆布各二錢五分

右件除茯苓皂角巴豆霜另末外為極細末和勻煉

蜜為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸漸加至大便微澹再從二加服周而復始積減大半勿服

伏梁圓治心之積起臍上大如臂上至心下久不愈令

人煩心

黃連半一兩

厚樸製

人參錢各五

黃芩錢三

桂錢一

乾薑

菖蒲

巴豆霜

紅豆

欽定四庫全書

仁齋直指卷五

川烏炮各五分

茯神

丹參炒各錢一

右件除巴豆霜外為細末另研豆霜旋旋入末煉蜜

為丸如桐子大服如上淡黃連湯下

痞氣圓治脾之積在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢

不收發黃疸飲食不為肌膚

厚樸半四錢

黃連錢八

吳茱萸錢三

黃芩錢二

澤瀉

人參錢各一

川烏頭炮

川椒炒各五分

茵陳酒



|                                                |                            |                           |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 乾薑<br><small>炮各一錢半</small>                     | 砂仁<br><small>半一錢</small>   | 白朮                        |
| 巴豆霜                                            | 桂<br><small>各四分</small>    |                           |
| 右件除豆霜另研茯苓另末旋入外同為細末煉蜜為丸如桐子大每服用淡甘草湯下服如上法         |                            |                           |
| 息賁丸治肺之積在右脇下覆大如杯久不已令人洒淅寒熱喘欬發肺壅                  |                            |                           |
| 厚樸<br><small>製八錢</small>                       | 黃連<br><small>炒一兩三錢</small> | 乾薑<br><small>炮</small>    |
| 白茯苓                                            | 川椒<br><small>炒</small>     | 紫苑<br><small>各一錢半</small> |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷五                           |                            |                           |
| 桂                                              | 川烏頭<br><small>炮</small>    | 桔梗                        |
| 白豆蔻                                            | 陳皮                         | 京三稜<br><small>各一錢</small> |
| 天門冬                                            | 人參<br><small>各一錢</small>   | 青皮<br><small>五分</small>   |
| 巴豆霜<br><small>四分</small>                       |                            |                           |
| 右件除茯苓巴豆霜旋入外為末煉蜜為丸如桐子大以淡薑湯下服如上法已上四方秋冬加厚樸減黃連四分之一 |                            |                           |
| 奔豚丸治腎之積發于小腹上至心下若豚狀或下或                          |                            |                           |

|                                                              |                            |                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 上無時久不已令人喘逆骨痠少氣及治男子內結七疝女人瘕聚滯下                                 |                            |                           |
| 厚樸<br><small>製七錢</small>                                     | 黃連<br><small>五錢</small>    | 白茯苓                       |
| 澤瀉                                                           | 菖蒲<br><small>各二錢</small>   | 川烏頭<br><small>五分</small>  |
| 丁香<br><small>五分</small>                                      | 苦楝<br><small>酒煮三錢</small>  | 玄胡索<br><small>半一錢</small> |
| 全蝎                                                           | 附子                         | 獨活<br><small>各一錢</small>  |
| 桂<br><small>二分</small>                                       | 巴豆霜<br><small>四分</small>   |                           |
| 右除巴豆霜茯苓另為末旋入外為細末煉蜜為丸如桐子大淡鹽湯下服如上法                             |                            |                           |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷五                                         |                            |                           |
| 散聚湯<br><small>三因方</small> 治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺腰脇小腹膜脹大小便不利 |                            |                           |
| 半夏                                                           | 檳榔                         | 當歸<br><small>各三分</small>  |
| 陳皮                                                           | 杏仁<br><small>去皮尖炒</small>  | 桂<br><small>各二分</small>   |
| 茯苓                                                           | 甘草<br><small>炙</small>     | 附子<br><small>炮</small>    |
| 川芎                                                           | 枳殼<br><small>炒</small>     | 厚樸<br><small>製</small>    |
| 吳茱萸<br><small>湯洗各一兩</small>                                  | 大黃<br><small>大便利去之</small> |                           |



|                       |  |                      |  |
|-----------------------|--|----------------------|--|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷五  |  | 右咬咀每服四錢水煎            |  |
| 濟生大七氣湯治積聚狀如癥瘕隨氣上行發作者時 |  | 心腹疔痛上氣室塞小腹脹滿         |  |
| 益智                    |  | 陳皮                   |  |
| 蓬朮                    |  | 香附子<br>兩各一<br>半      |  |
| 肉桂                    |  | 藿香葉                  |  |
| 青皮<br>分各三             |  | 甘草<br>炙              |  |
| 右咬咀每服五錢水煎             |  | 京三稜                  |  |
| 阿魏方<br>丹溪<br>治肉積      |  | 桔梗                   |  |
| 連翹<br>兩半              |  | 糖毬子<br>兩一            |  |
| 阿魏<br>煮一兩<br>作糊醋      |  | 黃連<br>半六錢            |  |
| 右為末用阿魏糊為丸如桐子大每二三十九白湯  |  | 送下                   |  |
| 秘傳賽寶丹追蟲取積神効           |  | 黑丑<br>十兩取頭末<br>四兩分二處 |  |
| 錫灰<br>一兩醋炒末           |  | 木香<br>末米             |  |
| 檳榔<br>兩取淨末二處          |  | 雷丸<br>兩取淨末二處         |  |

|                      |  |                      |  |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷五 |  | 陳皮<br>取末<br>半兩       |  |
| 莪朮<br>醋炒各<br>一兩      |  | 青皮<br>取末<br>半兩       |  |
| 右件各為細末再用使君子二兩鶴虱阜角各一兩 |  | 三稜<br>醋炒             |  |
| 三味用水二碗煎至一盞用粟米一合布包在藥內 |  | 煮將熟起手用黑丑末二兩法起次用檳榔末一兩 |  |
| 再用雷圓末一兩盡再用木香錫灰三稜莪朮陳皮 |  | 青皮等末盡後再一用雷圓二用檳榔三用丑末蓋 |  |
| 在外陰乾每服三錢四更時候用冷茶吞下復睡至 |  | 天明不可洗手洗面吃湯物代取下或蟲或積惡毒 |  |
| 滯氣並原藥下盡方可用冷水洗面其藥未下寧耐 |  | 片時見其藥下再用藥食補之         |  |
| 木香檳榔圓<br>方瑞竹         |  | 治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹大       |  |
| 小便結滯不快<br>方見         |  | 丹溪治茶癖方               |  |
| 石膏                   |  | 黃芩                   |  |
| 右為末沙糖水調下             |  | 升麻<br>各等分            |  |



琥珀膏專貼積塊

大黃

朴硝  
各兩

右為末用大蒜搗膏和勻貼之

保和圓治一切食積

方見傷  
食門

謹按丹溪曰氣不能成塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左為血塊誠然言也何以明之曰左關肝膽之位肝膽藏血液右關脾胃之位脾胃藏飲食所以左邊有積則

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷五

為血塊右邊有食則為食積而其中間則為水穀出入之道路五志之火薰蒸水穀而為痰飲所以中間有積則為痰飲也其理昭矣治法調其氣而破其血消其食而豁其痰是已如木香檳榔去氣積三稜莪朮去血積麥芋神麴去酒積香附子枳實去食積牽牛甘遂去水積山查阿魏去肉積海粉礞石去痰積雄黃白礬去涎積乾薑巴豆去寒積黃連大黃去熱積各從其類也若用羣隊之藥分其藥勢則難取効



迪志文化出版有限公司出版

雖要認得分明是何積聚兼見何證然後增減斟量使之不爾反有所損要在臨時通變也

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷五

仁齋直指卷五



迪志文化出版有限公司出版



欽定四庫全書

子部

仁齋直指卷六

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣郭洽怡

欽定四庫全書

仁齋直指卷六

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

心氣

心疼方論

紫之奪朱相去一間耳而毫釐疑似實霄壤焉夫心爲五官之主百骸之所以聽命者也心之正經果爲風冷邪氣所干果爲氣血痰水所犯則其痛掣背脹脇胸煩

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷六

咽乾兩目赤黃手足俱青至節朝發而暮殂矣然心之包絡與胃口相應往往脾痛連心或陽虛陰厥亦令心下急痛或他臟之邪亦有客乘於心者是則心之別脉受焉如所謂九種心痛一虫二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九去來者皆是也真心果痛不知能愈否乎然則治劑之法將何如曰熱者涼之寒者溫之感受風邪者散之順氣調血逐水豁痰此其要略耳蘇沈內翰有方目曰沉麝圓凡心脾疼痛隨試輒効他如玄胡索



五靈脂官桂當歸乳香沒藥沉香木香等輩皆的對藥也臨機應變學者亦當察其微

心疼證治

沉麝圓治心脾氣血諸痛

方見血類

和劑七氣湯治七氣相干心下疼痛

方見氣類

沉香降氣湯治陰陽不和心腹刺痛

方見氣類

佐

大沉香圓治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六

沉香

乾薑

炮

薑黃

辣桂

檀香

各四兩

白豆蔻仁

二兩

白芷

甘草

燬

甘松

洗焙

天台烏藥

各半斤

香附

淨燬一斤

右末煉蜜圓如大彈子每一圓食前薑湯嚼下或薑

三片略煎服

蘇合香圓治卒心痛

方見嗽門

用生薑橘皮湯調下

桂枝四七湯治風冷寒邪客搏心腹作痛



迪志文化出版有限公司出版

桂枝

白芍藥

半夏

製各一兩

白茯苓

厚朴

製

枳殼

製

甘草

炙各半兩

人參

紫蘇

各一分

右剉每服四錢薑七片棗二枚食前煎服

勝金散治心下痛

桂枝

延胡索

炒

五靈脂

當歸

等分

右為末每服三錢水一盞酒三分同煎食前服

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六

靈脂酒治心腹卒痛

川五靈脂

去砂石略炒

右為末每二錢溫酒調下加延胡索沒藥尤妙

生地黃膏治熱氣乘心作痛

石菖蒲

一兩半

北前胡

赤茯苓

各三分

右為末蜜一盞生地黃汁一盞夾研為膏每服彈子

大紫蘇煎湯食後調下

靈砂丹治冷氣乘心作痛



迪志文化出版有限公司出版

|                                              |                                                                               |                                     |          |                         |               |                |                      |                                                                  |             |          |           |                                               |                      |      |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|------|-----------|
| 好靈砂 <small>分三</small> 川五靈脂 <small>分二</small> | 右研極細稀糕糊圓麻子大每服二十圓食前石菖蒲生薑煎湯下或用五丹圓 <small>方見血類</small> 或用養正丹 <small>方見痢冷</small> | <small>門</small> 須審其脉證虛冷乃可用脾家冷痛亦可擇用 | 薑桂飲治心腹刺痛 | 良薑 辣桂 <small>分等</small> | 右為末每服二錢米湯乘熱調下 | 生薑枳殼湯治中脘氣滯心下引痛 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷六 | 辣桂 <small>一兩</small> 生薑母 <small>一兩</small> 枳殼 <small>製三分</small> | 右麓末每服三錢新水煎服 | 拈痛圓治九種心痛 | 五靈脂 木香 當歸 | 蓬莪朮 <small>煨各半兩</small> 生乾薑 <small>三分</small> | 右為末煉蜜圓桐子大每二十圓食前橘皮煎湯下 | 心腹痛方 | 草果 延胡索 靈脂 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|------|-----------|

|    |              |     |                                        |                                                   |                                                  |                                                                     |                      |                                                                    |                                                                        |         |           |                            |  |  |
|----|--------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|--|--|
| 沒藥 | 右末酒調一二錢腹痛手拈却 | 附諸方 | 家秘祛痛散治諸般心氣疼痛氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇小腸疝及婦人血氣刺痛立有神効 | 青皮 <small>穰去</small> 五靈脂 <small>研飛去砂淨</small> 川練子 | 川山甲 <small>錢各二</small> 良薑 <small>香油炒</small> 玄胡索 | 沒藥 <small>各一錢五分</small> 沉香 <small>一錢</small> 八角茴香 <small>二錢</small> | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷六 | 檳榔 <small>一錢五分</small> 木香 <small>一錢二分</small> 砂仁 <small>少許</small> | 右件咬咀為粗末用木鱉子去橈一錢二分剉片同前藥炒令焦香去木鱉子不用共為細末每服一錢加鹽一星用酒或滾水送下此方累用無不應驗故附於後與好生君子共之 | 落蓋湯治急心痛 | 陳皮 香附子 良薑 | 吳茱萸 石菖蒲 <small>各等分</small> |  |  |
|----|--------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|--|--|



右末水煎先用碗一箇用香油三五點在內小盞蓋之將藥淋下熱服

玄桂丸 丹溪方 治死血留胃脘當心作痛

玄胡索 一兩半 滑石 紅花

官桂 紅麴 各五錢 桃仁 三十箇

右為細末湯浸蒸餅為丸菴豆大每服四十九薑湯下

螺螄殼丸 丹溪方 治痰飲積胃脘當心而痛

欽定四庫全書 仁齋直指卷六

螺螄殼 墻頭年久者佳 滑石 炒 蒼朮

山梔 香附 南星 各二兩

枳殼 去穰炒 青皮 木香

半夏 砂仁 各半兩

右為末生薑汁浸蒸餅為丸如菴豆大每服三四十

丸薑湯下春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各半兩

安痛散治心胃急痛

五靈脂 去砂石 玄胡索 炒去皮 蒼朮

良薑 炒 當歸 洗各等分

右為細末每服二錢不拘時熱酒醋湯調下

脾胃 附腹痛脇痛內傷傷食調理

脾疼方論

血氣痰水皆能作痛而食積傷脾風冷入脾與夫脾間蟲動其為痛也居多血氣痰水食積風冷諸證之痛每停聚而不散惟蟲動則乍作乍止來去無定又有嘔

欽定四庫全書 仁齋直指卷六

吐清沫之為可驗焉俗謂脾家疼痛出於胃虛大率用養脾之劑而不知受病各有自來苟不能推究其原則和養等劑掩護邪氣非徒無益而又害之况夫風冷入脾尤念慮之所不到至有荏苒歲月而不可揣度者有一田夫醉飽之餘露星取快一枕天明自此脾疼攻刺百藥罔功淹淹數載後遇至人授以和氣抽刀散溫酒調下數服頓愈則知風露之根入胃良薑菖蒲為能散其邪巴貓借氣為能伐其根觀此可以通一畢萬矣然



而痛不復作養脾之劑獨不可繼是調理之乎療病如濯衣必去其垢污而後可以加漿飾醫言意也請借是以為喻

脾疼證治

良薑拈痛散治脾疼妙甚

良薑 切作大片先用吳茱萸慢火炒少頃次入東畔當日壁土須無雨處者同炒次以米醋酒同炒至茱萸黑

右只用良薑為末每服一錢重溫米飲調空心服

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷六

和劑抽刀散治脾胃積冷中滿疼痛

川白薑 五兩剉入巴豆肉一錢一字同炒至巴豆黑去巴豆 石菖蒲 五錢半不炒

右為末每服二錢空心溫酒調下

調痛散治脾疼氣隔

木香 丁香 檀香

大香附 天台烏藥 蓬朮 煨

辣桂 片薑黃 生白薑

白豆蔻仁 縮砂仁 甘草 炙各等分

右剉每服二錢半紫蘇四葉煎服

桂花散治脾積氣痛

香附 五兩炒赤去毛 蓬朮 醋炙焙乾 良薑

甘草 炙各三兩 桂花 一兩

右末每二錢鹽一點沸湯熱調食前服

穢跡脾疼方

香附 淨 良薑 等分

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷六

右為末每服二錢空心陳米湯熱調服

沉麝圓靈脂酒治氣血攻刺脾疼 方見心類

和劑七氣湯治痰水攻脾作痛 方見氣門 夾和劑流氣飲煎

亦得 方見滿門

蘇合香圓 方見嗽門 夾感應圓 方見滿門 等分用沉香降氣湯

下 方見氣門 治食積脾痛

獨桂湯治風冷入脾逆氣上攻作痛

辣桂 去麤皮





右細剉每二錢食前煎服或為末紫蘇煎湯乘熱調下腹痛通用

薑桂飲治風冷入脾作痛方見心類薑桂散治心腹痛方見心類

氣類

檳榔散治虫動脾痛乍去乍來嘔吐清沫

雞心大檳榔 貫衆各二分 石菖蒲

木香各一分 甘草炙一錢

右剉每三錢水煎空心吞靈砂十圓或金液丹蓋靈

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

砂金液有流黃水銀能殺虫也

金液丹壯陽道健胃氣除冷癖殺諸虫

好硫黃十兩飛煉去砂石研細末入磁合水調赤石脂封口鹽泥固濟日乾於地內埋小罐

子盛蒲水安磁合在上再用泥固濟慢火養七日七夜續加頂火一通候冷取出研末

右藥一兩用蒸餅一兩湯浸握去水為圓桐子大每

三十圓空心米飲下

二物湯治脾痛

雞心大檳榔 良薑等分

右細剉每服三錢陳米百粒煎服

乾薑甘草湯治脾中冷痛嘔吐不食

川白薑微炒一兩 甘草炙二錢

右剉散每服二錢大棗一枚同煎食前溫服

脾痛方治脾痛脹滿

大草果二個去殼

右剉用酒煎痛時服酒能飲一盞以兩盞煎一盞能

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

飲兩盞以三盞煎兩盞欲其中節也

脾痛氣痛方

良薑 陳皮各半兩 丁香

石菖蒲 甘草炙各一分

右剉散每服三錢水大盞煎八分入雞舌香散二錢

再煎少頃濾清汁服

和胃證治

治中湯方見嘔吐門 加肉豆蔻縮砂溫脾止痛



|                        |                       |                        |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 沉香磨脾散治脾胃虛寒腹中脹滿         |                       |                        |
| 人參                     | 沉香 <small>各一分</small> | 丁香                     |
| 檀香                     | 木香                    | 白豆蔻                    |
| 縮砂仁                    | 半夏麴                   | 辣桂                     |
| 烏藥 <small>各半兩</small>  | 藿香葉 <small>三分</small> | 甘草 <small>炙三錢半</small> |
| 右剉散每二錢薑五片棗二枚煎服         |                       |                        |
| 安胃散開胃和中止嘔進食            |                       |                        |
| 人參                     | 白朮                    | 木香                     |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷六   |                       |                        |
| 檳榔                     | 丁香                    | 半夏麴                    |
| 肉豆蔻 <small>濕紙煨</small> | 橘紅                    | 藿香                     |
| 白伏苓                    | 青皮                    | 甘草 <small>炙等分</small>  |
| 右剉散每三錢薑四片煎服            |                       |                        |
| 人參開胃湯助胃進食              |                       |                        |
| 人參                     | 橘紅                    | 丁香                     |
| 木香                     | 藿香                    | 神麴 <small>炒</small>    |
| 麥蘖 <small>炒</small>    | 白朮                    | 伏苓                     |

|                                                 |         |     |        |      |
|-------------------------------------------------|---------|-----|--------|------|
| 縮砂仁                                             | 蓮子肉     | 厚朴  | 製      |      |
| 半夏麴                                             | 甘草      | 炙分等 |        |      |
| 右剉散每三錢薑四片煎服                                     |         |     |        |      |
| 助胃膏治嘔吐不食                                        |         |     |        |      |
| 人參                                              | 白朮      | 白茯苓 |        |      |
| 橘紅                                              | 縮砂仁     | 各一分 | 木香     |      |
| 丁香                                              | 肉豆蔻     | 微煨  | 草果仁    | 各一兩半 |
| 白豆蔻仁                                            | 錢一      |     |        |      |
| <div>欽定四庫全書</div> <div>仁齋直指</div> <div>卷六</div> |         |     |        |      |
| 右末煉蜜圓彈子大每一圓薑三片煎湯下                               |         |     |        |      |
| 官方七香圓消食快膈和胃止痛                                   |         |     |        |      |
| 木香                                              | 丁香      | 檀香  |        |      |
| 甘松                                              | 淨       | 丁皮  | 橘紅     |      |
| 縮砂仁                                             | 白豆蔻仁    | 三稜  | 醋炙     |      |
| 蓬朮                                              | 醋炙焙乾各半兩 | 大香附 | 炒去毛二兩半 |      |
| 右為末研米糊圓菜豆大每三四十圓薑湯下                              |         |     |        |      |
| 丁香半夏圓治脾胃宿冷嘔吐痰水噫悶吞酸                              |         |     |        |      |



|                       |                   |                 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 人參                    | 丁香                | 木香              |
| 肉豆蔻                   | 陳橘紅               | 藿香葉             |
|                       | 分各一               | 兩半              |
| 半夏                    | 湯洗七次用薑汁<br>淹炒黃用三兩 |                 |
| 右細末薑汁煮麪糊圓小豆大每二十圓薑湯下   |                   |                 |
| 千金五套圓治胃虛膈滿宿滯不消停痰留飲頭眩臂 |                   |                 |
| 疼辟霧露風冷嵐瘴之氣            |                   |                 |
| 南星                    | 每箇切<br>十餘塊        | 半夏              |
| 調水再浸<br>三日洗焙          | 逐日換水次用白礬二兩研       |                 |
| 良薑                    |                   | 乾薑              |
|                       |                   | 炮               |
| 欽定四庫全書                | 仁齋直指<br>卷六        |                 |
| 白朮                    | 伏苓                | 丁香              |
|                       | 兩各一               |                 |
| 木香                    | 青皮                | 橘紅              |
|                       |                   | 兩各半             |
| 右末用神麪一兩大麥蘖二兩同末為糊圓桐子大  |                   |                 |
| 每五七十圓米湯下              |                   |                 |
| 附諸方                   |                   |                 |
| 燒脾散                   | 濟生方               | 治飲啖生冷菓菜停留中焦心脾冷痛 |
| 乾薑                    | 炮                 | 厚朴              |
|                       |                   | 薑汁炒             |
| 草果                    |                   |                 |
| 縮砂仁                   | 甘草                | 炙               |
|                       |                   | 神麪              |
|                       |                   | 炒               |

|                       |            |                  |
|-----------------------|------------|------------------|
| 麥蘖                    | 陳皮         | 高良薑              |
|                       |            | 炒各等分             |
| 右為末每服三錢熱鹽湯點服不拘時       |            |                  |
| 草豆蔻丸治客寒犯胃痛者宜此丸        |            | 方見內傷門            |
| 二薑圓治心脾冷痛              |            | 方見諸氣門            |
| 家秘祛痛散治諸般心氣疼痛氣滯不行攻刺心腹痛 |            |                  |
| 連胸脇小腸吊疝及婦人血氣刺痛立有神効    |            | 方見心痛             |
| 門                     |            |                  |
| 感應圓治積冷傷胃腹脇脹痛          |            | 方見諸氣門            |
| 欽定四庫全書                | 仁齋直指<br>卷六 |                  |
| 溫胃湯                   | 拔粹方        | 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛    |
| 益智                    | 砂仁         | 甘草               |
| 錢五                    |            | 兩各二              |
| 薑黃                    | 白豆蔻        | 陳皮               |
| 分三                    | 分三         | 分一               |
| 澤瀉                    | 乾薑         | 黃耆               |
|                       | 分各三        | 分七               |
| 厚朴                    | 人參         |                  |
| 分二                    | 分二         |                  |
| 右咬咀每服八錢水二盞煎至八分食前服     |            |                  |
| 蟠葱散                   | 和劑方        | 治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心 |
| 腹痛連胸脇膀胱小腸疝氣及婦人血氣刺痛    |            |                  |



|                                                   |                                                                                   |                                                 |                                                                   |                              |                         |                                                                 |                             |                                                                    |                                                                                        |                             |                          |                    |                      |                             |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>延胡索</p> <p>肉桂</p> <p>乾薑<small>炮各二兩</small></p> | <p>甘草<small>炙</small></p> <p>縮砂<small>皮去</small></p> <p>蒼朮<small>製各半兩</small></p> | <p>丁皮</p> <p>檳榔<small>各四兩</small></p> <p>蓬朮</p> | <p>三稜<small>煨</small></p> <p>茯苓</p> <p>青皮<small>去白各六兩</small></p> | <p>右為末每服二錢水一盞葱白一莖煎七分空心熱服</p> | <p>烏梅丸治胃冷蚘虫攻心痛嘔吐四肢冷</p> | <p>烏梅<small>三百箇</small></p> <p>黃柏<small>炙</small></p> <p>細辛</p> | <p>欽定四庫全書</p> <p>仁齋直指卷六</p> | <p>肉桂</p> <p>附子<small>炮各六兩</small></p> <p>黃連<small>十六兩</small></p> | <p>人參<small>六兩</small></p> <p>蜀椒<small>炒去閉口者及目</small></p> <p>當歸<small>各四兩</small></p> | <p>乾薑<small>炮十兩</small></p> | <p>右為末取烏梅肉和蜜丸梧子大每服五十</p> | <p>秘傳檳榔散治男婦心脾痛</p> | <p>五靈脂</p> <p>檳榔</p> | <p>右為末煎菖蒲湯調三錢服隔夜先將猪肉鹽醬煮</p> | <p>熱令患人細嚼休吞了吐出却服前藥空心食前服</p> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|

|                            |                                                                     |                                                                    |                                                                                                               |                             |                                       |             |                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>謹按用肉味所以引虫頭向上用藥所以殺虫也</p> | <p>螺螄殼丸<small>方丹溪</small></p> <p>治痰飲積胃脘當心而痛<small>方見心氣門</small></p> | <p>玄桂丸<small>方丹溪</small></p> <p>治死血留胃脘當心作痛<small>方見心氣門</small></p> | <p>謹按痛則不通通則不痛夫胃脘心脾痛者或因身受寒邪口食冷物内有鬱熱素有頑痰死血或因惱怒氣滯虫動作痛種種不同若不分而治之何能愈乎予曰是寒則溫之是熱則清之是痰則化之是血則散之是氣則順之是虫則殺之庶乎臨證不眩惑也夫</p> | <p>欽定四庫全書</p> <p>仁齋直指卷六</p> | <p>附腹痛<small>脇痛</small></p> <p>新增</p> | <p>腹痛方論</p> | <p>內經曰寒氣入經而稽遲澀而不行客於脉外則血少客於脉中則氣不通故卒然而痛按內經舉痛論言寒邪外客而痛者甚為詳悉未能盡述學者自宜檢閱外有因虛因實因傷寒因痰火因食積因死血者種種不同原病式曰熱鬱於內而腹滿堅結痛者不可言為寒</p> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



也東垣曰腹中諸痛皆因勞役過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而入客之故卒然而作大痛經言得炁則止炁者熱也以熱治寒治之正也此事難知集論曰傷寒中脘痛太陰也理中湯黃芪建中湯之類臍腹痛者少陰也四物湯真武湯附子湯之類小腹痛厥陰也重則正陽散回陽丹輕則當歸四逆湯之類若夫雜病腹痛四物苦練湯酒煮當歸丸之類夏月腹痛肌熱惡熱脉洪數屬手太陰足陽明黃芩芍藥湯主之秋月腹痛肌寒惡寒脉沉疾屬足太陰足少陰桂枝芍藥湯主之四時腹痛芍藥甘草湯主之丹溪曰腹痛有積熱有食積有痰有死血脉弦者多屬食積宜溫散之如乾薑炒蒼朮川芎白芷香附薑汁之類是也不可用峻利藥攻下之蓋食得寒則凝熱則化更兼行氣快氣藥助之無不可者脉滑者是痰痰因氣滯宜導痰解鬱二陳湯加台芎蒼朮香附之類是也臍下忽大痛人中黑色者多死腹中水鳴乃火擊動其水也凡腹痛以手不可按者

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

屬實宜大黃芒硝下之實痛不可用參芪白朮蓋補其氣氣旺不通而痛愈甚也

草豆蔻方東垣方治臍腹虛脹疼痛

澤瀉錢一木香分三神麴分四

半夏勿春夏用枳實黃色炒草荳仁半錢各

黃芪勿春夏用益智仁分六甘草半錢各

青皮分六陳皮分七川歸分七

茯苓分七

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷六

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫服

小建中湯治傷寒陽脉濇陰脉弦腹中急痛者方見虛勞門

真武湯治腹痛下利四肢沉重方見咳嗽門理中湯治霍亂

頭疼身寒腹痛四逆湯治傷寒下利腹痛四肢逆冷

附子湯方並見中寒類四物苦練湯治臍下虛冷腹痛方見痢門

芍藥甘草湯治四時腹痛

芍藥甘草炙





|                       |  |                                              |  |            |  |                                             |  |                      |  |                                                                                                                                                             |  |                         |  |                  |  |                                       |  |
|-----------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|---------------------------------------|--|
| 右等分每服五錢生薑三片水一盞半煎至一盞溫服 |  | 元戎云腹痛脉弦傷氣用本藥○脉洪傷金加黃芩○脉緩傷水加桂枝○脉瀉傷血加當歸○脉遲傷寒加乾薑 |  | 酒煮當歸圓治小腹下痛 |  | 茴香 <small>錢五</small> 良薑 <small>附子各七</small> |  | 當歸 <small>兩一</small> |  | 右四味細切以無灰酒一碗半煮乾再焙乾入後藥炙甘草 <small>苦練用生</small> 丁香 <small>錢各五</small> 木香 <small>升麻各一</small> 柴胡 <small>錢二</small> 炒黃鹽 <small>全蝎各三</small> 玄胡索 <small>錢四</small> |  | 右為細末酒煮糊為丸如梧子大每服二三丸空心白湯下 |  | 桃仁承氣治因跌撲損傷瘀血作腹痛者 |  | 內加當歸蘇木紅花入酒童便煎服下之 <small>方見血氣門</small> |  |
|-----------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|---------------------------------------|--|

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六



迪志文化出版有限公司出版

|                                                           |  |                                     |  |                                |  |                      |  |      |  |                                            |  |                                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|------|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 二陳湯養胃湯 <small>俱見瘧門</small> 黃芩芍藥湯治腹痛脉洪 <small>方見痢門</small> |  | 備急大黃圓治心腹諸卒疼痛百病 <small>方見內傷門</small> |  | 絞腸沙作痛以樟木煎湯大吐或白礬調湯吐之鹽亦可探吐宜刺委中出血 |  | 脇痛 <small>新增</small> |  | 脇痛方論 |  | 內經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目眈眈無所見耳無所聞善恐如人將捕之又曰怒則氣逆 |  | 虛則嘔血及 <small>關</small> 泄故氣上矣蓋心出血肝納血因大怒而血不歸經或隨氣而上出於口鼻或留於本經而為脇痛又或歲木太過而木氣自甚或歲經有餘而木氣被鬱皆能令人脇痛經曰病脇下滿氣逆二三歲不已 |  | 病名曰息積是亦肝木有餘之証也外有傷寒發寒熱而脇痛者足少陽膽足厥陰肝二經病也治以小柴胡湯無有不効者丹溪曰脇痛者肝火盛木氣實有死血有痰流注肝急木氣實用蒼朮川芎青皮當歸之類痛 |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|------|--|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六



迪志文化出版有限公司出版

甚者肝火盛以當歸龍會丸薑汁下是瀉火之要藥死  
血用桃仁紅花川芎痰流注以二陳湯加南星蒼朮川  
芎肝苦急急食辛以散之用撫芎川芎蒼朮血病入血  
藥中行血故也去滯氣須用青皮青皮乃肝膽兩經之  
藥也

左金丸瀉肝火行溫為熱甚之反佐

黃連 錢六 吳茱萸 錢一

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三伍十丸

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

淡薑湯下

當歸龍會丸治內有濕熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處  
却以生薑汁吞此丸痛甚者須炒令熱服

草龍膽 當歸 大梔子

黃連 黃芩 各兩 大黃

蘆會 兩半 木香 錢一 黃柏 兩一

麝香 錢半

右十味為末麵糊丸一方加柴胡川芎各半兩又方

加青黛半兩蜜丸治脇痛麵丸降肝火  
推氣散治右脇疼痛脹滿不食

枳殼 桂心 片子薑黃 各半兩 一本作

蠶 種 甘草 錢一 半

右為末每服二錢薑棗湯調下酒亦可

枳芎散治左脇痛刺不可忍者

枳實 炒 川芎 兩各半 粉草 錢一 半

右為末每服二錢薑棗湯下酒亦可

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

鹽煎散 方和劑 治男婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不能

已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣

砂仁 甘草 炙 茯苓

草果仁 去皮 肉豆蔻 川芎 洗

茴香 炒 華澄茄 大麥芽

檳榔 良薑 枳殼

蒼朮 陳皮 去白 羌活

厚朴



右咬咀每服三錢水一盞入鹽少許煎七分去粗空心溫服

小柴胡湯

見痰瘧門

二陳湯

見痰瘧門

琥珀膏

見積聚門

謹按丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每度之凡左脇痛甚者即是肝盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治之凡右脇痛即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸等藥辛溫之劑以治是也又嘗論曰左脇痛胃脘痛婦人多有之以憂思忿怒之氣素蓄於中發則上衝被濕痰死血阻滯其氣不得條達故治婦人諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶此之謂也

附內傷

新增

傷食調理脾胃

辨脈法

古人以脉上辯內外傷於人迎氣口人迎脉大於氣口為外傷氣口脉大於人迎為內傷此辯固是但其說有

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六

所未盡耳外感風寒皆有餘之證是從前客邪來也其病必見於左手左手主表乃行陽二十五度內傷飲食及飲食不節勞役所傷皆不足之病也必見於右手右手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎脉浮緊按之洪大緊者後甚於弦是足太陽寒水之脉按之洪大而有力量中見手少陰心火之脉丁與壬合內顯洪大乃傷寒脉也若外感風邪則人迎脉緩而大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口脉大於人迎一倍傷之重者過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脉若飲食不節勞役過甚則心肺變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火之勢亦來薄肺經云侮所不勝寡於畏者是也故氣口脉急大而澀數時一代而澀也澀者肺之本脉大者元氣不相接脾胃不及之脉洪大而數者心脉刑肺也急者肝木挾心火而反尅肺金也若不甚勞役惟右關脾脉大而數謂獨大於五脉數中顯緩時一代也如飲食不節寒溫失所則先



右關胃脉損弱甚則隱而不見惟內顯脾脉之大數微緩時一代之宿食不消則獨右關脉沉而滑經云脉滑者有宿食也以此辯之豈不明白易見乎但恐山野間卒無醫者何以診候故復說病證以辯之

辯陰證陽論

甚哉陰陽之證不可不詳也偏觀內經中所說變化百病其源皆由喜怒過度飲食失節寒溫不適勞役所傷而然夫元氣穀氣榮氣清氣衛氣生發諸陽上升之氣

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

此六者皆飲食入胃穀氣上行胃氣之異名其實一也既脾胃有傷則中氣不足中氣不足則六腑陽氣皆絕於外故經言五臟之氣已絕於外者是六腑之元氣病也氣傷臟乃病臟病則形乃應是五臟六腑真氣皆不足也惟陰火獨旺上乘陽分故榮衛失守諸病生焉其中變化皆由中氣不足乃能生發耳後有脾胃以受勞役之疾飲食又復失節耽病日久事息心安飽食太甚病乃大作槩其外傷風寒六淫客邪皆有餘之病當瀉

不當補飲食失節中氣不足之病當補不當瀉舉世醫者皆以飲食失節勞役所傷中氣不足當補之證認作外感風寒有餘客邪之病重瀉其表使榮衛之氣外絕其死只在旬日之間所謂差之毫釐謬以千里可不詳辯乎按陰陽應象論云天之邪氣感則害人五臟是八益之邪乃風邪傷人筋骨風從上受之風傷筋寒傷骨蓋有形質之物受病也繫在下焦肝腎是也肝腎者地之氣難經解云肝腎之氣已絕於內以其肝主筋腎主

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

骨故風邪感則筋骨疼痛筋骨之絕則腎肝之本亦絕矣乃有餘之證也及云水穀之寒熱感則害人六腑是七損之病乃內傷飲食也黃帝鍼經解云適飲食不節勞役所傷溫從下受之謂脾胃之氣不足而反下行極則衝脉之火逆而上是無形質之元氣受病也繫在上焦心肺是也心肺者天之氣故難經解云心肺之氣已絕於外以其心主榮肺主衛榮者血也脉者血之腑神之所居也衛者元氣七神之別名衛護周身在於皮毛





之間也肺絕故皮毛先絕神無所依故內傷飲食則亦惡風寒是榮衛失守皮膚間無陽以滋養不能任風寒也皮毛之絕則心肺之本亦絕矣蓋胃氣不升元氣不生無以滋養心肺乃不足之證也計受病之人飲食失節勞役所傷因而飽食內傷者甚多外傷者間而有之世俗不知往往將元氣不足之證便作外傷風寒表實之證而反傷心肺是重絕其表也安得不死乎古人所謂實實虛虛醫殺之耳若曰不然請以衆人之耳聞目見者證之向者壬辰改元京師戒嚴迨三月下旬受敵者凡半月解圍之後都受病不受病者萬無一二既病而死者繼踵而不絕都門十有二所每日各門所送多者二千少者不下一千似此者幾三月此百萬人豈俱感風寒外傷者耶大抵人在圍城中飲食不節乃勞役所傷不待言而知由其朝饑暮飽起居不時寒溫失所動經三兩月胃氣虧乏久矣一旦飽食太過感而傷人而又調治失宜其死也無疑矣非惟大梁為然遠在真

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

辨寒熱

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

祐興定間如東平如太原如鳳翔解圍之後病傷而死無不然者余在大梁凡所親見有表發者有以巴豆推之者有以承氣湯下之者俄而變結胸發黃又以陷胃湯丸及茵陳湯下之無不死者蓋初非傷寒以調治差悞變而似真傷寒之證皆藥之罪也往者不可追來者猶可及輒以平生已成之効著內外傷辨論一篇推前哲之餘論歷舉近世之變故庶幾同志者審其或中觸類而長之免後人之橫夭耳僭易之罪將何所逃乎

外傷寒邪之證與飲食失節勞役形質之病及內傷飲食俱有寒熱舉世盡將內傷飲食失節勞役不足之病作外傷寒邪表實有餘之證反瀉其表枉死者豈勝言哉皆由不別其寒熱耳今細為分解之外傷寒邪發熱惡寒寒熱併作其熱也翕翕發熱又為之拂拂發熱發於皮毛之上如羽毛之拂明其熱在表也是寒邪犯高之高者也皮膚毛腠者陽之分也是衛之元氣所滋養





之分也以寒邪乘之鬱遏陽分陽不得伸故發熱也其面赤鼻氣壅塞不通心中煩悶稍以袒裸露其皮膚已不能禁其寒矣其表上虛熱止此而已其惡寒也雖重衣下幕逼近烈火終不能禦其寒一時一日增加愈甚必待傳入裏作下證乃罷其寒熱齊作無有間斷也其內傷飲食不節或勞役所傷亦有頭痛項強腰痛與太陽表證微有相似餘皆不同論中辯之矣內傷不足之病表上無陽不能禁風寒也此則常常有之其燥熱發於腎間者間而有之與外中寒邪略不相似其惡風寒也蓋脾胃不足榮氣下流而乘腎肝此痰厥氣逆之漸也若胃氣平常飲食入胃其榮氣上行以舒於心肺以滋養上焦之皮膚腠理之元氣也既下流其心肺無所稟受皮膚間無陽失其榮衛之外護故陽分皮毛之間虛弱但見風見寒或居陰寒處無日陽處便惡之也此常常有之無間斷者也但避風寒及溫煖法或添衣蓋溫養其皮膚所惡風寒便不見矣是熱也非表傷寒邪

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六



迪志文化出版有限公司出版

皮毛間發熱也乃腎間受脾胃下流之濕氣間塞其下攻陰火上衝作蒸蒸而燥熱上徹頭頂傍徹皮毛渾身燥熱作須待袒衣露居近寒涼處即已或熱極而汗出而亦解彼外傷惡寒發熱豈有汗出者乎若得汗則病愈矣以此辯之豈不如黑白之易見乎當內虛而傷之者燥熱也或因口吸風寒之氣鬱其陰火使咽膈不通其吸入之氣欲入為膈上衝脉之火所拒使陰氣不得入其胸中之氣為外風寒所遏而不得伸令人口開目瞪極則聲發於外氣不得上下塞於咽中而氣欲絕又或因噦因嘔因吐而燥熱發必有所因方有此證其表虛惡風寒之證復見矣表虛之弱為陰火所乘燥發須臾而過其表虛無陽不任風寒復見矣是表虛無陽常常有之其燥熱則間而有之此二者不齊燥作寒已寒作燥已非如外傷之寒熱齊作無有間斷也百病俱有身熱又為之肌熱又為之皮膚間熱以手捫之方知者是也乃肌體有形之熱也亦須皆待陰陽既和汗出則

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六



迪志文化出版有限公司出版

愈矣慎不可於此上辯之以其虛實內外病皆有之故難辯耳只依先說病人自覺發熱惡寒之熱及燥作之熱上辯之為准則矣

辯外感八風之邪或有飲食勞役所傷之重者三二日特與外傷風者相似其餘證有特異者若不將兩證重別分解猶恐將內傷不足之證誤作有餘外感風邪雖辭理有重複處但欲病者易辯醫者易治耳

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

外感八風之邪乃有餘證也內傷飲食不節勞役所傷皆不足之病也其內傷亦惡風自汗若在溫暖無風處則不惡矣與外傷鼻流清涕頭痛自汗頗相似分之特異耳外感風邪其惡風自汗頭痛鼻流清涕常常有之一日一時增加愈甚直至傳入裏作下證乃罷語聲重濁高厲有力鼻息擁塞不通能飲食腹中和口知味大小便如常筋骨疼痛不能動搖便著床枕非扶不起其內傷與飲食不節勞役所傷然亦惡風居露地中遇大

漫風起却不惡也惟門窓隙中些小賊風來必大惡也與傷風傷寒俱不同矣况鼻流清涕頭痛自汗間而有之鼻中氣短少氣不足以息語則氣短而怯弱妨食或食不下或不飲食三者互有之腹中不和或腹中急而不能伸口不知五穀之味小便頻數而不渴初勞役得病食少小便赤黃大便秘或結或虛坐只見些小白膿時有下氣或泄黃如糜或溏泄色白或結而不通若心下痞或胸中閉塞如刀刺之痛二者亦互作不

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

併出也有時胃脘當心而痛上支兩脇痛必臍下相火之勢如巨川之水不可遏而上行使陽明之經逆行亂於胸中其氣無止息甚則高喘熱傷元氣令四肢不收無氣以動而懶倦嗜臥其外感風寒俱無此證故易分別耳

#### 辯手背手心

內傷及勞役飲食不節病手心熱手背不熱外傷風寒則手背熱手心不熱此辯至甚皎然



辯口鼻

若飲食勞役所傷其外證必顯在口必口失穀味必腹中不和必不欲言縱勉強對荅聲必怯弱口沃沫多唾鼻中清涕或有或無即陰證也外傷風寒則其外證必顯在鼻鼻氣不利聲重濁不清利其言壅塞盛有力而口中必和傷寒則面赤鼻壅塞而乾傷風則鼻流清涕而已內經云鼻者肺之侯肺氣通於天外傷風寒則鼻為之不利口者坤土也脾氣通於口飲食失節勞役所傷口不知穀味亦不知五味又云傷食惡食傷食明矣

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

辨氣少氣盛

外傷風寒者故其氣壅盛而有餘內傷飲食勞役者其口鼻中皆氣短促不足以息何以分之蓋外傷風寒者心肺元氣初無減損又添邪氣助之使鼻氣壅塞不利面赤不通其鼻中氣不能出併從口出但發一言必前輕而後重其言高其聲壯厲而有力是傷寒則鼻乾無涕面壅色赤其言前輕後重其聲壯厲而有力者乃有



迪志文化出版有限公司出版

餘之驗也傷風則決然鼻流清涕其聲啞其言響如從瓮中出亦前輕而後重高揭而有力皆氣盛有餘之驗也內傷飲食勞役者心肺之氣先損為熱所傷熱既傷氣四肢無力以動故口鼻中皆短氣少氣上喘懶女人有所問十不欲對其一縱勉強荅之其氣亦怯其聲亦低是其氣短少不足之驗也明白如此雖婦人女子亦能辨之豈有醫者反不能辨之乎

辯頭痛

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

內證頭痛有時而作有時而止外證頭痛常有之直須傳入裏實方罷此又內外證之不同者也

辯筋骨四肢

內傷等病是心肺之氣已絕於外必怠惰嗜臥四肢沈困不收此乃熱傷元氣脾主四肢既為熱所乘無氣以動經云熱傷氣又云熱則骨消筋緩此之謂也若外傷風寒是腎肝之氣已絕於內腎主骨為寒肝主筋為風自古腎肝之病同一治以其遞相維持也故經言膽主



迪志文化出版有限公司出版

筋膀胱主骨是也或中風或傷寒得病之日便著牀枕非扶不起筋骨為之疼痛不能動搖乃形質之傷經云寒傷形又云寒則筋攣骨痛此之謂也

辯外傷不惡食若勞役飲食失節寒溫不適此三者皆惡食

仲景傷寒論云中風能食傷寒不能食二者皆口中和而不惡食若勞役所傷及飲食失節寒溫不適三者俱惡食口不知五味亦不知五穀之味只此一辯足以分

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

內外有餘不足二證也陽寒證雖不能食而不惡食口中和知五味亦知穀味蓋無內證則心氣和脾氣通知五穀之味矣

辯渴與不渴

外感風寒之邪三日以外穀消水去邪氣傳裏始有渴也內傷飲食失節勞役久病者必不渴是邪氣在血脉中有餘故也初勞役形質飲食失節傷之重者必有渴以其心火熾上尅於肺金故渴也及當以此辯之雖渴

欲飲冷水者當徐徐少與之不可縱意而飲恐水多峻下則胃氣愈弱輕則為脹重則傳變諸疾必反覆悶亂百脉不安夜則增劇不得安臥不可不預度也

辯勞役受病表虛不作表實治之

或因勞役動作腎間陰火沸騰事閑之際或於陰涼處解脫衣裳更有新沐浴於背陰處坐臥其陰火下行還歸腎間皮膚腠理極虛無陽但風來為寒涼所遏表虛不任其風寒自認外感風寒求醫解表以重絕元氣取

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

禍如反掌苟幸而免者致虛勞血氣皆弱不能完復且表虛之人為風寒所遏亦是虛邪犯表始病一二日之間時與外中賊邪有餘之證頗相似處故致疑惑請醫者只於氣少氣盛上辯之其外傷賊邪必語聲前輕後重高厲而有力若是勞役所傷飲食不節表虛不足之病必短氣氣促上氣高喘懶語其聲困弱而無力至易見也若毫釐之誤則千里之謬已上者辯證別有治法用藥正論故作此說分解於後





辯證與中熱頗相似

復有一等乘天氣大熱之時在於路途勞役得之或在田野間勞形得之更或有身體薄弱食少勞役過甚又有修善當齋之人胃氣久虛而因勞役得之者皆與陽明中熱白虎湯證相似必肌體捫摸之壯熱必燥熱悶亂大惡熱渴而飲水以勞役過甚之故亦身疼痛始受病之時特與中熱外得有餘之證相似若誤與白虎湯旬日必死此證脾胃大虛元氣不足口鼻中氣皆短

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

促而上喘至日轉以後是陽明得時之際病必少減若是外中熱之病必到日晡之際大作譫語其熱增加大渴飲水煩悶不止其勞役不足者皆無此證尤易為分解若有難決疑似之證必當待一二日而求醫治療必不至錯誤矣飲食不節勞役形體所受病皆脾虛腠理元氣已絕於往往病人將自己表虛不任風寒但有風來寒至招認作傷風召醫以瀉其表反重虛其虛輕則致危困虛勞重則必死深可哀憫故時一說以祛醫者

之惑

論天地陰陽生殺之理在升降浮沉之間

陰陽應象論云天以陽生陰長地以陽殺陰藏然歲以春為首正正也寅引也少陽之氣始於泉下引陰升而在天地人身上即天之分百穀草木皆甲坼於此時也至立夏少陰之火熾於太虛則草木盛茂垂枝布葉乃陽之用陰之體此所謂天以陽生陰長經言歲半以前天氣主之在乎升浮也至秋而太陰之運初自天而下

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

逐陰降而徹地則金振燥令風厲霜飛品物咸殞其枝獨在若乎毫毛至冬則少陰之氣復服於泉下水冰地拆萬類周密陰之用陽之體也此所謂地以陽殺陰藏經云歲半已後地氣主之在乎降沉也至於春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此則正氣之序也故曰履端於始序則不愆升已而降降已而升如環無端運化萬物其實一氣也設或陰陽錯綜勝復之變自此而起萬物之中人一也呼吸升降倣象天地準繩陰陽蓋





胃為水穀之海飲食入胃而精氣先輸脾歸肺上行春夏之令以滋養周身乃清氣為天者也升已而下輸膀胱行秋冬之令為傳化糟粕轉味而出乃濁陰為地者也若夫順四時之氣起居有時以避寒暑飲食有節及不暴喜怒以頤神志常欲四時均平而無偏勝則安不然損傷脾真氣下溜或下泄而久不能升是在秋冬而無春夏乃生長之用陷於殞殺之氣而百病皆起或久升而不降亦病焉於此求之則知履端之義矣

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

勞倦所傷論

調經篇云陰虛生內熱岐伯曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脘不通而胃氣熱熱氣薰胸中故內熱舉痛論云勞則氣耗勞則喘且汗出內外皆越故氣耗矣夫喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣衰則火生火旺則乘其脾土脾主四肢故困熱無氣以動懶於語言動作喘乏表熱自汗心煩不安當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒瀉其熱火以酸味收其

散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之者是也金匱要略云平人脈大為勞脈極虛亦為勞矣夫勞之為病其脈浮大手足煩熱春夏劇秋冬差脈大者熱邪也秋冬差者時勝邪也以黃耆建中湯治之此亦溫

之意也夫上古聖人飲食有節起居有常不妄作勞形與神俱百歲乃去此謂治未病也今時之人去聖人久遠則不然飲食失節起居失宜妄作勞役形氣俱傷故病而後藥之是治其已病也推其百病之源皆因飲

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

食勞倦而胃氣元氣散解不能滋榮百脈灌溉臟腑衛護周身之所致也故蒼天之氣貴清靜陽氣惡煩勞噫飲食喜怒之間寒暑起居之際可不慎歟

飲食勞倦論

古之至人窮陰陽之造化究乎生死之際所著內經悉言人以胃氣為本蓋人受水穀之氣以生所謂清氣榮氣衛氣春升之氣皆胃氣之別稱也夫胃為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通



調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五臟陰陽揆度以為常也苟飲食失節寒溫不適則脾胃乃傷喜怒憂勞役過度而損耗元氣既脾胃虛衰元氣不足而心火獨盛心火者陰火也起於下焦其系繫於心心不主令相火代之相火下焦包絡之火元氣之賊也火與元氣不能兩立一勝則一負脾胃氣虛則下流於腎肝陰火得以乘其土位故脾胃之證始得之則氣高而喘身熱而煩其脉洪大而頭痛或渴不止皮膚不任風寒而生寒熱蓋陰火上衝則氣高而喘身煩熱為頭痛為渴而脉洪大脾胃之氣下流使穀氣不得升浮是生長之令不行則無陽以護其榮衛不任風寒乃生寒熱皆脾胃之氣不足所致也然而與外感風寒所得之證頗同而理異內傷脾胃乃傷其氣外感風寒乃傷其形傷外為有餘有餘者瀉之傷內為不足不足者補之汗之下之吐之剋之皆瀉也溫之和之調之養之皆補也內傷不足之病苟誤認作外感有餘之病而反瀉

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六



迪志文化出版有限公司出版

之則虛其虛也難經云實實虛虛損不足而益有餘如此死者醫殺之耳然則奈何曰惟當以甘溫之劑補其中升其陽甘寒以瀉其火則愈內經曰勞者溫之損者溫之蓋溫能除大熱大忌苦寒之藥瀉胃土耳今立補中益氣湯

補中益氣湯

黃芪

勞役甚一錢

甘草

炙已上各五分

人參

去蘆

升麻

柴胡

橘皮

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六

當歸身

洗酒

白朮

已上各三分

右件咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓早飯後溫服如傷之重者二服而愈量輕重治之

立方本指

夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗上喘氣短損真元氣人參以補之心火乘脾炙甘草用甘溫



迪志文化出版有限公司出版

以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛並大虛腹中急縮者宜多用之經云急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰臍間血胃中清氣在下必加升麻柴胡以引之引黃芪甘草甘溫之氣味上升能補胃氣之散解而實其表也又縮帶脉之縮急二味苦平物之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胸中為清濁相干用去白陳皮以理之又能助陽氣上升以散滯氣助諸甘辛為用也嗌乾者加乾葛脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其生發之氣榮血大虧榮氣不營陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬血氣日減心包與心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰惓惓者心惑而煩悶不安也故加辛甘微溫之劑生陽氣陽生則陰長或曰甘溫何能生血曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血更以當歸和之少加黃蘗以救腎水能瀉陰中之伏火如煩猶不止少加生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮心亂以硃砂安神丸鎮固之則愈

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六



迪志文化出版有限公司出版

四時用藥加減法

內經曰胃為水穀之海又云腸胃為市無物不包無物不入寒熱溫涼皆有之其為病也不一故隨時證於補中益氣湯中權立四時加減法於後

以手捫之而肌表熱者表熱也只服補中益氣湯一二服得微汗則已非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也○若更煩亂如腹中或周身有刺痛皆血滯不足加當歸身五錢或一錢○如精神短少加人參五錢五味子

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

二十  
○頭痛加蔓荊子三錢痛甚加川芎五錢○頂痛腦痛加藁本五錢細辛三錢諸頭痛併用此四味足矣○如頭痛有痰沈重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏五錢生薑三錢○耳鳴目黃頰頰腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以羌活一錢防風藁本七錢甘草五錢通其經血加黃芩黃連已上各三分消其腫人參五錢黃芪七錢益元氣而瀉火邪另作一服與之○嗌痛領腫脉洪大面赤者加黃芩甘草已上各三分桔梗七錢○口乾嗌



迪志文化出版有限公司出版

乾者加葛根分五升引胃氣上行以潤之○如夏月咳嗽者加五味子分五麥門冬分五○如冬月咳嗽加不去根節麻黃分五○如秋涼亦加○如春月天溫只加佛耳草欬冬花分五已上各

若久病痰嗽肺中伏火去人參以防痰嗽增益耳食不下乃胸中胃上有寒或氣滯滯加青皮木香分三已上

分五陳皮分五此三味為定法○如冬月加益智仁草豆蔻仁分五已上各○如夏月少加黃芩黃連更加檳榔草豆

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

蔻仁縮砂仁白豆蔻仁分五已上各○如春初猶寒少加辛熱之劑以補春氣之不足為風藥之佐益智草豆蔻可也○心下痞忤悶者加芍藥黃連分一已上各○如痞腹脹加枳實木香縮砂仁分三已上各厚朴分七如天寒少加乾薑或中桂分一桂心○心下痞覺中寒加附子黃連分一已上各不能食而心下痞加生薑陳皮分一已上各能食而心下痞加黃連分五枳實分三脈緩有痰而痞加半夏黃連分一已上各脈弦四肢滿便難而心下痞加黃連分五柴胡分七甘草分三○

腹中痛者加白芍藥分五甘草分三如惡寒覺冷痛加中桂分五○如夏月腹中痛不惡寒不惡熱者加黃芩甘草分五已上各芍藥分一以治時熱也○腹痛在寒涼時加半夏益智草豆蔻之類○如腹中痛惡寒而脈弦者是木來尅土也小建中湯主之蓋芍藥味酸於土中瀉木為君如脈沈細腹中痛是水來侮土以理中湯主之乾薑辛熱於土中瀉水以為主也如脈緩體重節痛腹脹自利米穀不化是濕勝以平胃散主之蒼

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

術苦辛溫瀉濕為主也○脇下痛或脇下縮急俱加柴胡分三甚甘草分三○臍下痛者加真熟地黃分五如不已者乃大寒也加肉桂分伍

硃砂安補丸

硃砂分五錢別研甘草分五錢黃連分五錢洗六錢

當歸分五錢蘆二生地黃分五錢

內經曰熱濕所勝治以甘寒以苦瀉之以黃連之苦寒去心煩除濕熱為君以甘草生地黃之甘寒瀉火補氣





|                                                                 |  |       |  |     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------|--|-----|--|--|--|--|--|
| 滋生陰血為臣以當歸身補其血不足硃砂納浮溜之火而安神明也                                     |  |       |  |     |  |  |  |  |  |
| 右件除硃砂外四味共為細末湯浸蒸餅為丸如黍米大以硃砂為衣每服十五丸或二十九丸津唾嚥下食後或溫水涼水少許送下亦得此近而奇偶制之緩也 |  |       |  |     |  |  |  |  |  |
| 參朮調中湯瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食                                             |  |       |  |     |  |  |  |  |  |
| 白朮                                                              |  | 黃耆    |  | 桑白皮 |  |  |  |  |  |
| 分五                                                              |  | 分四    |  |     |  |  |  |  |  |
| 欽定四庫全書                                                          |  |       |  |     |  |  |  |  |  |
| 仁齋直指                                                            |  |       |  |     |  |  |  |  |  |
| 卷六                                                              |  |       |  |     |  |  |  |  |  |
| 甘草                                                              |  | 人參    |  | 麥門冬 |  |  |  |  |  |
| 炙                                                               |  | 已上各三分 |  | 去心  |  |  |  |  |  |
| 青皮                                                              |  | 陳皮    |  | 地骨皮 |  |  |  |  |  |
| 白去                                                              |  | 白去    |  |     |  |  |  |  |  |
| 白茯苓                                                             |  | 五味子   |  |     |  |  |  |  |  |
| 已上各二分                                                           |  | 二十箇   |  |     |  |  |  |  |  |
| 右件咬咀如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓大溫服早飯後忌多語言勞役                               |  |       |  |     |  |  |  |  |  |
| 升陽補氣湯治飲食不時饑飽勞役胃氣不足脾氣下溜氣短無力不能寒熱早飯後轉增昏悶須要眠睡怠惰四肢不收懶倦動作及五心煩熱        |  |       |  |     |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>厚朴</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>薑製五分</p>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>升麻</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>羌活</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>白芍藥</p>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>獨活</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>防風</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>甘草</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>炙</p>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>澤瀉</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>已上各一錢</p>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>生地黃</p>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>一錢五分</p>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>柴胡</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>二錢五分</p>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>右件為麤末每服五錢水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去滓大溫服食前</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>加腹脹及窄狹加厚朴○如腹中似硬加砂仁</p>             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>已上各三分</p>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>雙和散治虛勞少力補血益氣</p>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>白芍藥</p>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>二錢五錢</p>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>黃芪</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>熟地黃</p>                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>川芎</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>當歸</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>已上各一兩</p>                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>甘草</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>炙</p>                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>官桂</p>                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>已上各七錢五分</p>                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>右為麤末每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎至七分去滓溫服</p>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>如大病之後虛勞氣乏者以此調治不熱不冷溫而有補</p>         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



升陽順氣湯治因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣  
遇春則口淡無味遇夏雖熱猶有惡寒饑則常如飽  
不喜食冷物

黃芪一兩 半夏三錢 草豆蔻二錢

神麴一錢五分 升麻 柴胡

當歸身 陳皮已上一錢 甘草炙

黃蘗已上各五分 人參去蘆三分

右件咬咀每服三錢水二盞生薑三片煎至一盞去

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

澤溫服

升陽益胃湯治脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不收時值秋  
燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便  
不調小便頻數不欲食食不消兼見肺病洒淅惡寒慘  
慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益氣  
也

黃芪二兩 半夏洗此一味 人參去蘆

甘草炙已上各一兩 黃連一錢 白芍何故秋旺用人參白朮芍

藥之類反補肺為脾胃虛則  
肺最受邪故因時而補也 獨活

防風以秋旺故以辛溫溺之 羌活已上各五錢

橘皮四錢 茯苓小便利不渴者勿用 柴胡

澤瀉不淋勿用 白朮已上各三錢

右咬咀每服秤三錢生薑五片棗二枚煎至一盞去

查溫服早飯後或加至五錢

門冬清肺飲治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐

血

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

紫菀茸一錢五分 黃耆 白芍藥

甘草已上一錢 人參去蘆 麥門冬已上各五分

當歸身三分 五味子三箇

右咬咀分作二服每服水二盞煎至一盞去粗溫服

食後

○局方中大阿膠丸亦宜用

升陽散火湯方見火門

當歸補血湯方見熱門



飲食所傷論

陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六府痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食也飲者水也無形之氣也因大飲則氣逆形寒飲冷則傷肺病則為喘咳為腫滿為水瀉輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散生薑半夏枳實白朮之類是也如重而畜積為滿者芫花大戟甘遂牽牛之屬利下之此其治也食者物也有形之血也如生氣通天論云因而飽食筋脉橫解湯瀉為痔又云食傷太陰厥陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿或下痢腸癖當分寒熱輕重而治之輕則內消重則除下如傷寒物者半夏神麴乾薑三稜廣木巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳皮麥蘖黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽應象論云在上者因而越之茺蒂散之屬主之然而不可過劑過劑則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又加之以藥過

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

論飲食自倍腸胃乃傷分而治之

故腸胃復傷而氣不能化食愈難消矣漸至羸困故五常政大論云大毒治病十去其六小毒治病十去其七凡毒治病不可過之此聖人之深戒也

痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷此混言之也分之為二飲也食也又經云因而大飲則氣逆因而飽食筋脉橫解則腸癖為痔飲者無形之氣傷之則宜發汗利小便使上下分消其濕解醒湯五苓散之類主之食者有形之物傷之則宜損其穀其次莫若消導丁香爛飯丸枳朮丸之類主之稍重則攻化三稜消積丸木香見睨丸之類主之尤重者則或吐或下茺蒂散備急丸之類主之以平為期蓋脾已傷又以藥傷使營運之氣減削食愈難消故五常政論云大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法聖人垂此嚴戒是為萬世福

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六



也如能慎言語節飲食所謂治未病也

辯內傷飲食用藥所宜所禁

內傷飲食付藥者受藥者皆以為瑣末細事是以所當重者為輕利害非細殊不思胃氣者榮氣也衛氣也穀氣也清氣也資少陽生發之氣也人之真氣衰旺皆在飲食入胃胃和則穀氣上升穀氣者升騰之氣也乃足少陽膽手少陽元氣始發生長萬化之別名也飲食一傷若消導藥的對其所傷之物則胃氣愈旺五穀之精

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

華上騰乃清氣為天者也精氣神氣皆強盛七神護衛生氣不乏增益大旺氣血周流則百病不能侵雖有大風苛毒弗能害也此一藥之用其利博哉易水張先生嘗戒不可用峻利食藥食藥下咽未至藥丸施化其標皮之力始明便言空快也所傷之物已去若更待一兩時辰許藥盡化開其峻利藥必有情性病去之後脾胃安得不損乎脾胃既損是真氣元氣敗壞促人之壽當時說下一藥枳實一兩麩炒黃色為度白朮二兩只此



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

二味荷葉裹燒飯為丸以白朮苦甘溫其甘溫補脾胃之元氣其苦味除胃中之溫熱利腰臍間血故先補脾胃之弱過於枳實剋化之藥一倍枳實味苦寒泄心下痞悶消化胃中所傷此一藥下胃其所傷不能即去須待一兩時辰許食則消化是先補其虛而後化其所傷則不峻利矣當是之時未悟用荷葉燒飯為丸之理老年味之始得可謂神奇矣荷葉之一物中央空虛象震卦之體震者動也人感之生足少陽甲膽也甲膽者風也生化萬物之根蒂也左傳云履端於始序則不愆人之飲食入胃營氣上行即少陽甲膽之氣也其手少陽三焦經人之元氣也手足經同法便是少陽元氣生發也胃氣穀氣元氣甲膽上升之氣一也異名雖多止是胃氣上升者也荷葉之體生於水土之下出於穢汙之中而不為穢汙所染挺然獨立其色青形乃空清而象風木者也食藥感此氣之化胃氣何由不上升乎其主意用此一味為引用可謂遠識深慮合於道者也更以

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

燒飯和藥與白朮協力滋養穀氣而補令胃厚再不至內傷其利廣矣大矣若內傷脾胃以辛熱之物酒肉之類自覺不快覓藥於醫者此風習以為常醫者亦不問所傷即付之以集香丸巴豆大熱藥之類下之大使下則物去遺留食之熱性藥之熱性重傷元氣七神不熾經云熱傷氣正謂此也其人必無氣以動而熱困四肢不舉傳變諸疾不可勝數使人真氣自此衰矣若傷生冷硬物世醫或用大黃牽牛二味大寒藥投之物隨藥

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

下所傷去矣遺留食之寒性藥之寒性重瀉其陽陽去則皮膚筋骨肉血脉無所依倚便為虛損之證論言及此令人寒心夫辛辣氣薄之藥無故不可亂服非止牽牛而已至真要大論云五味入胃各先逐其所喜攻攻者剋伐瀉也辛味下咽先攻瀉肺之五氣氣者真氣元氣也其牽牛之辛辣猛烈奪人尤甚飲食所傷腸胃受邪當以苦味泄其腸胃可也肺與元氣何罪之有夫牽牛不可用者有五此其一也况胃主血為物所傷物者

有形之物也皆是血病血病瀉氣此其二也且飲食傷於中焦止合剋化消導其食重瀉上焦腹中已虛之氣此其三也食傷腸胃當塞因塞用又寒因寒用枳實大黃苦寒之物以泄有形是也反以辛辣牽牛散瀉真氣犯大禁四也殊不知鍼經第一卷第一篇有云外來客邪風寒傷人五臟若誤瀉胃氣必死誤補亦死其死也陰氣有餘故躁今內傷腸胃是謂六腑不足之病反瀉上焦虛無肺氣肺者五臟之一數也為牽牛之類朝損

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

暮損其元氣消耗此乃暗裏折人壽數犯大禁五也良可哀歎故特著此論并方庶令四海聞而行之不至天橫耳此老夫之用心也胃氣豈可不足復明養胃之理故經曰安穀則昌絕穀則亡水去則榮散穀消則衛亡榮散衛亡神無所依仲景云水入於經其血乃成穀入於胃脉道乃行故血不可不養胃不可不溫血溫胃和榮衛將行常有天命穀者身之大柄也書與周禮皆云金木水火土穀惟脩以奉養五臟者也內傷飲食固非





細事苟妄服食藥而輕生損命其可乎哉黃帝鍼經有說胃惡熱而喜清大腸惡清冷而喜熱兩者不和何以調之岐伯曰調此者飲食衣服亦欲適寒溫寒無悽愴暑無出汗飲食者熱無灼灼寒無滄滄寒溫中適故氣將特乃不致邪僻也詳說見於本經條下是必有因用豈可用俱寒俱熱之食藥致損者與內經云內傷者其氣口脉反大於人迎一倍二倍三倍分經用藥又曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死如但食不納惡心欲吐者

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

所傷之物不同各立治法臨時加減用之其用藥又問病人從來稟氣盛衰所傷寒物熱物是喜食而食之邪不可服破氣藥若乘饑困而食之邪當益胃氣或為人所勉勸強食之宜損血而益氣也診其脉候傷在何臟方可與對病之藥豈可妄瀉大真生氣以輕喪身寶乎且如先食熱而不傷繼之以寒物因後食致前食亦不消化而傷者當問熱食寒食孰多孰少斟酌與藥無不當矣喻如傷熱物二分寒物一分則當用寒藥一分熱藥二分相合而與之則榮衛之氣必得周流更有或先飯酒而後傷寒冷之食及傷熱食冷水與冰如此不等皆當驗其節次所傷之物約量寒熱之劑分數各各對證而與之無不取驗自忖所定方藥未敢便為能盡藥性之理姑用指迷辯惑耳隨證立方備陳於後

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

易水張先生枳朮丸治痞消食強胃

白朮

二兩

枳實

麸炒  
黃色

右為細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每服五十





丸多用白湯下無時白朮者本意不取其食速化俱久令人胃氣強實不復傷也

橘皮枳朮丸治老幼元氣虛弱飲食不消或臟腑不調

心下痞悶

橘皮

枳實熬炒去穢已上各一兩

白朮二兩

右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸

熱水送下食遠○夫內傷用藥之大法所貴服之強

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷六

人胃氣令胃氣益厚雖猛食多食重食而不傷此能

用食藥者也此藥久久益胃氣令人不復致傷也

麴藥枳朮丸治為人所勉勸強食之致心腹滿悶不快

枳實熬炒去穢

大麥蘖炒麵神麴炒已上各一兩

右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸

用溫水下食遠

木香枳朮丸破滯氣消飲食開胃進食

木香

枳實熬炒去穢已上各一兩

白朮二兩

右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸

溫水送下食遠

木香化滯湯治因憂氣食濕麵結於中脘腹皮底微痛

心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣

半夏一兩

草豆蔻仁已上各五錢

柴胡四錢

木香已上各三錢

枳實熬炒去穢

當歸稍已上各二錢紅花五分

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷六

右件判如麻豆大每服五錢水二大盞生薑五片煎

至一盞去滓稍熱服食遠忌酒濕麵

半夏枳朮丸治因冷食內傷

半夏湯洗七次

枳實熬炒已上各一兩白朮二兩

右為細末荷葉燒飯為丸如菉豆大每服五十丸溫

水送下添服不妨熱湯浸蒸餅為丸亦可

○如食傷寒熱不調每服加上二黃丸十九白湯送下

丁香爛飯丸治飯食所傷



丁香

京三稜

廣茂炮

木香

已上各錢一

甘草

炙

甘松

去土

縮砂仁

丁香皮

益智仁

已上各錢三

香附子

五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如菴豆大每服三十丸白

湯送下或細嚼亦可不拘時候

○治卒心胃痛甚效

草豆蔻丸治秋冬傷寒冷物胃脘當心而痛上支兩脇

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六

膈咽不通

草豆蔻

麵裹煨去皮取仁

枳實

麸炒黃色

白朮

已上各一兩

大麥蘖

麸炒黃色

半夏

湯洗七次

黃芩

刮去皮生

神麴

炒黃色各五錢

乾生薑

橘皮

青皮

已上各二錢

炒鹽

伍分

右為細末湯浸蒸餅為丸如菴豆大每服五十丸白

湯下量所傷多少加減服之

○如冬月用別作一藥不用黃芩歲火不及又傷冷物

加以溫劑是其治也然有熱物傷者從權以寒藥治

之隨時之宜不可不知也

三黃枳朮丸治傷肉食濕麵辛辣味厚之物填塞悶亂

不快

黃芩

二兩

黃連

酒洗

大黃

濕紙煨

神麴

炒

橘皮

白朮

已上各一兩

枳實

麸炒五錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如菴豆大一倍每服五十

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷六

丸白湯送下量所傷服之

除濕益氣丸治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

枳實

麸炒黃色

神麴

炒黃色

黃芩

生用

白朮

已上各一兩

蘿蔔子

紅花

三分是一錢十分也

右為細末荷葉燒飯為丸如菴豆大每服五十丸白

湯送下量所傷多少服之

三稜消積丸治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

京三稜

炮

廣茂

炒

炒麴

已上各七錢



|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 青橘皮                                         | 巴豆 <small>和皮米炒<br/>黑燬去米</small> 陳皮 <small>已上各<br/>五錢</small> |
| 丁皮                                          | 益智 <small>已上各<br/>三錢</small> 茴香 <small>五錢<br/>炒</small>      |
| 右為細末醋打麵糊為丸如梧桐子大每服十丸加至二十丸溫生薑湯下食前量虛實加減如更衣止後服之 |                                                              |
| 備急大黃丸療心腹諸卒暴百病                               |                                                              |
| 大黃                                          | 巴豆 <small>去皮</small> 乾薑 <small>已上各<br/>一兩</small>            |
| 右須要精新好藥搗羅蜜和更搗一千杵丸如小豆                        |                                                              |
| 大每服三丸老少量之                                   |                                                              |
| 益胃散治服寒藥過多或脾胃虛弱胃脘痛                           |                                                              |
| 陳皮                                          | 黃芪 <small>已上各<br/>七錢</small> 益智仁 <small>六錢</small>           |
| 白豆蔻仁                                        | 澤瀉 乾薑                                                        |
| 薑黃 <small>已上各<br/>三錢</small>                | 縮砂仁 甘草                                                       |
| 厚朴                                          | 人參 <small>已上各<br/>二錢</small>                                 |
| 右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服食前○如脉弦惡寒腹痛乃中氣弱也以仲景小建中湯加    |                                                              |

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷六

|                                                                                                                                                                                                                          |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <p>黃芪錢氏異攻散加芍藥選而用之○如渴甚者以白朮散加葛根倍之</p>                                                                                                                                                                                      |            |           |
| <p>論酒客病</p>                                                                                                                                                                                                              |            |           |
| <p>夫酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之况亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神何依折人長命不然則虛損之病成矣金匱要略云酒疸下之久久為黑疸慎不可犯此戒不若令上下分消其濕葛花解醒湯主之</p> |            |           |
| <p>葛花解醒湯</p>                                                                                                                                                                                                             |            |           |
| <p>白豆蔻仁</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>縮砂仁</p> | <p>葛花</p> |
| <p><small>已上各五錢</small></p>                                                                                                                                                                                              |            |           |
| <p>乾薑</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>神麴</p>  | <p>澤瀉</p> |
| <p><small>炒</small></p>                                                                                                                                                                                                  |            |           |

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷六



|                                                                          |                                                                           |                                 |                             |                             |                             |                     |                              |                       |                             |                            |                                     |                                                      |                             |                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| <p>白朮 <small>已上各二錢</small> 橘皮 <small>去白</small> 猪苓 <small>去皮</small></p> | <p>人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 <small>各一錢五分</small> 木香 <small>五分</small></p> | <p>蓮花青皮 <small>去穰三分</small></p> | <p>右為細末秤和勻每服三錢七白湯調下但得微汗</p> | <p>酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃賴日日飲酒</p> | <p>此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵</p> | <p>酒病故也若頻服之損人天年</p> | <p>五苓散治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾</p> | <p>欽定四庫全書 仁齋直指 卷六</p> | <p>煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩</p> | <p>渴不止者宜服之又治霍亂吐利燥渴引飲之證</p> | <p>澤瀉 <small>二兩五錢</small> 猪苓 茯苓</p> | <p>白朮 <small>已上各一兩五錢</small> 桂 <small>一兩</small></p> | <p>右為細末每服二錢熱湯調服不計時候服訖多飲</p> | <p>熱湯有汗出即愈</p> | <p>○又治瘵熱在裏身熱黃疸濃煎茵陳蒿湯調下食前服之○如疸發渴及中暑引飲亦可用水調服</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|

|          |                              |                            |                                                                              |                                                        |                                                        |                             |                             |                             |            |             |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>之</p> | <p>家秘加味枳朮丸治脾胃虛弱飲食減少胸膈膨悶酒</p> | <p>傷食積氣滯滯腹滿常服則進食寬中和暢脾胃</p> | <p>白朮 <small>泔浸土炒二兩</small> 枳實 <small>去穰麩炒一兩</small> 神麴 <small>炒</small></p> | <p>麥蘖 <small>炒研取粉</small> 陳皮 <small>去白</small> 山查肉</p> | <p>香附 <small>炒已上各一兩</small> 縮砂仁 <small>炒五錢</small></p> | <p>右為細末荷葉燒陳老米飯為丸如菡豆大每服五</p> | <p>十丸用清米飲或滾水送下如胸膈膨悶枳殼湯送</p> | <p>下如酒傷乾葛湯送下如脾胃虛弱者加人參五錢</p> | <p>附傷食</p> | <p>傷食方論</p> | <p>病源曰宿食不消由藏氣虛弱寒氣在於脾胃之間故使穀不化也宿穀未消新穀又入脾氣既弱故不能磨之則經宿而不消也令人腹脹氣急噎氣醋臭時或增寒壯熱是也或頭痛如瘧之狀寸口脉浮大按之反澀尺脉亦微而澀者則宿食不消也丹溪云傷食惡食者</p> |
|----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 胸中有物宜導痰補脾用二陳湯加白朮山查川芎蒼朮服之                 |                                            |
| 荳蔻橘紅散                                    | 溫脾養胃升降陰陽和三焦化宿食                             |
| 丁香                                       | 木香 <small>各一兩</small> 肉荳蔻                  |
| 人參                                       | 厚朴 <small>薑汁製</small> 神麴 <small>炒</small>  |
| 乾薑 <small>炮</small>                      | 半夏麴 橘紅 <small>去白</small>                   |
| 甘草 <small>炙</small>                      | 藿香 <small>去土</small> 白朮 <small>各半兩</small> |
| 右呖咀每三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去渣                     |                                            |
| 溫服                                       |                                            |
| 保和丸專治一切食積                                |                                            |
| 山查 <small>六兩</small>                     | 神麴 半夏                                      |
| 茯苓 <small>各二兩</small>                    | 陳皮 連翹                                      |
| 蘿蔔子 <small>各一兩</small>                   |                                            |
| 右為末炊餅子如梧子大每服七八十丸食遠白湯下                    |                                            |
| 大枳殼丸 <small>御藥院方</small> 治一切酒食傷胸膈閉悶疼痛飲食不 |                                            |

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 消兩脇刺痛嘔逆惡心並皆治之                  |                                             |
| 蓬莪朮 <small>煨香熱</small>         | 厚朴 <small>去皮薑製</small> 人參 <small>去蘆</small> |
| 青皮                             | 黑牽牛 <small>炒</small> 枳殼 <small>麸炒去穰</small> |
| 茯苓 <small>去皮</small>           | 木香 陳皮 <small>去白</small>                     |
| 白朮 <small>各一兩</small>          | 檳榔 大黃 <small>錦紋者各二兩</small>                 |
| 半夏 <small>湯七次炮</small>         | 麥蘖 <small>微炒</small> 神麴 <small>炒黃</small>   |
| 三稜 <small>各一兩</small>          |                                             |
| 又一方有乾生薑五錢                      |                                             |
| 右為末薑汁糊丸如梧子大每服三四十丸薑湯下           |                                             |
| 常服美食                           |                                             |
| 木香檳榔丸治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小便結滯不利者並亦服之 |                                             |
| 木香                             | 檳榔 青皮 <small>去白</small>                     |
| 陳皮 <small>去白</small>           | 枳殼 <small>麸炒</small> 廣茂 <small>煨切</small>   |
| 黃連 <small>各一兩</small>          | 黃栢 <small>去粗皮</small> 香附                    |
| 大黃 <small>炒各三兩</small>         | 黑牽牛 <small>生取頭末各三兩</small>                  |





右為末滴水丸如豌豆大每服三五十丸食後生薑湯送下加至以利為度

秘方化滯圓理一切氣化一切積奪造化有通塞之功調陰陽有補瀉之妙久堅沉痾磨之自消暴積留導之立去

南木香

堅實者不見火

丁香

去芭不見火

青皮

四花者去白

紅橘皮

水浸去白

黃連

大二錢半

京三稜

煨火

莪朮

慢火煨各五錢

半夏

三錢

欽定四庫全書

仁齋直指卷六

前八味晒乾共研為細末

巴豆

去殼滾湯泡逐一研開去心膜以瓦器盛用

好醋浸過一指慢火熬至醋乾秤六錢重碾

烏梅

細將前藥末和再碾令勻入後烏梅肉膏巴豆若乾止用四錢五分

藥用肉厚者打研去核細剉火焙乾為細末秤五錢重用米醋調畧清慢火熬成膏和入前

右通和勻了用白麵八錢重水調得所慢火調糊為丸如粟米大每服五七丸人盛者十九五更空心用橘皮湯下○常服磨滯不欲通泄津液嚥下○停食



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

飽悶枳殼湯下○但有所積物取本汁冷下○因食

吐不止津液嚥下即止○食瀉不休及霍亂嘔吐俱

用冷水下○赤痢冷甘草湯下○白痢冷乾薑湯下

○心動石菖蒲湯下○赤白痢冷甘草乾薑湯下○

諸氣痛生薑橘皮湯下○小腸氣痛茴香酒下○婦

人血氣當歸湯下

若欲宣積滾薑湯下仍如丸數未利再服利多飲冷水

一口補住○小兒量歲數加減丸服疳積常服米飲

欽定四庫全書

仁齋直指卷六

下不拘時服○孕婦勿服此藥得熱則行得冷則止

丁香爛飯圓治食傷卒心痛三黃枳朮圓治傷肉食濕

麵辛辣味厚之物填塞悶亂不安葛花解醒湯治飲

酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲

食減少小便不利

方俱見內傷門

大柴胡湯治內傷飲食鬱結在裏身熱煩燥日晡發熱

如瘧脈實而滑數者用此微利

柴胡

四錢

黃芩

芍藥

各二錢半

半夏 錢二

大黃 錢二

枳實 錢一五分

右咬咀作一服加生薑三片棗二枚水二鍾煎一鍾去粗溫服以利為度未利再投一服

附調理脾胃 新增

調理脾胃方論

內經曰胃者五藏六府之海也水穀皆入於胃五藏六府皆稟氣於胃胃者五藏之本六府之大源也又曰胃為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以為常也以此論之若夫飲食有節寒溫適宜脾胃壯實則外邪不能侵內邪不能起何恙之有哉苟因飲食失節寒溫不適則脾胃虛弱而百病生焉况脾胃屬土土為五行之本萬物藉土而生故古人以調理脾胃為醫中之王道厥有旨哉予鄙見欲人知節飲食適寒溫以養脾胃之本倘有脾胃虛弱最易作疾故開諸方於後擇而用之苟得脾壯實固本

澄源之事也夫

調中益氣湯 東垣方 治因饑飽勞役損傷脾胃元氣不足

其脉弦或洪緩而沉按之無力中之下時得一澁其證身體沉重四肢倦懶百節煩疼胸滿短氣膈咽不通心煩不安耳鳴耳聾目有瘀肉熱壅如火覩物昏花口中沃沫飲食失味怠惰嗜臥忽肥忽瘦溺色變或清利而數或上飲下便或夏月飧泄腹中虛痛不思飲食

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷六

升麻

柴胡

橘皮 各二分

木香 二分

甘草 炙

人參

蒼朮 各五分

黃芪 錢一

當歸 五分

芍藥 三分

五味子 七箇此後三味出東垣證効方有之

右咬咀作一處水煎食前熱服如時顯熱燥是不元蒸蒸發也加生地黃黃栢如大便虛坐不得或大便了而不了腹常逼迫血虛血澁也加歸身

治中湯治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉參苓



|                                           |    |        |
|-------------------------------------------|----|--------|
| 白朮散治脾胃虛弱飲食不進或嘔吐泄瀉及大病後調助脾胃此藥最好             |    | 方並見虛勞門 |
| 痰水胸膈痞滯不美飲食並皆治之                            |    | 方見泄瀉門  |
| 痞消食理脾強胃                                   |    | 方見內傷門  |
| 家秘加味枳朮丸治脾胃虛弱飲食減少胸膈膨悶酒傷食積氣滯腹滿常服則進          |    |        |
| 食寬中和暢脾胃                                   |    | 方見內傷門  |
| 養胃湯                                       |    | 方因三    |
| 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉或有外感寒熱如瘧骨節煩疼並皆治之         |    | 方見瘧瘧門  |
| 白朮和胃丸治病久不能食而臟腑或結或澹此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕和脾胃進飲食 |    |        |
| 厚朴                                        | 製  | 半夏     |
| 陳皮                                        | 錢八 | 檳榔     |
| 木香                                        | 錢一 | 人參     |
|                                           | 錢七 | 甘草     |
|                                           |    | 錢三     |
| 右為末生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每三十九丸溫水食遠服                |    |        |
| 補脾丸                                       |    | 心法     |
| 有脾虛而惡湯藥者製此丸用湯吞省口                          |    |        |

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| 苦而易於從也                           |     |     |
| 白朮                               | 斤半  | 蒼朮  |
| 陳皮                               | 兩各三 | 芍藥  |
|                                  | 斤半  |     |
| 右為末粥糊丸加潤下丸可作催生用上熱甚者加清金丸尤妙與此藥必無產患 |     |     |
| 養脾丸                              |     | 方和劑 |
| 治脾胃虛冷心腹脹悶嘔逆惡心泄瀉                  |     |     |
| 大麥蘖                              | 炒   | 白茯苓 |
|                                  |     | 皮去  |
| 白朮                               | 斤半  | 人參  |
|                                  |     | 去蘆各 |
| 乾薑                               | 炮   | 縮砂  |
|                                  |     | 去皮各 |
| 甘草                               | 炙一  |     |
|                                  | 斤半  |     |
| 右為末煉蜜為丸每兩作八丸每服一丸細嚼薑湯下            |     |     |
| 補脾湯                              |     | 方三因 |
| 治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消                |     |     |
| 人參                               | 去蘆  | 茯苓  |
|                                  |     | 皮去  |
| 乾薑                               | 炮各  | 草果  |
|                                  | 兩各  | 皮去  |
| 厚朴                               | 去皮  | 甘草  |
|                                  | 製   | 炙各一 |
| 陳皮                               | 去   |     |
|                                  | 白   |     |
| 白朮                               | 各七  |     |
|                                  | 錢半  |     |



右咬咀每服四錢水一盞煎七分去渣空心溫服

溫脾散 方本是 開胃進食利氣散寒濕溫中

青皮 白去 陳皮 白去 砂仁

船上茴香 炒 良薑 桔梗

白芷 厚朴 兩各一 木香

麥芽 香附 白朮 兩各半

甘草 半一兩 紅豆 乾葛 錢各三

右咬咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分去渣空心

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

服

八味理中丸 選百一方 治脾胃虛冷飲食不化胸膈痞悶或

嘔吐痰水或腸鳴泄瀉

砂仁 川薑 麥芽 兩各二

白茯苓 神麴 炒 人參 兩各一

白朮 兩四 甘草 兩炙一

右為末煉蜜丸每兩分作十丸空心用一丸薑湯嚼

下或加半夏麴一兩為末入鹽點服亦可

參苓平胃散 御藥院方 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹

滿刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面

色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重節痛常多自利或

發霍亂及五噎八痞膈氣反胃宜服

厚朴 製 橘皮 兩各五 蒼朮 米泔浸

甘草 炙 茯苓 兩各二 人參 兩二

右咬咀水二盞生薑三片棗一枚煎至一盞去渣溫服不拘時一方棗肉丸小豆大服五十丸薑湯下空

欽定四庫全書 仁齋直指 卷六

心常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒涼溫四時

非節之氣

異功散 方拔粹 治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食

人參 茯苓 白朮

甘草 炙 橘皮 兩各等

右咬咀每服五錢生薑三片棗一枚水二盞煎八分

溫服

六君子湯 聖惠方 治脾臟不和不進飲食上燥下寒服熱



|                                                                   |                     |                     |    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|
| 藥不得者                                                              | 人參                  | 白朮                  | 橘紅 |
|                                                                   | <small>湯泡七次</small> | <small>各一兩</small>  |    |
| 半夏                                                                | 枳殼                  | 甘草                  |    |
|                                                                   | <small>去白炒</small>  | <small>炙各半兩</small> |    |
| 右咬咀每服一兩生薑七片棗一枚水二盞煎至一盞去渣溫服                                         |                     |                     |    |
| 木香人參生薑枳朮丸                                                         | <small>拔粹方</small>  | 開胃進食                |    |
| 木香                                                                | 人參                  | 乾生薑                 |    |
| <small>三錢</small>                                                 | <small>半</small>    | <small>一錢半</small>  |    |
| 枳實                                                                | 白朮                  | 橘皮                  |    |
| <small>一兩炒</small>                                                | <small>一兩半</small>  | <small>四錢</small>   |    |
| <small>欽定四庫全書</small><br><small>仁齋直指</small><br><small>卷六</small> |                     |                     |    |
| 右件為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服三五                                              |                     |                     |    |
| 十丸溫水送下食前服                                                         |                     |                     |    |
| 藿香安胃散                                                             | <small>衛生寶鑑</small> | 治脾胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐熟     |    |
| 藿香                                                                | 丁香                  | 人參                  |    |
|                                                                   |                     | <small>各二錢半</small> |    |
| 橘紅                                                                |                     |                     |    |
| <small>半兩</small>                                                 |                     |                     |    |
| 右咬咀水二盞生薑三片煎至一盞溫服不拘時                                               |                     |                     |    |
| 寬中進食丸滋形氣美飲食                                                       |                     |                     |    |

|                                                                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 神麴                                                                | 木香                 | 草荳蔻仁               |
| <small>炒四錢</small>                                                | <small>五分</small>  | <small>五錢</small>  |
| 枳實                                                                | 半夏                 | 甘草                 |
| <small>炒四錢</small>                                                | <small>七錢</small>  | <small>炙一錢</small> |
| 人參                                                                | 乾生薑                | 青皮                 |
|                                                                   |                    |                    |
| 猪苓                                                                | 陳皮                 | 白朮                 |
| <small>各一錢</small>                                                |                    |                    |
| 白茯苓                                                               | 澤瀉                 | 砂仁                 |
|                                                                   | <small>各二錢</small> | <small>一錢半</small> |
| 大麥芽                                                               |                    |                    |
| <small>一兩</small>                                                 |                    |                    |
| 右為末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三四十丸溫米飲下食遠服之                                       |                    |                    |
| <small>欽定四庫全書</small><br><small>仁齋直指</small><br><small>卷六</small> |                    |                    |
| 八珍湯                                                               | 治血氣理脾胃             |                    |
| <small>御藥院方</small>                                               |                    |                    |
| 當歸                                                                | 赤芍藥                | 川芎                 |
|                                                                   |                    |                    |
| 熟地黃                                                               | 人參                 | 白茯苓                |
|                                                                   |                    |                    |
| 甘草                                                                | 砂仁                 |                    |
|                                                                   | <small>各等分</small> |                    |
| 右咬咀每服三錢水一盞薑七片棗二枚煎至七分空心溫服                                          |                    |                    |
| 凝神散病後收斂胃氣清涼肌表                                                     |                    |                    |
| 人參                                                                | 白朮                 | 茯苓                 |





|                       |  |       |                       |     |          |
|-----------------------|--|-------|-----------------------|-----|----------|
| 山藥                    |  | 各一兩   | 粳米                    | 扁豆  | 炒        |
| 知母                    |  |       | 生苳                    | 甘草  | 炙各五錢     |
| 淡竹葉                   |  |       | 地骨皮                   | 麥門冬 | 各二錢半     |
| 右咬咀每服五錢水盞半薑三片棗一枚煎至一盞  |  |       |                       |     |          |
| 去渣溫服                  |  |       |                       |     |          |
| 加減保和丸消痰利氣扶脾胃進飲食       |  |       |                       |     |          |
| 山查                    |  |       | 神麴                    | 半夏  | 湯泡七次     |
| 茯苓                    |  | 去皮各三兩 | 陳皮                    | 連翹  | 洗        |
| 蘿蔔子                   |  | 各二兩   | 白朮                    | 蒼朮  | 米泔浸去粗皮   |
| 枳實                    |  | 去白各一兩 | 香附                    | 厚朴  | 薑製各二兩    |
| 黃芩                    |  | 去腐酒浸炒 | 黃連                    |     | 去鬚酒浸炒各一兩 |
| 右為細末薑汁麵糊為丸如梧子大每服五十九漸  |  |       |                       |     |          |
| 加至七八十九食後茶湯任下          |  |       |                       |     |          |
| 加味枳朮丸                 |  | 明醫雜著  | 論曰人之一身脾胃為主胃陽主氣        |     |          |
| 脾陰主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣津 |  |       | 液上升糟粕下降斯無痛矣人惟飲食不節起居不時 |     |          |

|                       |  |      |                       |  |     |
|-----------------------|--|------|-----------------------|--|-----|
| 損傷脾胃胃損則不能納脾損則不能化脾胃俱損納 |  |      | 化皆難元氣斯弱百邪易侵而飽悶痞積關格吐逆腹 |  |     |
| 痛泄痢等證作矣况人於飲食豈能一一節調一或有 |  |      | 傷脾胃便損飲食減常元氣漸憊矣故潔古製枳朮之 |  |     |
| 丸東垣發脾胃之論使人常以調理脾胃為主後人稱 |  |      | 為醫中王道厥有旨哉近世論治脾胃者不分陰陽氣 |  |     |
| 血而率皆理胃所用之藥又皆辛溫燥熱助火消陰之 |  |      | 劑遂致胃火益旺脾陰愈傷清純中和之氣變為燥熱 |  |     |
| 胃脘乾枯大腸燥結脾臟漸絕而死期迫矣殊不知脾 |  |      | 胃屬土屬溫位居長夏故溫熱之病十居七八况土居 |  |     |
| 四季寒熱溫涼各依其時豈可偏用辛熱之劑哉今舉 |  |      | 枳朮丸方立加減法於後            |  |     |
| 白朮                    |  | 二兩去梗 | 枳實                    |  | 一兩炒 |
| 右為細末荷葉包飯燒取出杵爛和藥杵勻丸如菉  |  |      | 豆大每服五六十丸清米湯下此法一補一消取飲  |  |     |
| 食緩化不令有傷東垣加陳皮一兩名橘皮枳朮丸  |  |      |                       |  |     |



|                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                    |                                                                            |                                              |                               |                                             |                                             |                                                     |                                                              |                                |                                                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>治老幼元氣衰弱飲食少進久服令人多食而不傷<br/>若元氣素弱飲食難化食多即腹中不和疼痛泄瀉<br/>此虛寒一也加人參白芍藥<small>酒炒</small>神麴<small>炒</small>大麥芽<small>炒</small><br/>杵<small>炒</small></p> | <p>去皮各<small>錢</small>宿砂木香<small>各五</small></p> | <p>若素有痰火胸膈鬱塞噯酸噎氣及素有吞酸吐酸<br/>之證或有酒積瀉結痛此皆溫熱也加黃連<small>薑汁</small></p> | <p>白芍藥<small>酒炒</small>陳皮<small>各一兩</small>石膏生甘草<small>各五錢</small>縮砂木香</p> | <p>各二<small>錢</small>川芎<small>四錢</small></p> | <p>欽定四庫全書<br/>仁齋直指<br/>卷六</p> | <p>若傷食飽悶痞塞不消加神麴大麥芽山查子<small>各一兩</small></p> | <p>如有食積痞塊在腹者再加黃連厚朴瓜蒌<small>製各五錢</small></p> | <p>積堅者再加蓬朮<small>醋炙</small>昆布<small>各三錢</small></p> | <p>若傷冷食不消腹痛瀉泄加半夏<small>薑製一兩</small>縮砂乾薑<small>各炒</small></p> | <p>神麴大麥芽<small>各五錢</small></p> | <p>若人性多氣惱夾氣傷食氣滯不通加川芎香附米<small>各一兩</small>木香黃連<small>薑製各五錢</small></p> | <p>若胸膈不利人過服辛香燥熱之藥以致上焦受傷</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                             |                                                            |                                     |                                                                            |                              |                                                                                                                      |                                                                  |                               |                            |                                                                             |                                       |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| <p>胃脘乾燥嘔吐膈噎反胃加黃連<small>薑炒</small>山梔子<small>炒各五錢</small></p> | <p>白芍藥當歸<small>各一兩</small>桔梗生甘草石膏<small>各五錢</small>胸膈頑</p> | <p>痰膠結及大便秘再加芒硝<small>五錢</small></p> | <p>若素有痰者加半夏<small>薑炒</small>橘紅白茯苓<small>各一兩</small>黃芩<small>炒黃</small></p> | <p>連<small>薑炒各五錢</small></p> | <p>若人能食好食但食後反飽難化此胃火旺脾陰虛<br/>也加白芍藥<small>酒炒一兩</small>人參<small>七錢</small>石膏<small>火煨一兩</small>生甘草<small>五錢</small></p> | <p>黃連<small>炒</small>香附米<small>炒</small>木香<small>各四錢</small></p> | <p>欽定四庫全書<br/>仁齋直指<br/>卷六</p> | <p>若年高脾虛血燥易饑易飽大便燥難加白芍藥</p> | <p>當歸<small>各一兩</small>人參<small>七錢</small>升麻甘草<small>炙各四錢</small>山查子大麥芽</p> | <p>桃仁<small>去皮尖各五錢</small>此老人常服藥也</p> | <p>仁齋直指卷六</p> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|



欽定四庫全書

仁齋直指卷七

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

痰涎

痰涎方論

惟氣與血能生諸病痰亦如之夫痰者津液之異名人之所恃以潤養肢體者也血氣和平關絡條暢則痰散而無氣脉閉塞腕竅凝滯則痰聚而有痰之所以發動

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

者豈無自而然哉風搏寒凝暑煩濕滯以至諸熱蒸鬱啖食生冷煎燂鯁膾鹹藏動風發氣等輩皆能致痰也是痰作恙為喘為嗽為壅為嘔為眩暈為風癇為狂迷為忪悸或吞酸或短氣或痞隔或腫脹或寒熱或疼痛痰實主之人知痛生於氣血孰知痰涎流注亦能纏滯而為痛乎如頭風證眉稜耳角俱痛投以風藥不效投以痰藥收功如患眼證赤腫羞明而痛與之涼劑弗瘳與之痰劑獲愈如酒家手臂痛重時或麻痺二陳湯加



迪志文化出版有限公司出版

片子薑黃下白圓子消飲圓倍术圓輩每每就安如鬪家胸骨撲傷刺痛無已散血之劑罔功續以自己洩便飲之須臾吐痰其痛立止此皆痰涎作痛之明證也然而頑痰滿膈上脘填塞其高者因而越之法當從權取吐或者津液不守所以痰多吐甚痰脫則精竭而斃矣療痰之法理氣為上和胃次之若風若寒若濕若熱如前數者亦當推尋所受之因和胃謂何涎者脾之液也脾胃一和痰涎自散故治痰多用半夏蓋半夏能利痰故也

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

痰涎證治

橘皮湯治胸膈停痰

半夏製五兩

茯苓

陳皮各三兩

細辛

青皮

桔梗

枳殼

甘草炒各二兩

人參

旋覆花去葉各一兩

右剉散每服三錢薑五厚片煎服



迪志文化出版有限公司出版

|                     |  |                           |  |                         |  |                        |  |
|---------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|
| 前胡半夏湯治痰盛            |  | 北前胡                       |  | 半夏 <small>製</small>     |  | 茯苓 <small>各三分</small>  |  |
| 陳皮                  |  | 木香                        |  | 紫蘇                      |  |                        |  |
| 枳殼 <small>製</small> |  | 甘草 <small>炒各二分</small>    |  | 右剉散每服三錢薑五片烏梅少許煎服        |  | 人參飲治痰亦治嗽               |  |
| 人參                  |  | 桔梗                        |  | 半夏麴 <small>製</small>    |  | 五味子                    |  |
|                     |  | 細辛                        |  | 枳殼 <small>製</small>     |  | 赤茯苓 <small>各一分</small> |  |
|                     |  |                           |  | 甘草 <small>炒半</small>    |  | 右剉散每服三錢薑五片煎服痰嗽加紫苑添甘草   |  |
| 星薑湯治痰去風             |  | 丸白南星 <small>半兩者一箇</small> |  | 老生薑 <small>三錢半</small>  |  | 右各切片以水三盞磁器內煎取其半逐旋溫服    |  |
| 二聖飲治風痰              |  | 南星                        |  | 半夏 <small>各二兩切片</small> |  | 右用生薑一斤搗取自然汁浸藥磁器盛之項在鍋   |  |

|                         |  |                        |  |                        |  |                                       |  |
|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 內隔湯熬桃令薑汁盡焙乾為末每挑二錢入生薑    |  | 甘草少許煎湯調下或用糕糊小丸薑湯下三十丸   |  | 入煨白礬少許同丸亦得             |  | 大半夏湯治痰飲                               |  |
| 半夏 <small>製</small>     |  | 茯苓                     |  | 生薑 <small>等分</small>   |  | 右剉碎每服三錢水二盞煎至一小盞溫服如熱痰                  |  |
| 加甘草少許胃不和去甘草加陳皮          |  | 半夏丸消下痰涎                |  | 丸白半夏                   |  | 老生薑 <small>等分搗如泥焙乾</small>            |  |
| 右為末煮薑汁為糊丸桐子大每三十九薑湯下     |  | 豁痰丸治頑痰壅盛               |  | 南星 <small>三兩</small>   |  | 半夏 <small>二兩各剉作大片用濃皂角水浸一宿焙乾為末</small> |  |
| 白附子                     |  | 川靈脂                    |  | 直僵蠶 <small>炒去絲</small> |  | 華陰細辛                                  |  |
| 白礬 <small>煨枯各一兩</small> |  | 全蝎 <small>三錢半焙</small> |  | 右為末皂角漿煮麵糊為丸桐子大每二三十丸薑湯下 |  |                                       |  |



神術丸治痰飲妙

茅山蒼朮

一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾為末

生油麻

半兩水二盞研細取

漿

大棗

十五箇煮取肉研碎入麻漿拌和藥

右末為丸桐子大日乾每五七十丸空心溫湯下

辰砂化痰丸驅風化痰

辰砂

細研

白礬

煨枯各半兩

半夏麴

三兩

南星

炮一兩

右為末薑汁調麴煑糊丸桐子大別用朱砂衣每十

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七

丸薑湯下小兒風痰一二丸

強中二薑湯溫脾胃消寒痰

良薑

乾薑

青皮

陳皮

大半夏

切開沸湯盪浸七次焙乾各一兩

南星

炮半兩

右為末薑汁調麴煑糊丸桐子大每三十丸薑湯下

養正丹治腎虛氣不歸元痰涎上壅亦治寒痰每服二

十丸用降氣湯送下

二陳湯吞白丸子

方見小兒類

治痰飲一證眉心眉梁骨痛

狀如頭風

二陳湯

方見癰類

加蒼朮片子薑黃製枳殼各少許治酒麴

積毒熱生痰攻眼腫痛

控痰良方喘嗽通用

號丹

白礬

各二兩

右以錢王搏剉一火孔先入號丹次以白礬蓋頂用

炭一斤煨至火盡礬枯丹黑出火毒研細煮稀麴糊

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七

丸麻子大每服十五丸沸湯泡生薑汁送下諸頑痰

迷塞關竅不通聲音不出以三十丸研末入全蝎少

許用自然薑汁澄取清者調灌須臾吐痰立愈凡喘

促胃膈膨湃寸脉急數須從權吐之中滿內實而喘

者與解毒雄黃丸

方見積熱門

附諸賢論

劉宗厚曰痰之為病仲景論四飲六證無擇叙內外三

因俱為切當蓋四飲則叙因痰而顯諸證者三因則論





其因有所傷而生痰者也惟王隱君論人之諸疾悉出於痰此發前人所未論可謂深識痰之情狀而得其奧者矣製滾痰丸一方絲治斯疾固為簡便較之仲景三因有表裏內外而分汗下溫利之法則疎濶矣况又有虛實寒熱之不同者哉夫痰病之原有因熱而生痰者亦有因痰而生熱者有因風寒暑濕而得者有因驚而得者有因氣而得者有因酒食而得者有因食積而得者有脾虛不能運化而生者有腎虛不能降火而生者若熱痰則多煩熱風痰多成癰瘰竒證冷痰多成骨痺濕痰多倦怠軟弱驚痰多成心痛癲疾飲痰多成脇痛臂痛食積痰多成癖塊痞滿其為病狀種種難名王隱君論中頗為詳盡學者但察其病形脉證則知所挾之邪隨其表裏上下虛實以治之若夫子和謂飲無補法必當去水故用吐汗下之三法治人常愈又論熱藥治痰之誤固為詳切亦有挾寒挾虛之證不可不論夫久痰凝結膠固不通狀若寒凝不用溫藥引導必有拒格

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七



迪志文化出版有限公司出版

之患况有風寒外來痰氣內鬱者不出溫散亦何以開鬱行滯又有血氣虧乏之人痰客中焦閉塞清道以致四肢百骸發為諸病理宜導去痰滯必當補接兼行又難拘於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多因食積痰飲所致何以然者蓋胃氣亦賴痰積所養飲食雖少胃氣卒不便虛故也亦有治痰用峻利過多則脾氣愈虛津液不運痰反生而愈盛法當補脾胃清中氣則痰自然運下此乃治本之法也謂醫中之王道者正此類也

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

附諸方

金沸草散治外感風寒痰氣內鬱咳唾稠粘參蘇飲亦治外感風寒痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續並見傷風門 小青龍湯治外感風寒內生溢飲支飲倚息喘滿方見咳嗽門 蘇子降氣湯治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛方見諸氣門 中和丸治濕痰氣熱



迪志文化出版有限公司出版

|                                 |                             |                          |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 蒼朮                              | 黃芩                          | 半夏                       |
| 香附<br><small>分等</small>         |                             |                          |
| 右為末粥丸如梧桐子大每服五七十丸薑湯下             |                             |                          |
| 導痰湯                             |                             |                          |
| 南星<br><small>炮</small>          | 橘紅<br><small>去白</small>     | 赤茯苓<br><small>去皮</small> |
| 枳殼<br><small>炒</small>          | 甘草<br><small>炙半兩各一兩</small> | 半夏<br><small>四兩</small>  |
| 右咬咀水煎生薑五片食前服                    |                             |                          |
| 茯苓圓<br><small>出千金第一方</small>    |                             |                          |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷七</small> |                             |                          |
| 半夏<br><small>四兩</small>         | 茯苓<br><small>二兩</small>     | 枳殼<br><small>一兩</small>  |
| 風化硝<br><small>半兩</small>        |                             |                          |
| 右為末蒸餅或神麴薑汁糊丸梧子大每服三十丸薑湯下         |                             |                          |
| 清膈化痰圓                           |                             |                          |
| 此方治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有効              |                             |                          |
| 黃連                              | 黃芩<br><small>各一兩</small>    | 黃栢                       |
| 山梔<br><small>半兩</small>         | 香附<br><small>一兩半</small>    | 蒼朮                       |



|                                                                     |                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 右為末蒸餅丸白湯下                                                           |                              |                            |
| 搜風化痰圓                                                               |                              |                            |
| 人參                                                                  | 槐角子                          | 殭蠶                         |
| 白礬                                                                  | 陳皮<br><small>去白</small>      | 天麻                         |
| 荊芥<br><small>各一兩</small>                                            | 半夏<br><small>四兩薑汁炒</small>   | 辰砂<br><small>半兩另研</small>  |
| 右為末薑汁浸蒸餅為丸辰砂為衣服四拾丸薑湯下                                               |                              |                            |
| 利膈化痰圓                                                               |                              |                            |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷七</small>                                     |                              |                            |
| 南星                                                                  | 蛤粉<br><small>研細一兩</small>    | 半夏                         |
| 瓜蒌仁                                                                 | 貝母<br><small>去心治胸痰氣妙</small> | 香附<br><small>半兩童便浸</small> |
| 右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角搗杏仁如泥入前藥搜和再入薑汁泡蒸餅丸如菉豆大青黛為衣每服五六十丸薑湯下 |                              |                            |
| 清痰圓治清中脘熱痰積                                                          |                              |                            |
| 烏梅                                                                  | 枯礬                           | 黃芩                         |



|                      |      |                 |     |
|----------------------|------|-----------------|-----|
| 蒼朮                   | 陳皮   | 活石              | 炒   |
| 青皮                   | 枳實   | 南星              | 各半兩 |
| 半夏                   | 神麴   | 山查              |     |
| 乾生薑                  | 香附   | 各一兩             |     |
| 右為末湯浸蒸餅丸服            |      |                 |     |
| 王隱君滾痰圓               |      |                 |     |
| 括曰甑裏翻身甲掛金于今頭戴草堂深相逢二八 |      |                 |     |
| 求斤正硝煅青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸桐 |      |                 |     |
| 子意常斟千般怪証如神効水瀉雙身却不任   |      |                 |     |
| 大黃                   | 黃片苓  | 酒洗淨             | 各八兩 |
| 礞石                   | 一兩   | 鐵線定鹽泥固濟晒乾火煅紅候冷取 |     |
| 一方加珠砂二兩              | 研為末  | 為細衣             |     |
| 右為細末水丸梧子大每服四五十丸量虛實加減 |      |                 |     |
| 服茶清溫水任下臨臥食後服         |      |                 |     |
| 六君子湯治脾虛不進飲食嘔吐痰水      | 方見調理 |                 |     |

|                      |      |     |        |
|----------------------|------|-----|--------|
| 清氣化痰圓清頭目涼膈化痰利氣       |      |     |        |
| 半夏                   | 湯洗七次 | 陳皮  | 去白     |
| 薄荷葉                  | 荊芥穗  | 各五錢 |        |
| 連翹                   | 梔子仁  | 炒   |        |
| 甘草                   | 炙各一兩 | 蒼朮  | 泔浸剉焙乾炒 |
| 右為末薑汁煎水打糊為丸如梧子大每服五十丸 |      | 香附子 | 醋浸炒各一兩 |
| 食後臨卧各一服如腸胃燥實加酒炒大黃芒硝各 |      | 桔梗  | 去蘆     |
| 一兩                   |      |     |        |
| 此方即二陳湯涼膈散加香附蒼朮相合是也蓋  |      |     |        |
| 痰者因火而動氣者因鬱而成故作胸膈痞滿頭  |      |     |        |
| 目昏眩今用二陳湯以豁痰涼膈散以降火而散  |      |     |        |
| 風熱香附蒼朮開鬱順氣何疾之不愈哉     |      |     |        |
| 節齋化痰圓                |      |     |        |
| 論曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通 |      |     |        |
| 何痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清熏蒸成聚而 |      |     |        |
| 變為痰焉痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾 |      |     |        |



古人用二陳湯為治痰通用者所實脾燥溫治其標也然以之而治溫痰寒痰飲痰涎則固是矣若夫痰因火上肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被鬱故其津液之隨氣而升者為火薰蒸凝濁鬱結而成歲月積久根深蒂固故名老名鬱而其源則火邪也病在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃溫痰冷痰痰飲痰涎之比也故湯藥難治

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

亦非半夏茯苓蒼朮枳殼南星等藥所能治也惟在開其鬱降其火清潤肺金而消化凝結之痰緩以治之庶可取効今製一方於後

天門冬

心去

黃芩

炒酒

海粉

研別

瓜蒌仁

研別

橘紅

兩各一

桔梗

蘆去

連翹

香附子

搥研

浸炒

各五錢

鹽水

青黛

別研

芒硝

三錢

右為細末煉蜜入生薑汁少許和藥末杵極勻丸如

小龍眼大噉化一九或嚼爛清湯細嚥之或丸為細丸如黍米大淡薑湯送下五六十丸此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺與胃脘皆受火邪故鬱滯而成此方用天門冬黃芩泄肺火也海粉芒硝鹹以軟堅也瓜蒌仁潤肺降痰香附米開鬱降氣連翹開結降火青黛解鬱火故皆不用辛燥之藥

秘傳豁痰丸治食積痰熱

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

陳皮

去白

山查

神麴

兩各二

當歸

黃芩

白朮

兩各四

半夏

薑汁浸

黃連

白茯苓

甘草

各一兩

枳實

二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服四五十

丸臨卧或食後淡薑湯送下

秘傳滾痰圓降痰火神効

大黃

八兩剉片

用皮硝三兩酒

黃芩

八兩剉碎

用

明礬三錢酒

一兩水一碗和勻蒸乾用



|                                                     |                               |                                        |              |                                        |                               |                   |                       |                  |                             |                     |                                                                  |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <p>水各一<br/>碗蒸用<br/>沉香 五錢<br/>礞石 一兩用硝一<br/>兩入確固濟</p> | <p>煨紅取<br/>硃砂 一兩研<br/>末為衣</p> | <p>右為細末水丸如梧桐子大硃砂為衣每服四五十<br/>丸量虛實加減</p> | <p>加味二陳湯</p> | <p>半夏 薑汁一<br/>錢五分<br/>白茯苓 各一<br/>錢</p> | <p>香附 一錢<br/>二分<br/>連翹 黃芩</p> | <p>枳實 炒 前胡 甘草</p> | <p>欽定四庫全書 仁齋直指 卷七</p> | <p>瓜蒌仁 桔梗 麥芽</p> | <p>神麴 炒 陳皮 鹽水浸炒<br/>各一錢</p> | <p>右呿咀水二盞薑三片煎一盞</p> | <p>五飲湯 方 一留飲心下二癖飲脇下三疼飲胃中四<br/>溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過<br/>多故有此疾</p> | <p>旋覆花 人參 陳皮</p> | <p>枳實 白朮 茯苓</p> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|

|                 |                 |                  |                                                                 |                         |                                   |                    |                       |                                     |                                                                            |                                   |                     |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <p>厚朴 半夏 澤瀉</p> | <p>猪苓 前胡 桂心</p> | <p>芍藥 甘草 各等分</p> | <p>右剉每兩分四服水二盞生薑十片同煎至六分取<br/>清溫服不拘時忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加<br/>葛根葛花砂仁</p> | <p>蠲飲枳實圓 方 逐飲消痰導滯清膈</p> | <p>枳實 炒 半夏 湯泡七次 陳皮 去白各<br/>二兩</p> | <p>黑牽牛 半斤取頭末三兩</p> | <p>欽定四庫全書 仁齋直指 卷七</p> | <p>右為末水煮麵糊為丸如梧子大每服五十丸薑湯<br/>下食後</p> | <p>辰砂祛痰丸 方 治酒食過多酸醎作成痰飲聚於胸<br/>中凝則嘔逆惡心流則臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深<br/>則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神効</p> | <p>硃砂 一兩水飛一半<br/>入藥一半為衣 半夏 四兩</p> | <p>槐角 炒 陳皮 白礬 生</p> |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|





荊芥

各一兩

生薑

四兩與半夏製作餅陰乾

右為末薑汁打糊丸如梧桐子大每服五十九生薑

湯下

八味圓治脾腎兩虛痰唾而不咳者

方見諸虛門

五虎湯治痰喘氣急

方見喘門

水飲

水飲方論

水之與飲同出而異名也人惟脾土有虧故平日所飲

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七

水漿不能傳化或停於心下或聚於脇間或注於經絡或溢於膀胱往往因此而致病矣孰謂血氣痰涎能生諸疾而水飲之不能為恙乎惟水與飲漉漉有聲為喘為咳為嘔為泄為痞隔為脹滿為眩運為怔忡為寒熱為堅痛為浮腫為多唾為短氣為體重氣為飲隔痞滿腹鳴骨痛冷痺則曰氣分經脉不行血化為水四肢紅腫則曰血分凡此等類皆水氣之所由作也據病驗證可不究其所受之原乎然則療治之法將何先曰能以

表裏虛實訂之斯得矣表有水者其身熱嗽喘怔忡乾

嘔微利青龍湯汗之而愈裏有水者其身涼嘔嗽痞滿

引脇痛硬十棗湯下之而安虛者脉虛心腹滿而濡當

以安腎圓為主加青木香圓少許以行之實者脉實心

腹滿而硬當以青木香圓為主用五皮散加枳殼以導

之尋常水氣心下怔忡大半夏湯小半夏茯苓湯五苓

散輩通用可也然而瘧家多積黃水或於心下停瀦或

於脇間結癖惟癖為能生寒熱所以瘧劑多用常山蓋

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七

水在上焦則吐之水不在於上焦則常山亦能破其癖而下其水也若夫水腫證候亦此種類詳見於後請旁參而互攷焉

水飲證治

芎夏湯逐水利飲通用

川芎

半夏

製

茯苓

各一兩

青皮

陳皮

枳殼

製各半兩

白朮

甘草

炒各一分



|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 右剉散每服三錢薑五厚片煎服川芎半夏能逐水也○喘加去節麻黃○嗽加炒桑白皮○嘔加生薑半夏○泄加蒼朮白朮○痞隔加枳殼桔梗○脹滿加縮砂白豆蔻○眩運加半夏南星○怔忡加白茯苓○寒熱疼痛下其癖浮腫體重滲其濕餘以類推 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大半夏湯 <small>方見痰涎門</small>                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小半夏茯苓湯治諸水氣                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半夏 <small>製五兩</small> 茯苓 <small>三兩</small>                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷七</small>                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右剉散每服三錢水二盞半煎一盞秤生薑二錢半研取汁入藥煎沸溫服                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五苓散流行水飲 <small>方見氣門</small> 每二錢沸湯調下小便更不利加防己佐之                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桂朮湯治氣分前證                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辣桂 <small>三兩</small> 白朮 麻黃 <small>去節</small>                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 細辛 <small>去苗</small> 甘草 <small>炒各二兩</small> 枳殼 <small>製</small>                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乾薑 <small>炮各一兩半</small>                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 右剉散每服三錢煎服                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桂苓湯治血分前證                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辣桂 赤茯苓 當歸                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 川芎 赤芍藥 蓬莪朮                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 京三稜 檳榔 蒼朮 <small>炒</small>                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桑白皮 <small>炒</small> 大腹皮 瞿麥穗                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青皮 陳皮 甘草 <small>炒各半兩</small>                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葶藶 大黃 <small>濕紙煨各一分</small>                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷七</small>                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右剉散每服三錢薑五片煎服                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平肺湯肺與腎皆以至陰積水喘嘈嗽咳蓋水乘之                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葶藶 <small>微炒</small> 桑白皮 <small>炒</small> 北梗    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 枳殼 <small>製</small> 紫蘇莖葉 半夏 <small>製各一兩</small> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 麻黃 <small>去節三分</small> 甘草 <small>炒半兩</small>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右剉散每三錢薑五片煎服治腎水用青木香圓                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青龍湯治表不解有水氣發熱乾嘔怔忡咳嗽微喘微利                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                       |      |     |       |
|---------------------------------------|------|-----|-------|
| 麻黃                                    | 節去   | 細辛  | 芍藥    |
| 乾薑                                    | 炮    | 甘草  | 炒     |
| 五味子                                   | 二兩   | 半夏  | 製二兩半  |
| 右剉每服三錢水一盞半煎一盞溫服                       |      |     |       |
| 十棗湯治表解裏有水身涼汗出乾嘔短氣微嗽微利                 |      |     |       |
| 胸下痞滿引脇硬痛                              |      |     |       |
| 芫花                                    | 炒    | 大戟  | 甘遂等分  |
| 右件異篩 <small>粳</small> 末合和入乳鉢研良久以肥棗十箇擘 |      |     |       |
| 開用水一碗煮爛取汁一盞調藥壯者服一錢重弱                  |      |     |       |
| 者服半錢重平旦溫服別用棗湯漱下通利即以糜                  |      |     |       |
| 粥自養未利明日再服半錢請酌量用                       |      |     |       |
| 安腎圓治腎氣不足膀胱虛冷                          |      |     |       |
| 川烏                                    | 炮去皮臍 | 辣桂  | 各四兩   |
| 白朮                                    |      | 石斛  | 酒炒    |
| 巴戟                                    |      | 菝葜  | 酒浸焙   |
| 山藥                                    |      | 桃仁  | 去皮尖微炒 |
| 破故紙                                   | 炒各十兩 | 白蒺藜 | 炒去刺   |
|                                       |      | 茯苓  |       |

欽定四庫全書

仁齋直指

卷七

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 右末煉蜜圓如桐子每五七十圓鹽湯空心服                                                                  |             |
| 青木香圓行滯通水                                                                            |             |
| 青木香                                                                                 | 五兩          |
| 華澄茄                                                                                 |             |
| 補骨脂                                                                                 | 炒           |
| 檳榔                                                                                  | 炒各十兩        |
| 牽牛                                                                                  | 六十兩炒香搗取木三十兩 |
| 右為末滴水圓菜豆大每二十圓熟水下                                                                    |             |
| 五皮散治皮膚水氣                                                                            | 方見諸氣類       |
| 二和散和暢三焦治痞脹浮腫                                                                        | 方見諸氣類       |
| 消飲圓                                                                                 |             |
| 欽定四庫全書                                                                              |             |
|  |             |
| 仁齋直指                                                                                |             |
| 卷七                                                                                  |             |
| 茯苓                                                                                  |             |
| 乾薑                                                                                  | 炮各三兩        |
| 白朮                                                                                  | 八兩          |
| 枳實                                                                                  | 炒半兩         |
| 右末煉蜜圓桐子大每十五圓米飲下                                                                     |             |
| 倍木圓                                                                                 |             |
| 白朮                                                                                  | 四兩          |
| 辣桂                                                                                  |             |
| 乾薑                                                                                  | 炒各二兩        |
| 右為末煉蜜圓桐子大每服二十圓米飲下此二藥                                                                |             |
| 可以溫中消水                                                                              |             |
| 嘔吐                                                                                  |             |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七



嘔吐方論

嘔吐出於胃氣之不和人所共知也然有胃寒有胃熱有痰水有宿食有膿血有氣攻又有所謂風邪入胃凡是數者可不究其所自來哉寒而嘔吐則喜熱惡寒四肢淒清法當以剛壯溫之熱而嘔吐則喜冷惡熱煩燥口乾法當以溫涼解之痰水證者唾沫怔忡先渴後嘔與之消痰逐水輩宿食證者胸腹脹滿醋悶吞酸與之消食去積輩腥氣燥氣熏炙惡心此膿血之聚經所謂

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

嘔家有癰膿不須治膿盡自愈是爾七情內鬱關隔不平此氣攻之證經所謂諸鬱干胃則嘔吐是爾若夫風邪入胃人多不審率用參朮助之欄住寒邪於此尤關利害其或惡聞食臭湯水不下粥藥不納此則翻胃之垂絕者也辯之不早其何以為對治乎雖然足陽明之經胃之絡脉也陽明之氣下行則順今逆而上行謹不可洪固也然嘔吐者每大便秘結上下壅遏氣不流行盡思所以區畫而利導之他如汗後水藥不入口者

逆嘔而脉弱小便復利身微熱而手足厥者虛寒之極也識者憂焉

嘔吐證治

附子理中湯治寒證嘔吐

方見寒類

二薑湯治寒證嘔吐

良薑

生白薑 各半兩

木香

丁香

各二錢半

甘草

炙一錢半

右剉散每服三錢水盞半煎半食前服

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

吳茱萸湯治冷涎嘔吐陰證乾嘔通用

吳茱萸

沸湯泡洗三次焙炒

生薑

各一兩半

人參

三分

大棗

五箇

右剉細每服四錢水盞半煎半食前服

小柴胡湯多加生薑治熱證嘔吐

方見血類

人參須依分兩

用或加烏梅亦得

大半夏湯治痰證嘔吐

半夏

製剉二兩

人參

四錢切片







|                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 丁香煑散治翻胃嘔逆                                                                         |                                             |
| 丁香                                                                                | 石蓮肉                                         |
|                                                                                   | <small>各十枚</small>                          |
|                                                                                   | 北棗                                          |
|                                                                                   | <small>七枚 截碎</small>                        |
| 生薑                                                                                |                                             |
|                                                                                   | <small>片七</small>                           |
| 黃秫米半合洗                                                                            |                                             |
| 右水椀半煮稀粥去藥取粥食之                                                                     |                                             |
| 附子散治弱證翻胃                                                                          |                                             |
| 大附子                                                                               | <small>一枚作兩截中心各剝小孔入丁香四十粒塞滿以竹針插入炭火燂四</small> |
| <small>圓滓薑汁半椀再滓再</small>                                                          | <small>滓以盡為度去皮切焙</small>                    |
| 右並末每一錢半粟米一捻北棗二箇煎食前服                                                               |                                             |
| 欽定四庫全書                                                                            |                                             |
|  |                                             |
| <small>仁齋直指 卷七</small>                                                            |                                             |
| 養正丹大治停寒留飲聚涎翻胃嘔吐                                                                   |                                             |
|                                                                                   | <small>方見病</small>                          |
| 添薑煎                                                                               |                                             |
| 二陳湯下                                                                              |                                             |
| 嘔吐家多大便秘結虛冷者用靈砂或養正丹溫而利                                                             |                                             |
| 之又蘇合香圓                                                                            |                                             |
|                                                                                   | <small>方見脈</small>                          |
| 用四分感應圓                                                                            |                                             |
| <small>滿門</small>                                                                 |                                             |
| 用六分夾                                                                              |                                             |
| 研作細圓薑汁泡沸湯下此亦溫利若大便熱結用蜜                                                             |                                             |
| 煮凝捻作指鉗納後部導之或用獐猪膽一枚取汁入                                                             |                                             |
| 法醋少許以筆蘸滴灌於後部或燒皂角於桶內熏穀                                                             |                                             |
| 道或用連根葱白一握漢椒五十粒搗細作餅焙熱和                                                             |                                             |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 輕粉掩臍續以葱椒煎湯熏盪身下       |                                |
| 翻胃方                  |                                |
| 橘皮湯治翻胃嘔吐             |                                |
| 真橘皮                  | 用日照西方壁土炒香取橘皮為末                 |
| 右每二錢薑棗略煎服            |                                |
| 連子散治翻胃               |                                |
| 右石蓮肉為末入些肉豆蔻末米湯乘熱調服二方 |                                |
| 患痢禁口通用               |                                |
| 欽定四庫全書               | 仁齋直指                           |
| 卷七                   |                                |
| 溫胃散治久冷翻胃             |                                |
| 附子                   | 一箇生去皮臍分作四塊生薑半斤水一大椀慢火同煮至半盞取附子切焙 |
| 右為末每一錢空心溫米湯調下        |                                |
| 附諸方                  |                                |
| 加味二陳湯治停痰氣結而嘔         |                                |
| 半夏                   | 泡                              |
| 陳皮                   | 各五兩                            |
| 白茯苓                  | 三兩                             |
| 甘草                   | 炙一兩半                           |
| 砂仁                   | 一兩                             |
| 丁香                   | 五錢                             |
| 生薑                   | 三兩                             |



右咬咀每服一兩水煎服

附膈噎

膈噎方論

能飲食而能便下無斯病矣飲食不下而便秘則膈噎成焉皆由恚憂氣結思慮傷脾以致津液枯澁而飲食不能下下則便秘不通復而上行也內經曰三陽結謂之膈子和云三陽者大小腸膀胱也結謂熱結也小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能圍膀胱熱結則津

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

液涸三陽既結則前後閉澁不通必反而上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下推而上行也故經又曰少陽所致為嘔湧溢食不下此理明矣嚴氏曰五噎五膈者由喜怒不常七情傷於脾胃鬱而生痰痰與氣搏升而不降飲食不下蓋氣留於咽嗑者則成五噎結於胸膈者為五膈五噎之名憂思勞食氣也五膈之名憂恚寒熱氣也其病令人胸膈痞悶嘔逆噎塞妨碍飲食夫喜怒憂鬱內傷脾肺肝氣愈盛痰火上升血液



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食物難入間或可入入亦不多名之曰噎其槁在下與胃為近食雖可入難盡入胃良久復出名之曰膈又曰翻胃所因不同病出一體其病始有吞酸吐酸吐痰出沫痞塞嘈雜等証醫者不察病原妄投峻劑愈耗真元久則脾胃漸虛血液枯澁以致傳導失常便秘不通治尤難矣良可嘆哉治法宜養血生津清痰降火潤氣補脾抑肝開鬱治宜枳朮二陳湯降火以炒黃芩黃連清痰以竹瀝薑汁開鬱以神麴香附潤氣以杏子麻仁燥以白蜜乳汁血虛以當歸地黃之類其間倘服燥熱過多津液枯澁腸胃燥結屎如羊矢者不治丹溪云年高者不治無血故也不守戒忌厚味房勞之人亦不可治張雞峰曰噎是神思間病惟內觀自養可治此一言深中病情不可不信哉

白朮

泔洗剉土  
炒一錢

黑枳實

炒

陳皮

去白各  
八分

秘傳枳朮二陳湯治痰氣食膈嘔吐痰涎翻胃嘈雜

|                                                                      |  |                                                                    |  |                                                |  |                      |  |                      |  |    |  |                      |  |                                                                     |  |                                                                    |  |                                                                    |  |                              |  |                           |  |                    |  |                                       |  |                                                                      |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----|--|----------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| 茯苓 <small>去麤皮</small> 香附子 <small>童便浸炒</small> 半夏 <small>湯泡七次</small> |  | 黃連 <small>薑汁炒</small> 檳榔 <small>雞心者</small> 白荳蔻 <small>各五分</small> |  | 青皮 <small>炒</small> 吳茱萸 生甘草 <small>各三分</small> |  | 右咬咀用水一鍾半薑三片棗一枚煎八分食遠服 |  | 氣虛者加人參黃芪血虛者加當歸地黃鬱加神麴 |  | 撫芎 |  | 秘傳半夏厚朴湯治翻胃吐痰胸滿肋痛嘈雜吐涎 |  | 半夏 <small>湯泡七次</small> 厚朴 <small>薑汁製</small> 山梔 <small>去皮炒黑</small> |  | 川黃連 <small>薑汁炒</small> 廣陳皮 <small>去白</small> 茯苓 <small>去麤皮</small> |  | 甘草 <small>生用三分</small> 黑枳實 <small>麩炒</small> 蒼朮 <small>泔浸炒</small> |  | 澤瀉 香附子 青皮 <small>各五分</small> |  | 當歸 白荳蔻 <small>各六分</small> |  | 右咬咀用水一鍾半薑三片煎八分不拘時服 |  | 瓜蒌實 <small>和劑方</small> 治膈噎胃膈痞痛徹背脇喘急妨悶 |  | 瓜蒌實 <small>去殼別研</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> 半夏 <small>湯泡七次</small> |  | 桔梗 <small>炒各一兩</small> |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----|--|----------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|

|                      |  |       |  |                                         |  |                  |  |                              |  |          |  |                                                                        |  |                      |  |   |  |                      |  |                       |  |                        |  |                |  |       |  |         |  |                                      |  |
|----------------------|--|-------|--|-----------------------------------------|--|------------------|--|------------------------------|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|----------------|--|-------|--|---------|--|--------------------------------------|--|
| 右為細末薑汁米糊為丸如梧桐子大每服五十丸 |  | 生薑湯送下 |  | 人參利膈丸 <small>東垣方</small> 治膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘 |  | 滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也 |  | 木香 檳榔 <small>各七錢半</small> 人參 |  | 當歸 藿香 甘草 |  | 枳實 <small>麩炒黃各一兩</small> 大黃 <small>酒濕蒸熟</small> 厚朴 <small>薑製一兩</small> |  | 右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五十丸溫水 |  | 下 |  | 五膈寬中散治七氣留滯飲食不下穀脹氣脹通用 |  | 撞氣阿魏圓治五種噎疾九般心痛痞癖氣塊冷氣攻 |  | 刺 <small>並見諸氣門</small> |  | 參苓白朮散治脾胃虛弱不能運化 |  | 白朮和胃丸 |  | 八珍湯治證同前 |  | 寬中進食丸滋形氣美飲食 <small>已上並見調理脾胃門</small> |  |
|----------------------|--|-------|--|-----------------------------------------|--|------------------|--|------------------------------|--|----------|--|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|----------------|--|-------|--|---------|--|--------------------------------------|--|



保和丸消食開胃 方見積聚門

橘杏麻仁圓治噎膈大便燥結

橘皮 炙

杏仁 去皮尖

麻仁 去殼各三兩

郁李仁 去殼五錢

右除陳皮為末三仁俱搗成膏用棗仁去核以石柏內三味搗和丸如梧桐子大每服五六十丸煎枳實湯送下食前服

謹按膈噎翻胃之証皆由七情太過而動五臟之火

欽定四庫全書 仁齋直指卷七

薰蒸津液而痰火益盛脾胃漸衰飲食不得流利為膈為噎為翻胃也矣丹溪云年高者不治蓋年少之人氣血未虛用藥劫去痰火調其脾胃病不復矣年老之人氣血已虛用藥劫去痰火雖得暫愈其病立復所以然者氣虛則不能運化而生痰血虛則不能滋潤而生火也又云此証切不可用香燥之藥而厚滋味蓋證屬熱燥固不用香燥之藥香能散氣燥能耗血而滋味助火而生痰也有等庸工但見斯疾不

察病因便以峻劑投入而取刻效圖以厚賄不思病危復而不救可不嘆哉

附痞滿

痞滿方論

丹溪云痞者有食積兼濕東垣有法有方心下痞須用枳實炒黃連如稟受充實面蒼骨露氣實之人而心下痞者枳實黃連青皮陳皮枳殼如稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者宜白朮山查神麴麥芽陳皮如

欽定四庫全書 仁齋直指卷七

肥人心下痞者乃有實痰宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石瘦人心下痞乃是溫熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻如食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草豆蔻吳茱萸砂仁痞挾血成窠囊用桃仁紅花香附大黃之類難知云傷寒痞者從血中來從外之內從無形雜病痞者亦從血中來從內之外從有形故無形以苦泄之有形以辛散之又有虛實之殊如實痞大便秘厚朴枳實主之虛痞大便利芍藥陳皮主之飲食所傷而為痞滿者當



|                                                             |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 用藥消導其胸中窒塞欲吐者則宜吐之有氣不運化及陰虛損血者以補虛之劑調之但世俗不明此理往往例用峻快藥下之復痞或致危篤者多矣 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 活人桔梗枳殼湯治傷寒痞氣胸滿欲絕                                            |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 桔梗                                                          |  | 枳殼     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |  | 去穢炒各三兩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 右剉水二盞煎至一盞去滓分作二服                                             |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 半夏瀉心湯治汗下後身寒痞滿而嘔飲食不下                                         |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 半夏                                                          |  | 黃芩     |  |  |  |  |  |  |  |
| 半升                                                          |  | 乾薑     |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗                                                           |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 欽定四庫全書                                                      |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 仁齋直指                                                        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 卷七                                                          |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 人參                                                          |  | 黃連     |  |  |  |  |  |  |  |
| 三兩                                                          |  | 一兩     |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘草                                                          |  | 大棗     |  |  |  |  |  |  |  |
| 三兩                                                          |  | 十二枚    |  |  |  |  |  |  |  |
| 右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升温服一升日三服                                   |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 仲景大黃黃連瀉心湯治心下痞                                               |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 大黃                                                          |  | 黃連     |  |  |  |  |  |  |  |
| 二兩                                                          |  | 一兩     |  |  |  |  |  |  |  |
| 右剉以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服                                         |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 黃連消痞丸                                                       |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 拔粹方                                                         |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 黃連                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兩炒半一                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黃芩                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兩炒三                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 枳實                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一錢兩                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乾生薑                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢三                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 茯苓                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白朮                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炒                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘草                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炙五錢各                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 片薑黃                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半一錢                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陳皮                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半七錢                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 澤瀉                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢一                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半夏                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三泡兩                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 猪苓                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢五                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砂仁                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半三錢                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厚朴                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製五錢                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸溫白湯送下    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消痞丸                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方 拔粹                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黃連                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炒六錢                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 神麴                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炒五錢                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黃芩                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刮黃色六錢                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷七          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 薑黃                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兩各一                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白朮                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兩各一                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人參                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢四                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甘草                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炙二錢                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縮砂仁                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢三                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 橘皮                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢四                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乾生薑                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢二                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 枳實                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色炒黃錢五                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 猪苓                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半二錢                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半夏                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次湯泡七錢五                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一方加澤瀉厚朴                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢各三                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服五七十丸白湯下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 枳實消痞丸                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 枳實                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黃連                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢各五                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乾生薑                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 錢二                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                    |                                  |                      |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 半夏麴 <small>錢三</small>              | 厚朴 <small>錢四</small>             | 人參 <small>錢三</small> |
| 甘草 <small>錢二</small>               | 白朮 <small>錢三</small>             | 茯苓                   |
| 麥芽 <small>錢各二</small>              | 右為末水浸蒸餅丸如梧子大每服三十五丸溫水下            |                      |
| 橘連枳朮丸                              |                                  |                      |
| 白朮 <small>三兩去梗</small>             | 枳實 <small>一兩去麩炒</small>          | 陳皮                   |
| 黃連 <small>酒浸炒各一兩</small>           | 右為末荷葉煮湯打米糊為丸如梧子大每服五十丸食後服         |                      |
| 橘皮枳朮丸 <small>脾胃論</small>           | 治老幼元氣虛弱飲食不消臟腑不調心下痞悶              |                      |
| 枳朮丸 <small>脾胃論</small>             | 治痞消食強胃 <small>並見內傷門</small>      |                      |
| 瓜蒌實丸 <small>濟生方</small>            | 治胸痞痛徹背脇喘急妨急 <small>方見膈噎門</small> |                      |
| 加味補中益氣湯治內傷心下痞 <small>方見內傷門</small> |                                  |                      |
| 有痰而痞加半夏黃連四肢滿閉便難而心下痞加               |                                  |                      |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                                                                                                                    |                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 柴胡黃連甘草大便秘燥加黃連桃仁少加大黃當歸心下痞腹脹加五味子砂仁芍藥嘔逆者加黃連生薑陳皮冬月加黃連丁香藿香食已心下痞別服橘皮枳朮丸如不能食心下痞者勿加止服本方主之                                                                                  | 附嘈雜                     | 嘈雜方論 |
| 丹溪云嘈雜是痰因火動治痰為先薑汁炒黃連入痰藥用炒山梔子黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛嘈雜此乃食鬱有熱炒山梔薑炒黃連不可無肥人嘈雜二陳湯少加撫芎蒼朮白朮炒山梔子嘈雜若濕痰氣鬱不喜食三補丸加蒼朮倍香附子醫按蔣氏子條云心嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下七八十丸數服而止又云眩暈嘈雜是火動其痰二陳湯加梔子芩連之類戴云此則俗謂之心嘈也 |                         |      |
| 二陳湯 <small>方見痰類</small>                                                                                                                                            | 三補丸 <small>方見損門</small> |      |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七



迪志文化出版有限公司出版

附吞酸

吞酸方論

內經云諸嘔吐酸皆屬於熱又云少陽之勝嘔酸原病式云酸者肝木之味也由火勝制金不能平木則肝木自甚故為酸也如飲食熱則易於酸矣是以肝熱則口酸也或言為寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吞酸故俗醫主於溫和脾胃豈知人之傷於寒也則為病熱蓋傷寒皮毛則腠理閉密陽氣怫鬱而為熱故傷寒熱在表以麻黃湯熱藥發表使腠理開通汗泄熱退而愈也凡內傷冷物者或即陰勝陽而為病寒或寒熱相搏而致腸胃陽氣怫鬱而為熱亦有內傷冷物而反病熱得汗泄身涼而愈也或微而吐為中酸俗謂之醋心法宜溫藥散之亦猶解表之義若久喜酸不已則不宜溫之宜以寒藥下之後以涼藥調之結散熱去則氣和也所以中酸不宜食粘活油膩者謂能令氣鬱不通暢也宜食糲食采蔬能令氣通利也

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七



迪志文化出版有限公司出版

丹溪云或曰吐酸素問明以為熱東垣又言為寒何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火化遂作酸味非熱而何其有鬱積之久不能自湧而出伏於脾胃之間咯不得上咽不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫煖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦可暫解非寒而何素問言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不言外得風寒而作收氣立說欲瀉肺金之實又謂寒藥不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無治濕熱鬱結之法為未合經意予嘗治吞酸用黃連菜萸各炒隨時令迭其佐使蒼朮茯苓為輔佐湯浸炒餅為小丸吞之仍告以糲食蔬菜自養則病易安

藿香安胃散

方見脾  
胃門

脾胃不和

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七



迪志文化出版有限公司出版

|                          |                           |                           |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 丁香<br><small>一兩</small>  | 半夏                        | 陳皮<br><small>各五兩</small>  |
| 茯苓<br><small>三兩</small>  | 甘草<br><small>一兩半</small>  |                           |
| 右咬咀每服四錢水煎入生薑三片煎服         |                           |                           |
| 麵朮丸治中脘宿食留飲酸蜚心痛或口吐清水      |                           |                           |
| 神朮<br><small>炒三兩</small> | 蒼朮<br><small>一兩半</small>  | 陳皮<br><small>一兩</small>   |
| 右為末生薑汁煮神朮為丸每七十丸薑湯下       |                           |                           |
| 黃連清化丸                    |                           |                           |
| 黃連<br><small>一兩</small>  | 吳茱萸<br><small>一錢</small>  | 桃仁<br><small>二十四箇</small> |
| 陳皮<br><small>半兩</small>  |                           |                           |
| 右為末神朮糊丸茱豆大每服百丸薑湯下        |                           |                           |
| 丹溪經驗方                    |                           |                           |
| 茱萸<br><small>一兩</small>  | 陳皮                        |                           |
| 蒼朮<br><small>米泔浸</small> | 黃連<br><small>陳壁土炒</small> | 黃芩<br><small>如土炒</small>  |
| 桔梗                       | 茯苓<br><small>各一兩</small>  |                           |
| 右為末神朮糊丸茱豆大每服二三十丸時時津液下食後服 |                           |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 附六鬱                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 六鬱方論 |
| 鬱者六氣血食痰濕熱結聚不得發越當升不得升當降不得降者是也丹溪云血氣冲和百病不生一有怫鬱諸病生焉故人身諸病多生於鬱或久病而生鬱矣戴氏曰氣鬱者胸脇疼痛脉沉而澀血鬱者四肢無力能食便紅脉沉芤結食鬱者噯酸腹飽不喜飲食人迎脉平氣口緊盛痰鬱者動則喘息寸脉沉滑濕鬱者周身走痛或關節疼痛遇陰寒而發脉沉細緩熱鬱者瞤悶尿赤脉沉而數內經曰五鬱者金鬱泄之謂滲泄解表於小便也木鬱達之謂吐之令其條達也水鬱折之謂抑之制其衝逆也火鬱發之謂汗之令其疎散也土鬱奪之謂下之無壅礙也此所謂六鬱者或七情之鬱遏或寒熱之交侵故為九氣怫鬱之候或雨濕之侵凌或酒漿之積聚故謂留飲濕鬱之疾熱鬱而成痰痰鬱而成癖血鬱而成癥食鬱而成痞滿此必然之理也 |      |



丹溪治六鬱方法

氣鬱

香附 童便浸

蒼朮 米泔浸

撫芎

濕鬱

白芷

蒼朮

川芎

茯苓

痰鬱

海石

香附

南星 薑製

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

瓜蒌

一本無南星瓜蒌有蒼朮川芎梔子

熱鬱

山梔 炒

青黛

香附

蒼朮

撫芎

血鬱

桃仁 去皮

紅花

青黛

川芎 撫芎亦可

香附

食鬱

蒼朮

香附

山查

神麴 炒

針砂 醋炒七次研極細

諸鬱春加芎夏加苦參秋冬加吳茱萸

凡藥在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假令食在氣上氣升則食降餘倣此

越麴丸

神麴 炒

香附 童便浸一宿

蒼朮

川芎

越梔 炒各等分

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷七

右為細末水丸萊豆大每服五七十丸溫水下

六鬱湯解諸鬱

陳皮 去白一錢

半夏 湯泡七次

蒼朮 米泔浸

撫芎 各錢

赤茯苓

梔子 炒各七分

香附 二錢

甘草 炙半錢

砂仁 研細五分

右細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞溫服

○如氣鬱加烏藥木香檳榔紫蘇乾薑倍香附砂仁

○如濕鬱加白朮倍蒼朮○如熱鬱加黃連倍梔子



○如痰鬱加南星枳殼小皂莢○如血鬱加桃仁紅  
花牡丹皮○如食鬱加山查神麴麥蘖麴

升發二陳湯治痰鬱火邪在下焦大小便不利此藥能  
使大便潤而小便長

陳皮

白去

撫芎

茯苓

錢各一

半夏

半一錢

升麻

防風

甘草

柴胡

分各五

右細切作一服加生薑三片水一盞半煎至一盞溫

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷七

服

升陽散火湯治熱鬱

方見火門

火鬱湯

方見熱門積

仁齋直指卷七

欽定四庫全書

子部

仁齋直指卷八

詳校官太醫院醫士臣趙正范

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄舉人臣曹夢齡





欽定四庫全書

仁齋直指卷八

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

咳嗽

咳嗽方論

江流滔滔日夜無聲狂瀾激石不平則鳴所以咳嗽者痰塞胸膈氣逆不平衝擊而動肺耳然亦何以致此哉曰感風傷冷挾熱受濕淤血停水與夫肺實肺虛皆能

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷八

壅痰而發嗽也夫肺為嬌臟外主一身之皮毛內為五臟之華蓋形寒飲冷最易得寒燥氣鬱蒸最易生熱惟其易為冷熱所以內外交侵動則邪氣窒塞矣此非不平而鳴乎感風者鼻塞聲重傷冷者淒清怯寒挾熱為焦煩受濕為纏滯瘀血則膈間脛悶停水則心下怔忡或實或虛痰之黃白唾之稀稠從可知也治嗽大法肺脉浮為風邪所客以發散取之肺脉實為氣壅內熱以清利行之脉濡散為肺虛以補肺安之其間久嗽之人



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷八

曾經解利以致肺胃俱冷飲食不進則用溫中助胃加和平治嗽等輩至若酒色過度虛勞少血津液內耗心火自炎遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮其嗽連續而不已惟夫血不榮肌故邪在皮毛皆能入肺而自背得之尤速此則人參芎歸所不可無一種傳注病涉邪惡五臟反尅毒害尤深近世率用蛤蚧天靈蓋桃柳枝丹砂雄黃安息香蘇合香圓通神之劑然則咳嗽證治於此可以問津索途矣抑猶有說焉肺出氣也腎納氣也肺為氣之主腎為氣之藏凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者此腎虛不能收氣歸元也當以補骨脂安腎圓主之母徒從事於寧肺○諸氣諸痰咳嗽喘壅之煩須用枳殼為佐枳殼不惟寬中又能行其氣氣下痰下他證自平

咳嗽證治

華蓋散治肺感風寒痰壅咳嗽

麻黃  
節

紫蘇子  
炒

杏仁  
尖炒



迪志文化出版有限公司出版

|                              |                           |                        |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 橘紅                           | 桑白皮 <small>炒</small>      | 赤茯苓 <small>各一兩</small> |
| 甘草 <small>炙半兩</small>        |                           |                        |
| 右細剉每服二錢半薑棗煎食後服隨意加製半夏         |                           |                        |
| 添薑煎                          |                           |                        |
| 加減麻黃湯治肺感寒邪咳嗽                 |                           |                        |
| 麻黃 <small>去節一兩</small>       | 辣桂                        | 甘草 <small>炙各半兩</small> |
| 杏仁 <small>五十枚去皮尖微炒別研</small> | 陳皮                        |                        |
| 半夏 <small>製各半兩</small>       |                           |                        |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷八               |                           |                        |
| 右細剉拌和杏仁每三錢紫蘇三葉薑四片煎服          |                           |                        |
| 溫肺湯治肺虛感冷咳嗽嘔吐痰沫               |                           |                        |
| 乾薑                           | 辣桂                        | 甘草 <small>炙</small>    |
| 半夏 <small>製</small>          | 陳皮                        | 北五味子                   |
| 杏仁 <small>去皮尖各一兩</small>     | 細辛                        | 阿膠 <small>炒各半兩</small> |
| 右麤散每二錢半薑棗煎服                  |                           |                        |
| 三物湯治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅             |                           |                        |
| 麻黃 <small>不去節</small>        | 杏仁 <small>不去皮尖各一兩</small> | 甘草 <small>不炙半兩</small> |



|                         |                         |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 右剉散每二錢半薑五片煎服            |                         |                       |
| 金沸草散治上壅熱嗽               |                         |                       |
| 荊芥穗 <small>二兩</small>   | 旋覆花 <small>去梗</small>   | 麻黃 <small>去節</small>  |
| 北前胡 <small>各一兩半</small> | 半夏 <small>製</small>     | 赤芍藥                   |
| 甘草 <small>炒各半兩</small>  |                         |                       |
| 右細剉每二錢半加炒葶藶半錢薑四片煎服如咽    |                         |                       |
| 喉焦燥加朴硝食後又治傷風鼻塞涕流壅嗽若聲    |                         |                       |
| 啞嗽不止兼服人參欵花膏             |                         |                       |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷八          |                         |                       |
| 人參欵花膏                   |                         |                       |
| 欵冬花                     | 紫苑草 <small>洗去土</small>  | 人參                    |
| 北五味子                    | 桑白皮 <small>炒等分</small>  |                       |
| 右為末煉蜜圓小彈大含化一圓或淡薑湯嚼下若    |                         |                       |
| 身熱口乾兼服天麻防風圓             |                         |                       |
| 天麻防風圓                   |                         |                       |
| 人參                      | 天麻                      | 防風 <small>各一兩</small> |
| 全蝎 <small>炒</small>     | 直僵蠶 <small>炒各半兩</small> | 硃砂 <small>研</small>   |



|                                 |                           |                          |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 雄黃<br><small>研</small>          | 甘草<br><small>炙各</small>   | 牛黃<br><small>錢一</small>  |
| 麝<br><small>字一</small>          |                           |                          |
| 右細末煉蜜圓桐子大每二圓紫蘇薄荷湯嚙下             |                           |                          |
| 清肺飲治肺氣上熱咳嗽                      |                           |                          |
| 前胡                              | 荊芥                        | 桑白皮<br><small>炒</small>  |
| 甘草<br><small>炙</small>          | 枳殼<br><small>製各</small>   | 知母                       |
| 貝母<br><small>炒去心</small>        | 腦荷                        | 赤茯苓                      |
| 北梗                              | 紫蘇                        | 阿膠<br><small>炒</small>   |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷八</small>   |                           |                          |
| 杏仁<br><small>皮去</small>         | 天門冬<br><small>去心各</small> |                          |
| 右剉散每三錢薑三片烏梅一枚食後煎服如更內            |                           |                          |
| 實與解毒雄黃圓<br><small>方在積熱門</small> |                           |                          |
| 黃連阿膠圓治肺熱或咯血                     |                           |                          |
| 黃連<br><small>淨三兩</small>        | 赤茯苓<br><small>二兩</small>  | 阿膠<br><small>炒一兩</small> |
| 右黃連茯苓同末水調阿膠和衆手圓桐子大每三            |                           |                          |
| 十圓食後米飲下黃連赤茯苓能抑心火則肺得其            |                           |                          |
| 清                               |                           |                          |

|                                                             |      |       |      |           |
|-------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------|
| 不換金正氣散治傷溫咳嗽                                                 |      |       | 方見寒類 | 加赤茯苓生乾薑煎服 |
| 大阿膠圓治肺虛客熱咳嗽咯血嘔血                                             |      |       |      |           |
| 阿膠                                                          | 炒熱   | 地黃    | 淨    | 白茯苓       |
| 北五味子                                                        | 山藥   | 各一兩   | 貝母   | 去心炒       |
| 百部                                                          | 栝子仁  | 茯苓    | 神    |           |
| 丹參                                                          | 杜仲   | 去麤皮剉炒 | 麥門冬  | 去心各半兩     |
| 遠志                                                          | 浸去心炒 | 人參    | 防風   | 各一分       |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八                                        |      |       |      |           |
| 右細末煉蜜圓彈子大每一圓少水略煎食後臨卧服或金沸草散加腦荷煎湯嚙下凡嗽藥不效覺胸膈腥悶乃宿血乘肺黑豆入紫蘇生薑煎汁與之 |      |       |      |           |
| 桑皮散治上焦有熱壅血腥悶嗽聲連併氣不得透                                        |      |       |      |           |
| 腦荷                                                          | 北梗   | 川芎    |      |           |
| 防風                                                          | 桑白皮  | 炒     | 黃芩   |           |
| 北前胡                                                         | 柴胡   | 紫蘇    |      |           |
| 赤茯苓                                                         | 枳殼   | 製各一分  | 甘草   | 炙一分半      |





|                   |  |            |  |     |  |     |  |                      |  |
|-------------------|--|------------|--|-----|--|-----|--|----------------------|--|
| 右細剉每三錢薑五片烏梅半箇食後煎服 |  | 養肺湯治肺壅上氣痰嗽 |  | 人參  |  | 紫苑  |  | 赤茯苓                  |  |
| 杏仁                |  | 真蘇子        |  | 陳皮  |  | 欵冬花 |  | 半夏麴                  |  |
| 北梗                |  | 甘草         |  | 分   |  | 炙等  |  | 右為麤末每三錢薑四片烏梅半箇食後煎服寒者 |  |
| 加桂                |  | 寧嗽湯諸嗽通用    |  | 桑白皮 |  | 紫蘇  |  | 細辛                   |  |
| 北五味子              |  | 橘皮         |  | 半夏  |  | 製   |  | 茯苓                   |  |
| 杏仁                |  | 去皮         |  | 縮砂仁 |  | 枳殼  |  | 製                    |  |
| 北梗                |  | 甘草         |  | 分   |  | 炒等  |  | 右剉散每三錢薑四片烏梅半箇食後煎服    |  |
| 人參潤肺散治咳嗽喘急痰壅鼻塞    |  | 麻黃         |  | 杏仁  |  | 貝母  |  | 各一兩                  |  |
| 去節                |  | 去皮         |  | 炙炒  |  | 去心  |  | 炙炒                   |  |

|                       |  |               |  |              |  |                      |  |                       |  |
|-----------------------|--|---------------|--|--------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| 人參                    |  | 阿膠            |  | 甘草           |  | 炙各                   |  | 橘紅                    |  |
| 北梗                    |  | 分             |  | 各一           |  | 右麤末每二錢半紫蘇三葉煎服亦能發散小兒通 |  | 用                     |  |
| 冷嗽寒痰方橘皮半夏湯大七氣湯夾和每三錢薑七 |  | 片棗二箇同煎吞白圓子三十粒 |  | 加味半夏茯苓湯治痰多咳嗽 |  | 半夏                   |  | 製二                    |  |
| 兩半                    |  | 茯苓            |  | 一兩           |  | 陳皮                   |  | 五味子                   |  |
| 各一                    |  | 人參            |  | 細辛           |  | 甘草                   |  | 炙各                    |  |
| 半兩                    |  | 右剉散每四錢薑七厚片煎服  |  | 南星散治風氣動痰發嗽   |  | 生南星                  |  | 一兩                    |  |
| 枳殼                    |  | 製             |  | 細辛           |  | 各半                   |  | 木香                    |  |
| 甘草                    |  | 炙各            |  | 一分           |  | 右咬咀每服三錢薑七厚片慢火熟煎服     |  | 人參芎歸湯治虛勞少血津液內耗心火自炎燥熱乘 |  |



|                  |     |                 |      |     |
|------------------|-----|-----------------|------|-----|
| 肺咳嗽咯血及血不榮肌動輒毛寒咳嗽 | 當歸  | 川芎              | 白芍藥  | 各二分 |
| 人參               | 半夏  | 製               | 橘皮   |     |
| 赤茯苓              | 阿膠  | 炒               | 細辛   |     |
| 北五味子             | 甘草  | 炙各一分            |      |     |
| 右剉每服三錢薑四片棗二箇煎服   |     |                 |      |     |
| 人參芎歸湯大阿膠圓        | 前方見 | 兼服治腎虛勞嗽         |      |     |
| 人參胡桃湯夾和定肺湯       | 喘方見 | 治勞氣喘急           |      |     |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷八   |     |                 |      |     |
| 七寶散治肺痿勞嗽久嗽       |     |                 |      |     |
| 人參               | 款冬花 | 鍾乳石             |      |     |
| 驚管石              | 研並生 | 胡礬              | 煨各二錢 | 辣桂  |
| 甘草               | 錢各一 |                 |      |     |
| 右細末臨卧以少許嚥下兩次     |     |                 |      |     |
| 黃耆建中湯            | 濕方見 | 加半夏麴生乾薑五味子同煎空心吞 |      |     |
| 安腎圓              | 方見水 | 治腎經虛寒咳嗽痰唾而色黯黑小腹 |      |     |
| 動氣作痛             | 飲門  |                 |      |     |

|                      |               |      |        |      |     |
|----------------------|---------------|------|--------|------|-----|
| 消膿飲治肺有癰膿腥氣上衝嘔吐咳      | 生南星           | 兩一   | 知母     | 貝母   | 去心炒 |
| 生地黃                  | 阿膠            | 炒    | 川芎     |      |     |
| 桑白皮                  | 炒             | 甘草   | 炙各三分   | 防風   |     |
| 射干                   | 北梗            | 天門冬  | 去心     |      |     |
| 腦荷                   | 杏仁            | 皮不去  | 半夏     | 製    |     |
| 紫蘇葉                  | 白芷            | 白及   | 各半兩    |      |     |
| 右剉散每四錢薑七片烏梅一箇食後煎服    |               |      |        |      |     |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷八       |               |      |        |      |     |
| 雄黃散治傳疰勞嗽肺管有虫令人喉癢     |               |      |        |      |     |
| 雄黃                   | 安息香           | 各一分  | 露蜂房    | 去子燒灰 |     |
| 桃仁                   | 去皮炒           | 麝    | 少許     |      |     |
| 右為末每用一錢生艾葉入生蜜研汁夾和臨卧含 |               |      |        |      |     |
| 化仍燒艾以管子吸煙熏喉          |               |      |        |      |     |
| 蘇合香圓                 |               |      |        |      |     |
| 安息香                  | 二兩別為末用無灰酒一升熬膏 | 蘇合香油 | 一兩入安息膏 |      |     |
| 白木                   | 內             | 丁香   |        |      |     |



|                                            |                          |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 青木香                                        | 白檀香                      | 沉香                    |
| 華撥                                         | 香附 <small>淨</small>      | 苛子 <small>煨取肉</small> |
| 烏犀 <small>鎔屑</small>                       | 硃砂 <small>研末飛各二兩</small> | 薰陸香                   |
| 龍腦 <small>研各一兩</small>                     | 麝香 <small>一兩半</small>    |                       |
| 右為細末入研藥拌和用安息香膏并煉白蜜和劑每一大圓沸湯化下前氣血風類後諸痛嘔逆類並用此 |                          |                       |
| 咳逆方                                        |                          |                       |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八                       |                          |                       |
| 蘇合香圓用丁香柿蒂煎湯調下                              |                          |                       |
| 噫逆即咳逆胃寒所致也良薑為要藥人參白茯苓佐之良薑溫胃能解散胃中風邪          |                          |                       |
| 安腎圓 <small>方見諸虛門</small> 凡咳嗽暴重覺氣從臍下逆奔而上者   |                          |                       |
| 蓋腎虛氣不歸元補骨脂安腎圓主之                            |                          |                       |
| 附諸方                                        |                          |                       |
| 參蘇飲治上膈有熱咳嗽聲重 <small>方見傷風門</small>          |                          |                       |
| 五物湯 <small>澹療方</small> 治風寒咳嗽肺氣喘急           |                          |                       |

|                                                         |                       |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 麻黃 <small>不去節</small>                                   | 杏仁 <small>不去皮</small> | 甘草 <small>生用</small> |
| 荊芥穗                                                     | 桔梗 <small>各等分</small> |                      |
| 右咬咀薑三片同煎溫服咽痛甚者煎熱後加朴硝少許一方去桔梗荊芥用半夏枳實等分                    |                       |                      |
| 人參荊芥散 <small>濟生方</small> 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語不出咽乾項強鼻流清涕      |                       |                      |
| 陳皮 <small>去白</small>                                    | 荊芥穗                   | 桔梗                   |
| 半夏 <small>湯洗七次</small>                                  | 細辛 <small>洗去土</small> | 甘草 <small>炙</small>  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八                                    |                       |                      |
| 人參                                                      | 杏仁 <small>去皮尖</small> | 通草                   |
| 麻節 <small>去根</small>                                    |                       |                      |
| 右咬咀每服四錢水盞半薑五片煎八分食後溫服                                    |                       |                      |
| 消風百解散 <small>和濟方</small> 治咳嗽聲重身熱頭疼 <small>方見傷風門</small> |                       |                      |
| 加減三奇湯 <small>東垣方</small> 治咳嗽上氣喘促胸膈不利                    |                       |                      |
| 枳梗                                                      | 陳皮                    | 甘草                   |
| 青皮                                                      | 人參                    | 紫蘇                   |
| 桑白皮 <small>各五錢</small>                                  | 半夏 <small>七錢</small>  | 杏仁 <small>三錢</small> |



|                          |  |             |  |                             |  |                 |  |                          |  |                          |  |    |  |    |  |                           |  |    |  |                          |  |                 |  |                              |  |               |  |                      |  |      |  |    |  |     |  |    |  |    |  |     |  |                        |  |     |  |                          |  |     |  |                         |  |                         |  |                         |  |                        |  |                         |  |                          |  |
|--------------------------|--|-------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----|--|----|--|---------------------------|--|----|--|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------------|--|----------------------|--|------|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|-----|--|------------------------|--|-----|--|--------------------------|--|-----|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|
| 五味子<br><small>錢四</small> |  | 右咬咀每六七錢入薑煎服 |  | 加減瀉白散<br><small>方東垣</small> |  | 治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘急 |  | 桑白皮<br><small>兩一</small> |  | 地骨皮<br><small>錢七</small> |  | 陳皮 |  | 青皮 |  | 五味子<br><small>錢各五</small> |  | 人參 |  | 白茯苓<br><small>錢一</small> |  | 右咬咀每服半兩水煎入粳米二十粒 |  | 人參五味子散<br><small>方聖惠</small> |  | 治男女老稚諸虛百損氣血勞傷 |  | 涎喘欬膿或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏 |  | 一切虛損 |  | 人參 |  | 五味子 |  | 桔梗 |  | 白朮 |  | 白茯苓 |  | 甘草<br><small>炙</small> |  | 熟地黃 |  | 當歸<br><small>兩焙半</small> |  | 地骨皮 |  | 前胡<br><small>苗去</small> |  | 桑白皮<br><small>炒</small> |  | 枳殼<br><small>去穰</small> |  | 黃芪<br><small>炙</small> |  | 陳皮<br><small>白去</small> |  | 柴胡<br><small>錢各三</small> |  |
|--------------------------|--|-------------|--|-----------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----|--|----|--|---------------------------|--|----|--|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------------|--|----------------------|--|------|--|----|--|-----|--|----|--|----|--|-----|--|------------------------|--|-----|--|--------------------------|--|-----|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|

|                                                  |  |       |  |                        |  |                         |  |                         |  |    |  |                         |  |                        |  |                           |  |    |  |    |  |                       |  |       |  |     |  |     |  |    |  |                          |  |                               |  |              |  |
|--------------------------------------------------|--|-------|--|------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----|--|-------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|----|--|----|--|-----------------------|--|-------|--|-----|--|-----|--|----|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|--------------|--|
| 右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服食後服日三次煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿膠煎尤妙 |  | 諸般嗽不已 |  | 粟殼<br><small>製</small> |  | 烏梅<br><small>核去</small> |  | 陳皮<br><small>白去</small> |  | 木香 |  | 人參<br><small>蘆去</small> |  | 桔梗<br><small>炒</small> |  | 杏仁<br><small>尖去皮炒</small> |  | 石膏 |  | 甘草 |  | 右咬咀每服八錢薑水二盞煎至八分去滓溫服食後 |  | 止嗽烟筒方 |  | 冬花蕊 |  | 驚管石 |  | 雄黃 |  | 艾葉<br><small>各等分</small> |  | 右為末用帛捲筒內用火點烟入口內吞下就用水吞一口以塞烟氣立効 |  | 加味人參紫苑散治虛勞咳嗽 |  |
|--------------------------------------------------|--|-------|--|------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----|--|-------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|----|--|----|--|-----------------------|--|-------|--|-----|--|-----|--|----|--|--------------------------|--|-------------------------------|--|--------------|--|



大寧嗽湯勞嗽諸嗽通用神効 並見虛勞門

咳嗽治例 出明醫雜著

王節齋曰咳嗽謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰咳嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺生氣而聲出也須分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之斂之降之則治虛之法也

欽定四庫全書 仁齋直指卷八

主方

杏仁 去皮尖 白茯苓 各一錢 橘紅 七分

五味子 桔梗 甘草 各五分

春作多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏 各一錢

麥門冬 炒 黃芩知母 各五分

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛涼解散加防風薄荷

紫蘇炒黃芩麥門冬 各一錢

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒

黃芩麥門冬石膏 各一錢

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮 各一錢 防

風黃芩山梔 各五錢炒

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生乾

薑防風 各一錢 肺經素有熱者再加酒炒黃芩知母

各五分 若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本川芎前胡

柴胡 各一錢

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星 薑汁炒 濕痰脾困

欽定四庫全書 仁齋直指卷八

少食加白朮蒼朮有痰而口燥咽乾勿用半夏南

星宜加知母 蜜水拌炒 貝母瓜蒌仁黃芩 炒

若夏月熱痰或素熱有痰加黃芩黃連知母石膏

上半日欬者胃中有火加貝母石膏黃連五更嗽者

同治

黃昏欬者火浮於肺不宜正用寒涼藥宜加五味子

訶子皮斂而降之

若咳嗽久肺虛滋氣補血加人參黃芪阿膠當歸生



薑天門冬欬冬花馬兜鈴酒芍藥之類肺熱咳喘  
去人參用沙參此兼補氣血也

若午後欬者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火如川芎  
當歸芍藥熟地黃黃柏知母竹瀝薑汁天門冬瓜  
萸仁貝母此專補陰血也

若火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開鬱消痰用訶子皮  
炒香附瓜萸仁半夏麴海石青黛黃芩為末蜜調  
為丸噙化仍服前補陰降火湯藥失治則成勞

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷八

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜萸仁貝母海石青  
黛半夏麴軟石膏山楂子枳實薑炒黃連為末蜜  
調噙化

若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母貝母桑  
白皮亦於前肺虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血  
多是肺受熱邪氣得熱而變為火火盛而陰虛不  
得安寧從火上升故治宜瀉火滋陰忌用人參等  
甘溫補氣之藥然亦有氣虛而咳血者則宜用人

參黃芪欬冬花之藥但此等證不多耳  
因咳而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰  
為重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬  
嗽只治其痰消其積而欬自止不必用肺藥以治  
嗽也

針灸法風門二穴

在背二椎下  
各開寸半

肺俞二穴

三椎下  
各寸半

三里

二穴

見前

附肺痿肺癰

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷八

肺痿方論

金匱曰熱在上焦者因欬為肺痿得之或從汗出或從  
嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重  
亡津液故得之寸口脉數其人欬口中反有濁唾涎沫  
者為肺痿若口中辟辟燥咳即胸中隱隱痛脉反滑數  
此為肺癰欬唾膿血脉數虛者為肺痿數實者為肺癰  
欬傷肺葉成也丹溪云宜補血養肺養氣清金虛者用  
人參平肺散治之





|                                           |  |    |    |                       |    |                         |                        |                           |                                                       |                      |  |                         |                      |                     |                        |    |                        |                       |                         |                          |                         |                          |                                       |                                           |
|-------------------------------------------|--|----|----|-----------------------|----|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 紫苑散 <small>振 粹</small><br>治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺痿變癰 |  | 人參 | 桔梗 | 茯苓 <small>各一錢</small> | 甘草 | 阿膠 <small>炒 各五分</small> | 五味子 <small>十五粒</small> | 右咬咀水煎服一云各等分水二盞生薑三片煎至一盞食前服 | 人參平肺散 <small>振 粹</small><br>治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八 |  | 桑白皮 <small>炒 一兩</small> | 知母 <small>七錢</small> | 甘草 <small>炙</small> | 地骨皮 <small>各半兩</small> | 青皮 | 五味子 <small>三百箇</small> | 茯苓 <small>各四錢</small> | 陳皮 <small>去白 半兩</small> | 天門冬 <small>去心 四錢</small> | 如熱加黃芩 <small>四錢</small> | 紫蘇葉半夏 <small>各半兩</small> | 右咬咀每服五錢水二盞生薑三片煎至八分去滓溫服或為末薑汁丸彈子大噉化亦得食後 | 知母茯苓湯 <small>宣明方</small><br>治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗 |
|-------------------------------------------|--|----|----|-----------------------|----|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|

|    |                         |    |    |    |                      |     |    |                       |                        |    |                       |                           |                                           |                      |  |                      |                      |                      |                       |                 |                               |                                       |                                                       |                |                              |                       |
|----|-------------------------|----|----|----|----------------------|-----|----|-----------------------|------------------------|----|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 茯苓 | 甘草 <small>炙 各一兩</small> | 知母 | 薄荷 | 白朮 | 柴胡 <small>去苗</small> | 欵冬花 | 桔梗 | 麥門冬 <small>去心</small> | 阿膠 <small>各二錢炒</small> | 川芎 | 黃芩 <small>各半兩</small> | 右咬咀每服一兩水二盞生薑十片煎至一盞去滓通口服食後 | 生薑甘草湯 <small>千金方</small><br>治肺痿咳唾涎痰不止咽燥而渴 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八 |  | 生薑 <small>五兩</small> | 人參 <small>二兩</small> | 甘草 <small>四兩</small> | 大棗 <small>十五枚</small> | 右四味以水七升煮取三升分溫三服 | 七寶散治肺痿勞嗽久嗽 <small>方見前</small> | 保和丸 <small>葛氏方</small><br>治勞嗽肺成痿者服之決効 | 潤肺膏 <small>葛氏方</small><br>治久肺燥成痿 <small>並見勞療門</small> | 葶歷大棗瀉肺湯治肺癰喘不得卧 | 葶歷 <small>熬令黃色搗丸如彈子大</small> | 大棗 <small>十二枚</small> |
|----|-------------------------|----|----|----|----------------------|-----|----|-----------------------|------------------------|----|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|



右先以水三升煮棗取二升去棗內葶歷煮取一升頓服

桔梗湯 方金匱 治欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁

唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗 兩二 甘草 兩二

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也

桔梗湯 方濟生 治肺癰咳嗽膿血咽喉多渴大小便赤澀

桔梗 去蘆 貝母 去心膜 當歸 去酒浸蘆

欽定四庫全書 仁齋直指 卷八

瓜蒌子 枳殼 去穰炒 薏苡仁 炒

桑白皮 炙蜜水 防己 兩各二 黃芪 兩去蘆半

甘草節 用生 杏仁 去皮尖 百合 半蒸各雨

右呔咀每服五錢水盞半生薑五片煎八分不拘時

服如大便秘加大黃小便赤少加木通

消膿飲治肺癰膿腥氣上衝而嘔欬嗽 方見前

針灸法肺俞二穴 穴法 膻中一穴 在兩乳相係玉下一寸六分又名元兒仰

之取

喘嗽

喘嗽方論

肺主氣也一呼一吸上升下降榮衛息數往來流通安有所謂喘惟夫邪氣伏藏癰涎浮湧呼不得呼吸不得吸於是上氣促急填塞肺腕激亂爭鳴如鼎之沸而喘之形狀具矣有肺虛挾寒而喘者有肺實挾熱而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂氣鬱肺脹而喘者又有胃絡不和喘出於陽明之氣逆真元耗損喘生於腎氣之

欽定四庫全書 仁齋直指 卷八

上奔如是等類皆當審證而主治之肺虛肺寒必有氣乏表怯冷痰如水之證法當溫補如官桂阿膠之類是也肺實肺熱必有壅盛胸滿外閔上炎之狀法當清利如桑白皮葶歷之類是也水氣者漉漉有聲怔忡浮腫與之逐水利小便如小半夏茯苓湯五苓散輩驚憂者惕惕悶悶引息鼻張與之寬中下氣如四七湯桔梗枳殼湯輩陽明之氣下行今逆而上行古人以通利為戒如分氣紫蘇飲指迷七氣湯加半夏二陳湯加縮砂施



之為當真陽虛憊腎氣不得歸元固有以金石鎮墜助陽接真而愈者然亦不可峻驟且先與安腎圓八味圓輩否則人參煎湯下養正丹主之雄黃麻黃馬兜鈴漢

防己雞內金諸品非不主喘也如前治法大要究其受病之原至若傷寒發喘表汗裏下脚氣喘滿疏導收功此則但療本病其喘自安圓機之士可以舉隅而反矣雖然喘有利下而愈者亦有因瀉而殂者喘有數年沉痼而復瘳者亦有忽因他疾大喘而不救者汗出髮潤

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷八

喘者為肺絕身汗如油喘者為命絕直視譫語喘滿者不治諸有篤病正氣欲絕之時邪氣盛行多壅逆而為喘然則喘之危惡又安可以尋常目之

### 喘嗽證治

九寶湯經年喘嗽通用常服屢效

麻黃  
去節

橘紅

腦荷  
各一兩

辣桂

紫蘇

桑白皮  
炒

杏仁  
去皮尖

大腹子  
連皮

甘草  
炙各半兩

右細剉每服三錢薑五片烏梅一箇水煎食後臨卧服或入童子小便半盞同煎尤妙

定肺湯治上氣喘嗽

紫苑茸

北五味子

橘紅

杏仁  
去皮尖略炒

甘草  
炙

真蘇子  
炒

桑白皮  
炒

半夏  
製

枳殼  
製等分

右細剉每三錢薑五片紫蘇五葉食後煎服

調降湯治喘嗽

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷八

枳殼  
製一兩

半夏  
製

北梗

青皮

陳皮

真蘇子

檳榔

茯苓

葶蘆  
隔紙炒各半兩

木香

白豆蔻仁

縮砂仁

紫蘇葉  
各二錢半

甘草  
炙三分

右剉散每三錢薑五片煎服

杏蘇飲治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉  
二兩

五味子

大腹皮



|                             |                              |                           |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 烏梅肉                         | 杏仁<br><small>去皮尖各一兩半</small> | 陳皮                        |
| 北梗                          | 麻黃<br><small>節去</small>      | 桑白皮<br><small>炒</small>   |
| 阿膠<br><small>三分炒各</small>   | 紫苑                           | 甘草<br><small>炒各一兩</small> |
| 右咬咀每三錢薑五片煎服                 |                              |                           |
| 五味子湯治寒喘                     |                              |                           |
| 北五味子                        | 杏仁<br><small>去皮炒</small>     | 橘紅<br><small>各一兩</small>  |
| 麻黃<br><small>去節一兩半</small>  | 甘草<br><small>炙</small>       | 生乾薑                       |
| 辣桂<br><small>各半兩</small>    |                              |                           |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷八              |                              |                           |
| 右麤末每服二錢半蘇三葉煎服肺虛加炒阿膠喘        |                              |                           |
| 甚加馬兜鈴                       |                              |                           |
| 人參胡桃湯治肺虛發喘氣乏                |                              |                           |
| 人參<br><small>一寸揀者</small>   | 胡桃肉<br><small>二箇去殼</small>   |                           |
| 右切碎薑錢五片棗二枚食後臨卧煎服蓋人參定        |                              |                           |
| 喘帶皮胡桃欽肺夷堅志方                 |                              |                           |
| 三物湯<br><small>方見咳嗽門</small> | 寒證喘者加生乾薑辣桂熱證喘者加              |                           |
| 葶藶腦荷煎畢入朴硝少許                 |                              |                           |

|                              |                          |                           |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 玉華散清肺定喘                      |                          |                           |
| 甘葶藶<br><small>香焙</small>     | 桑白皮<br><small>炒</small>  | 天門冬<br><small>去心</small>  |
| 馬兜鈴                          | 半夏<br><small>製</small>   | 紫苑                        |
| 杏仁<br><small>去皮尖</small>     | 貝母<br><small>炮</small>   | 百合                        |
| 人參<br><small>各半兩</small>     | 百部                       | 甘草<br><small>炙各一分</small> |
| 右剉散每服二錢半薑四片大棗三枚煎服            |                          |                           |
| 小青龍湯<br><small>方見水飲門</small> | 本方去麻黃加杏仁去皮三兩治水           |                           |
| 氣喘嗽若小腹滿更加茯苓                  |                          |                           |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷八               |                          |                           |
| 郁李仁圓治水氣乘肺動痰作喘身體微腫            |                          |                           |
| 葶藶<br><small>隔紙炒</small>     | 杏仁<br><small>去皮尖</small> | 防己                        |
| 郁李仁<br><small>炒</small>      | 真蘇子                      | 陳皮                        |
| 赤茯苓<br><small>各半兩</small>    |                          |                           |
| 右末煉蜜圓桐子大每三四十圓食後生薑紫蘇湯下        |                          |                           |
| 神秘湯治水氣作喘                     |                          |                           |
| 陳皮                           | 北梗                       | 紫蘇                        |



|                                     |                           |                         |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 人參                                  | 五味子                       | 檳榔                      |
| 桑白皮 <small>炒</small>                | 半夏 <small>製</small>       | 甘草 <small>炙等分</small>   |
| 右剉散每服三錢薑五片煎服                        |                           |                         |
| 小半夏茯苓湯五苓散 <small>方見水飲門</small>      |                           |                         |
| 四七湯治驚憂氣過上喘                          |                           |                         |
| 半夏 <small>製二兩半</small>              | 茯苓 <small>二兩</small>      | 厚朴 <small>製一兩半</small>  |
| 紫蘇葉 <small>一兩</small>               |                           |                         |
| 右咬咀每服三錢半薑七片棗二枚煎服                    |                           |                         |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八                |                           |                         |
| 桔梗枳殼湯指迷七氣湯分氣紫蘇湯 <small>方見氣門</small> |                           |                         |
| 二陳湯 <small>方見癰類</small>             |                           |                         |
| 安腎圓 <small>方見水飲門</small>            | 八味圓養正丹 <small>見冷痛</small> | 治腎虛上喘凡腎                 |
| 虛而喘須以人參為佐                           |                           |                         |
| 五靈圓治久喘                              |                           |                         |
| 木香 <small>半兩</small>                | 馬兜零 <small>去殼炒</small>    | 葶藶 <small>微炒各一分</small> |
| 川五靈脂 <small>二兩</small>              |                           |                         |
| 右為細末煉蜜圓桐子大每二十圓杏仁三箇搥碎                |                           |                         |

|                                                        |                                 |                        |     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|
| 薑三片煎湯下                                                 | 雄黃 <small>研</small>             | 白礬 <small>煨</small>    | 木香  |
| 雄黃圓至誠修合治喘                                              | 生葶藶 <small>各一分</small>          | 馬兜零 <small>去殼</small>  | 雞內金 |
| 淡豆豉 <small>各三錢半</small>                                | 信砒 <small>鋒芒瑩者研生研一錢半</small>    |                        |     |
| 右八味各取實分數並細末研米漿煮糊圓如胡椒大每服五圓茶清稍冷臨臥送下加至七圓而止次日飲食勿用熱菜豆生嚼解砒霜毒 |                                 |                        |     |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八                                   |                                 |                        |     |
| 控痰良方 <small>方見痰飲門</small>                              | 治喘嗽                             |                        |     |
| 虛勞喘嗽眩運方                                                |                                 |                        |     |
| 靈砂 <small>一兩研細</small>                                 | 人參                              | 木香 <small>各二錢半</small> |     |
| 大香附 <small>淨</small>                                   | 大紅川椒 <small>去合口并子焙出汗各半兩</small> |                        |     |
| 右細末糕糊圓麻子大每服二十圓空心食前橘皮湯下 <small>川椒引氣歸元</small>           |                                 |                        |     |
| 附諸方                                                    |                                 |                        |     |
| 蘇沉九寶湯 <small>簡易方</small>                               | 治老人小兒素有喘疾遇寒暄不常                  |                        |     |





|                       |  |     |          |      |
|-----------------------|--|-----|----------|------|
| 發則連綿不已咳嗽哮吼夜不得睡        |  | 桑白皮 | 甘草       | 大腹皮  |
| 麻黃                    |  | 官桂  | 薄荷       |      |
| 陳皮                    |  | 紫蘇  | 杏仁       | 各六分  |
| 右咬咀每服三錢水盞半薑三片烏梅半箇煎六分服 |  |     |          |      |
| 五味子湯                  |  | 方活人 | 治喘促脉伏而數者 |      |
| 五味子                   |  | 錢五  | 人參       | 麥門冬  |
|                       |  |     |          | 去心   |
| 杏仁                    |  | 去皮  | 生薑       | 陳皮   |
|                       |  | 尖   |          | 各一錢半 |
| 棗子                    |  | 三枚  |          |      |
| 右咬咀作二服每服水二盞煎至一盞食後溫服   |  |     |          |      |
| 四磨湯治七鬱結上氣喘急           |  |     |          |      |
| 人參                    |  | 檳榔  | 沉香       |      |
| 烏藥                    |  |     |          |      |
| 右件各濃磨水和煎三五沸溫服         |  |     |          |      |
| 千緡湯治痰喘不能卧人扶而坐一服即安     |  |     |          |      |

|                       |  |        |      |        |
|-----------------------|--|--------|------|--------|
| 半夏                    |  | 七箇剉    | 甘草   | 生薑     |
|                       |  | 泡七次    | 寸    | 一指     |
| 皂角                    |  | 一寸     |      |        |
| 右咬咀作一服水煎              |  |        |      |        |
| 丹溪治痰喘方                |  |        |      |        |
| 南星                    |  | 半夏     | 杏仁   |        |
| 瓜蒌仁                   |  | 香附     | 陳皮   | 去白     |
| 皂角灰                   |  | 蘿蔔子    |      |        |
| 右為末神麴糊為丸每服六七十丸薑湯下     |  |        |      |        |
| 五虎湯治喘急痰氣              |  |        |      |        |
| 麻黃                    |  | 七分     | 杏仁   | 甘草     |
|                       |  |        | 去皮尖  | 四分     |
| 細茶                    |  | 炒八分    | 白石膏  | 錢五分    |
| 右作一服白水煎               |  |        |      |        |
| ○風寒傷而喘者三拗湯華蓋散神秘湯可選而用之 |  |        |      |        |
| ○象云止喘氣促以天門冬人參黃耆為主     |  |        |      |        |
| 針灸法璇璣一穴               |  | 在天突下一寸 | 氣海一穴 | 在臍下一寸半 |
| 三里二穴                  |  |        |      |        |
| 聲音                    |  |        |      |        |



聲音方論

心為聲音之主肺為聲音之門腎為聲音之根風寒暑濕氣血痰熱邪氣有干於心肺者病在上脘隨證解之邪氣散則天籟鳴矣惟夫腎虛為病不能納諸氣以歸元故氣奔而上咳嗽痰壅或喘或脹髓虛多唾足冷骨痿胸腹百骸俱為之牽制其嗽愈重其氣愈乏其聲愈乾君子當於受病之處圖之可也按錢氏方小兒吐瀉利其小便過多以致脾虛不受錢用益黃散作效數日以後忽爾不語錢知其脾氣已復腎氣尚虛投以地黃圓益腎相繼數劑於是能言余益信聲音之根出於腎也不誣矣○諸病不語或聲乾沉難以痊復餘見活人總括小兒疳瘕見小兒類

聲音證治

星薑飲治風邪風毒纏喉不語

南星 畧炮半兩

生薑 四錢

橘皮 三錢

右剉每服三錢紫蘇五葉煎服

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷八



迪志文化出版有限公司出版

荊蘇湯失音通用

荊芥

蘇葉

木通

橘紅

當歸

桂

石菖蒲

右等分剉煎四錢服

金沸草散人參欵花膏兼服治傷風鼻塞涕流壅嗽聲

啞熱證通用

方見嗽門

二物湯治風寒邪氣留滯失音

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷八

辣桂

半兩

石菖蒲

二錢

右剉每服二錢半新水煎細呷

歸荊湯治風瘕口噤不語項強背直身腰反張

方附在濕門

小柴胡湯治伏暑發熱汗渴暑入心胞不語

方見血類

加茯苓煎

苓煎

不換金正氣散

方見寒類

加石菖蒲治濕證聲啞加桂治寒

證聲啞

三因七氣湯

方見氣類

加枳殼甘草治氣隔聲沉



迪志文化出版有限公司出版

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 犀角地黃湯治血證心忪語短眩冒迷忘      |      |
| 生地黃                   | 四兩淨  |
| 犀角                    |      |
| 牡丹皮                   |      |
| 芍藥                    | 各半兩  |
| 右剉每服四錢入桃仁去皮尖七粒煎服如無犀角  |      |
| 以升麻代                  |      |
| 硃砂圓治打撲驚忤血入心竅不語        | 方見血類 |
| 二陳湯                   | 方見瘧類 |
| 加石昌蒲煎吞白圓子             |      |
| 方見身疼類                 |      |
| 治痰證聲                  |      |
| 沉                     |      |
| 金花散治失音亦治喉痺            |      |
| 槐花新瓦上炒香熱三更後床上仰卧隨意食之熱  |      |
| 證通用                   |      |
| 密陀僧散治大驚入心痰血室塞瘡不能言亦治瘡風 |      |
| 方見驚悸門                 |      |
| 治蜜桃仁湯治狐惑虫食其臍上唇瘡其聲啞    |      |
| 桃仁                    | 浸去皮焙 |
| 槐子                    |      |
| 艾葉                    | 各一兩  |
| 大棗                    | 十五枚  |

|                       |  |                      |  |                       |  |                      |  |
|-----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|
| 右用水三盞煎至一盞半分三次服        |  | 人參平補湯治腎虛聲不出          |  | 人參                    |  | 川芎                   |  |
| 當歸                    |  | 熟地黃                  |  | <small>洗曬</small>     |  | 白芍藥                  |  |
| 白茯苓                   |  | 兔絲子                  |  | <small>酒浸細研</small>   |  | 北五味子                 |  |
| 杜仲                    |  | 巴戟                   |  | <small>酒浸去心曬</small>  |  | 橘紅                   |  |
| 半夏麴                   |  | 牛膝                   |  | <small>酒浸焙</small>    |  | 白朮                   |  |
| 補骨脂                   |  | 葫蘆巴                  |  | <small>炒</small>      |  | 益智仁                  |  |
| 甘草                    |  | 石昌蒲                  |  | <small>半一錢</small>    |  | 右剉細每服三錢薑五片棗二枚令前煎吞山藥圓 |  |
| 七十粒                   |  | <small>方見漏濁門</small> |  | 五更頭腎氣開不得咳唾言語默然        |  | 再進上藥功效勝常             |  |
| 杏仁煎治咳嗽暴重聲音不出          |  | 杏仁                   |  | <small>水浸去皮研膏</small> |  | 冬蜜                   |  |
| 砂糖                    |  | 薑汁                   |  | <small>各一盞</small>    |  | 桑白皮                  |  |
| <small>去赤炒</small>    |  | 木通                   |  | 貝母                    |  | 北五味子                 |  |
| <small>去心各一兩半</small> |  | 紫苑茸                  |  | <small>各一兩</small>    |  |                      |  |



|                          |      |                                      |          |    |     |    |    |     |                        |                         |                           |                           |                   |                      |     |          |                             |                               |                               |                            |                                    |    |                          |                           |
|--------------------------|------|--------------------------------------|----------|----|-----|----|----|-----|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----|----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------|
| 石菖蒲<br><small>兩半</small> | 欵冬花蕊 | 右後六味剉以水五升煎半去滓入杏薑糖蜜夾和微火煎取一升半每服三合兩日夜服之 | 木通湯治諸風失音 | 木通 | 石菖蒲 | 防風 | 羌活 | 桑螵蛸 | 全蝎<br><small>焙</small> | 直僵蠶<br><small>炒</small> | 甘草<br><small>炙各一分</small> | 圓白南星<br><small>畧兩</small> | 右剉每服二錢半紫蘇五葉薑五片熱煎服 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八 | 附諸方 | 訶子湯治失音不語 | 訶子<br><small>四箇半生半煨</small> | 桔便<br><small>一兩五錢半生半炒</small> | 甘草<br><small>二寸一寸生一寸熟</small> | 右為粗末分二貼每貼水一盞童便一盞煎至八分去滓食後溫服 | 玉粉圓治冬月寒痰結於咽喉不利語音不出鍼經云寒氣客於會厭卒如瘕宜服此藥 | 桂心 | 草烏<br><small>各一字</small> | 半夏<br><small>湯洗五錢</small> |
|--------------------------|------|--------------------------------------|----------|----|-----|----|----|-----|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----|----------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----|--------------------------|---------------------------|

|                                |                   |    |    |                           |                         |                         |    |                          |                          |                          |                         |                      |         |     |                          |    |     |                           |                       |        |
|--------------------------------|-------------------|----|----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------|-----|--------------------------|----|-----|---------------------------|-----------------------|--------|
| 右為細末薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一九至夜含化多年不愈者亦効 | 響聖破笛丸治歌謳失音不語者宜服神効 | 連翹 | 桔梗 | 甘草<br><small>各二兩半</small> | 薄荷<br><small>四兩</small> | 訶子肉<br><small>炒</small> | 砂仁 | 大黃<br><small>各一兩</small> | 川芎<br><small>一兩半</small> | 白藥煎<br><small>二兩</small> | 右為細末雞子清和為丸如彈子大每用一九臨臥噙化服 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷八 | 一方治失音不語 | 百藥煎 | 杏仁<br><small>去皮尖</small> | 百合 | 訶子肉 | 薏苡仁<br><small>各等分</small> | 右為末以雞子清和圓如彈子大每用一圓臨臥噙化 | 仁齋直指卷八 |
|--------------------------------|-------------------|----|----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------|-----|--------------------------|----|-----|---------------------------|-----------------------|--------|



欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷九

詳校官太醫院醫士臣趙步池

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱 鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄舉人臣曹夢齡

欽定四庫全書

仁齋直指卷九

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

虛勞

虛勞方論

蒙莊有言精太用則竭神太勞則憊借是可以論病矣  
夫人所以根本此性命者氣與血也若男若女氣血均  
有獨不能保而有之終日役役神倦力疲饑飽越常喜

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

怒失節形寒飲冷縱慾恣情遂使五臟氣血俱虛此五  
勞之所從始也六極七傷類焉故心家虛則便濁汗多  
肝家虛則筋攣目眩腎家虛則腰痛泄精肺家虛則咳  
嗽悶熱脾胃虛則嘔吐不食日就羸黃或乃胃熱消穀  
飲食雖多亦不生肌肉而轉加瘦悴矣前此數證其間  
大抵心下引脇俱疼蓋滯血不消新血無以養之也治  
法大要潮熱者不可過用寒涼秘結者不可驟與疎泄  
嗽喘者不可妄施發散咯血者不可錯認以為熱但以





滋養榮血為上調平臟氣次之某病某藥又於養血調氣之中而增益也其或骨間有熱以至四肢緩弱不舉此則骨痿欲斯疾之有瘳也艱哉雖然當歸地黃黃耆芍藥固養血之上藥也亦當以益胃消痰輩佐之蓋人以穀氣為本所謂精氣血氣由穀氣而生古人以五味五穀五藥養其病者不無先後於其間也當歸地黃戀膈引痰黃耆芍藥多則傷胃是可膠柱調瑟而劑量輕重之不審乎抑余聞諸虛不足皆成勞倦此可療不可

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

惡之疾也其視傳症一種實霄壤焉傳症者挾邪精鬼怪之氣而作也經曰人有逢年月之厄感鬼神之精無處不惡沉默而不能的知所苦積歲漸至委頓既往侵傳症於傍人須用通神明去惡氣等劑療之或者剗麝刺犀驅伐邪惡飛丹煉石引納清和蓋為尸症設也前集咳嗽中亦略陳之

又論

勞倦之疾百脉空虛非滋潤粘膩之物以養之不能實



迪志文化出版有限公司出版

也古方用鹿魚膠阿膠牛乳飴糖酥酪煎蜜人參杏仁當歸熱地黃之類正此意耳或者妄施伏火金石附子燥熱等輩以致血氣乾涸心腎不交故火炎於上為痰嗽為咯血為口乾為五心熱水走於下為脚弱為遺精為赤白濁為小便滑數誤矣哉虛勞之脉大低多弦或浮大或數皆虛勞之候也大者易治血氣未定可斂而正也弦者難治血氣已耗未易調補之若帶雙弦則為賊邪侵脾此尤難治加數劑則殆矣○灸勞法膏肓二

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

穴可以迴生或肚臍相對取背脊骨對正灸亦有驗艾炷亦不可多

虛勞證治

十補湯 方見癰冷門 虛勞通用嗽加北五味子痰加半夏發

熱加柴胡有汗加牡蠣虛寒加乾薑皆依元藥分兩稍不喜食則勿用

雙和湯五勞六極七傷通用

白芍藥 二兩半 當歸

川芎



迪志文化出版有限公司出版

|                      |        |                      |      |     |     |
|----------------------|--------|----------------------|------|-----|-----|
| 黃耆                   | 蜜炙各一兩  | 熟地黄                  | 洗酒蒸  | 辣桂  |     |
| 甘草                   | 炙各三分   | 右麤末每服三錢薑棗煎食前服或入二陳湯同煎 |      |     |     |
| 地骨皮                  | 洗      | 秦艽                   | 洗去蘆  | 柴胡  |     |
| 枳殼                   | 製      | 知母                   | 生    | 當歸  |     |
| 鱉甲                   | 醋炙黃各半兩 | 川芎                   | 半兩   | 甘草  | 炙一分 |
| 右麤末各服三錢桃柳枝各七寸薑三片烏梅一箇 |        |                      |      |     |     |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷九 |        |                      |      |     |     |
| 同煎空心臨臥各一服潮熱甚加些大黃微利之  |        |                      |      |     |     |
| 枳殼散治虛勞大便秘澀           |        |                      |      |     |     |
| 枳殼                   | 五兩製    | 甘草                   | 炙一兩半 | 加杏仁 | 去皮炒 |
| 阿膠                   | 酥炒     | 生地黃                  | 各一兩  |     |     |
| 右細剉每服三錢薑五片蜜三匙烏梅一箇同煎空 |        |                      |      |     |     |
| 腹服                   |        |                      |      |     |     |
| 加味人參紫苑散治虛勞咳嗽         |        |                      |      |     |     |
| 人參                   | 北五味子   | 紫苑茸                  |      |     |     |

|                                                                                                          |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 陳皮                                                                                                       | 貝母                | 紫蘇葉                                 |
| <small>炒</small>                                                                                         | <small>去心</small> |                                     |
| 桑白皮                                                                                                      | 白茯苓               | 杏仁                                  |
| <small>炒</small>                                                                                         |                   | <small>去皮</small>                   |
| 甘草                                                                                                       | 加川芎               | 半夏麴                                 |
| <small>炙各三分</small>                                                                                      |                   | <small>各一兩</small>                  |
| 阿膠                                                                                                       |                   |                                     |
| <small>炒酥兩</small>                                                                                       |                   |                                     |
| 右麤末每服三錢薑七片棗二枚烏梅一箇食後煎服                                                                                    |                   |                                     |
| 大阿膠圓                                                                                                     | 方見嗽門              | 治虛勞嗽血咯血前血類紫蘇湯豆蘇湯薏苡湯人參湯咳嗽門用人參飲皆可煎湯嚼下 |
| 欽定四庫全書<br> 仁齋直指<br>卷九 |                   |                                     |
| 肺熱加腦荷桑白皮天門冬                                                                                              |                   |                                     |
| 人參芎歸湯治虛勞少血肺熱嗽血                                                                                           | 方見嗽門              |                                     |
| 地黃飲治骨蒸勞熱咯血                                                                                               |                   |                                     |
| 生地黄搗汁入生薑汁少許服之以熱退為度或利則止                                                                                   |                   |                                     |
| 大寧嗽湯勞嗽諸嗽通用神效                                                                                             |                   |                                     |
| 北五味子                                                                                                     | 茯苓                | 桑白皮                                 |
|                                                                                                          |                   | <small>炒</small>                    |
| 紫蘇                                                                                                       | 細辛                | 橘皮                                  |



|                             |                                    |                            |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 枳殼<br><small>製</small>      | 杏仁<br><small>去皮炒</small>           | 阿膠<br><small>酥炒</small>    |
| 甘草<br><small>炙</small>      | 罌粟殼<br><small>去筋萼截寧蜜酒炒熱各一分</small> |                            |
| 半夏<br><small>製二分</small>    |                                    |                            |
| 右剉散每服三錢薑五片棗二枚烏梅半箇食後煎服勞嗽多加川芎 |                                    |                            |
| 遠志圓治虛勞驚悸神氣不寧                |                                    |                            |
| 遠志<br><small>薑汁醃取肉焙</small> | 茯神<br><small>去木</small>            | 黃耆<br><small>炙</small>     |
| 熟地黃<br><small>洗</small>     | 人參<br><small>各一兩</small>           | 石昌蒲<br><small>半兩</small>   |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷九        |                                    |                            |
| 當歸<br><small>三分</small>     |                                    |                            |
| 右末粟米糊圓桐子大每二十圓米飲下            |                                    |                            |
| 龍齒湯治心怔驚悸常懷憂懼如人將捕小便或少或多或濁    |                                    |                            |
| 半夏<br><small>製</small>      | 辣桂<br><small>各二兩</small>           | 人參                         |
| 白茯苓                         | 甘草<br><small>炙</small>             | 當歸                         |
| 龍骨<br><small>研</small>      | 北梗<br><small>炒</small>             | 遠志<br><small>水浸取肉炒</small> |
| 枳殼<br><small>製各一兩半</small>  | 黃耆<br><small>蜜炙</small>            | 茯神<br><small>去木各一兩</small> |

|                                         |                              |                                |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 右末每三錢薑五片棗二枚粳米百粒食前煎服                     |                              |                                |
| 養心湯吞十四友圓治虛勞少血心虛多驚精神恍惚                   |                              |                                |
| 方見驚悸門                                   |                              |                                |
| 辰砂妙香散治虛勞心氣不平小便膩濁<br><small>方見痘門</small> |                              |                                |
| 麝香鹿茸圓治勞損虛冷精血不足<br><small>方見冷門</small>   |                              |                                |
| 集驗鹿茸圓治諸虛勞倦補養心腎滋益血氣                      |                              |                                |
| 鹿茸<br><small>炙酥</small>                 | 熟地黃                          | 當歸<br><small>酒浸焙</small>       |
| 枸杞子                                     | 酸棗仁<br><small>慢火炒去皮</small>  | 遠志<br><small>薑汁醃取肉焙</small>    |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷九                    |                              |                                |
| 附子<br><small>炮</small>                  | 沉香                           | 牛膝<br><small>酒浸</small>        |
| 山藥<br><small>炮</small>                  | 茯苓<br><small>酒浸焙各一兩</small>  | 麝<br><small>半兩</small>         |
| 右末煉蜜圓桐子大每五十圓空心鹽湯下                       |                              |                                |
| 還少丹補虛勞益心腎生精血                            |                              |                                |
| 山藥<br><small>炮</small>                  | 牛膝<br><small>酒浸焙</small>     | 白茯苓                            |
| 山茱萸                                     | 舶上茴香<br><small>炒各一兩半</small> |                                |
| 續斷                                      | 兔絲子<br><small>洗酒浸焙</small>   | 杜仲<br><small>去麤皮薑汁塗炙截炒</small> |
| 巴戟<br><small>去心</small>                 | 茯苓<br><small>酒浸</small>      | 北五味子                           |





|                               |  |                                           |                                                           |                     |                                     |                                                                              |                                                          |                                        |                                     |                                                  |                                |                     |                                                                          |                                                 |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>薏苡仁 <small>各一兩</small></p> |  | <p>右末每二錢棗薑略煎服治中湯 <small>方見嘔吐門</small></p> | <p>湯 <small>方見脾疼門</small> 二陳湯 <small>方見癰類</small> 可擇用</p> | <p>桃仁煎治勞瘵傳尸骨蒸倦弱</p> | <p>大川椒 <small>汗出</small> 生犀角 當歸</p> | <p>續斷 <small>各一兩</small> 桃仁 <small>去皮炒</small> 鱉甲 <small>醋炙黃各一兩半</small></p> | <p>蛤蚧 <small>一對去頭足洗酥炙</small> 木香 白礬 <small>煨</small></p> | <p>猪牙皂角 <small>各半兩</small> 安息香 蘇合香</p> | <p>欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷九</small></p> | <p>雄黃 <small>各一分</small> 麝 <small>一錢</small></p> | <p>右末煉蜜圓桐子大每二十圓米飲下或用正川椒泡湯下</p> | <p>神授圓治傳尸勞瘵最殺勞虫</p> | <p>正川椒 <small>色紅而大者去合口并子以黃桿紙二重托之於熱爐內類撥令出油取頓地上用砂盆蓋以火灰遮密四圍約一時許</small></p> | <p>右碾末老酒浸白糕為糊圓桐子大每服三四十圓食前鹽湯下逐時常服滿一斤瘵疾自瘥昔人服之</p> |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                              |               |                            |                                       |                   |                                   |                                                       |                                     |                                                     |                                                                            |                               |            |                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>日久取下勞虫如小蛇狀即瘥此藥亦治痺辣桂煎湯下治腰痛茴香酒下治腎冷鹽湯下神妙</p> | <p>燒髮方治勞瘵</p> | <p>生髮燒存性為末水調空心服此亦用枕骨之意</p> | <p>蘇合香圓 <small>方見諸氣門</small> 皆要藥也</p> | <p>黃耆益損湯治諸虛勞倦</p> | <p>肉桂 熟地黃 半夏 <small>製</small></p> | <p>甘草 <small>炙各三分</small> 石斛 <small>酒炒</small> 當歸</p> | <p>欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷九</small></p> | <p>川芎 黃耆 <small>炙</small> 白朮 <small>各一兩</small></p> | <p>白芍藥 <small>一兩半</small> 北五味子 <small>兩半</small> 木香 <small>三錢半</small></p> | <p>右剉細每服三錢薑五片棗二枚食前煎服有熱加柴胡</p> | <p>附諸方</p> | <p>補陰圓 <small>明醫雜著</small> 論曰人之一身陰常不足陽常有餘况節慾者少過慾者多精血既虧相火必旺火旺則陰愈消而勞瘵效嗽咯血吐血等証作矣故宜常補其陰</p> |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|





使與陽齊則水能制火而水升火降斯無病矣故丹溪先生發明補陰之說謂專補左尺腎水也古方滋補藥皆兼補右尺相火不知左尺原虛右尺原旺若左右平補依舊火勝於水只補其左制其右庶得水火俱平也右尺相火固不可衰若果相火衰者方宜補火但世之人火旺而致病者十俱八九火衰成疾者百無二三且人在少年腎火正旺似不必補然慾心正熾妄用太過至於中年慾心雖減然少年斲喪既多焉得復實及至老年天真漸絕只有孤陽故補陰之藥自少以至老不可缺也丹溪先生發明先聖之旨以正千載之訛其功甚哉今立補陰丸方備加減法於後

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

黃栢去皮酒拌炒 知母去皮毛酒拌炒

瑣陽酥炙乾 敗龜板酸炙透 熟地黄酒拌蒸忌

五味子一兩 枸杞子甘州者 天門冬去心

白芍藥酒炒各 乾薑炒紫色三錢寒

右為細末煉淨蜜和入猪骨髓三條和藥末杵極勻丸如梧子大每服八九十九空心淡鹽湯送下寒月可用溫酒

若有夢遺精滑病者加牡蠣童便煅七次 白朮各一兩 山茱萸

去核 椿根白皮炒過各七錢

若有赤白濁病者加白朮白茯苓各二兩半 山梔仁黃連

各炒各五錢

若有軟弱無力者加牛膝酒洗二兩 虎脰骨酥炙透二兩 防己

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

酒浸 木瓜各五錢

若有疝氣病加蒼朮鹽炒一兩半 黃連生薑汁炒 山梔子仁炒

六錢 川芎一兩 吳茱萸炒 青皮去穰各五錢

若脾胃虛弱畏寒易泄者加白朮三兩 陳皮一兩 乾薑炒加

至七錢

若眼目昏暗者加當歸酒洗 川芎菊花各一兩 柴胡黃連

酒炒 烏犀各五錢 蔓荊子防風各三錢

若兼氣虛之人加人參黃芪蜜炙各二兩



若左尺既虛右尺亦微命門火衰陽事不舉加黑附

子小便浸肉桂去皮各沉香五錢

加減補陰丸

熟地黃八兩兔絲子四兩鹽酒

當歸三兩酒浸白芍三兩炒瑣陽三兩炙

杜仲二兩炒牛膝四兩酒浸破故紙三兩炙

枸杞一兩半虎骨二兩酥炙龜板三兩炙

黃栢二兩炒山藥人參

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

黃芪各二兩冬加乾薑一兩

右為末猪骨髓入蜜丸梧子大空心服一百丸鹽湯

下

虎潛丸治痿與補腎丸同

黃栢半斤酒炒龜板四兩酒炙知母三兩炒

熟苳陳皮白芍藥各二兩

瑣陽一兩半虎骨一兩炙乾薑半兩

右為末酒糊丸或粥丸一方加金箔一片一方用生

地黃懶言語如山藥加炒黃栢知母炙龜板各等分

乾薑三分之一酒糊丸名補血丸一方無乾薑冬月

方加有當歸一兩半熟苳比前多一兩餘同

六味地黃丸金匱方治形體瘦弱無力多困腎氣久虛久

新憔悴寢汗發熱五臟齊損遺精便血消渴淋濁等

証婦人血虛無子者服之有效

乾山藥山茱萸肉澤瀉各四兩去毛

牡丹皮去心白茯苓去皮各三兩熟苳八兩

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

右為末煉蜜為丸如梧子大每服五六十丸空心白

湯下寒月溫酒下如腎虛有飲作痰唾生薑湯下

八味丸治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛夜多旋溺脚

膝緩弱肢體倦怠面皮痿黃或黧黑及虛勞不足渴

欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利方見癰冷門

山藥丸和劑方治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦耳聾目

暗常服壯筋骨益腎水方見漏濁門

四君子湯和劑方補氣和胃進食



|                |                   |    |
|----------------|-------------------|----|
| 白朮             | 人參                | 茯苓 |
| 甘草             | 各等分               |    |
| 右咬咀水煎服         |                   |    |
| 四物湯            | 和劑補血和血調經方         |    |
| 當歸             | 白芍藥               | 芎藭 |
| 地黄             | 婦人用生              |    |
| 右咬咀水煎服         |                   |    |
| 八物湯            | 平補氣血調和陰陽          |    |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷九 |                   |    |
| 白朮             | 人參                | 茯苓 |
| 甘草             | 白芍                | 當歸 |
| 地黄             | 川芎                |    |
| 右咬咀水煎服         |                   |    |
| 黃芪建中湯          | 和劑治男子婦人諸虛不足羸乏少力此方 |    |
| 湯藥             | 大生血氣補益榮衛方見虛汗門     |    |
| 人參養榮湯          | 治男婦血虛短氣痿弱有汗潮熱等証   |    |
| 人參             | 白朮                | 茯苓 |



|                 |                  |     |     |
|-----------------|------------------|-----|-----|
| 甘草              | 炙                | 川歸  | 黃芪  |
| 肉桂              |                  | 白芍藥 | 炒   |
| 五味子             |                  | 熟地黄 |     |
| 右咬咀水二鍾薑三片煎服     |                  |     |     |
| 加味補中益氣湯         | 治動作勞倦可服          |     |     |
| 人參              | 錢一               | 黃芪  | 錢七  |
| 白朮              | 錢一               | 當歸  | 錢二  |
| 柴胡              | 去蘆五分             | 升麻  | 三分  |
| 麥門冬             | 七分製              |     |     |
| 天花粉             | 五分               | 黃栢  | 七分酒 |
| 黃栢              | 鹽炒               | 黃芩  | 五分酒 |
| 右咬咀用水二鍾煎至一鍾去滓溫服 |                  |     |     |
| 加味虎潛丸           | 治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元陽 |     |     |
| 滋腎水             |                  |     |     |
| 熟地黄             | 酒洗               | 黃栢  | 蜜炒  |
| 黃芪              | 蜜炙               | 當歸  | 酒洗  |
| 鎖陽              | 酒洗               | 龜板  | 酥炙  |
| 杜仲              | 酥炙               | 牛膝  | 酒洗  |
| 兔絲子             | 酒浸               |     |     |
| 破故紙             | 炒                |     |     |
| 人參              |                  |     |     |
| 茯苓              | 各二               |     |     |



|                      |      |      |      |     |     |
|----------------------|------|------|------|-----|-----|
| 欽定四庫全書               |      | 仁齋直指 |      | 卷九  |     |
| 知母                   | 酒炒   | 虎脰骨  | 酥炙各  | 山藥  | 炒   |
| 枸杞子                  | 炒    | 芍藥   | 酒炒各  |     |     |
| 右為細末煉蜜和猪脊髓為丸如梧桐子大每服五 |      |      |      |     |     |
| 六十丸空心鹽湯送下好酒亦可乾物壓之    |      |      |      |     |     |
| 濟陰圓                  |      |      |      |     |     |
| 黃栢                   | 二兩七錢 | 龜板   | 炙一兩三 | 陳皮  | 七錢  |
| 當歸                   | 一兩   | 知母   | 一兩   | 虎骨  | 七錢  |
| 瑣陽                   | 一兩   | 牛膝   | 一兩三  | 山藥  |     |
| 白芍                   |      | 砂仁   |      | 杜仲  | 絲炒斷 |
| 黃芪                   | 鹽水炒  | 熟苳   | 七錢   | 枸杞子 | 五錢  |
| 故紙                   | 三錢   | 兔絲子  | 酒浸一兩 |     |     |
| 右為末以地黃膏為丸如梧子大每服七十九   |      |      |      |     |     |
| 人參固本圓                |      |      |      |     |     |
| 夫人參心藏血腎藏精精血充實則鬚      |      |      |      |     |     |
| 髮不白顏貌不衰延年益壽其天閱者多由服性熱 |      |      |      |     |     |
| 之藥不能滋生精血也而藥之滋補精血者無出於 |      |      |      |     |     |
| 生熟二地黃世人徒知服二地黃而不知服二門冬 |      |      |      |     |     |

|                       |  |     |  |      |  |
|-----------------------|--|-----|--|------|--|
| 為引也蓋生地黃能生心血用麥門冬引入所生之  |  |     |  |      |  |
| 地熟地黃能補腎精用天門冬引入所補之地四味  |  |     |  |      |  |
| 互相為用本草又以人參為通心氣之主故宜加焉  |  |     |  |      |  |
| 生地黃                   |  | 熟地黃 |  | 天門冬  |  |
|                       |  | 各酒洗 |  | 去心酒浸 |  |
| 麥門冬                   |  | 各酒浸 |  | 人參   |  |
| 各二兩                   |  |     |  | 一兩   |  |
| 右為末煉蜜為丸如梧子大每服五十九丸空心溫酒 |  |     |  |      |  |
| 淡鹽湯任下如有痰者生熟地黃各用薑汁炒過恐  |  |     |  |      |  |
| 泥隔故也                  |  |     |  |      |  |
| 三才封髓丹降心火益腎水           |  |     |  |      |  |
| 天門冬                   |  | 熟地黃 |  | 人參   |  |
| 去心                    |  | 酒洗  |  | 各五錢  |  |
| 黃栢                    |  | 砂仁  |  | 甘草   |  |
| 炒褐色                   |  | 一兩  |  | 七錢半  |  |
| 三兩                    |  | 半   |  | 一方無  |  |
| 右為末水糊丸如梧子大每服五十九丸用菴蓉半兩 |  |     |  |      |  |
| 切作片子酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心  |  |     |  |      |  |
| 送丸子                   |  |     |  |      |  |
| 固真丹治諸虛百損五勞七傷水火不升下元虛冷臍 |  |     |  |      |  |
| 腹疼痛                   |  |     |  |      |  |



|                                                              |         |     |               |     |      |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|-----|------|
| 人參                                                           | 一兩      | 乾山藥 | 一兩半炒          | 當歸  | 酒浸   |
| 黃芪                                                           | 炒       | 黃栢  | 炒             | 白朮  | 各一兩  |
| 杜仲                                                           | 酒炙斷絲    | 補骨脂 | 炒各一兩          | 五味子 | 半兩炒  |
| 澤瀉                                                           | 兩半      | 白茯苓 |               | 牡丹皮 |      |
| 山茱萸                                                          | 肉各一兩    | 熟地黃 | 四兩湯頭開膏於石白內搗如泥 |     |      |
| 右前藥為極細末和地黃膏拌勻却入煉蜜為丸如梧桐子大每服八九十九空心淡鹽湯送下腰腿無力加牛膝一兩酒炒敗龜板一兩半酥炙夏天服加 |         |     |               |     |      |
| 桂半兩脉弱食少再加附子半兩炮                                               |         |     |               |     |      |
| 沉香大補丸專治下焦虛弱補益元氣久服身輕體健                                        |         |     |               |     |      |
| 五臟調和血脉通泰功效甚妙                                                 |         |     |               |     |      |
| 黃栢                                                           | 四兩酒浸炒褐色 | 知母  | 一兩半酒浸焙        | 熟地黃 | 二兩酒浸 |
| 芍藥                                                           |         | 陳皮  | 白去            | 牛膝  | 酒浸   |
| 鎖陽                                                           | 酒浸      | 當歸  | 一兩酒浸各         | 敗龜板 | 酥炙二兩 |
| 虎脰骨                                                          | 酥炙七錢半   | 山茱萸 | 肉一兩           | 山藥  |      |
| 沉香                                                           |         | 白茯苓 |               | 牡丹皮 |      |

|                                                                                                                                        |             |     |         |     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-----|----------|
| 杜仲                                                                                                                                     | 酥炙          | 澤瀉  |         | 大茴香 | 各一兩      |
| 人參                                                                                                                                     | 二兩          |     |         |     |          |
| 右件各要製度如法晒乾碾為細末酒煮黑羊羔肉熬為膏去骨內加猪脊髓二寸再加火熬和藥為丸如梧桐子大每服四五十九空心溫酒送下乾物壓之                                                                          |             |     |         |     |          |
| 仙傳班龍圓蜀中有一道人童顏漆髮眉宇疎秀自歌曰尾閭不禁滄海竭九轉神丹都漫說惟有班龍頂上珠能補玉堂關下穴仙人許仲遠得受其方道人曰吾餌此藥今壽四百二十三歲緣汝有仙骨故此相授言訖化白鶴飛去許仙後傳於世此藥理百病養五臟補精髓壯筋骨益心志安魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽久服成地仙矣 |             |     |         |     |          |
| 鹿霜                                                                                                                                     | 十兩          | 鹿膠  | 十兩      | 兔絲子 | 十兩酒浸一日蒸焙 |
| 乾為末                                                                                                                                    |             | 栢子仁 | 十兩去壳淨另研 |     |          |
| 熟地黃                                                                                                                                    | 十兩酒浸一宿蒸焙乾為末 |     |         |     |          |





右為細末先將鹿膠用無灰酒於磁器內慢火化開却將膠酒煮糊和杵二千下丸如梧子大每服四五十九空心鹽湯下或酒亦可

煮煉鹿霜膠法

用新鹿角三對每對各長二寸截斷長流水浸三日刷去垢每一斤用楮實子一兩桑白皮黃蠟各二兩以鐵鍋器內以水煮三晝夜魚眼湯慢火煮不可斷火常添熱湯不可添冷水毋令露角三日取出角削

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

去黑皮薄切晒乾碾為末即成鹿霜也

右將煮鹿角汁濾去滓如熬膠法同却以慢火熬傾

磁盆內候冷凝切作片陰乾成膠

經驗養榮丸治男婦氣血兩虛精神短少脾胃不足形

體羸乏

白朮

炒土

黃芪

炙蜜

芍藥

炒酒

遠志

甘草畧  
心各一兩半  
去

當歸身

洗酒

山藥

熟地黃

洗酒

五味子

人參

去蘆各

白茯苓

二兩

山茱萸

去梗

生地黃

酒洗各  
五錢

陳皮

泡八錢

右為細末用鴨一隻取血入蜜煉和前藥為丸如梧桐子大每服八十九丸白鹽湯送下寒月鹽酒送下○如咳嗽加麥門冬貝母紫苑欵冬花各一兩熱加黃栢知母各一兩遺精帶濁加牡蠣一兩真龍骨五錢吐衄血腥加牡丹皮赤芍藥各一兩

秘傳大補元圓治男婦諸虛百損五勞七傷形體羸乏

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

腰背疼痛遺精帶濁

黃栢

蜜炒  
褐色

知母

浸乳  
炒汁

龜板

酥炙各  
三兩

淮熟地黃

酒洗  
五兩

牛膝

洗酒

麥門冬

去心

肉蓯蓉

洗酒

虎脰骨

炙好酒

淮山藥

茯神

去心

黃芪

蜜炙各  
一兩半

杜仲

去粗皮  
酒炒斷絲

枸杞子

甘州  
者佳

何首烏

剉皮

人參

去蘆各  
二兩

當歸身

洗酒

天門冬

去心

五味子

去枝

淮生地黃

酒洗各  
一兩

白芍藥

酒炒二兩  
冬月只用



|                       |  |                                  |  |                                                                                                 |  |                                                                     |  |                             |  |                   |  |                                       |  |                                |  |                                    |  |                             |  |                                  |  |                                  |  |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| <p>一兩 冬加乾薑 五錢 炒黃色</p> |  | <p>紫河車一具一名混沌皮即今之胞衣 取初產者為佳如無者</p> |  | <p>初產者或壯盛婦人胎者亦可取一具用線吊於急流水中漂一晝夜去其污濁血系取起再用淨米泔水一碗許於小罐內微火煮一沸取出勿令泄氣再用小藍一箇四圍用帛密糊將河車安於藍內用慢火烘乾為末入前藥</p> |  | <p>右共為極細末煉淨蜜入猪脊髓三條和前藥杵勻丸如梧桐子大每服八十九空心淡鹽湯下寒月可用溫酒送下○如夢遺白濁加牡蠣一兩白朮山茱</p> |  | <p>用溫酒送下○如夢遺白濁加牡蠣一兩白朮山茱</p> |  | <p>黃各一兩五錢茯苓二兩</p> |  | <p>秘傳當歸膏治五勞七傷諸虛勞極脾胃虛弱養血和中滋榮筋骨養陰抑陽</p> |  | <p>當歸 酒洗一 生地黄 酒洗一 熟地黄 酒洗三兩</p> |  | <p>薏苡仁 八兩 炒米 白芍藥 粉一 炒斤 白茯苓 十二兩</p> |  | <p>白朮 一斤 蓮子 四兩 去心 山藥 五兩</p> |  | <p>人參 四兩 加 甘草 三兩 枸杞子 一斤 四兩 佳</p> |  | <p>貝母 三兩 去心 地骨皮 四兩 麥門冬 五兩 去心</p> |  |
|-----------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|

|                                  |  |                                                                                                              |  |                     |  |                               |  |                             |  |                              |  |                                     |  |                           |  |                |  |                                       |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------|--|
| <p>天門冬 二兩 去心 五味子 一兩 琥珀 一錢 二分</p> |  | <p>右各細剉和足以水十斤微火煎之如再加水十斤如此四次如法濾去滓取汁文武火煎之漸加至三分後以文武火煎之如法為度每斤加煉熟淨蜜四兩春五兩夏六兩共熬成膏如法吐血加牡丹皮二兩骨蒸加青蒿汁二碗童便二碗勞痰加鍾乳粉一兩</p> |  | <p>秘傳遠志養心丹治心虛手振</p> |  | <p>生地黄 酒洗 遠志 甘草湯煮去心 當歸 酒洗</p> |  | <p>甘草 炙各一 錢 栝子仁 酸棗仁 各三兩</p> |  | <p>川芎 人參 去蘆各 一兩 茯苓 去木 七錢</p> |  | <p>半夏 薑汁泡 七次 南星 炮 硃砂 研末為衣已 上各五錢</p> |  | <p>麝香 一錢 石菖蒲 六錢 琥珀 三錢</p> |  | <p>真金箔 二十片</p> |  | <p>右為細末湯浸蒸餅為丸如菽豆大每服四五十丸津唾嚥下痰用薑湯送下</p> |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------|--|



|                                         |  |                          |                           |     |
|-----------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-----|
| 茯苓補心湯治心虛耗不藏精血以致面色黃悴五心煩熱咳嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦服之 |  | 人參                       | 茯苓                        | 陳皮  |
| 桔梗                                      |  | 枳殼                       | 前胡                        |     |
| 川芎                                      |  | 地黃                       | 川歸                        |     |
| 芍藥                                      |  | 甘草 <small>減半</small>     | 半夏                        |     |
| 紫蘇                                      |  | 乾葛 <small>各等分</small>    |                           |     |
| 右呖咀水二盞薑三片棗一枚煎服                          |  |                          |                           |     |
| 平補鎮心丹 <small>和劑方</small>                |  | 治心血不足時或怔忡夜多異夢如           |                           |     |
| 墮層崖常服安心腎益榮衛                             |  | 白茯苓 <small>去皮</small>    | 五味子 <small>去梗</small>     | 車前子 |
| 茯神 <small>去木</small>                    |  | 肉桂                       | 麥門冬 <small>各一兩二錢半</small> |     |
| 遠志 <small>去心甘草湯煮兩半</small>              |  | 天門冬                      | 山藥 <small>洗薑製</small>     |     |
| 熟苧 <small>酒蒸各一兩半</small>                |  | 酸棗仁 <small>去殼炒</small>   | 人參 <small>去蘆五錢</small>    |     |
| 龍齒 <small>二兩半</small>                   |  | 硃砂 <small>半兩別研為衣</small> |                           |     |
| 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心米飲                    |  |                          |                           |     |

|                                          |  |                          |                         |  |
|------------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--|
| 溫酒下                                      |  | 八物定志圓 <small>拔粹方</small> |                         |  |
| 人參 <small>半一兩</small>                    |  | 石菖蒲                      | 遠志 <small>去心</small>    |  |
| 茯苓 <small>去皮</small>                     |  | 茯神 <small>去心各一兩</small>  | 硃砂 <small>一錢</small>    |  |
| 麥門冬 <small>去心</small>                    |  | 白朮 <small>各半兩</small>    | 牛黃 <small>二錢別研</small>  |  |
| 右為細末煉蜜為丸如梧子大米飲下五十丸無時                     |  |                          |                         |  |
| 天王補心丹寧心保神益血固精壯力強志令人不忘                    |  |                          |                         |  |
| 清三焦化痰涎去煩熱除驚悸療咽乾育養心神                      |  |                          |                         |  |
| 熟地黃                                      |  | 白茯苓                      | 人參                      |  |
| 遠志 <small>去心</small>                     |  | 石菖蒲                      | 玄參                      |  |
| 栝子仁                                      |  | 桔梗                       | 天門冬 <small>去心</small>   |  |
| 丹參                                       |  | 酸棗仁 <small>炒</small>     | 麥門冬 <small>去心</small>   |  |
| 甘草 <small>炙</small>                      |  | 百部                       | 五味子                     |  |
| 茯神                                       |  | 當歸                       | 杜仲 <small>薑汁炒斷絲</small> |  |
| 右各等分為細末煑蜜丸如彈子大每兩作十丸金箔為衣每服一丸用灯心棗湯化下食遠臨卧服或 |  |                          |                         |  |



作小丸亦可

灸法膏肓俞二穴百勞一穴心俞二穴腎俞二穴三里  
二穴關元一穴三焦俞二穴皆可灸之

虛汗

虛汗方論

汗者表虛而津液為之發泄也夫人以衛氣固其表衛  
氣所以溫肌肉充皮膚肥腠理司開闔衛氣一虛則肌  
肉不溫皮膚不充腠理不肥而開闔失其司耳或昏或

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

醒浸浸而出者曰自汗睡困則出醒而復收者曰盜汗  
若風若暑若濕邪氣與衛氣相干以至喜怒驚恐嗜慾  
勞傷皆能致之表虛者與之黃耆芍藥官桂之劑邪氣  
相襲者與之微微解散之劑驚恐勞傷者養心補腎之  
劑獨不可調理之乎然而人之一身負陰抱陽平則寧  
偏則病陰虛陽必湊故發熱汗出如水熱而湧陽虛陰  
必乘故發厥汗出如水溢而流要之汗者血之異名陽  
主氣氣為衛陰主血血為榮氣血二者俱不可一日餒

矣抑余聞之汗出髮潤一不治也汗出如油二不治也  
汗凝如珠三不治也君子見幾辯之不可不早

虛汗證治

建中湯治表虛自汗

官桂

三分

芍藥

一兩半

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢薑五片棗二枚食前煎服本方加  
黃耆一兩名黃耆建中湯治虛勞自汗加當歸一兩  
名當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

加桂半兩熟附子半箇名桂枝附子湯每服四錢薑

七片棗二枚空心煎服

黃耆六一湯加白朮芍藥治諸虛自汗

方見虛勞門

當歸散治虛汗盜汗

方見虛勞門

朮苓湯治虛汗盜汗

黃耆

炙

防風

白茯苓

白朮

麻黃根節

各半兩

甘草

炙二錢

右剉細每服三錢入小麥百粒同煎臨臥服加牡蠣



|                            |                          |                               |                         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 亦得                         | 牡蠣散治諸虛體常自汗驚惕不寧           | 左顧牡蠣<br><small>米泔浸洗燉透</small> | 麻黃根                     |
| 黃耆<br><small>蜜炙各一兩</small> | 加白朮<br><small>兩半</small> | 甘草<br><small>蜜炙一分</small>     | 右剉每服三錢小麥百餘粒同煎服          |
| 龍膽散治盜汗有熱                   | 龍膽草<br><small>等分</small> | 防風<br><small>日乾</small>       | 右為末每服一錢溫米飲調下臨卧服         |
| 防風散治盜汗                     | 川芎<br><small>一分</small>  | 人參<br><small>半分</small>       | 防風<br><small>二分</small> |
| 溫粉止汗法                      | 右為末每服一錢臨卧米飲調下            | 白芷                            | 白朮                      |
| 藁本<br><small>等分</small>    | 右為末每藥末一兩入米粉三分夾和撲身無藁本亦得   |                               |                         |

|     |                           |               |                           |                              |                       |                |                         |    |    |                        |    |      |    |                        |     |                           |                          |                         |             |                                       |            |    |                            |                          |                           |                         |                            |
|-----|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----|----|------------------------|----|------|----|------------------------|-----|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|----|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 附諸方 | 耆附湯<br><small>濟生方</small> | 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠 | 黃耆<br><small>蜜炙去蘆</small> | 附子<br><small>炮去皮臍各等分</small> | 右咬咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓臨卧通口服 | 大補黃耆湯治自汗虛弱之人可服 | 黃耆<br><small>蜜炙</small> | 防風 | 川芎 | 白朮<br><small>炒</small> | 當歸 | 山茱萸肉 | 肉桂 | 甘草<br><small>炙</small> | 五味子 | 肉蓯蓉<br><small>各一兩</small> | 白茯苓<br><small>半兩</small> | 熟芩<br><small>二兩</small> | 右每服五錢棗二枚水煎服 | 防己黃耆湯治風濕相搏時自汗出<br><small>方見濕門</small> | 加味建中湯治諸虛自汗 | 白朮 | 黃芪<br><small>各一錢蜜炙</small> | 白芍藥<br><small>二錢</small> | 當歸<br><small>酒洗一錢</small> | 甘草<br><small>七分</small> | 肉桂<br><small>去粗皮一錢</small> |
|-----|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----|----|------------------------|----|------|----|------------------------|-----|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|----|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|





右咬咀用水一盞半加炒浮小麥一撮煎八分去滓  
入錫少許再煎溫服

當歸六黃湯 聖惠方 治盜汗之聖藥也

當歸 生地黃 熟地黃

黃芩 黃連 各一分

黃芪 加倍

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓臨卧通口服

一方治盜汗

欽定四庫全書 仁齋直指 卷九

白朮 三兩 茯苓 二兩

右咬咀每服一兩水一盞生薑三片棗一枚煎八分

去滓溫服食前

一方 百一選方 治脾虛盜汗

人參 當歸 各等分

右二味等分每服秤五錢先用猪心一枚破作數片

并心內血煎湯澄清汁煎前藥服

勞瘵

勞瘵方論

瘵虫食人骨髓血枯精竭不救者多人能平時愛護元氣保養精血瘵不可得而傳惟夫縱慾多淫苦不自覺精血內耗邪氣外乘是不特男子有傷婦人亦不免矣然而氣虛腹餒最不可入勞瘵者之門弔喪問疾衣服器用中皆能乘虛而染觸間有婦人入其房睹其人病者思之勞氣隨入染患日久莫不化而為虫治療之法大抵以保養精血為上去虫次之安息蘇合阿魏麝犀

欽定四庫全書 仁齋直指 卷九

丹砂雄黃固皆驅伐惡氣之劑亦須以天靈蓋行乎其間蓋尸病者鬼氣也伏而未起故令淹纏得枯骸枕骨治之魂氣飛越不復附人於是乎瘵外此則虎牙骨鯉魚頭皆食人之類也其亦枕骨之亞乎要之發用以前當以川芎當歸先立乎根本之地 瘵疾至於骨痛骨癢聲沉聲啞脉槁面鰲斷不可活凡治瘵疾所用藥品永不得與病人知之也

勞瘵證治

芎歸血餘散治瘵疾先用此次以鱉甲生犀散取虫



室女頂門生髮一小團井水洗取油膩法醋浸一宿日中曬乾紙撚火燒存性

真川芎兩半 當歸三錢 木香

桃仁水浸去皮焙各二錢 安息香 雄黃各一錢

全蠋二枚 江上大鯉魚頭生截斷一錢

右為末分作四服每服井水一大碗淨室中煎八分

入紅硬降真香末半錢燒北斗符入藥月初五更空

心向北目天呪曰療神療神害我生人吾奉 帝勅

服藥保身急急如律令念呪五遍面北服藥畢面南吸

欽定四庫全書 仁齋直指 卷九

生氣入口腹中燒降真香置床下午時又如前服

藥

北斗符 念北斗呪 朱砂書符

鼈甲生犀散治療疾殺療虫取出惡物

天靈蓋一具男者色不赤可用女者色赤勿用以檀香煎湯候冷洗呪曰雷公靈雷公聖逢

傳尸即須應急急如律 生鱉甲一枚去裙

虎長牙二箇醋炙酥如無則用牙關骨半兩 安息香

雞心檳榔 桃仁水浸去皮關焙各半兩

生犀角 木香 甘遂

降真香 乾漆杵碎炒煙出畧盡存性

阿魏酒浸研各三錢 穿山甲取四趾醋炙焦 雷負二錢

全蠋三箇 蚯蚓十條生研和藥

右件為末每服半兩先用豉心四十九粒東向桃李

桑梅小稍各二莖長七寸生臨青七葉青蒿一小握

葱白連根洗五片石白內同杵用井水一碗半煎取

欽定四庫全書 仁齋直指 卷九

一盞入童子尿一盞并藥末煎取七分入麝一字月初

旬五更空心溫服即被覆汗恐汗中有細虫軟帛

拭之即焚其帛少時必瀉虫以淨桶盛急鉗取出付

裂火焚之並收入磁器中瓦片傳雄黃蓋之泥和灰

扎埋深山絕人行處

虎牙圓治勞瘵瘦悴咳嗽聲啞骨痿殺下療虫

紫河車一具即男子胎衣水洗淨酒醋再拆洗用童尿并好酒煮爛

麝半錢 大紅川椒去合口并子以黃稭紙二重托之就熱爐內頻



|                                                    |                                                      |                                          |                                              |                                          |                               |                                                      |                               |               |                     |                               |                                                                       |                                     |                                                                 |                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>撥去油頻地<br/>上蓋一宿<br/>虎頭關骨<br/>酒浸二宿炙<br/>焦各一兩半</p> | <p>黃狗頭<br/>取肉四兩童<br/>尿并酒煮爛<br/>鹿茸<br/>七錢半<br/>酒炙</p> | <p>生鱉甲<br/>一枚去裙醋炙一宿又醋<br/>一盞仰盛慢火炙令醋盡</p> | <p>桃仁<br/>水浸去<br/>皮焙<br/>秦膠<br/>洗<br/>木香</p> | <p>明阿膠<br/>炒酥各<br/>半兩<br/>雄黃<br/>安息香</p> | <p>生髮<br/>紙燃火燒存<br/>性各二錢半</p> | <p>右細末以紫河車狗肉杵粘為圓桐子大每七十粒<br/>月首五更空心米湯下午時又服如無胎衣以雄猪</p> | <p>欽定四庫全書<br/>仁齋直指<br/>卷九</p> | <p>肚代用修事同</p> | <p>雄麝圓治勞瘵殺瘵虫下惡物</p> | <p>雄黃<br/>雌黃<br/>青黛<br/>乾</p> | <p>代赭<br/>煨醋<br/>石淬<br/>硃砂<br/>研細各<br/>二錢半<br/>大蝦蟇<br/>一箇酒<br/>炙黃</p> | <p>男子天靈蓋<br/>酥炙黃<br/>三錢<br/>安息香</p> | <p>阿魏<br/>酒浸研<br/>各二錢<br/>麝<br/>半錢<br/>川巴豆肉<br/>肥者十<br/>粒畧去</p> | <p>油<br/>右細末軟粳飯頭揉和杵圓桐子大每二十粒桃仁</p> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                        |                  |                         |                                |                                                             |                             |                                                      |                               |                             |                             |                             |                   |                     |                               |                                                      |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>十四箇去皮研煎湯月初五更空心下</p> | <p>五枝散取下傳尸勞虫</p> | <p>桃枝<br/>李枝<br/>梅枝</p> | <p>桑枝<br/>並東向小枝各<br/>七莖長三寸</p> | <p>青蒿<br/>一小<br/>握<br/>苦練根<br/>白皮<br/>七寸<br/>生藍青<br/>七葉</p> | <p>葱白<br/>連根洗七<br/>片各寸截</p> | <p>右以童尿一升半煎取其半去滓入安息香蘇合香<br/>阿魏各一錢煎至一盞濾清調硃砂雄黃雷圓枯白</p> | <p>欽定四庫全書<br/>仁齋直指<br/>卷九</p> | <p>礬硫黃末各半錢雞心檳榔末一錢半麝一字分作</p> | <p>二服月頭五更空心進一服五更五點又進一服約</p> | <p>午前取下瘵虫淨桶盛急鉗收入油銚內煮仍傾油</p> | <p>虫入磁器灰扎埋山僻處</p> | <p>藍汁方殺瘵虫惡虫皆化為水</p> | <p>生藍青葉<br/>研取自然<br/>汁一大盞</p> | <p>右入雄黃枯白礬安息香紅硬降真香末各半錢麝<br/>少許研和月頭五更空心服藍青殺諸虫解諸毒蠱</p> |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|



毒通用此方

猫肝方殺療虫

黑猫生取肝曬乾

右為末月首五更空心醇酒調服或用酒浸而食之

木香蛤蚧圓治勞瘵久嗽聲乾骨痿瘦瘁

蛤蚧 洗一對尾全者  
淨酥炙

生鰲甲  
去裙醋  
灸焦

白茯苓  
川芎

當歸

北五味子  
牛膝  
錢各半

綿黃耆

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

柴胡  
知母

貝母  
心去

雞心檳榔  
明阿膠  
酥炒

巴戟  
酒浸  
去心

桃仁 酒浸去皮 焙各半兩 肉豆寇 生三箇

木香

秦艽  
洗

羌活

破故紙  
炒

生髮  
紙撚火燒存  
性各三錢

右細末煉蜜丸彈子大每一圓煎棗湯空心嚼下

參耆散治勞瘵嗽喘咯血聲焦潮熱盜汗

柴胡  
明阿膠  
酥炒  
黃耆  
炙蜜

白茯苓  
紫苑茸  
當歸

川芎  
半夏製

枳殼製

北梗

秦膠洗

甘草  
半焙  
兩各

人參

北五味子

羌活  
防風  
杏仁  
水浸  
去皮

欵冬花  
桑白皮  
錢炒各二  
半  
生鱉甲  
醋去裙  
炙黃米

右麤末每服二錢半薑棗煎食後少頃服

全鰲圓治勞瘵虛熱嗽喘

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

知母  
貝母  
杏仁

柴胡 兩二  
川芎 兩一  
當歸

明阿膠  
半炒  
兩酥  
各

右麕截入厚磁器中用中等活鱉一箇生宰於頭上

去鰲病以鰲肉并血并藥用醇酒五升同浸一宿蜜

紙封次早慢火同煮俟香熟取蟹令病者隨意食之

只留鱉甲并骨并藥焙乾為末以浸藥酒汁調米粉

為糊圓桐子大每七十圓不時米飲下



神授圖

方見虛勞門

論治療瘵瘵虫有効但隨時用飯頭圓

服之庶得藥味鮮

凡服藥永戒芻菜牛馬肉

瘵有數虫如蜈蚣如小蛇如蝦蟇如馬尾如亂絲如

爛麪如蒼蠅如壁蝨虫上紫下白形銳足細而有口

或如白蟻孔竅中皆出此皆勞瘵根毒若傳至三人

則如人形如鬼狀

前方驚甲生犀散已服後準七日又再服之

附論

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷九

滑伯仁論曰勞患人者有病機之不同有形狀之不一肌

膚羸瘦骨熱如蒸服藥無効針灸無功何也對曰勞者

虛勞也是因體虛之人房勞過損酒怒多端氣虛血耗

諸疾蜂生致使陰陽失序寒熱自生陽虛曰生寒陰虛

曰發熱以虛久熱變為骨蒸久則成勞久勞成瘵瘵者

住也有二十四種之名有三十六種之類有九十九種

之形種種不同症各異內有勞瘵尸瘵鬼瘵食瘵虫

瘵毒瘵此六者為傳尸之勞患滅門絕戶醫難治之又

云所因少壯之時醉飽迷房勞傷心腎蓋心主血腎主

精精竭血衰失於調護而無滋化之源致生融融之熱

咳咳之痰陰虛盜汗夜夢鬼交遺精困倦腰背酸疼咯

血咯痰頰紅喉痛飲食減少骨肉枯羸是為不治故曰

患此疾者有氣虛有血虛氣虛者易治血虛者難調故

也又云治虛勞世用寒涼之藥治熱症熱之愈熱用熱

藥治寒症寒之愈寒何也對曰東垣有云用苦寒之劑

妄治勞傷之熱大寒則愈虛其中大熱則愈怯其內治

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷九

療無端致傷脾胃殊不知甘能緩火勞者溫之保全者

當求微病之初莫治已病之後察氣血之虧盈審病源

之要道補益溫平無不効驗故集諸方補附於後

附諸方

加味十全大補湯治發熱漸成勞瘵者

十全大補湯加柴胡黃連煎服如熱在骨髓更加青

蒿驚甲煎服

方見虛熱門

青骨散治男子婦人五心頓熱欲成勞瘵





|                                                                                |                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 生地黃<br><small>二兩</small>                                                       | 人參<br><small>一兩</small>       | 防風<br><small>去蘆一兩</small> |
| 北柴胡<br><small>二兩</small>                                                       | 薄荷葉<br><small>七錢半</small>     | 秦艽                        |
| 赤茯苓                                                                            | 胡黃連<br><small>兩半</small>      | 熟地黃<br><small>一兩</small>  |
| 右咬咀每服五錢水一盞煎七分溫服                                                                |                               |                           |
| 太上混元丹<br><small>醫方集成</small>                                                   | 治勞損五臟補益真氣                     |                           |
| 紫河車<br><small>一具用少婦首生男子者良帶子全者於東流水洗斷血脉入麝香一錢在內以線縫定用生絹包裹懸胎於砂甕內入無灰酒五升慢火熬成膏</small> | 沉香<br><small>研別</small>       |                           |
| 硃砂<br><small>各一兩</small>                                                       | 人參<br><small>飛</small>        | 茯苓<br><small>酒浸</small>   |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷九                                                                 |                               |                           |
| 乳香<br><small>研別</small>                                                        | 安息香<br><small>酒煮去沙各二兩</small> |                           |
| 白茯苓<br><small>去皮二兩</small>                                                     |                               |                           |
| 右為末入河車膏子和藥末杵千百下丸如梧桐子大每服七十丸空心溫酒下沉香湯尤准服之可以輕身延年補損扶虛如病證虛極又須增加後項藥味                  |                               |                           |
| 川巴戟<br><small>去心</small>                                                       | 鍾乳粉                           | 陽起石<br><small>煨</small>   |
| 鹿茸<br><small>酒蒸</small>                                                        | 龍骨                            | 附子<br><small>泡去皮臍</small> |

|                                         |                               |                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 黃芪<br><small>去蘆各二兩</small>              | 桑寄生                           | 紫苑                          |
| 生鹿角<br><small>鎊各一兩</small>              |                               |                             |
| 修製為末和前藥為丸如婦人血海虛損榮衛不足多致潮熱經候不調或閉斷不通又宜增加此藥 |                               |                             |
| 當歸<br><small>去蘆</small>                 | 石斛<br><small>去根</small>       | 紫石英<br><small>煨醋汁水飛</small> |
| 栝子仁<br><small>炒別研</small>               | 鹿茸<br><small>酒蒸</small>       | 鱉甲<br><small>醋炙</small>     |
| 卷栝葉<br><small>各一兩</small>               | 牛膝<br><small>去蘆酒洗一兩半</small>  |                             |
| 修製為末和前藥為丸湯使如前虛寒者加炮熟附                    |                               |                             |
| 子二兩咳嗽者加紫苑茸二兩                            |                               |                             |
| 黃芪飲子<br><small>濟生方</small>              | 治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱乏力日漸黃瘦胸膈痞塞咳嗽痰多甚則唾血 |                             |
| 黃芪<br><small>蜜炙兩半</small>               | 當歸<br><small>去蘆酒洗</small>     | 紫苑茸<br><small>去土</small>    |
| 石斛<br><small>去根</small>                 | 地骨皮<br><small>去根</small>      | 人參                          |
| 桑白皮                                     | 附子<br><small>炮去皮</small>      | 鹿茸<br><small>酒蒸</small>     |
| 欵冬花<br><small>各一兩</small>               | 半夏<br><small>湯洗七次</small>     | 甘草<br><small>炙各半兩</small>   |
| 右咬咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎服此藥                    |                               |                             |



溫補榮衛枯燥不宜進唾血加阿膠蒲黃各半兩

樂令建中湯治臟腑虛損身軀消瘦潮熱自汗將成勞

瘵此藥大能退虛熱生血氣

經驗地仙散治骨蒸肌熱一切虛煩

五蒸湯治骨蒸勞熱自汗俱見積熱門

蘇合香圓方和劑治勞瘵傳尸骨蒸發熱肺痿喘急方見咳嗽

門

地骨皮散治虛勞潮熱骨蒸壯熱瘵証方見虛勞門

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

遇仙灸方和劑治療捷法取癸亥日二更後六神皆聚時

解去下衣直身平立以墨點記腰上兩傍陷處謂之

腰腿穴然後上床合面卧每穴灸七壯勞虫或吐或

瀉而出取後用火焚之棄於江河中恐害人故也或

依崔氏穴法灸之宜服後將軍丸

將軍丸方秘治傳尸勞瘵前灸法并此藥乃異人傳授累

經驗

錦文大黃酒蒸麝香一錢

管仲

牙皂去皮醋炙

桃仁去皮炒

檳榔

雷丸

驚甲醋炙黃各一兩

蕪荑半兩

右為末先將蒿葉二兩東邊桃柳李桑葉各七片水

一碗煎七分去滓入蜜一大盞再熬至成膏入前藥

末及麝安息香搗丸如梧桐子大每服三十丸食前

棗湯下

七聖神効散方秘治男子婦人遠年近日五勞七傷喘嗽

血尸勞等疾前藥無効針灸不應命將終服此神効

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

鹿茸大補湯方見虛勞門

十全大補湯方見虛勞門

黃耆益損湯方見虛勞門

進熱飲方書無進熱飲今存之

清心蓮子飲方見諸淋門

地骨皮散方見虛勞門

驚甲散方見熱門

右各一貼用無灰酒三升浸磁器瓶內半月開時空

心進二盞輕者半月重者一月必然痊可

勞瘵治例出明醫雜著

王節齋曰男子二十前後色慾過度損傷精血必生陰



虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯唾出血或咳血吐血衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此名勞瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以歲年然必須病人愛命堅心定志絕房室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無用也此病治之於蚤則易若到肌肉消燦沉困着床尺脉沉取細數則難為矣又此病大忌服人參若曾服過多者亦難治今製一方於後

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

治色慾証先見潮熱盜汗咳嗽倦怠趁早服之

主方

川芎 熟地黄 白芍藥 炒

當歸 酒洗各一錢 黃蘗 拌炒七分 知母 水一錢 蜜炒

生地黄 酒浸 甘草 炙五分 白朮 二錢 錢二分

天門冬 一錢 陳皮 七分 乾薑 紫三分 炒

生薑三片水煎空心溫服

若咳嗽盛加桑白皮馬兜鈴瓜蒌仁 各七分 五味子 十粒



迪志文化出版有限公司出版

若痰盛加薑製半夏貝母瓜蒌仁 各一錢

若盜汗多加牡蠣酸棗仁 各七分 浮小麥 撮一

若潮熱盛加桑白皮沙參地骨皮 各七分

若夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸 各七分

若赤白濁加白茯苓 一錢 黃連 三分 炒

若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮 一錢 黃芩山梔仁 各五分 炒

各五分 炒

若兼嗽血痰血出於脾也加桑白皮貝母黃連瓜蒌

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

仁 各七分

若兼嘔血吐血出於胃也加山梔黃連乾薑蒲黃 各炒

一韭汁 半銀 薑汁 少許

若兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側柏葉 炒各一錢

若先見血証或吐衄盛大者宜先治血治法輕少者

涼血止血盛大者先消瘀血次止血涼血蓋血未多

必有瘀於胃膈者不先消化之則止之涼之不應

也葛可久十藥神書方可次第檢用方內惟獨參



迪志文化出版有限公司出版

湯止可用於大吐血後昏倦脉微細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬<sup>錢五</sup>若如前所云陰虛火動潮熱盜汗咳嗽脉數不可用也說見本草集要人參條下明白

此病屬火大便秘多燥然須節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀溏則前項寒涼之藥難用矣急宜服藥理脾胃用白朮茯苓陳皮半夏神麴麥芽甘草等藥候胃氣復然後用前本病藥

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷九

收功保後可合補陰丸常服之及用葛可久方

又治勞瘵証方法

出十藥  
補書

心法附錄曰夫人之生也本天地氤氲之氣在乎保養真元固守根本則萬病不生四肢康健若曰不養真元不固根本疾病由是生焉且真元根本則氣血精液也余嘗聞葛先師有言曰萬病莫若勞瘵最為難治蓋勞之起因人之壯年氣血完聚精液充滿之際不能保養性命酒色是貪日夜耽嗜無有休息以致

耗散真元虛敗精液則嘔血吐痰以致骨蒸體熱腎虛精竭面白額紅口乾咽燥白濁遺精盜汗飲食艱難氣力全無謂之火盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡見醫者不究其源不窮其本或投之以大寒之劑或療之以大熱之藥妄為施治絕不取效殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫勞者萬無一人焉先師用藥治勞如羿之射無不中的今開用藥次第於後用藥之法如嘔吐咯嗽血者

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷九

先以十灰散遏住如甚者須以花蕊石散止之○大抵血見熱則行見寒則凝見灰則止理之必然○止血之後其人必倦其體次用獨參湯一補令其熟睡一覺不要驚動睡起病去五分後服諸藥

保和湯止嗽寧肺 保真湯補虛除熱

太平丸潤肺除痿 消化丸下痰消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之保真湯內分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗



六事加味用之餘無加用○服藥之法每日仍濃煎薄荷湯灌嗽喉中用太平丸先嚼一九徐徐嚥下次噙一九緩緩溶化至上床時亦如此用之夜則肺竅開藥必流入竅中此訣要緊○如痰壅却先用飴糖拌消化丸一百丸吞下次又依前噙嚼太平丸令其仰面卧而睡○服前七藥後若肺有嗽可煮潤肺丸食之如常七藥之前有餘暇煮此服之○亦可續煮白鳳膏食之固其根源完其根本○病可之後方可

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

合十珍丸服之此為收功起身之妙用也

甲字號十灰散治勞証嘔血吐血咯血嗽血先用此藥止之

大薊

小薊

栢葉

荷葉

茅根

茜根

大黃

山梔

牡丹皮

棕櫚皮

各等分

右各燒灰存性研極細末用紙包碗蓋於地上一夕

出火毒用時先將白藕搗絞汁或蘿蔔汁磨京墨半碗調服五錢食後下如病勢輕用此立止如血出成升斗者用後藥止之

乙字號花蕊石散五內崩損湧噴血出升斗用此止之

花蕊石

火煨存性  
研如粉

右童子小便一鍾煎溫調末三錢甚者五錢食後服下○如男用酒一半女用醋一半與小便處處和藥服使瘀血化為黃水服此訖以後藥補之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

丙字號獨參湯止血後服此藥補之

大人參

去蘆  
二兩

右咬咀水二鍾棗五箇煎不狗時細細服之服後宜熟睡一覺後服諸藥除根

丁字號保和丸治勞嗽肺成痿者服之決効

知母

貝母

天門冬

款冬花

各三錢

麥門冬

去心

天花粉

薏苡仁

杏仁

五味子

各二錢





|                              |     |                 |
|------------------------------|-----|-----------------|
| 粉草 <sub>炙</sub>              | 馬兜鈴 | 紫苑              |
| 百合                           | 桔梗  | 阿膠 <sub>炒</sub> |
| 當歸                           | 生苳  | 紫蘇              |
| 薄荷 <sub>各五分</sub>            |     |                 |
| 一方無地黃有百部                     |     |                 |
| 右以水煎生薑三片入飴糖一匙入藥內服之每日         |     |                 |
| 三服食後進加減於後                    |     |                 |
| 血盛加蒲黃茜根藕節大薊小薊茅花              |     |                 |
| 痰盛加南星半夏橘紅茯苓枳殼枳實括蕒實           |     |                 |
| 喘盛加桑皮陳皮大腹皮蘿蔔子葶藶蘇子            |     |                 |
| 熱盛加山梔子 <sub>炒</sub> 黃連黃芩黃栢連翹 |     |                 |
| 風盛加防風荆芥金沸草甘菊細辛香附             |     |                 |
| 寒盛加人參芍藥桂皮五味蠟片                |     |                 |
| 戊字號保真湯治勞証體虛胃蒸服之決補            |     |                 |
| 當歸                           | 生苳  | 白朮              |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷九

炒

炒



迪志文化出版有限公司出版

|                             |                    |                   |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 黃芪                          | 人參 <sub>各三錢</sub>  | 蓮心                |
| 赤茯苓                         | 白茯苓 <sub>各半錢</sub> | 天門冬               |
| 麥門冬                         | 陳皮                 | 白芍藥               |
| 知母                          | 黃栢 <sub>炒</sub>    | 五味子               |
| 柴胡                          | 地骨皮                | 熟苳 <sub>各一錢</sub> |
| 赤芍藥                         | 甘草 <sub>各半錢</sub>  |                   |
| 右以水煎生薑三片棗一枚食後服              |                    |                   |
| 驚悸加茯神遠志栢子仁酸棗仁               |                    |                   |
| 淋濁加萆薢台烏藥猪苓澤瀉                |                    |                   |
| 便溺加木通石葦篇蓄                   |                    |                   |
| 遺精加龍骨牡蠣蓮鬚連子                 |                    |                   |
| 燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲                 |                    |                   |
| 盜汗加浮麥子 <sub>炒</sub> 牡蠣黃芪麻黃根 |                    |                   |
| 己字號太平丸治勞証久嗽肺痿肺癰並皆噙服         |                    |                   |
| 天門冬                         | 麥門冬                | 知母                |
| 貝母                          | 欵冬花                | 杏仁 <sub>各二兩</sub> |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷九



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                                  |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 當歸                                                                               | 生地黃 | 熟地黃  |
| 黃連                                                                               | 阿膠珠 | 蒲黃   |
| 京墨                                                                               | 桔梗  | 薄荷   |
| 白蜜                                                                               | 麝香  | 薄荷   |
| 右為細末和勻用銀石器先下白蜜煉熟後下諸藥末攪勻再上火入麝香略熬三二沸丸如彈子大每日三服食後細嚼一丸煎薄荷湯緩緩化下次噙一丸臨卧時如痰盛先用飴糖拌消化丸吞下却噙嚼 |     |      |
| 此丸仰卧使藥流入肺竅則肺清潤其嗽退除七日                                                             |     |      |
| 病痊凡一切咳嗽只服此藥立愈                                                                    |     |      |
| 庚字號沉香消化丸治熱痰壅盛                                                                    |     |      |
| 青礞石                                                                              | 明礬  | 猪牙皂角 |
| 南星                                                                               | 半夏  | 白茯苓  |
| 陳皮                                                                               | 枳殼  | 枳實   |
| 薄荷                                                                               | 沉香  | 黃芩   |
| 右為細末和勻薑汁浸神麴攪糊為丸如梧桐子大                                                             |     |      |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷九

|                       |     |       |
|-----------------------|-----|-------|
| 每服一百丸每夜臨臥飴糖拌吞次噙嚼太平丸二  |     |       |
| 藥相攻痰嗽除根               |     |       |
| 辛字號潤肺膏治久嗽肺燥肺痿         |     |       |
| 羊肺                    | 杏仁  | 柿霜    |
| 具一                    | 研淨  |       |
| 真酥                    | 真粉  | 白蜜    |
|                       | 各一  | 二     |
| 右先將羊肺洗淨次將五味入水攪粘灌入肺中白  |     |       |
| 水煮熟如常服食前與七藥相間服之亦佳     |     |       |
| 壬字號白鳳膏治一切久怯弱極虛憊咳嗽吐痰咳血 |     |       |
| 發熱                    |     |       |
| 欽定四庫全書                |     |       |
| 仁齋直指                  |     |       |
| 卷九                    |     |       |
| 黑嘴白鴨                  |     |       |
| 一隻                    | 大京棗 | 參苓平胃散 |
|                       | 二   | 一     |
| 陳煮酒                   |     |       |
| 瓶一                    |     |       |
| 右將鴨縛定脚量患人飲酒多少隨量以酒盪溫將  |     |       |
| 鴨項割開滴血入酒攪勻飲之直入肺經潤補其肺  |     |       |
| 却將鴨乾搨去毛於脇邊開一孔取其腸雜拭乾次  |     |       |
| 將棗子去核每箇中實納參苓平胃散末填滿鴨肚  |     |       |
| 中用麻扎定以沙瓮一箇置鴨在內四圍用火慢煨  |     |       |



將陳煮酒作三次添入煮乾為度然後食其棗子陰乾隨意食用參湯送下後服補髓丹則補髓生精和血順氣

癸字號補髓丹一名十珍丸治久勞虛敗髓乾精竭血枯氣

少服前藥愈後服此藥

猪脊脊一條

羊脊髓一條

團魚一枚

烏雞一隻

四味製淨去骨存肉用酒一大碗於沙甌內煮熟搗

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

細再入後藥

大山藥五條

蓮肉半斤

京棗一百枚

柿霜十枚

四味修製淨用井花水一大瓶於沙甌內煮熟搗細

與前熟肉一處再用慢火熬之却下

明膠四兩

真黃蠟三兩

右二味逐漸下與前八味和一處搗成膏子和平胃散末四君子湯末知母黃栢末各一兩共一十兩搜

和成劑如十分硬再入白蜜同熬取起放青石上用木槌打如泥丸如梧桐子大每服一百丸不拘時候棗湯下

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷九

仁齋直指卷九



欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷十至十二

欽

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張炳

欽定四庫全書

仁齋直指卷十

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

漏濁

漏濁方論

精之主宰在心精之藏制在腎凡人酒色無度思慮過情心腎氣虛不能管攝往往小便頻數漏濁之所由生也因小便而出者曰尿精因見聞而出者曰漏精心不

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十

足而挾熱者為赤濁心不足而腎冷者為白濁陰不升陽不降上下乖睽是以有清濁不分之證藥法品量條列于下要必體認之精而後發用之審歟外此又有脾精不禁小便漏濁淋瀝不止手足力乏腰背酸疼盍用蒼朮等劑以斂脾精斂脾謂何精生於穀也

漏濁證治

約精圓治小便中泄精不止

白龍骨

貳兩  
研細

新韭子

冬霜後採者壹斤好  
酒浸壹宿次日搗細



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

|                        |  |            |  |                                                |  |                   |  |                  |  |                                |  |                                                                       |  |            |  |                            |  |                     |  |                                                             |  |                                          |  |              |  |         |  |                       |  |
|------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------|--|---------|--|-----------------------|--|
| 右末酒調糯米為糊圓桐子大每服參拾圓空心塩湯下 |  | 蓮子六一湯治心熱赤濁 |  | 石蓮肉 <small>連心用陸兩</small> 甘草 <small>灸壹兩</small> |  | 右末每服貳錢食後燈心壹小撮煎湯調下 |  | 清心蓮子飲治心中客熱煩燥赤濁肥脂 |  | 石蓮肉 白伏苓 <small>各壹兩</small> 益智仁 |  | 遠志 <small>水浸取肉薑製炒</small> 麥門冬 <small>去心</small> 人參 <small>各半兩</small> |  | 石昌蒲 車前子 白朮 |  | 澤瀉 甘草 <small>微炙各壹分</small> |  | 右剉散每服參錢添燈心壹握煎服有熱加薄荷 |  | 辰砂妙香散 <small>方見瘕門</small> 蠟苓圓 <small>方見消渴門</small> 治小便赤濁又五苓 |  | 散 <small>方見水飲門</small> 可夾和辰砂妙香散每服壹錢用燈心并去 |  | 心麥門冬煎湯調下男女通用 |  | 雞清圓便濁通用 |  | 圓白半夏 <small>生</small> |  |
|------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------|--|---------|--|-----------------------|--|

|                                                          |  |                                   |  |                                |  |          |  |                                    |  |                                   |  |                                 |  |                                                                         |  |                                    |  |              |  |                                                                      |  |                                                                      |  |                                |  |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 右為末用雞子清圓桐子大稍乾以木猪苓末夾和慢火同炒圓子裂為度留木猪苓末養藥磁器密收每叁拾圓食前白伏苓煎湯下或用鹽湯 |  | 寧志膏調平心氣赤白濁通用 <small>方見心驚門</small> |  | 十四友圓治心虛便濁 <small>方見驚悸門</small> |  | 妙應圓赤白濁通用 |  | 真龍骨 辰砂 厚牡蠣 <small>以腐草鞋重包揷定</small> |  | 火煨並研細 石昌蒲 <small>各貳錢半</small> 白伏苓 |  | 益智仁 石蓮肉 縮砂仁 <small>各叁錢半</small> |  | 川練子 <small>蒸去皮焙</small> 桑螵蛸 <small>瓦上焙</small> 兔絲子 <small>酒浸一宿焙</small> |  | 右末以山藥碎炒末為糊圓桐子大每伍拾圓日間煎人參酸棗仁湯下臨卧粳米湯下 |  | 遠志圓治心氣不足遺精白濁 |  | 遠志 <small>水浸取肉薑淹焙乾</small> 山藥 <small>熟炒</small> 地黃 <small>洗曬</small> |  | 天門冬 <small>去心</small> 龍齒 <small>研細各壹兩半</small> 麥門冬 <small>去心</small> |  | 北五味子 車前子 <small>炒略</small> 白伏苓 |  |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--|----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|





|                                          |                                |            |      |     |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------|------|-----|
| 伏神                                       | 地骨皮                            | 各壹兩        | 辣桂   | 陸錢  |
| 木                                        | 貳錢半                            | 壹字         |      |     |
| 右末煉蜜圓桐子大每五十圓食前粳米湯下                       |                                |            |      |     |
| 伏兔丹赤白濁通用                                 | 方見消渴門                          | 赤濁燈心煎湯下白濁白 |      |     |
| 伏苓煎湯下                                    |                                |            |      |     |
| 平補圓治腎虛心熱小便急而數澀而瀝如水竇欲滲之狀又且油濁              | 方見消渴門                          | 兼用辰砂妙香散佐之  | 方見瘡門 |     |
| 牡蠣圓治精氣不禁白濁夢遺                             |                                |            |      |     |
| 圓白半夏                                     | 壹兩盪洗拾次每箇作兩片以木猪苓去皮貳兩為龕末同半夏慢火炒黃放 |            |      |     |
| 欽定四庫全書                                   | 仁齋直指                           |            |      |     |
| 卷十                                       |                                |            |      |     |
| 地出火                                      | 毒壹宿                            |            |      |     |
| 右未用木猪苓入煨過厚牡蠣粉壹兩同末以山藥糊圓桐子大留木猪苓養藥磁器密收每叁拾圓伏 |                                |            |      |     |
| 苓煎湯下                                     |                                |            |      |     |
| 金櫻子圓治諸虛漏精白濁                              |                                |            |      |     |
| 真龍骨                                      | 厚牡蠣                            | 煨          | 桑螵蛸  | 各壹兩 |
|                                          |                                |            |      |     |
| 右以雄黑豆壹盞淘濕將前叁件置豆上蒸半日去                     |                                |            |      |     |
| 豆焙叁件為末入白伏苓壹兩末金櫻子肆拾玖枚                     |                                |            |      |     |

|                       |           |       |
|-----------------------|-----------|-------|
| 去刺并穰蒂洗淨搥碎磁器內入水一盞煮濃汁濾  |           |       |
| 清調伏苓末為糊圓桐子大每參拾圓食前用益智  |           |       |
| 伍枚連殼搥碎北五味子拾粒縮砂仁參箇煎湯下  |           |       |
| 小兒絲子圓用北五味子煎湯下治諸虛白濁    |           |       |
| 桑螵蛸散治心腎不和小便白濁或如米泔或為夢泄 |           |       |
| 桑螵蛸                   | 遠志        | 白伏神   |
| 略焙                    | 水浸取肉曬薑汁和焙 |       |
| 石菖蒲                   | 人參        |       |
| 當歸                    | 龍骨        | 鼈甲    |
|                       | 研別        | 炙黃各半兩 |
| 欽定四庫全書                |           |       |
| 仁齋直指                  |           |       |
| 卷十                    |           |       |
| 甘草                    | 錢貳        |       |
| 右為末每服貳錢人參伏苓煎湯調下夜卧服    |           |       |
| 生料四君子湯                | 方見瘡門      | 生料五苓散 |
| 方見水飲門                 |           |       |
| 貳藥夾和每服貳錢用燈心壹撮同煎服治小便白濁 |           |       |
| 龍齒補心湯治諸虛不足虛熱潮來心神驚惕睡卧不 |           |       |
| 寧小便油濁                 |           |       |
| 龍齒                    | 煨別研       | 當歸    |
| 酒浸壹宿焙                 |           |       |
| 熟地黄                   | 北梗        | 酸棗仁   |
| 洗焙                    | 焙         | 炒     |



|                                                    |                                                                                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 白伏苓                                                | 白伏神 <small>去木</small>                                                                                  | 遠志 <small>水浸取肉曬</small>                          |
| 枳殼 <small>去穰炒</small>                              | 麥門冬 <small>去心</small>                                                                                  | 半夏 <small>麴</small>                              |
| 白朮                                                 | 甘草 <small>炙各半兩</small>                                                                                 | 肉桂 <small>貳錢半</small>                            |
| 綿黃耆 <small>柒錢半蜜炙</small>                           | 右麓末每服參錢水盞半薑五片粳米一小撮同煎不時服臨卧服                                                                             |                                                  |
| 煉鹽方治漏精白濁                                           |                                                                                                        |                                                  |
| 雪白鹽 <small>入磁瓶內築十分實以瓦蓋頂黃泥塗封火煨壹日取出放陰地上壹夜密器收</small> | 欽定四庫全書<br> 仁齋直指<br>卷十 |                                                  |
| 白伏苓                                                | 山藥 <small>炒各壹兩</small>                                                                                 | 右為末入塩壹兩研和用沸湯浸棗取肉研夾煉蜜再研為圓桐子大每服參拾圓空心棗湯下蓋欲甘以濟鹹脾腎兩得也 |
| 山藥圓                                                |                                                                                                        |                                                  |
| 乾山藥 <small>貳兩</small>                              | 北五味子                                                                                                   | 蓯蓉 <small>酒浸焙各肆兩</small>                         |
| 兔絲子 <small>酒浸散研</small>                            | 牛膝 <small>酒浸焙</small>                                                                                  | 澤瀉                                               |
| 熟地黄 <small>洗</small>                               | 山茱萸                                                                                                    | 伏神 <small>去木</small>                             |

|                          |             |       |      |     |         |
|--------------------------|-------------|-------|------|-----|---------|
| 巴戟                       | 去心          | 赤石脂   | 各壹兩  | 杜仲  | 劉薑汁淹炒壹兩 |
| 右末煉蜜圓桐子大常服參拾圓鹽湯下         |             |       |      |     |         |
| 安腎圓                      | 方見水         | 白圓子   | 方見身  | 山藥圓 | 方見前     |
| 每服柒拾圓食前煎雙和湯送下            | 勞門          | 治虛勞羸瘦 |      |     |         |
| 浮膩白濁                     |             |       |      |     |         |
| 還少丹治心腎俱虛漏精白濁             | 勞類          |       |      |     |         |
| 鹿茸益精圓治心虛腎冷漏精白濁           |             |       |      |     |         |
| 鹿茸                       | 去皮酥炙微黃      | 桑螵蛸   | 瓦上焙  | 肉蓯蓉 |         |
| 當歸                       |             | 巴戟    | 去心   | 兔絲子 | 酒浸軟研    |
| 杜仲                       | 截碎薑汁淹炒斷絲    | 川練子   | 蒸去皮焙 | 益智仁 |         |
| 禹餘糧                      | 煨紅醋淬以碎為度各叁分 | 韭子    | 微炒   | 赤石脂 |         |
| 故紙                       | 炒           | 山茱萸   |      |     |         |
| 龍骨                       | 別研各貳分       | 滴乳香   | 壹分   |     |         |
| 右細末酒調糯米糊圓桐子大每柒拾圓食前白伏苓煎湯下 |             |       |      |     |         |
| 家韭子圓治陽氣衰敗白濁遺精            |             |       |      |     |         |



|                                             |                                |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 家韭子<br><small>陸兩炒</small>                   | 鹿茸<br><small>肆兩酥炙</small>      | 茯苓<br><small>酒浸焙</small> |
| 牛膝                                          | 熟地黃<br><small>洗曬</small>       | 當歸<br><small>各貳兩</small> |
| 巴戟<br><small>去心</small>                     | 兔絲子<br><small>酒浸研焙各壹兩半</small> |                          |
| 杜仲<br><small>剉薑淹炒</small>                   | 石斛                             | 桂心                       |
| 乾薑<br><small>生各一兩</small>                   |                                |                          |
| 右末酒調糯米為糊圓桐子大每服柒拾圓空心塩湯下亦治胞冷遺尿                |                                |                          |
| 震靈丹治腎經虛憊漏濁不止<br><small>方見瀉門</small> 用二陳湯加白伏 |                                |                          |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷十</small>             |                                |                          |
| 苓送下<br><small>方見瘡類</small>                  |                                |                          |
| 白圓子治陰陽不調清濁相干小便渾濁<br><small>方見身疼門</small> 用伏 |                                |                          |
| 苓湯送下                                        |                                |                          |
| 分清飲治思慮過度清濁相干小便白濁                            |                                |                          |
| 益智仁<br><small>壹兩醋浸壹</small>                 | 川草薢                            | 石昌蒲<br><small>去毛</small> |
| 天台烏藥                                        | 白伏苓<br><small>各壹兩</small>      | 甘草<br><small>肆錢</small>  |
| 右為末每貳錢塩少許同煎食前服                              |                                |                          |
| 蒼朮難名丹治元陽氣衰脾精不禁漏濁淋瀝腰痛力                       |                                |                          |

|                                     |                                     |                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 疲                                   | 蒼朮<br><small>枹去麤皮壹斤米泔浸壹日夜焙乾</small> | 舶上茴香<br><small>炒</small>   |
| 川練子<br><small>蒸去皮取肉焙乾各叁兩</small>    | 川烏<br><small>炮去皮臍</small>           | 龍骨<br><small>別研各貳兩</small> |
| 故紙<br><small>炒</small>              | 白伏苓                                 |                            |
| 右末酒麪糊圓桐子大朱砂為衣每服伍拾圓空心縮砂煎湯下粳米湯下蒼朮收斂脾精 |                                     |                            |
| 附諸方                                 |                                     |                            |
| 妙應圓治赤白濁                             |                                     |                            |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷十</small>     |                                     |                            |
| 真龍骨                                 | 辰砂                                  | 石昌蒲<br><small>各貳錢半</small> |
| 川練子<br><small>取肉半兩</small>          | 白伏苓                                 | 益智仁                        |
| 石蓮肉                                 | 縮砂仁<br><small>各壹錢半</small>          | 桑螵蛸<br><small>瓦上焙</small>  |
| 兔絲子<br><small>酒浸一宿焙各半兩</small>      | 牡蠣<br><small>破草鞋包火煅細研三錢</small>     |                            |
| 右以山藥碎炒為糊丸如桐子大每服五拾丸間日煎人參酸棗仁湯下臨卧粳米飲湯下 |                                     |                            |
| 遠志圓<br><small>濟生方</small>           | 治因事有驚心神不定夜夢驚墮小便白濁                   |                            |
| 遠志<br><small>去心煮汁奄</small>          | 石昌蒲<br><small>各貳兩</small>           | 伏神<br><small>去木</small>    |



|                                                |
|------------------------------------------------|
| 白茯苓 <small>去皮</small> 人參 龍齒 <small>各壹兩</small> |
| 右為末煉蜜丸梧子大以辰砂為衣每服柒拾丸熱湯下                         |
| 一方治心經伏暑小便赤濁                                    |
| 人參 白朮 赤茯苓 <small>去皮</small>                    |
| 香薷 澤瀉 木猪苓 <small>去皮</small>                    |
| 蓮肉 麥門冬 <small>去心各等分</small>                    |
| 右咬咀每服肆錢水壹盞煎服                                   |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十                                 |
| 一方治小便白濁出髓條                                     |
| 酸棗仁 <small>炒</small> 白朮 白茯苓                    |
| 破故紙 人參 益智 <small>洗淨</small>                    |
| 大茴香 左顧牡蠣 <small>童便煨各等分</small>                 |
| 右為末加青塩酒丸如梧子大每服叁拾丸温酒米飲任下                        |
| 秘傳金鎖思仙丹治男子嗜慾過多精氣不固澁以去脫之劑                       |



|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓮花蕊拾兩 <small>煖無毒鎮心忌硫黃蒜</small> 石蓮子拾兩 <small>味甘平温</small>                                  |
| 無毒經秋正黑次水者是也本功益氣安心澁精止痛取淨粉用                                                                 |
| 鷄頭實拾兩 <small>味甘平無毒益精氣強志取其實并中子搗爛曝乾再搗篩取淨粉</small>                                           |
| 右以金櫻子三斤取霜後半黃者木白中轉杵却刺勿損擘為兩片去水淘淨爛搗入大鍋以水煎不絕火約水耗半取出濾過重煎如稀錫市肆乾者焙之用水浸軟去子煎令如法入前藥末和丸桐子大每服叁拾丸空心塩湯下 |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十                                                                            |
| 針灸法陰交一穴 <small>在臍下一寸</small> 氣海一穴 <small>在臍下一寸半</small> 關元 <small>在臍下三寸</small>           |
| 夢泄                                                                                        |
| 夢泄方論                                                                                      |
| 邪客於陰神不守舍故心有所感夢而後泄也其候有三年少氣盛鰥曠矜持強制情慾不自覺知此泄如瓶之滿而溢者也人或之是有為無病勿藥可矣心家氣虛不能主宰或心受熱陽氣不收此泄如瓶之側而出      |



者也人多有之其病猶輕合用和平之劑臟腑積弱真元久虧心不攝念腎不攝精此泄如瓶之罅而漏者也人少有之其病最重須當大作補湯或謂夢泄尤其於房勞此世俗習聞其說也獨不觀證候之有重輕乎外此又有一輩神氣消磨怪異橫生風邪乘其虛鬼氣干其正往往與妖魅交通是又厄運之不可曉者也法藥相助誠哉是言

夢泄證治

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十

伏苓圓治心虛夢泄

白伏苓

右為末每服肆錢粳米湯調下間用溫熱水調下空

心食前臨卧日參服

蓮子六一湯雞清圓

方見漏濁門

辰砂妙香散

方見治心熱

夢泄並用燈心一握煎湯下

鹿角散治臟腑久虛夢泄

鹿角屑

鹿茸

去皮酥炙  
各壹兩

白伏苓

參分

人參

白伏神

桑螵蛸

焙蒸

芎藭

當歸

故紙

炒

龍骨

研別

新韭子

酒浸壹宿  
焙各半兩

栢子仁

殼去

甘草

炙各一分

服

還少丹

方見虛勞門

鹿茸益精圓家韭子圓

方見漏濁門

大補虛

損夢遺用十補湯送下

方見癰冷門

間用滴乳香末泡湯下

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十

震靈丹封固下焦治夢泄不止

方見瀉門

空心人參北五味

子煎湯下

附諸方

秘傳龍骨鎖精丹

白龍骨

煨貳兩半

牡蠣

煨貳兩

知母

錢伍

黃栢

陸錢

猪苓

伍錢

人參

去蘆壹兩

遠志

甘草湯煮去心壹兩半

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服肆伍拾丸空





|                       |  |                                         |  |                                   |                         |                     |
|-----------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 心鹽酒或鹽湯送下              |  | 固精圓治心神不安腎虛自泄精                           |  | 知母 <small>炒</small>               | 黃栢 <small>酒炒各壹兩</small> | 牡蠣 <small>煨</small> |
| 龍骨 <small>煨</small>   |  | 芡實                                      |  | 蓮蕊                                |                         |                     |
| 伏苓                    |  | 遠志 <small>去心</small>                    |  | 山茱萸 <small>肉各叁錢</small>           |                         |                     |
| 右為末煮山藥糊丸梧子大硃砂為衣服五十丸   |  | 芡實圓 <small>濟生方</small> 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不 |  | 固面少顏色驚悸健忘小便赤澁遺精白濁足脛酸疼             |                         |                     |
| 耳聾目暗                  |  | 欽定四庫全書                                  |  | 仁齋直指                              |                         |                     |
| 芡實 <small>皮蒸去</small> |  | 蓮花鬚 <small>兩貳</small>                   |  | 伏神 <small>去木</small>              |                         |                     |
| 山茱萸肉                  |  | 龍骨 <small>生用</small>                    |  | 五味子                               |                         |                     |
| 枸杞子                   |  | 熟地黄 <small>酒蒸</small>                   |  | 韭子 <small>炒</small>               |                         |                     |
| 肉蓯蓉 <small>酒洗</small> |  | 川牛膝 <small>去蘆酒洗</small>                 |  | 紫石英 <small>煨柒次各壹兩</small>         |                         |                     |
| 右為末酒煮山藥為丸如梧子大每服柒拾丸空心  |  | 鹽湯下                                     |  | 玉鎖丹 <small>御藥院方</small> 治精氣虛滑遺泄不禁 |                         |                     |

|                                  |  |                      |  |        |  |
|----------------------------------|--|----------------------|--|--------|--|
| 龍骨                               |  | 蓮花蕊                  |  | 雞頭實    |  |
| 烏梅肉 <small>各等分</small>           |  | 右為末用熟山藥去皮為膏和丸小豆大每服叁拾 |  | 丸空心米飲下 |  |
| 秘傳金鎖思仙丹桑螵蛸散 <small>並見漏濁門</small> |  | 欽定四庫全書               |  | 仁齋直指   |  |
| 仁齋直指卷十                           |  |                      |  |        |  |



欽定四庫全書

仁齋直指卷十一

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

眩運

眩運方論

眩言其黑運言其轉冒言其昏眩運之與冒眩其義一也其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟舡之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一塗而取軌也風則有汗寒

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十一

則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩運也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥此七情攻虛而眩運也淫慾過度腎家不能納氣歸元使諸氣逆奔而上此眩運之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩運之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀滯不行皆能眩運是不可不推尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下然而眩運欲解自汗則有之

若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自冒者此虛極而脫也識者將有采薪之憂

溢大多作眩運諸風棹眩皆屬於肝

眩運證治

茯苓桂枝白朮甘草湯治氣上衝胃戰搖眩運

茯苓

壹兩

桂枝

叁分

白朮

甘草

炙各半兩

右剉散每服肆錢新水煎服風證加川芎細辛濕證

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十一

加川芎蒼朮寒證加乾薑良薑

理中湯

方見瀉門

治寒濕眩運仍吞來復丹

方見暑門

甚者養正

丹

方見瀉門

芎朮除眩湯治感濕感寒頭重眩運

附子

生

白朮

川芎

各半

官桂

甘草

炙各貳錢半

右剉每服叁錢薑柒厚片同煎食前服

乾薑甘草湯

方見脾門

附子理中湯

方見寒類

並主虛寒眩運



桂苓圓治暑證眩運

肉桂 伏苓 等分

右細末煉蜜圓每兩作捌圓每服壹圓用香薷剉散

調下消暑圓通用 方並見暑門

十四友圓 方見驚悸門 安腎圓 方見水飲門 二藥夾和用和劑七

氣湯送下 方見氣門 治七情相干眩運欲倒仍間用乳香泡

湯下

芎辛湯 方見頭風門 治痰飲厥逆眩運

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十一

千金五套圓 方見脾疼門 治痰飲結聚胃脘眩運欲嘔

香橘飲治氣虛眩運

木香 白朮 半夏麴

橘皮 白伏苓 縮砂 各半兩

丁香 甘草 各壹分

右剉散每服參錢薑伍厚片同煎吞蘇合香圓 方見嗽門

本方加當歸川芎各參分官桂半兩治血虛眩運

蘇沈沉麝圓治一切血運每服壹圓研開用滴乳香泡

湯調下

芎藭湯 方見血類 加細辛石菖蒲治婦人血運眩冒不省人

事次用和劑七氣湯佐之

五苓散 方見水飲門 加赤伏苓治停飲眩冒心下悸氣

養正丹 方見冷痢門 來復丹 方見暑門 升降陰陽用之養正丹夾

和震靈丹以乳香泡湯下升降鎮墜功用兩全

震靈丹 方見瀉門 黑錫丹 方見冷痢門 鎮墜眩運用之

蘇合香圓用棗湯調開吞震靈丹治心氣不斂怔忡頭

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十一

運

二陳湯 方見癰門 加生乾薑治因氣鬱痰眩運及酒食所傷

眩運及酒食所傷眩運吞來復丹尤勝

芷彈圓治風證眩運及血證眩運

新白芷 擇大塊湯盪洗三次日乾

右為末煉蜜圓彈子大每服壹圓荊芥煎湯嚼下

白附子圓治風痰上厥眩運頭疼

白附子 炮 南星 炮 半夏 盪次



|                                                                                                            |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 旋覆花                                                                                                        | 甘菊                   | 天麻                     |
| 川芎                                                                                                         | 橘紅                   | 僵蠶 <small>炒去絲</small>  |
| 乾薑 <small>生各一兩</small>                                                                                     | 全蝎 <small>半兩</small> |                        |
| 右末用生薑半斤取汁打麪糊小圓每伍拾圓食後                                                                                       |                      |                        |
| 荊芥湯下                                                                                                       |                      |                        |
| 人參前胡湯治風痰頭運目眩                                                                                               |                      |                        |
| 前胡                                                                                                         | 橘紅                   | 半夏麴                    |
| 木香                                                                                                         | 枳殼 <small>製</small>  | 紫蘇葉                    |
| 欽定四庫全書<br><br>仁齋直指<br>卷十一 |                      |                        |
| 赤茯苓                                                                                                        | 南星 <small>炮</small>  | 甘草 <small>炙各半兩</small> |
| 人參 <small>錢參</small>                                                                                       |                      |                        |
| 右麓末每參錢薑柒厚片慢火熟煎服                                                                                            |                      |                        |
| 真方白圓子 <small>方見身</small>                                                                                   | 用參拾圓蘇合香圓三粒全蝎壹        |                        |
| 箇炙為末三件研和以紫蘇橘皮煎湯入生薑汁少許                                                                                      |                      |                        |
| 調下治諸風眩運搐掣語短嘔吐                                                                                              |                      |                        |
| 驚悸                                                                                                         |                      |                        |
| 驚悸方論                                                                                                       |                      |                        |

|                            |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此      |                       |                       |
| 驚悸之所肇端也曰驚曰悸其可無辯乎驚者恐怖之      |                       |                       |
| 謂悸者怔忡之謂心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物      |                       |                       |
| 遇險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則      |                       |                       |
| 為驚心虛而停水則胃中滲漉虛氣流動水既上乘心      |                       |                       |
| 火惡之心不自安使人有快快之狀是則為悸驚者與      |                       |                       |
| 之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所謂扶虛      |                       |                       |
| 不過調養心血和平心氣而已若一切以剛燥用工或      |                       |                       |
| 者心火自炎又有熱生風之證               |                       |                       |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十一            |                       |                       |
| 驚悸證治                       |                       |                       |
| 養心湯治心虛血少驚惕不寧               |                       |                       |
| 黃耆 <small>炙</small>        | 白茯苓                   | 伏神                    |
| 半夏麴                        | 當歸                    | 川芎 <small>各半兩</small> |
| 遠志 <small>取肉薑汁淹焙</small>   | 辣桂                    | 栝子仁                   |
| 酸棗仁 <small>浸去皮隔紙炒香</small> |                       | 北五味子                  |
| 人參 <small>各壹分</small>      | 甘草 <small>炙肆錢</small> |                       |



|                       |  |                           |  |                                  |  |                                                                             |  |                                                                         |  |                      |  |                                                                             |  |                                                                             |  |                                  |  |
|-----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一 |  | 右末煉蜜圓桐子大每參拾圓食後棗湯下         |  | 參乳圓治心氣不足怔忡自汗                     |  | 人參<br><small>兩半</small> 當歸<br><small>壹兩</small> 乳香<br><small>壹錢</small>     |  | 右末山藥煮糊圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下                                                    |  | 十四友圓治心血俱虛怔忡驚惕        |  | 栝子仁<br><small>研</small> 遠志肉<br><small>薑汁</small> 酸棗仁<br><small>湯浸去皮</small> |  | 紫石英<br><small>煨</small> 熟乾地黄 川當歸                                            |  | 白伏苓 白伏神 人參                       |  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一 |  | 石菖蒲<br><small>各壹分</small> |  | 焙各<br><small>兩</small> 乳香        |  | 朱砂<br><small>別研</small>                                                     |  | 酸棗仁<br><small>溫酒浸半日去殼隔紙炒香</small> 遠志<br><small>酒浸半日新布裹撻取肉</small>       |  | 栝子仁 琥珀 當歸            |  | 人參 白伏苓 伏神                                                                   |  | 寧志圓治心虛血虛多驚                                                                  |  | 赤伏苓治停水怔悸                         |  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一 |  | 右麓末每服參錢薑伍片棗貳枚煎食前服加檳榔      |  | 右末煉蜜圓桐子大每參拾圓食後棗湯下                |  | 參乳圓治心氣不足怔忡自汗                                                                |  | 人參<br><small>兩半</small> 當歸<br><small>壹兩</small> 乳香<br><small>壹錢</small> |  | 右末山藥煮糊圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下 |  | 十四友圓治心血俱虛怔忡驚惕                                                               |  | 栝子仁<br><small>研</small> 遠志肉<br><small>薑汁</small> 酸棗仁<br><small>湯浸去皮</small> |  | 紫石英<br><small>煨</small> 熟乾地黄 川當歸 |  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一 |  | 白伏苓 白伏神 人參                |  | 紫石英<br><small>煨</small> 熟乾地黄 川當歸 |  | 栝子仁<br><small>研</small> 遠志肉<br><small>薑汁</small> 酸棗仁<br><small>湯浸去皮</small> |  | 十四友圓治心血俱虛怔忡驚惕                                                           |  | 右末山藥煮糊圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下 |  | 參乳圓治心氣不足怔忡自汗                                                                |  | 人參<br><small>兩半</small> 當歸<br><small>壹兩</small> 乳香<br><small>壹錢</small>     |  | 右末煉蜜圓桐子大每參拾圓食後棗湯下                |  |

|                       |  |                                     |  |                     |  |                                                                         |  |                                                  |  |                      |  |                         |  |                                                    |  |                                                  |  |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一 |  | 蜜陀僧散治大驚入心敗血頑痰填塞心竅暗不能言               |  | 右細末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下 |  | 朱雀圓治心病怔忡不止                                                              |  | 白伏神<br><small>貳兩</small> 沉香<br><small>半兩</small> |  | 右細末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下  |  | 朱砂<br><small>半兩</small> |  | 龍齒<br><small>研各一兩</small> 朱砂<br><small>研半兩</small> |  | 黃耆<br><small>炙</small> 阿膠<br><small>炒</small> 辣桂 |  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一 |  | 湯泡麝香調下亦治瘡風頗有奇效<br><small>出夷</small> |  | 溫膽湯治心膽虛怯觸事多驚亦治水氣怔忡  |  | 半夏<br><small>製</small> 枳殼<br><small>製</small> 白伏苓<br><small>各壹兩</small> |  | 橘紅<br><small>壹兩</small> 甘草<br><small>炙半</small>  |  | 右剉每服參錢半薑柒片棗貳枚刮青竹皮壹塊如 |  | 錢大煎服或加製遠志尤妙             |  | 加味四七湯治心氣鬱滯豁痰散驚                                     |  | 黃耆<br><small>炙</small> 阿膠<br><small>炒</small> 辣桂 |  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一 |  | 蜜陀僧<br><small>即極細</small>           |  | 右細末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下 |  | 朱雀圓治心病怔忡不止                                                              |  | 白伏神<br><small>貳兩</small> 沉香<br><small>半兩</small> |  | 右細末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下  |  | 朱砂<br><small>半兩</small> |  | 龍齒<br><small>研各一兩</small> 朱砂<br><small>研半兩</small> |  | 黃耆<br><small>炙</small> 阿膠<br><small>炒</small> 辣桂 |  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一 |  | 湯泡麝香調下亦治瘡風頗有奇效<br><small>出夷</small> |  | 溫膽湯治心膽虛怯觸事多驚亦治水氣怔忡  |  | 半夏<br><small>製</small> 枳殼<br><small>製</small> 白伏苓<br><small>各壹兩</small> |  | 橘紅<br><small>壹兩</small> 甘草<br><small>炙半</small>  |  | 右剉每服參錢半薑柒片棗貳枚刮青竹皮壹塊如 |  | 錢大煎服或加製遠志尤妙             |  | 加味四七湯治心氣鬱滯豁痰散驚                                     |  | 黃耆<br><small>炙</small> 阿膠<br><small>炒</small> 辣桂 |  |



|                           |                                           |                              |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 半夏<br><small>製貳兩半</small> | 白茯苓                                       | 厚朴<br><small>製各壹兩半</small>   |
| 伏神                        | 紫蘇葉<br><small>各壹兩</small>                 | 遠志<br><small>薑汁蘤濕去肉焙</small> |
| 甘草<br><small>炙各半兩</small> | 右剉每服肆錢薑柒片石昌蒲半寸棗貳枚煎服                       |                              |
| 伏苓甘草湯治心下停水忪悸              | 伏苓<br><small>各貳兩</small>                  | 甘草<br><small>炙壹兩</small>     |
| 生薑<br><small>參兩</small>   | 右剉每服肆錢水煎服                                 |                              |
| 薑朮湯治虛證停飲怔忡                | 白薑<br><small>生</small>                    | 白朮                           |
| 半夏<br><small>各半兩</small>  | 辣桂                                        | 甘草<br><small>炙各壹分</small>    |
| 右剉每服參錢薑棗煎服                | 小半夏伏苓湯五苓散並主水氣心下怔忡<br><small>方見水飲門</small> |                              |
| 炙甘草湯治心下動悸其脉結代動而時止曰伏       | 甘草<br><small>炙壹兩</small>                  | 人參<br><small>半兩</small>      |
| 桂枝<br><small>參分</small>   | 麻仁                                        | 麥門冬<br><small>去心各壹分</small>  |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 生薑<br>分參                      | 大棗<br>枚捌           |
| 右龕末每椀參大錢水壹盞半酒半盞煎至捌分入          |                    |
| 透明阿膠壹斤俟膠消溫和服日進參劑不拘時           |                    |
| 寧志膏治因驚失心                      |                    |
| 人參                            | 酸棗仁<br>湯浸去皮<br>各壹兩 |
| 辰砂<br>半兩                      | 滴乳香<br>壹錢乳鉢<br>坐水研 |
| 右末煉蜜和杵圓如彈子每壹圓薄荷湯化下            |                    |
| 附諸方                           |                    |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十一         |                    |
| 硃砂安神丸治血虛心煩懊懷驚悸怔忡胸中氣亂<br>方見內傷門 |                    |
| 加味定志圓治痰迷心隔驚悸怔忡                |                    |
| 遠志<br>去心<br>貳兩                | 人參<br>壹兩           |
| 白茯苓<br>參兩                     | 琥珀                 |
|                               | 鬱金                 |
| 右為細末煉蜜丸如梧子大硃砂為衣每服貳拾丸          |                    |
| 米湯下                           |                    |
| 健忘                            |                    |



丹溪云精神短少者多有痰者戴云健忘者為事有始無終言談不知首尾此以為病之名非此生成之愚頑不知人事者

歸脾湯濟生方治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白朮伏神木去黃芪蜜炙

龍眼肉酸棗仁殼去人參去蘆各壹兩

木香兩半甘草炙貳錢半

右咬咀每服肆錢水壹鍾薑伍片棗壹枚煎柒分溫

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十一

服

人參遠志圓聖惠方治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬去心白茯苓各柒錢半菖蒲

人參去蘆遠志去心酸棗仁

黃芪蜜炙各半兩桔梗丹砂

官桂去皮各貳錢半

右為末蜜丸如豆大每服貳拾丸至參拾丸米湯下

寧志膏和劑方治心神恍惚一時健忘方見前



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十一

仁齋直指卷十一

欽定四庫全書

仁齋直指卷十二

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

痲瘋

痲瘋方論

風寒暑濕邪自外來飲食居處邪由內作此痲瘋感受之胚胎也豈特夏傷於暑秋必為痲哉古人蓋以其受病最多者言之耳痲候何如始而呵欠繼而足冷面色

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十二

青黃身體拘急寒慄鼓頷腰脊俱疼寒去未幾內外皆熱頭痛而渴但欲飲冷嘔惡妨滿而不嗜食者其候也或內伏寒痲寒從背起冷如掌大痲之寒熱其豈非陰陽二氣更相勝負而作耶邪併於陰則寒邪併於陽則熱陰盛則寒多陽盛則熱熾其寒也湯火不能溫其熱也冰水不能寒衛氣與邪氣相值故邪正交爭而病以作衛氣與邪氣相離故汗出乃解而病以休衛氣晝行陽夜行陰得陽而外出故發於日間得陰而內搏故發



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十二

於暮夜若乃邪氣內搏於五臟橫連於募原其道遠其行遲不能與衛氣交併故有隔日發有三四日一發衛氣之行疾行遲病作之有蚤有晏甚者內外失守真邪不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣痲有數種○風痲自感風而得惡風自汗煩燥頭疼轉而為痲風陽氣也故先熱後寒可與解散風邪如川芎白芷青皮紫蘇之類或細辛檳榔佐之溫痲一證亦先熱後寒此為傷寒壞病與風痲大畧則同熱多寒少小柴胡湯熱少寒多小柴胡湯內加官桂○寒痲自感寒而得無汗惡寒攣痛面慘轉而為痲寒陰氣也故先寒後熱可與發散寒邪生料五積散增桂養胃湯或良薑乾薑官桂草果之類甚則薑附湯附子理中湯○暑痲者暑勝熱多得之一名瘧痲陰氣獨微陽氣獨發但熱不寒裏實不泄煩渴且嘔肌肉消鑠盍用小柴胡湯香薷散嘔者縮脾飲加生薑溫服下消暑圓熱多燥甚者少與竹葉湯常山柴胡於暑證最便○濕痲者冒襲雨濕汗出澡

浴得之身體痛重肢節煩疼嘔逆脹滿盍用五苓散除濕湯加蒼朮伏苓輩寒多者朮附湯最良○牝瘧者久受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所以寒多不熱氣虛而泄悽慘振振柴胡桂薑湯減半黃芩加以半夏施之為當○食瘧一名胃瘧飲食無節飢飽有傷致然也凡食啖生冷鹹藏魚塩肥膩中脘生痰皆為食瘧其狀苦飢而不能食食則中滿嘔逆腹痛青皮陳皮草果半夏縮砂白豆蔻作劑或四獸湯下紅圓子自有奇功○瘧瘧

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十二

挾嵐瘴溪源蒸毒之氣致然也自嶺以南地毒苦炎燥濕不常人多瘧瘧其狀血乘上焦病欲來時令人迷困甚則發燥狂忘亦有啞不能言者皆由敗血瘀於心毒涎聚於脾坡仙指為脾胃實熱所致又有甚於傷暑之瘧耳治之須用涼膈疏通大腸小柴胡加大黃治瘧木香圓觀音圓皆為要藥○如前數證經久不瘥真氣已耗邪氣猶存則有所謂勞瘧瘧母者焉表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復來謂之勞瘧法當調養氣血川



迪志文化出版有限公司出版

芎當歸官桂芍藥輩所不可無○彌年閱歲經吐汗下榮衛虧損邪氣伏藏脇間結為癥癖謂之瘧母此證未可直攻急作烏頭七棗湯以扶其裏俟其內氣已充繼此經效瘧丹或消癖圓下之取愈大抵瘧之初得三數日間如火燎原不可嚮邇波濤洶湧未易回瀾當俟其稍定而圖之經所謂其盛者可待衰而已瘧方來與正發及將解不可投藥耗其真氣投藥當於未發以前兩時之先或遇發日凌晨空心與之諸瘧之脉大約尺寸

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十二

俱弦或浮數或緊實或緩濇或虛遲或左手濡而右手盛或尺寸盛而關中濡不可定名以為弦也總前治法弦數多熱者寒之弦遲多寒者溫之浮弦浮緊浮數其邪在表者可汗弦實沉實數實其邪在裏者可下若夫調胃氣利痰水分陰陽行三焦是又治法之綱領也渴欲水漿藥入輒吐人參煎湯效抑猶有說焉嘗讀二廣攝生見其論議若瘧瘧若暑毒每用疎轉之劑取下根源里有先傷暑後發瘧涉年餘者度其腹中有癖水磨



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                                        |  |                   |  |               |  |    |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|--|----|--|------|--|
| 沉香下解毒雄黃圓黑血如泥泄下極臭由是獲愈因知諸瘡皆有根在治法之外又當隨輕重而利導之實者與巴豆大黃虛者用養正丹輩不然常山於瘡每每作效何耶蓋瘡家多蓄黃水常山為能破其癖而下其水也 |  |                   |  |               |  |    |  |      |  |
| 痲瘡證治                                                                                   |  |                   |  |               |  |    |  |      |  |
| 麻黃白朮湯治感風發瘡                                                                             |  |                   |  |               |  |    |  |      |  |
| 麻黃                                                                                     |  | 節 去               |  | 官桂            |  | 青皮 |  | 陳皮   |  |
| 川芎                                                                                     |  | 白芷                |  | 紫蘇            |  | 茯苓 |  | 甘草   |  |
| 半夏                                                                                     |  | 麴                 |  | 北梗            |  | 炙等 |  | 甘    |  |
| 白朮                                                                                     |  | 北梗                |  | 檳榔            |  | 分  |  | 等    |  |
| 加細辛                                                                                    |  | 右剉散每服參錢薑肆片棗貳枚空心煎服 |  | 五積散感寒發瘡初作以此解散 |  | 蒼朮 |  | 炒 貳兩 |  |
| 枳殼                                                                                     |  | 製                 |  | 陳皮            |  | 各錢 |  | 陸    |  |
| 厚朴                                                                                     |  | 製                 |  | 川芎            |  | 當歸 |  | 乾薑   |  |
| 肆錢                                                                                     |  | 各                 |  | 錢             |  | 陸  |  | 節 去  |  |

|                        |  |    |  |     |  |            |  |
|------------------------|--|----|--|-----|--|------------|--|
| 白芍藥                    |  | 白芷 |  | 甘草  |  | 炒          |  |
| 半夏                     |  | 製  |  | 官桂  |  | 伏苓         |  |
| 錢                      |  | 各  |  | 參   |  |            |  |
| 右剉散每服參錢水盞半蔥白參寸薑參片煎半空心服 |  |    |  |     |  |            |  |
| 養胃湯加桂治感寒發瘧             |  |    |  |     |  |            |  |
| 厚朴                     |  | 製  |  | 蒼朮  |  | 炒          |  |
| 人參                     |  | 茯苓 |  | 草果  |  | 半夏         |  |
| 兩                      |  | 各  |  | 分   |  | 製          |  |
| 霍香                     |  | 橘紅 |  | 甘草  |  | 壹          |  |
| 兩                      |  | 參  |  | 分   |  | 壹          |  |
| 欽定四庫全書                 |  |    |  |     |  |            |  |
| 仁齋直指                   |  |    |  |     |  |            |  |
| 卷十二                    |  |    |  |     |  |            |  |
| 右剉散每服參錢水盞半薑伍片烏梅半箇煎半溫服  |  |    |  |     |  |            |  |
| 解毒雄黃圓                  |  |    |  |     |  |            |  |
| 方                      |  | 見  |  | 熱   |  | 積          |  |
| 門                      |  | 方  |  | 見   |  | 癰          |  |
| 冷                      |  | 門  |  | 薑   |  | 附湯附子理中湯主寒瘧 |  |
| 類                      |  | 寒  |  | 方   |  | 見          |  |
| 草果飲諸瘧通用加乾薑治寒瘧          |  |    |  |     |  |            |  |
| 草果                     |  | 白芷 |  | 良薑  |  |            |  |
| 青皮                     |  | 川芎 |  | 紫蘇葉 |  |            |  |



|                          |          |                                          |          |                                                                         |                       |                                       |                                                                                                                       |          |              |                                                                            |                      |           |                                   |                                                     |                      |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 甘草<br><small>炒等分</small> | 右剉散每參錢煎服 | 小柴胡湯治暑瘧純熱<br><small>方見血類</small> 或寒熱等則加桂 | 香薷散治傷暑發瘧 | 香薷<br><small>肆兩</small> 厚朴<br><small>製</small> 扁豆<br><small>製各兩</small> | 右剉散每參錢烏梅壹箇水煎臨熟入薑汁壹匙溫服 | 五物香薷湯香薷縮脾飲並主暑證<br><small>方見暑類</small> | 欽定四庫全書<br><br><small>仁齋直指卷十二</small> | 常山飲治傷暑發瘧 | 嫩黃川常山 知母 草果仁 | 甘草<br><small>炙各壹兩</small> 良薑<br><small>陸錢</small> 烏梅肉<br><small>半兩</small> | 右咬咀每參錢水壹椀薑伍片棗參枚煎半稍冷服 | 七寶剉散治暑瘧諸瘧 | 川常山 雞心檳榔 青皮<br><small>刮去白</small> | 甘草<br><small>炙各半兩</small> 草果仁<br><small>貳錢半</small> | 右細剉每參錢桃柳枝各柒寸烏梅參箇水大椀煎 |
|--------------------------|----------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

|        |                                       |                                           |                 |                                                                                                   |                                               |                                                     |             |                                                                                                                         |          |                                                      |                          |                                              |              |                              |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 半稍冷空心服 | 五苓散治傷濕發瘧及小便不利<br><small>方見水飲類</small> | 加劑除濕湯術附湯並主濕瘧或加官桂伏苓<br><small>方見濕類</small> | 柴胡桂薑湯治牝瘧但寒或寒多微熱 | 柴胡<br><small>貳兩</small> 辣桂<br><small>叁分</small> 栝蒌根<br><small>壹兩</small> 牡蠣<br><small>煨各兩</small> | 乾薑<br><small>炮</small> 甘草<br><small>炙</small> | 黃芩<br><small>叁錢叁字</small> 內加半夏<br><small>兩半</small> | 右剉散每服參錢薑棗煎服 | 欽定四庫全書<br><br><small>仁齋直指卷十二</small> | 二陳湯治食瘧諸瘧 | 陳皮 半夏<br><small>製各伍兩</small> 茯苓<br><small>叁兩</small> | 甘草<br><small>炙壹兩</small> | 右咬咀每服參錢薑伍片烏梅半箇煎服寒多者加草果熱多者加前胡如青皮檳榔縮砂白豆蔻之類隨意增用 | 四獸湯治食瘧諸瘧和胃消痰 | 半夏<br><small>製</small> 人參 伏苓 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------|



|                                              |                         |                          |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 白朮                                           | 橘紅                      | 草果                       |
| 生薑                                           | 烏梅                      | 大棗<br><small>各等分</small> |
| 甘草<br><small>炙減半</small>                     |                         |                          |
| 右咬咀以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服肆錢水壹椀煎半溫服               |                         |                          |
| 紅圓子治食癰食積氣滯腹脹                                 |                         |                          |
| 京三稜<br><small>水浸軟截碎</small>                  | 蓬莪木<br><small>煨</small> | 青皮                       |
| 陳皮<br><small>各伍兩</small>                     | 胡椒                      | 乾薑<br><small>炮各兩</small> |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷十二</small>               |                         |                          |
| 右為末米醋煮米粉糊圓桐子大礬紅為衣每伍拾圓二陳湯四獸湯皆可下               |                         |                          |
| 烏頭七棗湯治久瘡但久瘡但寒及脾寒發瘡或寒重熱輕                      |                         |                          |
| 大川烏頭<br><small>壹箇燂火灰炮裂以鹽水浸再炮再浸凡七次去皮臍</small> |                         |                          |
| 右細剉分貳服每服薑柒厚片棗柒箇蔥白三寸水大椀煎半先喫棗稍冷服               |                         |                          |
| 又方用小附子壹枚修製一同烏附皆能溫脾挾風則                        |                         |                          |

|                                              |                          |                                     |      |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 用川烏寒甚則用附子                                    | 治瘴木香圓                    | 牽牛<br><small>壹斤淘去浮者焙搗取末肆兩別頓</small> | 雞心檳榔 |
| 陳橘紅<br><small>各貳兩</small>                    | 青木香                      | 人參                                  |      |
| 熟附子                                          | 厚朴<br><small>製</small>   | 官桂<br><small>去麤皮</small>            |      |
| 京三稜                                          | 羌活                       | 獨活                                  |      |
| 乾薑<br><small>炮</small>                       | 甘草<br><small>炙</small>   | 川芎                                  |      |
| 川大黃<br><small>剉焙</small>                     | 芍藥<br><small>各半兩</small> | 肉豆蔻<br><small>陸箇</small>            |      |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷十二</small>               |                          |                                     |      |
| 右為末磁器密收臨用枰牽牛末一兩諸藥末共壹兩研和煉蜜圓桐子大每服貳拾圓橘皮煎湯下以通利為度 |                          |                                     |      |
| 地龍飲治瘴瘧諸瘧大熱煩燥                                 |                          |                                     |      |
| 生地龍<br><small>叁條研極細</small>                  |                          |                                     |      |
| 右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱熾加腦子少許                   |                          |                                     |      |
| 觀音圓取下暑毒瘴毒                                    |                          |                                     |      |



|                                               |                                  |                               |     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----|
| 圓白半夏 <small>生</small>                         |                                  | 烏梅肉                           | 母丁香 |
| 川巴豆 <small>不去油每<br/>件各拾枚</small>              |                                  |                               |     |
| 右為末薑麪糊圓麻子大上下以厚紙蓋貼有油又再易紙每服伍圓臨卧冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之 |                                  |                               |     |
| 芎歸鱉甲散治勞瘧寒熱                                    |                                  |                               |     |
| 當歸                                            | 川芎                               | 芍藥                            |     |
| 青皮                                            | 陳皮                               | 伏苓                            |     |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十二                               |                                  |                               |     |
| 半夏 <small>製各<br/>壹分</small>                   | 鱉甲 <small>醋炙黃<br/>半兩</small>     |                               |     |
| 右剉散每參錢薑伍片棗貳箇小烏梅壹箇水煎服熱多加柴胡寒多加草果                |                                  |                               |     |
| 五勞圓治勞瘧瘴瘧久病                                    |                                  |                               |     |
| 嫩黃常山 <small>參兩<br/>半</small>                  | 桃仁 <small>去皮尖炒<br/>壹兩貳錢半</small> | 辣桂 <small>去麤皮<br/>柒錢半</small> |     |
| 淡豉 <small>參兩</small>                          | 烏梅肉 <small>貳兩<br/>半</small>      |                               |     |
| 右日乾為末煉蜜圓梧子大每參肆拾圓空心溫酒下不飲者熟水入些酒下                |                                  |                               |     |

|                                                     |                             |                       |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 經效瘧丹治瘧母結癖寒熱無已                                       |                             |                       |  |
| 真阿魏                                                 | 雄黃 <small>各貳錢半</small>      | 朱砂 <small>壹錢半</small> |  |
| 右沸湯泡阿魏研散雄朱為末和之稀麪糊圓桐子大每壹圓人參煎湯候冷空心服瘧瘧桃枝煎湯冷服臨發磨壹圓傳鼻頭口畔 |                             |                       |  |
| 消癖圓治瘧母停水結癖腹脇堅痛                                      |                             |                       |  |
| 芫花 <small>炒</small>                                 | 朱砂 <small>研細<br/>等分</small> |                       |  |
| 右為末煉蜜圓小豆許每拾圓濃煎棗湯下去癖須用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯                |                             |                       |  |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十二                                     |                             |                       |  |
| 驅瘧湯治諸瘧久瘧                                            |                             |                       |  |
| 草果仁                                                 | 青皮                          | 陳皮                    |  |
| 人參                                                  | 伏苓                          | 半夏 <small>製</small>   |  |
| 厚朴 <small>製</small>                                 | 蒼朮 <small>炒</small>         | 雞心檳榔                  |  |
| 白朮                                                  | 甘草 <small>炙各<br/>半兩</small> | 良薑 <small>壹分</small>  |  |
| 右剉散每參錢薑伍片棗貳枚烏梅壹箇空心煎服生熟飲治脾寒發瘧及寒多熱少                   |                             |                       |  |



|                                   |      |      |
|-----------------------------------|------|------|
| 草果                                | 肉豆蔻  | 各兩箇壹 |
| 川厚朴                               | 方寸許  | 生薑   |
| 二片                                | 貳塊半生 | 甘草   |
|                                   | 半濕紙煨 | 貳寸半  |
| 右剉散分貳服每服壹椀水貳棗壹烏梅煎半空心服             |      | 生半炙  |
| 蒜丹圓截瘡消痰                           |      |      |
| 革丹                                | 煨    | 穿山甲  |
|                                   |      | 熱灰中炮 |
| 土硃                                | 兩半   | 焦各壹分 |
| 右為末以獨頭蒜煨去皮研膏圓桐子大每拾圓生              |      |      |
| 欽定四庫全書                            | 仁齋直指 | 卷十二  |
| 薑烏梅紫蘇煎湯下                          |      |      |
| 七物湯治諸瘡                            |      |      |
| 常山                                | 酒浸   | 檳榔   |
| 蒸                                 |      | 草果   |
| 青皮                                | 陳皮   | 川厚朴  |
|                                   |      | 製    |
| 甘草                                | 炒等分  |      |
| 右剉細每服叁錢薑伍片烏梅貳箇水壹椀煎半露壹宿來早溫服之如熱多加柴胡 |      |      |
| 截瘡丹臻志修合                           |      |      |



迪志文化出版有限公司出版

|                                                     |       |       |        |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 土朱                                                  | 貳兩半   | 真綠豆粉  | 貳兩壹兩生入 |
| 淨末                                                  |       | 藥壹兩煮糊 |        |
| 信砒                                                  | 有鋒芒者半 |       |        |
| 兩研細生                                                |       |       |        |
| 右用綠豆粉糊築和叁件圓如麻子每服止貳圓新汲水研桃軟空心服是日飲食微和而已                |       |       |        |
| 勝金圓治一切瘡寒熱不一嘔惡頭疼煩渴喘息痰聚中滿                             |       |       |        |
| 雞心檳榔                                                | 壹兩    | 川常山   | 酒浸蒸    |
| 日乾                                                  |       | 焙肆兩   |        |
| 右為末水麪糊圓桐子大每服叁拾圓於未發前半                                |       |       |        |
| 欽定四庫全書                                              | 仁齋直指  | 卷十二   |        |
| 日冷酒下便睡不得喫熱湯飲次日又用冷酒下貳拾圓仍不得喫熱飲食又次日飲食無拘                |       |       |        |
| 治瘡方二陳湯貳貼加常山貳錢分作兩服每服薑柒片棗貳枚烏梅貳枚水壹椀煎陸分候微冷吞前件脾積圓柒圓次日吞叁圓 |       |       |        |
| 六物湯治久瘡不已寒少熱多                                        |       |       |        |
| 嫩常山                                                 | 貳錢    | 柴胡    | 雞心檳榔   |
| 半                                                   |       |       |        |
| 青皮                                                  | 去白各   | 草果仁   | 甘草     |
| 貳錢                                                  |       |       | 炙各壹    |
|                                                     |       |       | 錢半     |



迪志文化出版有限公司出版

|                             |  |                             |  |                             |  |            |  |                                              |  |                                                   |  |                                                   |  |                           |  |                              |  |                                                |  |                                                |  |                 |  |                                                     |  |                                     |  |                                                                         |  |                             |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| <p>右剉分參服每服大軟烏梅貳箇好夏酒準壹啜許</p> |  | <p>新水貳盞煎半隔宿露空以紗蓋之次早拂明服若</p> |  | <p>寒熱等加製厚朴貳錢略煖服是日飲食皆勿用熱</p> |  | <p>附諸方</p> |  | <p>白虎加桂枝湯 <small>活人方</small> 治瘧疾但熱不寒及有汗者</p> |  | <p>知母 <small>炙</small> 甘草 <small>炙</small> 桂枝</p> |  | <p>粳米 <small>各叁兩</small> 石膏 <small>壹斤</small></p> |  | <p>右咬咀每服伍錢水盞半煎至壹盞去滓溫服</p> |  | <p>大柴胡湯治瘧熱多寒少目痛多汗脉大以此湯微利</p> |  | <p>為度餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪 <small>方見傷食門</small></p> |  | <p>清脾飲 <small>濟生方</small> 治瘧瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少</p> |  | <p>口苦咽熱小便赤澀</p> |  | <p>青皮 <small>去白</small> 厚朴 <small>薑製</small> 白朮</p> |  | <p>半夏 <small>湯泡次</small> 黃芩 草果仁</p> |  | <p>柴胡 <small>去苗</small> 伏苓 <small>去皮</small> 甘草 <small>炙各等分</small></p> |  | <p>右咬咀每服肆錢水盞半薑伍片煎柒分溫服不拘</p> |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|

|          |  |                                         |  |                                    |  |                 |  |                              |  |                            |  |            |  |                 |  |                 |  |                                                         |  |                             |  |           |  |                                  |  |                             |  |                             |  |                             |  |
|----------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| <p>時</p> |  | <p>正氣散 <small>徐同知方</small> 退寒瘧止胃寒進食</p> |  | <p>藿香 草果 <small>各肆兩</small> 半夏</p> |  | <p>陳皮 厚朴 砂仁</p> |  | <p>甘草 <small>各壹兩</small></p> |  | <p>右剉為散生薑棗子煎服如瘧未止俟發日早服</p> |  | <p>六和湯</p> |  | <p>人參 草果 知母</p> |  | <p>貝母 烏梅 白芷</p> |  | <p>檳榔 柴胡 <small>各壹錢用酒拌</small> 常山 <small>貳錢</small></p> |  | <p>右咬咀薑叁片棗壹枚酒水同煎露壹宿臨發前貳</p> |  | <p>時服</p> |  | <p>瘧疾治例 <small>出明醫雜著</small></p> |  | <p>王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發</p> |  | <p>有三日一發有間日連二日發有日與夜各發有有</p> |  | <p>汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治</p> |  |
|----------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|------------|--|-----------------|--|-----------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|





法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪癰及新發熱者可散可截虛癰及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡去苗

白朮

蒼朮米泔浸各壹錢

已上三味癰疾必用之藥

陳皮柒分

甘草炙伍分

乾葛壹錢貳分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩伏苓

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十二

半夏各壹錢

熱甚頭痛加川芎軟石膏各壹錢

口渴加

石膏知母麥門冬各壹錢

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎

當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母各壹錢

酒洗紅花

酒炒黃芪各肆兩提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人

參黃芪白伏苓各壹錢以補氣川芎當歸白芍藥熟

地黃各壹錢以補血

若陽癰多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮白朮黃芩乾薑以發之

若陰癰多汗用當歸白芍藥熟地黃黃芪黃蘗以斂

之無汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之故曰

有汗者要無汗正氣為主無汗者要有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者

加人參壹錢半酒炒芍藥大麥芽各壹錢

若傷食痞悶或有食積者加神麴麥芽枳實炒各錢貳

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十二

黃車伍分

若痰盛加薑製半夏南星枳實炒各壹錢黃芩黃連各陸分

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山各壹錢烏梅淨肉三箇

肥者

若日久虛癰寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已

無只用四君子合四物湯加柴胡黃芩陳皮以滋

補氣血

仁齋直指卷十二



欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷十三

詳校官太醫院八品吏目黃登

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張炳

欽定四庫全書

仁齋直指卷十三

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

霍亂吐瀉

吐瀉方論

乾上坤下其卦為否陽隔陰而不降陰無陽而不升此否之所以痞而大通也人具此陰陽揮霍變亂結搏於中卒然吐瀉或瀉而不吐或吐而不瀉大抵心腹擾悶

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十三

煩疼其視天地不交之否異乎否乎霍亂之證心腹卒痛嘔吐下利發熱增寒頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則轉筋顫頓特反掌間蓋足陽明屬胃以養宗筋暴吐暴下津液驟亡宗筋失其所養故攣急甚則舌卷縮囊危甚風燭矣然亦何以致此哉曰胃傷暑毒露卧卑濕當風取涼風冷邪氣入於腸胃加以嗜好肥腥飲啖生冷居處不節激而發焉於是邪正相干中脘節閉氣不得通吐利暴作所



謂脾受賊邪木來勝土者此也治法霍香正氣散加霍香生薑為上不惟可以溫散風邪抑亦可以調理吐瀉其若傷暑所致未可遽投香薷散沉冷之劑自合先治中脘如二陳湯橘皮半夏湯輦次則以香薷溫服散暑解煩昧者指為脾胃虛冷遽用人參白朮苟子肉豆蔻之屬以壯胃滋腸不思風冷未散驟以參朮苟蔻攔補寒邪邪氣得之愈盛愈作縱得淹延或下痢或久瀉或腹脹虛浮或中滿不食變證百出矣抑猶有說焉濕霍

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十三

亂死者少乾霍亂死者多許仁則嘗有是言矣蓋謂所傷之物因吐利而出泄泄盡則止猶可幸免若上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣闕隔陰陽燥擾喘脹其能生乎則知揮霍變亂如人被髮交爭必有以捄之可也古方用來復丹正取疎利之意但多則太溫莫若薑湯下蘇感圓為愈霍亂氣息劣不欲言者不治

又論

治嘔吐莫先於助胃既助胃而復嘔吐者中脘挾風寒

也治喘嗽莫先於調肺既調肺而復喘嗽者風寒在表或在裏也瀉痢之疾固腸斷下終不作效非腸胃間留蓄風寒邪氣之所致乎故必隨其感受解散於其先則某病某藥庶乎其對證矣解散風寒不換金正氣散為上其間增益則青皮官桂良薑乾薑擇用最良若欲其清解則紫蘇荊芥乾葛柴胡等輩劑量可也惟暑亦然每每隱伏作病或為熱嘔或為焦煩或為腹痛或泄痢不止暑中類多有之炎燠蘊隆念慮又當及此此說雖

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十三

詳於卷首敬用申之

吐瀉證治

霍香正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂小便利者加茯苓

方見嘔吐門

此藥能溫散風寒濕氣若暑證加香

薷

五苓散治霍亂熱多發渴

方見水飲門

良薑飲治霍亂神效

良薑

霍香

陳皮

各壹兩



|                       |           |    |           |           |       |                                                |                              |                       |                       |                                                 |          |                                              |             |                                         |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 甘草 <small>炙參分</small> | 右剉細每參錢水煎服 | 又方 | 霍香葉 良薑 木瓜 | 右同煎治霍亂水瀉效 | 治要除濕湯 | 半夏麴 川厚朴 <small>製</small> 蒼朮 <small>炒兩各</small> | 霍香葉 陳皮 伏苓 <small>各壹兩</small> | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十三 | 甘草 <small>炙參錢</small> | 右剉散每服肆錢薑參片棗壹枚煎服霍亂瀉而不吐者加桂吐而不瀉者去蒼朮加桂丁香吐瀉俱作兼腹痛者只加桂 | 胡椒湯治霍亂吐瀉 | 胡椒 <small>粒柒</small> 生綠豆 <small>貳拾壹粒</small> | 右末煎宣木瓜湯溫和調下 | 治中湯治飲食居處不節以致霍亂吐 <small>方見嘔</small> 本方青皮 |
|-----------------------|-----------|----|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|

|          |                               |              |                                                                  |                           |                    |                          |                       |                            |                        |                                                         |                     |                                           |                     |                     |
|----------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 陳皮乾薑能散風冷 | 香薷剉散治傷暑霍亂 <small>方見暑門</small> | 木瓜湯治吐瀉不已轉筋擾悶 | 酸木瓜 <small>壹兩</small> 茴香 <small>壹分</small> 甘草 <small>炙貳錢</small> | 吳茱萸 <small>半兩盪柒次焙</small> | 右剉散每肆錢薑伍片紫蘇拾葉空心急煎服 | 四順附子湯治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣小不語急服 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十三 | 生附子 白薑 <small>炮</small> 人參 | 甘草 <small>炒各壹分</small> | 右剉每服肆錢水貳盞煎壹盞空腹服腹痛加桂小便利加伏苓仍用炒鹽熨或用薑附湯 <small>方見寒類</small> | 薑鹽飲治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉痰壅腹脹 | 鹽 <small>壹兩</small> 生薑 <small>半兩切</small> | 右同炒令色變以童尿兩盞煎壹盞分為貳溫服 | 塩湯法治乾霍亂心腹絞痛欲吐不吐欲下不下 |
|----------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|



先以鹽湯壹盞頓服候吐出令透不吐再服續以剉

理中湯倍加橘紅與之或霍香正氣散加官桂伏苓

倍加枳殼或蘇合香圓用枳殼散調下

蘇合香圓

方見諸氣門

用枳殼壹分木瓜半分煎湯調下治

乾霍亂不吐不瀉氣痞於中心腹絞痛此證最惡

鹽熨方治霍亂吐瀉心腹作痛

炒鹽貳碗紙包紗護頓其脅前并腹肚上截以熨斗

火熨氣透則蘇續又以炒鹽熨其背則十分無事

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十三

霍亂吐瀉臨時無藥以生蒜頭研細塗心下及兩脚心即止

附諸方

不換金正氣散治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼

方見瀉痢門

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉暑天瀉痢

方見暑門

理中湯治中寒霍亂吐瀉

方見寒門

七氣湯三方因治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不

和揮霍變亂吐利交作

半夏

湯洗伍兩

厚朴

薑製

桂心

各叁兩

白芍藥

伏苓

去皮各肆兩

紫蘇葉

橘皮

各貳兩

人參

去蘆壹兩

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞生薑七片棗一枚

煎七分溫服

加減理中湯

人參

白朮

乾薑

甘草

炙各等分

若為寒氣溫氣所干者加附子壹兩名附子理中湯

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十三

若霍亂吐瀉加陳皮青皮各壹兩名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令

透即進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏壹兩每服生薑

拾片同煎

若泄瀉者加橘紅伏苓各壹兩名補中湯

若塘泄不已者於補中湯內加附子壹兩○不喜飲

米穀不化者加縮砂仁壹兩共成八味





若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附名四順湯

若傷寒結胸先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐和後胃痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實茯苓各壹兩名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括蕢根壹兩

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏壹兩

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂壹兩半腎惡燥

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十三

故去朮恐作奔豚故加官桂

若悸多加茯苓壹兩

若渴欲飲水者添加朮半兩

若腹滿者去白朮加附子壹兩

若飲酒過多及啖炙煖熱食發為鼻衄加川芎壹兩

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血

脉

泄瀉

### 泄瀉方論

胃為水穀之海其精英則流布以養臟腑其糟粕則傳送以歸大腸腸胃虛弱或挾風挾寒或傷暑傷濕停冷蓄熱冷熱不調泄瀉諸證皆能致之挾風者自汗惡風痛引腰背挾寒者筋節拘急身體怯寒傷暑者面垢燥渴泛引水漿傷濕者肌肉虛浮肢體重着冷則腸鳴肚冷而手足清熱則煩燥肚熱而手足溫冷熱不調者由熱積於內不能去其積徒以冷藥水之熱氣無所發泄

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十三

故冷與熱搏而下注其或冷積於中不能去其滯徒以熱藥壓之冷積不得宣行故熱與冷干而成泄或澁或澹裏急後重是其候也外此則傷食一證失飢傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭可驗焉治法當究其感受之源然後為之固實不窒其源吾恐決潰四出莫知其終者矣雖然脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所謂泄人皆以泄為脾恙而不知腎病有泄焉腎泄何如曰腹痛無定處似痢非痢骨弱面鰲脚下時冷者是也前



件諸方條例于后至若泄利之後腹滿身疼是則為表裏俱病先當溫裏急與四逆湯然後解表急以桂枝湯與之活人書言之詳矣抑猶有緒餘之論焉肝者脾之賊木能勝土古人慮之固也經曰肝腎氣虛為病泄瀉亦孰知腎者所以守司於下而肝者又門戶要束之具束則不泄也不然泄瀉而面色青慘者古書謂肝經受寒所致特設當歸厚朴湯以主之果何意哉

下利惡證具載活人

總括

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十三

### 泄瀉證治

理中湯治腸胃虛弱滲瀉有聲泄瀉頻併

人參

白朮

乾薑炒

甘草炒各壹兩

加伏苓

川厚朴製各叁分

右剉細每服叁錢空心煎服

調中散治腸虛泄瀉止嘔進食

霍香葉

縮砂

蓬朮炮

乾薑炮

肉桂

茴香炒

草果各半兩 麥牙炒 益智仁  
橘紅各叁分 蒼朮炒 神麴炒  
甜梗各壹兩 甘草灸叁錢  
右末每服叁錢薑棗并少鹽煎服  
肉蔻散治脾虛腸鳴泄瀉不食  
大肉豆蔻壹枚剉小窰子入乳香三小塊在內以麪裹煨麪熟為度去麪  
右末每壹錢水飲調下

治要除濕湯治風邪泄瀉加辣桂寒邪泄瀉加乾薑良

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十三

薑通用加木香方見吐瀉門

香薷剉散方見暑門 治傷暑泄瀉更增伏苓

平胃散治傷濕泄瀉

橘紅

厚朴製各叁兩半

蒼朮炒伍兩半

甘草灸壹兩

右剉細每服叁錢薑棗煎服

又法以生料五苓散對夾平胃散用陳米煎暑瀉濕瀉

諸證皆驗



|                                                  |             |              |                          |                          |                          |                      |      |                                            |             |                                                                                                            |  |                           |                            |    |                           |                 |            |                           |                            |                         |                   |                  |                                         |    |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|----|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|----|
| 黃連阿膠圓治暑瀉熱瀉<br><small>方見用五苓散送下<br/>嗽門 方見水</small> | 又洞泄方車前子末米飲下 | 藥皮湯治協熱泄瀉亦治血痢 | 藥皮<br><small>兩 叁</small> | 黃芩<br><small>兩 貳</small> | 黃連<br><small>兩 壹</small> | 右剉每服肆錢水大盞煎柒分入阿膠末半錢再煎 | 少頃溫服 | 薑附湯治冷證泄瀉<br><small>方見寒類 米附湯 見濕類 通用</small> | 大已寒圓治虛冷腸鳴滑泄 | 欽定四庫全書<br><br>仁齋直指<br>卷十三 |  | 良薑<br><small>兩 各肆</small> | 乾薑<br><small>陸 炮 各</small> | 肉桂 | 華撥<br><small>兩 各肆</small> | 右末麪糊圓桐子大每伍拾圓米飲下 | 戊己圓治冷熱不調泄瀉 | 吳茱萸<br><small>炒 去</small> | 黃連<br><small>去 鬚 分</small> | 白芍藥<br><small>等</small> | 右末米糊圓桐子大每叁拾圓空心米飲下 | 真人養臟湯治冷熱不調泄瀉裏急後重 | 罌粟殼<br><small>去 筋 葶 蜜 炙 壹 兩 捌 錢</small> | 木香 |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|----|---------------------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|----|

|                            |                           |    |                           |                           |                        |                           |                      |                                     |               |    |    |                          |                            |                             |                          |                 |           |                         |                         |     |                        |                                |                           |                      |           |               |                                     |                            |
|----------------------------|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----|----|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 白芍藥<br><small>錢 各捌</small> | 訶子肉<br><small>錢 六</small> | 人參 | 白朮<br><small>錢 各肆</small> | 當歸<br><small>錢 各叁</small> | 甘草<br><small>炙</small> | 肉桂<br><small>錢 各肆</small> | 右龕末每服貳錢薑棗煎食前服先用縮砂煎湯下 | 感應圓<br><small>方見滿門 俟其積消然後服此</small> | 雞舌香散治飧食生冷久為冷積 | 良薑 | 辣桂 | 香附<br><small>淨 炒</small> | 益智仁<br><small>兩 各壹</small> | 天台烏藥<br><small>兩 各壹</small> | 甘草<br><small>炙 半</small> | 右末每貳錢入少鹽沸湯點吞感應圓 | 三稜散酒食傷積用此 | 京三稜<br><small>炮</small> | 蓬莪朮<br><small>炮</small> | 益智仁 | 甘草<br><small>炙</small> | 青皮<br><small>去 白 各 貳 兩</small> | 白茯苓<br><small>肆 兩</small> | 右末每貳錢少鹽煎吞感應圓治傷食泄瀉俟酸臭 | 出盡即服固腸散止之 | 固腸散治冷瀉腸滑及下痢頻併 | 罌粟殼<br><small>去 筋 葶 蜜 炙 壹 兩</small> | 陳米<br><small>炒 壹 兩</small> |
|----------------------------|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----|----|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|



|                                                                                                            |                    |                 |                      |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----|-----|
| 乾薑                                                                                                         | 炮                  | 甘草              | 炙各貳錢半                | 肉豆蔻 | 生貳錢 |
| 木香                                                                                                         | 壹錢                 |                 |                      |     |     |
| 右末每貳錢薑棗煎食前服                                                                                                |                    |                 |                      |     |     |
| 實腸散治泄瀉不止                                                                                                   |                    |                 |                      |     |     |
| 川厚朴                                                                                                        | 製壹兩半               | 肉豆蔻             |                      | 訶子  | 炮   |
| 縮砂                                                                                                         |                    | 橘紅              |                      | 蒼朮  | 炒   |
| 伏苓                                                                                                         | 各壹兩                | 木香              | 半兩                   | 甘草  | 炒肆錢 |
| 右麓末每參錢薑棗煎服手足冷加炒乾薑                                                                                          |                    |                 |                      |     |     |
| 欽定四庫全書<br><br>仁齋直指<br>卷十三 |                    |                 |                      |     |     |
| 安腎圓                                                                                                        | 方見水<br>欽門          | 治腎泄腹痛無定處似痢非痢骨痛面 |                      |     |     |
| 鯨腰脚時冷用和劑七氣湯送下<br>方見氣門                                                                                      |                    |                 |                      |     |     |
| 震靈丹治腎泄證候同前                                                                                                 |                    |                 |                      |     |     |
| 禹餘糧                                                                                                        | 火煨醋淬不計遍<br>次手撚得碎為度 | 丁香代赭石<br>修製如製   |                      |     |     |
| 赤石脂                                                                                                        |                    | 紫石英             | 杵碎以上各肆兩入甘鍋內以瓦蓋口鹽泥固濟候 |     |     |
| 乾用硬炭壹拾斤煨通紅火盡為度入地坑埋出火毒貳宿研末                                                                                  |                    |                 |                      |     |     |
| 的乳香                                                                                                        | 別研                 | 沒藥              |                      |     |     |
| 五靈脂<br>並去砂石研各貳兩                                                                                            |                    |                 |                      |     |     |
| 朱砂                                                                                                         | 壹兩研                |                 |                      |     |     |

|                                                                                     |          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 右並為細末糯米粉糊圓小雞頭大風乾每服參圓                                                                |          |     |
| 用炒故紙入棗煎湯調鐘乳粉少許空心送下小兒                                                                |          |     |
| 腎泄白膿褐汁面黯齒脫猥人怯寒震靈丹末入些                                                                |          |     |
| 鐘乳粉以棗煎炒故紙取熱汁調下                                                                      |          |     |
| 木香散治脾腎俱虛泄瀉                                                                          |          |     |
| 肉豆蔻                                                                                 | 麪裹<br>紙煨 | 故紙  |
| 炒                                                                                   |          |     |
| 白朮                                                                                  |          |     |
| 白伏苓                                                                                 | 各半<br>兩  | 木香  |
| 甘草                                                                                  | 炙各<br>壹分 |     |
| 右剉細每參錢食前薑棗煎溫服                                                                       |          |     |
| 欽定四庫全書                                                                              |          |     |
|  |          |     |
| 仁齋直指                                                                                |          |     |
| 卷十三                                                                                 |          |     |
| 二神圓治脾腎俱虛泄瀉不食                                                                        |          |     |
| 破故紙                                                                                 | 肆兩<br>炒  | 肉豆蔻 |
| 貳兩<br>生                                                                             |          |     |
| 右末用肥棗蒸爛取肉研膏夾和杵圓桐子大每服                                                                |          |     |
| 肆拾圓清米湯下若飯食後常一泄服此頓愈                                                                  |          |     |
| 當歸厚朴湯治肝經受寒面色青慘厥而泄利                                                                  |          |     |
| 當歸                                                                                  | 炒        | 厚朴  |
| 製各<br>貳兩                                                                            |          |     |
| 官桂                                                                                  | 叁兩       |     |
| 良薑                                                                                  | 伍兩       |     |
| 右剉散每參錢食前服                                                                           |          |     |



|     |  |                           |  |                      |  |
|-----|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| 附諸方 |  | 白朮芍藥湯                     |  | 治太陰脾經受濕水泄注下體重微       |  |
|     |  | 滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化         |  | 白朮                   |  |
|     |  | 芍藥                        |  | 甘草                   |  |
|     |  | 右咬咀每服壹兩水煎                 |  | 升陽除濕湯                |  |
|     |  | 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃色四肢困弱 |  | 升麻                   |  |
|     |  | 柴胡                        |  | 防風                   |  |
|     |  | 神麴                        |  | 澤瀉                   |  |
|     |  | 蒼朮                        |  | 陳皮                   |  |
|     |  | 大麥芽                       |  | 甘草                   |  |
|     |  | 右咬咀水煎食後熱服                 |  | 升陽除濕防風湯              |  |
|     |  | 如大便閉塞或裏急後重數至              |  | 病及鬱結而不通也又此道舉其陽則陰氣自降矣 |  |
|     |  | 蒼朮                        |  | 防風                   |  |

|    |  |                      |  |                       |  |
|----|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| 白朮 |  | 白伏苓                  |  | 白芍藥                   |  |
|    |  | 右咬咀除蒼朮另作片子水壹碗半煎至貳盞內諸 |  | 藥同煎至壹大盞食前熱服           |  |
|    |  | 益胃湯                  |  | 燥熱短氣口不知味腸鳴大便微澹黃色身體皆悶口 |  |
|    |  | 乾不喜飲冷                |  | 黃芪                    |  |
|    |  | 甘草                   |  | 半夏                    |  |
|    |  | 黃芩                   |  | 柴胡                    |  |
|    |  | 白朮                   |  | 當歸梢                   |  |
|    |  | 升麻                   |  | 蒼朮                    |  |
|    |  | 右咬咀水盞半煎捌分食前通口服       |  | 胃苓湯治感暑夾食泄瀉煩渴平胃散五苓散相合  |  |
|    |  | 蒼朮                   |  | 厚朴                    |  |
|    |  | 甘草                   |  | 伏苓                    |  |
|    |  | 猪苓                   |  | 桂                     |  |
|    |  | 右咬咀水煎入鹽少許服如作末藥湯服亦可   |  |                       |  |



柴苓湯分理陰陽治瀉解熱

柴胡

黃芩

半夏

甘草減半

人參

猪苓

白朮

茯苓

澤瀉各等分

水貳鍾薑參片煎服

養胃湯治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉方見

痰瘧門

五苓散益元散並見暑門

欽定四庫全書仁齋直指卷十三

丹溪方治一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是

脾泄

黃芩炒半兩

白朮炒貳兩

白芍藥酒拌炒

半夏泡各半兩

神麴炒

山查炒各壹兩半

霍香壹兩

右為末青荷葉包飯燒熟研丸如梧子大食前白湯

下

錢氏白朮散治氣血俱虛神弱之人或吐瀉

人參

白茯苓

白朮

木香

甘草

霍香各壹兩

乾薑半兩

右為粗末每服伍錢水壹鍾煎柒分食前溫服

參苓白朮散治脾胃氣虛飲食不進或致吐瀉方見虛勞門

溫臍止瀉散治大人小兒久瀉滑脫不止

乾薑微炒

白芷

附子生各壹錢

右為細末用生白蜜丸如彈子大按入內一二日即

欽定四庫全書仁齋直指卷十三

止

泄瀉治例出明醫雜著

王節齋曰泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而

作須看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食燥

濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有

久泄腸胃虛滑不禁者宜收澀之

主方

白朮貳錢

白茯苓

白芍藥炒各壹錢半



|                       |     |                  |      |           |    |   |  |  |  |
|-----------------------|-----|------------------|------|-----------|----|---|--|--|--|
| 以上三味泄瀉必用之藥            |     |                  |      |           |    |   |  |  |  |
| 陳皮                    | 錢壹  | 炙甘草              | 去皮伍分 |           |    |   |  |  |  |
| 若傷食泄黃或食積加神麴大麥芽山查子     | 錢壹  | 炒                |      |           |    |   |  |  |  |
| 黃連                    | 柒分  | 消之腹中窄狹飽悶再加厚朴枳實木香 |      |           |    |   |  |  |  |
| 若小便赤澁短少加澤瀉猪苓木通        | 錢壹  | 以分利之             |      |           |    |   |  |  |  |
| 夏月再加茵陳                | 柒分  | 炒山梔仁             | 肆分   |           |    |   |  |  |  |
| 若口渴引飲加乾葛              | 錢壹半 | 人參麥門冬            | 錢壹   | 升麻滑       |    |   |  |  |  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十三 |     |                  |      |           |    |   |  |  |  |
| 石                     | 各肆分 | 烏梅肉              | 貳箇   |           |    |   |  |  |  |
| 若夏秋之間濕熱大行暴注水泄加炒黃連蒼朮澤瀉 | 錢壹  | 升麻木通             | 各伍分  | 發熱燥渴加乾葛石膏 | 錢壹 | 各 |  |  |  |
| 黃疸小便黃赤加茵陳             | 錢壹  | 山梔木通             | 各伍分  |           |    |   |  |  |  |
| 若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連茵陳乾葛   | 錢壹  | 各                |      |           |    |   |  |  |  |
| 木香                    | 錢伍分 | 神麴麥芽             | 各捌分  |           |    |   |  |  |  |
| 若寒月溏泄清冷腹痛或傷生冷飲食加神麴麥芽  |     |                  |      |           |    |   |  |  |  |
| 炙乾薑                   | 錢壹  | 砂仁益智木香           | 各柒分  |           |    |   |  |  |  |

|                                                                                     |        |          |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不效宜加人參                                                                |        |          |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 黃芪                                                                                  | 各壹錢    | 以補中氣升麻柴胡 | 各肆分     | 以升提之加 |     |  |  |  |  |  |  |
| 羌活防風藁本白芷等風藥                                                                         | 各肆分    | 助風以平之更   |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 加炙乾薑                                                                                | 伍分     | 以固之      |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 若久泄脾胃虛弱食少難化加炙黃芪人參                                                                   | 各壹錢    | 神        |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 麴麥芽                                                                                 | 各壹錢    | 木香       | 過       | 乾薑    | 各壹錢 |  |  |  |  |  |  |
| 若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻                                                                       | 各壹錢    | 訶子皮赤石脂   |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 各壹錢                                                                                 | 煨木香炙乾薑 | 各伍分      |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 欽定四庫全書                                                                              |        |          |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
|  |        |          |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 仁齋直指                                                                                |        |          |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 卷十三                                                                                 |        |          |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 針灸法脾腧二穴                                                                             | 在十一寸半  | 推下兩傍     | 中脘一穴    | 在四寸   | 上   |  |  |  |  |  |  |
| 腹瀉關元一穴                                                                              | 在臍下三寸  | 天樞二穴     | 在臍旁各開三寸 | 治腹滿脾洩 |     |  |  |  |  |  |  |
| 瀉大腸俞二穴                                                                              | 在十六寸   | 推下各開寸半   | 灸       |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 痢                                                                                   | 三壯     | 治腸鳴腹膜脹暴瀉 |         |       |     |  |  |  |  |  |  |
| 仁齋直指卷十三                                                                             |        |          |         |       |     |  |  |  |  |  |  |



欽定四庫全書

仁齋直指卷十四

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

瀉痢

瀉痢方論

痢與瀉名目不同而感受之源一也風邪得之鼻壅惡風腰背強痛寒邪得之面慘惡寒肢體拘攣受暑得之面垢背寒自汗發渴受溫得之一身盡痛重着浮黃或

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十四

停冷則淒清腸鳴或蘊熱則發熱煩燥冷熱不調者乍瀉乍澹飲食傷飽者注下酸臭諸有積以肚熱纏痛推之諸有氣以狀如蟹渤驗之究其受病之源決之對病之劑大要以散風邪行滯氣開胃脘為先不可遽用肉豆蔻苧子白朮輩以補住寒邪不可遽投罌粟殼龍骨牡蠣輩以閉澀腸胃邪氣得補而愈盛補之愈盛而愈作不為纏擾撮痛則為裏急後重所以日夕淹延而未已也痢之赤白其赤者熱乘於血血滲大腸則赤也若

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十四

風邪挾熱則所下黃而赤焉其白者冷搏腸間津液凝滯則白也若寒邪併之則所下白而黑焉冷熱相交故赤白相半重者狀若膿涕而血雜之輕者白涕中間微有赤縷是也內挾風邪故清血流注或濕毒乘虛入腸胃之間則下如豆汁或有瘀血是也論者以手足寒為冷手足溫為熱於理甚當亦當合赤白而並觀之庶乎其的矣雖然風寒暑濕感之於外者也其有大嚼傷飽宿酒漿醯醢以成積滯房闈縱情加奔走勞役以耗精血此非病生於內者乎必明白內外而權度之則受病淺深用藥輕重知有定嚮矣毋槩曰無積不成痢○下痢壯熱須用敗毒散加陳米間與五苓散黃連阿膠丸○下痢雖曰有積有暑如用藥不效即是腸胃有風邪熱者赤者與敗毒散冷者白者不換金正氣散加木香

瀉痢證治

敗毒散治風邪寒邪壯熱下痢

方見寒類

陳米飲調五苓散

佐之

方見水飲門



|                                     |  |                                          |  |                    |  |                                      |  |                  |  |                                                  |  |                       |  |             |  |                                                                |  |                                                                |  |                                                |  |                                                    |  |             |  |                                             |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------------|--|
| 不換金正氣散治風邪寒邪冷證下痢 <small>方見寒類</small> |  | 治要除濕湯 <small>方見吐瀉門</small> 加官桂木香治風寒冷證下痢加 |  | 乾薑茯苓治傷濕下痢仍以五苓散利其小便 |  | 理中湯 <small>方見瀉門</small> 加厚朴木香伏苓治濕冷下痢 |  | 艾薑丸治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血 |  | 乾艾葉 <small>肆兩炒焦存性</small> 川白薑 <small>壹分炮</small> |  | 右為末醋煮麪糊丸桐子大每柒拾丸食前清米飲下 |  | 人參豆蔻散冷證瀉痢通用 |  | 木香 <small>炮</small> 厚朴 <small>製</small> 蒼朮 <small>米泔浸曬</small> |  | 乾薑 <small>炮</small> 肉豆蔻 <small>生兩各</small> 半夏 <small>麵</small> |  | 陳皮 <small>肆兩各</small> 阿膠 <small>炒兩各</small> 縮砂 |  | 甘草 <small>炒各貳兩半</small> 罌粟殼 <small>去筋萆淹炒肆兩</small> |  | 右剉每叁錢薑棗煎食前服 |  | 香薷剉散五物香薷湯六和湯 <small>方見暑門</small> 治傷暑下痢五苓散佐之 |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------------|--|

|     |  |    |  |     |  |                        |  |                      |  |    |  |                                                               |  |            |  |                                                      |  |                      |  |       |  |                                        |  |                                      |  |                                                            |  |      |  |                                          |  |
|-----|--|----|--|-----|--|------------------------|--|----------------------|--|----|--|---------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------|--|------------------------------------------|--|
| 升麻湯 |  | 升麻 |  | 白芍藥 |  | 甘草 <small>炙各拾兩</small> |  | 右龕末每叁錢薑叁片同煎吞感應丸治傷暑下痢 |  | 纏痛 |  | 黃連阿膠丸 <small>方見嗽門</small> 藥皮湯 <small>方見瀉門</small> 治熱證發熱下痢亦治暑痢 |  | 香連丸治冷熱不調瀉痢 |  | 黃連 <small>壹兩用茱萸半兩炒去茱萸不用</small> 木香 <small>壹分</small> |  | 右取香連為末醋糊丸桐子大每叁拾丸米飲下前 |  | 戊己丸通用 |  | 真人養臟湯治冷熱不調下痢 <small>方見瀉門</small> 依前法用之 |  | 三稜散治食積下痢腹痛 <small>方見瀉門</small> 依前法用之 |  | 感應丸 <small>方見諸氣門</small> 解毒雄黃丸 <small>方見熱門</small> 治諸積下痢用五 |  | 苓散送下 |  | 和劑流氣飲大異香散五膈寬中散 <small>方見諸氣門</small> 治諸氣痢 |  |
|-----|--|----|--|-----|--|------------------------|--|----------------------|--|----|--|---------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------|--|----------------------|--|-------|--|----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------|--|------------------------------------------|--|



牛乳湯治氣痢泄如蟹渤

華撥末 錢貳 牛乳 升半

右同煎減半空腹服

萊連丸治赤白下痢

吳茱萸 淨揀 黃連 去鬚半寸一截同炒熟分為二處

右各碾末醋麪糊丸桐子大赤痢專服黃連白痢專

服茱萸赤白併服或多或少以意增減每服柒拾丸

陳米飲下以愈為度

欽定四庫全書 仁齋直指卷十四

胃風湯治風冷客入腸胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如

豆汁或下瘀血

人參 白伏苓 川芎

當歸 辣桂 白朮

白芍藥 等分

右剉每服參錢粟米百餘粒同煎食前熱服腹痛加

木香

肉蔻散治冷證久痢不止 方見瀉門

附子理中湯薑附湯 方見寒類 朮附湯 方見濕類 治虛損久痢四

肢厥冷以意擇用

禁口痢方

石蓮肉 乾日

右為末每服貳錢陳米飲調下便覺思食仍以日照

東方壁土炒真橘皮為末薑棗略煎佐之

斷下湯止赤白痢

伏苓 白朮 各壹錢

甘草 半錢

欽定四庫全書 仁齋直指卷十四

草果 連皮壹枝 大罌粟殼 拾肆枝去筋萼剪碎醋浸炒燥

加木香 半錢

右為麓末分作兩服每服薑伍片大棗參箇大烏梅

參箇食前煎服固腸散 方見瀉門 通用

玉華白丹治臟腑久虛止瀉止痢

陽起石 入乾鍋煨通紅酒淬頓陰地令乾莫見日 白石脂 紅煨

左顧牡蠣 鹽泥周濟煨紅取白者各半兩 鍾乳粉 壹兩

右研極細如粉和畢糯米糊圓空心米飲下渴者人





參湯下亦治腸風下血又震靈丹

方見通用  
瀉門

赤石脂禹餘糧湯治瀉痢諸藥不效以此固其下焦

赤石脂

劉小塊

禹餘糧

煨醋淬以碎為度

右等分夾和每服肆錢空心煎溫服

瀉痢須要衣服周密恐傷風冷凡蘊熱血痢裏急而痛甚雖已疎通蕩滌然其痛不減者非熱亦非積也榮血虧少陽剛勝陰故爾用藥當以川芎為佐榮血一調其痛立止

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十四

附諸方

防風芍藥湯

援粹方

治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及

頭痛微汗

防風

芍藥

黃芩

各壹兩

右咬咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口服

經驗栢皮湯治傷寒下痢亦治久血熱痢

藥皮

叁兩

黃芩

貳兩

黃連

壹兩

右咬咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓通口服腹痛加山梔子小便利加赤伏苓阿膠煎服  
芍藥藥皮湯

子和方

治一切溫熱惡心痢頻併窘痛無問膿血

芍藥

黃蘗

各壹兩

當歸

黃連

各半兩

冷熱物

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十四

黃連香薷飲治感暑下痢鮮血

清暑益氣湯治暑病內傷下痢不思飲食發熱

並見暑門

白朮芍藥湯

機要方

治老人奉養太過飲食傷脾時或瀉

痢

錢氏白朮散治氣血俱虛之人或瀉或痢

並見瀉門

蒼朮芍藥湯

粹粹方

治痢疾痛甚者

蒼朮

貳兩

芍藥

壹兩

黃芩

官桂

各伍錢



|                       |  |                              |  |                                    |  |                       |  |                      |  |                                                      |  |                       |  |                                         |  |                                    |  |
|-----------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十四 |  | 四物湯 <small>保命集</small> 治下痢純血 |  | 調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯 <small>俱見傷寒門</small> |  | 前                     |  | 右咬咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾去滓通口服食 |  | 黃芩<br>芍藥 <small>各壹兩</small><br>甘草 <small>炙半兩</small> |  | 洪疾者及下痢膿血稠粘            |  | 芍藥黃芩湯 <small>拔粹方</small> 治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉 |  | 右咬咀每壹兩水貳鍾煎至壹鍾溫服                    |  |
| 川芎                    |  | 當歸 <small>洗酒</small>         |  | 白芍藥                                |  | 生地黃                   |  | 槐花                   |  | 黃連                                                   |  | 御米殼 <small>等分</small> |  | 右咬咀水煎服                                  |  | 地榆芍藥湯 <small>拔粹方</small> 治泄痢膿血乃至脫肛 |  |
| 蒼朮 <small>剉兩</small>  |  | 地榆 <small>貳兩</small>         |  | 卷栢                                 |  | 芍藥 <small>各叁兩</small> |  | 右咬咀每服壹兩水貳鍾煎至壹鍾食前通口服  |  |                                                      |  |                       |  |                                         |  |                                    |  |

|                       |  |                                          |  |                                |  |     |  |                        |  |     |  |                      |  |                      |  |                     |  |                         |  |                                           |  |                                   |  |                      |  |                                           |  |                       |  |                                     |  |                        |  |    |  |                         |  |
|-----------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----|--|------------------------|--|-----|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|----|--|-------------------------|--|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十四 |  | 阿膠梅連丸 <small>宣明方</small> 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸証 |  | 金井阿膠 <small>淨草灰炒透明白別研細</small> |  | 赤伏苓 |  | 烏梅肉 <small>去核炒</small> |  | 赤芍藥 |  | 黃栢 <small>剉炒</small> |  | 黃連 <small>去鬚</small> |  | 乾薑 <small>炮</small> |  | 當歸 <small>酒洗各等分</small> |  | 右為細末入阿膠研勻水丸梧子大溫米飲下拾丸食前連夜伍陸服小兒丸如菉豆大忌油膩脂肥諸物 |  | 石榴皮散 <small>經驗方</small> 治暴瀉不止及痢赤白 |  | 用酸石榴皮燒存性不以多少空心米飲調下貳錢 |  | 保和丸專治脾虛因積作後重者不可下用此消導 <small>方見積聚門</small> |  | 秘傳香連丸治男婦小兒諸般痢疾作痛並久痢虛脫 |  | 濃血不止者服之神效如初痢一二日之間不可服恐攔住積滯熱毒他証愈劇反為咎矣 |  | 川黃連 <small>酒潤炒</small> |  | 木香 |  | 白豆蔻 <small>各壹兩半</small> |  |
|-----------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----|--|------------------------|--|-----|--|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|----|--|-------------------------|--|



乳香

沒藥

各伍錢

右為細末麪糊丸如彈子大每服壹丸赤者甘草湯  
搗下白者生薑湯下

黃連湯治痢疾

黃連

滑石

生地黃

白芍藥

蒼朮

台朮

當歸

青皮

條黃芩  
各等分

右咬咀每服柒錢水貳盞煎捌分去滓食遠溫服

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十四

大柴胡湯治下痢舌黃口燥胃滿作渴身熱腹脹譫語  
此必有燥屎宜下後服木香黃連苦堅之三乙承氣湯  
暑毒溫熱傷後下痢膿血宜服二方  
見傷寒門  
針灸法見前泄瀉門詳施

脫肛

脫肛方論

四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫  
非虛無故然哉蓋惟實則溫溫則內氣充而有所蓄惟



迪志文化出版有限公司出版

虛則寒寒則內氣餒而不能收而況大腸之厚薄膏脂

之瘠肥亦視夫內氣之虛實何如耳大凡脫肛須以溫

湯澆令和軟然後摩挲而入治法以溫斂行之其有產

婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪襲虛亦

有此證○凡腸頭作癢即是腹中有蟲生艾苦練根煎

湯熏洗仍以乾艾生薑煎服其脫肛腸風痔漏者登溷

不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用纔有一毫染

汚其間立見痛腫如此急以溫湯滌之患在肛腸登溷

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十四

後須用一洗

脫肛證治

蝟皮散治肛門脫出不收

蝟皮

壹箇火內燒  
令焦黃存性

磁石

半兩法醋煎數沸  
焦磁石柒次為末

辣桂

叁錢

鰲頭

壹枚慢火  
炙令焦黃

右細末每服貳錢食前米飲調下仍以破草鞋底炙

上面熨按令入

鰲頭散治脫肛



迪志文化出版有限公司出版

|                     |  |                   |  |                            |  |
|---------------------|--|-------------------|--|----------------------------|--|
| 欽定四庫全書              |  | 仁齋直指              |  | 卷十四                        |  |
| 鰲頭                  |  | 慢火炙焦黃             |  | 右為末塗傅腸頭用軟紙襯輕輕按入仍以方寸匕食前米飲調下 |  |
| 磁石散治脫肛              |  | 磁石 醋中凡柒次          |  | 右為末每服壹錢空心米飲調下              |  |
| 香荊散治脫肛              |  | 大香附 荆芥穗 兩各半       |  | 縮砂 半 貳錢                    |  |
| 右末每服叁錢食前新水煎數沸即服小兒通用 |  | 釣腸丸治大腸空冷脫肛不收及腸風諸痔 |  | 白礬 枯 綠礬 枯                  |  |
| 枳殼 去穰炒              |  | 白附子 生南星           |  | 訶子 煨取                      |  |
| 生半夏 生附子 去皮臍已上各壹兩    |  | 黃瓜萐 壹箇燒存性         |  | 雞冠花 剉炒貳兩半                  |  |
| 黃瓜萐 壹箇燒存性           |  | 胡桃仁 柒箇不用油者        |  | 右細末醋煮麪糊丸桐子大每服貳拾丸空心溫酒       |  |

|              |  |                    |  |                       |  |
|--------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| 欽定四庫全書       |  | 仁齋直指               |  | 卷十四                   |  |
| 下或枳殼散送下      |  | 縮砂湯治大腸虛而淡熱脫肛紅腫     |  | 縮砂 黃連 木賊              |  |
| 右末每貳錢米飲調下    |  | 黃連阿膠丸 方見嗽門         |  | 熱痛仍以荆芥穗朴硝泡湯溫洗次用薄荷煎鵬砂丸 |  |
| 津液調傳         |  | 鐵粉散治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫 |  | 鐵粉 細研                 |  |
| 右入白斂末夾和傅之即按入 |  | 蒲黃膏治脫肛熱痛           |  | 生蒲黃以猪膏和傅即按入           |  |
| 桑螺膏治脫肛       |  | 桑螺上緣桑螺子 燒存性        |  | 右末以猪膏和塗雨後緣桑者佳         |  |
| 橡斗膏治脫肛       |  |                    |  |                       |  |

橡斗子燒存性猪脂和傅

木賊散治脫肛不熱

木賊燒存性為末糝以帛按入

獨虎散治脫肛不收五倍子半兩末井水參梔入磁瓶

慢火煎半續入朴硝荊芥穗各壹錢乘熱熏洗仍以五

倍子末傅之

石灰方治大腸積冷久年脫肛

石灰炒熱以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以海

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十四

螵蛸末傅

敗毒散小兒痢後風邪入大腸脫肛不收以此散風邪

加陳米煎

方見  
寒類

桑葉方

黃皮桑椹取葉參升煎帶溫

右以布盛罨小兒肛門輕手按入次用門白中細塵

綿包撲之

小兒灸法百會穴直取前後髮際折中橫取兩耳尖折

中在順之中心端正螺毛處是也兩手握蒜灸灸則肛

腸自收

濕蘊證蟲蝕肛門咽乾唇瘡齒晦

方見活  
人總括

附諸方

二靈散治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨

煨伍  
錢

木賊

燒存性貳  
錢伍分

右為末摻托之

一方治脫肛用五倍子為末每用參錢入白礬壹塊水

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十四

貳碗煎洗

一方用蔓陀羅花子連殼壹對橡斗拾陸箇搗碎水煎

參伍沸入朴硝熱洗其肛自收

一方用浮萍為末乾貼患處

針灸法命門一穴

在十四椎下灸二七壯  
治大腸虛冷脫肛不收

長強一穴

在尾

間骨尖底灸二七壯治  
痢腸風痔漏脫肛不收

仁齋直指卷十四





欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷十五

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈴

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張炳

欽定四庫全書

仁齋直指卷十五

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

積熱 附  
風熱  
火□

積熱方論

酒麪煎燂雄附峻補皆能生熱謂之積者何哉朝斯夕斯其所由來尚矣夫人偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在冷煖得中而已矯枉過正識者憂焉然則欲

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十五

去積熱將何如曰三黃湯圓第一藥耳雖然凡熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心洗心散所不可闕熱能傷血四順清涼飲又不可無此自本自根之論也若夫酒後之麪飯後之酒最易積熱又當防於未然

積熱證治

小柴胡湯諸熱通用  
方見傷寒總括敗毒散解熱次之  
方見寒類

三黃湯治積熱蘊隆三焦皆熱大小便閉

黃連 去  
黃芩  
大黃 濕紙煨  
等分



|                   |  |                       |  |          |  |                   |  |                                              |  |                                                 |  |                       |  |                    |  |                       |  |              |  |                                |  |                        |  |                      |  |     |  |                  |  |                             |  |           |  |
|-------------------|--|-----------------------|--|----------|--|-------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|-----|--|------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|
| 右剉細每服參錢薑參片慢火略煎食後服 |  | 三黃圓證治同前即前項藥品等為末煉蜜圓桐子大 |  | 每參肆拾圓滾水下 |  | 洗心散治壯熱煩燥風熱壅塞大小便秘澀 |  | 大黃 <small>濕紙煨</small> 甘草 <small>炒</small> 當歸 |  | 芍藥 麻黃 <small>節不去</small> 荊芥穗 <small>各叁兩</small> |  | 白朮 <small>柴錢半</small> |  | 右末每服貳錢半生薑薄荷少許同煎食後服 |  | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十五 |  | 四順清涼飲治血熱蘊結壅滯 |  | 大黃 <small>米上蒸日乾</small> 赤芍藥 當歸 |  | 甘草 <small>微炙等分</small> |  | 右為龕末每貳錢半慢火煎服小柴胡湯亦治血熱 |  | 可擇用 |  | 八正散治心熱煩燥目赤咽疼小便淋閉 |  | 大黃 <small>濕紙煨</small> 瞿麥 木通 |  | 滑石 篇竹 車前子 |  |
|-------------------|--|-----------------------|--|----------|--|-------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|-----|--|------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|

|                           |  |                           |  |          |  |              |  |                                                   |  |                            |  |                       |  |                    |  |                       |  |           |  |            |  |                                              |  |                      |  |            |  |              |  |                                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------|--|--------------|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|------------|--|--------------|--|-------------------------------------------|--|
| 山梔仁 甘草 <small>炙等分</small> |  | 右剉每服參錢入燈心煎食後服大凡心熱要得小便流利而出 |  | 甘露飲治諸瘡發熱 |  | 生乾地黄 熟地黄 天門冬 |  | 麥門冬 <small>並去心</small> 黃芩 枇杷葉 <small>刷去毛淨</small> |  | 山茵陳 枳殼 <small>製</small> 石斛 |  | 甘草 <small>炙等分</small> |  | 右末每服貳錢半食前煎服加乾葛柴胡尤佳 |  | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十五 |  | 木通散治諸熱利小便 |  | 生乾地黄 木通 荊芥 |  | 地骨皮 桑白皮 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> |  | 北梗 <small>等分</small> |  | 右剉每參錢薑參片煎服 |  | 甘豆湯治諸熱煩渴大小便澀 |  | 黑豆 <small>貳合</small> 甘草 <small>貳錢</small> |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|----------|--|--------------|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------|--|------------|--|--------------|--|-------------------------------------------|--|



右生薑柒片井水煎汁服

黃連湯治一切熱血熱眼熱酒熱並主之

黃連  
去鬚  
剉碎

右以井水浸良久磁碗盛之置鐵銚內隔湯煑取清

汁服再煑

牛黃涼膈圓治上焦壅熱口乾咽痛煩燥涎潮

馬牙硝  
寒水石  
煨  
硬石膏  
各貳兩

甘草  
微炙  
壹兩  
牛膽南星  
叁分  
紫石英  
半兩  
飛

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十五

牛黃  
腦子  
麝香  
各壹分

右末煉蜜圓每兩作肆拾圓每服壹圓溫薄荷人參

湯調下

解毒雄黃圓取積下熱

雄黃  
研  
飛  
川鬱金  
各壹分  
巴豆  
拾肆箇  
去油

右末醋煮麪糊圓麻子大每服伍圓加至柒圓熱茶

清下裏實用此喉閉以熱茶清調灌

竹茹湯治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者是

半夏  
叁分用薑汁半盞漿  
水壹升煮去半切焙  
乾葛  
叁兩

甘草  
叁分  
生

右剉散每叁錢青竹茹一彈子許薑棗煎溫服或加

前胡

諸熱酒蒸黃連圓黃連阿膠圓皆可用  
方見嗽門

附諸方

涼膈散治臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸

胃秘澀便溺不利一切風熱並皆治之

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十五

連翹  
甘草  
炙  
大黃

朴硝  
各貳兩  
薄荷  
黃芩

梔子仁  
各壹兩

右咬咀每服水壹鍾半竹葉柒片蜜少許煎食後溫

服

既濟解毒湯治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安

卧大便微秘

大黃  
酒  
煨  
黃連  
酒  
炒  
黃芩  
酒  
炒



|                                 |                         |                        |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 甘草 <small>炙</small>             | 桔梗 <small>各貳錢</small>   | 柴胡                     |
| 升麻                              | 連翹                      | 當歸身 <small>各壹錢</small> |
| 右咬咀每服水貳鍾煎食後溫服                   |                         |                        |
| 大金花園治內外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋閉           |                         |                        |
| 咳嗽衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽者                |                         |                        |
| 黃連                              | 黃栢                      | 黃芩                     |
| 梔子仁                             | 大黃 <small>各等分</small>   |                        |
| 右為末滴水丸如小豆大每服參拾丸新汲水送下            |                         |                        |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十五           |                         |                        |
| 加味金花圓治內外諸熱氣壅痰涎溺血淋閉              |                         |                        |
| 黃連                              | 黃栢                      | 黃芩                     |
| 山梔 <small>炒已上各貳兩</small>        | 桔梗                      | 半夏 <small>泡</small>    |
| 陳皮                              | 人參 <small>去蘆各壹兩</small> |                        |
| 右為細末滴水丸如小豆大每服伍拾丸淡薑湯送下           |                         |                        |
| 清心蓮子飲治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋者 |                         |                        |



|                            |                         |                        |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 黃芩                         | 車前子                     | 麥門冬 <small>去心</small>  |
| 地骨皮                        | 甘草 <small>炙各半兩</small>  | 黃芪 <small>蜜炙</small>   |
| 石蓮子 <small>去心</small>      | 白伏苓                     | 人參 <small>各柒錢半</small> |
| 右咬咀每服水壹鍾煎服如發熱加柴胡薄荷         |                         |                        |
| 經驗地仙散治骨蒸肌熱一切虛煩             |                         |                        |
| 地骨皮                        | 防風 <small>去蘆各壹兩</small> | 雞蘇                     |
| 人參                         | 甘草 <small>各貳錢伍分</small> |                        |
| 右咬咀每服壹兩薑參片竹葉伍片水貳鍾煎至壹       |                         |                        |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十五      |                         |                        |
| 鍾去滓通口服不拘時候                 |                         |                        |
| 五蒸湯治骨蒸勞熱自汗                 |                         |                        |
| 甘草                         | 人參 <small>去蘆</small>    | 知母                     |
| 黃芩 <small>各貳錢</small>      | 伏苓                      | 熟地黃                    |
| 葛根 <small>各叁錢</small>      | 石膏 <small>伍錢</small>    | 竹葉 <small>貳拾片</small>  |
| 右剉咬咀作壹服入粳米壹合煎服             |                         |                        |
| 十全大補湯治諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱 |                         |                        |



|                                                |  |                              |  |                        |  |                     |  |    |  |                         |  |                       |  |                       |  |                       |  |             |  |                                  |  |                        |  |                      |  |                      |  |
|------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|----|--|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| 人參養榮湯治久病虛損口乾食少欬而下利心驚悸熱而自汗 <small>並見虛勞門</small> |  | 黃芪驚甲散治男婦虛熱身瘦五心煩熱四肢怠惰欬嗽咽乾自汗食少 |  | 人參                     |  | 生地黃                 |  | 知母 |  | 甘草                      |  | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十五 |  | 驚甲 <small>錢各伍</small> |  | 地骨皮                   |  | 右呶咀每服壹兩薑水煎服 |  | 樂令建中湯治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣 |  | 前胡 <small>去蘆壹兩</small> |  | 人參 <small>去蘆</small> |  | 當歸 <small>去土</small> |  |
|                                                |  |                              |  | 肉桂                     |  | 半夏 <small>泡</small> |  | 芍藥 |  | 桑白皮 <small>錢各貳半</small> |  |                       |  | 秦艽                    |  | 柴胡 <small>錢各叁</small> |  |             |  |                                  |  | 細辛                     |  | 桂心                   |  | 白芍藥                  |  |
|                                                |  |                              |  | 桔梗 <small>錢壹分伍</small> |  | 紫苑                  |  | 黃芪 |  | 天門冬                     |  |                       |  | 伏苓                    |  |                       |  |             |  |                                  |  | 黃芪 <small>蜜炙壹兩</small> |  | 橘皮 <small>去白</small> |  | 伏苓 <small>去皮</small> |  |

|                       |  |                       |  |                        |  |                       |  |                 |  |                             |  |                                            |  |      |  |                                                                                                       |  |                      |  |                        |  |                      |  |     |  |                       |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------|--|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|-----|--|-----------------------|--|
| 麥門冬 <small>去心</small> |  | 甘草 <small>炙壹兩</small> |  | 半夏 <small>湯泡柒次</small> |  | 右呶咀每服肆錢水壹鍾薑伍片棗壹枚煎服不拘時 |  | 防風當歸飲子治煩渴發熱虛煩蒸病 |  | 六物湯滋陰退熱 <small>並見火門</small> |  | 龍腦雞蘇丸治心中鬱熱消煩渴涼上膈解酒毒治肺熱咳嗽吐血鼻衄崩中下血血淋勞煩諸淋胃熱口臭 |  | 方見火門 |  | 當歸補血湯 <small>東垣方</small> 治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脉洪大而虛重按全無通評虛實論云脉虛血虛脉實血實又云血虛發熱證象白虎惟脉不長實為辨熱若悞服白虎湯必死此病得之於飢困勞役 |  | 黃芪 <small>壹兩</small> |  | 當歸 <small>酒製貳錢</small> |  | 右呶咀都作壹服水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服之 |  | 空心服 |  | 柴胡飲子解一切肌骨蒸熱畜積熱作往來及傷寒發 |  |
|                       |  |                       |  |                        |  |                       |  |                 |  |                             |  |                                            |  |      |  |                                                                                                       |  |                      |  |                        |  |                      |  |     |  |                       |  |





|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 熱汗不解或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病皆治                          |     |
| 柴胡                                             | 人參  |
| 黃芩                                             |     |
| 甘草                                             | 炙   |
| 大黃                                             |     |
| 當歸                                             | 酒浸  |
| 芍藥                                             | 各等分 |
| 右咬咀每服柒錢水貳鍾薑叁片煎捌分食後服                            |     |
| 黃連安神丸治心煩懊懷反復心亂怔忡上熱脅中氣亂心下痞悶食入反出                 |     |
| 硃砂                                             | 肆錢  |
| 黃連                                             | 伍錢  |
| 生甘草                                            | 貳錢半 |
| 右為細末湯浸蒸餅丸如黍米大每服壹拾丸食後時時津唾嚥下內經云心肺位近而倚偶制其小服此緩治之理也 |     |
| 此緩治之理也                                         |     |
| 補中益氣湯                                          | 東垣方 |
| 治陽虛發熱久患虛勞                                      |     |
| 硃砂安神丸                                          | 東垣方 |
| 治心神煩亂怔忡兀兀欲吐氣亂而熱似懊懷狀                            |     |
| 並見內傷門                                          |     |
| 瀉青丸                                            | 錢氏方 |
| 治肝經鬱熱                                          |     |
| 當歸                                             | 酒洗  |
| 龍膽草                                            |     |
| 川芎                                             |     |

|                       |     |                 |      |
|-----------------------|-----|-----------------|------|
| 山梔                    | 炒   | 大黃              | 羌活   |
| 防風                    | 去蘆  |                 |      |
| 右為末蜜為丸雞頭子大每服壹貳丸       |     |                 |      |
| 瀉黃散治脾熱口臭咽乾            |     |                 |      |
| 藿香                    | 柒錢  | 山梔              | 壹兩   |
| 甘草                    | 叁兩  | 防風              | 去蘆肆兩 |
| 右為末蜜酒拌微炒香每服壹錢         |     |                 |      |
| 火鬱湯治手足心發熱             |     |                 |      |
| 升麻                    | 葛根  | 柴胡              |      |
| 白芍藥                   | 各壹兩 | 甘草              | 各伍錢  |
| 右剉每服伍錢連須葱白叁寸煎稍熱服不拘時   |     |                 |      |
| 大青丸治上焦熱結勞役發熱並瘟疫時行發熱   |     |                 |      |
| 風熱                    |     |                 | 方見火門 |
| 防風通聖散治風熱諸証            |     |                 |      |
| 定風餅子                  | 方不易 | 治風客陽經邪傷腠理背脊強直言語 |      |
| 寒澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒 |     |                 |      |



過多嘔吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪方見傷風門

追風散和劑方治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚瘙

痒眉角牽引婦人血風一切頭風並皆治之

白殭蠶去絲 荆芥各貳兩 石膏

川烏炮去 防風去蘆又 全蝎炒壹錢

川芎參兩 麝香研 甘草炙壹兩

右為末每服半錢食後臨卧茶調下

龍腦川芎丸御藥院方消風化滯除熱消痰通利七竅爽氣

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十五

清神

桔梗壹兩伍錢 片腦陸錢 砂仁貳錢

白豆蔻伍錢 薄荷去土叁錢 川芎

防風去蘆壹兩 甘草炙壹兩

右為末煉蜜為丸每兩作貳拾丸每服貳丸細嚼茶

清送下

附火証

火証方論

劉宗厚曰火之為病其害甚大其變甚速其勢甚彰其

死甚暴何者蓋能燔灼焚焰飛走狂越消鑠於物莫能

禦之遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰

相火也猶龍火也火性不妄動能不達於道常以稟位

聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少

靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火化火一妄行

元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動

之極也病則死矣經所謂一水不勝二火之火出於天

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十五

造君相之外又有厥陽臟腑之火根於五志之內六欲

七情激之其火隨起蓋大怒則火起於肝醉飽則火起

於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心為君

主自焚則死矣丹溪又啟火出五臟主病曰諸風掉眩

屬肝火動之類經所謂一水不勝五火之火出自人為

又考內經病機一十九條內舉屬火者五諸熱贅瘕皆

屬於火之類而河間又廣其說火之致病者甚多深契

內經之旨曰諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁



腹脹大鼓之有聲如鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂  
脅鬱腫脹鼻塞衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚  
惑悲笑譫妄衄蟻血汚此皆少陰君火之熱乃真心小  
腸之氣所為也若脅癰暴瘡胃味操擾狂越罵詈驚駭  
肘腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神守噤嘔瘡瘍喉痺耳  
鳴及聲嘔涌溢食不下目抹不明暴注睨癰暴病暴死  
此皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所為也是皆  
火之變見為諸病也為脉虛則浮大實則洪數藥之所  
主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水滅可以  
直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水  
濕折之從其性而伏之惟黃柏之屬可以降之噫瀉火  
之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之黃連  
瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火大柴胡瀉肝火知母  
瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦  
內傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘溫之劑除之如  
黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十五

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十五

日漸煎熬為血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃  
之屬若心火亢極鬱熱內實為陽強之病以鹹冷之劑  
折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷真陰失守無根之  
火為陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬  
若右腎命門火衰為陽脫之病以溫熱之劑濟之如附  
子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土為火  
鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明諸此  
之類而求火之為病施治何所依據故於諸經集略其  
說備處方之用庶免實實虛虛之禍也滑氏曰虛勞証  
中多云相火為患者何氣使然是為火也請明議焉對  
曰華陀云三焦者相火也相火之相者譬之如丞相之  
相也善政之道輔佐週身維持綱紀所接元陽以為一  
身統領使百脉舒和上焦曰膻中之屬宣行氣血中焦  
曰中脘之緣腐熟水谷下焦曰膀胱之所搜便精溺無  
形而有用焉故曰三焦蓋三焦者為諸陽升降之方呼  
吸發源之所三元有道九竅流通神志相關命脉相繼



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|
| 欽定四庫全書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 仁齋直指 |    |
| 卷十五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |    |
| <p>週身有倚血氣無偏治化宣和是無虞矣又曰於火為患者何以驗云對曰於斯者是因體虛之人房勞過損腎水乾枯無因既濟相火頓生或因七情所感或因怒火傷肝肝木相乘為熱為風風邪鼓舞火性上炎為百病之長也華陀云三焦積熱於火生焉六腑顛危從權所化且如脉來洪數者熱之有准芤浮中空者吐血無疑咳嗽咯痰須明虛實欲知治嗽先補其源身熱者滋陰清氣惡寒者和陽挽陰治寒遠寒治熱遠熱甘緩溫和調虛之則丹溪云陰虛火動証難治用四物湯加炒黃栢降火補陰龜板補陰乃陰中之至陰也又云氣從臍下起者陰火也氣從脚下起入腹如火者乃虛之極也蓋火起於九泉之下多死一法用附子末津調塞湧泉穴以四物湯加降火藥服之妙</p> <p>東垣瀉陰火升陽湯治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛脉右關緩弱或弦或浮數</p> |    |      |    |
| 羌活                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 甘草 | 黃芪   | 蜜炙 |

|                                                              |        |      |       |
|--------------------------------------------------------------|--------|------|-------|
| 欽定四庫全書                                                       |        | 仁齋直指 |       |
| 卷十五                                                          |        |      |       |
| 蒼朮                                                           | 各壹兩    | 升麻   | 捌錢    |
| 人參                                                           |        | 黃芩   | 各柒錢   |
| 石膏                                                           | 半兩秋深勿用 | 黃連   | 酒炒半兩  |
| 右咬咀每服壹兩或半兩水煎服                                                |        |      |       |
| 升陽散火湯治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之 |        |      |       |
| 升麻                                                           | 葛根     | 獨活   |       |
| 羌活                                                           | 人參     | 白芍   | 各半兩   |
| 防風                                                           | 柴胡     | 甘草   | 炙叁錢捌錢 |
| 甘草                                                           | 生貳錢    |      |       |
| 右咬咀每服半兩或壹兩水煎積熱服                                              |        |      |       |
| 柴胡飲子治一切肌熱蒸熱積熱或汗後餘熱脉洪實弦數                                      |        |      |       |
| 八正散治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤睛痛臍秘結小便赤澀                                  |        |      |       |



|                    |                                  |                                                         |                                        |      |                       |                                                  |                                         |                       |                                  |                                              |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 三黃湯治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥 | 三黃丸治男子婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀大便秘結並宜治之 | 大金花丸治中外諸熱寢汗咬牙時語驚悸溺血淋閉咳衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花丸又曰既濟解毒丸 | 加味金花丸治內外諸熱氣壅痰涎溺血淋閉火証 <small>並方</small> | 見積熱門 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十五 | 黃連解毒湯治傷寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱內甚 <small>方見眼目</small> | 大青丸治上焦熱結勞役發熱並痰火瘟疫發熱 <small>方見瘧門</small> | 涼膈散治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煇 | 礫多渴腸胃秘澀便溺不利 <small>方見積熱門</small> | 神芎丸治一切熱證常服保養除痰飲消酒食清頭目利咽喉能令遍身結滯宣通氣利而愈神強體健耐傷省病 |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|



|                        |                        |                       |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 大黃                     | 黃芩 <small>各貳兩</small>  | 牽牛                    |
| 滑石 <small>各肆兩</small>  | 黃連                     | 薄荷                    |
| 川芎 <small>各半兩</small>  | 右為末水為丸如小豆大溫水下拾丸至拾伍丸貳拾丸 |                       |
| 清心湯即涼膈散料內加黃連伍錢用蜜與竹葉同煎  | 連翹                     | 山梔子                   |
| 薄荷葉                    | 黃芩 <small>各伍錢</small>  | 甘草 <small>壹兩半</small> |
| 朴硝 <small>貳錢伍分</small> | 加黃連 <small>半兩</small>  |                       |
| 右為細末每服伍錢水壹盞蜜少許竹葉拾片同煎   | 柒分服                    |                       |
| 黃芩湯治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利   | 澤瀉                     | 梔子仁                   |
| 麥門冬 <small>去心</small>  | 木通                     | 生地黃                   |
| 黃連                     | 甘草 <small>各等分</small>  |                       |
| 右咬咀每服壹兩水貳盞薑伍片煎至壹盞食前溫   |                        |                       |





服

玄明粉

御藥院方

此藥大治邪熱所干膈上氣滯臟腑秘澀

並宜服之以朴硝煎過澄濾伍柒遍至夜於星月下露

至天明自然結作青白塊子用磁罐子按實於炭火內從

慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取

出於淨地上倒下用盆合蓋以去火毒然後研為細末

每貳斤入甘草生熟貳兩為末一處攪勻臨睡斟酌用

之或壹錢貳錢以桃花煎湯或葱白湯下

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十五

防風通聖散

方見風門

清燥湯

方見痿門

龍腦雞蘇圓

方見鼻門

地骨皮散治虛潮熱骨蒸壯熱

六味地黃丸治腎氣虛久新憔悴寢汗發熱五臟齊損

瘦弱虛煩骨蒸下血

補陰丸降陰火治發渴骨蒸補腎水真陰不足

俱見虛勞門

大補丸

丹溪方

去腎經火燥下焦濕治筋骨軟氣虛以補

氣藥下血虛以補血藥下並不單用

川黃栢

炒褐色

右以水丸服

六物湯滋陰血降腎火

川芎

白芍藥

酒炒

生地黃

酒洗

當歸

酒洗

黃栢

蜜炒

知母

酒炒各等分

右咬咀用水壹鍾半煎至捌分食前溫服

當歸龍膽圓治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕搐

溺神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞶癢胸膈咽噎

不利腸胃燥澀躁擾狂越罵詈驚駭火熱等証

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十五

當歸

草龍膽

山梔仁

黃連

黃栢

黃芩

各壹兩

大黃

蘆薈

青黛

各半兩

木香

壹錢

麝香

伍分

右為末煉蜜為丸如小豆大薑湯下參貳拾丸此藥

瀉肝心脾肺腎胃火之神藥也

麥門冬湯

千金方

治諸疾後火熱乘肺咳唾有血胸脇脹

滿上氣羸瘦五心煩熱渴而煩悶



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

|                      |     |           |          |
|----------------------|-----|-----------|----------|
| 麥門冬                  | 桑白皮 | 生地黃       | 各壹兩      |
| 半夏                   | 紫苑  | 桔梗        |          |
| 淡竹茹                  | 麻黃  | 五味子       | 各七錢半     |
| 甘草                   |     |           | 各伍錢      |
| 右咬咀每服伍錢或壹兩入薑煎        |     |           |          |
| 防風當歸飲子               | 宣明方 | 治煩渴發熱虛煩火証 |          |
| 柴胡                   | 人參  | 黃芩        |          |
| 甘草                   | 各壹兩 | 滑石        | 叁兩       |
| 大黃                   |     |           |          |
| 當歸                   | 芍藥  | 防風        | 各伍錢      |
| 右咬咀每服壹兩水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾去滓 |     |           |          |
| 通口服不拘時如有痰嗽加半夏泄者去大黃   |     |           |          |
| 左金圓                  | 丹溪方 | 治肝火       |          |
| 黃連                   | 陸兩  | 吳茱萸       | 壹兩       |
| 右為末水丸或蒸餅丸白湯下伍拾丸      |     |           |          |
| 滋陰降火湯養血降火之聖藥也        |     |           |          |
| 川歸身                  | 酒洗  | 地黃        | 涼血用生補血用熟 |
| 天門冬                  | 去心  |           |          |

|                                                                                                                                                             |         |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|
| 白芍藥                                                                                                                                                         | 薄荷炒     | 白朮 | 各壹錢 |
| 甘草                                                                                                                                                          | 炙各伍錢    | 知母 |     |
| 遠志                                                                                                                                                          |         | 陳皮 | 洗   |
| 川芎                                                                                                                                                          | 各陸分久病去之 |    |     |
| 右咬咀薑水煎服氣血虛加人參黃芪嗽加五味阿膠痰加瓜蒌貝母吐血加丹皮藕汁熱加地骨皮                                                                                                                     |         |    |     |
| 痼冷                                                                                                                                                          |         |    |     |
| 痼冷方論                                                                                                                                                        |         |    |     |
| 苟得其養無物不長苟失其養無物不消人之處世飲食為上湯藥次之惟其口腹不充嗜慾無節所以臟中停寒而為之沉痼也男子精流女子帶下骨寒腦冷氣乏血衰嘔吐惡心久泄暴下皆其證耳療治之法雖貴乎溫補不貴乎大剛惟於滋血養氣中佐以薑桂雄附為愈抑古人所謂精不足者補之以味繼此尤當加意焉若夫執劑剛燥亟欲陽氣頓回吾恐腎水易涸心火獨炎識者未保其往 |         |    |     |
| 痼冷證治                                                                                                                                                        |         |    |     |



|                           |  |                        |  |                       |  |                        |  |
|---------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|
| 十補湯治諸虛百損                  |  | 人參 <small>分壹</small>   |  | 白朮                    |  | 白茯苓                    |  |
| 甘草 <small>炙</small>       |  | 辣桂                     |  | 黃耆 <small>炙蜜</small>  |  |                        |  |
| 當歸                        |  | 川芎                     |  | 熟地黃                   |  |                        |  |
| 白芍藥 <small>各半兩</small>    |  |                        |  |                       |  |                        |  |
| 右剉散每服參錢半薑棗煎空心食前服加熟附子      |  |                        |  |                       |  |                        |  |
| 溫之                        |  |                        |  |                       |  |                        |  |
| 附子理中湯沉附湯薑附湯並主痢冷須加當歸       |  |                        |  |                       |  | 方見寒類                   |  |
| 欽定四庫全書                    |  | 仁齋直指                   |  | 卷十五                   |  |                        |  |
| 麝香鹿茸圓治真元虛憊精血耗少            |  | 熟地黃                    |  | 山藥 <small>各叁兩</small> |  | 杜仲 <small>炒斷絲</small>  |  |
| 鹿茸 <small>酒炙各壹兩半</small>  |  | 北五味子                   |  | 肉蓯蓉                   |  |                        |  |
| 牛膝 <small>並酒浸焙各壹兩</small> |  | 沉香 <small>半兩</small>   |  | 麝香 <small>半錢</small>  |  |                        |  |
| 右末煉蜜圓桐子大每叁伍拾圓食前塩湯下        |  |                        |  |                       |  |                        |  |
| 八味圓治下元冷憊腰脚痠重虛勞消渴          |  | 熟地黃 <small>肆兩</small>  |  | 山藥                    |  | 山茱萸 <small>各貳兩</small> |  |
| 辣桂                        |  | 熟附子 <small>各壹兩</small> |  | 澤瀉                    |  |                        |  |

|                         |  |                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------|--|
| 牡丹皮                     |  | 白茯苓 <small>各壹兩半</small> |  |                           |  |
| 右為末煉蜜圓桐子大每服叁拾圓食前鹽湯下     |  |                         |  |                           |  |
| 黑錫丹治脾腎俱虛冷氣刺痛止汗墜痰除濕破癰    |  | 黑錫 <small>洗鎔取淨</small>  |  | 透明硫黃 <small>結砂各貳兩</small> |  |
| 沉香                      |  | 木香                      |  | 熟附子                       |  |
| 葫蘆巴 <small>酒浸炒</small>  |  | 肉桂 <small>各半兩</small>   |  | 舶上茴香 <small>炒</small>     |  |
| 破故紙 <small>酒浸炒</small>  |  | 陽起石 <small>研細水飛</small> |  | 肉豆蔻 <small>麝裹煨各壹兩</small> |  |
| 右用新鐵銚如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒    |  |                         |  |                           |  |
| 欽定四庫全書                  |  | 仁齋直指                    |  | 卷十五                       |  |
| 候冷研極細餘藥並末同研自朝至暮以黑光為度    |  |                         |  |                           |  |
| 酒麪糊圓桐子大陰乾每叁伍拾圓空心鹽湯下婦    |  |                         |  |                           |  |
| 人艾醋湯下本方加蓯蓉背膝白朮丁香名接氣丹    |  |                         |  |                           |  |
| 治真元虛憊                   |  |                         |  |                           |  |
| 養正丹升降水火助陽接真治咳逆飆胃痰結頭運腹   |  |                         |  |                           |  |
| 痛腰疼霍亂吐瀉                 |  |                         |  |                           |  |
| 好硫黃 <small>研</small>    |  | 黑錫                      |  | 水銀                        |  |
| 硃砂 <small>研細各壹兩</small> |  |                         |  |                           |  |



欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十五

右淨鐵籩以厚紙布扎柄先鎔鉛濾去滓壹兩淨再放籩內用鐵匙炒攪將熟硫黃末叁錢重漸入其中或焰起亦莫管只急手炒攪令鉛熟無性其硫黃皆燒去但得鉛熟遂傾放地下紙上令硬即碾開以紗篩出鉛粉其餘成珠者再炒碾為末次將籩鉋頓慢火爐上又鎔鉛粉以熟硫黃末壹兩漸入頻攪炒纔見黃烟上急拖過冷爐上少頃又過火上再攪炒得鉛與硫黃皆成黑色極調和了却放冷爐上候鉛硫

微冷又頓在十分微微火上少頃入水銀以鐵匙頻攪切勿令青烟上烟上便走了水銀又次入朱砂末頻攪炒令十分調和即傾放地下紙上俟硬別碾為末糯米糊圓菜豆大每叁拾圓塩湯空心下

靈砂諸虛痼冷厥冷神效

好硫黃

壹兩

水銀

叁兩

右修煉家有見成者贖研細糯米糊圓小麻子大每服伍柒圓加至拾伍圓空心人參棗湯下或塩湯下

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十五

○疝氣偏墜木腎腫疼炒茴香入酒煎候溫下○虛勞喘嗽生薑烏梅紫蘇莖煎湯下○盜汗小便多煨牡蠣入塩煎湯下○痰癰不已桃柳枝煎湯下○脹滿腹痛腰疼莪朮湯下○嘔逆翻胃丁香木香煎湯下○白濁遺精白伏苓煎湯下○中風痰厥向青木香湯研灌○走注風遍身痛嚼葱白酒下○脚痛木瓜湯下○氣滯生薑陳皮湯下○婦人血痛氣痛延胡索五靈脂酒醋各半煎湯下○小兒慢驚沉困胃

虛神脫人參丁香煎湯吞下

椒附散治腎氣上攻項背不能轉側亦治冷痺不仁

熟附子

末

真川椒

右每服附子末貳大錢匕川椒貳拾壹粒用白麪塞滿水盪半薑柒片煎半去椒入塩少許通口空心服大凡腎氣須以川椒引而歸經則安矣又一證腎虛血寒氣逆而脹胸腹走痛中脘痞滿兩眼多淚此寒泣血也二陳湯加官桂當歸下安腎圓立愈若大便澁更加



|                        |     |       |                           |
|------------------------|-----|-------|---------------------------|
| 枳殼二陳湯                  |     | 方見安腎圓 | 方見水                       |
| 附諸方                    |     | 方和劑   | 方見水                       |
| 沉香畢澄茄圓                 |     | 方和劑   | 方見水                       |
| 面色痿黃臟腑自利小便滑數少陽一切氣痛並皆治之 |     |       |                           |
| 桃仁                     | 去皮尖 | 木香    | 川練子                       |
| 附子                     | 炮去  | 川烏    | 炮去                        |
| 葫蘆巴                    | 肉桂  | 沉香    | 萆澄茄                       |
| 補骨脂                    |     | 炒     | 巴戟天                       |
| 右咬咀剉服參錢水壹盞入塩少許煎捌分空心熱服  |     |       |                           |
| 復陽丹                    |     | 方濟生   | 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰証悉皆治之 |
| 川烏                     | 去皮肆 | 天推    | 附子                        |
| 鍾乳粉                    | 各壹  | 陽起石   | 朱砂                        |
| 右為末酒煮神麴糊丸如梧桐子大每服伍拾丸空   |     |       |                           |

|                      |    |     |                   |
|----------------------|----|-----|-------------------|
| 心塩湯下                 |    |     |                   |
| 附子茴香散                |    | 方詹療 | 治氣積冷心腹絞痛          |
| 肉豆蔻                  | 乾薑 | 附子  | 大者壹枚炮去            |
| 茴香                   | 木香 | 白朮  | 炒                 |
| 人參                   | 甘草 | 白茯苓 |                   |
| 丁香                   |    |     |                   |
| 右咬咀每服參錢水壹盞塩少許煎柒分空心服  |    |     |                   |
| 雄朱丹                  |    | 選百一 | 治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱變為勞瘵 |
| 朱砂                   | 雄黃 | 各貳  |                   |
| 以上用沙合壹箇先以牡丹皮貳兩內外薰黃入藥 |    |     |                   |
| 於內以嚴醋和腦茶作餅蓋定合口以赤石脂固濟 |    |     |                   |
| 合縫又用赤石脂泥裹合了一重再用黃泥紙筋又 |    |     |                   |
| 裹一重先以草火燒令乾次以炭火伍斤漸又添至 |    |     |                   |
| 壹秤候火力漸消取出掘地坑壹尺埋壹宿去火毒 |    |     |                   |
| 取研入後藥                |    |     |                   |





丁香

萹蓢

赤石脂

胡椒

附子

白朮  
各壹兩

乳香

半兩與前赤石脂同研

官桂

木香

右為末入前藥研勻以清酒貳升貳分熬去貳分入附子末煑糊丸如梧桐子大每服拾丸空心溫酒塩湯任下

秘澁

附胞轉多

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十五

### 小便不通方論

腎主水膀胱為之府水瀦於膀胱而泄於小腸實相通也然小腸獨應於心者何哉蓋陰不可以無陽水不可以無火水火既濟上下相交此榮衛所以流行而水竇開闔所以不失其司耳惟夫心腎不濟陰陽不調故內外關格而水道澁傳送失度而水道滑熱則不通冷則不禁其熱盛者小便閉而絕無其熱微者小便難而僅有腎與膀胱俱虛客熱乘之故不能制水水挾熱而行



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十五

澁焉是以數起而溺有餘瀝腎與膀胱俱冷內氣不充故胞中自滑所出多而色白焉是以遇夜而陰盛愈多若夫下焦蓄血其與虛勞內損則便溺自遺而不知下焦虛寒不能溫制水液則便溺欲出而不禁是皆心不與腎交通故或冷或熱而滑澁隨之矣繼自今心氣旺盛小便壅遏以清利行之如赤茯苓麥門冬燈心車前子之類是也心氣虛怯小便滑利以溫和益之如乳香益智巴戟人參之類是也演觸其間腎實腎虛皆可以舉隅而反或者膠柱調瑟詳於腎而略於心其可乎雖然小腸之與膀胱心腎所主固也然素問有云水之本在腎其末在肺則知天一之水自上而下相為貫通亦猶心腎之不可不升降也昧者夜間忍縮小便使水氣上逆乘肺痰涎喘嗽激亂爭鳴其來不可禦於此見肺主氣也小便澁滑又當調適其氣焉毋徒曰葶藶桑皮可以逐肺經之水

### 小便不通證治

草蜜湯治心腎有熱小便不通

生車前草搗取自然汁半盞入蜜壹匙調服

蒲黃湯治心腎有熱小便不通

赤伏苓 木通 車前子

桑白皮炒 荊芥 燈心

赤芍藥 甘草微炙 生蒲黃

滑石等分

右末每服貳錢葱頭壹片紫蘇伍葉煎湯調下

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十五

八正散治心經邪熱小便赤澀不通方見積熱門

五苓散方見水飲門 加赤伏苓治小便不通每服貳錢用燈

心山茵陳各壹握煎湯調下

參耆湯治心肺虛而客熱乘之小便澀而數數而瀝

赤伏苓半錢 生乾地黄 黃耆

桑螵蛸微炙 地骨皮各半兩 人參

北五味子 兔絲子酒浸 甘草各錢半

右細剉每服參錢新水煎臨熟入燈心貳拾壹莖溫

服

平補圓治腎虛小便數而瀝如欲滲之狀或虛勞內損

遺尿或下焦虛寒小便欲出而不禁通用方見消渴門

茸香圓治下焦虛冷尿多或虛勞遺尿或欲出而不禁

鹿茸酥炙 肉蓯蓉酒浸 當歸各半兩

雞內金微炙 龍骨燂碎 牡蠣灰

赤石脂 禹餘糧燂碎為度

川白薑 益智仁 巴戟

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十五

乳香各錢半

右細末糯米糊圓桐子大每服柒拾圓空心鹽湯下

桃仁承氣湯治下焦蓄血漱水迷忘小腹急痛内外有

熱加生蒲黃方見血類

大小便不通證治

掩臍法治小便大便不通連根葱壹莖不得洗帶土生

薑壹塊淡豆豉貳拾壹粒塩貳匙同研爛捏餅烘熱掩

臍中以帛扎定良久氣透自通不然再換一劑



轉胞證治

轉胞方治胞轉小便不能通先用

良薑

蔥頭

紫蘇莖葉

各壹握

右煎湯密室內熏洗小腹外腎肛門留湯再添蘸帛

洗以手拊摩臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣

次用

蜀葵子

貳錢半

赤茯苓

赤芍藥

白芍藥

各半兩

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十五

右剉每服參錢煎取清汁再煖乘熱調蘇合香圓參

丸并研細青塩半錢食前温服○又法炒塩半斤囊

盛熨小腹

便多證治

多溺方暖腎圓治腎虛多溺或小便不禁而濁

葫蘆巴

炒

故紙

炒

川練肉

用牡蠣炒  
去牡蠣

大熟地黄

洗焙

益智仁

鹿茸

酒炙

山茱萸

代赭石

煮熟醋蘸  
柒次研細

赤石脂

各叁分

龍骨

海螵蛸

熟艾

米醋浸壹宿炙焦

丁香

沉香

滴乳香

各貳分

禹餘糧

煨醋淬碎為  
度細研叁分

右細末水煮糯米糊圓桐子大每服伍拾圓食前石

昌蒲煎湯送下

附諸方

導氣除燥湯

東垣方

治小便閉塞不通乃血澁致氣不通

而竅澁也

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十五

知母

酒炒叁錢

黃柏

酒炒肆分

滑石

炒黃色

澤瀉

伏苓

去皮各貳錢

右件和勻每服半兩水參大盞煎至壹盞去滓稍熱

服空心如急閉不計時候

腎疸湯

東垣方

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澁

升麻

半兩

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡

已上各伍分

已上治腎疸目黃渾身黃



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

|                           |                               |                          |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 白朮<br><small>錢半</small>   | 蒼朮<br><small>錢壹</small>       | 猪苓<br><small>分肆</small>  |
| 澤瀉<br><small>分叁</small>   | 茯苓<br><small>分貳</small>       |                          |
| 已上治小便赤澀                   |                               |                          |
| 葛根<br><small>分伍</small>   | 甘草                            | 人參<br><small>分各叁</small> |
| 黃蘗<br><small>分壹</small>   | 麴<br><small>分陸</small>        |                          |
| 右件剉如麻豆大分作貳服每服水叁盞煎至壹盞      |                               |                          |
| 去滓稍熱服食前                   |                               |                          |
| 鬱金黃連圓治心火上炎腎水不升致使水火不得相     |                               |                          |
| 濟膀胱小腸積熱或癰閉不通或遺溺不禁或白濁如     |                               |                          |
| 泔或膏淋如膿或如梔子水或如小石米粒或如粉糊     |                               |                          |
| 相似者諸熱証也                   |                               |                          |
| 鬱金                        | 黃連<br><small>兩各壹</small>      | 黃芩                       |
| 琥珀<br><small>研</small>    | 大黃<br><small>兩貳酒浸各</small>    | 滑石                       |
| 白茯苓<br><small>兩各肆</small> | 黑牽牛<br><small>兩炒取頭末叁兩</small> |                          |
| 右為末水丸如梧子大每服伍拾丸沸湯下空心服      |                               |                          |
| 如用消導飲食降心火可加沉香伍錢           |                               |                          |

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 一方治孕婦轉胞并男子小便不通用冬葵子山梔子                                      | 炒滑石研各伍錢木通叁錢       |
| 右作壹服水煎溫服外用冬葵子滑石梔子為末田                                       | 螺肉和搗成膏或用生葱汁調貼臍中立通 |
| 一方治遺尿失禁用益智<br><small>去皮鹽炒</small> 烏藥<br><small>各肆兩</small> |                   |
| 右為末以山藥末陸兩打糊為丸如梧桐子大每服                                       | 柒拾丸空心清米飲送下        |
| 大便秘澀方論                                                     |                   |
| 凡人五味之秀者養臟腑諸陽之濁者歸大腸大腸所                                      |                   |
| 以司出而不納也今停蓄蘊結獨不得其疏導何哉抑                                      |                   |
| 有由矣熱邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾                                      |                   |
| 此大腸之挾熱然也虛人臟冷而血脉枯老人腸寒而                                      |                   |
| 氣道澀此大腸之挾冷然也腹脹痛悶胃痞欲嘔此證                                      |                   |
| 結聚以宿食留滯得之腸胃受風涸燥秘澀此證閉塞                                      |                   |
| 以風氣燔灼得之若夫氣不下降而穀道難噫逆泛滿                                      |                   |
| 必有其證矣劑量治法熱者三黃湯冷者金液丹宿食                                      |                   |



者脾積圓風秘者脾約麻仁圓氣不下降則桔梗枳殼湯固在精擇而審處其間縱橫泛應亦自胷中活法充之矣然而大腸與肺為表裏大腸者諸氣之道路關焉熱則清利冷則溫利積聚者揆其積風壅者疏其風是固然爾孰知流行肺氣又所以為四者之樞紐乎不然叔和何以曰肺與大腸為傳送

大便秘澀證治

大黃飲子治身熱煩燥大便不通

欽定四庫全書

仁齋直指卷十五

川大黃

濕紙煨

杏仁

去皮尖炒

梔子仁

川升麻

枳殼

浸去穰碎炒各半兩

生地黄

壹兩

人參

黃芩

甘草

炙各貳錢半

右剉散每服參錢生薑伍片豉貳拾壹粒小烏梅壹

枚煎服

三黃湯三黃圓治熱證大便結

方見積熱門

甘豆湯治熱證風證大便不通

方見積熱門

金液丹治大便挾冷結滯用麻仁杏仁煎湯下

方見脾疼門

半硫圓治冷秘風秘老人秘結

透明硫黃

研十分細

圓白半夏

湯盪柒次焙乾等分

右末生薑汁煮白麪糊築圓桐子大每服貳拾圓薑

湯下或用蔥白壹條生薑叁片煎熟入阿膠貳片鎔

開食空送下

膠蜜湯治老人虛人大便秘澀

連根蔥白

叁片

右新水煎去蔥入透明阿膠炒貳錢蜜貳匙鎔開食

欽定四庫全書

仁齋直指卷十五

前溫服

潤腸圓大便秘澀通用

杏仁

去皮尖炒

枳殼

浸去穰炒

麻仁

陳皮

各半兩

阿膠

炒

防風

各貳錢半

右末煉蜜圓桐子大每服伍拾圓老者蘇子煎湯下

壯者荊芥泡湯下

脾積圓治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪朮

叁兩

京三稜

貳兩





|                       |                     |      |             |
|-----------------------|---------------------|------|-------------|
| 良薑                    | 半兩已上用米醋壹升於瓶內煑乾乘熱切碎焙 | 青皮   | 去白壹兩        |
| 南木香                   | 各半兩                 | 不蛀皂角 | 叁大銚燒存性      |
| 百草霜                   | 深村鍋底者佳叁匙            |      |             |
| 右為細末用川巴豆半兩只去殼研如泥漸入藥末  |                     |      |             |
| 研和得所麪糊圓麻子大每服伍圓加至拾圓橘皮  |                     |      |             |
| 煎湯下                   |                     |      |             |
| 木香逐氣圓治食積氣滯通利大便兼治腳氣小腸氣 |                     |      |             |
| 諸氣攻刺腹痛                |                     |      |             |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十五       |                     |      |             |
| 橘紅                    |                     | 青皮   | 去白          |
| 南木香                   | 貳錢半                 | 川巴豆肉 | 壹錢半研如泥漸入藥夾研 |
| 右件並未用生薑自然汁調神麪末為糊圓麻子大  |                     | 檳榔   | 雞心者各半兩      |
| 每服拾圓薑湯下如氣攻腹痛枳殼木瓜煎湯下   |                     |      |             |
| 二香圓治積滯氣秘心腹刺痛中滿壅嗽      |                     |      |             |
| 南木香                   |                     | 丁香   |             |
| 橘紅                    |                     | 草果仁  |             |
| 白豆蔻仁                  |                     | 五靈脂  | 香潤者別研各半兩    |
|                       |                     | 肉豆蔻  | 生           |
|                       |                     | 青皮   | 浸去白曬        |

|                      |           |     |       |
|----------------------|-----------|-----|-------|
| 蓬木                   | 炮乘熱碎研     | 縮砂仁 | 各柒錢半  |
| 右細末用川巴豆肉半兩研如泥漸入藥末研和白 |           |     |       |
| 麪稀糊圓麻子大候乾每服叁圓加至伍柒圓止薑 |           |     |       |
| 湯下壅嗽紫蘇生薑煎湯下          |           |     |       |
| 獨棗湯治大便積日不通           |           |     |       |
| 大好棗                  | 壹枚擘開入輕粉半錢 |     |       |
| 右以棗相合麻線札縛慢火煮熟嚼細以棗汁送下 |           |     |       |
| 脾約麻仁圓治風秘及脾約證小便數大便秘   |           |     | 方見脚氣門 |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十五      |           |     |       |
| 用枳殼散送下               |           |     |       |
| 追風毒剉散治風氣蕃盛大便秘結       |           |     | 方見脚氣門 |
| 疎風散治風毒秘結             |           |     |       |
| 枳殼                   | 製半兩       | 防風  |       |
| 獨活                   |           | 檳榔  |       |
| 威靈仙                  |           | 蒺藜  | 炒赤去刺  |
| 杏仁                   |           | 甘草  | 炙各壹分  |
| 右麓末每貳錢半薑伍片蜜壹匙慢火煎服    |           | 麻仁  |       |
|                      |           | 白芷  |       |
|                      |           | 羌活  |       |



桔梗枳殼湯治氣不下降大便不通方見氣門加紫蘇莖葉

煎

寬快湯治氣不下降大腸澀滯

香附杵淨貳兩

天台烏藥去心

枳殼製各壹兩半

縮砂仁柒錢半

蘇子炒半兩

青木香叁錢

甘草炙柒錢半

右末每服貳錢陳皮煎湯調下或吞青木香圓少許

降氣湯治氣不下降大便不通方見氣門加枳殼杏仁煎

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十五

此藥流行肺氣

蘇感圓治氣秘不大便用紫蘇橘皮煎湯下或枳殼散

送下蘇合香圓方見嗽門

感應圓方見滿門

蘇合肆分感應陸

分研和別圓大凡腹痛而嘔欲利其大便諸藥皆吐惟

蘇感圓用薑汁泡湯下最妙

煨蒜方獨頭蒜煨熟去皮以綿裹納後部即通

又掩臍法方見小

臨用入輕粉少許尤速

重方不蛀皂角用椀燒置於桶內熏其後部自通

調導飲治婦人產前產後大便不通

當歸

川芎

防風

枳殼製各肆分

甘草炙貳錢

右細剉每服叁錢食前薑棗煎服

附諸方

潤腸圓方東垣

治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥秘塞不

通全不思食乃風結秘血結秘皆令閉塞也以潤燥和

血疏風自然通

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十五

麻子仁

桃仁去皮尖各壹兩

羌活

當歸尾

煨大黃各半兩

右件除麻子仁桃仁別研如泥外搗羅為末五上火煉

蜜圓如桐子大每服叁伍拾圓空心白湯送下○如

病人不大便為大便不通而滋其邪盛者急加酒製

大黃以利之○如血燥而大便燥乾者加桃仁酒製

大黃○如風結燥大便不行者加麻子仁大黃○如

風澀而大便不行者加皂角仁大黃秦艽以利之○



|                                                                                                                |    |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|
| <p>如脉澁覺身有氣澁而大便不通者加郁李仁大黃以除之氣燥○如寒因之病為寒結閉而大便不通者以局方中半硫圓或加煎附子乾薑湯水冷與之其病雖陰寒之證常當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與一服藥微通其大便不令閉結乃治之大法</p> |    |    |     |     |
| <p>若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脉實堅亦宜與陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加</p>                                                                |    |    |     |     |
| <p>如陰燥欲坐井中者其二腎脈必按之虛或沉細而遲此易為辨耳知有客邪之病亦從權加藥去之</p>                                                                 |    |    |     |     |
| <p>當歸潤燥湯</p>                                                                                                   |    |    |     |     |
| 升麻                                                                                                             | 錢貳 | 當歸 | 熟地黄 | 各壹錢 |
| 生地黄                                                                                                            | 錢貳 | 甘草 | 大黃  |     |
| 桃仁                                                                                                             | 壹  | 麻仁 | 紅花  | 少許  |
| <p>右件除桃仁麻仁另研如泥外剉如麻豆大作壹服水二大盞入桃仁麻仁煎至壹盞去滓空心宿食消</p>                                                                |    |    |     |     |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十五



迪志文化出版有限公司出版

|                       |                    |                       |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 盡熱服之                  |                    |                       |
| 導滯通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞 |                    |                       |
| 不便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之      |                    |                       |
| 當歸                    | 升麻                 | 桃仁泥                   |
|                       |                    | <small>各壹錢</small>    |
| 生地黄                   | 熟地黄                | 紅花                    |
|                       | <small>各伍分</small> |                       |
| 炙甘草                   | <small>各壹分</small> |                       |
| 右件作壹服水貳盞煎至壹盞去滓調檳榔細末半  |                    |                       |
| 錢稍熱服                  |                    |                       |
| 四物湯治臟結秘澁              |                    |                       |
| 當歸                    |                    |                       |
| 熟地黄                   |                    |                       |
| 川芎                    |                    |                       |
| 白芍藥                   | 大黃                 | 桃仁                    |
|                       | <small>煨</small>   | <small>去皮尖各壹錢</small> |
| 右咬咀作壹服水貳盞煎捌分去滓服或為丸亦得  |                    |                       |
| 橘杏麻仁圓治噎膈大便燥結          |                    |                       |
| <small>方見噎門</small>   |                    |                       |
| 六味地黄丸治下焦燥熱小便澁而數       |                    |                       |
| <small>方見損門</small>   |                    |                       |
| 大補丸治陰虛燥熱              |                    |                       |
| <small>方見火門</small>   |                    |                       |
| 仁齋直指卷十五               |                    |                       |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十五



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指卷十六

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

五疸

五疸論

濕與熱鬱蒸於脾面目肢體為之發黃此即疸也疸之名有五發熱不渴身腫而汗汗如黃蘗汁者曰黃汗此胃中蓄熱汗出浴水得之已食如飢但欲安卧小便如

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十六

黃蘗汁者曰黃疸此酒麪炙烤蘊熱瘀滯得之食則腹滿怫鬱眩暈心忪而不自安者曰穀疸此失飢大嚼遽飽衝脾得之其或飲酒常多進食常少醞熱入水大醉當風以致中心懊疼足脛腫滿是之謂酒疸大勞淫慾大熱交接衽席未幾遽就浴室以致發熱惡寒小腹滿急是之謂色疸五者雖不同其為黃則一自本自根未有非熱非濕而能致病者也濕也熱也又豈無輕重之別乎濕氣勝則如薰黃而晦熱氣勝則如橘黃而明蓋



迪志文化出版有限公司出版

脾主肌肉土色尚黃濕熱內蒸或重或輕不容揜於外矣自其濕熱瘀而傷血此又為血證發黃何以明之疸證之黃小便不利血證之黃則小便自利耳况夫脾受濕熱鬱而不行亦有腹脹之候治法綱領大要疏導濕熱於大小便之中人徒見茵陳湯五苓散黃連圓三黃圓輩隨試輒效則目之以尋常不思單陽無陰病勢已極疸而不渴猶可用工疸而復渴其或腹膨全濟者鮮甚則寸口無脈鼻出冷氣與夫形如烟熏搖頭直視為心絕環口鰲黑油汗發黃

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十六

為脾絕此皆倉扁所望而驚者也孰謂黑疸之能有瘳乎

脾與腎俱病為黑疸色疸一名女勞身黃額黑疸

脈緩大順弦急而堅逆已食如飢胃熱消穀

五疸證治

薑蜜湯諸疸通用或小便出血或小便如血用之皆效蜜半盞薑錢拾片新汲水一碗煎服逐日常進兩服小便漸白而疸遂瘥桂枝黃耆湯治黃汗自出發熱身腫小便不利



迪志文化出版有限公司出版

|                            |       |        |     |      |      |
|----------------------------|-------|--------|-----|------|------|
| 白芍藥                        | 壹兩半   | 辣桂     | 甘草  | 炙各壹兩 |      |
| 黃耆                         | 炙貳兩   | 黃芩     | 半兩  |      |      |
| 右剉散每服肆錢水盞半薑伍片棗叁枚煎服覆取微汗未汗再服 |       |        |     |      |      |
| 必效散黃疸通用                    |       |        |     |      |      |
| 葶藶子                        | 隔紙炒   | 龍膽草    | 山梔仁 |      |      |
| 山茵陳                        | 黃芩    | 等分     |     |      |      |
| 右麤末每服叁錢新水煎服                |       |        |     |      |      |
| 一清飲疸證發熱諸熱通用                |       |        |     |      |      |
| 柴胡                         | 叁兩    | 赤茯苓    | 貳兩  | 桑白皮  | 製    |
| 川芎                         | 壹兩    | 甘草     | 炙半兩 |      |      |
| 右剉每服叁錢薑棗煎服                 |       |        |     |      |      |
| 茵陳湯治濕熱癢而發黃小便秘澀頭汗而渴         |       |        |     |      | 方見濕門 |
| 五苓散疸證通用                    | 方見飲水門 | 吞酒蒸黃連圓 | 方在後 | 治濕熱  |      |
| 發疸或煎茵陳湯調下亦得                |       |        |     |      |      |
| 山茵陳散治黃疸大小便秘澀               |       |        |     |      |      |

|                             |        |               |      |     |       |
|-----------------------------|--------|---------------|------|-----|-------|
| 梔子                          | 壹兩     | 茵陳            | 壹兩   | 枳實  | 製叁枚   |
| 赤伏苓                         |        | 葶藶            |      | 甘草  | 炙壹分各  |
| 右剉每服叁錢薑叁片煎服                 |        |               |      |     |       |
| 甘露飲                         | 見積熱門   | 加山梔柴胡同煎吞黃連阿膠圓 |      |     | 方見嗽門治 |
| 鬱熱發疸小便秘澀                    |        |               |      |     |       |
| 柴胡甘草湯治熱疸                    |        |               |      |     |       |
| 柴胡                          | 壹兩     | 甘草            | 壹分   | 白茅根 | 壹握    |
| 右件以水貳碗煎柒分時時服壹日盡             |        |               |      |     |       |
| 生髮方治疸                       |        |               |      |     |       |
| 生髮燒灰存性為末新汲水調方寸匕日叁服          |        |               |      |     |       |
| 紅圓子治穀疸腹滿眩運怫鬱怔忡酒疸通用○二陳湯加縮砂煎下 |        |               |      |     | 並見瘡類  |
| 辰砂妙香散治飲酒行事酒熱癉於心經致成黃疸        |        |               |      |     |       |
| 伏苓                          | 去木     | 伏神            | 炒    | 山藥  | 炒     |
| 遠志                          | 水浸去心酒炒 | 黃耆            | 炙壹兩各 | 人參  |       |
| 甘草                          | 炙      | 北梗            | 各半兩  | 木香  |       |





|                                               |  |                        |          |                                                  |                  |                               |  |                             |                                              |                                              |                                             |                                                    |          |                                  |
|-----------------------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 辰砂 <small>別研各叁錢</small> 麝香 <small>壹錢重</small> |  | 右細末每服貳錢加辰砂少許用茵陳煎湯調下日叁服 | 酒蒸黃連圓治酒疸 | 黃連去鬚淨肆兩略碎以酒洒醃壹宿日乾為末粟米糊為圓桐子大每服叁肆拾圓以二陳湯加乾葛茵陳入薑棗煎送下 | 當歸白朮湯治酒疸發黃心下飲結妨滿 | 欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷十六</small> |  | 伏苓 <small>壹兩半</small> 當歸 黃芩 | 茵陳 <small>兩各半</small> 白朮 枳殼 <small>製</small> | 甘草 <small>炙</small> 杏仁 <small>去皮炒</small> 前胡 | 乾葛 <small>兩各壹</small> 半夏 <small>製叁分</small> | 右剉散每服叁錢水盞半薑柒片食前煎服凡酒疸熱疸大便秘者可三黃湯 <small>見積熱門</small> | 六物湯治酒疸肚脹 | 華撥 荊芥穗 不蛀川練子 <small>連皮核用</small> |
|-----------------------------------------------|--|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------|

|            |  |                                                                                 |                 |          |                                                      |                               |  |                                                 |                      |                           |                            |                                                                 |                                                |                         |                 |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 生薑母 軟烏梅 甘草 |  | 右件等分於石臼中搗細用磁器盛以自己滿腹小便去其首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星壹宿拂明飲其清汁續用車前子山茵陳竹園荳煎湯乘熱調五苓散服自覺黃水從小便出而肚不脹妙 | 土瓜方治酒疸熱疸土瓜搗取汁恁服 | 小兔絲子圓治色疸 | 兔絲子 <small>伍兩洗酒浸叁宿研捏餅焙</small> 石蓮肉 <small>貳兩</small> | 欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷十六</small> |  | 白伏苓 <small>壹兩</small> 山藥 <small>壹兩留壹半打糊</small> | 右為末山藥糊圓桐子大每伍拾圓用芎藭湯多加 | 伏苓煎湯下 <small>方見血類</small> | 四君子湯 <small>加劑</small> 治色疸 | 人參 <small>壹兩</small> 白伏苓 <small>壹兩</small> 白朮 <small>壹兩</small> | 甘草 <small>炙半兩</small> 加黃耆 <small>炙</small> 白芍藥 | 白扁豆 <small>製各壹兩</small> | 右剉細每服叁錢薑伍片棗貳枚煎服 |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|



解熱方

生車前草最治黃疸解諸熱淋研細井水調下

又方

車前子炒末之米飲調立止洞泄

附諸賢論

此事難知云色如重火黃乃濕病也一身盡痛色如橘  
子黃乃黃病也一身不痛乾黃燥也小便自利四肢不  
沉重渴而引飲者梔子蘗皮湯濕黃脾也小便不利四

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十六

肢沉重似渴不欲飲者大茵陳湯若大便自利而黃者  
茵陳梔子黃連三物湯往來寒熱一身盡黃者小柴胡  
加山梔子湯略例云內感傷寒勞役形體飲食失節中  
州變寒之病生黃非傷壞之而得只用建中理中大建  
中足矣不必用茵陳也

附諸方

茵陳大黃湯治傷寒大熱發黃面目悉黃小便赤

茵陳蒿

梔子

柴胡



迪志文化出版有限公司出版

栝皮

黃芩

升麻

大黃

炒各  
壹兩

龍膽草

半兩

右為粗末每服伍錢水煎服

茵陳五苓散

局方

治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴

見方

濕門

加減五苓散

濟生方

治飲食伏暑鬱發為疸煩渴引飲小

便不利

茵陳

赤伏苓

去皮

猪苓

去皮

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十六

白朮

澤瀉

各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞薑伍片煎捌分溫服不拘

時

葛根湯

濟生方

治酒疸

枳實

去白

梔子仁

豆豉

各壹兩

甘草

炙半兩

葛根

貳兩

右咬咀每服肆錢水壹盞煎捌分溫服不拘時

伏苓滲濕湯治黃疸寒熱嘔逆渴飲冷水身體面目俱



迪志文化出版有限公司出版

|                    |     |                       |     |                |     |
|--------------------|-----|-----------------------|-----|----------------|-----|
| 黃小便不利              |     | 茵陳                    |     | 猪苓             |     |
| 白茯苓                | 分伍  | 黃連                    | 分陸  | 黃芩             |     |
| 澤瀉                 |     | 黃連                    |     | 白朮             |     |
| 梔子                 |     | 漢防己                   |     | 青皮             |     |
| 蒼朮                 |     | 陳皮                    |     | 枳實             | 各參分 |
| 右咬咀每服水貳鍾煎至壹鍾去滓食前溫服 |     | 小溫中丸治疸又能去食積           |     | 欽定四庫全書         |     |
| 仁齋直指               |     | 卷十六                   |     | 神麴             |     |
| 蒼朮                 |     | 川芎                    |     | 香附             |     |
| 針砂                 | 紅醋炒 | 針砂                    | 紅醋炒 | 針砂             | 各貳兩 |
| 春加芎夏加苦參或黃連冬加吳茱萸或乾薑 |     | 大溫中丸治食積與黃腫又可借為制肝燥脾之用脾 |     | 虛者以參朮芍藥陳皮甘草作湯使 |     |
| 陳皮                 |     | 蒼朮                    |     | 厚朴             |     |
| 三稜                 |     | 蓬朮                    |     | 青皮             | 各伍兩 |
| 香附                 | 壹斤  | 甘草                    |     | 針砂             | 各貳兩 |

|                      |  |                      |  |                      |     |
|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|-----|
| 右為末醋糊丸空心薑鹽湯下午後飯食可酒下忌 |  | 大肉果菜                 |  | 搗藥瓜蒂散                |     |
| 方拔粹                  |  | 治黃疸遍身如金色累效           |  | 瓜蒂                   | 錢貳  |
| 赤小豆                  |  | 母丁香                  |  | 黍米                   | 肆拾粒 |
| 右先將瓜蒂為末次入三味再碾至夜令病人先含 |  | 水壺口次將藥半字搐入鼻內待下或吐去水便睡 |  | 至半夜或次入取下黃水直候利水止即服黃連散 |     |
| 或茵陳五苓散病輕者五日病重者半月見效   |  | 黃連散                  |  | 黃連                   |     |
| 方拔粹                  |  | 治黃疸大小便秘澀臟腑壅熱         |  | 川大黃                  |     |
| 兩貳                   |  | 黃芩                   |  | 炙甘草                  |     |
| 兩壹                   |  | 右為極細末每服貳錢食後溫水調下日參服   |  | 一方治黃腫及積滯浮腫           |     |
| 皂礬                   |  | 膠棗仁                  |  | 平胃散                  |     |
| 半斤醋                  |  | 二斤煮                  |  | 右用棗搗爛入礬丸如梧桐子大以平胃散為衣每 |     |
| 煮乾                   |  | 去皮核                  |  | 兩肆                   |     |



服參伍拾丸臨卧以溫酒送下

針砂圓治黃病助脾去濕

用針砂不拘多少以水搗盡鏽淘洗白色為妙就用  
米醋於鐵銚內浸過壹指深炒乾再炒參伍次候銚  
內通紅方可取出又用陳粳米半升隔夜以水浸次  
日漉起於白內搗為粉就作成塊如鴨蛋大入釜中  
煮如粉劑又以生熟相停再杵調粘為度却入百草  
霜炒過壹兩半針砂貳兩半於粉內仍搗數百下為

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十六

丸如梧桐子大每服伍拾丸用五加皮牛膝根木瓜

浸酒吞下初服若泄瀉其病源去也

腎疸湯

東垣方

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤遺

秘方見  
瘡

門

一方治遍身黃不浮腫手足怠倦

針砂

用水搗  
淨醋煮

陳皮

去白  
炒

蒼朮

米泔水  
淨焙乾

青皮

去白炒  
各肆兩

青礬

炒令赤  
黑陸兩

飛羅麪

炒黃

百草霜

炒

三稜

煨

莪朮

煨各  
貳兩

右為末麪糊丸如梧桐子每服參拾丸米湯溫酒任  
下

綠礬丸治黃胖

針砂

貳兩炒  
醋汁

綠礬

肆兩薑  
汁煮

五倍子

神麪

各半  
斤

右為末大棗半斤取肉為丸此方神効但愈後宜忌  
食蕎麥母猪肉諸毒物若犯之即死余嘗見一人服  
此藥後二年下因食所犯忽無故而就死

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十六

一方治黃胖

用明亮綠礬壹斤鍋內鎔化次下多年黃陳米肆升  
慢火煮炒約壹時許烟盡為度攤於地上出火毒為  
末另用蒼朮壹斤貳兩米泔水浸壹晝夜刮淨剉晒  
乾為末壹斤和前藥以陳米醋為丸如梧桐子大每  
服柒捌拾丸空心臨卧溫酒送下陳米湯亦可忌糯  
米麪生冷

一方



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

用絲瓜全者燒灰為末病因麪傷麪湯下因酒傷酒調下

針灸法至陽一穴

在第七推下灸二七壯治渾身發黃穀疸酒疸黃汗心中痛女勞疸發熱

脾俞二穴

在十一推下胃俞二穴在十二推下膽俞在十推下已上各開寸半

百勞一穴

在第一推骨尖上中脘一穴三里二穴穴法見前

### 諸淋

#### 諸淋方論

諸淋所發皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十六

遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏急膏血

砂石從小便道出焉於是有欲出不出淋瀝不斷之狀

甚者窒塞其間則令人悶絕矣大凡小腸有氣則小便

脹小腸有血則小便澀小腸有熱則小便痛痛者為血

淋不痛者為尿血敗精結者為沙精結散者為膏金石結

者為石揣本揆原各從其類也執劑之法並用流行滯

氣疎利小便清鮮邪熱其於調平心火又三者之綱領

焉心清則小便自利心平則血不妄行最不可姑息用

補氣得補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈盛水竇

不行加之穀道閉遏未見其有能生者也雖然腎氣虛

弱囊中受寒亦有挾冷而小便淋澀者其狀先寒戰而

後溲便蓋冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而成淋正

氣勝則寒戰解而得便溺也況又有胞系轉戾之不通

者乎是不可以無辯胞轉證候臍下急痛小便不通凡

強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿飽食走馬忍尿入

房使水氣上逆氣迫於胞故屈戾而不得舒張也胞落即

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十六

殂

#### 諸淋證治

消石散治諸淋

消石白者為細末每服貳錢○血淋山梔仁煎湯調

下○熱淋小便赤而淋瀝臍下急痛新水調下或黃

芩煎湯下○氣淋小腹脹滿尿後常有餘瀝木通煎

湯下○石淋莖內痛割尿不能出尿中有沙石令人

悶絕此證將消石用抄紙隔炒紙焦為度再研細蜀





葵子參拾粒打開煎湯下

二神散治諸淋急痛

黃色海金沙 柒錢半

滑石 兩半

右為細末每服貳錢半多用燈心木通麥門冬草新水煎入蜜調下

五淋散治諸淋

赤伏苓 赤芍藥

山梔仁

生甘草 各參分

當歸

黃芩 各貳分

欽定四庫全書 仁齋直指卷十六

右為細末每服貳錢半水壹盞煎至捌分空腹服或

以五苓散和之用竹園尿門冬草蔥頭燈心煎湯調

下

車前子散治諸淋小便痛不可忍

車前子 不炒兩半

淡竹葉

荊芥穗

赤伏苓

燈心 各貳錢半

右件分作兩劑多用新汲水煎恁意服荊芥通竅

血餘散治諸血下 見血類 白茅花燈心各壹握新汲水煎

湯調下若血淋婦人髮更好加海金沙佐之切不可用

百草霜蓮蓬止澁之劑

黃芩一物湯治血淋熱痛

黃芩細剉新水煎通口服

八正散治熱淋 方見積熱門

琥珀飲治尿血

琥珀為細末每服貳錢燈心壹握腦荷少許煎湯調

下

欽定四庫全書 仁齋直指卷十六

增味導赤散血淋尿血通用

生乾地黃 洗晒 木通

黃芩

生甘草

車前子 不炒

山梔仁

川芎

赤芍藥 已上各等分

右件為末每服參錢入竹葉拾葉薑參片煎服

車前草方治小腸有熱血淋急痛

生車前草洗淨白內搗細每服准壹盞許井水調濾

清汁食前服若沙石淋則以煨寒水石為末和新水



|           |    |     |     |     |     |    |     |    |    |     |   |    |    |    |     |         |                             |              |                                               |        |     |                   |                   |      |    |     |    |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|---|----|----|----|-----|---------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------|-------------------|------|----|-----|----|
| 瞿麥湯血淋尿血通用 | 調下 | 爛滑石 | 赤芍藥 | 瞿麥穗 | 車前子 | 炒不 | 赤伏苓 | 石韋 | 毛去 | 桑白皮 | 炒 | 阿膠 | 酥炒 | 黃芩 | 白茅根 | 已上並等分晒乾 | 右為細末每服貳錢入生髮燒灰壹錢沸湯調下如無茅根止用茅花 | 海金散治血淋沙淋小便澀痛 | 黃爛浮石於草陰地為末每服貳錢生甘草煎湯調下亦治小腸氣莖縮囊腫用木通燈心赤伏苓麥門冬煎湯調下 | 五苓散治尿血 | 方見水 | 內加辰砂少許用燈心壹握新水煎湯調下 | 伏苓調血湯治酒麪過度房勞後小便下血 | 半赤伏苓 | 壹兩 | 赤芍藥 | 川芎 |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|---|----|----|----|-----|---------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------|-------------------|------|----|-----|----|

|     |     |    |    |    |    |    |     |   |     |    |    |       |                   |          |      |       |                |       |                       |      |    |    |       |     |    |     |     |     |    |     |    |         |                            |                           |     |    |     |    |     |         |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|---|-----|----|----|-------|-------------------|----------|------|-------|----------------|-------|-----------------------|------|----|----|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|---------|----------------------------|---------------------------|-----|----|-----|----|-----|---------|
| 半夏麴 | 各半兩 | 前胡 | 柴胡 | 青皮 | 枳殼 | 北梗 | 桑白皮 | 炒 | 白茅根 | 燈心 | 甘草 | 炙各貳錢半 | 右剉細每服叁錢薑伍片蜜貳匙新水煎服 | 薑蜜湯治小便出血 | 方見痘門 | 加白茅根煎 | 甘豆湯治血淋諸淋小便痛不可忍 | 方具積熱門 | 導赤圓治心腎氣鬱膀胱有熱小便淋痛及諸熱壅滯 | 生乾地黃 | 洗焙 | 木通 | 去節各貳兩 | 山梔仁 | 兩叁 | 赤伏苓 | 壹兩半 | 赤芍藥 | 滑石 | 各壹兩 | 大黃 | 濕紙裹煨叁兩半 | 右為末煉蜜圓桐子大每服貳拾圓食後煎導赤散送下熟水亦得 | 秋石圓治濁氣干清精散而成膏淋黃赤白黯如肥膏油蜜之狀 | 白伏苓 | 壹兩 | 桑螵蛸 | 蜜炙 | 鹿角膠 | 搗碎炒黃焦末之 |
|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|---|-----|----|----|-------|-------------------|----------|------|-------|----------------|-------|-----------------------|------|----|----|-------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|---------|----------------------------|---------------------------|-----|----|-----|----|-----|---------|



|                               |  |                      |  |           |  |                                           |  |                                         |  |                               |  |           |  |                              |  |               |  |                                                  |  |                                              |  |                    |  |                        |  |                          |  |               |  |
|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------|--|------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--|
| 秋石<br><small>各半<br/>兩</small> |  | 右末研和糕糊圓桐子大每服伍拾圓人參煎湯下 |  | 滑石散治沙石淋痛割 |  | 爛滑石<br><br>爛石膏<br><small>各半<br/>兩</small> |  | 瞿麥穗<br><br>木通<br><small>去<br/>節</small> |  | 右細末每服貳錢半用葱頭貳片燈心壹握新水壹大盞蜜貳匙煎湯調下 |  | 鵬砂散治沙石淋急痛 |  | 鵬砂<br><small>細<br/>研</small> |  | 琥珀<br><br>赤伏苓 |  | 蜀葵子<br><br>陳橘皮<br><small>不去<br/>白<br/>等分</small> |  | 右末每服貳錢半用葱頭貳片去心麥門冬貳拾壹粒蜜貳匙新水煎取清汁調下或菴豆水浸和皮研清汁調下 |  | 木香湯治冷氣凝滯小便淋澀作痛身體冷清 |  | 木香<br><br>木通<br><br>檳榔 |  | 舶上茴香<br><small>焙</small> |  | 當歸<br><br>赤芍藥 |  |
|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------|--|------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--|

|                              |  |    |  |    |  |    |  |                        |  |              |  |      |  |                                 |  |                                |  |                       |  |                                |  |        |  |                                         |  |    |  |                        |  |                               |  |                               |  |                    |  |                         |  |                         |  |                                |  |                         |  |                          |  |                          |  |
|------------------------------|--|----|--|----|--|----|--|------------------------|--|--------------|--|------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|--------|--|-----------------------------------------|--|----|--|------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| 青皮<br><small>去<br/>白</small> |  | 澤瀉 |  | 辣桂 |  | 橘紅 |  | 甘草<br><small>炙</small> |  | 右剉散每服參錢薑五片煎服 |  | 沙石淋方 |  | 黑豆<br><small>壹百貳<br/>拾粒</small> |  | 粉草<br><small>壹寸<br/>生剉</small> |  | 右以新水煎乘熱入滑石末壹錢調和空腹服附諸方 |  | 琥珀散<br><small>宣明<br/>方</small> |  | 治五淋沙石淋 |  | 滑石<br><br>琥珀<br><small>各壹<br/>兩</small> |  | 木通 |  | 當歸<br><br>木香<br><br>鬱金 |  | 篇竹<br><small>各半<br/>兩</small> |  | 右為末每服伍錢以蘆葦葉煎湯空心調服如無蘆葦葉以竹葉煎湯送下 |  | 參苓琥珀湯治淋莖中痛不可忍相引脇下痛 |  | 人參<br><small>伍分</small> |  | 伏苓<br><small>肆分</small> |  | 川練子<br><small>炒壹<br/>錢</small> |  | 琥珀<br><small>叁分</small> |  | 生甘草<br><small>壹錢</small> |  | 玄胡索<br><small>柒分</small> |  |
|------------------------------|--|----|--|----|--|----|--|------------------------|--|--------------|--|------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|--------|--|-----------------------------------------|--|----|--|------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|





欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷十七

欽

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張炳

欽定四庫全書

仁齋直指卷十七

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

消渴

消渴方論

水包天地前輩嘗有是說矣然則中天地而為人水亦可以包潤五臟乎曰天一生水腎實主之膀胱為津液之府所以宣行腎水上潤於肺故識者以肺為津液之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

臟自上而下三焦臟腑皆囿乎天一真水之中素問以水之本在腎末在肺者此也真水不竭安有所謂渴哉人惟淫慾恣情酒麪無節酷嗜炙燂糟藏鹹酸酢醢甘肥腥羶之屬復以丹砂五石濟其私於是炎火上熏臟腑生熱燥氣熾盛津液乾焦渴引水漿而不能自禁矣渴之為病有三曰消渴曰消中曰消腎分上中下三焦而應焉熱氣上騰心虛受之心火散漫不能收斂胃中煩燥舌赤唇紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦





謂之消渴熱蓄於中脾虛受之伏陽蒸胃消穀善飢飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩但欲飲冷小便數而泔病屬中焦謂之消中熱伏於下腎虛受之腿膝枯細骨節酸疼精走髓虛引水自救此渴水飲不多隨即溺下小便多而濁病屬下焦謂之消腎自消腎而析之又

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十七

道興強不交精泄謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎又甚焉若強中則其斃可立待也雖然真水不充日從事於盃勺之水其間小便或油膩或赤黃或泔白或渴

而且利或渴而不利或不渴而利但所食之物皆從小便出焉甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹為腫滿猛火自炎留於肌肉則發為癰疽此又病之深而證之變者也總前數者其何以為執劑乎吁此虛陽炎上之熱也叔和有言虛熱不可大攻熱去則寒起請援此以為治法又曰消渴證候人皆知其心火上炎腎水下泄小便愈多津液愈涸飲食滋味皆從小便消焉是水火不交濟



迪志文化出版有限公司出版

然爾孰知脾土不能制腎水而心腎二者皆取氣於胃乎治法總要當服真料參苓白朮散可以養脾自生津液兼用好粳米煮粥以腎肉碎細入塩醋油酒葱椒茴香調和少頃粥熟而後入以此養腎則水有所司又用淨黃連溫剉入雄猪肚中密扎於斗米上蒸爛添些蒸飯白中杵粘圓如桐子每服百粒食後米飲下可以清心止渴

### 消渴證治

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十七

茯苓丹三消渴通用亦治白濁

兔絲子

酒浸叁宿水淘砂盆研細捏餅焙乾壹拾兩

北五味子

柒兩

白伏苓

伍兩

石蓮肉

叁兩

右末山藥陸兩末為糊攪和搗叁百杵圓桐子大每

伍拾圓食前米湯下神妙

降心湯治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

人參

遠志薑淹取肉焙

當歸

川芎

熟地黄

白伏苓



迪志文化出版有限公司出版

|                            |                       |                           |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 黃耆 <small>蜜炙</small>       | 北五味子                  | 甘草 <small>微炙各半</small>    |
| 天花粉 <small>兩壹</small>      |                       |                           |
| 右剉細每參錢棗煎食前服                |                       |                           |
| 生地黄膏渴證通用                   |                       |                           |
| 生地黄 <small>東如常梔大貳把</small> | 冬蜜 <small>梔壹</small>  |                           |
| 人參 <small>兩半</small>       | 白茯苓 <small>兩壹</small> |                           |
| 右將地黃洗切研細以新水壹梔調開同蜜煎至半       |                       |                           |
| 次入參苓末拌和磁器密收匙挑服             |                       |                           |
| 黃耆湯治諸渴疾                    |                       |                           |
| 黃耆                         | 伏神                    | 瓜蒌根                       |
| 麥門冬 <small>去心各壹兩</small>   | 北五味子                  | 甘草 <small>炙各半兩</small>    |
| 生乾地黄 <small>壹兩半</small>    |                       |                           |
| 右剉細每肆錢新水煎服                 |                       |                           |
| 猪肚圓治諸渴疾                    |                       |                           |
| 川黃連 <small>兩伍</small>      | 淨白乾葛                  | 知母                        |
| 伏神                         | 麥門冬 <small>去心</small> | 大熟地黄 <small>洗焙各貳兩</small> |



迪志文化出版有限公司出版

|                                               |                        |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 瓜蒌根                                           | 粟米 <small>各叁兩</small>  | 人參 <small>兩壹</small>      |
| 右木白中同搗為散入淨猪肚內縫密置甑內蒸極爛乘熱再杵細若硬加少蜜丸桐子大蒸汁下伍拾丸或粥飲下 |                        |                           |
| 又方一味黃連末入猪肚內縫密滿甑粳米上蒸熟日過杵丸如前法                   |                        |                           |
| 川黃連丸治諸渴                                       |                        |                           |
| 川黃連 <small>淨伍兩</small>                        | 白天花粉                   | 麥門冬 <small>去心各貳錢半</small> |
| 右末以生地黄汁并牛乳汁夾和搗圓桐子大每參拾丸粳米飲下                    |                        |                           |
| 玉泉圓治煩渴口乾                                      |                        |                           |
| 麥門冬 <small>去心晒</small>                        | 人參                     | 伏苓                        |
| 黃耆 <small>半生半蜜炙</small>                       | 烏梅肉 <small>焙</small>   | 甘草 <small>各壹兩</small>     |
| 瓜蒌根                                           | 乾葛 <small>各壹兩半</small> |                           |
| 右末煉蜜丸彈子大每壹丸溫湯嚼下                               |                        |                           |
| 止渴剉散                                          |                        |                           |



迪志文化出版有限公司出版

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 枇杷葉<br><small>新布拭去毛炙</small>     | 白乾葛<br><small>生薑切片焙各壹兩</small> |
| 大烏梅<br><small>染筒</small>         | 大草果<br><small>貳筒去皮</small>     |
| 甘草<br><small>生各半兩</small>        | 淡竹葉                            |
| 右剉每肆錢新水煎服                        |                                |
| 衛生天花圓治渴通用                        |                                |
| 黃連<br><small>淨叁兩童尿浸叁宿焙</small>   | 白扁豆<br><small>薑製去皮炒貳兩</small>  |
| 辰砂                               | 白伏苓                            |
| 知母                               | 苦參                             |
|                                  | 天花粉                            |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷十七</small> |                                |
| 鐵粉<br><small>各半兩</small>         | 蘆會<br><small>壹分</small>        |
| 右末取瓜萋根生汁和生蜜圓桐子大每叁拾丸麥門冬湯下         | 金銀箔<br><small>各貳拾片</small>     |
| 桑椹方治渴疾桑椹熟時盡意食之為妙                 |                                |
| 又方生牛乳細呷○又方生蘿蔔搗取汁時飲少許             |                                |
| 蠟苓圓補虛治濁止渴                        |                                |
| 黃蠟                               | 雪白伏苓<br><small>各肆兩</small>     |
| 右伏苓為末鎔蠟和圓彈子大每壹丸不飢飽細嚼             |                                |

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| 下                                          |                            |
| 繭絲湯治渴神效煮繭搔絲湯任意飲之頓效如非時以絲或綿煎湯服               |                            |
| 辰砂妙香散治渴證小便澁數而瀝兼有油濁<br><small>方見用痘門</small> |                            |
| 燈草伏苓煎湯下                                    |                            |
| 天花粉圓治消渴飲水多身體瘦                              |                            |
| 天花粉                                        | 黃連<br><small>去鬚各壹兩</small> |
| 當歸<br><small>各半兩</small>                   | 伏苓                         |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷十七</small>           |                            |
| 右末煉蜜圓桐子大每叁拾丸茅根煎湯下                          |                            |
| 瓜蓮丸治消渴骨蒸                                   |                            |
| 黃連<br><small>淨剉用冬瓜汁浸壹宿曬乾凡柒次</small>        |                            |
| 右末冬瓜汁丸桐子大每三四十丸半飢飽熟水下或伍拾丸米飲下                |                            |
| 玉壺丸治消渴引飲無度                                 |                            |
| 人參                                         | 瓜萋根<br><small>等分</small>   |
| 右末煉蜜丸桐子大每叁拾丸麥門冬煎湯下                         |                            |



|                                                                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 天花散治消渴                                                                                                     |                                              |
| 天花粉                                                                                                        | 生乾地黄 <small>洗各壹兩</small> 乾葛                  |
| 麥門冬 <small>去心</small>                                                                                      | 北五味子 <small>各半兩</small> 甘草 <small>壹分</small> |
| 右麤末每服參錢粳米伯粒同煎服                                                                                             |                                              |
| 錢氏白朮散治消中消穀善飢                                                                                               |                                              |
| 人參                                                                                                         | 白朮                                           |
| 甘草 <small>炙</small>                                                                                        | 霍香葉 <small>壹兩</small> 白乾葛 <small>貳兩</small>  |
| 木香 <small>半兩</small>                                                                                       | 柴胡                                           |
| 加北五味子                                                                                                      |                                              |
| 欽定四庫全書<br><br>仁齋直指<br>卷十七 |                                              |
| 枳殼 <small>製各半兩</small>                                                                                     |                                              |
| 右麤末每參錢新水煎服                                                                                                 |                                              |
| 伏神丸治消中煩渴消穀小便數                                                                                              |                                              |
| 人參                                                                                                         | 生乾地黄                                         |
| 黃連 <small>淨</small>                                                                                        | 麥門冬 <small>去心</small> 枳殼 <small>製</small>    |
| 牡蠣粉 <small>各壹兩</small>                                                                                     | 石蓮肉                                          |
| 黃耆 <small>炙</small>                                                                                        |                                              |
| 知母 <small>各半兩</small>                                                                                      | 瓜蒌根 <small>叁分</small>                        |
| 右末煉蜜同搗參百杵丸桐子大每伍拾丸清粥飲                                                                                       |                                              |

|                         |  |                     |                          |       |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|-------|
| 下                       |  | 小兒絲子丸治消腎以天花粉北五味子煎湯下 |                          | 方見痘門  |
| 枸杞子丸治消腎久渴困乏小便滑數         |  | 枸杞                  | 兔絲子                      | 酒浸研焙  |
| 黃耆                      |  | 炙                   | 牡蠣粉                      |       |
| 熟地黃                     |  | 洗                   | 麥門冬                      | 去心各壹兩 |
| 桑螵蛸                     |  |                     | 瓜蒌根                      | 各叁分   |
| 牡丹皮                     |  | 各半兩                 | 山茱萸                      |       |
| 右末煉蜜和搗參百杵丸桐子大每伍拾丸食前粥飲下  |  |                     |                          |       |
| 八味圓治消腎補虛止渴              |  | 方見癰冷門               | 本方去附子以北五味子代之內澤瀉截塊再蒸熟地黃再蒸 |       |
| 平補圓治消腎不渴肌肉瘦削小便澁數而瀝如欲滲之狀 |  |                     |                          |       |
| 兔絲子                     |  | 酒浸研焙                | 山茱萸                      | 酒浸焙   |
| 當歸                      |  |                     |                          |       |
| 益智仁                     |  | 各半兩                 | 川練肉                      |       |
| 牛膝                      |  |                     |                          |       |



|                                                                                             |                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 葫蘆巴 <small>炒</small>                                                                        | 厚杜仲 <small>薑製炒</small> | 巴戟 <small>去心</small>     |
| 茯苓 <small>酒浸焙各錢半</small>                                                                    | 乳香 <small>貳錢</small>   |                          |
| 右末糯米糊丸桐子大每伍拾丸棗湯或塩湯食前服                                                                       |                        |                          |
| 雙補丸治腎虛水涸燥渴勞倦                                                                                |                        |                          |
| 鹿角膠 <small>貳兩</small>                                                                       | 沉香 <small>半兩</small>   | 澤瀉 <small>截塊再蒸半兩</small> |
| 覆盆子                                                                                         | 白伏苓                    | 人參                       |
| 宣木瓜                                                                                         | 薏苡仁                    | 黃耆 <small>炙</small>      |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十七                                                                             |                        |                          |
| 熟地黄 <small>洗再蒸</small>                                                                      | 茯苓 <small>酒浸焙</small>  | 兔絲子 <small>酒浸蒸碾</small>  |
| 北五味子                                                                                        | 石斛 <small>炒</small>    | 當歸 <small>酒浸焙各壹兩</small> |
| 麝香 <small>壹錢</small>                                                                        |                        |                          |
| 右末煉蜜丸桐子大朱砂衣每伍拾丸空心棗湯下                                                                        |                        |                          |
| 煞蟲方治消渴有蟲 <small>出夷堅志</small> 苦練根取新白皮壹握切焙入麝少許水貳椀煎至壹椀空心飲之雖困頓不妨自浸下蟲三四條狀如蛔蟲其色真紅而渴頓止乃知消渴一證有蟲耗其津液 |                        |                          |

|                           |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 附諸方                       |                          |                         |
| 麥門冬飲子治膈消胃脹滿心煩津液乾燥短氣消渴     |                          |                         |
| 人參                        | 伏神                       | 麥門冬                     |
| 知母                        | 五味子                      | 生地黃                     |
| 甘草 <small>炒</small>       | 括蕪根                      | 葛根 <small>各等分</small>   |
| 每服水貳鍾竹葉拾肆片煎去滓溫服           |                          |                         |
| 生津甘露飲子 <small>東垣方</small> | 治膈消大渴飲水無度舌上赤澁            |                         |
| 上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹痛渾身色     |                          |                         |
| 黃白白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛     |                          |                         |
| 善嚏善怒健忘腎腰背寒兩丸冷甚            |                          |                         |
| 石膏 <small>壹錢貳分</small>    | 人參                       | 炙甘草 <small>各貳錢</small>  |
| 生甘草                       | 山梔子                      | 華澄茄                     |
| 白豆蔻                       | 香白芷                      | 連翹 <small>各壹錢</small>   |
| 杏仁 <small>去皮尖</small>     | 黃蘗 <small>酒拌各壹錢半</small> | 白葵                      |
| 麥門冬 <small>各半錢</small>    | 黃連                       | 木香 <small>各叁分</small>   |
| 桔梗 <small>叁錢</small>      | 升麻                       | 知母 <small>酒製各貳錢</small> |





|                                                                                         |         |             |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 欽定四庫全書                                                                                  |         | 仁齋直指        |     | 卷十七 |     |
| 薑黃                                                                                      | 錢壹      | 當歸身         | 錢半  | 全蝎  | 錢貳  |
| 藿香                                                                                      | 分貳      | 柴胡          | 分叁  | 蘭香  | 錢半  |
| 右件為細末如法湯浸蒸餅和勻成劑捻作餅子晒半乾杵碎篩如黃米大食後每服貳錢抄於掌中以舌舐之隨津唾下或送以白湯少許亦可此制之緩也不惟不成中滿亦不傳下消矣戊申正月七日葉律千戶服此大効 |         |             |     |     |     |
| 枇杷葉散治消渴胃滿心煩津液大消                                                                         |         |             |     |     |     |
| 枇杷葉                                                                                     | 去毛水     | 麥門冬         | 去心  | 五味子 | 去梗  |
| 瓜蒌實                                                                                     | 洗貳張     | 生地黃         | 壹錢  | 人參  | 伍分  |
| 茯神                                                                                      | 去木      | 粉葛          | 家種者 | 人參  | 去苗蘆 |
| 甘草                                                                                      | 炙已上     | 知母          | 去毛  | 人參  | 去苗蘆 |
| 右作壹服水貳鍾竹葉拾肆片入烏梅壹箇去內仁煎柒分去滓食遠溫服不拘時                                                        |         |             |     |     |     |
| 人參石膏湯                                                                                   | 即白虎加人參湯 | 治膈消上焦燥渴不欲飲食 |     |     |     |
| 人參                                                                                      | 半兩      | 石膏          | 壹兩  | 甘草  | 肆錢  |

|                       |  |         |  |
|-----------------------|--|---------|--|
| 知母                    |  | 東垣加黃芩杏仁 |  |
| 錢柒                    |  |         |  |
| 右咬咀每服壹兩水貳盞粳米壹撮煎至壹盞去滓  |  | 通口服     |  |
| 硃砂黃連丸                 |  | 秘方秘     |  |
| 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴       |  |         |  |
| 硃砂                    |  | 貳兩      |  |
| 別研                    |  |         |  |
| 黃連                    |  | 叁兩      |  |
| 生地黄                   |  | 貳兩      |  |
| 右為末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸燈心棗子湯  |  | 送下      |  |
| 人參白朮湯                 |  | 宣明方     |  |
| 治胃膈痺熱煩滿飢不欲食瘰癧成為       |  |         |  |
| 消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼 |  |         |  |
| 療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過 |  |         |  |
| 積毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病 |  |         |  |
| 產後煩渴氣液不得宣通            |  |         |  |
| 人參                    |  | 白朮      |  |
| 當歸                    |  |         |  |
| 芍藥                    |  | 大黃      |  |
| 山梔子                   |  |         |  |
| 荊芥穗                   |  | 薄荷      |  |
| 桔梗                    |  |         |  |
| 知母                    |  | 澤瀉      |  |
| 各半兩                   |  |         |  |
| 茯苓                    |  | 去皮      |  |

連翹

瓜蒌根

乾葛  
各壹兩

甘草

兩叁

藿香葉

青木香

官桂

各壹分即貳錢半是也

石膏  
兩肆

寒水石

兩貳

滑石  
斤半

右為細末每服抄伍錢水壹茶盞入盆消半兩生薑  
參片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至拾餘錢  
得臟腑流利取効如常服以意加減兼服消痞丸散  
以散腸胃結治濕熱內甚自利者去了大黃芒硝

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

調胃承氣湯治消中暑熱在胃而能飲食小便黃赤

方見

傷寒  
門

三黃丸

方見火門

加減八味丸治腎水枯竭心火炙炎煩燥渴小便頻數  
白濁陰痿飲食不多肌膚日削本方減附子加五味子

六味地黃丸

方並見虛勞門

針灸法脾俞二穴

在十一寸半

中脘一穴

在臍上四寸

治飲

不止渴三里二穴

在膝下三寸大脛骨外

治食不充飢

太谿二穴

在足內踝後跟骨上動脈陷中

治房勞腎消

脹滿

脹滿方論

陰陽愆伏榮衛凝滯三焦不能宣行脾胃不能傳布此  
脹滿之所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹或冷  
或熱又不可以無別失飢傷飽痞悶停酸旦則陰消陽  
長穀氣易行故能飲食暮則陰長陽消穀氣難化故不  
能食是為穀脹脾土受濕不能制水水漬於腸胃而溢

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

於體膚漉漉有聲怔忡喘息是為水脹七情鬱結氣道  
擁隔上不得降下不得升身腫大而四肢瘦削是為氣  
脹煩燥漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大  
便黑婦人尤多見之是為血脹陽熱為邪則身體有熱  
脹滿而咽乾陰寒為邪則吐不下食脹滿而自利隨證  
劑量是固然爾抑猶有虛實之辨焉實者腹中常脹外  
堅內痛按之不陷法當為之疏利虛者時脹時減虛氣  
留滯按之則濡法當以溫藥和之此又出於隨證劑量



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

之外其若久病羸乏卒然脹滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻頻百藥遍嘗未見一愈者耳

脹滿證治

十膈散治七氣為隔飲食不消穀脹氣脹通用

人參

伏苓

厚朴

製

橘紅

蓬朮

枳殼

製

半夏麴

甘草

炙

生白薑

辣桂

檳榔

木香

分等

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十七

右麓末每參錢薑貳片棗貳枚煎服

大異香散治穀脹氣脹

京三稜

蓬朮

青皮

陳皮

半夏麴

霍香

北梗

益智仁

枳殼

製

香附

炒各半兩

甘草

炙參分

右剉散每參錢薑伍片棗貳枚煎服

五膈寬中散治七氣留滯飲食不下氣滿膨脹

方見諸氣門

華澄茄圓治痞滿脹痛穀脹氣脹通用

華澄茄

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

蘿苳子

木香

各參分

肉豆蔻

茴香

辣桂

丁香

各壹分半

陳皮

參分

右末飛麴煮稀糊圓桐子大每參拾圓陳皮煎湯下

調氣散治氣滯脹滿宿食不消

方見諸氣門

大半夏湯

方見痰涎門

小半夏伏苓湯

方見水飲門

二藥加橘紅

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十七

北梗檳榔甘草

炙

並主水氣脹滿

和劑流氣飲調榮衛利三焦行痞滯消腫

方見諸氣門加減見水飲門

調降湯治氣脹

方見喘門

沉香降氣湯治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸

證

方見諸氣門

人參芎歸湯治血脹

當歸

半夏

製參分

川芎

壹兩

蓬朮

木香

縮砂仁



|                                      |                             |                               |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 烏藥                                   | 甘草<br><small>炙 各半兩</small>  | 人參                            |
| 辣桂                                   | 五靈脂<br><small>炒 各壹分</small> |                               |
| 右剉散每服參錢薑伍片棗貳枚紫蘇肆葉煎食前服                |                             |                               |
| 溫胃湯治冷則氣聚脹滿不下食                        |                             |                               |
| 熟附子                                  | 當歸                          | 厚朴<br><small>製</small>        |
| 人參                                   | 橘紅                          | 半夏麴                           |
| 生白薑                                  | 甘草<br><small>炙 各壹兩</small>  | 川椒<br><small>去 合口者 叁分</small> |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十七                |                             |                               |
| 右剉散每服參錢棗貳枚食前煎服                       |                             |                               |
| 順氣木香散治冷證腫脹泄瀉<br><small>方見諸氣門</small> |                             |                               |
| 枳殼剉散治熱證脹滿                            |                             |                               |
| 厚朴<br><small>製</small>               | 枳殼<br><small>製</small>      | 北梗<br><small>各半兩</small>      |
| 甘草<br><small>炙</small>               | 大黃<br><small>蒸 各壹分</small>  |                               |
| 右剉每參錢薑伍片棗貳枚烏梅壹枚煎服                    |                             |                               |
| 感應圓                                  |                             |                               |
| 丁香                                   | 木香<br><small>各壹兩半</small>   | 乾薑<br><small>壹兩煨</small>      |

|                                                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 深村百草霜<br><small>貳兩淨</small>                                                           | 大杏仁<br><small>壹百肆拾箇去皮尖</small> |
| 肉豆蔻<br><small>貳拾箇</small>                                                             | 肥巴豆<br><small>柒拾粒畧去油</small>   |
| 麻油<br><small>壹兩秋冬添半兩減蠟半兩</small>                                                      |                                |
| 右將丁香木香薑蔻為細末并三味研極得所煉油蠟和劑油單裹漸圓菴豆大每伍柒圓加至拾伍圓熱水下夾蘇合香圓<br><small>方見諸氣門</small>              |                                |
| 只可治痢不可治瀉蓋痢家服之有積則行無積則止若以此亦可治瀉誤人已上數劑前氣類多用之                                              |                                |
| 方却在此                                                                                  |                                |
| 附諸賢論                                                                                  |                                |
| 東垣曰六元政紀論云太陰所至為中滿<br><small>云云</small> 太陰所至為畜滿<br><small>云云</small> 諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之    |                                |
| 太陰同濕土之化脾濕有餘腹滿食不化天為陽為熱主運化也地為陰為濕主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿病調經篇云因飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中皆由脾胃之氣虛弱不能運化精微而 |                                |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十七                                                                 |                                |



制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿填脹支膈脇脇  
下厥上冒過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經所謂胃  
中寒則脹滿者是也鍼經三卷雜病第八腹滿大便秘不利上走胃  
溢喘息喝喝然取足少陰又云脹取三陽三陽者足太  
陽寒水為脹與通評虛實論說腹暴滿按之不下取太  
陽經絡胃之募也正同取者瀉也經云中滿者瀉之於  
內者是也宜以辛熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下  
分消其濕正如開鬼門潔淨府溫衣繆處其處是先瀉  
其血絡後調其真經氣血平陽布神清此治之正也或  
曰諸脹腹大皆屬於熱者何也此乃病機摠辭假令外  
傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變為熱而作胃實腹滿  
仲景以大承氣湯治之亦有膏粱之人濕熱鬱於內而  
成脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之  
者宜詳辨之心法附錄曰心肺陽也居上腎肝陰也居  
下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸  
於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七



迪志文化出版有限公司出版

布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使  
心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是為無病  
今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之  
陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升  
陰自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞鬱而  
為熱熱留為濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以  
其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以療治  
又名曰蠱若虫侵蝕之義理宜補脾又須養肺金以制  
木使脾無邪賊之患滋腎水以制火使肺得清化却厚  
味斷妄想遠音樂無有不安醫又不察虛實急於作効  
病者苦於脹急喜行利藥以求通快不知寬得一日半  
日其腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣古方惟禹餘糧丸又  
名紫金丸制肝補脾殊為切當又曰朝寬暮急血虛暮  
寬朝急氣虛終日急氣血皆虛嚴氏曰脹脉浮者易治  
虛者為難治

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

平肝飲子

濟生方

專治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心



迪志文化出版有限公司出版



|                                          |  |                         |  |                        |  |                              |  |
|------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|--|
| 腹脹滿頭暈嘔逆脉來浮弦                              |  | 防風 <small>去蘆</small>    |  | 桂心 <small>不見火</small>  |  | 枳殼                           |  |
| 赤芍藥                                      |  | 桔梗 <small>去蘆炒</small>   |  | 甘草 <small>炙</small>    |  | 人參                           |  |
| 木香 <small>不見火</small>                    |  | 當歸 <small>去蘆酒浸</small>  |  | 川芎                     |  | 陳皮 <small>半兩</small>         |  |
| 右咬咀每服肆錢水壹盞薑伍片煎服不拘時                       |  | 木香順氣湯治濁氣在上則生膜脹          |  | 木香 <small>壹錢貳分</small> |  | 厚朴 <small>製壹錢陸分</small>      |  |
| 陳皮                                       |  | 益智                      |  | 白茯苓 <small>去皮</small>  |  | 澤瀉                           |  |
| 吳茱萸 <small>各壹錢捌分</small>                 |  | 當歸                      |  | 半夏 <small>洗</small>    |  | 升麻                           |  |
| 柴胡 <small>各肆分</small>                    |  | 蒼朮 <small>米泔浸貳錢</small> |  | 草豆蔻 <small>煨壹錢</small> |  | 右咬咀分二貼每貼水貳盞薑叁片煎捌分食前溫服忌生冷硬物恚怒 |  |
| 廣茂潰堅湯治中滿腹脹内有積聚堅硬如石令人坐卧不能二便澁滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫 |  |                         |  |                        |  |                              |  |

欽定四庫全書

仁齋直指卷十七



迪志文化出版有限公司出版

|                          |  |                          |  |                         |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|
| 厚朴 <small>製</small>      |  | 黃芩                       |  | 草豆蔻 <small>煨麩</small>   |  |
| 益智仁 <small>炒</small>     |  | 當歸 <small>酒洗各貳錢半</small> |  | 黃連 <small>叁分</small>    |  |
| 半夏 <small>湯泡叁分半</small>  |  | 蓬朮 <small>煨</small>      |  | 紅花                      |  |
| 吳茱萸 <small>湯泡去苦水</small> |  | 升麻                       |  | 甘草 <small>炙</small>     |  |
| 柴胡                       |  | 澤瀉                       |  | 神麴 <small>炒</small>     |  |
| 陳皮                       |  | 青皮 <small>各壹錢半</small>   |  | 右咬咀分二貼每貼水貳鍾薑叁片煎捌分食遠服    |  |
| 木香塌氣丸治中滿腹脹               |  | 陳皮                       |  | 羅蔔子 <small>炒各伍錢</small> |  |
| 木香                       |  | 草豆蔻 <small>煨麩</small>    |  | 胡椒                      |  |
| 蝎梢 <small>炒去毒貳錢半</small> |  | 青皮 <small>各叁錢</small>    |  | 右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服伍拾丸食遠米飲下 |  |
| 禹餘糧丸治中滿氣脹喘滿及水氣脹          |  |                          |  |                         |  |
| 蛇含石 <small>叁兩煨</small>   |  | 真針砂 <small>伍兩</small>    |  | 禹餘糧 <small>叁兩同炒</small> |  |
| 右已上三味為主其次量人虛實入下項藥        |  |                          |  |                         |  |

欽定四庫全書

仁齋直指卷十七



迪志文化出版有限公司出版

|                                 |                       |                        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 木香                              | 牛膝                    | 蓬朮 <small>炮</small>    |
| 白茯苓                             | 桂心                    | 川芎                     |
| 白豆蔻                             | 茴香 <small>炒</small>   | 三稜 <small>炮</small>    |
| 羌活                              | 伏苓                    | 乾薑                     |
| 青皮                              | 陳皮                    | 附子 <small>炮</small>    |
| 當歸 <small>各半兩</small>           |                       |                        |
| 右為細末拌勻以湯浸蒸餅去水搗勻丸如桐子大每服伍拾丸空心溫酒送下 |                       |                        |
| 中滿分消丸治中滿鼓氣水氣等証                  |                       |                        |
| 黃芩 <small>炒伍錢</small>           | 薑黃                    | 白朮                     |
| 人參                              | 甘草 <small>炙</small>   | 猪苓 <small>各壹錢</small>  |
| 黃連 <small>剉伍錢炒</small>          | 白茯苓                   | 砂仁                     |
| 乾生薑 <small>各貳錢</small>          | 枳實                    | 半夏 <small>洗各伍錢</small> |
| 厚朴 <small>壹兩製</small>           | 知母 <small>炒肆錢</small> | 澤瀉                     |
| 陳皮 <small>各叁錢</small>           |                       |                        |
| 右為末湯浸蒸餅丸如桐子大每服壹百丸食遠白            |                       |                        |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十七

中滿分消丸治中滿鼓氣水氣等証

黃芩炒伍錢

薑黃

白朮

人參

甘草炙

猪苓各壹錢

黃連剉伍錢炒

白茯苓

砂仁

乾生薑各貳錢

枳實

半夏洗各伍錢

厚朴壹兩製

知母炒肆錢

澤瀉

陳皮各叁錢

右為末湯浸蒸餅丸如桐子大每服壹百丸食遠白

|                               |                        |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 湯下                            |                        |                      |
| 中滿分消湯治中滿寒脹寒疝大小便不通四肢厥冷食入反出心痞奔豚 |                        |                      |
| 益智                            | 半夏 <small>湯洗</small>   | 茯苓                   |
| 木香                            | 升麻 <small>各貳錢</small>  | 川烏 <small>炮</small>  |
| 澤瀉                            | 人參                     | 青皮                   |
| 當歸 <small>浸酒</small>          | 生薑                     | 麻黃                   |
| 柴胡                            | 乾薑 <small>炮</small>    | 萆澄茄                  |
| 黃連 <small>各貳錢</small>         | 黃芪                     | 吳茱萸 <small>洗</small> |
| 草豆蔻 <small>煨</small>          | 厚朴 <small>製各伍錢</small> | 黃栢 <small>貳錢</small> |
| 右咬咀每貼壹兩水貳鍾薑叁片棗壹枚煎捌分食後溫服       |                        |                      |
| 人參定喘湯治蠱脹有喘                    |                        |                      |
| 人參 <small>壹兩</small>          | 杏仁 <small>去皮尖</small>  | 陳皮 <small>伍錢</small> |
| 木香 <small>叁錢</small>          | 甘草 <small>伍錢</small>   |                      |
| 右為末每服叁錢食遠濃煎蘇木湯調服叁服喘即          |                        |                      |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十七

黃連各貳錢

黃芪

吳茱萸洗

草豆蔻煨

厚朴製各伍錢

黃栢貳錢

右咬咀每貼壹兩水貳鍾薑叁片棗壹枚煎捌分食後溫服

後溫服

人參定喘湯治蠱脹有喘

人參壹兩

杏仁去皮尖

陳皮伍錢

木香叁錢

甘草伍錢

右為末每服叁錢食遠濃煎蘇木湯調服叁服喘即



止

秘傳諸蠱保命丹

肉苁蓉

兩 叁

皂礬

斤 壹

紅棗

壹斤 煮  
熟去核

大麥芽

炒壹斤 半

香附

壹斤

苳蓉皂礬二味入  
礱內火煨盡烟

右為末麪糊為丸如梧桐子大每服貳拾丸好酒下

食後服日進叁服量人大小用

四炒枳殼丸

枳殼

去穰咀分四分

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十七

一分同蒼朮壹兩炒

一分同蘿蔔子壹合炒

一分同乾漆壹兩炒

一分同小茴香壹兩炒

右各炒枳殼黃色為度揀出為細末却將蒼朮等四

味用水貳椀煎至半椀去滓攪麪糊和枳殼末為丸

如梧桐子大每服叁拾丸食遠米飲送下

一方治血鼓腹如盆脹

三棱

煨

莪朮

乾漆

炒烟

牛膝

去蘆酒洗

蟲虫

糯米炒

琥珀

肉桂

各等分

礪砂

水蛭

石灰炒赤

右為末用生地黃自然汁和米醋調勻為丸如梧桐

子大每服拾丸空心溫酒送下童便下亦可

敷法治腹緊硬如石或陰囊腫大先用甘草煎湯壹鍾

服之後用此藥敷

大戟

芫花

甘遂

海藻

各等分

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十七

右為末醋糊和藥塗腫脹處

針灸法脾俞二穴

在第十一推下兩傍相  
去各一寸半

肝膈二穴

在九

推下兩傍各一寸半

分水一穴

在臍上一寸治腹脹  
統臍結痛灸百壯

三焦膈

二穴

在十三推下兩傍各寸半治心腹滿腰  
背痛飲食吐逆小便不利羸瘦少氣

虛腫

虛腫方論

賈洛陽以病瘡不治必為痼疾雖有扁鵲亦莫能為則  
知腫之危惡非他病比也夫人所以得全其性命者水



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

與穀而已水則腎主之穀則脾主之惟腎虛不能行

水惟脾虛不能制水胃與脾合氣胃為水穀之海又因虛而不能傳化焉故腎水泛溢反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫矣其狀目胞上下微起肢體重着咳喘怔忡股間清冷小便澁黃皮薄而光手按成窟舉手即滿是也治法大要身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下其間通利小便順氣和脾俱不可緩耳然而證雖可下又

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

當權其重輕不可過用芫花大戟甘遂猛烈之劑一發不收吾恐峻決者易固閉者難水氣復來而無以治之也雖然水之為腫特一耳曰風曰氣曰血合而有四焉風腫者皮竈麻木不仁走注疼痛氣腫者皮厚四肢瘦削腹脇脹膨其或煩燥漱水迷忘驚狂嘔逆煩悶皮間有紅縷赤痕者此血腫也婦人經脉壅閉敗血停腐尤多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安脾飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退

而告殂矣大凡虛腫先起於腹而後散於四肢者可活先起於四肢而後歸於腹者不治至若蠱脹而肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘕而轉作虛浮與夫唇黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足平傷腎背平傷肺皆為不治之証當明辯之○男從脚下腫而上女從身上腫而下或肉硬或手掌平並不治

### 虛腫證治

青龍湯治表有水十棗湯量用治裏有水方詳見水飲門

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

安腎圓多用青木香圓少用貳藥夾和食前溫湯下治

水腫屢效方見水飲門

溫白圓治十種水病積聚脹滿癥癖塊痛久瘕諸風

吳茱萸盪洗次焙 柴胡 北梗

石菖蒲 乾薑 肉桂

黃連去鬚 伏苓 人參

川椒去目隔紙炒出汗 厚朴製 皂角去子炒

紫苑茸 巴豆去皮膜出油各半兩 川烏頭炮去皮臍壹兩半



右細末和勻煉蜜圓桐子大每服參圓食後薑湯下  
 加至伍柒圓止治水腫溫白圓用五苓散加炒牽牛  
 入些薑汁略煎送下 方見水  
飲門

集香湯

沉香

丁香 各貳  
錢

木香

青木香

霍香

川芎

赤伏苓

檳榔

枳殼 製

甘草 炙各  
叁錢

乳香 壹錢  
半

麝香 壹字  
別研

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

右麓末每貳錢半薑叁片紫蘇叁葉空心煎服凡虛

腫先用諸香以透其關絡然後審證療之

蘿蔔子飲治水病浮腫

蘿蔔子

赤伏苓 生各  
半兩

牽牛末 炒

葶藶 炒  
香

甘草 炙各  
肆兩

半夏 製

川芎

檳榔

辣桂

青皮

陳皮

青木香

白色商陸 各叁  
錢



迪志文化出版有限公司出版

右剉每服叁錢薑肆片不飢不飽煎服  
 三和散 方見諸  
氣門 加縮砂赤伏苓煎吞青木香圓治水蠱  
 氣脹腹腫腎腫面浮青木香圓乃水腫要藥但酌量用  
 或五皮散送下或枳殼散下無熱者沉香降氣湯下  
 神助散治水腫

牽牛 炒取  
末

葶藶 炒香各  
貳兩半

木猪苓 水浸軟去  
皮切焙

澤瀉

木香 各壹  
兩

川椒目 壹兩  
半

右末先以葱白叁莖漿水壹盞煎半盞入老酒半盞

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

調藥末叁錢空心服

行水圓治水腫氣腫

葫蘆巴 炒

故紙 炒

縮砂仁

萆澄茄

真川椒 去目紙上  
炒出汗

烏梅肉 焙乾各  
貳錢半

牽牛 炒取末  
各半兩

巴豆肉 畧去油  
壹錢半

右末稀麪糊圓菜豆大每伍圓食後薑湯下

薑蔻散治胃滿腹腫大瀉不止時或乾嘔



迪志文化出版有限公司出版



|                       |                        |                         |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 人參                    | 川厚朴 <small>製</small>   | 草果仁                     |
| 良薑                    | 苛子 <small>炒</small>    | 川白薑 <small>生</small>    |
| 霍香                    | 丁皮                     | 蒼朮 <small>炒</small>     |
| 真橘紅                   | 甘草 <small>炒各壹分</small> | 木香                      |
| 肉豆蔻 <small>炮</small>  | 縮砂仁                    | 伏苓 <small>各壹分半</small>  |
| 右剉散每服參錢水煎食前服仍以木香縮砂煎湯  |                        |                         |
| 濃調正料參苓白朮散佐之           |                        |                         |
| 桑皮飲治肺間積水頭面浮腫          |                        |                         |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十七       |                        |                         |
| 桑白皮                   | 青皮                     | 陳皮                      |
| 檳榔 <small>製</small>   | 枳殼                     | 赤伏苓                     |
| 青木香                   | 當歸                     | 川芎                      |
| 石韋 <small>炙去毛</small> | 羌活 <small>各壹分</small>  | 牽牛 <small>炒末</small>    |
| 半夏 <small>製</small>   | 葶藶 <small>炒香</small>   | 甘草 <small>炙各壹分半</small> |
| 右剉每參錢薑肆片煎服            |                        |                         |
| 防風散治風腫皮粗麻木不仁或時疼痛      |                        |                         |
| 麻黃 <small>去節</small>  | 牽牛 <small>炒取末</small>  | 甘草 <small>炙各壹分半</small> |



|                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 杏仁                                                                                  | 防風   | 半夏   |
| 皮去                                                                                  |      | 製    |
| 芍藥                                                                                  | 辣桂   | 白芷   |
| 防己                                                                                  | 當歸   | 川芎   |
| 羌活                                                                                  | 獨活   | 檳榔   |
|                                                                                     |      | 分各壹  |
| 右剉每參錢薑肆片紫蘇參葉煎服                                                                      |      |      |
| 消蠱湯治氣作蠱脹但腹滿而四肢頭面不腫                                                                  |      |      |
| 紫蘇莖葉                                                                                | 縮砂   | 肉豆蔻  |
|                                                                                     |      | 生    |
| 枳殼                                                                                  | 青皮   | 陳皮   |
|                                                                                     |      |      |
| 欽定四庫全書                                                                              |      |      |
|  |      |      |
| 仁齋直指                                                                                |      |      |
| 卷十七                                                                                 |      |      |
| 三稜                                                                                  | 蓬朮   | 檳榔   |
| 辣桂                                                                                  | 白豆蔻仁 | 華澄茄  |
| 木香                                                                                  | 半夏   | 蘿蔔子  |
|                                                                                     |      | 生    |
| 甘草                                                                                  |      |      |
| 分炙各壹半                                                                               |      |      |
| 右剉每參錢薑棗煎服                                                                           |      |      |
| 加味枳朮湯治氣為痰飲所隔心下堅脹名曰氣分                                                                |      |      |
| 枳殼                                                                                  | 白朮   | 紫蘇莖葉 |
| 製                                                                                   |      |      |
| 辣桂                                                                                  | 陳皮   | 檳榔   |



|                          |     |     |            |
|--------------------------|-----|-----|------------|
| 北梗                       | 木香  | 五靈脂 | 炒各分壹       |
| 半夏                       | 製   | 伏苓  | 甘草         |
|                          |     |     | 炙各壹分半      |
| 右剉每服參錢薑肆片煎服              |     |     |            |
| 調榮飲治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分 |     |     |            |
| 華陰細辛                     | 莪朮  | 辣桂  |            |
| 赤芍藥                      | 延胡索 | 當歸  |            |
| 川芎                       | 白芷  | 檳榔  |            |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十七          |     |     |            |
| 大腹皮                      | 桑白皮 | 瞿麥穗 | 炒          |
| 赤伏苓                      | 陳皮  | 葶藶  | 炒香         |
| 大黃                       | 甘草  |     | 濕紙煨各壹分炙壹分半 |
| 右剉每服參錢薑棗煎食前服             |     |     |            |
| 續斷飲治血分如前                 |     |     |            |
| 延胡索                      | 當歸  | 川芎  |            |
| 牛膝                       | 川續斷 | 赤芍藥 |            |
| 辣桂                       | 白芷  | 五靈脂 | 炒          |

|                                                                                |     |     |       |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|----|
| 羌活                                                                             | 各壹分 | 赤茯苓 | 牽牛    | 炒取末 |    |
| 半夏                                                                             | 製   | 甘草  | 炙各壹分半 |     |    |
| 右剉散每服參錢薑肆片食前煎服                                                                 |     |     |       |     |    |
| 土狗方治遍身腫外腎腫生土狗壹箇手足全者研細入縮砂末等分老酒調下                                                |     |     |       |     |    |
| 虛腫方以大香附杵淨以童尿浸壹日夜取出別換童尿又浸壹日夜再取出又換童尿浸壹日夜次以生布錢袋牽擦去皮於白中搗細用米醋煮飛白麪糊圓桐子大每服柒拾圓煎和劑流氣飲送下 |     |     |       |     |    |
| 方見脹門                                                                           |     |     |       |     |    |
| 又方                                                                             |     |     |       |     |    |
| 生綠豆                                                                            | 壹合  | 橘皮  | 貳錢    | 良薑  | 壹錢 |
|                                                                                | 碾末  |     |       |     | 剉  |
| 右橘皮貳錢良薑壹錢細剉煎湯候冷調綠豆末得所然後略煖連參日空心服                                                |     |     |       |     |    |
| 青皮                                                                             | 木香  | 黃連  |       |     |    |
| 橘紅                                                                             | 各壹分 | 胡椒  | 壹錢半   |     |    |
| 右為末入巴豆肉不用去油壹錢麪糊圓胡椒大每                                                           |     |     |       |     |    |



參肆圓薑湯下大便利腫自消未利再服停積痢滯  
通用

又方二十四味大流氣飲壹貼加枳殼壹錢用紫蘇連  
莖參條截碎燈心壹握生薑柒片大棗貳枚新水壹大  
椀同煎取清汁調蘇合香圓參圓吞溫白圓伍圓效溫

白圓 方見浮腫門

治外腎腫大莖物水泡通明方二十四味流氣飲加白

芷木通紫蘇煎吞青木香圓百粒效

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十七

附諸方

治十種水氣病根源証方法

先從面腫者曰熱水其根在肺 桑白皮為主

先從四肢腫者曰黃水其根在脾 大戟為主

先從背腫者曰鬼水其根在膽 雄黃為主

先從胷腫者曰食水其根在皮膚 茯苓為主

先從脇腫者曰飲水其根在肚 芫花為主

先從腰腫者曰肝水其根在胃 甘遂為主

調補藥方

先從腹腫者曰冷水其根在肺 商陸為主  
先從陰腫者曰勞水其根在腎 澤瀉為主  
先從手腫者曰心水其根在腹 巴戟為主  
先從腳腫者曰清水其根在心 葶藶為主  
右十味為末所主藥加倍餘藥各等分每服壹錢空  
心井水調服以利為度忌塩百日外忌魚蝦麪食一  
切毒物房事病痊後更服調補藥

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十七

肉桂 乾薑 炮 肉豆蔻

青皮 白朮 川芎

檳榔 桔梗 各等分

右為細末每服參錢食遠白湯調服

神效丸治十種水氣

大戟 微炒 澤瀉 葶藶 炒

連翹 桑白皮 木香 炒

甘遂 炒 赤小豆 炒 芫花 醋炒



|        |             |                         |                      |                     |              |
|--------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 欽定四庫全書 |             | 仁齋直指                    |                      | 卷十七                 |              |
| 巴戟     | 去心已上<br>各等分 | 右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服參拾丸桑白皮湯送下 | 道滯通經湯治脾濕有餘氣不宣通面目四肢浮腫 | 桑白皮                 | 白朮           |
| 茯苓     | 澤瀉          | 陳皮                      | 各等分                  | 右呖咀每服柒錢水貳盞煎捌分去滓食遠溫服 | 香蘇飲治上氣喘嗽面目浮腫 |
| 紫苑     | 紫蘇子         | 炒各壹錢貳分                  | 大腹皮                  | 烏梅肉                 | 杏仁           |
| 去尖     | 去皮          | 五味子                     | 桑白皮                  | 炙                   | 陳皮           |
| 桔梗     | 麻黃          | 節去                      | 阿膠                   | 炒                   | 甘草           |
| 炙      | 炙各壹錢        | 右呖咀分貳貼每貼水貳盞薑叁片煎捌分食遠溫服   | 亭蘚丸治肺氣咳喘面目浮腫喘促不安小便赤澁 | 防己                  | 木通           |
| 甜亭蘚    | 紙炒各壹兩       |                         |                      |                     |              |



|        |            |      |      |                                                   |                       |
|--------|------------|------|------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 欽定四庫全書 |            | 仁齋直指 |      | 卷十七                                               |                       |
| 杏仁     | 去皮尖<br>麸炒黃 | 貝母   | 煨各壹兩 | 右為末棗肉搗膏為丸如梧桐子大每服伍拾丸食遠桑白皮煎湯下                       | 治男子婦人十種水氣取水法          |
| 大鯽魚    | 壹箇去腸肚      | 大戟   | 甘遂   | 各貳錢半                                              | 雄黃                    |
| 另研     | 木香         | 牽牛   | 各半錢  | 右先以大戟同甘遂一半入魚肚裏水濕紙裹煨令焦取出焙乾同衆藥為末每服參貳錢用土狗壹箇爛研入藥內冷水調下 | 塗臍膏治腫滿小便少             |
| 地龍     | 猪苓         | 針砂   | 各等分  | 右為末葱涎調敷臍中寸高以帛束之                                   | 五皮飲治水氣遍身浮腫宜先此藥數日次服消水丸 |
| 伏苓皮    | 陳皮         | 生薑皮  | 大腹皮  | 桑白皮                                               | 加蘿蔔子                  |
| 蘇子     | 亭蘚子        | 漢秋子  |      |                                                   |                       |



右四子同炒咬咀每服伍錢水壹鍾生薑叁片同煎至柒分去滓不拘時服

一方治酒腫及脾虛作腫

蘿蔔  
拾枚

皂角  
伍斤

右二味用水同煮乾去皂角將蘿蔔搗爛入蒸餅和

丸如雞頭實大蘿蔔子煎湯如意送下

一方治水腫氣蠱

木香  
檳榔  
陳皮

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

青皮  
大戟  
甘遂

肉豆蔻 各貳錢半  
牽牛 末壹兩半

右為末水丸或商陸汁丸如菡豆大每服伍拾丸空

心白湯下

三花神祐丸治一切水濕腫病大腹實脹喘滿舟車丸

濕方  
門見

針灸法分水一穴

穴 當臍中灸三壯主水腫  
鼓脹腸鳴如流水聲

石門一穴 在臍下二寸灸七壯主水脹水氣行



迪志文化出版有限公司出版

皮中小便  
三里二穴  
在膝下三寸  
腓外廉兩筋  
水溝名  
黃氣滿  
間灸七壯  
主水腹脹  
皮腫

人中  
主在鼻楮下灸三壯

水腫惟得針水溝若針餘穴水盡即死此明堂銅人所戒也庸醫多為人針分水殺人多矣若其他穴亦有針得瘥者特幸焉再不可為法也

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十七

仁齋直指卷十七



迪志文化出版有限公司出版



欽定四庫全書

仁齋直指卷十八

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

身體

身疼方論

凡人百骸四體肌肉皮膚關節脈絡總而謂之身風淫濕滯血刺痰攻皆能作痛至於骨之酸疼或寒或熱入裏徹骨則倍蓰千萬大不侔焉蓋骨為髓之藏髓者飲

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十八

食五味之實秀也髓虛則骨虛勢所必至矣痛在於身風之證以走注知之濕之證以重着驗之血有筋脈鑽刺之證痰有眩暈咳唾之證驅風除濕行血豁痰對證一投猶冀可以旦暮起病入於骨此勞極損傷之不可救藥者也其能生乎然則身痛之與骨痛毫釐千里之差於此不可以無辯雖然酒家之癖多為項腫臂痛蓋熱在上焦不能清利故醞釀日久生痰涎聚飲氣流入於項臂之間不腫則痛耳然而曰痰曰涎曰飲又有理

一分殊之別伏於包絡隨氣上浮客肺壅嗽而發動者痰也聚於脾元隨氣上溢口角流出而不禁者涎也惟飲生於胃府為嘔為吐此胃家之病學者不可不知

身疼證治

人參順氣散身疼通用方見風類更增川芎半兩亦散風邪

左經圓麝香圓增味五痺湯治風濕身痛並見風類

加劑除濕湯生附除濕湯方見濕類五苓散見水類並主傷濕

身痛

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十八

黃耆建中湯方見濕類加川芎當歸治血刺身痛

大半夏湯方見涎類加辣桂陳皮治痰證身痛

消痰茯苓圓治臂痛不能舉手或左右轉移或兩臂如

人抽拽

圓白半夏盪洗三次切碎日乾一兩半茯苓一兩

風化朴消一分枳殼半兩炒

右末薑汁煮稀麪糊圓桐子大每三十圓食後薑湯

下



|                           |  |                             |  |                                      |  |                                        |  |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| 天仙飲治痰注臂痛                  |  | 片子薑黃 <small>錢六</small>      |  | 天仙藤                                  |  | 羌活                                     |  |
| 白朮                        |  | 白芷梢 <small>錢各三</small>      |  | 半夏 <small>製半兩</small>                |  | 右挫每服三錢薑五片煎服間下千金五套圓 <small>方見脾疼</small> |  |
| 白圓子諸風痰涎通用                 |  | 圓白半夏 <small>七兩生水浸洗過</small> |  | 南星 <small>三兩</small>                 |  | 白附子 <small>生二兩</small>                 |  |
| 川烏頭 <small>生去皮臍半兩</small> |  | 右細末入生絹袋井水擺以手揉出滓再研入袋擺        |  | 盡磁盆中曬露星至曉棄舊水換新水攪曬次早又                 |  | 換新水攪曬春五日夏三日秋七日冬十日去水曝                   |  |
| 乾研開糯米粉煎粥清圓菴豆大每三十圓薑湯下      |  | 治酒家痰壅項腫白圓子二錢研末白豆蔻縮砂煎        |  | 湯調下化痰立愈自後二陳湯加荊芥服 <small>方見瘡類</small> |  | 婆蒿根酒治風淫濕滯手足不舉筋節攣疼先與通關                  |  |
| 用                         |  | 欽定四庫全書                      |  | 仁齋直指                                 |  | 卷十八                                    |  |

|                                   |  |                             |  |                                          |  |                                    |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 全蠋 <small>七箇新瓦上微炒末之</small>       |  | 麝 <small>一字</small>         |  | 右老酒三盞空心調作一服如覺已透則止未透次日再作一劑然病未盡除自後專以婆蒿根洗淨切 |  | 碎酒煎日二服神效                           |  |
| 消飲圓倍朮圓治酒癖停飲臂痛 <small>見水飲門</small> |  | 沉香驚甲散治勞倦身痛                  |  | 沉香                                       |  | 人參                                 |  |
| 茯苓                                |  | 秦艽                          |  | 木香                                       |  | 黃耆 <small>微炙</small>               |  |
| 巴戟 <small>去心</small>              |  | 當歸                          |  | 柴胡                                       |  | 熟附子                                |  |
| 熟地黃 <small>洗酒蘊蒸七錢半</small>        |  | 鱉甲 <small>浸去裙醋炙黃各一兩</small> |  | 羌活                                       |  | 全蠋 <small>二錢半</small>              |  |
| 大肉豆蔻 <small>四箇</small>            |  | 右末每二錢葱白二寸薑三片棗二枚食前煎服溫        |  | 酒調下尤妙                                    |  | 十補湯加製半夏添桂治勞倦身痛 <small>方見冷門</small> |  |
| 欽定四庫全書                            |  | 仁齋直指                        |  | 卷十八                                      |  |                                    |  |

舒筋散治風淫血刺身痛體疼痛四肢拘攣

延胡索炒

辣桂去粗皮

當歸等分

右末每二錢酒調下延胡索活血除風理氣

補髓丹補益真元治臂痛腰痛

杜仲去粗炒黑十兩

破故紙十兩用芝麻五兩同炒候芝麻黑篩去之

鹿茸二兩酒炙

沒藥一兩別研

右細末用胡桃肉三十箇湯浸去皮杵為膏入麵少

許酒煮糊圓桐子大每百粒空心鹽湯下

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十八

附諸方

通氣防風湯拔粹方

肩背痛不可迴顧者此太陽氣鬱而不行以風藥散之背痛項強腰似折項似拔者此足

太陽經不通也

羌活

獨活各一錢

藁本

防風

甘草各半錢

川芎

荊芥各三分

右咬咀水煎服

麒麟竭散治寒濕搏於經絡以致氣血凝滯疼痛不可

忍者

血竭

乳香

沒藥

白芍藥

當歸

水蛭炒令烟盡

麝香各二錢

虎脛骨酥炙黃半兩

右為末每三錢溫酒調下食前

當歸拈痛湯拔粹方

治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸

膈不利及遍身疼痛下疰於足脛痛腫不可忍方見脚氣門

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十八

丹溪方治上中下疼痛

南星薑製

蒼朮洗

黃栢酒炒各二兩

川芎一兩

白芷半兩

神麴炒一兩

桃仁半兩

威靈仙酒炒三錢

羌活三錢走骨

防己半兩下行

桂枝三錢行臂

紅花酒洗半錢

草龍膽半錢下行

右為末麪糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下

一方治血氣虛有痰白濁陰火痛風



|                                                                 |          |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|
| 人參                                                              | 一兩       | 白朮  | 熟芋    |
| 川黃柏                                                             | 炒黑各二兩    | 山藥  | 海石    |
| 南星                                                              | 各一兩      | 鎖陽  | 半兩    |
| 乾薑                                                              | 燒灰半兩取其不走 | 敗龜板 | 酒炙二兩  |
| 右為末粥丸一云酒糊丸                                                      |          |     |       |
| 一方治酒濕痰痛風                                                        |          |     |       |
| 黃栢                                                              | 炒酒       | 威靈仙 | 酒炒各五錢 |
| 羌活                                                              |          | 甘草  | 三錢    |
|                                                                 |          | 陳皮  |       |
| 芍藥                                                              | 各一錢      |     |       |
| 右為末每服一錢或二錢沸湯入薑汁調下                                               |          |     |       |
| 諸風應効酒治一切諸般風氣濕痺通身骨節疼痛                                            |          |     |       |
| 腰                                                               |          |     |       |
| 腰痛方論                                                            |          |     |       |
| 腰者腎之外候一身所恃以轉移闔闢者也蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛凡衝風受濕傷冷蓄熱血滯氣滯水積墮傷與夫失志作勞種種腰疼疊見而 |          |     |       |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十八

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十八

|                                                                                                                                                                                                                              |    |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|
| 層出矣衝風者汗出乘風風邪風毒之胚胎也受濕者踐雨卧濕重著腫滯之萌蘖也腰間如水為傷冷發渴便閉為蓄熱血滯則轉側如錐之所刺氣滯則鬱鬱悶悶而不伸積水沉重則小腸不得宣通墜墮損傷則瘀血為之凝結沮剋失志者腎之蠹疲精勞力者腎之戕舉是數證腎家之感受如此腰安得而不為痛乎內經曰腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣審如是則痛在少陰必究其受病之原而處之為得雖然宗筋聚於陰器肝者腎之同系也五臟皆取氣於穀脾者腎之倉廩也鬱怒傷肝則諸筋縱弛憂思傷脾則胃氣不行二者又能為腰痛之冠故併及之 |    |    |            |
| 腰痛證治                                                                                                                                                                                                                         |    |    |            |
| 青娥圓治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚用安胎飲吞神效                                                                                                                                                                                                      |    |    |            |
| 破故紙                                                                                                                                                                                                                          | 四兩 | 杜仲 | 去粗剉四兩用生薑炒香 |
| 右為末用胡桃肉三十箇研膏入少熟蜜圓桐子大                                                                                                                                                                                                         |    |    |            |



|                       |        |       |         |
|-----------------------|--------|-------|---------|
| 每服五十圓調氣散食前下           |        | 方見脹滿門 |         |
| 安腎圓治腎虛腰痛橘皮煎湯食前下       |        | 方見水飲門 |         |
| 獨活寄生湯治風邪冷濕傷腎腰脚背痛及新產腹痛 |        |       |         |
| 腰脚攣疼最除風活血脚氣通用         |        |       |         |
| 獨活                    | 二兩半    | 桑寄生   | 如無以續斷代之 |
| 杜仲                    | 薑製炒    | 細辛    |         |
| 秦艽                    | 去蘆     | 茯苓    |         |
| 白芍藥                   |        | 防風    |         |
| 辣桂                    |        | 川芎    |         |
| 人參                    |        | 當歸    |         |
| 熟地黄                   | 淨      |       |         |
| 甘草                    | 炙各二兩   |       |         |
| 右細剉每服三錢空心煎服下利者去地黄     |        |       |         |
| 小續命湯治風攻腰痛             |        | 方見諸風門 |         |
| 加桃仁去皮尖炒               |        |       |         |
| 生附湯治受濕腰痛              |        |       |         |
| 附子                    | 生一分    | 蒼朮    | 炒       |
| 生乾薑                   |        | 白朮    |         |
| 茯苓                    |        |       |         |
| 杜仲                    | 薑製炒各半兩 |       |         |
| 厚朴                    | 製      |       |         |
| 甘草                    | 炙各一分   |       |         |
| 牛膝                    | 酒浸焙    |       |         |

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 右剉每三錢薑四片棗二枚食前煎服                                                                     |                       |
| 薑附湯治傷冷腰痛                                                                            | <small>方見寒類</small>   |
| 加辣桂製杜仲食前煎服                                                                          |                       |
| 甘豆湯治內蓄風熱入腎腰痛大小便不通                                                                   | <small>方見熱門</small>   |
| 加                                                                                   |                       |
| 續斷天麻間服敗毒散                                                                           | <small>方見寒類</small>   |
| 蘇沈沉麝圓治血瀝腰痛                                                                          | <small>方見血類</small>   |
| 用續斷牛膝桃仁炒煎                                                                           |                       |
| 湯磨下                                                                                 |                       |
| 人參順氣散烏藥順氣散治氣滯腰痛                                                                     | <small>方見風類</small>   |
| 加五加                                                                                 |                       |
| 皮入少甘草煎湯調下                                                                           |                       |
|  |                       |
| 欽定四庫全書                                                                              | 仁齋直指                  |
|                                                                                     | 卷十八                   |
| 腎着湯治腰間積水痛重                                                                          | <small>方見濕門</small>   |
| 續用安腎圓并少許青                                                                           |                       |
| 木香圓繼之                                                                               | <small>方見水飲門</small>  |
| 乳香趁痛散治打墜腰痛                                                                          |                       |
| 虎脰骨                                                                                 | <small>酒炙黃</small>    |
| 敗龜                                                                                  | <small>酒炙各二兩</small>  |
| 麒麟竭                                                                                 |                       |
| 赤芍藥                                                                                 |                       |
| 沒藥                                                                                  |                       |
| 自然銅                                                                                 | <small>煨醋淬細研</small>  |
| 防風                                                                                  |                       |
| 白附子                                                                                 | <small>炮</small>      |
| 辣桂                                                                                  | <small>去粗</small>     |
| 白芷                                                                                  |                       |
| 蒼耳子                                                                                 | <small>微炒</small>     |
| 骨碎補                                                                                 | <small>炒去毛各三兩</small> |
| 牛膝                                                                                  |                       |
| 天麻                                                                                  |                       |





|                       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 檳榔                    | 五加皮   | 羌活    | 各一兩   |
| 右末每服一錢溫酒調下加全蝎妙脚氣通用    |       |       |       |
| 茴香酒治打墜凝瘀腰疼通用          |       |       |       |
| 破故紙                   | 炒香研   | 茴香    | 炒     |
| 右為末每服二錢熱酒調食前進故紙主腰痛主行  |       | 辣桂    | 等分    |
| 血                     |       |       |       |
| 和劑七氣湯治失志傷腎氣剝腰痛        | 方見類   | 多加白茯苓 |       |
| 少加沉香乳香                |       |       |       |
| 欽定四庫全書                | 仁齋直指  |       |       |
| 麝香鹿茸丸八味丸治房勞傷腎腰痛十補湯下青娥 | 卷十八   |       |       |
| 丸治勞力腰痛                | 三方見冷門 |       |       |
| 調肝散治鬱怒傷肝發為腰痛          |       |       |       |
| 半夏                    | 製三分   | 辣桂    | 宣木瓜   |
| 當歸                    |       | 川芎    | 牛膝    |
| 好細辛                   | 各二分   | 石菖蒲   | 酸棗仁   |
| 甘草                    | 炙各一分  |       | 薑去皮微炒 |
| 右剉細每三錢薑五片棗二枚煎服        |       |       |       |

|                       |        |      |     |
|-----------------------|--------|------|-----|
| 沉香降氣湯和調氣散每服二錢半薑棗煎治憂思傷 |        |      |     |
| 脾發為腰痛                 | 方見諸氣門  |      |     |
| 橘香丸治腰痛經久不瘥            |        |      |     |
| 橘核                    |        | 茴香   |     |
| 菴藺子                   | 破故紙    |      | 葫蘆巴 |
| 右末酒煮糯米糊圓桐子大每服三四十圓食前鹽  | 炒各     | 附子   | 炮等分 |
| 湯下                    |        |      |     |
| 神麴酒治腰痛不能轉側陳久神麴一大塊燒通紅淬 |        |      |     |
| 老酒去神麴通口吞青娥圓兩服頓愈       | 欽定四庫全書 | 仁齋直指 |     |
| 腰重痛方                  | 卷十八    |      |     |
| 八角茴香炒末食前溫酒調下          |        |      |     |
| 附諸方                   |        |      |     |
| 獨活湯治因勞役得腰痛沉重如水似折      |        |      |     |
| 羌活                    |        | 防風   | 獨活  |
| 肉桂                    |        | 大黃   | 煨   |
| 桃仁                    | 五十箇    | 當歸   | 連翹  |
|                       |        |      | 半兩  |
|                       |        |      | 澤瀉  |
|                       |        |      | 三錢  |



|                                  |                         |                         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 甘草<br><small>錢二</small>          | 防己                      | 酒連<br><small>一兩</small> |
| 右咬咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服             |                         |                         |
| 補髓丹<br><small>選百一方</small>       | 升降水火補益心腎強筋壯骨治腎虛腰痛       |                         |
| 痛<br><small>方見身體門</small>        |                         |                         |
| 若濕腰痛如坐水中蓋腎屬水久坐水濕處或為雨             |                         |                         |
| 露所着濕流入腎經以致腰痛宜滲濕湯不効宜              |                         |                         |
| 腎着湯                              |                         |                         |
| 若風傷腎而腰痛者或左右痛無常處牽引兩足宜             |                         |                         |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷十八</small> |                         |                         |
| 五積散每服加防風半錢或加全蝎三箇小續命              |                         |                         |
| 湯獨活寄生湯可選而用                       |                         |                         |
| 經驗羌活桃仁湯治墜墮挫閃氣血凝滯攻刺腰痛神効           |                         |                         |
| 桃仁<br><small>去皮尖</small>         | 紅花                      | 牛膝<br><small>酒洗</small> |
| 玄胡索                              | 破故紙<br><small>炒</small> | 杜仲<br><small>炒</small>  |
| 川歸尾<br><small>酒洗</small>         | 羌活                      | 官桂                      |
| 蒼朮<br><small>泔浸炒各等分</small>      | 茴香                      | 乳香<br><small>少許</small> |
| 右咬咀用水一鍾酒半鍾煎至八分食前溫服               |                         |                         |

|                                          |                                     |                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 補陰丸治腎虛腰痛<br><small>方見虛勞門</small>         |                                     |                         |
| 牛膝酒<br><small>方三因</small>                | 治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者                      |                         |
| 地骨皮                                      | 五加皮                                 | 薏苡仁                     |
| 川芎                                       | 牛膝<br><small>各二兩</small>            | 甘草<br><small>一兩</small> |
| 生地黃<br><small>十兩</small>                 | 海桐皮<br><small>二兩</small>            | 羌活<br><small>一兩</small> |
| 右咬咀用絹帛裹藥入無灰酒內炙浸七日夏三五宿每服一盃日用三四服長令酒氣不絕一法加炒 |                                     |                         |
| 杜仲<br><small>一兩</small>                  |                                     |                         |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷十八</small>         |                                     |                         |
| 杜仲酒<br><small>方三因</small>                | 治風冷傷腎腰痛不能屈伸                         |                         |
| 杜仲<br><small>一兩去粗皮用姜汁製炒</small>          |                                     |                         |
| 右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服                       |                                     |                         |
| 針灸法腎俞二穴<br><small>在十四椎下兩旁各寸半</small>     | 一法<br><small>令患人正立用竹杖度臍點記度皆</small> |                         |
| 盡處灸<br><small>隨年壯</small>                |                                     |                         |
| 腎氣                                       |                                     |                         |
| 腎氣方論                                     |                                     |                         |
| 腎主納氣人之氣海繫焉腎虛而為風寒所乘為暑濕                    |                                     |                         |



所襲為喜怒憂恐所傷而水結不散又與氣搏是以群邪聚於其中曰疝曰奔豚曰小腸氣曰膀胱氣皆是物也其候不特外腎小腹作痛或攻刺於腰脇或遊走於背脊或冷氣搶心心下痛滿或手足厥冷痛繞臍傍或脇之左右如盃或臍之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘間覆大如盤有壯熱惡寒者有洒淅寒熱者有不得大小便者有裏急而下泄者有自汗出者有不欲食者其於陰間則卵有大小伸縮而上下不常囊有腫脹急痛而發歇無定挾冷觸怒則塊物逼上囊根或攻腹脇時和心平則塊物自循脛系歸入囊中凡此皆謂之腎氣治法綱領風則散之寒則溫之暑則解其熱濕則滲其水七情所發調其心氣水與氣搏行其小便其間以主治腎氣之劑參之固定則也然總治之法大要以流行疎利為先毋曰腎虛得病不敢疎泄蓋腎為邪氣所干若非逐去病何由愈儻或姑息畏虛妄以剛劑兜住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣雖

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十八



迪志文化出版有限公司出版

然腎氣發作固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又有冷熱不調尤當詳審冷者脇邊及外腎清冷小便清而多遇寒即發是也熱者內挾暑氣或積酒毒或服煖藥於前外腎與小腹俱熱肛門間糞後亦熱小便數而澁遇熱則甚是也冷熱不調者小腹外腎乍冷乍熱大便小便或秘或利用藥溫涼當隨證而權度之但所謂流行疎導常運轉於其中矣其若大小便流利之後或更有牽刺引疼或微氣遊注於肌膚之間此則腎虛血虛氣不還元當加潤養人參當歸川芎芍藥桑螵蛸葫蘆巴輩又不可無惟是逆氣長噓中脘停酸燥悶擾擾甚而至於嘔吐最為惡候何則天一生水腎實主之宗筋聚於陰器惟藉陽明以養之今脾土不濟腎水上乘必為酸汁必為涎飲荏苒踰時遂成暴吐醫家執劑之始皆知腎經惡燥如蒼朮白朮良薑之類誠不敢發用耳及其嘔吐大作薑朮輩用之而不顧若猶也則吳茱萸薑撥剛燥等劑又加多焉雖附子亦用之而救急矣病勢至此脾土未強腎水已為之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十八



迪志文化出版有限公司出版

潤腎水既潤脾土又為之焦往往陰陽不升降榮衛不流行大小二便關隔澀閉而腎汁胃汁皆自其口出也如此者大抵不救臨病須當識證預與病家言之

腎氣證治

牡丹丸治風寒疝痛及諸血滯作痛

牡丹皮

四兩

桃仁

浸去皮炒別研

官桂

各五兩

川烏頭

一隻炮熱去皮尖

右末煉蜜圓桐子大每服五十圓溫酒下血痛醋湯下

欽定四庫全書

仁齋直指卷十八

養正丹

方見痢冷門

治奔豚氣痛嘔吐身冷調氣散下

沈附湯治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時冷兼

治濕證

附子

生一錢

沈香

辣桂

萆澄茄

甘草  
炙各半錢

香附

一錢

右剉為一服薑七片空心煎服

桂薑湯治無陽臍冷疝氣兼治濕證

吳茱萸

十兩半酒醋浸一宿焙乾

川白薑

生

辣桂

各半兩

良薑

萆澄茄

茴香

炒

縮砂仁

益智仁

木香

茯苓

甘草  
炙各三錢

右剉每服三錢水煎調蘇合香丸食前服

薑桂丸治腎冷寒疝

良薑

碎片半兩

巴豆肉

二十一粒截斷同炒焦去巴豆

桂心

半兩

右並末醋麪糊圓桐子大每三十九丸溫酒食前服

欽定四庫全書

仁齋直指卷十八

茴香雀酒治腎冷疝氣偏墜急痛

舶上茴香

三錢

胡椒

一錢

縮砂仁

辣桂

各二錢

右粗末以生雀燎毛去腸拭淨不洗用三箇入藥於腹

中麻繩繫定濕紙數重裹煨香熟空心嚼食溫酒送下

川椒散治疝氣外腎腫痛

真川椒

去目并合口者微炒出汗

官桂

各半兩

川芎

當歸

青皮



|                         |                       |                        |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 陳皮 <small>製</small>     | 枳殼                    | 檳榔                     |
| 赤茯苓                     | 青木香                   | 南木香                    |
| 萹澄茄                     | 白豆蔻仁                  | 甘草 <small>炙各一分</small> |
| 右粗末每三錢薑棗煎食前服            |                       |                        |
| 梔子散治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱熱大小便不通 |                       |                        |
| 梔子仁 <small>製</small>    | 枳殼 <small>各半兩</small> | 北梗                     |
| 北前胡                     | 青木香                   | 赤茯苓                    |
| 車前子                     | 甘草 <small>各一分</small> |                        |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十八         |                       |                        |
| 右剉每三錢新水煎服壯熱加柴胡大便秘加大黃    |                       |                        |
| 甘豆湯治腎氣虛中有熱大小便不通         |                       |                        |
| 黑豆 <small>合三</small>    | 甘草 <small>剉二錢</small> | 薑 <small>七片</small>    |
| 右作一劑新水煎取清汁服             |                       |                        |
| 海浮石散治腎氣熱證小便秘澀黃色         |                       |                        |
| 海浮石                     |                       |                        |
| 右為末每二錢煎麥門冬赤茯苓湯調下        |                       |                        |
| 金蓮散治膀胱氣痛                |                       |                        |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 巴豆 <small>三十粒去殼截斷</small>  | 川練子 <small>二十四箇湯浸去皮薄切片</small> |
| 右件用麩二合同炒令黃赤去麩與巴豆只將川練       |                                |
| 為末每二錢溫酒調空心服                |                                |
| 五苓散 <small>方見水飲門</small>   | 用生車前子竹園尿赤茯苓麥門冬去                |
| 心燈心烏梅煎湯調下治腎氣小便不通兼治水結不      |                                |
| 散暑證通用                      |                                |
| 柴胡桂枝湯治腎氣冷熱不調證              |                                |
| 柴胡 <small>三錢</small>       | 人參                             |
| 桂枝                         |                                |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十八            |                                |
| 白芍藥                        | 生薑 <small>各半兩</small>          |
| 黃芩                         | 甘草 <small>炙各三錢</small>         |
| 半夏 <small>製四錢</small>      |                                |
| 右剉散每服四錢棗一枚水大盞煎七分溫服         |                                |
| 解毒雄黃丸 <small>方見積熱門</small> | 溫白丸 <small>見浮腫門</small>        |
| 治腎氣大便不通酌量輕重用               | 以枳殼散送下 <small>方見脚氣</small>     |
| 二物湯治奔豚疝氣攻刺走痛               |                                |
| 辣桂 <small>一兩半</small>      | 牽牛 <small>炒一兩</small>          |
| 右粗末每服二錢薑棗煎溫服               |                                |





青木香丸治膀胱疝氣每五十丸以醇酒入葱白煎五  
苓散送下方並見水飲門又方青木香圓二百粒班貓七箇去  
頭足翅為末同於文武火上慢慢炒令丸子微香以磁  
碟蓋銚上頓在冷處少頃去班貓末取圓子每服五十  
丸茴香酒下

金鈴散治膀胱小腸氣外腎腫痛

大川練子三十箇湯浸去薄皮每箇作六七片巴豆三十粒去皮膜每粒作兩三段夾炒焦去巴色

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十八

右以舶上茴香與川練等秤并木香一分為末每二  
錢水酒各半盞連根葱白二寸煎取汁食前調下  
煨棗方治小腸氣痛不可忍班貓一箇去頭足翅入大  
棗中線繫濕紙包置慢火中煨令香熟去貓空腹食棗  
以桂心華澄茄煎湯送下

蝎麝散治膀胱小腸氣痛全蝎緊實而全者不拘多少  
焙乾為末每迎病發時用蝎末一錢入麝半字分作二  
服溫酒調下人行十里又進後服神効

失笑散治小腸氣痛及諸血痛

川五靈脂 蒲黃隔紙微炒 加延胡索各等分

右末每服二錢酒半盞水半盞煎七分食前服血痛  
臨熟入米醋少許

鹽煎散治小腸氣吊腹中成陣刺痛兼治風證

益智仁 白芷 白乾薑炮

茴香炒 甘草炙 天台烏藥去心

香附淨各一兩 青皮一兩半 檳榔

欽定四庫全書 仁齋直指 卷十八

麻黃節去 川芎 枳殼製各半兩

右末每服二錢鹽少許水煎食前服

全蝎延胡散治小腸氣痛最良

延胡索用鹽炒一兩 全蝎日乾生用一分

右細末每服一錢食前溫酒調下亦治心痛不饑飽  
醋湯調下

葫蘆巴散治小腸氣攻刺

葫蘆巴炒一兩



|                       |     |              |        |
|-----------------------|-----|--------------|--------|
| 右末每服二錢茴香炒紫用熱酒沃盖定取酒調下  |     | 葱白散治腎氣刺痛七氣通用 |        |
| 當歸                    | 川芎  | 枳殼           | 製      |
| 官桂                    | 青皮  | 川白薑          | 生      |
| 茴香                    | 炒   | 川練肉          | 陳皮     |
| 紫蘇                    | 三稜  | 蓬朮           | 醋浸一宿焙  |
| 白芍藥                   | 茯苓  | 木香           | 各一兩    |
| 人參                    | 沈香  | 甘草           | 炙各半兩   |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十八       |     |              |        |
| 右粗末每服三錢葱白二寸鹽少許煎服大便秘加  |     | 寸金圓治奔豚諸疝作痛   |        |
| 大黃                    |     | 當歸           |        |
| 葫蘆巴                   |     | 延胡索          |        |
| 炒各一兩                  | 桃仁  | 皮浸去          | 桑螵蛸    |
| 別研                    | 白芍藥 | 川練肉          | 酒蒸各半兩  |
| 華澄茄                   | 木香  | 全蝎           | 二錢半十箇焙 |
| 右末米醋打麵糊圓桐子大每服五十圓少鹽入酒送 |     |              |        |

|                       |           |            |          |
|-----------------------|-----------|------------|----------|
| 下有熱小便秘車前子赤茯苓煎湯下       |           | 生料調氣散治寒疝作痛 |          |
| 蘇少鹽煎服若是藥末用茴香鹽酒調下      |           | 方見諸氣門      | 每服二錢入生薑紫 |
| 秘傳茱萸內消圓治腎虛為邪所襲留伏作痛陰癰偏 |           | 大或生瘡出黃水    |          |
| 吳茱萸                   | 半酒半醋浸一宿焙乾 | 山茱萸        | 蒸去核      |
| 馬蘭花                   | 醋浸焙       | 川練子        | 蒸去皮核     |
| 黑牽牛                   | 炒取末       | 船上茴香       | 用鹽炒      |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷十八       |           |            |          |
| 橘紅                    |           | 青皮         |          |
| 桃仁                    |           | 白蒺藜        |          |
| 浸去炒                   | 白蒺藜       | 炒去刺        | 木香       |
| 右細末酒麪稀糊圓桐子大每四十圓食前溫酒鹽  |           | 湯任下        |          |
| 葫蘆巴丸治腎經虛冷膀胱氣痛或陰腫偏墜或小腹 |           | 有物如卵上下走痛   |          |
| 葫蘆巴                   | 炒         | 川練子        | 蒸去皮核焙各四兩 |
| 川烏                    | 炮去皮臍      | 大巴戟        | 去心各半兩    |
| 苗香                    |           |            |          |

|                                    |                          |                       |            |                            |                           |                             |                          |                       |                            |    |    |                            |    |                          |                      |           |          |                          |                          |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----|----|----------------------------|----|--------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 吳茱萸<br><small>半酒半醋浸一宿焙乾二兩半</small> | 牽牛<br><small>炒取末</small> | 右為末酒麪稀糊圓桐子大每二十圓空心溫酒送下 | 蠲痛圓治小腸膀胱氣痛 | 延胡索<br><small>畧炒一兩</small> | 川練<br><small>蒸去皮核</small> | 舶上茴香<br><small>炒各半兩</small> | 牽牛<br><small>炒取末</small> | 右為末酒麪稀糊圓桐子大每二十圓空心溫酒送下 | 青皮<br><small>白去末炒取</small> | 當歸 | 良薑 | 天台烏藥<br><small>各一分</small> | 木香 | 全蝎<br><small>七箇焙</small> | 右末生薑自然汁浸糕為糊圓桐子大每服三十圓 | 燒綿灰存性調酒送下 | 腰子散治腎氣作痛 | 黑牽牛<br><small>炒熟</small> | 白牽牛<br><small>炒熟</small> | 右為末每服挑三錢匕猪腰一副薄切開縫入川椒五十粒茴香一百粒以牽牛末徧摻入腎中線繫濕紙數重裏煨香熟出火氣燈後空腹嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈 |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----|----|----------------------------|----|--------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十八



迪志文化出版有限公司出版

|                |                         |                          |                         |                        |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |                          |                          |                         |                               |                             |                                  |                            |                                         |                                         |                      |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 茯苓桂甘湯治臍下悸動欲作奔豚 | 茯苓<br><small>二兩</small> | 甘草<br><small>炙半兩</small> | 桂枝<br><small>一兩</small> | 右剉細每服四錢棗一箇用甘泉水一盞半煎一盞溫服 | 敵金圓治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛遠腹寒熱往來 | 京三稜 | 蓬莪朮 | 木猪苓 | 赤芍藥 | 白附子 | 蘿蔔子 | 黑牽牛 | 川練肉 | 山茵陳 | 青木香 | 陳橘皮 | 五靈脂 | 薑黃 | 茴香<br><small>各一兩</small> | 南木香<br><small>半兩</small> | 丁香<br><small>一分</small> | 澤瀉<br><small>一兩半已上並生用</small> | 海藻<br><small>酒浸一宿焙乾</small> | 海浮石<br><small>米醋浸火煨七次黑為度</small> | 川山甲<br><small>熱大灰煨</small> | 青皮<br><small>去白二兩一兩生用一兩炒黃色去班貓不用</small> | 香附<br><small>杵淨二兩一兩生用一兩炒色焦去巴豆不用</small> | 右件截碎夾和微炒並為末酒麪稀糊圓桐子大每 |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十八



迪志文化出版有限公司出版

|                                               |  |                                        |  |     |  |                       |  |               |  |               |  |                      |  |                      |  |                                               |  |                                                |  |                                                |  |                                                                      |  |                       |  |                                      |  |
|-----------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----|--|-----------------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|
| 服三十圓溫酒送下此藥能泄斟酌用之                              |  | 川練子散治小腸氣痛                              |  | 附諸方 |  | 又方生薑母多開小孔納以川椒濕紙煨透老酒嚼下 |  | 腎氣方大七氣湯加炒牽牛煎服 |  | 子大每服七十圓溫酒鹽湯任下 |  | 艾塞滿蓋定竹針插麻線繫蒸爛研細和藥為丸桐 |  | 右為末以艾去枝梗二兩大木瓜二枚切蓋去穰入 |  | 當歸 <small>酒浸焙</small> 沒藥 <small>別研各一兩</small> |  | 厚杜仲 <small>去粗皮薑製</small> 天麻 <small>各二兩</small> |  | 肉苁蓉 <small>酒浸焙</small> 川續斷 <small>揀淨生用</small> |  | 葫蘆巴 <small>慢火炒</small> 牛膝 <small>酒浸焙</small> 舶上茴香 <small>酒浸炒</small> |  | 金山老艾瓜丸治腎氣攻刺及脚氣酸疼通用皆得効 |  | 川練散治膀胱小腸氣木腎諸疝通用 <small>方具木腎門</small> |  |
| 木香 <small>不見火</small> 茴香 <small>鹽炒黃去鹽</small> |  | 川練子 <small>用巴豆十粒搥碎同川練炒黃色去巴豆各一兩</small> |  |     |  |                       |  |               |  |               |  |                      |  |                      |  |                                               |  |                                                |  |                                                |  |                                                                      |  |                       |  |                                      |  |



迪志文化出版有限公司出版

|                 |  |           |  |                      |  |                              |  |                                       |  |                                              |  |             |  |             |  |                                 |  |                                                                     |  |                              |  |                      |  |              |  |       |  |                                   |  |                              |  |
|-----------------|--|-----------|--|----------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|--------------|--|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| 右為末每服二錢溫酒空心食前調服 |  | 玄胡索散治小腸氣痛 |  | 用玄胡索鹽炒乾薑各等分為細末空心鹽酒調下 |  | 腎氣方 <small>丹溪方</small> 治諸疝定痛 |  | 茴香<br>破故紙<br>吳茱萸 <small>鹽炒各五錢</small> |  | 葫蘆巴 <small>七錢半</small> 木香 <small>三錢半</small> |  | 右為末蘿蔔搗汁丸鹽湯下 |  | 守効丸治癰疔要藥不痛者 |  | 蒼朮<br>南星<br>白芷 <small>散</small> |  | 山查 <small>各一兩</small> 川芎 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>又云枳實炒</small> |  | 半夏 <small>各半兩</small> 秋冬加吳茱萸 |  | 右為末神麴糊丸服又云有熱加山梔一兩堅硬加 |  | 朴硝半兩又或加青皮荔枝核 |  | 又方治癰疔 |  | 南星<br>山查<br>蒼朮 <small>各二兩</small> |  | 白芷<br>半夏 <small>製</small> 枳核 |  |
|-----------------|--|-----------|--|----------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|--------------|--|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|--|



迪志文化出版有限公司出版

|                       |     |     |     |    |        |
|-----------------------|-----|-----|-----|----|--------|
| 神麴                    | 各一兩 | 海藻  | 半兩  | 昆布 | 半兩     |
| 玄明粉                   |     | 吳茱萸 | 各二錢 |    |        |
| 右為末酒糊丸                |     |     |     |    |        |
| 積疝方                   |     |     |     |    |        |
| 山查                    | 炒一兩 | 茴香  | 炒   | 柴胡 | 炒二錢    |
| 牡丹皮                   | 錢一  |     |     |    |        |
| 右為末酒糊丸如梧子大服五六十丸鹽湯下    |     |     |     |    |        |
| 又方治疝作痛                |     |     |     |    |        |
| 蒼朮                    |     | 香附  | 俱鹽炒 | 黃栢 | 酒炒已上為君 |
| 玄胡索                   |     | 益智仁 |     | 桃仁 | 已上為臣   |
| 茴香                    | 炒   | 附子  | 鹽釀炒 | 甘草 | 已上為使   |
| 右為末作湯服後一痛過更不再作矣       |     |     |     |    |        |
| 治偏墜用沒藥川練肉角茴全蝎為末每服二錢空心 |     |     |     |    |        |
| 熱酒調下                  |     |     |     |    |        |
| 木腎                    |     |     |     |    |        |
| 木腎方論                  |     |     |     |    |        |

|                                                                                                                                                                        |                                            |                                        |                     |                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 心火下降則腎水不患其不溫真陽下行則腎氣不患其不和溫溫其和安有所謂木强者哉惟夫嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作疼頑痺結硬勢所必至矣執劑之法不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪邪氣內消榮衛流通盡如寒谷回春蓋有不疾而速不行而至者矣外此又有一種升高墜下外腎跌傷驚氣與敗血交攻亦有木強脹痛之證治法大要則同於中更為之消瘀 |                                            |                                        |                     |                     |                         |
| 木腎證治                                                                                                                                                                   |                                            |                                        |                     |                     |                         |
| 川練散治外腎脹大麻木痛硬及奔豚疝氣偏墜諸證                                                                                                                                                  |                                            |                                        |                     |                     |                         |
| 川練子                                                                                                                                                                    | 不蛀者四十九箇先切七箇取肉以茴香二錢半慢火同炒併留茴香又切七箇以破故紙二錢半同炒併留 | 同炒併留故紙又切七箇以黑牽牛二錢半同炒併留牽牛又切七箇以鹽一錢同炒併留鹽又切 | 七箇以班貓十四箇去翅同炒去班貓不用又切 | 七箇以巴豆肉十四箇作兩斷同炒去巴豆不用 | 又切七箇以蘿蔔子二錢半同炒去蘿蔔子不用外更別入 |
| 茴香                                                                                                                                                                     | 炒                                          |                                        |                     |                     |                         |
| 青木香                                                                                                                                                                    | 各半兩                                        | 辣桂                                     |                     |                     |                         |
| 南木香                                                                                                                                                                    | 各二錢半                                       |                                        |                     |                     |                         |





|                      |  |                      |  |               |  |                       |  |       |  |            |  |                                       |  |                                                         |  |                      |  |         |  |     |  |         |  |           |  |                                              |  |                           |  |        |  |
|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|-------|--|------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------|--|-----|--|---------|--|-----------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------|--|
| 右並為末酒調稀麪糊圓桐子大每服三十圓食前 |  | 鹽酒下積日計功打墜瘀血證本方加延胡索半兩 |  | 畧炒入藥以沒藥研為末調酒下 |  | 金鈴散煨棗方治膀胱小腸氣痛外腎脹大通治木腎 |  | 方見腎氣門 |  | 四神丸治腎冷疝氣脹痛 |  | 吳茱萸<br><small>揀淨一兩一半用米醋浸一宿各焙乾</small> |  | 大香附<br><small>杵淨一兩</small> 華澄茄<br><small>青木香各半兩</small> |  | 右為末米糊圓桐子大每服七十圓食前鹽湯下或 |  | 乳香葱白煎湯下 |  | 附諸方 |  | 一方治木腎不痛 |  | 枸杞子 南星 半夏 |  | 黃栢 <small>酒炒</small> 蒼朮 <small>鹽炒</small> 山查 |  | 白芷 神麴 <small>炒</small> 滑石 |  | 昆布 吳茱萸 |  |
|----------------------|--|----------------------|--|---------------|--|-----------------------|--|-------|--|------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---------|--|-----|--|---------|--|-----------|--|----------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------|--|

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十八



迪志文化出版有限公司出版

|                   |  |            |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                |  |                                            |  |            |  |                                                   |  |                            |  |                       |  |     |  |       |  |                                            |  |
|-------------------|--|------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|-----|--|-------|--|--------------------------------------------|--|
| 右為末酒糊丸桐子大空心鹽湯下七十丸 |  | 治小腸氣及木腎偏墜方 |  | 黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好酒米 |  | 醋各一碗於砂鍋內煮乾為度取去黑牽牛用青紅 |  | 娘子十九箇於鉄鍋內炒燥去青紅娘子將牽牛研 |  | 取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二兩醋糊丸如 |  | 梧桐子大每服三十丸空心鹽酒送下不可多服如 |  | 多服令人頭眩如頭眩可服黑錫丹 |  | 奪命丹<br><small>和濟方</small> 遠年近日小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜 |  | 腫硬陰間濕痒抓成瘡癬 |  | 吳茱萸<br><small>一斤酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸四兩各浸一宿用火焙乾</small> |  | 澤瀉<br><small>去灰十二兩</small> |  | 右為末酒煮麵糊丸如梧子大每服五十九丸溫酒鹽 |  | 湯任下 |  | 一方治木腎 |  | 楮樹葉<br><small>又云楊樹</small> 雄者晒乾為末酒糊丸桐子大空心鹽 |  |
|-------------------|--|------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|-----|--|-------|--|--------------------------------------------|--|

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十八



迪志文化出版有限公司出版

湯下五十九丸

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十八

仁齋直指卷十八



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指卷十九

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

腎臟風癢

腎癢方論

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十九

實則為痛虛則為癢癢之出於骨虛也明矣腎屬足少陰之經囊間濕癢謂之腎臟風世所共知也孰知宗筋聚於陰器足厥陰之肝系焉惟腎主虛惟肝主風人之精血不充內為嗜慾所耗外為風冷所乘風毒濕氣皆從虛入囊間其有不濕癢者乎脚下其有不瘡瘍者乎療治之法先當疏散風邪流行濕毒夫然後以芎歸活血與細辛蒺藜驅風數輩潤養而平治之若欲遽用川烏故紙燥烈之劑吾恐攔住內邪病無由愈間有患者為酒麪炙烤所傷腎虛而挾熱如猪肚黃連蒸為圓子又不可無其或不施藥餌一切從事於熱湯雖沃之暫止然真氣愈泄肝腎愈虛或者未知攸濟



迪志文化出版有限公司出版

腎癢證治

宣風散疎肝腎風

大雞心檳榔二箇半橘皮半兩

牽牛生取末一兩炒取末一兩

甘草焙三錢

右末每服二錢蜜湯調下

不換金正氣散去肝腎濕氣方見傷寒類

青木香圓疎導腎經風水方見水飲門病人腎虛扶邪浮腫

多用安腎圓少用青木香圓夾和鹽湯下屢效安腎圓

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十九

方見水飲門

活血驅風散治肝腎風毒腎囊濕癢脚下瘡癬

當歸 川芎 白芷

華陰細辛 白蒺藜炒去刺 桃仁浸去皮焙

白芍藥 半夏製 塊潤

五靈脂 甘草生各三錢 蒼朮炒

杜仲薑汁炙炒去絲 辣桂 天麻

薏苡 橘紅 檳榔

厚朴製

枳殼製

右細剉每服三錢水盞半薑錢五片棗二枚煎七分

濾清煖熱入乳香末少許食前服乳香以佐心氣使

心腎相交或有熱證去乳香加黑豆煎

蒺藜散治癩風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡癢

蒺藜炒杵刺 草烏頭水浸三日逐日換水去皮晒各半兩

白芷 白附生 蒼朮炒

荆芥穗各二錢半

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷十九

右畧末米糊圓桐子大每三十圓上則茶清下則鹽

酒服

烏荊圓治肝腎風癢方見腸風門

神授圓治外腎濕癢方見虛勞門

莖物腫爛淫汁方

大腹皮一斤

右夾苦參荆芥煎湯溫洗拭以津唾塗次用油髮燒

存性入些白及末傳逐日煎湯密室洗換藥或用乳



|                   |  |                |  |                     |  |     |  |                |  |                                             |  |                           |  |                                                                    |  |                        |  |                      |  |       |  |                            |  |                          |  |                          |  |                 |  |                              |  |         |  |                                                |  |
|-------------------|--|----------------|--|---------------------|--|-----|--|----------------|--|---------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|-------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------|--|------------------------------------------------|--|
| 香龍骨散仍服蠟礬圓并髮灰用米飲調下 |  | 莖頭三五孔小漏瘡出血微膿妙方 |  | 油髮燒存性灰傳乾則津唾調仍以米湯調髮灰 |  | 食前服 |  | 乳香龍骨散治外腎濕癢淫爛如癰 |  | 龍骨<br><small>石膏</small><br><small>生</small> |  | 五倍子<br><small>各一分</small> |  | 白及<br><small>乳香</small><br><small>黃革丹</small><br><small>各半</small> |  | 麝<br><small>許少</small> |  | 右細末先以苦參大腹皮紫蘇莖葉煎湯溫洗後傳 |  | 陰汗濕癢方 |  | 爐甘石<br><small>綠者一分</small> |  | 眞蚌粉<br><small>黃連</small> |  | 五倍子<br><small>各半</small> |  | 右細末摻先以蜂房大腹皮煎湯溫洗 |  | 又爐甘石方<br><small>見諸瘡門</small> |  | 妬精瘡陰蝕瘡方 |  | 油髮灰<br><small>青黛</small><br><small>乾等分</small> |  |
|-------------------|--|----------------|--|---------------------|--|-----|--|----------------|--|---------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|-------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|---------|--|------------------------------------------------|--|

|               |  |                              |  |            |  |                                           |  |                           |  |                          |  |    |  |                      |  |                      |  |                  |  |                       |  |        |  |     |  |                 |  |                                               |  |     |  |                          |  |                           |  |                           |  |                      |  |
|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|----|--|----------------------|--|----------------------|--|------------------|--|-----------------------|--|--------|--|-----|--|-----------------|--|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
| 右為末入些麝或摻或津唾調傳 |  | 又青紙方<br><small>見妬精瘡中</small> |  | 大學治腎臟風發瘡疥方 |  | 雞心檳榔<br><small>一大箇破開以黃革月一錢合在內濕紙裹煨</small> |  | 明硫黃<br><small>研二錢</small> |  | 生革丹<br><small>一錢</small> |  | 全蝎 |  | 右同末入輕粉半錢麝少許於磁器收每用少許麻 |  | 油調抹兩掌先以鼻臭男以兩掌揜外腎女以兩掌 |  | 掩兩乳各睡至醒次日又如此用藥屢效 |  | 又方用大紅川椒去目水蘸濕半日夾生杏仁研膏擦 |  | 手如上法亦驗 |  | 附諸方 |  | 龍膽瀉肝湯治陰部時復濕癢及臊臭 |  | 柴胡<br><small>澤瀉</small><br><small>各一錢</small> |  | 車前子 |  | 木通<br><small>各五分</small> |  | 生地黃<br><small>當歸尾</small> |  | 草龍膽<br><small>各三分</small> |  | 右件咬咀如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞 |  |
|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|----|--|----------------------|--|----------------------|--|------------------|--|-----------------------|--|--------|--|-----|--|-----------------|--|-----------------------------------------------|--|-----|--|--------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|



|                                 |     |                          |  |
|---------------------------------|-----|--------------------------|--|
| 去滓稍熱空心宿食消盡服之更以美膳壓之              |     | 柴胡勝濕湯治兩外腎冷兩脾樞陰汗前陰痿陰囊濕癢臊氣 |  |
| 生甘草                             | 酒黃栢 | 柴胡                       |  |
| 當歸尾                             | 紅花  | 草龍膽                      |  |
| 麻黃根                             | 羌活  | 漢防己                      |  |
| 五味子                             | 升麻  | 澤瀉                       |  |
| 茯苓                              |     |                          |  |
| 右件剉如麻豆大都作一服水三大盞煎至一盞去滓溫服食前忌酒濕麵房事 |     |                          |  |
| 補肝湯                             |     |                          |  |
| 黃耆                              | 人參  | 葛根                       |  |
| 白茯苓                             | 升麻  | 柴胡                       |  |
| 羌活                              | 當歸身 | 連翹                       |  |
| 炒黃蘗                             | 澤瀉  | 蒼朮                       |  |
| 麴末                              | 知母  | 防風                       |  |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十九



迪志文化出版有限公司出版

|                       |  |                       |  |         |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|---------|--|
| 陳皮                    |  | 炙甘草                   |  | 猪苓      |  |
| 右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓  |  | 稍熱服空心食前忌酒濕麵           |  | 一方治腎囊濕瘡 |  |
| 蜜陀僧                   |  | 乾薑                    |  | 滑石      |  |
| 右為末擦上                 |  | 又方先用吳茱萸煎湯洗            |  | 吳茱萸     |  |
| 寒水石                   |  | 黃栢                    |  | 樟腦      |  |
| 蛇床子                   |  | 輕粉                    |  | 硫黃      |  |
| 白礬                    |  | 檳榔                    |  | 白芷      |  |
| 右為末麻油調搽               |  | 頭風                    |  | 頭風方論    |  |
| 足大陽者頭之經也六經傷寒惟太陽受病最多蓋頭 |  | 居其上當風寒之衝一有間隙則若項若腦若耳若鼻 |  |         |  |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷十九



迪志文化出版有限公司出版



風邪乘虛皆得而入之矣况復櫛沐取涼飽食仰卧之不謹乎頭風為病不必須有偏正頭疼之證但自頸項以上耳目口鼻眉稜之間或有一處不若吾之體焉皆其漸也有頭疼有頭運有頭皮頑厚不自覺知有口舌不仁莫知滋味或耳聾或頭汗或目痛或眉稜上下掣痛或鼻中聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作冒眩之狀凡此皆頭風證也治法大要有熱證者消風散用防風荆芥煎湯下無熱證者追風散用薄荷茶清下又有素

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十九

患頭風之人或因傷風寒暑濕依證調理已獲輕安未幾頭風發作則不必拘泥前藥當以頭風和平之劑療之其或病軀老弱先患頭風復感寒邪自汗不止此等用藥無附子又不可也若夫太陽項強一證無汗惡風則為表實合用葛根湯汗出惡風則為表虛合用桂枝葛根湯是又感受風邪在頭風界限之內者也入水捕魚入林捕兔要必知其所在斯可矣  
婦人月候適行輒  
水炮之狀  
瘁痛滿頭如



迪志文化出版有限公司出版

頭風證治

消風散治頭目昏痛鼻塞冒運

人參

羌活

川芎

白茯苓

白僵蠶  
炒

霍香葉

荆芥穗

防風

甘草  
炒

蟬殼  
兩各二

厚朴  
製

陳皮  
兩各半

右末每服二錢防風荆芥煎湯調下

追風散治偏正頭風疼痛面上遊風狀若虫行

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十九

川烏  
炮去  
皮尖

軟石膏  
煨

白僵蠶  
炒去  
青絲

川芎

防風

荆芥

甘草  
炙各  
一兩

南星  
炮

白附子  
炮

羌活

天麻

全蝎

地龍  
去  
土

白芷  
兩各半

草烏  
炮去  
皮尖

沒藥

乳香

雄黃  
並研各  
一分

右為末每服半錢入好茶少許沸湯調食後臨睡服

川芎茶調散治諸風上攻偏正頭疼



迪志文化出版有限公司出版

|                                |                        |                          |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 川芎                             | 荊芥穗 <small>各二兩</small> | 香附 <small>去毛</small>     |
| 薄荷 <small>各四兩</small>          | 白芷                     | 羌活                       |
| 細辛                             | 甘草 <small>炙各一兩</small> | 防風 <small>三分</small>     |
| 右末每服二錢食後茶清調下                   |                        |                          |
| 究原抽刀散治頭風掣痛                     |                        |                          |
| 川烏 <small>切片薑汁浸晒</small>       | 雄黃                     | 蟬退 <small>去頭足各半兩</small> |
| 川芎                             | 細辛 <small>各一兩</small>  |                          |
| 右末每服半錢食後臨卧茶清調下                 |                        |                          |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷十九</small> |                        |                          |
| 芎芷散治頭風風壅                       |                        |                          |
| 川芎                             | 白芷                     | 荊芥穗                      |
| 軟石膏 <small>煨等分</small>         |                        |                          |
| 右末每服一錢食後沸湯調下                   |                        |                          |
| 香芷散治頭面諸風                       |                        |                          |
| 新白芷 <small>剉以蘿蔔汁浸日乾</small>    |                        |                          |
| 右末沸湯調食後服或以些子搐入鼻左右用             |                        |                          |
| 左屢效                            |                        |                          |

|                                |                            |                        |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 又方                             | 新白芷 <small>洗晒</small>      |                        |
| 右為末煉蜜圓彈子大每一圓食後荊芥湯嚼下妙           |                            |                        |
| 二陳湯 <small>方見暑門</small>        | 加荊芥治頭風兼治痰壅酒壅               |                        |
| 如聖餅子治偏正頭疼痛連腦項吐逆惡心耳聾目暗          |                            |                        |
| 川烏 <small>炮去皮尖</small>         | 南星                         | 川白薑 <small>各一兩</small> |
| 川芎                             | 甘草 <small>各二兩</small>      | 天麻                     |
| 防風                             | 半夏 <small>重洗去滑生各半兩</small> |                        |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷十九</small> |                            |                        |
| 右末蒸餅糊圓雞頭大捻作餅日乾每服五餅同荊           |                            |                        |
| 芥二穗細嚼薑湯下                       |                            |                        |
| 細辛湯治諸頭疼及痰厥飲厥腎厥氣厥等證但發熱者不可服      |                            |                        |
| 附子 <small>生</small>            | 烏頭 <small>生</small>        | 南星                     |
| 乾薑                             | 川芎                         | 細辛 <small>各一兩</small>  |
| 甘草 <small>三分</small>           |                            |                        |
| 右剉散每服三錢薑五片茶芽少許熟煎空心服            |                            |                        |



|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 活人書葛根湯治太陽病頸項強無汗惡風為表實             |        |
| 葛根                               | 一兩     |
| 麻黃                               | 去節三分   |
| 官桂                               |        |
| 芍藥                               |        |
| 甘草                               | 炙各半兩   |
| 右剉散每服四錢薑五片大棗一枚煎服                 |        |
| 桂枝葛根湯治太陽病頸項強汗出惡風為表虛              |        |
| 桂枝                               |        |
| 芍藥                               |        |
| 甘草                               | 各七錢    |
| 葛根                               | 一兩三錢   |
| 右剉散每服四錢薑五片大棗一枚煎服                 |        |
| 欽定四庫全書                           |        |
| 仁齋直指                             |        |
| 卷十九                              |        |
| 頭風方                              |        |
| 川芎                               |        |
| 天麻                               | 各半兩    |
| 細辛                               | 華陰者去苗土 |
| 爛石膏                              |        |
| 荊芥穗                              |        |
| 白芷梢                              |        |
| 甘草                               | 微炙各二錢  |
| 全蝎                               | 炙五箇    |
| 右末白湯或茶清調食後臨卧服消風散加蟬殼白圓子加朱砂薑汁湯下皆要藥 |        |
| 附諸方                              |        |
| 川芎散                              | 拔粹方    |
| 治偏頭痛頭風神効                         |        |

|                       |      |      |       |
|-----------------------|------|------|-------|
| 甘菊花                   | 石膏   | 川芎   | 各三錢   |
| 右為末每服一錢茶清調下一方有白僵蠶六錢生用 |      |      |       |
| 菊花茶調散治諸風頭目昏重偏正頭痛頭風鼻塞  | 菊花   | 川芎   | 荊芥穗   |
| 羌活                    | 甘草   | 白芷   | 各二兩   |
| 細辛                    | 一兩洗淨 | 防風   | 去蘆一兩半 |
| 殭蠶                    | 薄荷   | 各五錢  |       |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷十九 |      |      |       |
| 右為末每服二錢食後用茶清調下        |      |      |       |
| 又方                    | 片苓   | 酒炒五錢 | 蒼朮    |
|                       |      |      | 二錢半   |
|                       | 蒼耳   | 川芎   | 生甘草   |
| 酒黃連                   | 各一錢半 | 半夏麴  | 炒三錢半  |
| 右為末服法同前               |      |      |       |
| 附東垣頭痛論                |      |      |       |
| 金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣 |      |      |       |



者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目内眥上額交顛上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在鬲中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癰疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也如痛半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高顛之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異故太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十九



迪志文化出版有限公司出版

主少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻葛根石膏白芷為主太陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脉沉緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脉沈細麻黃附子細辛為主厥陰頭痛項痛或痰吐涎沫厥冷其脉浮緩吳茱萸湯主之諸血虛頭痛當歸川芎為主諸氣虛頭痛人參黃耆為主為主者主治也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法也氣血俱虛頭痛者於調中益氣湯中少加川芎蔓荊子細辛其効如神半夏白朮天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯厥逆頭痛藥也如溫氣在頭者以苦吐之不可熱方而治加減三五七散和劑方治八風五痺肢體不仁大治風寒入腦陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有溫痺脚氣緩弱並皆治之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷十九

山茱萸  
去核

乾薑  
泡

茯苓  
去皮各三兩



迪志文化出版有限公司出版

|                                      |                               |                              |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 細辛<br><small>半一兩</small>             | 防風<br><small>去蘆四兩</small>     | 附子<br><small>三箇半炮去皮臍</small> |
| 右為細末每服溫酒食前調服                         |                               |                              |
| 仲景麻黃湯治太陽傷寒頭痛無汗                       |                               |                              |
| 桂枝湯治太陽傷風頭痛有汗<br><small>並見傷寒門</small> |                               |                              |
| 定風餅子<br><small>方秘</small>            | 治偏正頭痛<br><small>方見傷風門</small> |                              |
| 川芎散<br><small>方聖惠</small>            | 治頭風偏正頭痛                       |                              |
| 羌活<br><small>細辛</small>              | 川芎                            |                              |
| 香附子<br><small>槐花</small>             | 甘草<br><small>炙</small>        |                              |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷十九</small>     |                               |                              |
| 石膏                                   | 荊芥穗                           | 薄荷                           |
| 菊花                                   | 茵陳                            | 防風                           |
| 右為末每服二錢茶清調食後服忌動風物                    |                               |                              |
| 清空膏治偏正頭痛年深不愈者又治風溫熱頭上壅及腦痛除血虛頭痛不治餘皆治之  |                               |                              |
| 川芎<br><small>錢五</small>              | 柴胡<br><small>錢七</small>       | 黃連<br><small>酒炒</small>      |
| 防風                                   | 羌活<br><small>各一兩</small>      | 炙甘草<br><small>一兩五錢</small>   |
| 細挺子黃芩<br><small>三兩去皮一半炒</small>      |                               |                              |

|                                                                                                                                       |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 右為末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨卧如苦頭痛每服加細辛二分痰厥頭痛脉緩減羌活防風川芎甘草加半夏一兩五錢如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱口渴此陽明頭痛只與白虎湯加吳白芷<br><small>白虎湯方見暑門</small> |                          |                          |
| 一方治傷風減風一切頭痛                                                                                                                           |                          |                          |
| 甘菊<br><small>兩一</small>                                                                                                               | 細辛<br><small>兩半</small>  | 甘草<br><small>七錢半</small> |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷十九</small>                                                                                                      |                          |                          |
| 白芷                                                                                                                                    | 香附子                      | 羌活                       |
| 薄荷<br><small>各兩</small>                                                                                                               | 荊芥<br><small>二十枚</small> | 茵陳<br><small>兩半</small>  |
| 蒼朮<br><small>浸兩</small>                                                                                                               | 川芎<br><small>各兩</small>  |                          |
| 右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下                                                                                                                |                          |                          |
| 寶鑑石膏散治頭疼                                                                                                                              |                          |                          |
| 川芎                                                                                                                                    | 石膏                       | 白芷<br><small>各等分</small> |
| 右為末每服四錢熱茶清調下                                                                                                                          |                          |                          |





|                              |  |          |  |                              |  |                                            |  |                      |  |        |  |     |  |                               |  |                                                  |  |                      |  |           |  |                       |  |                      |  |                     |  |                                                |  |           |  |
|------------------------------|--|----------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------------|--|--------|--|-----|--|-------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 豆粉丸 <small>聖惠方</small> 治風熱頭疼 |  | 川芎 細辛 甘草 |  | 白芷 豆粉 <small>各二錢半</small> 薄荷 |  | 石膏 <small>各半兩</small> 朴硝 <small>二錢</small> |  | 右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一 |  | 丸細嚼茶清下 |  | 徹清膏 |  | 蔓荊子 細辛 <small>各一分</small> 薄荷葉 |  | 川芎 <small>各二分</small> 生甘草 炙甘草 <small>各五分</small> |  | 藁本 <small>一錢</small> |  | 右為末茶清調二錢下 |  | 半夏白朮天麻湯治脾胃証已經服疎風丸下二三次 |  | 元証不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開 |  | 頭苦痛如裂四肢厥冷不得安卧此氣虛頭痛也 |  | 黃栢 <small>二分酒洗</small> 乾薑 <small>三分</small> 澤瀉 |  | 白茯苓 天麻 黃耆 |  |
|------------------------------|--|----------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------------|--|--------|--|-----|--|-------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------|--|-----------|--|-----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------|--|

|                              |  |                                               |  |                        |  |           |  |                      |  |                                                                  |  |          |  |                                                |  |                              |  |                   |  |            |  |                                               |  |                                                                     |  |                                                |  |                        |  |                      |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------|--|----------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|
| 人參 蒼朮 <small>各五分</small> 炒神麴 |  | 白朮 <small>各一錢</small> 麥芽 半夏 <small>湯洗</small> |  | 陳皮 <small>各一錢半</small> |  | 右每服五錢水煎熱服 |  | 順氣和中湯治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈 |  | 黃耆 <small>一錢半</small> 人參 <small>一錢</small> 甘草 <small>炙七分</small> |  | 白朮 陳皮 當歸 |  | 芍藥 <small>各二分</small> 升麻 柴胡 <small>各一分</small> |  | 細辛 蔓荊子 川芎 <small>各二分</small> |  | 右作一服水煎食後服亦治氣血俱虛頭痛 |  | 安神湯治頭旋眼黑頭痛 |  | 羌活 <small>一兩</small> 防風 <small>二錢半</small> 柴胡 |  | 升麻 <small>各半兩</small> 黃蘗 <small>酒製一兩</small> 知母 <small>酒製一兩</small> |  | 生地黄 <small>半兩</small> 黃耆 <small>二兩</small> 炙甘草 |  | 生甘草 <small>各二錢</small> |  | 右件每服秤半兩水二盞煎至一盞半加蔓荊子半 |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------|--|----------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|----------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|



|                  |          |                             |          |                                     |                 |     |                     |                                                                                                            |    |                          |    |          |               |          |                          |                              |                 |                    |
|------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|----------|---------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 錢川芎三分再煎至一盞去滓臨卧熱服 | 芎歸湯治血虛頭痛 | 川芎<br>當歸 <small>各等分</small> | 右每服五錢水煎服 | 調中益氣湯治氣血俱虛頭痛<br><small>方見脾胃</small> | 內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分 | 眉眶痛 | 丹溪云眉眶痛者屬風熱與痰作風痰治類痛風 | 欽定四庫全書<br><br>仁齋直指<br>卷十九 | 一方 | 黃芩<br><small>酒浸炒</small> | 白芷 | 右為末茶清調二錢 | 選奇湯治眉骨痛不可忍大有効 | 羌活<br>防風 | 甘草<br><small>各二錢</small> | 酒黃芩<br><small>一錢冬月不用</small> | 右每服三錢水一鍾煎七分食後溫服 | 一方治頭痛連眼痛此風痰上攻須用白芷開 |
|------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|----------|---------------|----------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|



|     |    |    |    |    |    |    |       |                                                                                                              |         |
|-----|----|----|----|----|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 雨前茶 | 川芎 | 白芷 | 防風 | 藁本 | 細辛 | 當歸 | 右用水煎服 | 欽定四庫全書<br><br>仁齋直指<br>卷十九 | 仁齋直指卷十九 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|



欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷二十

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張紹鼎

欽定四庫全書

仁齋直指卷二十

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

眼目

眼目方論

眼者五臟六腑之精華如日月麗天著明而不可掩者  
也其首尾赤眚屬心其滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬  
肝其上下肉胞屬脾而中間黑瞳一點如漆者腎實主

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十

之是雖五臟各有證應然論其所主則瞳子之關係重  
焉何以言之目者肝之外候也肝取木腎取水水能生  
木子肝母腎焉有子母而能相離者哉故肝腎之氣充  
則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙暈眩烏輪赤暈刺痛  
浮漿此肝熱也膽生清淚枯黃遠睛此肝虛也瞳人開  
大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也  
一虛一實以此驗之然人知肝腎之氣相依而行孰知  
心者神之舍又所以為肝腎之副焉所謂一而二二而



三者也何則心主血肝藏血血能生熱凡熱衝發於眼皆當清心涼肝又不可固執水生木之說特眼者輕膜裏水照徹四方邇源反本非天一之水又果孰為之主宰乎析而論之則拘急牽颺瞳青胞白癢而清淚不赤不疼是之謂風眼烏輪突起胞硬腫紅眇淚濕漿裏熱刺痛是之謂熱眼眼渾而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澁微赤是之謂氣眼其或風與熱并則癢而浮赤風與氣搏則癢澁昏沉血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十

類氣血不至故有眇視胞垂雀眼盲障之形淡紫而隱紅者為虛熱鮮紅而妬赤者為實熱兩眦呈露生胬肉者此心熱血旺白睛紅膜如紙傘者此氣滯血凝熱證瞳人內湧白睛帶濕色浮而赤也冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼熱經久復為風冷所乘則赤爛眼中不赤但為痰飲所注則作疼肝氣不順而挾熱所以羞明熱氣蓄聚而傷飽所以胞合吁此外證之大概然爾五臟不可闕一脾與肺獨無預何耶曰白睛帶赤或

紅筋者其熱在肺上胞下胞或目唇間如疥點者其熱在脾脾主味也五味之秀養諸中則精華發見於外肺主氣也水火升降榮衛流轉非氣孰能使之前所謂五臟各有證應者於此又可推矣雖然眼之為患多生於熱其間用藥大抵以清心涼肝調血順氣為先有如腎家惡燥設遇虛證亦不過以當歸地黃輩潤養之輕用溫藥不可也況夫肺能發燥肝亦好潤古方率用杏仁柿乾飴糖砂蜜為佐果非潤益之意乎至於退翳一節

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十

尤關利害凡翳起於肺家受熱輕則朦朧重則生翳真珠翳狀如碎米者易散梅花翳狀如梅花葉者難消雖翳自熱生然治法先退翳而後退熱者謂熱極生翳若先去赤熱則血為之水而翳不能去其有赤眼與之涼藥過多又且滌之以水不反掌而冰凝眼特一團水耳水性清澄尤不可規規於點洗喜怒失節嗜慾無度窮役眼力泣涕過傷凌寒衝風當暑冒日不避煙火飲啖熱多此皆患生于腑臟者也專事點洗可乎哉有能靜



|                                                       |     |                           |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 坐澄神愛護目力放懷息慮心逸日休調和飲食以養之斟酌藥餌以平之明察秋毫斷可必矣諺曰眼不點不害耳不幹不聾請以為戒 |     | <small>風眼腫則軟熱眼腫則硬</small> |
| 眼目證治                                                  |     |                           |
| 人參羌活散治風眼熱眼澁癢昏朦                                        |     |                           |
| 羌活                                                    | 獨活  | 柴胡                        |
| 人參                                                    | 川芎  | 枳殼 <small>炒 麸</small>     |
| 茯苓 <small>各半兩</small>                                 | 前胡  | 北梗                        |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十</small>                        |     |                           |
| 天麻                                                    | 地骨皮 | 甘草 <small>炙 各二錢半</small>  |
| 右末每服一錢半荊芥煎湯調下                                         |     |                           |
| 菊花散 <small>方在後</small> 夾和亦得                           |     |                           |
| 敗毒散 <small>方見傷寒類</small> 加荊芥性效同                       |     |                           |
| 消風散 <small>方見頭風門</small> 治眼風癢昏澁荊芥煎湯下                  |     |                           |
| 治眼壅熱赤腫方                                               |     |                           |
| 山茵陳                                                   | 車前子 |                           |
| 右煎湯下本門川芎茶調散通用食後臨卧服                                    |     |                           |

|                                 |                        |                            |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 磨光散治諸風攻眼消磨翳膜                    |                        |                            |
| 沙苑蒺藜 <small>形如羊腎慢火畧炒杵去刺</small> | 防風                     |                            |
| 羌活                              | 甘草 <small>鹽水炙</small>  | 石決明 <small>搗碎飛過水</small>   |
| 草決明                             | 蟬蛻 <small>去足</small>   | 蛇皮 <small>剪碎和麻油新瓦炒</small> |
| 川芎 <small>各半兩</small>           | 甘菊                     |                            |
| 右末每一錢半用麥門冬去心煎湯下食後臨卧服            |                        |                            |
| 菩薩散治風毒攻眼昏淚颰癢                    |                        |                            |
| 蒼朮 <small>日換童尿浸二宿挫晒</small>     | 防風                     |                            |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十</small>  |                        |                            |
| 白蒺藜 <small>炒搗去刺各二兩</small>      | 荊芥穗 <small>一兩半</small> |                            |
| 甘草 <small>鹽水炙七錢半</small>        |                        |                            |
| 右末每服一錢入鹽少許沸湯點下或用消風散夾和尤佳         |                        |                            |
| 羌活散治風氣攻眼昏澁淚花                    |                        |                            |
| 羌活                              | 川芎                     | 天麻                         |
| 旋覆花                             | 甘菊                     | 藁本                         |
| 防風                              | 蟬殼 <small>洗晒</small>   | 細辛                         |





|                                                |                                |                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 杏仁<br><small>浸去皮<br/>各一兩</small>               | 甘草<br><small>半兩<br/>炙</small>  | 右為末每二錢新水畧煎服                        |
| 菊花散治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜                               | 蟬殼<br><small>去足</small>        | 木賊<br><small>去節童尿<br/>浸一宿晒</small> |
| 白蒺藜<br><small>炒去刺</small>                      | 荊芥穗                            |                                    |
| 羌活<br><small>各三兩</small>                       | 甘草<br><small>去萼<br/>四兩</small> |                                    |
| 甘草<br><small>炙各<br/>二兩</small>                 |                                |                                    |
| 右末每服二錢食後茶清下                                    |                                |                                    |
| 白蒺藜散治腎經風毒攻眼昏淚澁癢                                |                                |                                    |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十                                |                                |                                    |
| 白蒺藜<br><small>炒搗<br/>去刺</small>                | 防風                             | 甘草                                 |
| 生直僵蠶<br><small>炒去絲<br/>各一兩</small>             |                                |                                    |
| 白南星<br><small>一兩半用黑豆二合青鹽<br/>半兩水煮透焙去鹽豆</small> |                                |                                    |
| 甘菊<br><small>去萼<br/>兩半</small>                 |                                |                                    |
| 右末每二錢沸湯少鹽點下                                    |                                |                                    |
| 開明散風毒氣眼朦澁障膜通用                                  |                                |                                    |
| 蒺藜<br><small>炒去刺</small>                       | 防風                             | 羌活                                 |
| 川芎                                             | 天麻                             | 茯苓                                 |



|                                           |                                     |                                    |                                  |     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 蟬殼<br><small>去足</small>                   | 蒼朮<br><small>童尿浸一宿<br/>焙各半兩</small> | 華陰細辛                               | 荊芥                               | 荒蔚子 |
| 甘草<br><small>炙各<br/>一分</small>            | 甘菊<br><small>去萼<br/>二兩</small>      | 右末每二錢鹽一點食後沸湯調下                     |                                  |     |
| 海明散治風眼昏淚翳膜                                | 川芎<br><small>一兩</small>             | 蒼朮<br><small>童尿浸一<br/>宿去皮焙</small> | 木賊<br><small>去節童<br/>尿浸晒</small> |     |
| 蟬殼<br><small>洗晒</small>                   | 蛇皮<br><small>皂角水洗<br/>新瓦焙</small>   | 羌活                                 |                                  |     |
| 防風                                        | 荒蔚子                                 | 楮實                                 |                                  |     |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十                           |                                     |                                    |                                  |     |
| 地骨皮                                       | 荊芥穗                                 | 旋覆花                                |                                  |     |
| 白蒺藜<br><small>炒去刺</small>                 | 爛石膏                                 | 細辛                                 |                                  |     |
| 杏仁<br><small>浸去<br/>皮晒</small>            | 甘草<br><small>鹽水炙<br/>各半兩</small>    | 全蝎<br><small>五枚</small>            |                                  |     |
| 右細末每服一錢半食後臨卧服或秦皮煎湯下                       |                                     |                                    |                                  |     |
| 蟬花無比散治風眼氣眼昏淚癢翳膜或頭風牽引眼                     |                                     |                                    |                                  |     |
| 小胞爛                                       |                                     |                                    |                                  |     |
| 石決明<br><small>用東流水入鹽煮<br/>一伏時搗研如粉</small> | 當歸                                  |                                    |                                  |     |
| 防風                                        | 羌活<br><small>各三兩</small>            | 蟬殼<br><small>洗晒</small>            |                                  |     |



|                             |                                   |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 甘草<br><small>炙各二兩</small>   | 蛇皮<br><small>皂角水洗新瓦焙</small>      | 荊芥                         |
| 細辛<br><small>各一兩</small>    | 茯苓<br><small>四兩</small>           | 蒺藜<br><small>炒去刺八兩</small> |
| 芍藥                          | 蒼朮<br><small>童尿浸二宿去皮切晒各十兩</small> |                            |
| 右細末每二錢食後米泔茶清任下              |                                   |                            |
| 蟬花散治風眼熱眼昏澁腫疼漸生翳膜            |                                   |                            |
| 蟬殼<br><small>洗晒</small>     | 甘菊                                | 川芎                         |
| 防風                          | 羌活                                | 山梔仁                        |
| 白蒺藜<br><small>炒去刺</small>   | 草決明<br><small>炒</small>           | 荊芥穗                        |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十             |                                   |                            |
| 蔓荊子                         | 穀精草<br><small>洗晒</small>          | 蜜蒙花                        |
| 木賊<br><small>去節童尿浸晒</small> | 蒼朮<br><small>米泔浸焙</small>         | 甘草<br><small>炙等分</small>   |
| 右末每二錢食後米泔茶清任下               |                                   |                            |
| 治眼流氣飲治風熱攻眼赤腫                |                                   |                            |
| 荊芥穗                         | 梔子仁                               | 牛蒡子<br><small>炒</small>    |
| 蔓荊子                         | 甘菊                                | 細辛                         |
| 甘草<br><small>炙</small>      | 防風                                | 白蒺藜<br><small>炒去刺</small>  |
| 玄參                          | 川芎                                | 大黃                         |

|                               |                       |                      |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 黃芩                            | 木賊                    | 草決明                  |
|                               | <small>去節童尿浸晒</small> | <small>各一兩</small>   |
| 蒼朮                            | 右末每服二錢食後臨卧紫蘇煎湯調下或蜜湯下  |                      |
| <small>米泔浸一宿焙二兩</small>       |                       |                      |
| 千金漏蘆湯治熱眼赤腫朦霧                  | 漏蘆                    | 黃芩                   |
| 白及                            |                       |                      |
| 麻黃                            | 川升麻                   | 芍藥                   |
| <small>去節</small>             |                       |                      |
| 白微                            | 枳殼                    | 大黃                   |
|                               | <small>炒麩</small>     |                      |
| 甘草                            | 右粗末每三錢新水煎熱服以通利為度      |                      |
| <small>炙等分</small>            |                       |                      |
| <small>欽定四庫全書</small>         |                       |                      |
| <small>仁齋直指</small>           |                       |                      |
| <small>卷二十</small>            |                       |                      |
| 八珍飲治熱眼腫痛                      |                       |                      |
| 車前子                           | 龍膽草                   | 穀精草                  |
| 仙靈脾                           | 威靈仙                   | 藁本                   |
|                               |                       | <small>各半兩</small>   |
| 荊芥穗                           | 秦皮                    | 甘草                   |
|                               |                       | <small>炙各二錢半</small> |
| 右細剉每服二錢食後煎服                   |                       |                      |
| 黃連解毒湯治諸熱眼赤腫羞明胃暑飲酒患眼通用         |                       |                      |
| 黃連                            |                       |                      |
| <small>去鬚搗碎色紅者隨意新水浸半日</small> |                       |                      |



|                |            |                 |          |             |                   |                |                  |                       |                      |                |      |                 |           |                |                                       |                     |
|----------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------|-----------------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| 右以磁碗盛重湯煖食後服滓再煖 | 瀉肝散治肝熱赤眼腫痛 | 梔子仁<br>荊芥<br>大黃 | 甘草<br>等分 | 右剉每服二錢水煎食後服 | 洗肝散肝盛風熱攻眼赤腫眵淚浮霧蔽明 | 當歸<br>川芎<br>防風 | 羌活<br>山梔仁<br>薄荷葉 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十 | 大黃<br>焙<br>甘草<br>炙等分 | 右末每服二錢食後荊芥泡湯調下 | 治眼痛方 | 當歸鬚<br>木賊<br>華撥 | 右末茶水調舌浸出涎 | 消毒麻仁圓治肝熱風毒攻眼赤痛 | 大黃<br>生五兩<br>山梔仁<br>十兩<br>杏仁<br>去皮晒二兩 | 右末煉蜜圓桐子大每服三四十圓臨卧溫湯下 |
|----------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------|-----------------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------------------|

|                |                         |                |                       |           |               |                       |                                    |                       |                 |           |                 |             |                           |                        |                         |                          |
|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 龍膽散治肝熱烏睛浮腫赤暈昏疼 | 龍膽草<br>梔子仁<br>錢各二<br>防風 | 川芎<br>玄參<br>荊芥 | 山茵陳<br>甘菊<br>去毒<br>楮實 | 甘草<br>各一錢 | 右末每服一錢半食後茶清調下 | 和劑流氣飲加川芎治氣眼浮軟上壅朦朧加蒺藜治 | 風眼牽輓昏淚澀癢<br>方見服滿類<br>調消風散尤佳<br>方見頭 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十 | 楮實散治肝熱生翳亦治氣翳細點者 | 楮實子<br>細研 | 右以蜜湯調下食後服亦治小兒翳眼 | 遠志圓清心益肝明目退翳 | 人參<br>茯神<br>去木<br>蘆薈<br>研 | 琥珀<br>蔓荊子<br>各半兩<br>川芎 | 生地黄<br>熟地黄<br>洗焙<br>羌蔚子 | 蟬殼<br>洗晒各一兩<br>車前子<br>細辛 |
|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 白蒺藜<br><small>刺 炒去</small> | 遠志<br><small>水浸去心晒乾薑汁蘸焙各七錢半</small> |
| 全蝎<br><small>伍枚</small>    | 右細末煉蜜圓桐子大每五十圓空心粥飲下臨卧                |
| 石菖蒲湯下                      | 麥黃湯治熱眼赤痛                            |
| 車前子                        | 麥門冬<br><small>去心</small>            |
| 右剉每服三錢新水入蜜同煎食後服加川芎尤好       | 生地黃<br><small>洗晒等分</small>          |
| 生地黃圓明目活血消去瘀肉               | 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷二十</small>    |
| 人參                         | 防風<br><small>各半兩</small>            |
| 川芎                         | 生地黄                                 |
| 全蝎<br><small>五尾</small>    | 乾白蒺藜<br><small>炒去刺各一兩</small>       |
| 右晒為末煉蜜圓桐子大每五十圓食後薄茶下加       |                                     |
| 羚羊角半兩尤佳                    |                                     |
| 朱僧熱翳方                      |                                     |
| 蟬殼<br><small>洗晒半兩</small>  | 蒺藜<br><small>炒搗去刺半兩</small>         |
| 羌活                         | 木賊<br><small>去節童尿浸一宿晒</small>       |
|                            | 防風                                  |
|                            | 川芎                                  |

|                               |                                                   |                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 細辛                            | 秦皮                                                | 楮實                         |
| 荊芥                            | 藁本                                                | 甘菊                         |
| 甘草<br><small>各二錢半</small>     | 右末每服一錢薄茶調下                                        | 道人開障散治諸障翳                  |
| 蛇退<br><small>洗焙</small>       | 蟬退<br><small>洗焙</small>                           | 黃連<br><small>去鬚各半兩</small> |
| 綠豆<br><small>一兩</small>       | 甘草<br><small>生二錢</small>                          | 右剉細每服二錢食後臨卧新水煎服            |
| 杏仁方治肝腎風虛瞳人帶青潤澤臟腑洗垢開光能         | 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷二十</small>                  | 驅風明目                       |
| 真杏仁<br><small>水浸五枚去皮尖</small> | 右五更初就床端坐勿言勿唾息慮澄神嚼杏仁一粒勿嚥逐一細嚼至五粒俟津液滿口分為三嚥直入肝腎惟在久而成功 | 花草膏治患眼腫痛澁癢昏淚羞明             |
| 羯羊膽<br><small>一枚飯上蒸熟</small>  |                                                   |                            |



右以冬蜜研和入朱砂末少許頻研成膏食後臨卧匙抄少許含嚥亦可點目

夏枯草散治眼痛痒翳膜

夏枯草

大香附  
杵淨童尿浸一宿晒

木賊  
去節童尿浸晒

蠶退紙  
炒焦存性 細辛

連翹

川芎 當歸鬚

赤芍藥

蟬殼  
洗晒各半兩 甘草  
微炙

腦荷  
各二錢半

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十

右末每二錢茶清米泔任下無蠶紙以夜明砂代用

神授錢太師方治一切眼疾昏翳通用

木賊  
去節童尿浸一宿晒

甘草  
生 川芎

穀精草  
炒杵去刺

蟬殼  
洗

荊芥 羌活 防風

旋覆花 蜜蒙花  
等分

右末每二錢秦皮煎湯調下

鹽末散治内外障

蒼朮  
四兩日換米泔浸七日刮去皮細切入青鹽一兩同炒黃去鹽不用

木賊  
去節二兩童尿浸一宿晒

右搗為末每一錢溫米泔調下或滲入飲食中任服

仙木飲治眼中翳膜

蒼朮  
童尿換浸二宿洗淨晒乾一兩一分

木賊  
去節童尿浸一宿晒

蟬殼  
去足 白蛇皮  
皂角水洗焙

白蒺藜  
炒去刺

穀精草 防風 羌活

川芎 杏仁  
去皮

甘草  
生焙各一分

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十

右末每一錢食後蜜湯調下

觀音圓治内外障失明或欲結青光内障或赤脉疼痛

悉療之

血竭 熊膽  
研各二錢

人參

蛇退  
皂角水洗新瓦焙各半兩

木賊  
去節童尿浸晒

蒼朮  
童尿浸二宿晒 威靈仙

鷹爪黃連  
去鬚

地骨皮  
洗晒

蔓荊子 茺蔚子

車前子 川芎 當歸





|                                                            |                                       |                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 羌活                                                         | 蟬退<br><small>洗晒</small>               | 石決明<br><small>煨存半生<br/>各一兩</small> |
| 蠶退紙<br><small>二十幅<br/>炒焦</small>                           |                                       |                                    |
| 右細末用羯羊肝一具去筋膜慢火煮半生熟帶血性和藥同搗以粟米粉用肝汁煮糊圓桐子大每七八十圓溫米泔下或石菖蒲煎湯下食後常服 |                                       |                                    |
| 羊肝圓解熱消血明目                                                  |                                       |                                    |
| 黃連<br><small>淨為末<br/>二兩</small>                            | 杏仁<br><small>去皮<br/>半兩</small>        | 白羊子肝一具<br><small>去筋膜</small>       |
| 右件白內搗細衆手圓桐子大每七十粒食後臨卧                                       |                                       |                                    |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十                                      |                                       |                                    |
| 溫米泔下日三服                                                    |                                       |                                    |
| 大仙飲治內外障翳目睛疼痛                                               |                                       |                                    |
| 石決明<br><small>煨存<br/>半生</small>                            | 明爛石膏<br><small>生</small>              | 川芎                                 |
| 木賊<br><small>去節童尿浸一夜<br/>各一兩</small>                       | 杏仁<br><small>浸去皮<br/>半兩</small>       |                                    |
| 甘草<br><small>炙二錢</small>                                   |                                       |                                    |
| 右細末每二錢燈心薄荷少許煎服食後臨卧                                         |                                       |                                    |
| 前麓開翳散治眼生翳障神效                                               |                                       |                                    |
| 白蒺藜<br><small>炒搗<br/>去刺</small>                            | 蒼朮<br><small>洗童尿換浸二宿<br/>晒各一兩</small> |                                    |

|                                          |                                               |                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 蟬殼<br><small>洗晒</small>                  | 蛇退<br><small>去頭尾及脊上一線皮不堪用<br/>皂角水洗新瓦焙</small> |                                |
| 菜花蛇皮                                     | 好川芎                                           | 杏仁<br><small>水浸<br/>去皮</small> |
| 防風                                       | 羌活                                            | 白芷<br><small>各半兩</small>       |
| 華陰細辛                                     | 獨活<br><small>各四錢</small>                      | 白附子<br><small>生</small>        |
| 明爛石膏                                     | 荊芥穗                                           | 真蚌粉<br><small>各三錢</small>      |
| 右細末每服一錢半沸湯點茶清調以舌浸於藥中良久毒涎自出又別換藥食後臨卧服仍用點翳膏 |                                               |                                |
| 真珠退翳散                                    |                                               |                                |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十                    |                                               |                                |
| 白澤石膏                                     | 烏賊骨                                           | 真蚌粉<br><small>等分</small>       |
| 小珠<br><small>少許</small>                  |                                               |                                |
| 右細末每一錢第二米泔調食後臨卧常服                        |                                               |                                |
| 退翳散治眼中翳膜瘡豆翳眼通用                           |                                               |                                |
| 真蛤粉<br><small>研一兩</small>                | 細穀精草<br><small>日乾細末一兩</small>                 |                                |
| 右夾和每服二錢生猪肝三指大竹刀切開藏藥捲束麻繩扎米泔一椀煮肝熟食後臨卧細嚼以汁下 |                                               |                                |
| 五退散治內障眼                                  |                                               |                                |



|                            |                            |                         |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 蟬退                         | 蛇退                         | 蠶紙                      |
| 烏雞卵殼                       | 男子髮等分                      |                         |
| 右夾燒存性研細末每一錢和羊肝湯喫不時常服       |                            |                         |
| 還睛圓治眼目昏翳                   |                            |                         |
| 蟬殼 <small>洗曬</small>       | 蒼朮 <small>童尿換浸</small>     | 熟地黄 <small>洗焙</small>   |
| 川芎                         | 白蒺藜 <small>炒杵去刺</small>    |                         |
| 茺蔚子                        | 羌活                         | 防風                      |
| 木賊 <small>去節童尿浸一宿晒</small> | 甘菊                         | 荊芥                      |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十            |                            |                         |
| 蔓荊子                        | 杏仁 <small>浸去皮焙</small>     | 兔絲子 <small>研酒浸</small>  |
| 石決明 <small>煨各半生</small>    | 蛇皮 <small>酒浸洗淨焙各半兩</small> |                         |
| 右細末煉蜜圓彈子大每一圓食後細嚼茶下         |                            |                         |
| 明眼生熟地黄圓治腎氣衰弱肝受虛熱眼生黑花       |                            |                         |
| 生地黃                        | 熟地黄 <small>各一斤半</small>    | 淨石斛 <small>炒</small>    |
| 枳殼 <small>麸炒各六兩</small>    | 羌活                         | 防風                      |
| 牛膝 <small>各四兩</small>      | 甘菊 <small>去萼一斤</small>     | 杏仁 <small>去皮焙十兩</small> |
| 右末煉蜜圓桐子大每五十粒空心食前鹽湯下或       |                            |                         |

|                                        |                                |                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 蒺藜煎湯下                                  |                                |                         |
| 駐景圓治肝腎俱虛眼目昏翳                           |                                |                         |
| 兔絲子 <small>酒浸研五兩</small>               | 熟地黄 <small>洗曬</small>          | 車前子 <small>各三兩</small>  |
| 右末煉蜜圓桐子大每五十粒食前鹽湯下或白茯苓石菖蒲煎湯下本方加枸杞子一兩半尤佳 |                                |                         |
| 山藥圓 <small>見漏濁門</small>                | 駐景圓明眼地黄圓菊睛圓 <small>見本門</small> |                         |
| 右四藥夾和每服百粒食前鹽湯下或大流氣飲下                   |                                |                         |
| 治腎虛瞳人開大淡白昏矇凡人五更初腎氣開纔                   |                                |                         |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十                        |                                |                         |
| 一言語咳唾腎氣即合當腎開時靜默進前藥百粒                   |                                |                         |
| 功效勝常                                   |                                |                         |
| 菊睛圓治肝腎氣虛日暗黑花                           |                                |                         |
| 茯苓 <small>酒浸洗二兩</small>                | 枸杞子 <small>三兩</small>          | 甘菊 <small>去萼四兩焙</small> |
| 川巴戟 <small>去心酒浸晒一兩</small>             |                                |                         |
| 右細末煉蜜圓桐子大每五七十粒食前鹽湯下余                   |                                |                         |
| 太宰方加熟地黄二兩淨或用駐景圓對交服                     |                                |                         |
| 千金神麴圓升降水火明眼目血心腎                        |                                |                         |



|                                                   |                     |     |          |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| 磁石                                                | 燒紅碎法醋以碎為度<br>研細無聲二兩 | 朱砂  | 一兩<br>研細 |
| 神麴                                                | 炒二兩                 | 加沈香 | 半兩       |
| 右細末別用生神麴水調濃煮糊圓桐子大每服三十粒空心鹽湯下磁石法水入腎朱砂法火入心濟以沈香是則升降水火 |                     |     |          |
| 湯泡散治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸形翳膜                                |                     |     |          |
| 當歸                                                | 赤芍藥                 | 黃連  | 去鬚等分     |
| 右末每用二錢極沸湯泡乘熱先熏後洗冷則再煖用日兩三次又方沸湯入白鹽少許閉目沃洗鹽亦散血        |                     |     |          |
| 水淋法治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中頻數換水眼睛自入仍以麥門冬桑白皮山梔仁煎湯通口服之         |                     |     |          |
| 黃連滴眼方治熱眼赤腫疼痛                                      |                     |     |          |
| 鷹爪黃連                                              | 淨二錢                 | 乾艾葉 | 少許       |
|                                                   |                     | 真杏仁 | 一箇<br>去皮 |
| 右同搗碎新汲水浸一日夜濾清汁仰臥以帛蘸滴入眼中鼻內見苦味即藥透也或新水浸黃連磁器          |                     |     |          |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十



迪志文化出版有限公司出版

|                            |         |               |      |
|----------------------------|---------|---------------|------|
| 盛重湯桃濃汁以熟艾燒存性入藥用            |         |               |      |
| 滌風散治風毒攻眼赤腫癢疼               |         |               |      |
| 黃連                         | 去鬚      | 蔓荊子           | 各半兩  |
|                            |         | 五倍子           | 三錢   |
| 右剉細分三次新水煎濾清汁以手沃洗效          |         |               |      |
| 立消膏治浮翳粟翳霧膜遮睛               |         |               |      |
| 雪白鹽                        | 淨器中生研少許 |               |      |
| 右以大燈草蘸鹽輕手指定浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐屢效 |         |               |      |
| 薑液膏治眼風癢冷淚爛眩有虫              |         |               |      |
| 生薑母                        | 一塊      | 以銀簪插入即拔出點眼頭尾效 |      |
| 南鵬砂散治胬肉瘵突                  |         |               |      |
| 南鵬砂                        | 黃色      | 腦子            | 少許研細 |
| 右以燈草蘸點其上玄參麥門冬煎湯調洗心散服       |         |               |      |
| 爛眩方治爛眩風綠色爐甘石燒紅淬童尿凡三次出      |         |               |      |
| 火毒一日夜研細末夾黃連末用童尿浸取清汁點眼      |         |               |      |
| 胞仍取覆盆子軟葉入男兒乳汁研為圓置眼眥頭引      |         |               |      |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十



迪志文化出版有限公司出版

虫自出

甘石散治風眼流淚不止

綠爐甘石 烏賊骨 等分

右細末入腦少許點目井口淚自收二藥燥腦和之

前麓點翳膏

朱砂 二錢 南鵬砂 一錢半 蕤仁 二十一粒用抄紙去油乾為度

真珠 爛石膏 各半 熊膽 一字

麝 少許

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十

右細末用冬蜜研和於硃內蒸得粘入角罐收用時

煎秦皮汁調銅筋點於眼背頭淚出為效

傳眼方治患眼赤腫閉合

土朱 二分 爛石膏 一分

右末新水入蜜調傳眼頭尾及太陽處仍以山梔煎

湯調治眼流氣飲服一泄而愈 方見前

雀盲散治遇夜目不能視建昌軍螺兒蚌粉三錢為末

雄猪肝一葉竹刀披開納蚌粉於中麻線扎第二米泔

煮七分熟又別蘸蚌粉細嚼以汁送下無蚌粉以夜明砂代用夜明砂治內外障纏入猪肝煮帶生和汁細嚼效

治偷針方脾間積熱兼宿食不消則偷針秦皮剉細夾砂糖水煎調大黃末少許利之

鱖血方治小兒豆瘡入眼生翳鱖魚繫其尾而垂之從項下割破些少取生血點翳白鱖尤佳若翳已凝即用

南鵬砂以燈心蘸點仍用威靈仙仙靈脾洗晒等為末

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十

每一錢第二米泔調服

通關散

細辛 川芎 腦荷

蔓荊子 等分

右為末每半錢搐入鼻又頭風門消風散加細辛皆

可通關 小兒泔眼不開 諸方論在後

附諸方

石膏羗活散 宣明 治久患雙目不覩光明遠年近日內



|                                          |  |                                  |  |                       |  |                     |  |
|------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|
| 外氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾                           |  | 羌活                               |  | 蜜蒙花                   |  | 木賊                  |  |
| <small>治腦熱頭風</small>                     |  | <small>治羞明怕日</small>             |  | <small>治羞明障翳</small>  |  | <small>治目中瘡</small> |  |
| 香白芷                                      |  | 乾菜子                              |  | 荊芥穗                   |  |                     |  |
| <small>清利頭目</small>                      |  | <small>起拳毛</small>               |  | <small>治頭風</small>    |  |                     |  |
| 細辛                                       |  | 蘇子                               |  | 川芎                    |  |                     |  |
| <small>二味起倒睫</small>                     |  | <small>去明目</small>               |  | <small>治頭風</small>    |  |                     |  |
| 蒼朮                                       |  | 甘菊花                              |  | 石膏                    |  |                     |  |
| <small>閉鬱行氣</small>                      |  | <small>治偏正風</small>              |  | <small>和諸藥各等分</small> |  |                     |  |
| 黃芩                                       |  | 藁本                               |  | 甘草                    |  |                     |  |
| <small>二味洗心退熱</small>                    |  | <small>治偏正風</small>              |  | <small>和諸藥各等分</small> |  |                     |  |
| 右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或茶清亦可日進三服至十日漸明至二十日大 |  |                                  |  |                       |  |                     |  |
| 驗此方醫數十餘人矣後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄荷葉防風天麻桔梗        |  |                                  |  |                       |  |                     |  |
| <small>秘方</small>                        |  | <small>治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛</small> |  |                       |  |                     |  |
| 上清丸                                      |  | 羚羊角                              |  | 犀角                    |  | 黃連                  |  |
| <small>治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛</small>         |  | <small>各一兩</small>               |  | <small>各一兩</small>    |  | <small>各一兩</small>  |  |
| 厚朴                                       |  | 牛黃                               |  | 黃芩                    |  |                     |  |
| <small>各一兩</small>                       |  | <small>各一兩</small>               |  | <small>各一兩</small>    |  |                     |  |
| 川芎                                       |  | 羌活                               |  | 蟬退                    |  |                     |  |
| <small>各一兩</small>                       |  | <small>各一兩</small>               |  | <small>各一兩</small>    |  |                     |  |
| 白芷                                       |  | 菊花                               |  | 大黃                    |  |                     |  |
| <small>各一兩</small>                       |  | <small>各一兩</small>               |  | <small>各一兩</small>    |  |                     |  |
| 防風                                       |  | 草決明                              |  | 地膚子                   |  |                     |  |
| <small>各一兩</small>                       |  | <small>各一兩</small>               |  | <small>各一兩</small>    |  |                     |  |

|                    |  |                      |  |                                   |  |
|--------------------|--|----------------------|--|-----------------------------------|--|
| 滑石                 |  | 生地黄                  |  | 熟地黄                               |  |
| <small>各五錢</small> |  | <small>各七錢</small>   |  | <small>各七錢</small>                |  |
| 牽牛                 |  | 右為末煉蜜丸如梧桐子大          |  |                                   |  |
| <small>八錢半</small> |  | <small>清神益氣湯</small> |  | <small>治因脾胃虛損黃證之人誤服瀉肝散致目疾</small> |  |
| <small>東垣方</small> |  | <small>升麻</small>    |  | <small>陳皮</small>                 |  |
| 茯苓                 |  | 生甘草                  |  | 芍藥                                |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |
| 五味子                |  | 麥門冬                  |  | 澤瀉                                |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |
| 蒼朮                 |  | 防風                   |  | 黃柏                                |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |
| 青皮                 |  | 人參                   |  | 生薑                                |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |
| 右剉水煎服              |  | 救苦湯治赤腫苦痛             |  |                                   |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |
| 桂枝                 |  | 連翹                   |  | 紅花                                |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |
| 細辛                 |  | 歸身                   |  | 甘草                                |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |
| 蒼朮                 |  | 草龍膽                  |  | 羌活                                |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |
| 黃芩                 |  | 麻黃                   |  | 柴胡                                |  |
| <small>各一兩</small> |  | <small>各一兩</small>   |  | <small>各一兩</small>                |  |



|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 防風                   | 藁本   | 黃連         |
| 黃栢                   | 生地黄  | 知母         |
| 芍藥                   | 錢二   | 錢一         |
| 右剉水煎服                |      |            |
| 經驗神仙退雲丸治一切翳暈內外障昏無睛屢効 |      |            |
| 川歸                   | 川芎   | 木賊         |
|                      |      | 半各一兩<br>去節 |
| 犀角                   | 枳實   | 黃連         |
| 蟬退                   | 薄荷   | 瓜蒌根        |
|                      | 兩各半  | 錢六         |
| 欽定四庫全書               | 仁齋直指 | 卷二十        |
| 甘菊                   | 蛇退   | 蜜蒙花        |
| 荆芥                   | 地骨皮  | 白蒺藜        |
|                      | 兩各三  |            |
| 乾地黄                  | 兩二   |            |
| 右蜜為丸飲下婦人當歸湯下有氣木香湯下   |      |            |
| 羊肝丸治一切目病不間障盲         |      |            |
| 黃連                   | 白乳羊肝 | 甘菊         |
| 兩一                   |      |            |
| 防風                   | 薄荷   | 荆芥         |
| 羌活                   | 川芎   | 川歸         |
|                      |      | 錢各二        |

|                      |      |                  |
|----------------------|------|------------------|
| 右為末羊肝杵丸水下            |      |                  |
| 助陽和血補氣湯              | 衛生寶鑑 | 治眼發後上熱白睛紅多眼淚     |
| 無疼痛而癰澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能 |      |                  |
| 通九竅故眼昏花不明宜助陽和血補氣     |      |                  |
| 防風                   | 黃耆   | 甘草               |
| 分七                   | 錢二   | 灸                |
| 蔓荊子                  | 當歸身  | 白芷               |
| 錢各一                  |      |                  |
| 升麻                   | 柴胡   |                  |
|                      | 分各五  |                  |
| 右咬咀作一服水一鍾半煎一鍾臨卧通口服忌風 |      |                  |
| 欽定四庫全書               | 仁齋直指 | 卷二十              |
| 寒及食冷物                |      |                  |
| 蔓荊湯                  | 聖惠方  | 治勞役飲食不節內障眼疾此方立効  |
| 黃耆                   | 人參   | 蔓荊子              |
|                      | 兩各一  | 半二錢              |
| 甘草                   | 白芍藥  | 黃栢               |
| 錢灸八                  | 錢二   | 三錢酒浸<br>晒四次      |
| 右咬咀每服五錢水二盞食後臨卧溫服     |      |                  |
| 車前散                  | 曾氏家傳 | 肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人 |
| 羞明多淚                 |      |                  |
| 蜜蒙花                  | 甘菊花  | 白蒺藜              |
| 枝去                   | 葉去枝  | 刺炒去              |



|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 羌活                  | 粉草                  | 草決明                 |
| 車前子                 | 黃芩                  | 龍膽草                 |
| <small>炒各</small>   |                     | <small>洗各等分</small> |
| 右為末每服二錢食後飯湯調下       |                     |                     |
| 四物龍膽湯               | 治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍者      |                     |
| <small>方拔粹</small>  |                     |                     |
| 當歸                  | 川芎                  | 芍藥                  |
| 地黄                  | 羌活                  | 草龍膽                 |
| <small>錢各五</small>  | <small>錢三</small>   | <small>錢二</small>   |
| 防風                  | 防己                  |                     |
| <small>錢三</small>   | <small>錢二</small>   |                     |
| 右咬咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服 |                     |                     |
| 東垣熟乾地黄丸治血少神勞腎虛眼目昏黑  |                     |                     |
| 熟地黄                 | 生地黄                 | 柴胡                  |
| <small>兩一</small>   | <small>錢一兩五</small> | <small>錢八</small>   |
| 天門冬                 | 甘草                  | 枳殼                  |
|                     | <small>炙</small>    |                     |
| 地骨皮                 | 黃連                  | 五味子                 |
|                     |                     | <small>錢各三</small>  |
| 人參                  | 當歸身                 | 黃芩                  |
| <small>錢三</small>   | <small>酒蒸焙乾</small> | <small>錢各五</small>  |
| 右為末煉蜜丸如菉豆大每服百丸茶清下   |                     |                     |
| 決明散治眼青盲內障方          |                     |                     |
| 桔梗                  | 羚羊角                 | 大黃                  |

|                      |                     |                    |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| 紫決明                  | 當歸                  | 川芎                 |
| 瞿麥                   | 生地黄                 | 木賊                 |
| <small>花用</small>    |                     |                    |
| 羌活                   | 防風                  | 赤芍藥                |
| 石決明                  | 青相子                 | 車前子                |
| <small>煨火</small>    |                     |                    |
| 蟬退                   | 白芷                  | 細辛                 |
| 蔓荊子                  | 蒺藜                  | 香附子                |
|                      | <small>炒</small>    |                    |
| 玄參                   | 瞿麥                  |                    |
|                      | <small>兩各半</small>  |                    |
| 右咬咀每服四錢水一鍾半煎至一鍾通口服立効 |                     |                    |
| 加                    |                     |                    |
| 黃連                   | 猪苓                  | 杏仁                 |
| 犀角                   | 蛇退                  | 菊花                 |
| 旋覆花                  | 木通                  | 山梔子                |
| 丹砂                   | 空清殼                 | 甘草                 |
|                      | <small>水</small>    |                    |
| 養肝丸治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力 |                     |                    |
| 當歸                   | 車前子                 | 防風                 |
| <small>酒浸</small>    | <small>酒蒸</small>   |                    |
| 白芍藥                  | 葳蕤仁                 | 熟地黄                |
|                      | <small>湯泡去皮</small> | <small>酒蒸焙</small> |



|                                         |                                         |                                           |                                                                             |                                                                             |                                     |                               |                                      |                             |                  |                          |                                                                            |                                   |                             |           |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <p>川芎</p> <p>楮實子 <small>各等分</small></p> | <p>右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸食後白湯下又婦人血虛目疾日宜服</p> | <p>益陰腎氣丸 <small>方東垣</small> 此壯水之主以鎮陽光</p> | <p>熟地黃 <small>兩三</small> 牡丹皮 <small>錢五</small> 生地黃 <small>四兩酒制炒</small></p> | <p>澤瀉 <small>半二錢</small> 當歸尾 <small>酒去上製</small> 山茱萸 <small>各半兩</small></p> | <p>茯苓 <small>半二錢</small> 柴胡 五味子</p> | <p>乾山藥 <small>錢各五</small></p> | <p>欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷二十</small></p> | <p>右件為細末煉蜜為丸如桐子大硃砂為衣每服五</p> | <p>七十丸空心鹽湯送下</p> | <p>地芝丸治目不能遠視能近視或亦妨近視</p> | <p>生地黃 <small>焙乾</small> 天門冬 <small>去心秤</small> 枳殼 <small>麸炒去穰</small></p> | <p>甘菊花 <small>去枝秤</small> 各二兩</p> | <p>右為細末煉蜜為丸如桐子大茶清送下百丸溫酒</p> | <p>亦可</p> | <p>定志丸治眼不能近視反能遠視者 <small>方見驚悸門</small></p> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|

|                     |                                                          |                                 |                                    |                                                                                         |                                      |                           |                             |                             |                             |                             |                     |                   |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <p>秘傳程東陽光明散屢用神効</p> | <p>水銀 <small>錢五</small> 鉛錫 <small>三錢一方五錢一</small> 枯礬</p> | <p>炒鹽 炒硝 <small>錢各五</small></p> | <p>治翳膜加鵬砂硃砂 <small>錢各一</small></p> | <p>右五味共研為末入於陽城礬內用鐵燈盞蓋之再用鉄線扎定外用舊草鞋燒灰和鹽泥固濟用文武火升之勿令泄氣鉄燈盞上常常用水漬之依法三炷官香時退火候冷輕手開礬取下靈氣雪白重五</p> | <p>欽定四庫全書 <small>仁齋直指卷二十</small></p> | <p>錢者為佳用磁礬收貯入後爐甘石煅煉聽用</p> | <p>羊腦爐甘石一兩用槌熟黃泥包封甘石在內再將</p> | <p>前靈氣五分摻於泥上再用青鹽合黃泥槌熟又裹</p> | <p>於外故蜜晒乾用髻條鐵線團圍縛定用炭火煅紅</p> | <p>用童便漬之依法七次取出去土將爐甘石研為極</p> | <p>細末點之立効或加冰片少許</p> | <p>又方治赤眼爛眩風神効</p> | <p>防風 連翹 荊芥</p> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|



|                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|
| 黃芩                   | 黃栢  | 生地黃 |
| 海漂硝                  | 羌活  | 黃連  |
| 當歸                   | 各一兩 |     |
| 右咬咀用水五碗煎熟去滓再熬成膏入面粉一兩 |     |     |
| 銅綠三錢前靈氣五分氣脚三分共為細末入膏和 |     |     |
| 成條子每用二三錢井水攤化重湯煨溫淋洗三次 |     |     |
| 立愈神効                 |     |     |
| 秘傳神仙撥雲散點開翳膜如神        |     |     |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十      |     |     |
| 真珠                   | 鵬砂  | 石燕子 |
| 冰片                   | 硃砂  | 牙硝  |
| 石蟹                   | 牛黃  |     |
| 右為極細末點開再用後方末藥點之神効    |     |     |
| 又方                   |     |     |
| 乳香                   | 沒藥  | 輕粉  |
| 石燕子                  | 青鹽  | 珍珠  |
| 琥珀                   | 血結  | 雄黃  |

|                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| 雄膽             | 硃砂  | 枯礬  |
| 胆礬             | 海漂硝 | 白丁香 |
| 爐甘石            |     |     |
| 右研極細末加冰片少許點之神効 |     |     |
| 服藥方            |     |     |
| 蜜蒙花            | 生地黃 | 甘菊花 |
| 梔子仁            | 黃栢  | 黃芩  |
| 木賊             | 知母  | 木通  |
| 川芎             | 藁本  | 甘草  |
| 石決明            | 黃連  | 陳皮  |
| 草決明            | 龍膽草 | 枳殼  |
| 當歸             | 白附子 | 柴胡  |
| 桔梗             |     |     |
| 右咬咀用水二鍾煎食後服    |     |     |
| 又末藥方服之神効       |     |     |
| 防風             | 木香  | 川芎  |

|                                          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|
| 黃連                                       | 黃芩       | 白荳蔻      |
| 菊花                                       | 川椒       | 瓜蒌仁      |
| 秦皮                                       | 蜜蒙花      | 羚羊角      |
| 犀角                                       | 枸杞子      | 蟬退       |
| 枳殼                                       | 各等分      |          |
| 右為末每服一錢茶清調下                              |          |          |
| 秘傳受仙方復明膏                                 |          |          |
| 黃連                                       | 赤芍藥      | 當歸       |
| 一斤淨<br>細剉碎                               | 半兩<br>洗淨 | 一兩<br>洗淨 |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十                    |          |          |
| 杏仁                                       | 黃栢皮      |          |
| 三七<br>粒                                  | 一兩<br>去粗 |          |
| 右剉碎安銅銚內用水滿浸文武火熬至茶鍾鍾半                     |          |          |
| 一次二次三次熬至一茶鍾熬至九次次用磁器盛                     |          |          |
| 藥水於內攪動取大半椀藥水煨紅爐甘石九次吃                     |          |          |
| 將乾為度爐甘石雖用茶褐色者 <small>土十分輕者為佳</small> 用乳鉢 |          |          |
| 細研為末用密絹羅羅之再研二十分細用製了淨                     |          |          |
| 朴硝三錢重                                    | 除用<br>三分 | 製了爐甘石末   |
|                                          |          | 一兩<br>半重 |
| 硃砂                                       | 一錢<br>重  | 片腦       |
|                                          |          | 二錢<br>重  |

|                       |          |        |
|-----------------------|----------|--------|
| 前五味用信白紙好綿濾過洗銅銚淨於內慢火熬  |          |        |
| 不可吹灰塵在內切忌諸般厭穢之事用竹篋子不  |          |        |
| 住手攪之休令銚底焦了再括下乳鉢中乳得十分  |          |        |
| 均上殼如常法立効              |          |        |
| 補陰圓治腎虛眼目昏暗            | 方見<br>勞門 | 虛      |
| 防風通聖散治風熱眼痛頭目昏眩        | 方見<br>風門 | 中      |
| 明日流氣飲治一切眼疾疼痛神効        |          |        |
| 大黃                    | 炮        | 牛蒡子    |
|                       |          | 炒      |
| 川芎                    |          |        |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十 |          |        |
| 菊花                    | 去<br>枝   | 細辛     |
|                       |          | 去<br>苗 |
| 防風                    | 去<br>蘆   | 玄參     |
|                       |          | 去<br>蘆 |
| 黃芩                    |          | 甘草     |
|                       |          | 炙      |
| 蔓荊子                   |          |        |
| 荊芥                    | 去<br>梗   | 木賊     |
|                       |          | 去<br>節 |
| 草決明                   | 一兩<br>五錢 |        |
| 蒼朮                    | 米泔<br>二兩 |        |
| 右為細末臨睡酒服二錢            |          |        |
| 秘傳神應眼藥                |          |        |
| 製爐甘石                  | 十兩       | 黃連     |
|                       |          | 黃栢     |





|                                          |                             |                               |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 薄荷<br><small>各三兩</small>                 | 甘草<br><small>一兩</small>     | 朴硝<br><small>二兩</small>       |
| 右五味咬咀用水數碗煎熟濾去滓用鉢頭盛之將爐甘石研細入銀窩內火煨深紅傾入藥水內就研 |                             |                               |
| 飛過淨末聽用                                   |                             |                               |
| 水銀<br><small>一兩</small>                  | 黑鉛<br><small>一錢已上二塊</small> |                               |
| 白鵬砂<br><small>一錢</small>                 | 硃砂<br><small>五分</small>     | 食鹽<br><small>一兩用白水煮炒乾</small> |
| 枯白礬<br><small>一兩</small>                 | 皂礬<br><small>二錢</small>     | 火硝<br><small>七錢五分</small>     |
| 右八味同一處入陽城礬內用鹽泥固濟於蜜升打                     |                             |                               |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十                    |                             |                               |
| 一炷官香候冷取出聽用將前製爐甘石研細再入                     |                             |                               |
| 五兩在陽城礬底次將前靈氣七錢五分亦研細上                     |                             |                               |
| 又安甘石五兩蓋定亦嚴封固打一炷官香冷定出                     |                             |                               |
| 火毒研極細紙羅過如點翳膜加白鵬砂五錢硃一                     |                             |                               |
| 錢五分火硝一錢五分照前製過名曰捲簾散如點                     |                             |                               |
| 昏朦加冰片名曰光明散                               |                             |                               |
| 至寶琥珀錠子                                   |                             |                               |
| 爐甘石<br><small>童便煨七次</small>              | 府丹<br><small>各四兩水飛過</small> | 鵬砂<br><small>四錢</small>       |

|                                                              |                         |                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 琥珀                                                           | 硃砂                      | 珍珠                       |
| 硃砂                                                           | 明礬                      | 熊膽                       |
| 輕粉                                                           | 海漂硝                     | 淨皮硝                      |
| 雄黃                                                           | 乳香                      | 沒藥<br><small>各四錢</small> |
| 冰片<br><small>五分</small>                                      | 麝香<br><small>四分</small> |                          |
| 右為極細末又黃連黃栢黃芩白蒺藜梔子仁穀精草菊花各一兩五錢訶子三箇共味咬咀滾水浸一晝夜銅器熬成老膏又蜜一斤六兩熬成老膏滴水 |                         |                          |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十                                        |                         |                          |
| 成珠去火為度同煎成膏和均下前末藥令勻梨子                                         |                         |                          |
| 三箇取汁通和前藥成錠子用乳汁銀簪蘸點一切                                         |                         |                          |
| 眼疾如神                                                         |                         |                          |
| 倒睫拳毛                                                         |                         |                          |
| 因邪風攻入脾經致使兩皮風痒不住雙手背揉目久赤爛拳毛入眼內將木鱉子去殼搥爛用絲綿包撚成條左患塞右鼻右患塞左其毛自分上下次服 |                         |                          |
| 五退散                                                          |                         |                          |



五退散

蟬退 錢二

猪退 錢四

蠶蛻 錢三

穿山甲 灸焦五錢

防風 二兩去蘆

荊芥 一兩半

石決明

川烏 炮去皮臍

草決明 炒各五錢

甘草 三錢

蛇蛻 醋煮竹筒盛焙乾一錢五分

右為末每服二錢鹽湯送下

針法攢竹二穴

在兩眉頭內尖陷中是穴宜以細三稜針刺之宣洩熱氣三度刺目大明

絲竹空二穴

在兩眉後尖髮際陷中針三分宜瀉不宜補禁灸

欽定四庫全書

仁齋直指卷二十

灸法三里二穴

穴法見前治眼目昏暗

風翳在左灸右手中指本節頭骨上灸五壯炷如

小麦大右患灸左

仁齋直指卷二十

欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷二十

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱 鈐

校對官主簿臣 汪日贊

謄錄監生臣 張紹鼎



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指卷二十一

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

耳

耳論

耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通乎耳所主者精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血風邪襲虛使精脫腎憊則耳轉而聾又有氣厥而聾者有

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十一

扶風而聾者有勞損而聾者蓋十二經脉上絡於耳其脉隊諸經適有交并則臟氣逆而為厥厥氣搏入於耳是為厥聾必有時乎眩暈之證耳者宗脉之所附脉虛而風邪乘之風入於耳之脉使經氣痞而不宣是為風聾必有時乎頭痛之證勞役傷於氣血淫慾耗其精元瘦悴力疲昏昏瞶瞶是為勞聾有能將適得所血氣和平則其聾暫輕其或日就勞傷風邪停滯則為久聾之證矣外此又有耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈眼或見

光謂之虛鳴熱氣乘虛隨脉入耳聚熱不散膿汁出焉謂之膿耳人耳間有津液輕則不能為害若風熱搏之津液結韌成核塞耳亦令暴聾謂之聒耳前是數者腎脉可推風則浮而盛熱則洪而實虛則濇而濡風為之疎散熱為之清利虛為之調養邪氣屏退然後以通耳調氣安腎之劑主之於此得耳中三昧

耳病證治

治厥聾方和劑流氣飲加石菖蒲每服三錢以生薑葱

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十一

白同煎食後服沉香降氣湯

方見脈滿門

或降氣湯

方見脚氣門

不換金正氣散

方見寒門

指迷七氣湯

方見氣門通用

輕者吞來復

丹

方見暑門

重者吞養正丹

方見冷門

凡治耳聾皆當調氣

桂星散治風虛耳聾

辣桂

川芎

當歸

細辛

淨石菖蒲

白蒺藜

炒杵去刺

木通

木香

麻黃

去節

甘草

大南星

煨裂

白芷稍

各四錢



|                                            |  |             |                           |    |                           |                              |                           |    |                |          |                                   |  |                           |    |    |                                |                        |                            |                            |    |                                    |                           |                                  |          |
|--------------------------------------------|--|-------------|---------------------------|----|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------|-----------------------------------|--|---------------------------|----|----|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
| 右件剉碎每服三錢水盪半葱白二片紫蘇五葉薑五片食後煎服晚少食臨卧加些全蝎服排風湯亦可用 |  | 加味宣風散通利腎臟風氣 | 雞心檳榔<br><small>三箇</small> | 橘皮 | 桃仁<br><small>浸去皮焙</small> | 牽牛<br><small>二兩重半炒半生</small> | 枳殼<br><small>製各半兩</small> | 白芷 | 右為末每服二錢蜜湯調下食前服 | 地黃丸治勞損耳聾 | 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷二十一</small> |  | 大熟地黃<br><small>洗焙</small> | 當歸 | 川芎 | 兔絲子<br><small>酒浸三日曬乾搗末</small> | 故紙<br><small>炒</small> | 白蒺藜<br><small>炒杵去刺</small> | 杜仲<br><small>姜製炒去絲</small> | 白芷 | 磁石<br><small>火燒醋淬七次研細水飛一分半</small> | 石菖蒲<br><small>各一分</small> | 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九以葱白溫酒空心吞下晚飯前又服 | 益腎散治腎虛耳聾 |
|--------------------------------------------|--|-------------|---------------------------|----|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------|-----------------------------------|--|---------------------------|----|----|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|

|                                         |  |           |    |                         |    |                        |    |    |                        |    |    |                           |                         |      |                      |     |                           |     |                |       |    |     |                           |                          |
|-----------------------------------------|--|-----------|----|-------------------------|----|------------------------|----|----|------------------------|----|----|---------------------------|-------------------------|------|----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------|-------|----|-----|---------------------------|--------------------------|
| 右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少鹽并藥濕紙十重裹煨令香熟空心嚼以酒送下 |  | 芎芷散治風入耳虛鳴 | 白芷 | 石菖蒲<br><small>炒</small> | 蒼朮 | 厚朴<br><small>製</small> | 木通 | 辣桂 | 半夏<br><small>製</small> | 陳皮 | 細辛 | 甘草<br><small>炙各一分</small> | 川芎<br><small>二分</small> | 紫蘇莖葉 | 右剉散每三錢薑五片葱白二片水煎食後臨卧服 | 耳鳴方 | 草烏頭<br><small>燒帶生</small> | 石菖蒲 | 右等分為末用綿裹塞耳一日三度 | 耳鳴暴聾方 | 川椒 | 石菖蒲 | 舊松脂<br><small>各一分</small> | 巴豆肉<br><small>五分</small> |
|-----------------------------------------|--|-----------|----|-------------------------|----|------------------------|----|----|------------------------|----|----|---------------------------|-------------------------|------|----------------------|-----|---------------------------|-----|----------------|-------|----|-----|---------------------------|--------------------------|



|                |  |             |  |     |  |                       |  |     |  |                       |  |                  |  |       |  |     |  |                         |  |          |  |     |  |                     |  |                        |  |        |  |    |  |
|----------------|--|-------------|--|-----|--|-----------------------|--|-----|--|-----------------------|--|------------------|--|-------|--|-----|--|-------------------------|--|----------|--|-----|--|---------------------|--|------------------------|--|--------|--|----|--|
| 右為細末鎔蠟圓如棗核大塞入耳 |  | 蔓荊子散治內熱耳出濃汁 |  | 川升麻 |  | 桑白皮 <small>炒</small>  |  | 前胡  |  | 蔓荊子                   |  | 右件剉散每服三錢薑棗煎食後臨卧服 |  | 耳熱出汗方 |  | 消石  |  | 防風 <small>已上各一錢</small> |  | 右件為末摻耳立止 |  | 膿耳方 |  | 真龍骨                 |  | 黃革丹 <small>煨</small>   |  | 右為細末摻耳 |  | 又方 |  |
|                |  |             |  | 木通  |  | 麥門冬 <small>去心</small> |  | 甘菊  |  | 甘草 <small>炙等分</small> |  |                  |  |       |  | 爛石膏 |  | 腦 <small>少許</small>     |  |          |  |     |  | 白礬 <small>煨</small> |  | 烏賊骨 <small>各一分</small> |  |        |  |    |  |
|                |  |             |  | 赤芍藥 |  | 生地黄                   |  | 赤茯苓 |  |                       |  |                  |  |       |  | 天花粉 |  |                         |  |          |  |     |  | 赤小豆                 |  | 臙脂 <small>半分</small>   |  |        |  |    |  |

|                             |  |                      |  |                        |  |                   |  |     |  |                       |  |                        |  |     |  |                       |  |                       |  |                  |  |    |  |                       |  |                         |  |               |  |  |  |
|-----------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|-----|--|-----------------------|--|------------------------|--|-----|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------|--|----|--|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--|--|
| 爛石膏 <small>於新瓦上煨出火毒</small> |  | 黃革丹 <small>煨</small> |  | 麝 <small>少許</small>    |  | 右為細末用綿纏竹筴拭耳換綿蘸藥入耳 |  | 聾耳方 |  | 生豬脂                   |  | 右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿包入耳令潤即挑出 |  | 耳聾方 |  | 明硫黃                   |  | 皂角肉 <small>等分</small> |  | 右為細末葱白搗粘入麝少許綿包入耳 |  | 又方 |  | 革麻子肉                  |  | 滴乳香                     |  | 右件細研鎔蠟圓如棗核大入耳 |  |  |  |
|                             |  | 真蚌粉                  |  |                        |  |                   |  |     |  | 生地黄                   |  |                        |  |     |  | 雄黃 <small>各研細</small> |  |                       |  |                  |  |    |  | 巴豆 <small>去膜油</small> |  | 松脂 <small>各別研等分</small> |  |               |  |  |  |
|                             |  | 明礬 <small>煨</small>  |  | 真龍骨 <small>各等分</small> |  |                   |  |     |  | 釜丁墨 <small>等分</small> |  |                        |  |     |  | 遠志 <small>去心</small>  |  |                       |  |                  |  |    |  | 杏仁 <small>去皮</small>  |  | 青鹽 <small>半分</small>    |  |               |  |  |  |



又方

以生鼠取膽汁盡入耳又以生鼠取腦髓綿包入

耳生鯉魚腦通用

雞峰方

菖蒲

一寸

巴豆

一箇去心膜

麝

少許

右為末合研作七圓綿包入耳日一圓

久聾方

葶麻子

兩箇一箇去油用

遠志

去心

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十一

乳香

磁石

燒如前各二錢

皂角

煨取肉半鋌

生地龍

中者一條

全蝎

二箇焙

右為細末入蠟搗圓柱入耳

耳痛方

白鹽炒熱重帛包熨

又方

杏仁炒焦研細帛包塞

虫入耳方

桃葉按細塞其耳自出○或以藍青研汁滴入耳又

以川椒為末法醋浸一宿滴耳

蟻入耳方

猪脂一指許炙令香置耳孔邊其蟻自出

蜈蚣入耳方

用生薑取汁灌放耳中少時自出或以桑皮搗汁灌

入耳即自出

耳聾方

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十一

用大蒜一瓣從一頭開孔以巴豆肉一粒慢火煨極

熱入蒜孔中以新綿包塞耳逐日換

又方

用猛燬石半錢搥碎生研細入聾耳孔別用針砂末

入不聾耳孔自然通透然後傾出

大治耳聾通神散

全蝎

一枚

土狗

二枚

中地龍

二條

雄黃

明礬

半生半煨各半錢

麝

一字



|                         |  |                              |  |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| 右研細葱白引藥入耳閉氣面壁坐一時三日一次    |  | 膿耳方                          |  |
| 明白礬 <small>煨</small>    |  | 黃號丹 <small>煨</small>         |  |
| 龍骨                      |  | 麝脂 <small>等分<br/>為末</small>  |  |
| 右件研為細末用綿杖纏乾換綿杖蘸藥入耳入麝    |  | 香輕粉各少許摻入耳                    |  |
| 又方                      |  | 蝎梢 <small>七箇<br/>去毒焙</small> |  |
| 乳香                      |  | 麝脂 <small>半錢</small>         |  |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十一  |  | 麝香 <small>各少許</small>        |  |
| 右研為細末以斡子挑入耳             |  | 耳鳴方論腎者宗脉所聚耳為之竅血氣不足宗脉乃        |  |
| 虛風邪乘虛隨脉入耳氣與之搏故為耳鳴先用生料   |  | 五苓散加製枳殼橘皮紫蘇生薑同煎吞青木香圓         |  |
| 並方                      |  | 見水<br>飲門 散邪疎風下氣續芎歸飲和養        |  |
| 川芎                      |  | 當歸                           |  |
| 華陰細辛 <small>各半兩</small> |  | 石菖蒲                          |  |
| 白芷 <small>各三錢</small>   |  | 辣桂                           |  |

|                        |  |                         |  |
|------------------------|--|-------------------------|--|
| 右剉細每服三錢入紫蘇薑棗煎服如虛冷甚者酌   |  | 量加生附子                   |  |
| 附諸方                    |  | 犀角散子 <small>濟生方</small> |  |
| 治風熱上壅兩耳聾閉內外腫痛膿水        |  | 流出                      |  |
| 犀角 <small>鎊</small>    |  | 芎蒲                      |  |
| 木通                     |  | 玄參                      |  |
| 赤芍藥                    |  | 赤小豆 <small>炒各一兩</small> |  |
| 甘草 <small>去梗一兩</small> |  | 甘草 <small>炙半兩</small>   |  |
| 右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎七分溫服   |  | 清神散治風氣壅上頭目不清耳常重聰        |  |
| 殭蠶 <small>炒去絲嘴</small> |  | 乾菊花 <small>各一兩</small>  |  |
| 荆芥穗                    |  | 羌活                      |  |
| 木通                     |  | 川芎                      |  |
| 防風 <small>各五錢</small>  |  | 木香 <small>一錢</small>    |  |
| 石菖蒲                    |  | 甘草 <small>各三錢</small>   |  |
| 右為末每服三錢食後臨卧茶清調下        |  | 復聰湯 <small>姚方伯傳</small> |  |
| 治痰火上攻耳聾耳鳴              |  |                         |  |



|                                 |                             |                       |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 半夏 <small>製</small>             | 陳皮 <small>去白</small>        | 白茯苓 <small>去皮</small> |
| 甘草 <small>炙</small>             | 瞿麥                          | 篇蓄                    |
| 木通                              | 黃栢 <small>去粗皮炒褐色各一錢</small> |                       |
| 右用水二茶鍾生薑三片煎至一茶鍾空心臨卧各一服          |                             |                       |
| 涼膈散治風熱上攻耳聾                      | <small>方見積熱門</small>        |                       |
| 通聖散治風熱上攻耳聾                      | <small>方見風門</small>         |                       |
| 滾痰丸治熱痰濕痰耳聾                      | <small>方見痰門</small>         |                       |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十一</small> |                             |                       |
| 神芎散治濕熱濕痰耳聾                      |                             |                       |
| 檳榔丸治濕熱濕痰耳聾                      | <small>方見積聚門</small>        |                       |
| 龍會丸治肝火上升耳聾                      | <small>方見痛門</small>         |                       |
| 一方治耳聾久不聞                        |                             |                       |
| 磁石 <small>一塊如豆大</small>         | 川山甲 <small>燒存性為末一字</small>  |                       |
| 右用新綿子裏塞於患耳內口中含些生鐵覺耳內如風聲即愈       |                             |                       |
| 一方治耳作膿者                         |                             |                       |

|                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 用甘遂一塊如棗核大以綿裏塞耳中以甘草含口中徐徐嚙下                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 一方治凍耳                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 用橄欖核燒灰清油調敷雀腦亦可                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 鼻                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 鼻論                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 肺為氣之主通竅於鼻鼻者清氣出入之道路也陰陽升降氣血和平則一呼一吸榮衛行焉其或七情內蠹六氣外傷則清濁不分泥丸汨亂諸證迭起矣夫血之與氣相隨而行若臟腑生熱乘於血氣故熱氣迫血妄行自鼻孔出謂之鼻衄熱則津液中乾冷則髓涕流注若風冷隨氣乘於鼻腦則津液交涕不能自收謂之流涕肺為風寒所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不聞於是壅作鼻艱冷氣停聚血脉陰凝歲月淹延轉加壅結於是變生息肉或風邪入鼻搏於正氣邪正相擊鼻道不通則為鼻痛或氣血壅滯上焦生熱邪熱之氣留伏不 |  |  |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十一</small>                                                                                                                                                                                    |  |  |



散則為鼻瘡疊是數證七情六氣皆當究其感受之原用藥有序痊愈可期執方無權迄未有所濟也外此更有濕蘊一證鼻爛汁臭下部生瘡詳於後篇疳論見之

鼻病證治

生地黄湯治上熱衄血

生地黄 洗淨二兩 阿膠 炒酥一兩

川芎

北梗

蒲黃

甘草 生各半兩

右剉碎每服三錢水煎熟入生薑汁二匙溫服

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十一

麥門冬散治鼻衄

生地黄

生麥門冬 三錢

生薑 一錢

白藥

蒲黃 各二錢

白蜜 一合

右搗細以井水二大椀煎七分兩服

川芎三黃散治實熱衄血

大黃 濕紙裹蒸

川芎

黃連 淨

黃芩 等分

右為末每服二錢井水調服食後

敗毒散 方見寒類 吞雞蘇丸治肺熱胃中鬱熱衄血兼治血

淋吐血口臭

雞蘇 即腦荷半斤

真蒲黃 一兩焙

麥門冬 浸去心晒二兩

阿膠 一兩炒

甘草 七錢焙

人參

黃耆 各半兩

木通

柴胡 各一兩

生地黄末 三兩

右研為細末用冬蜜一斤熬一二沸即入地黄末頻

攪得所次將餘藥和圓如桐子大每服三十圓食後下

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十一

蘇子降氣湯治虛壅鼻血

方見脚氣門

血方

川鬱金末井水調下亦治吐血○又茅花煎湯通口

服○又方血餘散 方見血類 曾服燒煉藥致鼻血者山梔

煎湯解之仍燒山梔存性為末入鼻○又方烏賊骨

槐花等末入鼻○又方槐花半生半炒末入鼻○又

方成片人中白燒去穢為末入麝少許入鼻或加油

髮灰○又方蘿蔔汁或藕汁滴入鼻○又方大蒜煨



|                                                                                   |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| 香取三瓣研傳脚底鼻中有蒜氣即去之                                                                  |  |       |  |
| 川椒散治流涕                                                                            |  |       |  |
| 大紅開口川椒                                                                            |  | 微炒蓋出汗 |  |
| 川白薑                                                                               |  | 辣桂    |  |
| 生者                                                                                |  |       |  |
| 細辛                                                                                |  | 淨白朮   |  |
|                                                                                   |  | 等分    |  |
| 右件為末每服二錢溫酒調下                                                                      |  |       |  |
| 南星飲治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物室塞腦氣                                                             |  |       |  |
| 不宣遂流髓涕                                                                            |  |       |  |
| 欽定四庫全書                                                                            |  | 仁齋直指  |  |
|  |  | 卷二十一  |  |
| 上等大白南星切成片用沸湯盪兩次焙乾每服二                                                              |  |       |  |
| 錢用棗七箇甘草少許同煎食後服三四服後其硬                                                              |  |       |  |
| 物自出腦氣流轉髓涕自收仍以大蒜華撥末杵作                                                              |  |       |  |
| 餅用紗襯炙熱貼顙前熨斗火熨透或香附華撥末                                                              |  |       |  |
| 入鼻                                                                                |  |       |  |
| 芎藭散治鼻塞為艱                                                                          |  |       |  |
| 芎窮                                                                                |  | 檳榔    |  |
| 肉桂                                                                                |  | 防己    |  |
|                                                                                   |  | 木通    |  |
|                                                                                   |  | 麻黃    |  |
|                                                                                   |  | 去節    |  |

|                |    |      |      |    |
|----------------|----|------|------|----|
| 細辛             | 白芷 | 石菖蒲  | 各一分  |    |
| 木香             | 川椒 | 甘草   | 煨各半  |    |
| 右剉每三錢生薑紫蘇煎服    |    |      |      |    |
| 通頂散治鼻鼈         |    |      |      |    |
| 瓜蒂             | 藜蘆 | 皂角肉  | 各一分半 |    |
| 麝              |    |      |      | 少許 |
| 右為末吹些入鼻        |    |      |      |    |
| 鼻鼈雄黃丸          |    |      |      |    |
| 欽定四庫全書         |    | 仁齋直指 |      |    |
| 卷二十一           |    |      |      |    |
| 雄黃             | 瓜蒂 | 綠礬   | 半錢一錢 |    |
| 麝              |    |      |      | 少許 |
| 右為細末搗些入鼻亦治息肉   |    |      |      |    |
| 又方             |    |      |      |    |
| 瓜蒂             | 明礬 | 華陰細辛 | 各一錢  |    |
| 雄黃             | 錢半 |      |      |    |
| 右為末以雄犬膽汁和圓綿包塞鼻 |    |      |      |    |
| 千金息肉方          |    |      |      |    |





|                      |          |
|----------------------|----------|
| 瓜蒂                   | 華陰細辛等分   |
| 右末綿包少許塞鼻             |          |
| 又息肉方                 |          |
| 甘遂                   | 明礬煨      |
| 雄黃                   | 雌黃       |
| 瓜蒂                   | 朱砂       |
| 分等                   |          |
| 右為末清蜜調傅前艱二藥通用        |          |
| 人參順氣散                | 方見嘔吐類    |
| 風類                   | 霍香正氣散    |
| 皆治鼻痛                 |          |
| 欽定四庫全書               | 仁齋直指卷二十一 |
| 又方                   |          |
| 杏仁                   | 水浸去皮焙    |
| 細辛                   |          |
| 白芷                   | 各一錢      |
| 全蝎                   | 兩箇焙      |
| 右為末麻油調傅              |          |
| 甘露飲                  | 方見積熱門    |
| 黃連阿膠丸                | 方見嗽門     |
| 共治鼻瘡                 |          |
| 又方                   |          |
| 用杏仁研乳汁傅之○或以烏牛耳垢傅○或黃栢 |          |
| 苦參檳榔等為末以猪脂研傅○或青黛槐花杏仁 |          |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 研傅                   |          |
| 酒查鼻并鼻上贅肉面粉刺雀斑方       |          |
| 黃革丹                  | 二錢半      |
| 硃砂                   | 半錢       |
| 巴豆肉                  | 十箇紙壓去油   |
| 餅藥                   | 一盞半      |
| 右件同入罐子中以慢火熬三四沸取下續入研細 |          |
| 石灰三錢和畢酒查驚毛蘸掃紅處日一次粉刺雀 |          |
| 斑小竹杖挑藥點纔見微腫便洗去鼻上贅肉傅之 |          |
| 半月取出膿血自成痂落矣          |          |
| 欽定四庫全書               | 仁齋直指卷二十一 |
| 又酒查鼻面上肺風瘡方           |          |
| 白龍圓末逐日洗面如澡豆法更罨少時方以湯洗 |          |
| 去食後常服龍丹一貼            | 並見和劑方    |
| 半月瑩潔                 |          |
| 酒查鼻方                 |          |
| 白鹽常擦妙                |          |
| 鼻血方                  |          |
| 髮灰入鼻磨好墨入點法醋井水調下      |          |
| 附諸方                  |          |



|                      |  |   |  |     |  |      |  |
|----------------------|--|---|--|-----|--|------|--|
| 欽定四庫全書               |  |   |  |     |  | 仁齋直指 |  |
| 卷二十一                 |  |   |  |     |  |      |  |
| 用頭髮燒灰以竹管吹入鼻中即止或以酒調亦可 |  |   |  |     |  |      |  |
| 禦寒湯治寒邪傷於皮毛令人鼻塞咳嗽上喘   |  |   |  |     |  |      |  |
| 黃蘗                   |  | 二 |  | 黃耆  |  | 一    |  |
| 炙甘草                  |  | 二 |  | 欵冬花 |  | 各三   |  |
| 黃連                   |  | 二 |  | 白芷  |  | 三    |  |
| 陳皮                   |  | 五 |  | 佛耳草 |  | 三    |  |
| 蒼朮                   |  | 七 |  | 升麻  |  | 半    |  |
| 右咬咀如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去 |  |   |  |     |  |      |  |
| 黃芩芍藥湯治鼻衄不止           |  |   |  |     |  |      |  |
| 黃芩                   |  | 二 |  | 芍藥  |  | 二    |  |
| 甘草                   |  |   |  |     |  |      |  |
| 右以水煎服或犀角地黃湯如無犀角以升麻代之 |  |   |  |     |  |      |  |
| 一方治鼻血不止              |  |   |  |     |  |      |  |
| 葛根散治鼻衄不止             |  |   |  |     |  |      |  |
| 葛根                   |  | 二 |  | 阿膠  |  | 蛤粉   |  |
| 側柏葉                  |  | 二 |  | 生芩  |  | 各一   |  |
| 甘草                   |  | 半 |  | 甘草  |  | 半    |  |
| 右以水煎服加薑三片            |  |   |  |     |  |      |  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 滓稍熱服                 |       |
| 菖蒲散                  | 御藥院方  |
| 治鼻內室塞不通不得喘息          |       |
| 菖蒲                   | 皂角    |
|                      | 等分    |
| 右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧片時     |       |
| 增損防風通聖散治鼻塞不利肺氣不清     |       |
| 鼠粘子                  | 桔梗    |
|                      | 桑白皮   |
| 紫苑                   | 荊芥穗   |
|                      | 各三兩   |
|                      | 甘草    |
|                      | 生二兩   |
| 右咬咀每服八錢水一鍾半薑五片煎八分食後溫 |       |
| 服                    |       |
| 欽定四庫全書               |       |
| 仁齋直指                 |       |
| 卷二十一                 |       |
| 羌活散治腦有鬱熱遇寒鼻塞         |       |
|                      | 方見傷風門 |
| 蒼耳散                  | 三因方   |
| 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵          |       |
| 辛荑仁                  | 半兩    |
| 蒼耳子                  | 炒二錢半  |
| 香白芷                  | 一兩    |
| 薄荷葉                  | 五分    |
| 右為末每服二錢葱茶清食後調下       |       |
| 辛荑散                  | 濟生方   |
| 治肺虛為四氣所干鼻壅塞涕出不已或     |       |
| 氣息不通或不聞香臭            |       |



|                         |                       |                          |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 川芎                      | 木通 <small>去節</small>  | 防風 <small>去蘆</small>     |
| 甘草                      | 辛荑                    | 細辛 <small>洗去土</small>    |
| 藁本                      | 升麻                    | 香白芷 <small>各等分</small>   |
| 右為末每服三錢茶清調下             |                       |                          |
| 防風湯治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必衄血   |                       |                          |
| 防風 <small>二兩半</small>   | 黃芩                    | 人參                       |
| 甘草 <small>炙</small>     | 川芎                    | 麥門冬 <small>去心各一兩</small> |
| 右為末每服二錢沸湯調食後服           |                       |                          |
| 丹溪方治鼻中瘰肉胃中有食積熱痰流注治本當消食積 |                       |                          |
| 蝴蝶礬 <small>二錢</small>   | 細辛 <small>一錢</small>  | 白芷 <small>半錢</small>     |
| 右為末內鼻中                  |                       |                          |
| 治鼻淵方                    |                       |                          |
| 南星                      | 半夏                    | 蒼朮                       |
| 白芷                      | 神麴                    | 酒芩                       |
| 辛荑                      | 荊芥 <small>各等分</small> |                          |

|                                                                                     |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 右為末水調食後服                                                                            |      |               |
| 白黃散                                                                                 | 簡易方  | 治鼻鼽瘰肉鼻痔等證     |
| 雄黃                                                                                  |      | 白礬            |
|                                                                                     |      | 細辛            |
| 瓜子                                                                                  | 各等分  |               |
| 右為末搐入鼻中                                                                             |      |               |
| 辛荑膏                                                                                 | 御藥院方 | 治鼻生瘰肉室塞不通有時疼痛 |
| 辛荑葉                                                                                 | 二兩   | 細辛            |
|                                                                                     |      | 木香            |
| 木通                                                                                  |      | 白芷            |
|                                                                                     |      | 杏仁            |
|                                                                                     |      | 湯泡去皮尖研各五錢用    |
| 欽定四庫全書                                                                              |      |               |
|  |      |               |
| 仁齋直指                                                                                |      |               |
| 卷二十一                                                                                |      |               |
| 右用羊髓猪脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即愈                                       |      |               |
| 又方治鼻中瘰肉                                                                             |      |               |
| 蝴蝶礬                                                                                 | 二錢   | 細辛            |
|                                                                                     |      | 一錢            |
|                                                                                     |      | 白芷            |
|                                                                                     |      | 五分            |
| 右為末內鼻中                                                                              |      |               |
| 唇舌                                                                                  |      |               |
| 唇舌論                                                                                 |      |               |

心之所司者舌脾之所司者唇口是雖各有司存然心之氣未嘗不通於脾脾之氣未嘗不通於心也夫舌者心之官嘗五味之秀以榮養一身資脾胃之藏以分布水穀故心之本脈系於舌根脾之絡脈系於舌傍或風寒暑濕之所中傷則舌縮捲而不能言或憂怒思恐之所鬱閉則舌腫滿而不得息心熱則破裂生瘡脾閉則白胎如雪舌之為病合心脾而主治之故曰心之氣未嘗不通於脾者此也口者一身吐納之都門百物榮養之要道節宣少舛病必生焉故熱則苦寒則鹹宿食則酸煩燥則澁虛則淡疸則甘臟氣偏勝則其味必偏應於口鹹酸甘苦非舌味之而誰歟若夫上池津液出於舌端心實主之也津液流布非胃而何故曰脾之氣未嘗不通於心者此也或問口臭一證可得聞乎曰臟腑異氣燥腐不同是氣蘊積胃膈之間挾熱而衝發於口人將掩鼻而過之信夫醫不難於處方惟難於識證受病源流懵不及究律以古方嘗試一中不幾費人乎此

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十一



迪志文化出版有限公司出版

辯之不可不早  
唇舌證治  
升麻散治心脾有熱口舌破裂生瘡  
川升麻 玄參 川芎  
生地黃 麥門冬 去心各半兩 大黃  
黃連 淨黃芩 甘草 焙各三錢  
右件剉碎每服三錢薑棗煎食後服  
龍石散治口舌生瘡喉間腫痛  
欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十一  
寒水石 燒紅半斤 朱砂 六錢 腦 半錢  
右為細末日三五次搽  
五福化毒丹治唇舌腫破生瘡煩渴  
玄參 洗焙 北梗 各三兩 茯苓 二兩  
人參 半兩 馬牙硝 枯 青黛 各一兩  
甘草 七錢 麝香 一字 金銀箔 用四十片為衣  
右為細末煉蜜圓如皂子大以腦荷泡湯候冷調下  
如口臭以生地黃汁調下



迪志文化出版有限公司出版

|                  |                       |            |          |
|------------------|-----------------------|------------|----------|
| 生地黃膏治口舌瘡腫        | 生地黃                   | 藍青葉        | 各等分      |
| 右入蜜杵細每服半兩井水煎食後服  | 萍草圓治口舌瘡               | 浮萍草        | 晒末並      |
| 杏仁               | 黃栢                    | 末並         |          |
| 輕粉               | 少許                    |            |          |
| 青黛               | 等分                    |            |          |
| 右煉蜜研圓皂子大以綿裹含有涎吐之 | 洗心散治心熱四順清涼飲治脾熱甘露飲治血熱牛 | 欽定四庫全書     | 仁齋直指卷二十一 |
| 黃涼膈丸治唇焦口瘡咽痛      | 並見積熱門                 |            |          |
| 舌出血              | 槐花晒為末傳舌上或真蒲黃生傳        | 黃連阿膠丸治心熱口瘡 | 方見嗽門     |
| 可擇用              | 鵬砂圓治口臭口乾口舌瘡           | 寒水石        | 燒紅十兩     |
| 鵬砂               | 二兩                    | 腦          |          |
| 馬牙硝              | 枯四錢                   | 甘草         | 浸汁熬二兩    |
| 麝                | 各二錢                   |            |          |
| 右為細末甘草膏搜圓麻子大含嚥   |                       |            |          |



|              |      |
|--------------|------|
| 雞蘇圓治胃中鬱熱口臭煩渴 | 方見鼻門 |
| 舌腫大方         |      |
| 真蒲黃摻傳        |      |
| 又方           |      |
| 鵬砂末薑錢蘸擦      |      |
| 舌腫强方         |      |
| 蛇皮           | 燒存性  |
| 全蝎           |      |
| 右為末少許摻傳      |      |
| 治舌瘡腫方        |      |
| 大山豆根剉細含嚥或末摻傳 |      |
| 口瘡方          |      |
| 正黃連          |      |
| 厚黃栢          |      |
| 雞心檳榔         |      |
| 右等分為細末傳之即可   |      |
| 又方           |      |
| 黃栢           | 四錢   |
| 青黛           | 二錢   |
| 銅綠           | 一錢   |
| 右件為末傳之       |      |







|                                                                                                                                |      |               |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----|----|
| 青黛                                                                                                                             | 枯礬   | 檳榔末           | 各等分 |    |
| 冰片                                                                                                                             | 許少   |               |     |    |
| 右共為細末摻患處                                                                                                                       |      |               |     |    |
| 瀉黃飲子                                                                                                                           | 濟生方  | 治風熱蘊於脾經唇燥折裂生瘡 |     |    |
| 白芷                                                                                                                             | 升麻   | 枳殼            | 去白炒 |    |
| 黃芩                                                                                                                             | 防風   | 去虛            | 半夏  | 湯洗 |
| 石斛                                                                                                                             | 各一兩  | 甘草            | 炙半兩 |    |
| 右吹咀每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服                                                                                                             |      |               |     |    |
| 欽定四庫全書                                                                                                                         | 仁齋直指 | 卷二十一          |     |    |
| 咽喉                                                                                                                             |      |               |     |    |
| 咽喉論                                                                                                                            |      |               |     |    |
| 咽者胃之系喉者肺氣之所通咽以嚥物喉以候氣理一而分殊也自其風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏而為咽疼自其熱氣生於肺胃風毒蘊隆則腫結而為喉痺尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令尸虫發動上蝕於喉或癢或疼如蠱之候也穀賊者穀芒強澁藏於米而誤食之滯於咽門不能傳化故風 |      |               |     |    |

|                                                                                                                                        |      |      |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-----|
| 熱併聚與血氣搏遂令腫刺如喉噎之生穀賊也胃脘實熱燼灸上焦發為白頭赤根固有咽瘡之證臟腑停寒寒則氣縮如物窒礙於其間亦有喉閉之證至若懸癰生於上腭雖不關於咽喉所以暴腫者抑亦熱氣使然也咽喉懸癰關要所係病不急療皆能殺人然則療之將何如曰熱則通之寒則溫之不熱不寒依經調之寒熱和平病不生矣 |      |      |    |     |
| 咽喉證治                                                                                                                                   |      |      |    |     |
| 欽定四庫全書                                                                                                                                 | 仁齋直指 | 卷二十一 |    |     |
| 膽礬散治酒麪熱盛咽喉腫結閉塞                                                                                                                         |      |      |    |     |
| 鴨背膽礬                                                                                                                                   | 半錢   | 全蝎   | 二箇 |     |
| 右為末以雞羽蘸藥入喉中須臾破開聲出次用生青苛研細井水調下候吐出毒涎即愈未吐再服                                                                                                |      |      |    |     |
| 山豆根丸治積熱咽喉閉塞腫痛                                                                                                                          |      |      |    |     |
| 山豆根                                                                                                                                    | 一兩   | 北大黃  |    | 川升麻 |
| 朴消                                                                                                                                     | 生各半兩 |      |    |     |
| 右為末煉蜜丸如皂子大每一粒以薄綿包少痛便                                                                                                                   |      |      |    |     |



|                           |                           |                          |  |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 含嚥液                       |                           | 青解毒丸治熱毒上攻咽喉腫痛            |  |
| 寒水石                       | 石膏<br><small>各四兩研</small> | 右為細末拌和青黛水浸蒸餅研糊丸龍眼大每一     |  |
| 丸食後以井花水化下                 |                           | 吹喉散治咽喉熱腫口舌生瘡             |  |
| 盆硝<br><small>兩四</small>   | 青黛<br><small>七錢半</small>  | 真蒲黃<br><small>兩半</small> |  |
| 右以生荷汁半斤和三件入磁銚慢火熬乾研細每      |                           | 半錢筒吹入口內                  |  |
| 絳雪散治咽喉熱痛腫塞                |                           | 寒水石<br><small>半兩</small> |  |
| 鵬砂                        |                           | 牙硝                       |  |
| 朱砂<br><small>各研一錢</small> | 腦<br><small>半錢</small>    | 右為細末每一字摻入口嚥津             |  |
| 玉屑無憂散治咽喉熱閉腫痛舌瘡物鯁          |                           | 貫衆                       |  |
| 縮砂仁                       |                           | 荊芥穗                      |  |
| 白茯苓                       | 玄參                        | 黃連<br><small>淨</small>   |  |

|                          |                           |                           |  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 山豆根                      |                           | 滑石<br><small>研</small>    |  |
| 寒水石<br><small>兩一</small> | 鵬砂<br><small>一錢研細</small> | 右為細末每一錢乾摻舌上漸以新水嚥下         |  |
| 牛黃涼膈丸治咽喉唇舌熱腫生瘡           |                           | 如聖湯治咽喉腫痛                  |  |
| 北梗<br><small>去蘆</small>  | 甘草<br><small>焙</small>    | 加荊芥穗                      |  |
| 右件等分為粗末每服二錢用井水煎臨卧服       |                           | 僵蠶丸治喉風                    |  |
| 白僵蠶<br><small>炒</small>  |                           | 明白礬<br><small>生</small>   |  |
| 右件為末以白梅肉和圓如皂子大每一圓薄綿包     |                           | 入喉少頃涎水出即愈                 |  |
| 遠志散治喉閉                   |                           | 遠志<br><small>去心取肉</small> |  |
| 右為細末以管子擗開口吹藥入喉策令頭低涎出     |                           | 而愈                        |  |
| 白藥散治喉中熱塞腫痛散血消痰           |                           |                           |  |



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 白藥                         | 朴硝                   |
| 右為末以小管吹入喉                  |                      |
| 穀賊方                        |                      |
| 木鱉子仁                       | 川大黃 <small>焙</small> |
|                            | 牙硝                   |
| 射干                         | 山豆根                  |
|                            | 川升麻                  |
| 白藥                         |                      |
| 右件等分為末煉蜜圓如皂子大以薄綿包含嚥液       |                      |
| 又方                         |                      |
| 欽定四庫全書                     | 仁齋直指<br>卷二十一         |
| 鵬砂                         | 牙硝                   |
| 右件等分細研每服半錢以薄綿裹含嚥           |                      |
| 口瘡赤爛方                      |                      |
| 清蜜浸黃栢一宿取汁含嚥                |                      |
| 和劑七氣湯加北梗甘草指迷七氣湯治冷證氣縮喉      |                      |
| 閉 <small>方見<br/>氣類</small> |                      |
| 半夏桂甘湯治冷證無陽咽疼喉閉             |                      |
| 辣桂                         | 甘草 <small>焙</small>  |
|                            | 半夏 <small>製</small>  |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 右件等分剉碎每服三錢水一大盞煎半候冷少呷             |                       |
| 咽閉方                              |                       |
| 膽礬細研以管子挑少許吹入喉中即破續以白梅             |                       |
| 煎湯調炒僵蠶末以去其風如無膽礬只透明綠礬             |                       |
| 代之亦得                             |                       |
| 又方                               |                       |
| 明白礬末一大錢匕用川巴豆肉一粒入礬中以火熬            |                       |
| 乾取礬為末極細每一字以小管挑吹入喉涎出自愈            |                       |
| 欽定四庫全書                           | 仁齋直指<br>卷二十一          |
| 又喉風喉痺方                           |                       |
| 蛇皮 <small>畧洗過日乾<br/>剪作細屑</small> | 白梅肉                   |
| 右件研和為圓含化屢效                       |                       |
| 解毒雄黃丸治纏喉風急喉閉                     | 方見積熱門                 |
| 以熱水研白梅肉調下或熱茶清下熱則通之用此             |                       |
| 玉鑰匙治風熱喉痺                         |                       |
| 焰消 <small>三分</small>             | 鵬砂 <small>一分</small>  |
|                                  | 直僵蠶 <small>炒半</small> |
| 腦 <small>少許</small>              |                       |



|              |      |                          |               |    |                 |        |       |                        |                  |                    |                         |     |                                                                             |                                                      |                   |
|--------------|------|--------------------------|---------------|----|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 右為末每半錢以竹管吹入喉 | 又熱閉方 | 川升麻<br><small>兩半</small> | 右剉井水濃煎服少頃吐出毒氣 | 又方 | 山豆根<br>射干<br>升麻 | 右井水平煎服 | 喉風喉痺方 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十一 | 蠶退紙燒存性為末煉蜜圓皂子大含嚥 | 又方 綠礬研細米醋調嚥一邊痛側卧含嚥 | 又方 皂角肉半錠剉細以米醋一大盞煎至七分濾清嚥 | 通關散 | 白礬<br><small>枯</small><br>直僵蠶<br><small>炒</small><br>南星<br><small>生</small> | 藜蘆<br><small>錢各一</small><br>全蝎<br><small>焙二箇</small> | 右為末以小管挑一字吹入鼻中吐痰喉通 |
|--------------|------|--------------------------|---------------|----|-----------------|--------|-------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|

|         |                                                                               |                                                     |                |       |                                     |                                                     |                |                        |                      |               |      |                                                                               |             |                   |      |                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|-----------------|
| 又方治喉脾欲絕 | 雄黃<br><small>錢二</small><br>明礬<br><small>生</small><br>藜蘆<br><small>錢各一</small> | 蝎梢<br><small>七枚</small><br>猪牙皂<br><small>錢七</small> | 右為細末每服一字吹入鼻吐痰効 | 懸癰腫痛方 | 玄參<br><small>兩半</small><br>升麻<br>射干 | 大黃<br><small>分各一</small><br>甘草<br><small>錢一</small> | 右為末每三錢以井水煎時時含嚥 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十一 | 又方 明礬燒灰存性和鹽花研細筋頭點傳患處 | 穀賊方 脂麻炒為末以湯點服 | 喉癰閉方 | 白明礬<br><small>煨</small><br>牙硝<br><small>錢各一</small><br>臘<br><small>月半</small> | 右研細爛烏梅肉圓旋含嚥 | 又方治痰熱閉喉以蘿蔔汁和皂角漿吐之 | 又喉閉方 | 牙硝<br>臘脂<br>鹽梅屑 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|-----------------|





|           |  |               |  |     |  |                              |  |                         |  |             |  |            |  |                      |  |    |  |                      |  |                         |  |                    |  |                                |  |                         |  |                      |  |                      |  |                      |  |     |  |
|-----------|--|---------------|--|-----|--|------------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|------------|--|----------------------|--|----|--|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----|--|
| 右件同研以雞羽送入 |  | 又喉痛方以山豆根常常含嚥汁 |  | 附諸方 |  | 甘桔湯 <small>活人方</small> 治少陰喉痛 |  | 桔梗 <small>甘草各等分</small> |  | 右吹咀每服五錢水一鍾半 |  | 又方治喉痺并時行疼痛 |  | 桔梗 <small>甘草</small> |  | 升麻 |  | 連翹 <small>防風</small> |  | 黃芩 <small>酒炒各一錢</small> |  | 右吹咀作一服水二盞煎八分食後細細飲服 |  | 嚥化三黃丸 <small>秘方</small> 治咽喉痛大效 |  | 山豆根 <small>一兩二錢</small> |  | 鵬砂 <small>二錢</small> |  | 麝香 <small>少許</small> |  | 右為末用青魚膽為丸如菉豆大每服三五丸嚥化 |  | 津嚥下 |  |
|-----------|--|---------------|--|-----|--|------------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|------------|--|----------------------|--|----|--|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-----|--|

|         |  |                         |  |              |  |                                        |  |                                  |  |                                        |  |                      |  |                        |  |                      |  |                              |  |                          |  |     |  |                       |  |                       |  |        |  |                      |  |                      |  |                      |  |                    |  |
|---------|--|-------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|--|-----|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|
| 一方治咽喉腫痛 |  | 山豆根 <small>射干花根</small> |  | 右同陰乾為末吹入喉中如神 |  | 三黃丸 <small>大治</small> 丈夫婦人三焦積熱咽喉腫悶心膈燥煩 |  | 小便赤澁大便秘結並宜治之 <small>方見火門</small> |  | 涼膈散 <small>大治</small> 大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利 |  | 咽喉煩燥多渴腸胃秘澁小便不利一切風熱並宜 |  | 治之 <small>方見熱門</small> |  | 吹喉散治咽喉腫痛急慢喉閉懸癰乳驚嚥物不下 |  | 訶子 <small>一兩醋浸一宿去核曬乾</small> |  | 黃芩 <small>酒浸一宿曬乾</small> |  | 牛旁子 |  | 明礬 <small>一錢半</small> |  | 薄荷 <small>各五錢</small> |  | 一方有百藥煎 |  | 右為末先用好生薑擦舌上每用藥一錢蘆管吹入 |  | 喉中吐出涎痰便用熱茶喫下再吹第二次便用熱 |  | 粥三次再吹用熱茶或熱粥乘熱食之加朴硝末少 |  | 許如口舌生瘡用藥吹之口中利去痰涎為妙 |  |
|---------|--|-------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|--|-----|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|



針灸法一穴

在大指甲後第一節灸三小壯治累年喉痺舉發男灸左女灸右

少商二穴

在大指內側去爪甲角韭葉許針出血愈

合谷二穴

在虎口針五分

治喉閉立愈

齒

齒論

齒者骨之所終髓之所養腎實主之經云腎衰則齒豁精固則齒堅誠哉是言也或曰手陽明之支脉入齒手陽明者大腸經也於齒夫何預不思大腸傳送氣道行

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十一

焉壅則齒浮虛則宣露挾風則上攻頭面疳蠱則變成齲脫不相為而實相關也夫齒之為痛者五一曰風熱二曰風冷三曰毒痰四曰惡血五曰虫蝕風氣襲虛客於齒間乘於血氣故令斷腫熱氣加之膿汁遺臭此風熱之為齒痛一也血氣不足骨髓乃虛風冷湊入停於齒根不腫不蛀日漸動搖此風冷之為齒痛二也熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證壅盛咳唾交衝此毒痰之為齒痛三也頭面有風挾熱攻斷熱搏於



迪志文化出版有限公司出版

血故令血出瘀滯不消掣痛鑽刺此惡血之為齒痛四

也凡人飲食甘肥不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒根

有孔虫在其間蝕一齒盡又度其餘至如疳蠱皆其種

類必蟲殺而後痛止此非五曰虫蝕之證乎前是數者

痛有自来治各隨證條列於後雖然百物養生莫先口

齒不漱不洗損蠹之媒是不惟患生宿腐而暑毒酒毒

常伏於口齒之間莫若時時洗漱之為愈也臨睡洗畢

至於晨興灌漱一口吐出掌中就掌滌眼自覺光明終

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十一

身行之直可為終身受用

齒病證治

荊芥湯治風熱齒痛

荊芥

腦荷

升麻

細辛

右件等分為末每服二錢以沸湯點漱口含嚥併用

擦牙

消風散

方見頭風門

治齒熱痛斷腫有汁先傳消風散又以



迪志文化出版有限公司出版

|                   |      |
|-------------------|------|
| 朴消傳其上○又法川升麻煎湯漱嚥解毒 |      |
| 溫風散治風冷齒痛          |      |
| 當歸                | 川芎   |
| 白芷                | 萆撥   |
| 蜂房                | 藁本   |
| 分炒等               |      |
| 右剉每二錢井水煎服仍含漱      |      |
| 安腎圓               | 方見水  |
| 八味圓               | 方見痛  |
| 治冷證齒痛             |      |
| 香椒散治冷證齒痛          |      |
| 欽定四庫全書            | 仁齋直指 |
| 卷二十一              |      |
| 香附                | 紅川椒  |
|                   | 炒    |
| 故紙                | 炒    |
| 錢各                |      |
| 萆撥                | 錢一   |
| 右為末和炒鹽二錢擦傳        |      |
| 開笑散治風冷齒痛          |      |
| 白芷                | 細辛   |
|                   | 淨    |
| 良薑                |      |
| 萆撥                | 川椒   |
| 蜂房                | 炒    |
| 右件等分為末擦牙搗鼻        |      |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 皂莢散治風齒動搖                                                                            |                     |
| 長肥皂莢                                                                                | 二錢                  |
| 白鹽                                                                                  | 半兩                  |
| 右二件同燒赤研細常擦                                                                          |                     |
| 一陳湯                                                                                 | <small>方見瘡類</small> |
| 加細辛枳殼用薑棗烏梅煎治毒痰齒痛                                                                    |                     |
| 仍以片子薑黃華撥等分井水煎候溫以舌浸其中涎                                                               |                     |
| 自流                                                                                  |                     |
| 甘露飲治毒血齒痛                                                                            | <small>方見熱門</small> |
| 加升麻煎                                                                                |                     |
| 荊槐散治牙宣出血或痛                                                                          |                     |
|  |                     |
| <small>仁齋直指 卷二十一</small>                                                            |                     |
| 槐花                                                                                  | 荊芥穗                 |
| 右等分為末擦牙仍煎點服                                                                         |                     |
| 鬱金散治齒出血                                                                             |                     |
| 鬱金                                                                                  | 白芷                  |
| 細辛                                                                                  |                     |
| 右件等分為末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許                                                                |                     |
| 含嚥或炒鹽傳                                                                              |                     |
| 靈脂醋治惡血齒痛                                                                            |                     |
| 川五靈脂以米醋煎汁含嚥                                                                         |                     |



|                      |     |      |    |
|----------------------|-----|------|----|
| 鶴虱圓治虫蝕齒痛             |     | 又方   |    |
| 猪牙皂角                 | 錢三  | 川椒   | 半錢 |
| 生明礬                  |     |      |    |
| 鶴虱                   | 錢各一 |      |    |
| 右為末蒸飯搜圓如麻子大納於孔中有痰吐之  |     | 又方   |    |
| 椒鹽散治齒虫痛              |     | 又方   |    |
| 川椒                   |     | 白鹽   |    |
| 右件剉碎等分每服二錢以井水葱白煎熱含冷吐 |     | 蜂房   | 炒  |
| 虫蛀牙痛方                |     | 又方   |    |
| 川巴豆肉                 |     | 明乳香  | 錢一 |
| 右同研溶蠟圓麻子大每服一圓塞孔      |     | 又方   |    |
| 又虫痛方                 |     | 紅川椒末 | 錢一 |
| 又方                   |     | 大巴豆肉 | 粒一 |
| 右件研細蒸飯圓如麻子大以薄綿包塞孔    |     | 又方   |    |
| 明礬                   |     | 滴乳香  | 錢一 |
| 右為細末飯圓塞孔             |     | 又方   |    |

|                      |  |                      |        |
|----------------------|--|----------------------|--------|
| 又方                   |  | 又方                   |        |
| 蜘蛛殼一箇揉軟以薄綿包塞痰吐之○又方米醋 |  | 煮川椒入蜂房蘸軟撚塞○又方蠶紙燒存性擦少 |        |
| 時鹽湯漱口○又方雄黃末入麝研傳痛處    |  | 又方                   |        |
| 直僵蠶                  |  | 蜂房                   | 炒二件各等分 |
| 右為末皂角肉按濃漿煮少頃和作小圓塞痛孔  |  | 樟腦                   | 半      |
| 齒痛通用方                |  | 又方                   |        |
| 華撥                   |  | 生地黃                  |        |
| 荊芥穗                  |  | 白芷                   |        |
| 蜂房                   |  | 赤芍藥                  |        |
| 細辛                   |  | 藁本                   |        |
| 右為粗末每服三錢井水煎頻漱齒       |  | 赤甘草                  | 生等分    |
| 歸荊散齒痛通用              |  | 又方                   |        |
| 當歸                   |  | 荊芥穗                  |        |
| 川鬱金                  |  | 川升麻                  |        |
| 細辛                   |  | 白芷                   |        |



|                             |  |                         |  |                  |  |                                 |  |            |  |                                                     |  |                           |  |                                                              |  |                       |  |           |  |                                                                      |  |                  |  |                   |  |                                   |  |                                                                         |  |                   |  |                               |  |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|---------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|--|
| <p>華撥 <small>等分</small></p> |  | <p>右為末每服半錢揩痛處良久鹽湯灌漱</p> |  | <p>齊峰川椒散齒痛通用</p> |  | <p>紅川椒 <small>錢四</small> 樟腦</p> |  | <p>赤小豆</p> |  | <p>縮砂仁 <small>錢各二</small> 明礬 <small>錢煨一</small></p> |  | <p>右為末少許塞傳噉不妨齒痛惟藉川椒麻痺</p> |  | <p>又方蜂房 <small>炒三錢</small> 全蝎 <small>焙二箇</small> 為末傳亦治風疼</p> |  | <p>又通用方絲瓜乾燒存性為末擦傳</p> |  | <p>又方</p> |  | <p>蜂房 <small>炒</small> 明礬 <small>煨</small> 黃革丹 <small>分等</small></p> |  | <p>右為末飯為小圓塞齒</p> |  | <p>麝香散治疳蠱斷爛口臭</p> |  | <p>白礬 <small>煨</small> 青黛 胡黃連</p> |  | <p>蘆薈 <small>各一分</small> 蝦蟇 <small>炙焦半分</small> 麝 <small>一字</small></p> |  | <p>右為末每服半錢傳患處</p> |  | <p>又牙疳臭方以蜘蛛殼為末入噉脂麝傳之或用大蜘蛛</p> |  |
|-----------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|---------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|----------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|--|

|                              |  |                              |  |            |  |            |  |                 |  |                                 |  |                             |  |                             |  |                         |  |             |  |                                                     |  |                   |  |                       |  |               |  |                                                       |  |                       |  |
|------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--|------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| <p>蛛一枚以濕紙裹又用荷葉外包煨令焦存性為末入</p> |  | <p>少麝研傳○又蠶退紙燒入麝亦治牙疳○香附末可</p> |  | <p>為齒藥</p> |  | <p>牙癰方</p> |  | <p>朱砂 雄黃 磁石</p> |  | <p>石膽 礬石 <small>即銀星</small></p> |  | <p>右件等分入磁合鹽泥塗燒兩日夜覆地出火毒兩</p> |  | <p>日細末雞羽蘸傳瘡惡肉朽骨損牙俱出而愈此周</p> |  | <p>官五毒攻瘍正方諸惡肉朽骨瘡毒通用</p> |  | <p>牙蛀痛方</p> |  | <p>蠶紙 <small>燒存性</small> 直僵蠶 <small>炒等分</small></p> |  | <p>右為末擦傳良久鹽湯漱</p> |  | <p>又方鶴虱為細末擦良久鹽湯洗口</p> |  | <p>又牙宣出血方</p> |  | <p>明白礬 <small>煨二錢</small> 乳香 <small>半錢</small> 少麝</p> |  | <p>右件同研細輕手擦良久鹽湯灌漱</p> |  |
|------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--|------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|





酒齒痛方以井水洗口頻換且含且漱或百藥煎泡湯  
微冷含嚥或縮砂嚼傳齒痛通縮砂

附諸方

羌活散治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動搖肉

斷袒脫疼痛苦楚

麻黃

去節根  
三兩

羌活

半錢

防風

三分

藁本

三分

細辛

少許

升麻

五分

柴胡

兩半

當歸身

六分

蒼朮

五分

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十一

白芷

桂枝

三分

骨灰

即羊脛骨  
灰也二錢

草荳蔻

二錢

右為細末先用溫水漱口淨擦之其痛立止

草荳蔻散治寒多熱少牙疼痛

草荳蔻

一錢二分  
不去皮

黃連

半錢

升麻

二錢半

細辛葉

各二

防風

各二

骨灰

熟地黃

各五分

當歸

六分

右為細末擦之同前

立效散治牙齒疼不可忍痛及頭腦項背微惡寒飲大  
惡熱飲

防風

一錢

升麻

七分

炙甘草

三分

細辛葉

二分

草龍膽

酒製  
四分

右咬咀如麻豆大都作一服水一盞煎至五分去滓

以匙抄在口中燂痛處待少時立止如多惡熱飲更

加草龍膽一錢此法不定隨寒熱多少臨時加減若更

惡風作痛加草荳蔻五分黃連五分却勿加草龍膽累用

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十一

得効

秘方治風牙疼痛用芒硝食鹽川椒等分為末用肥皂

一箇去子將藥末安於肥皂內用線縛定用炭火燒

存性為末擦於患處立効久擦齒白牙堅

一方治陰虛牙出鮮血

四物湯赤牛膝香附生甘草側柏

秘方治牙落重出

公鼠骨

一付取骨法用鼠一箇剥去皮用礪砂  
擦上三日肉爛化盡取骨瓦上焙乾用



|                   |     |                    |
|-------------------|-----|--------------------|
| 香附                | 白芷  | 川芎                 |
| <small>兩一</small> |     |                    |
| 桑葉                | 地骨皮 | 川椒                 |
| 蒲公草               | 青鹽  | 川槿皮                |
| 早蓮草               |     | <small>錢各三</small> |
| 右為細末擦百日復出固齒無不效驗   |     |                    |
| 欽定四庫全書            |     |                    |
| 仁齋直指              |     |                    |
| 卷二十一              |     |                    |
| 仁齋直指卷二十一          |     |                    |



迪志文化出版有限公司出版

|              |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|
| 欽            | 定 | 四 | 庫 | 全 | 書 |
| 欽定四庫全書       |   |   |   |   |   |
| 子部           |   |   |   |   |   |
| 仁齋直指卷二十二     |   |   |   |   |   |
| 詳校官太醫院吏目臣周世恭 |   |   |   |   |   |
| 編修臣倉聖脈覆勘     |   |   |   |   |   |
| 覆校官中書臣朱鈐     |   |   |   |   |   |
| 校對官主簿臣汪日贊    |   |   |   |   |   |
| 騰錄監生臣張紹鼎     |   |   |   |   |   |



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指卷二十二

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

癰疽

癰疽方論

癰疽五發發腦發鬢發眉發頤發背是也人之一身血氣周流而無間稍有壅聚莫不隨所至而發見焉又豈特五者而已哉俗以癌癰癰附於癰疽之列以是為五

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

豈知癰與癌不過癰疽之一物古書所載僅有所謂癰疽則癰亦同出而異名也若癌若癰前未之聞合是以為五發其可乎癰者壅也疽者沮也血氣壅沮寒熱不散陰滯於陽則發癰陽滯於陰則發疽而所發無定處也蓋衣服厚煖則表易招寒滋味過多則裏易生熱感受日久熱勝於寒寒化為熱六腑蘊熱騰出於膚肉之間其發暴盛腫而光軟皮薄以澤侵展廣大者為癰其患浮淺不傷筋骨此可治也五臟蘊熱攻焮乎肌骨



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

之內其發停蓄狀如瘡癰皮厚以堅淡白焦枯者為疽其患沈深傷筋蝕骨此不可治也凡發熱憎寒頭痛惡心筋節拘牽氣急悶悶或病渴經年是皆欲發癰疽之證發於喉舌頭面腦項肩背脅腹四肢大節女子妬乳數者為險其他為緩腫高而軟者發於血脉腫下而堅者發於筋骨肉皮色不變者發於骨髓近骨者多冷近虛者多熱近骨久不愈則化血成虫近虛久不愈則傳氣成漏成虫則多癢少痛或先癢後痛成漏則多痛少癢或不痛不癢若形狀腫大按而後痛者其膿深小按即痛者其膿淺按之軟而即復者有膿按之強而不復者無膿瘡淺者欲在厚處瘡深者欲在薄處腫起堅硬膿稠者為實腫下軟慢膿稀者為虛有實熱者易療虛寒而邪熱多者難療癰疽已決去其膿而煩疼尚未全退其脈洪粗者又難為力要之癰疽脈來帶澁但得和緩為平若洪粗則銳毒不收鮮有濟也然則治療之法將何如曰血得溫則流行氣得溫則和暢服餌貼傳藥用

和平初覺則散腫內消已潰則排膿飲毒膿盡則去腐內塞惡肉盡則生肌傳痂此定則也瘡家臟腑生熱熱蒸其血血敗則腐肉肉腐則成膿當膿血燠聚之時所賴朝夕洗瘡以外舒其毒氣纔覺有膿即煖醋蘸熨而破之纔見敗肉即煑藥盪射而去之稍或稽延不反掌而侵蝕筋骨是必腐敗盡除庶幾真氣得復好肉得生耳而況癰疽險惡古人以虎口鳩毒喻之一芽初萌炙熨宣散急作主張殆有甚於拯溺救焚之不可緩也柰

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

何人多玩忽荏苒成形潰裂四出往往不救伊誰咎歟大抵癰疽自內發外最不可服冷藥亦不可傳冷藥但以溫和調治使毒氣自內發出可也若服冷藥則必至傷動臟腑若傳冷藥則逼令毒氣內行內氣有虧毒從外入衝心煩燥嘔吃嗽喘以至泄瀉此為內壞殺人無疑或不隨順療理妄以急澁澁劑行之歛口太速毒氣舒泄未盡必於其傍復發大疽活血排膿飲毒去腐生新收口人所共知也孰知諸痛癢瘡皆屬於心心主血



迪志文化出版有限公司出版

脉心通諸竅如茯苓茯神遠志益智石菖蒲等輩又當佐助於其間抑使病人不得憂驚嗔怒勞精疲神有觸於心尤關利害五臟六腑所包者一膜耳人有患疽醫療兩月新肉已平夜寐中幹者攻擊疾呼驚觸入心新肉開裂醫者謂其肉膜已破而後肉開神仙莫救果非心乎於此又能精加飲食使胃氣有所充和劑救裏使內氣得所養有諸中形諸外理勢必然切戒癰疽成形以後不得通利大便秘上醫宣毒蓋用車蠅瓜萐甘草紫

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

草等類以乳香沒藥佐之若大黃則不敢輕用也如其有熱即以赤茯苓麥門冬桑白皮燈心草利其熱於小便之中或以盃勺黑豆入紫蘇生薑如豆湯法亦能疏導若夫瘡口瘵熱而焮疼却暫用升麻山豆根厚黃藥煎湯入麝為之熏洗或瘡口斂平尚留一竅經時汁水不乾者其中必有淫虫朽骨當以藥消蝕而盡除之婦人患此適值月候不行尤當急為調血所謂大寒大熱大渴大吐大痛狂言無事喜笑鼻青唇慘赤暈不收膿



迪志文化出版有限公司出版

青血黯膿血腥臭血流不止小便如淋結硬過月方發硬如石榴不破多日不腫不疼昏睡不知痛癢患熱恣意取涼沈重痿弱氣乏肩項運掉不便心病臉如脂坯貼藥鮮血常流膿如赤白下痢眼小竄視而白睛青黑膿血大泄而焮腫且堅聲嘶色脫而肢體腫浮氣短喘粗赤恍惚嗜腫煩燥時嗽而腹痛渴甚飲食不下而服藥即嘔與熱吃逆嗽喘大便泄瀉皆惡證也抑猶有內外之別焉疽初發來一粒如麻豆許身體即熱患處亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫此為外發縱使極大用藥有條百無一失自發疽以來不問小大身體無熱但覺倦怠瘡亦不熱數日之間漸漸開濶不腫不高不焮不痛低陷而壞爛肉色紫黑此為內發盧扁無如之何蓋其未發以前臟腑已先潰爛矣此又善惡之衡鑑云雖然癰疽治法已條列於前矣究其病源有風有氣有食有藥毒有勞損而所受不同焉風則多癢氣則多痛食則發寒熱藥毒則堅硬勞損則瘦弱此外證

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二



迪志文化出版有限公司出版

之為可驗也風氣食三種易療藥毒勞損二者難醫大概風毒當驅風氣毒當調氣食毒當消積勞損當補虛藥毒則黑豆汁利之甘草生薑解之丹砂則羊血菴豆可以為佐登山到須酌水問源故推明本始以為瘍醫一髮之助

癰疽證治

灸法癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如錢貼其中心頓小艾柱灸之五壯而止若形狀稍大以黃稗紙蘸酒全貼認先乾處為筋脚於先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而止又法屈指從四圍尋按遇痛處是根就此重按深入自覺輕快即此灸之更於別處尋灸若或大腫即搗蒜為餅焙乾蘸法醋炙熱更換頻罨或以熨汁火於蒜餅上熨之更換熱餅頻罨如覺患處走散即以綿帛覆蓋勿令氣泄俟少間傳藥凡癰疽展大如龜之形且看頭向上下先灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長從盡處灸之須留頭并後兩脚

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二



迪志文化出版有限公司出版



勿灸若盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無所走散又攻入裏也或辨認不明以

白芷

分三

漢椒

桑白皮

各一

連根葱白

片十

右取新水煎湯入酸醋半盞淋洗少頃其筋自現可

以辨認頭尾

速消方癰疽發背已發未結已結未潰急以黃明牛皮膠新水溶令稀稠得所攤在抄紙上貼之良久以軟布

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

二條於醎醋中煮熱互換漉出罨在膠紙上蒸熨常要熱氣相接若患處癢乃藥氣透須忍癢頻蒸熨直至消散或破而膿出將盡即以貫衆煎湯洗去膠紙用退腫散蠲毒散沈水膏等類摻傳或使用拔毒散隨意急服萬金一醉膏或內消散乳粉托裏散破後以洗瘡方盪洗發散毒氣

拔毒散癰疽腫結通用能散能潰

南星

上等大白  
者一兩

草烏頭

白芷

各半  
兩

木鱉子仁

一箇  
研

右細末分兩次法醋入蜜調傳紗貼之  
蠲毒散治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿

大南星

兩一

貝母

分三

白芷

赤小豆

直僵蠶

焙各  
半兩

雄黃

二錢  
研

右細末初用醋調傳後用蜜水調傳

癰疽宣毒方諸癰疽已破未破通用

瓜蒌

一箇  
皮剉細

紫車蛾殼

一箇  
黃泥和鹽塗  
傳煨通紅用三錢

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

皂角刺

甘草

微灸各  
二錢

乳香

輕粉

各半  
錢

右細末先用老酒二椀煎瓜蒌濾清取一大椀五更煖瓜蒌酒調上項藥末空心服大便自下惡物如魚涎狀

宣毒一醉膏

瓜蒌

一箇  
去皮

老翁鬚

一倍  
半

右剉酒水等分同煎少頃入開口真川椒四十九粒



臨熟又入乳香沒藥末少許任意服

癰疽宣毒方

黑牽牛  
皮去

右取仁入猪腎中線札濕紙包熱火灰內煨香熟候

冷溫酒嚼下

宣毒方

斑猫  
一枚只翅去

好大棗  
一枚去核包裏斑猫入猪腎中線扎青竹葉重包濕紙裏煨熟去猫

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

右空心喫猪腎溫酒下

又方宣散癰疽腫毒

老翁鬚草  
亦名金銀花忍冬草驚驚藤水楊藤其藤左纏花五出而白微香蒂帶紅色野蔓

生延

右花與葉生搗煖酒調服無花只用葉酒和葉烘煖

可傳瘡

穿山甲散癰疽托毒排膿治五毒附骨在臟腑裏托出

毒氣止痛內消

蜂房  
一兩

蛇退

穿山甲

油髮  
並燒帶生存性各一分

右為末每服二錢入乳香末半錢煖酒調下

皂棘散托毒排膿

川芎  
半兩

甘草  
生一兩

乳香  
一分

皂莢刺  
燒帶生存性四兩

右末每二錢溫酒調下

芎歸托裏散托裏排膿生肌

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

川芎

當歸

白芍藥  
炒

木香

白芷

茯苓  
各半兩

人參

辣桂

丁香

甘草  
生各一分

右末每二錢食前米湯調下

癰疽毒入臟腑嘔吐惡食方

甘草  
焙半兩

丁香  
三錢半

右剉每服二錢水煎入麝少許溫服



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

癰疽腫毒傳藥仙靈散收腫斂毒排膿

滑蘭揅皮末 紫貝草搗

右二味同搗酒調為膏傳或蜜水調亦好滑蘭托毒

紫貝散血或單用紫貝草亦效

妙勝散收腫斂毒排膿

落地茄花去心并萼日乾磁器收 黃蜀葵花

右為末井水稀調雞羽掃放患處乾則再傳或收毒

平散或破潰出膿神效如瘡口開用末摻亦斂毒不

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

急瀝

消腫散癰疽通用

滑蘭皮 大南星 赤小豆

白芷 薑黃各一分 白芨半分

右細末酒調傳或蜜水醋同調傳

退毒散癰腫通用

木鱉子去油 大南星 半夏生

赤小豆 白芷 草烏連皮尖等分

右細末硬則法醋調傳熱熅則蜜水調傳

川烏散癰腫初發急用

川烏 蜈蚣窠土等分

右細末法醋調傳未結則散已結則潰

夜明砂膏潰腫排膿

夜明砂一兩 辣桂半分 乳香一分

右細末入乾砂糖半兩研和用井水調膏傳

乳豆膏治癰疽腫節疼痛入門先用此止痛

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

綠豆去皮取肉一兩 乳香竹葉裏熨一分

右末酒調傳傘紙貼乾則再傳續後却換消腫排膿

藥

星烏散治癰疽已結未作穴潰

大南星 草烏頭 辣桂等分

右末用酒或醋調傳軟白紙貼未穴再用

斂毒散傳四圍收毒

南星 赤小豆 白芨等分



右末井水調傳四圍軟帛貼上

退腫散癰疽腫毒通用

大南星 圓白者 半夏 生各半兩

赤小豆

五倍子 白芷 貝母 各二錢半

右細末蜜醋調傳

收毒外消膏

黃明牛皮膠 以長流水半升溶開一兩 號丹 再煎柳枝急攪五六沸一兩

右候冷收入磁合以雞羽攤於瘡上留口如未破傳

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

腫自消

乳香膏治癰疽腫毒惡瘡排膿止痛收縮筋脚

乳香 竹葉包熨研 沒藥 各一分 輕粉 一錢

麝 半錢 黃蠟 二錢 草麻子仁 一兩

右搗研極細成膏以撫紙折薄攤藥留眼貼之日二

換或純用草麻子仁入沒藥研細傳貼

保安妙貼散治癰疽發背腫毒

透明硫黃 為細末 蕎麥麪 各二兩



迪志文化出版有限公司出版

右用井花水調和作餅焙乾收下要得硫黃性和用時再末之入乳香少許井水調厚傳瘡上如乾以雞羽蘸新水潤之如此至瘡愈方歇痛則不痛不痛則痛神驗

蜀葵膏治癰疽腫毒惡瘡

黃蜀葵花

右用鹽摻取入磁器密封經年不壞患處傳之自平

自潰蜀葵子炒碎入宣毒藥中尤驗

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

皂角膏癰疽腫結通用

不蛀皂角 滿尺者槌碎去弦核

右以法醋煮爛研膏傳之自消

四虎散治發疽腫硬厚如牛皮按之方痛

大南星 草烏頭 半夏 生

狼毒 等分

右細末醋蜜調傳留頭出毒氣

沈水膏癰疽發背排膿斂毒



迪志文化出版有限公司出版

|                                 |                              |                           |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 大南星<br><small>分三</small>        | 白芨                           | 白芷                        |
| 赤小豆                             | 半夏<br><small>生</small>       | 貝母<br><small>各半兩</small>  |
| 木鱉子仁<br><small>油去</small>       | 乳香                           | 沒藥<br><small>各二錢半</small> |
| 雄黃<br><small>錢一</small>         |                              |                           |
| 右細末井水入蜜調傳紗貼                     |                              |                           |
| 爐峯散治癰疽腫毒等患                      |                              |                           |
| 爐甘石<br><small>綠者十分細一兩</small>   | 大南星                          |                           |
| 半夏<br><small>生各半兩</small>       | 五倍子                          | 赤小豆                       |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二</small> |                              |                           |
| 片薑黃                             | 直僵蠶                          | 貝母                        |
| 白芨<br><small>錢各四</small>        | 乳香<br><small>二錢半</small>     |                           |
| 右細末未破者酸醋調傳已潰者清蜜調傳半乾濕            |                              |                           |
| 只摻若紅腫多汁生地黄研汁調傳仍煎苦參桑白            |                              |                           |
| 皮湯淋                             |                              |                           |
| 麝香散癰疽已結而頭不破用此                   |                              |                           |
| 直雀屎<br><small>研一錢</small>       | 斑猫<br><small>去頭足翅一錢半</small> | 腦                         |
| 麝<br><small>隨意</small>          |                              |                           |

|                                 |                                |                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 右細末法醋調少許點在有頭處立破急用煎黃連            | 湯洗去                            | 湧泉膏治癰疽軟而瘡頭不破或已破而瘡頭腫結無膿  |
| 斑猫<br><small>去頭足翅焙</small>      |                                |                         |
| 右為末揉和蒜膏似小豆許點在膏藥中准瘡口處            |                                |                         |
| 貼之少頃膿出即去藥或用綠礬直雀屎少許用餅            |                                |                         |
| 藥調一點傳瘡頭軟處亦破須四圍塗藥護之              |                                |                         |
| 蚣蝎散治癰疽瘡口小而硬貼膏藥膿不出是為風毒           |                                |                         |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二</small> |                                |                         |
| 所勝用                             |                                |                         |
| 赤足蜈蚣<br><small>一條去頭足</small>    | 全蝎<br><small>三枚實全尾者並生用</small> | 木香<br><small>一錢</small> |
| 右細末每用一字摻於膏藥錢上准瘡口貼如瘡口            |                                |                         |
| 開濶不硬勿用若是風邪所搏即煎連根葱白五莖            |                                |                         |
| 次入白芷末半兩少頃濾清淋洗明日又洗仍服不            |                                |                         |
| 換金正氣散                           |                                |                         |
| 護肌膏收暈斂毒                         |                                |                         |
| 大南星<br><small>兩二</small>        | 明白礬<br><small>並生用七錢半</small>   | 白斂                      |





白芨

雄黃

右細末每半兩生地黃取汁調傳瘡暈外舊肉上自

外圓而促歛之又驗瘡用新水調筆醮傳瘡藥力勝

則腫消皮皺易療若腫處皮急暈開難療

神功妙貼散塗傳癰疽暈內使膿血化為水出收暈歛毒

大南星

圓白者

草麻子仁

各四錢

半夏

生

白芷

消片

薑黃

五倍子

淡紅者

貝母

白芨

各三錢

沒藥

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

乳香

各三錢

花藥石散

二貼

右細末夾和井水入蜜調傳瘡色黯晦薑汁調傳從

暈邊抹收入裏留中間如錢大貼膏藥若瘡開大全

用紗攤藥以舊茶籠內白竹葉尾煎兩片如瘡勢先

貼藥上然後貼瘡久年蓬仰上竹葉亦得竹葉出水

藉藥以行之凡傳藥須是細末則不痛

內消散癰疽惡瘡方萌纔覺便服

穿山甲

插入穀芒熱灰中候焦黃

右為末入麝隨意每服二錢半溫酒調下或瓜蒌煎

酒調下尤妙日兩服

大全內消散內消癰疽惡毒纔覺便服

穿山甲

截片以穀芒槌炒脆一兩

當歸

半兩

甘草

二錢半生

右末每服三錢溫酒調下

小車螯散內消癰疽取下惡毒首初便服

紫貝大車螯

生取殼一合鹽泥塞滿相合麻線纏鹽泥塗外日乾炭火煨通紅去泥冷

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

地出火毒一伏時

右細末每服三錢入生甘草末一錢輕粉一字用瓜蒌

一枚燈心三十莖分兩次煎酒乘熱調下五更溫服天

明又服日中大便下黑苔惡物或不用甘草入蜜二匙

皂刺散治癰疽等患宣毒排膿首初便服

皂角刺

紫黑色者

連皮瓜蒌

等分

北五靈脂

減半

右剉細每服四錢酒二大盞煎六分入乳香少許溫

服皂刺亦能宣毒



萬金一醉膏治癰疽發背宣導惡毒始初便服神妙

瓜蒌一箇去皮碎研 甘草生粗末半兩 沒藥水中研二錢半

右用紅酒三大碗煎取其半分兩服溫服之在上食

後服在下食前服重者再劑以瘥為度又方加當歸

白芷并些乳香更要宣毒加紫皂角刺一分

粉乳托裏散癰疽初發便服或毒氣入裏衝心煩悶吃

嘔嗽喘以至泄瀉急用此頻服托裏返出毒氣自內發起

於外此藥又能消已發未發皆可服神妙

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

真菉豆粉心二兩 明乳香半兩以竹葉包熨斗火熨乃研細

右末每服二錢熟新水調下或生甘草煎湯調食後

少時細呷常要藥味在胃膈間則毒氣不能攻心或

瘡已沈晦用當歸一錢辣桂二錢煎湯調下仍以加

味不換金正氣散為佐小兒豆瘡陷入粉乳散能救

之瘰癧攻心嘔悶通治

蠟礬圓治癰疽發背瘰癧漏瘡惡瘡衛護內膜驅解諸

毒自然內消神妙

通明白礬生用二兩

右細末黃蠟一兩二錢溶汁就爐上入礬拌和衆手

圓桐子大每服十五圓熟水下或冷酒下常常服之

漏瘡用油髮又和雞內金末外塞

明膠酒治癰疽等患使毒氣不攻於內不轉惡證

通明牛皮膠每用一兩截片

右醇酒一大碗入膠重湯煖令溶散通口服

排膿內消散治癰疽發背活血排膿消毒紅內消即紅

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

何首烏一兩 當歸 川芎

生地黄 川續斷各洗 茯苓

芍藥 白芷 半夏麩

霍香葉各半兩 紫草茸 甘草炙各三錢半

右粗末每服三錢新水二分酒一分薑棗煎服有熱

者加燈心只用水煎

究原排膿內補散活血排膿扶養內氣或大潰開爛用

此救裏內塞方見腸門以加味不換金正氣散佐之有熱



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 證者勿用以排膿內消散加燈心服                           |                          |
| 五香散治癰疽須用香氣透達經絡                           |                          |
| 木香                                       | 丁香<br>霍香葉<br>各一分         |
| 沈香                                       | 乳香<br>連翹                 |
| 木通                                       | 續斷<br>桑寄生                |
| 甘草                                       | 微灸各半分                    |
| 右細剉每服三錢井水一椀煎七分入麝少許患在上食後服患在下食前服五發證皆令人頭痛惡心 |                          |
| 寒熱氣急拘攣此藥療之如有熱加燈心桑白皮                      |                          |
| 加味不換金正氣散治癰疽寒熱往來或內挾風邪或                    |                          |
| 內氣虛餒通用最能發出風毒可與排膿內補散並行                    |                          |
| 蒼朮                                       | 麸炒<br>橘紅<br>半夏麴          |
| 霍香葉                                      | 厚朴<br>製各一兩<br>甘草<br>灸七錢半 |
| 白茯苓                                      | 川芎<br>各半兩<br>木香<br>二錢半   |
| 右為末每服三錢薑五片棗二枚煎服若瘡陷不發多加辣桂當歸               |                          |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 二香散風氣食三證通用調暢胃氣須兼服之                                                                  |                        |
| 木香                                                                                  | 霍香葉                    |
| 白豆蔻仁                                                                                |                        |
| 半夏麴                                                                                 | 厚朴 <small>製</small>    |
| 橘皮                                                                                  |                        |
| 茯苓                                                                                  | 蒼朮 <small>炒</small>    |
| 甘草                                                                                  | <small>灸各半兩</small>    |
| 益智仁                                                                                 | 縮砂仁 <small>各一兩</small> |
| 丁香                                                                                  | <small>二錢半</small>     |
| 右粗末每二錢半薑棗煎服                                                                         |                        |
| 黃耆托裏散托裏內虛止痛                                                                         |                        |
| 黃耆                                                                                  | 白茯苓 <small>各一兩</small> |
| 甘草                                                                                  | <small>生二錢半</small>    |
|  |                        |
| 欽定四庫全書                                                                              |                        |
| <small>仁齋直指卷二十二</small>                                                             |                        |
| 乳香                                                                                  | <small>別研一錢半</small>   |
| 右末每服二錢酒小盞慢火煎如膏再添酒調服內                                                                |                        |
| 虛加當歸                                                                                |                        |
| 當歸酒治癰疽陰證頭平向內沈黯不疼渾身患處不                                                               |                        |
| 熱                                                                                   |                        |
| 辣桂                                                                                  | <small>去粗皮半兩</small>   |
| 當歸                                                                                  | <small>四錢</small>      |
| 木香                                                                                  |                        |
| 白芷                                                                                  | <small>各二錢</small>     |
| 右細剉每服三錢半醇酒一椀慢火煎七分入乳香                                                                |                        |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二



迪志文化出版有限公司出版

末半錢不飢飽溫服以排膿內補散加味不換金正  
氣散為佐以熟鋪猪蹄膂肉為養喬麥麪能起發可  
煑食之如更不發起用局方薑附湯加當歸木香灸  
甘草煎服又更不發起用

穿山甲

頭截片  
醋炒焦

生人牙

煨留性  
各一分

右為末分作兩服用辣桂當歸去節麻黃煎酒食前  
調下患處用生薑汁和麪厚塗或用川烏硫黃人牙  
煨並細末酒調傳之

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

神授香附湯治癰腫結硬聚毒作痛

香附

杵去皮用生薑  
汁浸一宿曬乾

右末每一錢半米飲調下或紫蘇甘草煎湯調下進  
數服腫硬自消有膿即出於氣證尤便急用只小烏  
沈湯

消毒散內消癰疽惡毒

當歸

白芷

甘草

生

赤小豆

紫草茸

各半  
兩

貝母

一兩



迪志文化出版有限公司出版

右末每二錢半水酒煎日二服

瞿麥散排膿止痛通利小便從小便出毒氣

瞿麥穗

赤小豆

當歸

川芎

白芷

黃耆

赤茯苓

各半  
兩

辣桂

甘草

各二  
錢半

右末每二錢半酒調下

萬病解毒圓治癰疽發背魚臍毒瘡藥毒草毒挑生毒

蛇獸毒蠱毒療虫諸惡病

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

文蛤

即五倍子  
一兩半

山茨菰

即金燈花根  
一兩洗焙

紅牙大戟

洗焙七  
錢半

全蝎

五  
枚

大山豆根

續隨子

取仁去油留  
性各半兩

麝香

一錢

朱砂

雄黃  
各二錢

右件先以前五味入木臼搗羅為細末次研後四味  
夾和糯米糊圓分作三十五圓端午七夕重陽臘日  
淨室修合每服一圓生薑蜜水磨下井水浸研傳患  
處解毒收瘡救病神妙朱砂雄黃功能醫五毒攻瘍中



迪志文化出版有限公司出版

|    |  |                |  |                                                                      |  |          |  |             |  |                                              |  |                  |  |           |  |                  |  |                             |  |                              |  |                        |  |                   |  |          |  |                         |  |                       |  |
|----|--|----------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-------------|--|----------------------------------------------|--|------------------|--|-----------|--|------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|----------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| 物也 |  | 紅內消散癰疽內蘊熱外發熱用此 |  | 紅何首烏 <small>兩半</small> 遠志 <small>水浸取肉</small> 赤茯苓 <small>薑汁焙</small> |  | 川芎 北梗 苦參 |  | 赤小豆 赤芍藥 蔓荊子 |  | 威靈仙 <small>各三錢</small> 生甘草 <small>兩半</small> |  | 右末每服二錢麥門冬十四粒煎湯調下 |  | 清心散治癰疽有熱證 |  | 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二 |  | 遠志 <small>製</small> 赤茯苓 赤芍藥 |  | 生地黃 麥門冬 <small>去心</small> 知母 |  | 甘草 <small>生各等分</small> |  | 右剉每三錢薑棗煎服小便秘加燈心木通 |  | 癰疽大便秘導毒方 |  | 紫草 瓜蒌 <small>連皮</small> |  | 右剉新水煎服或用黑豆一盞入生薑紫蘇煎湯亦得 |  |
|----|--|----------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-------------|--|----------------------------------------------|--|------------------|--|-----------|--|------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|----------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|

|       |  |       |  |               |  |                             |  |                                                                           |  |                                                    |  |                                             |  |                            |  |                        |  |       |  |                            |  |                         |  |             |  |       |  |
|-------|--|-------|--|---------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|-------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|-------|--|
| 癰疽煩渴方 |  | 參苓白朮散 |  | 右以瓜蒌根菉豆烏梅煎湯調下 |  | 加味八味九降心火生腎水治諸渴疾癰疽未發前已瘥後渴證通用 |  | 好熟地黃 <small>洗焙二兩</small> 山藥 <small>剉微炒</small> 山茱萸 <small>蒸取肉焙各一兩</small> |  | 辣桂 <small>去粗皮半兩</small> 澤瀉 <small>截作塊酒蘸磁器盛</small> |  | 牡丹皮 <small>焙</small> 白茯苓 <small>各八錢</small> |  | 真北五味子 <small>研火焙透別</small> |  | 右為末煉蜜候冷和圓桐子大每服三十圓空心鹽湯下 |  | 癰疽腹痛方 |  | 辣桂 <small>一分</small> 木香 芍藥 |  | 北五靈脂 <small>各半分</small> |  | 右剉散每服三錢薑棗煎服 |  | 癰疽泄瀉方 |  |
|-------|--|-------|--|---------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|-------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|-------|--|





粉乳托裏散

右用木香白茯苓煎湯調下加味不換金正氣散佐之嘔惡通用

癰疽虛證寒戰方

明乳香  
研細半兩

右每服一錢熟水調下戰發於肝乳香着肝而溫之寒戰隨止

山藥丸  
見蜀門治癰疽因腎虛勞損所發每服七十圓五

欽定四庫全書  
仁齋直指卷二十二

更初腎氣開時端坐勿言勿動勿咳勿唾侍側有人進藥鹽湯下日間以排膿內補散加川芎當歸白茯苓佐之最療勞損證

內托黃耆丸癰疽因針砭錐割傷其經絡白膿赤汁逗留不止用此

黃耆  
二兩當歸  
生七錢半

木香  
二錢沈香  
二錢乳香  
別研各半

右末菴豆粉一兩生薑汁煮糊圓桐子大每服七十

圓溫熟水下

特異萬靈散治癰疽發背腫毒等患神妙

軟石膏  
燒通紅椀覆在泥地上一宿大白南星

赤小豆  
連皮尖各半兩乳香  
別研二錢

右細末蜜水調膏從外抹收入留最高處如錢勿傳如已破切忌藥入瘡口恐痛斂毒排膿不致潰爛屢效

洗瘡方

欽定四庫全書  
仁齋直指卷二十二

莽草  
苦參貝母

射干  
木通蜂房

大腹皮  
桑白皮漢椒

連根葱白  
用多白芷

右煎湯密室中淋洗

又方

白芷  
一兩新桑白皮  
三分貝母  
半兩

漢椒  
三錢紫蘇  
三錢



右剉碎分兩次入連根葱煎以葱蘸湯洗潰爛者猪蹄煎湯洗或水膠煎湯洗亦好

北艾湯癰疽瘡口冷滯膿血少肉色白久不合逐日用

北艾一把

右煎湯密室中洗仍以白膠燒煙熏之續貼膏藥仍

多服排膿內補散加味不換金正氣散

又方瘡口已成大窟以

桑白皮一分 當歸半分

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

右為末乾摻外用北艾蘸蜜水研細塞口

桑皮散治瘡口有熱攻焮作痛亦爛淫汁

桑白皮新者一兩 苦參 槐花

天花粉晒各半兩

右杵細末乾摻仍煎苦參桑白皮湯盪洗瘡者加檳

榔輕粉

又癰疽方

白芷 桑白皮

右煎湯洗以桑白皮末摻效

又瘡口大窟專以

大桑葉日乾

右末之頻摻効經霜黃桑葉尤好摻傳煎湯皆可用

又方

生絲瓜或生地黃或芭蕉根取汁筆蘸抹

消蝕散消蝕惡肉淫虫朽骨先用洗瘡方然後傳此

明白礬入銀窩內瓦蓋煨令性盡一兩

綠礬煨熱

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

雄黃 乳香 好胭脂

遠志水浸取肉焙各二錢

右細末蜜水研膏傳惡肉上麻油調亦得

又消蝕方臘月收獐猪糞燒存性

獐猪糞臘月取一兩 雄黃研 雞心檳榔各二錢

右細末濕者摻乾者麻油輕粉調抹蝕惡肉藺茹好

茶蠟圓諸瘡潰後孔中以鎔蠟和好茶捏尖圓塞其中

以牛角內粉屑夾天花粉真蚌粉乾摻消毒生肌



|                                                                                                             |                   |       |                    |                      |            |           |     |            |         |           |     |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------|-----|------------|---------|-----------|-----|------------|-----|
| 欽定四庫全書<br><br>仁齋直指<br>卷二十二 | 欽定四庫全書            | 保安欽瘡方 | 次入餘藥末研和乾摻神妙        | 右滑石花藥石炭燒通紅椀覆泥地一伏時為細末 | 滴乳香<br>各一錢 | 白芨<br>半錢  | 軟滑石 | 雞內金<br>各半兩 | 號丹<br>煨 | 白欽<br>二錢半 | 花藥石 | 雞內金<br>各半兩 | 欽瘡散 |
| 厚黃蘗<br>半兩                                                                                                   | 右細末井水調傅須膿盡乃用潰者亦能欽 | 硬瘡生肌方 | 降真香<br>一兩紫赤大片者油處更好 | 半夏<br>生各半兩           | 乳香<br>各二錢  | 桑白皮<br>新者 | 當歸  | 又方         | 右細末乾摻   |           |     |            |     |



|                        |                 |            |                          |                            |                           |                             |                                                                                  |     |                                   |                            |                          |               |                           |     |      |    |                           |     |    |                        |     |     |
|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----|------|----|---------------------------|-----|----|------------------------|-----|-----|
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十二 | 右細末麻油調傅瘡深則摻傘紙護之 | 太乙膏治癰疽發背惡毒 | 好號丹<br><small>二兩</small> | 男生髮<br><small>洗焙二錢</small> | 木鱉仁<br><small>碎三枚</small> | 肥白巴豆肉<br><small>十八粒</small> | 右用麻油四兩慢火先煎巴豆木鱉髮團更換柳枝攪准髮耗五分頓冷爐絹濾再煖入淨號丹換柳枝頻攪候色變滴入水成珠隨意入乳香末再煎沸傾入磁器候凝覆泥三日貼用凡修合膏藥密室中勿 | 生肌散 | 老狗頭生腦骨<br><small>截碎新瓦煨透二兩</small> | 桑白皮<br><small>新者一兩</small> | 當歸<br><small>二錢半</small> | 右細末先盪洗後摻藥傷撲通用 | 白芨<br><small>各二錢半</small> | 厚黃蘗 | 降真香節 | 白欽 | 雞內金<br><small>各半兩</small> | 南木香 | 當歸 | 半夏<br><small>生</small> | 大南星 | 五倍子 |
|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-----|------|----|---------------------------|-----|----|------------------------|-----|-----|



令猫犬婦人見之

神應膏治癰疽發背惡毒

龍泉好光粉 二真麻油 兩三

右慢火同熬更換柳枝頻攪滴入水成珠方入白膠

末少許徐徐傾入磁器以水浸兩日抄紙攤貼

神異膏治癰疽發背惡毒瘡癰

黑參 白芷實 露蜂房

杏仁 皮不去 木鱉仁 男生髮 洗焙各二錢

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

蛇退 鹽水洗 焙一錢 肥白巴豆 一十粒

右剉細麻油五兩同藥入磁鉢浸一宿慢火煎更換

柳枝攪候藥色焦黑頓冷爐生絹濾再入鉢煖入淨

號丹二兩柳枝急攪候黑滴入水成珠入乳香末二

錢拌和傾入磁器候凝覆泥地三日貼用

遇仙膏治癰疽發背毒瘡等

川五靈脂 白芷 貝母 各半兩

當歸 二錢半

右剉細柳枝截二十四寸麻油六兩同上藥入磁鉢

一宿慢火煎柳枝攪藥色稍焦入肥白巴豆二十一

粒木鱉仁碎五箇攪煎令黑頓冷爐生絹濾再煖入

蠟半兩溶盡再頓冷爐入淨號丹二兩半更換柳枝

急攪候色黑滴入水如珠入乳香沒藥末各二錢拌

和傾入磁器候凝覆泥地三日貼服皆好柳枝止痛

神仙截法治癰疽發背毒瘡發作便服使毒氣不內攻

可保

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

真麻油 銀器內煎十餘沸 傾出候冷一斤

右和醇酒二椀分五次盪溫日夜服盡解陰證沈毒

將理法

避風邪 少睡卧 勿驚憂 勿嗔怒 徐行動

省言語 戒閨房 絕思慮 防觸穢 聽好事

瘡頻洗 藥常助 鹽漱聞香 二便順序

擇飲食內充無飢飽失度 傳藥運掉屈伸瘡口常

加愛護 妄用惡草愈滋其毒不忌飲食反害其瘡



皆非正法

癰疽發背龜形灸法凡發背如龜形辨認龜頭不論左右上下但以腫高處為頭或有疑似即以黃稭紙蘸醋掩之先乾處為頭把筆點定男女皆取左手中指用草比量全指為度一樣剪草十二片六片安頓在外合作龜背形六片安頓於龜背之內中心直頓二片四方分頓四片內外各相連合如是則頭尾四足定矣以筆點其尾足抹蒜膏灸之先灸其尾七壯火未滅便灸後一

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

脚七壯火未滅又灸後一脚七壯迤邐如是灸至前兩脚而止須留龜頭莫灸以出毒氣法艾捍實如筋中間大剪作艾柱此法合陰陽氣候可用灸之省力療理論熱背發大瘡惟發熱則謂之背若不發熱皆癰也其有陰證於五臟內發者却又沈晦無熱大凡癰疽惟藉有熱則發熱則氣血行冷則氣血滯熱則能生肌冷則瘡不合遇有熱者切不可退熱但用溫藥以微涼少濟之是為和劑



迪志文化出版有限公司出版

論暈癰疽發背俗以腫痕所至為暈非真暈也暈生於瘡口之傍如紅筋之狀纔見暈則非美證矣一暈二暈以至三暈尚可措手若四暈五暈是臟腑蘊受銳毒斷難醫

保安灸甘草方癰疽漏瘡通用神妙

粉草

以山泉溪澗長流水一小椀徐蘸慢火灸水盡為度秤一兩

右剉粗末用醇酒三椀煎二椀空心隨意溫服最活

血消毒

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

癰疽方

赤小豆

綠豆

黑豆

川薑黃

右為細末未發起薑汁和井水調傳已發起蜜水調傳

諸癰疽大便秘方

甘草

生一兩

右剉碎井水濃煎入酒溫服能疎導惡物



迪志文化出版有限公司出版



|     |                                 |                        |                                                  |                           |         |                        |                             |                      |      |             |        |     |        |    |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------|-------------|--------|-----|--------|----|
| 蝕漏方 | 生油髮 <small>燒留性</small> 白及一錢細末摻傳 | 去水膏治癰疽破穴後誤飲皂角水及諸毒水以致疼痛 | 甘草 <small>生為末</small> 一分砂糖糯米粉 <small>各三分</small> | 右為膏攤在絹上貼毒水自出驢馬汗及尿糞一切青水皆治之 | 木香摻收瘡口方 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十二 | 木香雞心檳榔號丹 <small>煨各錢</small> | 輕粉 <small>半錢</small> | 右細末摻 | 秦芫摻方治一切瘡口不合 | 秦芫細末摻之 | 盪洗方 | 蜂房白芷苦參 | 川椒 |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------|-------------|--------|-----|--------|----|

|          |         |                                     |                               |                                              |                       |                        |                                                                       |                  |                                                                 |
|----------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 右煎洗熱熨加荊芥 | 癰疽瘡口深大方 | 深山黃牛糞 <small>塞滿瘡籐紙貼上一四日後</small> 蜂房 | 白芷大腹皮 <small>三件煎湯淋洗拭乾</small> | 右以黃桑葉晒為細末撒摻常服酒調排膿內補散飲醇酒食肥肉自然生肌深山黃牛喫百草平田牛只喫禾藁 | 諸惡核方或在上或在下頑結留滯不潰不散用療癰 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十二 | 門立應散宣毒從小便出非用一醉膏之類宣毒從大便出也先以大戟草烏為末酒調傳仍服蠟礬丸或穿山甲灸焦為末溫酒調下佐之在上者加皂莢刺帶生灰煎葱湯熏洗 | 癰疽惡核男以左邊為重女以右邊為重 | 發頤方此瘡最險毒氣灌注頭面腫大可畏牙齒亦脫治法○解開頭髮尋頂螺中灸二十一壯如不透達灸至四十九壯而止其瘡開口大孔用東向石榴皮晒為 |
|----------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|



細末撒摻其中特異萬靈散本方加煨過石膏半倍蜜水少許調傳四圍不換金正氣散排膿內補散二藥各加川續斷皂莢刺燒去半帶生灰相間煎服皂莢刺性上行主上焦病凡癰疽藥太溫加乾薄荷煎服石膏性寒始亦疑之然火煨通紅盆覆地上以出火毒最能收暈使瘡口把就不至爛肌

附諸方

真人活命飲治癰疽發背發腦發髭發脇癰毒騎毒腫

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

肚癰腿癰附骨癰疽惡瘡惡漏瘡血塊氣塊面目手

足浮腫隨病加減並宜治之

天花粉

錢一

甘草節

乳香  
一透明各

川山甲

三大片蛤  
粉炒去粉

赤芍藥

白芷

貝母  
錢各一

防風  
去蘆七分

沒藥

皂角刺  
錢各五分

當歸尾  
洗酒

陳皮

錢各半

金銀花

錢三

或加大黃

錢一

木鱉子

去殼  
八分

體虛加黃耆

錢一

在背俞皂角刺為君 在腹白芷為君 在胸次加瓜蒌二錢 在四肢金銀花為君 如疔瘡加紫河車草根三錢 無加亦可 右作一貼用金華好酒一鍾半煎至一鍾溫服煎時次用大瓦瓶以紙密封口勿令泄氣能飲酒服藥後再飲數鍾浩大不可憶度

偈云

真人活法世間稀

大惡癰疽總可醫

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

消毒只如湯潑雪

化膿漸使肉生肌

陰功豈止萬人活

神効何須刻日期

留下仙方誠信授

存仁修製上天知

此方治一切癰疽疔腫不問陰陽虛實善惡腫潰大痛或不痛先用此劑大勢以退然後隨餘證調治其功甚捷誠仙方也

防風通聖散治癰疽通用

方見中  
風門

狗寶丸

濟生  
方

專治癰疽發背附骨疽諸般惡腫將發時



|                            |           |               |              |                   |     |                |    |                                                                                                                        |            |
|----------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|-----|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 先覺口中煩渴四肢沈重遍身壯熱乃其候也此藥功效不可具述 |           |               |              |                   |     |                |    |                                                                                                                        |            |
| 蟾酥                         | 錢二        | 金條蜈蚣          | 七條全者<br>酥炙黃色 | 輕粉                | 雄黃  | 滴乳香            | 沒藥 | 烏金石                                                                                                                    | 即石炭<br>各一錢 |
| 狗寶                         | 一錢        | 狗腹中得之<br>又去一兩 | 狗膽           | 一箇乾者用之<br>皮黑狗臘月者佳 | 鯉魚膽 | 一箇乾者用<br>之臘月者佳 | 粉霜 | 黃臘                                                                                                                     | 錢各三        |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二           |           |               |              |                   |     |                |    |                                                                                                                        |            |
| 孩兒乳                        | 一合頭<br>首者 | 鉛白霜           | 一錢一<br>本無此   | 礪砂                | 兩半  | 麝香             | 一分 | 右先將乳汁黃臘放在罐內文武火化開次將各藥末和成劑用時大人丸菴豆大小兒丸如芥子大每服三丸病重者加至五丸用白丁香七箇研爛新汲水調送下腰以下食前服腰已上食後服如人行五里熱葱白粥投之即以衣被蓋定汗出為度已後只喫白粥常服十宣散留頭其四邊以烏龍膏貼 |            |

|                                                                                                 |      |                     |                       |    |     |         |      |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|----|-----|---------|------|---------|---------|
| 漏蘆湯 <small>精義</small> 治一切惡瘡毒腫丹瘤癰癤疔腫魚睛五發癰疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沈重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便秘濇小便赤黃並宜服之惟妊娠忌服 |      |                     |                       |    |     |         |      |         |         |
| 漏蘆                                                                                              | 白欵   | 黃芩                  | 去黑心                   | 麻黃 | 去節  | 枳實      | 去穢炒  | 升麻      | 升麻      |
| 芍藥                                                                                              | 甘草   | 一灸各錢                | 大黃                    | 二錢 | 朴硝  | 一錢      | 右水煎服 | 千金漏蘆湯   | 精要 治證同前 |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二                                                                                |      |                     |                       |    |     |         |      |         |         |
| 漏蘆                                                                                              | 連翹   | 黃芩                  | 白欵                    | 枳殼 | 去穢炒 | 升麻      | 麻黃   | 去根節 各一錢 | 大黃      |
| 粉草                                                                                              | 灸    | 枳殼                  | 去穢炒                   | 升麻 | 麻黃  | 去根節 各一錢 | 大黃   | 濕紙煨     | 半       |
| 朴硝                                                                                              | 別研一字 | 右作一服用水一盞半煎至八分去滓空心熱服 | 淵然真人奪命丹專治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一 |    |     |         |      |         |         |



切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡證藥中至寶病危者服之亦可矣萬無一失不可輕易

蟾酥 二錢乾者老酒化 血竭 一錢 乳香

沒藥 銅綠 硃砂 為衣各二錢

輕粉 半錢 膽礬 寒水石 各一錢

雄黃 三錢 射香 半錢 腦子 半錢無亦可

蝸牛 一十一箇連殼用 蜈蚣 一條酒浸炙去頭足

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

右為細末將蝸牛研作泥和前藥為丸如菉豆大若丸不就以好酒煮麪糊為丸每服只二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子裹在葱白內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣被蓋覆約人行五里之久再用熱酒數杯以助藥力發熱大汗出為度如汗不出重者再服二丸汗出即効初覺者二丸即消三五日病重者再進二丸如疔瘡走黃過心者難治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱搗

爛裹藥仍以熱酒吞下瘡在上食後服瘡在下食前服服後忌冷水黃瓜茄子油麵猪羊雜肉魚一切發風瘡毒等物及婦人洗換狐臭犯之難治竹葉黃耆湯 精義方 治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發

大渴者 淡竹葉 二分 生地黃 一兩 黃耆

黃芩 去腐 當歸 川芎

甘草 芍藥 人參

麥門冬 去心 半夏 湯洗 石膏 各四分

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

右用水一盞半竹葉五片生薑五片煎至一盞溫服內補散專治癰疽發背潰膿出多內虛少力不進飲食有虛證惡重者亦治之 人參 白茯苓 川歸 黃耆 桂心 甘草 遠志 各半兩 芎藭 麥門冬 白芍藥 陳皮 熟地黃



|                    |        |
|--------------------|--------|
| 五味子                | 各一兩    |
| 右咬咀水一鍾薑三片棗一枚煎至半鍾溫服 |        |
| 敗毒流氣散              |        |
| 人參                 | 桔梗     |
| 甘草                 | 防風     |
| 前胡                 | 川芎     |
| 白芷                 | 芍藥     |
| 右咬咀水一鍾半薑棗煎服        | 紫蘇 各等分 |
| 護心托裏飲              |        |
| 人參                 | 黃耆     |
| 川芎                 | 甘草     |
| 乳香                 | 木香     |
| 官桂                 | 防風     |
| 桔梗                 | 厚朴 各等分 |
| 右咬咀水薑煎服            |        |
| 鐵圍散治癰疽腫毒           |        |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 乳香                  | 沒藥 半兩     |
| 黃柏                  | 黃連        |
| 半夏                  | 防風        |
| 木鱉子                 | 瓜蒌        |
| 草烏                  | 阿膠        |
| 右為末醋調成膏砂石器內火熬黑色鵝翎傳之 |           |
| 圍藥治諸般癰疽傳上消散         |           |
| 乳香                  | 沒藥        |
| 連翹                  | 黃芩        |
| 黃柏                  | 南星        |
| 防風                  | 羌活        |
| 阿膠                  | 皂角刺 各等分   |
| 右研細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用 |           |
| 圍藥鉄井欄               |           |
| 貝母                  | 南星 各七錢    |
| 五倍子                 | 經霜芙蓉葉 各一兩 |
|                     | 連翹        |





右為細末用水調傳四向腫處止留中間一竅出毒氣

秘傳鉄箍散

霜後芙蓉葉兩二海金砂錢五草烏

金線重樓生者佳天南星各五錢

右為末用好米醋調藥成膏圍傳患處若是發背加

木鱉子五錢為末和前藥立効

千金托裏散治背疽併諸惡瘡如三日以內未針灸及

利大便秘者則可消矣

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

羌活藁本生黃芩

人參炙甘草木猪苓錢各一

防風身洗防風稍各五分川歸身洗酒

連翹酒黃芩川歸稍錢各三

生甘草陳皮蘇木

五味子酒黃栢酒防已各五分

桔梗山梔酒生苳

酒黃連錢各一酒大黃錢三麥門冬錢二

右細切分作二服每服用水三大盞浸半日煎一盞

稍熱服後一服如前併滓煎服忌冷水此方如覺有

病即便忙服無不効者若瘡勢已發三四日或成膿

者則不消矣

十全內托散治瘡腫托裏未成者速散已成者速潰

人參當歸黃耆錢各一

厚朴川芎桔梗

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

防風桂心白芷

甘草錢各一

右細切作一服用水二盞煎至一盞去滓食遠服

秘授仙方萬應膏藥治一切腫毒未潰貼之則消已潰

貼則去腐生肌並治楊梅癰漏惡瘡風氣骨節疼痛

痞氣積塊坐閃腰痛一切諸證貼之神効

羌活兩一巴豆兩二木鱉子兩二

川烏皂角刺川山甲



|      |      |     |
|------|------|-----|
| 白芷   | 蟬退   | 杜當  |
| 赤芍藥  | 金線重樓 | 五倍子 |
| 獨脚連  | 雷藤   | 連翹  |
| 血餘   | 白芨   | 降香  |
| 白欽   | 紫荊皮  | 藁本  |
| 黃連   | 石羊角  | 廣藤  |
| 川芎   | 殭蠶   | 草蘇子 |
| 防風   | 蜈蚣   | 草烏  |
| 當歸   | 蛇退   | 葉下紅 |
| 三白草  | 八角風  | 苦參  |
| 孩思母  | 何首烏  | 大風藤 |
| 小風藤  | 海風藤  | 尋風藤 |
| 七葉黃荊 | 松節   | 金銀花 |
| 車前草  | 槐角   | 丹參  |
| 斑蝥   | 青木香  | 玄參  |
| 牛膝   | 地榆   | 威靈仙 |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

一兩  
五錢

二兩

七條

二兩

各一兩

二兩  
五錢

|                                                               |     |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 生地黃                                                           | 薄荷  | 蒼朮  |
| 五靈脂                                                           | 天花粉 | 南星  |
| 細辛                                                            | 蝦蟇  | 桔梗  |
| 山梔                                                            | 荊芥  | 黑丑  |
| 花蛇                                                            | 大風子 | 烏藥  |
| 小茴                                                            | 節骨草 | 兩頭尖 |
| 黃蘗                                                            | 烏梢蛇 | 槐嫩枝 |
| 桃嫩枝                                                           | 柳嫩枝 | 榆嫩枝 |
| 椿嫩枝                                                           | 各五兩 |     |
| 右件七十九味咬咀片末用真香油十斤和藥浸七日下鍋熬待藥滓成炭血餘無形方可濾去藥滓再熬滴水成珠再將黃丹徐徐入內收為膏再入後項藥 |     |     |
| 乳香                                                            | 血竭  | 阿魏  |
| 龍骨                                                            | 膽礬  | 雄黃  |
| 輕粉                                                            | 沒藥  | 孩兒茶 |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

各五兩

一隻

生者一箇佳

各五錢



|                            |        |     |     |    |      |  |  |  |  |
|----------------------------|--------|-----|-----|----|------|--|--|--|--|
| 樟腦                         | 錢四     | 赤石脂 | 錢七  | 沈香 |      |  |  |  |  |
| 木香                         | 錢各三    | 麝香  | 錢一  | 冰片 | 分三   |  |  |  |  |
| 右十五味研為極細末入膏內攪勻用磁鉢收貯出       |        |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 火毒油紙攤貼神効                   |        |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 秘傳定痛生肌散                    |        |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 龍骨                         | 煨      | 白芷  | 錢各三 | 黃丹 | 水飛錢五 |  |  |  |  |
| 軟石膏                        | 煨去火毒一兩 | 沒藥  |     | 乳香 | 錢各三  |  |  |  |  |
| 血竭                         | 錢二     | 黃連  | 錢四  | 輕粉 |      |  |  |  |  |
| 硃砂                         | 錢各五    |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 欽定四庫全書                     |        |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 仁齋直指卷二十二                   |        |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 右為極細末糝於瘡口上止痛生肌神効再用白膏藥貼之    |        |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 秘傳白膏藥                      |        |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 官白粉                        | 半一兩    | 赤石脂 | 兩煨一 | 樟腦 | 錢五   |  |  |  |  |
| 輕粉                         | 錢五分    |     |     |    |      |  |  |  |  |
| 右為細末生猪油去膜搗爛和前藥調勻先將生肌散摻上後貼之 |        |     |     |    |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|--|--|
| 洗毒散                                                                                                                                                                                                                                     | 通玄論 | 治諸般惡瘡風濕陰蝕並宜此洗之 |  |  |  |
| 用蛇床子地骨皮丁麻黃荊芥防風桔槿各三錢                                                                                                                                                                                                                     |     |                |  |  |  |
| 右用水三椀葱白三根煎至二椀無風處洗                                                                                                                                                                                                                       |     |                |  |  |  |
| 乳癰                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |  |  |  |
| 乳癰方論                                                                                                                                                                                                                                    |     |                |  |  |  |
| 男子以腎為重婦人以乳為重上下不同而性命之根一也坐草以後風邪襲虛榮衛為之凝滯與夫嬰幼未能吮乳或乳為兒輩所吹飲而不泄或斷乳之時捻出不盡皆令乳汁停蓄其間與血氣搏始而腫痛繼而結硬至於手不能近則乳癰之患成矣乳癰一名妬乳婦人四十以下血氣周流患此可療年事既高血氣耗澁患此難瘳惡寒發熱煩燥大渴是其證也甚則嘔吐無已咽膈窒礙何耶蓋胃屬足陽明之經實通乎乳血熱入胃嘔吐何疑或者不能溫散妄以寒涼踈轉之劑行之即使癰毒自外入裏嘔吐尤甚其咽膈妨礙者毒氣上衝所致也生薑甘桔湯最為咽間要藥乳粉托裏散 |     |                |  |  |  |



最能反出毒氣二香散加瓜蒌根止嘔止渴兩得其便  
焉更伏萬金一醉膏佐之能事畢矣雖然渴而過飲水  
入腸胃必至下利醫理失節久而不瘥必成漏瘡又不  
可不防其變

乳癰證治

究原五物湯癰疽發背乳癰通用

瓜蒌研一枚

皂角刺半燒帶生

沒藥各半兩

乳香

甘草各二錢半

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

右粗末醇酒三升煎取二升時時飲之痛不可忍立

止

萬金一醉膏內加川芎一分當歸半分

乳癰方

皂莢刺

半燒帶生半兩

真蚌粉三錢

右研細每一錢酒調下

生薑甘桔湯治癰疽諸發毒氣上衝咽喉胃膈室塞不

利

北梗去蘆頭一兩

甘草生

生薑各半兩

右剉細每服三錢井水煎服

乳初腫方

甘草生二錢灸二錢

粗末分兩次新水煎服即令人吮乳

傳乳方

大南星半夏生

皂莢刺燒帶生各二分

白芷

草烏

直僵蠶焙各一分

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

右細末多用葱白研取汁入蜜調傅若破瘡口用膏

藥貼

乳癰方乳癰初發

貝母為末

右每服二錢溫酒調下即以兩手覆按於棹上垂乳良

久自通

又方

石膏燒紅椀覆地出毒細末三錢溫酒調下



附諸方

橘皮湯治乳癰初發即散已潰即効痛不可忍者

陳皮

湯浸去白晒乾  
麸炒微黃色

右為細末麝香研少許每服二錢酒調服初發覺赤腫疼痛一服効因小兒吹妳變成此疾者並治

復元通氣散治發乳癰疽及一切腫毒

木香

茴香

青皮

川山甲

炙酥

陳皮

白芷

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

甘草

各等分

貝母

去心  
薑製

加漏蘆

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓入酒食遠服末酒服二錢亦可

一方治婦人乳赤腫成癰者

歌曰

欲治乳癰良捷法

紫蘇一味勝他方

濃煎湯飲頻頻服

蘇葉圍來合乳房

一方治乳癰神効

用桑黃不拘多少用好酒磨熱服即安

一方治婦人吹妳

用棗七枚去核入鼠矢七粒火煨存性研末入麝香少許溫酒調服

又方治婦人吹妳

詩曰

婦人吹妳治如何

皂角燒灰蛤粉和

熱酒一盞調八字

雙手揉散笑呵呵

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

一方加乳香

少許

一方治婦人乳頭裂

用秋後冷露茄兒裂開者晒乾燒存性為末水調敷

患處甚驗

癌

癰疽諸發  
此法通用

發癌方論

癌者上高下深巖穴之狀顆顆累垂裂如瞽眼其中帶青由是簇頭各露一舌毒根深藏穿孔透裡男則多發





於腹女則多發於乳或項或肩或臂外證令人昏迷治法急用草麻子等藥外傳以多出其毒水如癰疽方中乳香膏神功妙貼散是也內則於小便利之蓋諸痛癢瘡皆屬於心心與小腸為表裏所當宣毒於小便但諸

發蘊毒又非麥門冬燈心草之所能宣必如是齋方中立應散以地膽為主以白牽牛滑石木通佐之而後可以宣其毒矣自此又於心腎用工人之一身水不能濟火則渴而後發瘡心腎相交水火既濟於人何病之有

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

心主血也清心行血固所當然亦使腎得其養則水有所司真元凝合彼瘡自平更服童尿又可以灌滌餘毒切戒忌風邪入之將理一節米舖猪蹄可以益腎可以養中當加之意

瘡

### 發瘡方論

瘡發於手足或掌心或腰腿或臀下伸縮處長形平腫無頭無面低貼肌肉瞰裏開瘡如疽而大走注牽連較

之諸發煩渴為甚其患淺則可療其患深則害人或重毒已平數月之後復於他處大發但作肉色微帶淡紅終不能救治法以癰疽類例推之大要培養內氣以防滑泄兼用膏藥吮瘡神異膏遇仙膏可貼可服

瘰

### 發瘰方論

瘰癧之發有數種先作點而後露肉小者如粟如豆劇者如梅如李赤黑青白色變不常或臂或臀或口齒或

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

肚臍發無定處大概多見於手指之間根深入肌走臂遊腫毒血流注貫串筋脈爛肉見骨出血極多令人串痛狂言痛入於心即死突出於外腎者亦死此瘡最慮引風治法宣毒行血尤當於心腎加意焉蓋心為萬病之門敗血鬱滯煩燥噁悶皆毒氣攻心之候也心家為毒所攻若於小便利之又恐外腎虛怯易至傷風勢必宣毒於大便如瓜萆酒之入沒藥五靈脂皂莢刺帶生灰是也是雖大便引導毒氣然清心行血去風邪之劑



如之何而廢之心清血行風邪解散庶乎有瘳矣經云在指則截在肉則割蓋慮毒氣隨風走肌隨脉入腹倏忽害人至速而不可留也此疾根源初因感受惡風入於脉理或傷寒瘴癘之後毒變所生凡癰疽諸發開一寸則一寸引風非必風入於其中蓋虛處自引風也惟風邪襲虛則肉爛透骨惡血橫流大南星生半夏白芷稍最能去風可以頻傳其諸療理推廣癰疽法度行之

發癰證治

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

癰疽癌癰惡瘡妙方

生髮  
燒留性  
三分

皂莢刺  
燒帶生  
二分

白芨  
一分

右細末乾摻或井水調傳皂莢刺能行諸藥

療方

生髮  
燒留性  
各二分

皂莢刺  
燒留性  
各二分

赤蜈蚣  
半燒

厚黃栢  
各一分

右細末雄猪膽汁調傳

又方

雞內金

生髮  
各燒留  
性夾和

大南星

半夏  
生

右為細末摻

又方

皂莢刺  
燒帶生

白芨  
少許

右為細末摻諸瘡通用

又方 燕窠和百雀兒糞研膏傳

又方 生髮燒留性末之米湯調服兼傳漏瘡亦効

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

諸發諸瘡蠟礬圓冷酒入麝香送下

洗盪瘰癧方

荊芥穗 白芷

漢椒  
去目

葱白連根

右用井水煎入鹽候溫自手臂上盪下日三次瘰疽

毒氣走臂腫所至處緊繫之

又洗方

山竈屋垂塵 竈煙

釜下土  
各半升



右研和分兩次井水煮沸溫洗日如是  
癰方

生井蛙 取皮日乾  
燒帶生

右細末摻或蜜水調傳又通用方在前

是齋立應散 方見癰  
癰門

癰瘡灸法癰瘡自手發者毒走至心不救自足發者毒  
走至腎不救各有小紅筋湯洗再尋其筋之住處灸小  
艾柱三壯即瘥此即蛇瘡

欽定四庫全書 仁齋直指  
卷二十二

癰瘡方論癰瘡一名蛇瘡南地多有毒蛇吐毒於蠻煙  
瘴雨之鄉人有伏水土風氣而感觸之者數月以還未  
有不發為蛇瘡也惟赤蜈蚣伏蛇最為上藥雄黃白芷  
次之諸蛇藥亦可以制其毒矣 雄黃有毒爛肌  
但夾和蛇藥用

疔瘡

疔瘡方論

疔瘡含蓄毒氣突出兩寸痛癢異常一二日間害人甚  
速是尤在癰疽之上也內經以白疔發於右鼻赤疔發



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

於舌根黃疔發於口唇黑疔發於耳前青疔發於目下  
蓋取五色之應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰  
或足發無定處在手足頭面骨節間者最急其餘尚庶  
幾焉疔曰五疔類分數種如白如豆如葩如箔金如茱  
萸如石榴子或發疹搔破而青黃汁出或衣物觸着而  
疼痛忽生或白而腫實或赤而浮虛其狀不一大抵瘡  
頭黑硬如釘四畔帶赤如火盤根突起隨變焦黑未幾  
腫大而光轉為濕爛深孔透肌如大針穿之狀外證心

欽定四庫全書 仁齋直指  
卷二十二

驚頭痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間赤黑  
點點如珠若毒入腹心則煩悶嘔逆恍惚癡眠其斃可  
立待也此疾雖自風毒而來其諸觸犯不可不信如石  
疔之忌瓦礫磚石麻子疔之忌麻衣麻仁火疔之忌火  
光炙燂水疔之忌飲水渡河惡眼鹹食爛帛刀鎌色色  
見忌又不特雌雄二疔戒謹房事而止一有觸犯難以  
有瘳其或背脊拘強瘡痛徹骨此觸犯之候也治法以  
調平心氣為上蓋疔瘡蓄毒壅結於心如茯苓茯神遠

志益智蓮子石菖蒲之類佐以川芎當歸皆舒豁心經之劑也心氣一清毒自消散外所傳者用銷蝕惡肉輩如膽礬綠礬鉛霜斑蝥等類以餅藥調和而筆傳之爛其肉而後剪隨傳隨爛次第剪平却以生髮蛇皮土蜂窠皂莢刺各燒留性白芨減半並為細末以平瘡口或銷蝕惡肉輩傳之作痛則以排膿內補散多用酒調以醉之矣又有一種瘡頭黑深形如魚臍破之黃水滲出四畔浮漿是曰魚臍瘡其毒尤甚通前治法即癰疽方中萬病解毒圓以清心行血湯使服之以井花水磨傳之是為神仙妙藥

諸瘡證治

生髮拔一圓如雞子大攤在一尺緋絹上 雄黃研一豆許

皂莢刺二十針 赤小豆二十粒

右並粗末撒放髮上捲就緋絹作一團外用髮繩十字縛定熨斗內烈火燒帶性為末入地骨皮末倍之



分作兩服空心酒調下

又方

生髮

蛇皮洗晒 土蜂窠

皂莢刺各半兩

右以緋絹一尺分作四片分裹上件藥髮繩扎之炭火燒帶生並為細末每一錢空心酒調下

又方

蛇皮 土蜂窠燒帶性等分

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

右為末每一錢酒調下

又方蛇皮洗晒炙焦為末雞子清調傳

又方磁石於石白中搗為細末 再研醋調傳

又方

蒼耳亦名鼠粘子根莖苗實但取一色研細

右酒調下仍以蒼耳燒灰醋調傳或不拘一色雜採用之

瘡方



|                                                                     |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 金頭蜈蚣<br><small>一條</small>                                           | 膽礬                        | 銅綠                        |
| 烏賊骨<br><small>錢各一</small>                                           | 麝<br><small>字一</small>    |                           |
| 右細末以紙撚蘸麻油粘藥引入瘡中如瘡頭硬即灸破或針刺破然後入藥                                      |                           |                           |
| 附諸方                                                                 |                           |                           |
| 立馬回疔丹治疔瘡走徹不止                                                        |                           |                           |
| 金脚信                                                                 | 蟾酥                        | 血竭                        |
| 硃砂                                                                  | 沒藥<br><small>分各五</small>  | 輕粉                        |
| <small>欽定四庫全書</small><br><small>仁齋直指</small><br><small>卷二十二</small> |                           |                           |
| 片腦                                                                  | 麝香<br><small>字各一</small>  |                           |
| 右為細末生草烏頭汁為錠如麥子長大用時將瘡頭刺破納入一錠第二日瘡腫為効以膏藥貼之                             |                           |                           |
| 飛龍奪命丹<br><small>方聖惠</small>                                         | 治一切惡疔瘡                    |                           |
| 人言<br><small>半二錢</small>                                            | 斑猫<br><small>去十二箇</small> | 巴豆<br><small>去十二箇</small> |
| 硃砂<br><small>錢三</small>                                             | 硃砂                        | 礪砂                        |
| 乳香                                                                  | 沒藥                        | 黃丹<br><small>錢各三</small>  |
| 南星<br><small>水</small>                                              | 半夏<br><small>水</small>    | 血竭<br><small>錢二</small>   |

|                                                                     |                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 麝香<br><small>錢二分半</small>                                           | 右為末蟾酥汁為丸如紅豆大五分內分一分加入斑猫四箇然後捻成定子如小麥大每一瘡針破下一定子用飯粘白紙封口用前四分內一丸噙在舌上覺麻凉水吞下忌熱物片時如蟾酥乾用人乳汁化開一方加雄黃二錢 |                          |
| 千金托裏散治疔腫發背一切惡腫                                                      | 官桂                                                                                        | 人參                       |
| <small>欽定四庫全書</small><br><small>仁齋直指</small><br><small>卷二十二</small> |                                                                                           |                          |
| 川芎                                                                  | 白芷                                                                                        | 芍藥<br><small>兩各一</small> |
| 木香                                                                  | 沒藥<br><small>錢各二</small>                                                                  | 乳香<br><small>錢二</small>  |
| 當歸<br><small>兩半</small>                                             | 連翹<br><small>錢一兩</small>                                                                  | 黃耆<br><small>兩半</small>  |
| 防風                                                                  | 桔梗                                                                                        | 厚朴                       |
| 右十五味為細末每服三錢酒一盞煎三二沸和滓服無時                                             |                                                                                           |                          |
| 一方治疔瘡                                                               |                                                                                           |                          |
| 土蜂房<br><small>全一</small>                                            | 蛇蛻<br><small>全一條</small>                                                                  |                          |





右作一處細瓦器中以黃泥封固火煨存性研為細末空心酒調服一錢少頃腹中大痛痛止其瘡已化為黃水仍服五聖散

五聖散

大黃

生薑

金銀花

甘草  
各一兩

瓜蒌  
一箇

皂角針  
二兩

右咬咀每服一兩用好酒二盞煎至一盞溫服

瘰癧

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

瘰癧方論

瘰癧生於項腋之間凡人少小以來動輒蓄怒或憂思驚恐抑鬱不伸多致結核於項日積月累風毒熱氣聚焉於是腫濕開瘡起伏無已甚則牽連至於腋下自腋下而蔓衍心胸殆無及矣發熱增寒煩渴盜汗或寒熱往來或痛或不痛其外證也治法無他大抵以地膽斑貓為主蓋瘰癧之毒莫不有根地膽斑貓製度如法能使其根從小便中出或如粉片或如塊血或如爛肉皆

其驗耳但毒根之行小便亦必澁痛當以木通滑石輩導之然是毒必從小便出者何哉諸痛癢瘡蓋屬於心其或一二流行於大便尤快便也人有此患不惟懲忿室慾謹護燥濕風寒其於飲食百味一切戒之然則投方匕之劑當何如而責効焉曰飯蔬食而已

瘰癧證治

是齋立應散治瘰癧神効已破未破皆可服

連翹

赤芍藥

川芎

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

當歸

甘草  
炙

滑石  
研各半兩

黃芩  
三錢

白牽牛  
生取末

土蜂房  
蜜水洗飯上蒸乾各二錢半

川烏尖  
七箇

地膽  
去頭皮足絲米炒米黃為度去米秤三錢

右為細末每服抄一大錢匕煎濃木通湯調下臨卧服毒根從小便中出澁痛不妨毒根如粉片塊血爛肉是也如未効後再服繼以薄荷丹解其風熱且地膽性帶毒濟以烏尖或衝上麻悶不能強制嚼葱白



一寸茶清下以解之如小便澁燈心煎湯調五苓散服瘡處用好膏藥貼若療癰疽用此宣導惡毒本方去黃芩不用

薄荷丹解癰癰風熱之毒自小便宣毒後須常服

杜薄荷 皂角不蛀者去弦皮 連翹

何首烏米泔浸一宿 蔓荊子 京三稜煨

荊芥各一兩

右為末好鼓二兩半以米醋煎沸洒豉淹令軟研和

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

糊如圓桐子大每三十圓食後熱水下日一服病雖

愈常服之

必捷圓治癰癰多年不瘥

斑猫去頭翅足絲米炒一分 薄荷葉三分

右細末烏雞子清和圓桐子大空心茶清下二圓午

時後服三圓臨卧服四圓次日空心服五圓臍下痛

小便取下惡物為効如小便秘喫葱茶少許

神秘散治癰癰

斑猫去頭足皮麪炒二十一箇 荊芥穗日乾

直僵蠶絲炒去背 黑牽牛微炒取仁各二錢

右細末每服一錢五更好酒調下日中當取下惡物

如不下次日五更再進一服或更不下第三日五更

先喫秫米粥一盞次服此藥其毒決下如小便痛澁

以葱茶解之或木通燈心煎湯利之

雌雄散治癰癰

斑猫一雌一雄足翅全者新瓦焙焦去頭翅足 貫衆二錢

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

鶴虱 甘草各五分

右細末作兩服飽飯後好茶濃點一盞調下

木鱉膏治癰癰經年發歇無已

木鱉仁二箇用厚紙捍去油研碎

右以烏雞子清調和磁盞盛之甑內蒸熟每日食後

喫一次服之半月自然消靡

粉乳托裏散治癰癰攻心嘔吐發出毒方見癰疽門

蠟礬圓治癰癰神効方見癰疽門



山豆根方治咽喉上膈熱毒患瘰癧者常常含汁嚥下仍以

山豆根 紫蘇葉細剉煎湯臨卧服

解熱方瘰癧四畔紅腫多汁為熱證

小黑豆 合二 紫蘇 莖一 薑 片七

右細剉煎湯食後服

洗傳方

白芷煎湯泡荆芥

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

右候溫軟帛蘸洗拭乾好膏藥貼膿汁惡肉出盡更

用

半夏 生 南星 各二 血竭 一 錢

輕粉 少 許

右細末以津唾調傳

究原方歛瘡口

血竭 一 半 燒 灰 麝 少 許

右夾研津唾調傳

附諸方

散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬如石或在耳前後上下及

肩脇背手足少陽經及瘰癧遍於頭或頰車堅面不

潰在足陽明經○一瘡已破乃流膿水並皆治之

草龍膽 酒 洗 炒 四 次 桔 梗 各 五 錢 升 麻 六 錢

甘草 灸 柴胡 各 五 分 連 翹 三 錢

葛根 白芍藥 黃連 各 二 錢

黃芩稍 錢 半 生 酒 昆布 知母 洗 酒

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

括蕪根 酒 洗 各 黃 栢 各 五 錢 京 三 稜 洗 酒

廣 茂 酒 洗 各 當 歸 梢 半 酒 洗 錢

右咬咀每貼七錢水二盞煎八分去粗食遠熱服於

卧處伸足於高處頭微低每嚥一口作數次嚥下至

服畢如常安卧取藥在胸中停蓄也另攢一料作細

末煉蜜丸每服百丸此藥湯留一口送下更加海藻

五錢炒

白花蛇散 三 因 治久漏瘰癧發於項腋之間痒痛增寒



發熱

青皮 兩半 生犀 錢半

黑牽牛 半兩 用一半炒熟

白花蛇 酒浸軟去皮骨 焙乾秤二兩

右為末每服二錢膩粉五分研勻五更糯米飲調下以利下惡毒為度十餘日再進一服可絕病根

梅花點舌丹治男婦惡瘡癰癰

蟾酥 錢二 粉霜 沒藥

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

輕粉 分各六 麝香 冰片

血竭 分各四 乳香 雄黃 錢各一

右為細末用男人乳丸如茄子大每服一丸含一丸在舌上待自化癰癰可先食胡椒麪然後含之其瘡自消神効

針灸法治癰癰以手仰置肩上微舉肘尖上是穴隨患處左即灸左右即灸右艾炷如筋頭大再灸如前三次永無恙如患四五年用藥不退辰時着灸申時即

落所感稍深三灸即安法仍以蒜切片貼癰瘡上灸七壯易蒜多灸取効

癰瘤

癰瘤方論

氣血凝滯結為癰瘤癰則憂恚所生多着於肩項皮寬不急槌槌而垂是也癰則隨氣留住初作梅李之狀皮嫩而光漸如盃卵是也其肉色不變者謂之肉癰其筋脉呈露者謂之筋癰其赤脉交絡者謂之血癰隨憂愁

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十二

而消長者謂之氣癰堅硬而不可移者謂之石癰癰之名有五者此也一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿瘤五曰血瘤六曰石瘤癰之種有六者此也癰瘤二者雖無痛癢最不可決破決破則膿血崩潰滲漏無已必至殺人其間肉瘤攻療尤所不許若夫脂瘤氣癰隨順用藥尚庶幾焉

癰瘤證治

海藻圓癰瘤通用



|                        |                  |    |   |    |          |
|------------------------|------------------|----|---|----|----------|
| 海藻                     | 洗晒<br>一兩         | 海蛤 | 煨 | 松蘿 | 各七<br>錢半 |
| 當歸                     |                  | 川芎 |   | 官桂 |          |
| 白芷                     |                  | 細辛 |   | 藿香 |          |
| 白欬                     |                  | 明礬 | 煨 | 昆布 | 洗晒       |
| 右細末煉蜜圓彈子大每一圓含咽下        |                  |    |   |    |          |
| 蠟礬圓癰瘰癧通用常服自然縮小消磨       |                  |    |   |    |          |
| 瘰癧方見癰疽門                |                  |    |   |    |          |
| 針沙方專治氣癰                |                  |    |   |    |          |
| 針沙                     | 浸於水缸平日飲食皆用此水十日一換 |    |   |    |          |
| 針沙服之半年自然消散針沙能去積也       |                  |    |   |    |          |
| 欽定四庫全書                 |                  |    |   |    |          |
| 仁齋直指                   |                  |    |   |    |          |
| 卷二十二                   |                  |    |   |    |          |
| 治小瘤方先用甘草煎膏筆蘸瘰癧傍四圍乾而復瘰  |                  |    |   |    |          |
| 凡三次後以                  |                  |    |   |    |          |
| 大戟                     |                  | 芫花 |   | 甘遂 |          |
| 右等分為細末米醋調別筆瘰癧傳其中不得近着甘  |                  |    |   |    |          |
| 草處次日縮小又以甘草膏瘰癧小瘰癧三次中間仍用 |                  |    |   |    |          |
| 大戟芫花甘遂如前自然焦縮           |                  |    |   |    |          |
| 又治瘤方舊牛皮鞋皮洗煎凍常食之瘤若破如豆腐  |                  |    |   |    |          |
| 極臭                     |                  |    |   |    |          |

|                                 |                   |                            |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 附諸方                             |                   |                            |
| 破結散治五癰                          |                   |                            |
| 海藻                              | 龍膽草               | 海蛤                         |
| <small>洗</small>                |                   |                            |
| 通草                              | 昆布                | 明礬                         |
|                                 |                   | <small>枯</small>           |
| 松蘿                              | 麥麴                | 半夏                         |
| <small>各三分</small>              | <small>四分</small> |                            |
| 貝母                              |                   |                            |
| <small>各二分</small>              |                   |                            |
| 右為末酒調服日三食忌甘草鯽魚猪肉五辛生菜            |                   |                            |
| 毒物                              |                   |                            |
| 昆布丸治一切癰瘤                        |                   |                            |
| 昆布                              | 海藻                | 小麥                         |
| <small>洗</small>                | <small>洗</small>  | <small>醋煮乾<br/>各一兩</small> |
| 右為末煉蜜丸如杏核大每一丸食後噙嚥               |                   |                            |
| 秘傳治癰方治一切癰瘤神効                    |                   |                            |
| 乾猪噉                             | 海漂硝               |                            |
| <small>七箇用燈盞火<br/>烘過乾為末</small> |                   |                            |
| 木香                              | 青木香               | 孩兒茶                        |
|                                 |                   | <small>各五錢</small>         |
| 雄黃                              | 神麴                | 麥芽                         |
| 辰砂                              |                   |                            |
| <small>各一錢</small>              |                   |                            |





右為細末用酒送下食後令睡時服之即睡再不可

言語戒惱怒房室此方係累用無不効驗

海帶丸治癭氣久不消者

海帶

貝母

青皮

陳皮

右各等分為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後噙

化

一方治頰下結核不消經効

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

大蜘蛛

不計  
多少

右以好酒浸過研爛同酒調開澄去滓臨卧服

外臺秘要治項下卒結囊漸大欲成癭者

昆布

海藻

各等分

右為末蜜丸如杏核大含稍稍嚥津

針灸法天突一穴

在結喉下宛宛中灸  
三七壯治諸般癭疾

肩髃二穴在膊骨頭肩端兩骨間陷宛中舉臂取  
之男左十八壯右十七壯女左十七壯右十八壯

又灸

兩耳後

髮際  
七壯

漏瘡

漏瘡方論

漏者諸癭之潰漏也狼癭鼠癭螻蛄癭蜂癭虵癭蟻  
螬癭浮蛆癭癰癰癰癰轉筋癭古所謂九癭是爾析而言  
之三十六種其名目又不同焉大抵外傷四氣內窘七  
情與夫飲食乖常染觸蠱動含靈之毒未有不變為癭

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

瘡穿孔一深膿汁不盡得冷而風邪併之於是涓涓而  
成漏矣漏喜發於項腋亦喜發於陰僻肛門之間療治  
失時即生寒熱不特癭能為漏凡癰疽諸發隨所在處  
苟有宿膿敗肉朽骨停蓄其間皆一切漏瘡之萌藥也  
治法溫散風冷為急收水次之生肌又次之霍香厚朴  
半夏橘皮蒼朮細辛川芎白芷以官桂乾薑一已佐之  
此足以溫散風冷矣然有近年漏者有久年漏者近則  
或帶淡紅或帶微腫或留小核久則上而槁白內而黑



爛淫虫惡臭生焉近者不過前藥數品而已久者復其元陽亦當以漏監輩加減而用之如其不當用而輕用又恐熱氣乘虛變移結核旁緣相通而孔竅為尤甚若夫收水一節則有司存水屬腎也腎虛不能傳導而後水溢於腎水溢則滲漉於漏瘡行腎之水無如黑牽牛必以牽牛取末入於豬腎慢火煨熟而溫酒下之則借腎入腎一縱一擒兩得其便惡水既泄不復淋漓繼以當歸黃耆川芎官桂川續斷葫蘆巴等修治細末佐以髮灰空心溫酒調下仍以安腎圓山藥圓兼而濟之庶幾腎得所養真元凝合夫然後龍骨牡蠣人齒犬牙加之血竭乳麝髮灰內外相維生肌必矣然而新肉方生又當以贅肉豬蹄米舖為養不惟滋味益腎而陽明之主肌肉亦藉穀氣以充之此則自本自根之論也雖然漏已息矣瘡已平矣衾幃動念可乎否乎曰始焉之漏者溝澮之細流也終焉之犯者江河之浚決也知而故作盧扁其如之何

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

漏瘡證治

溫解散溫散漏瘡風冷

霍香葉

厚朴

製

半夏麴

橘皮

蒼朮

炒

細辛

川芎

白芷

各一分

辣桂

川白薑

生

甘草

灸各半分

右剉散薑棗煎服

豬腎酒通行漏瘡中惡水自大腸出

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十二

黑牽牛碾細去皮取末一分入豬腎中以線扎青

竹葉包

右慢火煨熟空心溫酒嚼下

續斷散止漏活血益腎氣續筋脉

槁藤子

去穰  
酥灸

當歸

川芎

黃耆

微灸

川續斷

洗晒

葫蘆巴

炒

紫金皮

生乾地黄

洗晒

牡蠣粉

研細各半兩

木香

辣桂

各三錢

甘草

灸二錢



右為末每二錢空心溫酒調下或加髮灰佐之

保安炙甘草方治漏瘡內外癰方見乳癰門

乳麝雲母膏治漏瘡効

穿山甲浸一宿去肉用一片

真蚌粉同炒候香熟起泡去粉以甲為末四兩

右入乳香末一錢麝香半錢夾和雲母膏十五貼為

圓桐子大每服三十圓溫酒下仍以鹿角膠調鹽酒

服神授圓川椒方見虛勞門兼服之

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

代赭石圓治漏瘡膿血不止方見痔門

冷漏乳香圓

白淨滴乳香一分牡蠣粉半

右細末雪糕糊圓麻子大每服三十圓道地川白薑

生用煎湯空心下

雄黃膏治積年冷漏黃水不止

雄黃研細各一分硫黃研細各一分頭髮

黃蠟各半兩



迪志文化出版有限公司出版

右用麻油二兩煎熬頭髮溶盡去滓次入雄黃硫黃  
碎片黃蠟慢火上桑枝頻攪為膏攤生絹貼用藥先  
以赤甘草頭煎湯洗或露蜂房白芷煎湯常洗常貼  
黑靈散漏瘡通用

露蜂房剉淨二分牡蠣粉號丹

硫黃研各一分

右同炒令煙盡為細末入髮灰一分麝少許拌和傳  
患處麝能引藥透達亦殺虫

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

血竭散治痔漏痛不可忍

血竭牡蠣灰髮灰各等分

右細末入麝香少許自以津唾調傳如更痛研杏仁  
膏調藥傳之

生地黃膏漏瘡通用

露蜂房灸黃五倍子木香各三錢

滴乳香二錢輕粉一字

右細末用生地黃一握搗細和為膏攤生絹上貼瘡



迪志文化出版有限公司出版

蜂房散治久年漏瘡或暫瘥復發或移於別處

多孔露蜂房灸黃三分穿山甲灸焦一分龍骨各一分

右末入麝香用臘月猪脂調傳濕則搽

蛇蛻散治漏瘡血水不止

蛇皮洗焙焦五倍子龍骨各一分

川續斷洗晒二分

右細末入麝香少許津唾調傳

人牙散治漏瘡惡瘡生肌裏欲乾則用

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

人牙油髮各燒存性雄雞內金各等分

右為末入麝香輕粉少許濕則搽乾則麻油調傳

平肌散治漏瘡久不合露乾則用

老狗骨頭露蜂房生髮各燒存性一分

新桑白皮半分

右細末入輕粉麝香少許津唾調傳乾則搽

鐵屑膏治漏瘡露乾則用

鍛落鐵屑半兩狗頭連齒骨灸黃一兩

鹿角燒灰一兩真輕粉一錢

右細末用猪脂調傳

薰漏瘡方

艾葉五倍子白膠

苦練根等分

右剉碎如燒香法置長桶內坐薰瘡處

洗漏瘡方漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨

露蜂房白芷煎湯洗或大腹皮苦參煎湯洗

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十二

右洗畢候水出拭乾先用東向石榴皮晒為末乾搽

以殺淫虫少頃傳藥

諸漏瘡方

百日兒屎密器封五日取塗瘡

惡核漏瘡並戒怒氣不然核則大漏則水多

漏瘡方

真龍骨蜂房灸黃各二錢黃丹煨

五倍子降真香節枯骸骨瓦煨各一錢



右為細末傳之

久癩方

九孔蜂房炙黃為末臘月猪脂研傳俟收汁以

真龍骨降真香節細末入些乳香硬瘡

附諸方

蓋漏瘡須先服補藥以主血

人參

黃耆

白朮

當歸

川芎  
各等分

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

右咬咀為一大劑服之外以附子末唾調作餅如錢厚以艾炷灸之漏大艾炷亦大但灸令微熱不可令痛乾則易之如困倦則止來日又灸直至肉平為効仍用好膏藥貼之

翠霞錠子治年深冷漏日久惡瘡有反肉用之

銅錄

寒水石  
煨

滑石  
各三錢

明礬

膩粉

砒霜

雲母石

研如粉各  
錢二分半

右為細末擦百日便愈

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十二

仁齋直指卷二十二



欽定四庫全書

仁齋直指卷二十三

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

腸癰

腸癰論

癰發於外人可得見者猶為危急之疾而況隱伏腸間痛無定處人不可得而見者乎蓋癰疽五發在外則為發背發腦發眉發鬚發頤在內則為腸癰心癰腎癰肺

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十三

癰臍癰等患治之得法尚庶幾焉一着少差枰砵去矣何則腸癰為病身皮甲錯腹皮緊急如腫之狀而按之濡體無悶熱腹無積聚者此積陰冷之所致也當以溫藥調之發熱無汗洒淅惡寒小腹腫強而按之痛小便澀數其候如淋者此內結熱之所致也當以涼劑利之其脉遲緊膿未成者可下其脉洪數膿已成者不可下甚者腹肚脹大轉側聞有水聲或遶臍生瘡膿汁穿出或臍中常常出膿或大便屢下膿血凡此皆為惡證其

間寒熱氣急煩渴驚悸嘔惡唾膿咳嗽痰涎自汗自利如尋常發癰之狀亦類有此婦人尤多得之但恐世俗不識其證耳抑余聞焉內經有曰息貴病有人得之二三年遍身微腫其後大腸與臍俱出膿血遂至不救此亦腸癰類也又可不審思而明辨之乎

腸癰證治

牡丹散治腸癰冷證腹濡而痛時時利膿

人參 牡丹皮 白茯苓

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十三

天麻 黃耆 木香

當歸 川芎 辣桂

桃仁 白芷 薏苡仁

甘草 各二分

右末每服三錢井水煎食前服

木通散治腸癰熱證腹痛而強發熱惡寒小便似淋濃未成者用此

木通 薏苡仁 葶藶 炒



|                      |                     |         |                    |
|----------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 甘草                   | <small>炙</small>    | 川升麻     | 北梗                 |
| 桃仁                   | <small>皮侵炒去</small> | 赤茯苓     | 牡丹皮                |
|                      |                     |         | <small>各一兩</small> |
| 生乾地黄                 |                     | 甜瓜子     | 敗醬                 |
| 赤芍藥                  | <small>各一兩半</small> | 大黃      | <small>兩半</small>  |
|                      |                     | 朴消      | <small>一分</small>  |
| 右剉為散每服三錢井水一盞半薑五片煎服   |                     |         |                    |
| 四聖散治腸癰癰疽便毒神效         |                     |         |                    |
| 生黃瓜                  | <small>一枚去皮</small> | 粉草末     | <small>錢四</small>  |
| 乳香末                  | <small>錢一</small>   | 沒藥末     | <small>錢三</small>  |
| 右件用好紅酒二大椀慢火煎至一椀分作兩服兩 |                     |         |                    |
| 日服盡大便秘順導惡物妙若乾瓜萆則用兩枚  |                     |         |                    |
| 薏苡湯治腸癰冷熱證通用          | <small>方見血類</small> | 加北梗甘草煎服 |                    |
| 究原排膿內補散治腸癰冷證及癰疽等患    |                     |         |                    |
| 人參                   | 當歸                  | 川芎      |                    |
| 厚朴                   | <small>薑製</small>   | 防風      | 北梗                 |
|                      |                     |         | <small>焙</small>   |
| 白芷                   | 辣桂                  | 黃耆      | <small>炙</small>   |
| 甘草                   | <small>炙</small>    | 白茯苓     | <small>等分</small>  |

|                       |                          |                 |                        |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 右為末每服三錢溫酒調下如不飲酒南木香煎湯  |                          |                 |                        |
| 下諸癰熱證黃瓜萆煎湯下           |                          |                 |                        |
| 雲母膏治內外一切癰腫結毒冷熱證通用藥料四十 |                          |                 |                        |
| 件                     | <small>修製法度詳見和劑方</small> | 每服一錢圓如梧桐子大冷證以酒送 |                        |
| 下熱證甘草煎湯送下○又肺癰脅膈間隱痛而咯膿 |                          |                 |                        |
| 血鯉氣上衝濃煎北梗甘草湯送下服畢皆就枕   |                          |                 |                        |
| 蠟礬丸治諸癰腫毒痔瘻惡瘡          |                          |                 |                        |
|                       |                          | 痔門              | <small>方見</small>      |
| 燒棗散治腸癰                |                          |                 |                        |
| 乾棗                    |                          |                 |                        |
|                       | <small>連核燒</small>       | 川百藥煎            | <small>研細等用</small>    |
| 右為末每服一錢米飲調下           |                          |                 |                        |
| 附諸方                   |                          |                 |                        |
| 秘傳薏苡仁湯治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不 |                          |                 |                        |
| 食小便澀婦人產後虛熱多有此病縱非是癰證疑  |                          |                 |                        |
| 似間便可服                 |                          |                 |                        |
| 薏苡仁                   | <small>錢五</small>        | 牡丹皮             | 桃仁                     |
|                       |                          |                 | <small>去皮尖炒各三錢</small> |
| 瓜仁                    | <small>錢四</small>        |                 |                        |



右咬咀分二貼每貼水二盞煎八分去滓溫服  
一方治肚癰便癰

牽牛末一兩

大黃半兩

牛旁子二錢半

補骨脂一錢二分半

右為細末冷蜜水調空心服每二錢加芒硝妙

牡丹湯治腸癰小便腫否按之即痛如淋或小便自調  
時時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下  
之當有血洪數者膿已成不可下

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十三

大黃蒸

桃仁去皮尖

牡丹一字

瓜蒌實三錢

芒硝三錢三分

右咬咀作一服煎去滓入芒硝再煎沸頻服未効再

服敗毒散方見傷寒門

神効托裏散和劑治癰疽發背腸癰奶癰無名毒腫毒

作疼痛增寒壯熱類若傷寒不問老幼虛人並治之

忍冬草去梗

黃耆各五兩

當歸八兩

甘草炙八錢

右為細末每服二錢酒一盞半煎至一盞病上食後  
病下食前少頃再進滓外傳未成內消已成即潰也

一方治腹內癰腫

大黃一兩取末

破故紙一兩取末牛旁子一兩取末

牽牛一兩取末

右和作二服蜜水調空心服以利為度

丹溪云

大腸有痰積死血流注用桃仁承氣湯加連翹秦艽

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十三

近肛門破入風者難治防風之類

桃仁承氣湯方見血門

腸風

腸風論

腸胃不虛邪氣無從而入人惟坐卧風濕醉飽房勞生  
冷停寒酒麪積熱以致榮血失道滲入大腸此腸風臟  
毒之所由作也挾熱下血清而色鮮腹中有痛挾冷下  
血濁而色黯腹內畧疼清則為腸風濁則為臟毒有先



便而後血者其來也遠有先血而後便者其來也近世俗糞前糞後之說非也治法大要先當解散腸胃風邪熱者與敗毒散冷者與不換金正氣散風邪既去然後隨其冷熱而對治之或曰血遇熱則行止血多有涼藥如地榆散藥皮湯黃連阿膠丸酒蒸黃連丸輩施之熱證固當然爾其或陽虛陰走正氣不得歸元則用木香理中湯附子理中湯震靈丹黑錫丹輩如之何而廢之要之芎歸湯一劑又調血之上品熱者如伏苓槐花冷者加伏苓木香此則自根自本之論也雖然精氣血氣生於穀氣靖惟大腸下血大抵以胃藥收功真料四君子湯參苓白朮散以枳殼散小烏沉湯和之胃氣一回血自循於經絡矣抑猶有說焉腸風之與虫痔特介乎毫芒之間腸風之血自腸中來虫痔之血肛門邊傍別一小竅射如血線是也迨夫肛門既脫腐血浸淫於其間則俱化為虫蠹蝕腸口滴血淋漓自此又不能約而收之矣善調理者尤當以蕪荑艾葉苦練根輩為之化

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十三



迪志文化出版有限公司出版

虫○血屬於心雖曰川芎當歸主血當以伏苓伏神佐之前輩止血亦不用甘草但增棗入藥用

腸風證治

敗毒散不換金正氣散方並見寒類

地榆散治腸風熱證下血

地榆 黃連 茜根

黃芩 伏神各半兩 梔子仁一分

右麤末每服三錢薤白五寸同煎服又藥皮湯方見瀉類

酒蒸黃連圓方見瘡門 黃連阿膠丸方見嗽門 伏苓伏神煎湯下

治諸下血腹痛痛即是血多服為佳附子理中湯方見寒類

理中湯方見瀉類 內加木香治虛冷腸風○芎歸湯方見血類 熱

證加伏苓槐花冷證加伏苓木香

小烏沉湯

香附杵去皮毛焙二兩 天台烏藥去心一兩 甘草炒一分

右為末每一錢鹽點服枳殼散正方不用加藥參苓

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十三

用通



迪志文化出版有限公司出版

白朮散

方並見  
虛勞門

四君子湯

症門

四件夾和薑棗煎服治

諸下血

烏荊圓治腸風下血諸風抽掣

川烏頭

一兩炮  
去皮

荊芥穗

二兩

右為末醋麵糊圓如桐子大每服二十圓枳殼散下

不換金正氣散加川芎當歸同煎吞白圓子

方見身  
疼門

治

腸風及便血妙

四君子湯加製白扁豆黃耆治腸風五痔下血痿黃乏

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十三

力

猪臟圓治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛

裏不急名曰野雞先用海螵蛸炙黃去皮取白者為末

以木賊草煎湯調下服之三日後用淨黃連二兩剉碎

嫩猪臟二尺去肥以黃連塞滿猪臟繫兩頭煮十分爛

研細添糕糊圓如桐子大每服三五十圓米飲下

橄欖散治腸風臟毒久不止

橄欖核於燈燭上燒存性研為末每服二錢用陳米

飲食前調下

蒜連圓一名金屑萬應丸治腸風臟毒

方見  
血類

○法製香

附方并黑散子治腸風臟毒

方見  
血類

黑玉丹治腸風痔瘻等疾

棕蘭

頭髮

以皂角水洗  
淨各二兩

刺蝟皮

槐角

各三兩

牛角髓

四兩已上  
並燒存性

生油麻

雷圓

各一兩

苦練根

一分

乳香

半兩

麝香

二錢

猪蹄甲

四十九箇  
燒

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十三

槁藤子

炒香一分  
兩

右為末酒麵糊圓桐子大每服五十圓食前米飲下

腸風黑散治腸風下血腹痛

敗棕

頭髮

木饅頭

木賊

各燒  
存性

槐角

炒

枳殼

製各  
一分

甘草

炒焦

烏梅肉

炒各  
半分

右為末每服二錢陳米飲乘熱調下

木賊散治腸風下血





|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 木賊 <small>去節炒</small>   | 木饅頭 <small>炒</small> | 枳殼 <small>製</small>  |
| 槐角 <small>炒</small>     | 茯苓                   | 荊芥 <small>各半</small> |
| 右為末每二錢濃煎棗湯調下            |                      |                      |
| 槐角圓治傷風瀉血脫肛              |                      |                      |
| 槐角 <small>一兩</small>    | 防風                   | 地榆                   |
| 當歸                      | 枳殼 <small>製</small>  | 木賊                   |
| 茯神 <small>各半</small>    |                      |                      |
| 右末酒麪糊圓桐子大每服三十圓米飲下       |                      |                      |
| 真養臟湯 <small>方見類</small> | 加生槐花治腸風冷熱不調下血        |                      |
| 黑聖散治腸風臟毒痔瘻及諸下血          |                      |                      |
| 當歸                      | 川芎                   | 茯苓                   |
| 地榆                      | 槐花 <small>焙</small>  | 敗棕                   |
| 艾葉 <small>燒存性</small>   | 百草霜                  |                      |
| 右件等分為末每服二錢食前陳米飲調下       |                      |                      |
| 鯽魚方治腸風血痔及下痢膿血           |                      |                      |
| 大活鯽魚一箇不去鱗肚下穿一孔去其腸穢入透    |                      |                      |

|                             |                          |            |
|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 明白礬一塊如金橘大以敗棕皮重包外用厚紙裹        | 先煨令香熟去紙於熨斗內燒帶生存性為末每服     | 一錢空心溫米飲調下  |
| 震靈丹 <small>方見瀉類</small>     | 玉華白丹 <small>方見痢類</small> | 治臟腑虛損大腸不收久 |
| 作腸風下血二藥夾用煎不換金正氣散加川芎空心       | 嚥下                       |            |
| 黃龍圓治傷酒臟毒及暑瀉熱瀉               |                          |            |
| 黃連淨八兩用酒一大升煮乾研細水麪糊為圓如        |                          |            |
| 桐子大每服四五十圓陳米飲湯下              |                          |            |
| 消風散治腸風米飲調下吞烏荊圓酒蒸黃連圓隨意       |                          |            |
| 方見頭風門                       |                          |            |
| 腸風久血方                       |                          |            |
| 吳茱萸 <small>淨半兩盪七次炒過</small> | 黃連 <small>去鬚七錢</small>   |            |
| 右為末陳米糊圓桐子大每服五十圓陳米飲下食        |                          |            |
| 前服                          |                          |            |
| 又方                          |                          |            |



|                      |                     |                |            |
|----------------------|---------------------|----------------|------------|
| 茅花                   | 敗荷葉                 | 敗棕             | 各半兩<br>燒存性 |
| 香附                   | 杵淨一兩炒鹽和一<br>半炒焦一半畧炒 |                |            |
| 右為末食前米飲調下二錢          |                     |                |            |
| 腸風方                  |                     |                |            |
| 香附                   | 製一兩                 | 枳殼             | 三分         |
| 川芎                   | 兩各半                 | 槐花             | 炒          |
| 右為麤末每服三錢新水一盞半薑棗煎食前服  |                     | 甘草             | 炙各一分       |
| 附諸方                  |                     |                |            |
| 欽定四庫全書               | 仁齋直指                |                |            |
| 加減四物湯治腸風下血不止         |                     |                |            |
| 側柏葉                  | 生地黃                 | 當歸             | 酒浸去蘆       |
| 川芎                   | 兩各一                 | 枳殼             | 炒去白        |
| 槐花                   | 炒                   | 甘草             | 炙各半兩       |
| 右咬咀每服四錢水一鍾薑三片烏梅少許同煎空 |                     |                |            |
| 心溫服                  |                     |                |            |
| 腸風黑散                 | 方和劑                 | 治腸風下血或在糞前後並皆治之 |            |
| 荊芥                   | 兩二                  | 亂髮             | 槐花         |

|                      |             |                |       |
|----------------------|-------------|----------------|-------|
| 槐角                   | 兩各一         | 甘草             | 炙     |
| 枳殼                   | 去白二兩<br>炒一兩 |                |       |
| 右將所燒藥同入甕瓶內鹽泥固濟燒存三分性出 |             |                |       |
| 火毒同甘草枳殼搗羅為末每服三錢水一鍾煎七 |             |                |       |
| 分空心服                 |             |                |       |
| 結陰丹                  | 方板粹         | 治腸風下血臟毒下血諸大便血疾 |       |
| 枳殼                   | 去麩炒         | 葳靈仙            | 黃耆    |
| 陳皮                   | 白去          | 椿根白皮           | 何首烏   |
| 荊芥穗                  | 兩各半         |                |       |
| 右為末酒糊丸如梧子大每服五七十九陳米飲入 |             |                |       |
| 醋少許煎過要放溫水送下          |             |                |       |
| 黃連貫衆散                | 方張子         | 治腸風下血          |       |
| 黃連                   |             | 雞冠花            | 貫衆    |
| 大黃                   |             | 烏梅肉            | 枳殼    |
| 荊芥                   | 兩各一         | 甘草             | 炙七分五錢 |
| 右為末每服二錢溫米飲下食前        |             |                |       |



一方治臟毒下血

用黃連四兩酒浸春秋五日夏三日冬七日晒乾為末以烏梅肉六兩同搗為膏丸如梧子大每二三十丸空心白湯下

一方治腸風下血

滑石 當歸 生苳

黃芩 蒼朮 各等分

右以水煎服或以蒼朮生苳不犯鐵器為末丸服

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十三

一方治腸風臟毒

用茄蒂燒灰存性為末米飲調下二錢小兒服半錢

諸痔

諸痔論

臟腑本虛外傷風濕內蘊熱毒醉飽交接多慾自戕以故氣血下墜結聚肛門宿滯不散而衝突為痔也肛邊發露肉珠狀如鼠乳時時滴潰膿血曰牡痔肛邊生瘡腫痛突出一枚數日膿潰即散曰牝痔腸口顆顆發癰

且痛且癢出血淋漓曰脉痔腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰腸痔若血痔則每遇大便清血隨下而不止若酒痔則每遇飲酒發動瘡腫而血流若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見腫痛大便艱難強力則肛出而不收矣此諸痔之外證然也治法總要大抵以解熱調血順氣先之蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不運行氣與血俱滯乘虛而墜入大腸此其所以為痔也諸痔出血肛門間別有小竅下如血線不與便物共道痔

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十三

久不愈必至穿穴瘡口不合漏無已時此則變而為瘻矣前乎治法之外抑猶有說焉腸風臟毒之與痔瘻同出而異名也歲積月累淫蝕腸頭濕爛可畏此果何物致然哉虫是也其間執劑又當為之化虫不然古書何以謂之虫痔○氣血下墜衝突為痔既不能坐又不容行立行立則愈墜矣惟高枕偃仰心平氣定其腫自收

諸痔證治

清心湯素問云諸痛癢瘡皆屬於心心主血熱諸痔受



|                                     |  |                          |  |                                  |  |                          |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| 病之源也此藥主之                            |  | 黃連 <small>淨一兩</small>    |  | 茯神 <small>去木</small>             |  | 微赤茯苓 <small>各半兩</small>  |  |
| 右為末煉蜜圓如桐子大每服一百圓食前米飲下                |  | 患痔只是喫白米稀粥疏其腸胃            |  | 黃連阿膠圓治諸痔解熱調血 <small>方見嗽門</small> |  | 用枳殼散送下 <small>方見</small> |  |
| 諸痔蘊熱腫痛大便不通加枳殼煎 <small>方見脚氣門</small> |  | 清涼飲治諸痔熱證大便秘結             |  | 當歸                               |  | 甘草 <small>炙</small>      |  |
| 大黃 <small>米上蒸晒等分</small>            |  | 右為粗末每服二錢新水煎服             |  | 五痔散治諸痔不問冷熱內外                     |  | 鱉甲 <small>醋浸炙焦</small>   |  |
| 蜂房 <small>炒各半兩</small>              |  | 蛇皮 <small>一條燒並存性</small> |  | 猪甲 <small>剉碎炒焦</small>           |  | 右為末入麝少許每服一錢半食前米飲調下       |  |
| 聖圓子諸痔通用                             |  |                          |  |                                  |  |                          |  |

|                               |  |                          |  |                        |  |                          |  |                          |  |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| 槁藤子 <small>重一兩者三箇去穢酥炙</small> |  | 猪牙皂角 <small>二兩醋炙</small> |  | 沒藥 <small>別研</small>   |  | 槐角 <small>各三分</small>    |  | 麝 <small>少許</small>      |  |
| 右為末酒麪稀糊圓桐子大每服三十圓枳殼散送下         |  | 雞峯烏金散治痔漏                 |  | 穿山甲                    |  | 刺蝟皮                      |  | 黃牛角心 <small>各碎炒黃</small> |  |
| 猪牙皂角                          |  | 槐子                       |  | 皂莢刺                    |  | 阿膠 <small>各等分再夾和</small> |  | 貫衆                       |  |
| 枳殼                            |  | 牛角                       |  | 蝟皮                     |  | 山甲 <small>同炒</small>     |  | 右為末每服一錢半用胡桃肉研爛併調酒食前服     |  |
| 大腸有熱荊芥泡湯調下漏血不止當歸煎湯調下          |  | 槐角圓治諸痔及腸風下血脫肛            |  | 槐角 <small>去梗一兩</small> |  | 防風                       |  | 地榆                       |  |
| 當歸                            |  | 枳殼 <small>麸炒</small>     |  | 黃芩 <small>各半兩</small>  |  | 右為末酒麪稀糊圓梧桐子大每服三十圓米飲下     |  | 蝟皮圓治諸痔出血裏急疼痛             |  |



|                                 |                                 |                             |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 槐花<br><small>炒微</small>         | 艾葉<br><small>炒黃</small>         | 枳殼<br><small>製</small>      |
| 地榆                              | 當歸                              | 川芎                          |
| 黃耆                              | 白芍藥                             | 白礬<br><small>煨</small>      |
| 貫衆<br><small>兩各半</small>        | 蝟皮<br><small>炙一兩焦</small>       | 頭髮<br><small>燒三錢各存性</small> |
| 猪後蹄垂甲<br><small>十枚炙焦</small>    | 盈尺皂角<br><small>一枚銚去弦核炙黃</small> |                             |
| 右為細末煉蜜圓桐子大每服五十圓食前米飲下            |                                 |                             |
| 收痔圓諸痔通用                         |                                 |                             |
| 透明阿膠<br><small>酥炒</small>       | 黃連<br><small>淨</small>          | 貫衆<br><small>兩各半</small>    |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十三</small> |                                 |                             |
| 盈尺皂角<br><small>去弦核炙焦</small>    | 蝟皮<br><small>炙</small>          |                             |
| 蜂房<br><small>炒焦</small>         | 蛇皮<br><small>畧炒</small>         | 皂角刺<br><small>畧炒</small>    |
| 穿山甲<br><small>插入熱火中令焦</small>   | 猪後蹄垂甲<br><small>燒已上各存性</small>  | 槐花<br><small>並用二錢半</small>  |
| 當歸                              | 川芎                              |                             |
| 右為末米醋煮麪糊圓桐子大每服七十圓調氣用            |                                 |                             |
| 枳殼散下消血熱荊芥煎湯下食前服                 |                                 |                             |
| 蠟礬圓治諸痔諸癰惡瘡便毒                    |                                 |                             |
| 明白礬煨為末鎔蠟圓桐子大每服七圓溫熱水下            |                                 |                             |

|        |                                 |              |        |                                 |                                                                   |                 |                                      |                          |                                       |           |    |    |    |    |    |    |
|--------|---------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 猪甲散治諸痔 | 猪後蹄垂甲<br><small>不拘多少燒存性</small> | 右為末陳米飲調二錢空心服 | 青蛙圓治諸痔 | 青色蛙<br><small>長脚者取一箇燒存性</small> | 右為末雪糕圓桐子大每服十五圓空心先喫飯二匙次以胡桃肉切細煎湯調枳殼散送下若產婦發痔裏急作疼用黑豆一百粒陳米一合夾煎湯下亦先喫飯二匙 | 穿山甲散治痔肛邊生鼠乳或成瘡痛 | 穿山甲<br><small>橫取後段尾根盡處一兩炙焦存性</small> | 麝<br><small>半錢細研</small> | 右為末每服一錢半用蠟茶半匙夾和沸湯調下防風煎調亦得留滓傳痔○又方單用穿山甲 | 地榆散治痔生瘡腫痛 | 地榆 | 黃耆 | 枳殼 | 檳榔 | 川芎 | 黃芩 |
|--------|---------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|





|                                                                    |             |       |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|
| 赤芍藥                                                                | 槐花          | 羌活    | 兩各半       |
| 白斂                                                                 | 蜂房          | 甘草    | 炙一分各      |
| 右剉每服三錢新水煎服                                                         |             |       |           |
| 皂刺圓治痔痛而復癢                                                          |             |       |           |
| 皂莢刺                                                                | 二兩燒煙<br>盡存性 | 防風    |           |
| 槐花                                                                 | 分各三         | 蛇床    |           |
| 白蒺藜                                                                | 刺炒去         | 枳殼    | 製         |
| 蜂房                                                                 | 焦炒          | 五倍子   | 分各一       |
| 右為末醋調菜豆粉為糊圓如小豆大每服五十圓以<br>苦練根煎湯下仍用童子熱尿入白礬末澆洗肛門<br>皂角煎圓治內痔腸頭裏面生核寒熱往來 |             |       |           |
| 滿尺皂角                                                               | 三錠去弦<br>核醋炙 | 刺蝟皮   | 一兩<br>炙黃  |
| 白礬                                                                 | 兩煨一         | 猪後蹄垂甲 | 十枚燒<br>存性 |
| 桃仁                                                                 | 皮浸去<br>尖    | 川芎    | 北梗        |
| 甘葶藶                                                                | 半炒焦各<br>兩   | 薏苡    | 白芷        |
| 右為末煉蜜圓如桐子大每五十圓桑白皮煎湯下                                               |             |       |           |



|                      |            |      |     |
|----------------------|------------|------|-----|
| 仍以藩籬草根煎湯熏洗           |            |      |     |
| 芎歸圓治痔下血不止            |            |      |     |
| 川芎                   | 當歸         | 黃耆   |     |
| 神麴                   | 炒          | 地榆   |     |
| 阿膠                   | 酥炒         | 荊芥穗  | 木賊  |
| 頭髮                   | 燒存性<br>各一分 |      |     |
| 右末煉蜜圓桐子大每服五十圓食前米飲下   |            |      |     |
| 乾葛湯治酒痔               |            |      |     |
| 白乾葛                  | 枳殼         | 炒    | 半夏  |
| 伏苓                   | 生乾地黃       | 杏仁   | 兩各半 |
| 黃芩                   | 甘草         | 分各一  |     |
| 右剉碎每服三錢黑豆百粒薑五片白梅一箇煎服 |            |      |     |
| 橘皮湯治氣痔               |            |      |     |
| 橘皮                   | 枳殼         | 炒    | 川芎  |
| 槐花                   | 半炒各<br>兩   | 檳榔   | 木香  |
| 桃仁                   | 皮浸去<br>尖   | 紫蘇莖葉 | 香附  |



甘草 灸各二錢半

右剉每三錢薑棗煎服

代赭石圓治痔變為癭膿血不止

代赭石 煨醋滓研 磁石 煨米醋數沸七次研 白礬 煨

牡蠣灰 龍骨 研

蛻皮 灸焦

皂莢刺 燒 猪後蹄垂甲 燒存性各 赤石脂

川椒 焙 木賊 蜂房 炒

右件等分細末神麴糊圓小豆大每服五十圓食前艾

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十三

并生薑煎湯下漏血處以熟艾揉和血竭塞日三換

荆枳湯治氣滯發痔

荆芥穗 枳殼 炒 槐花

香附 紫蘇莖葉 甘草 炙等分

右為末每服二錢米湯調下

芎歸湯 方具載血類 加伏苓槐花微炒治產婦諸痔

傳痔方治腸口熱腫朴消二錢鵬砂半錢末之乾摻○又大

黃滑石等分末之井水調傳○又朴硝五倍子等末傳之

止血方

明血竭末傳之○通用方猪後蹄垂甲燒灰傳○又

水浸熊膽汁以筆傳○又鴨觜青膽礬煨為末用清

蜜調筆傳可以消脫○又雞子一箇煮熟去黃取白

切焙明礬煨白欽各一錢同末傳有孔用紙撚蘸入

熏洗方

槐花荆芥枳殼艾葉水煎入白礬熏洗○又木鱉七枚

取仁研土礬末二錢少水煎熏兩三次○又藩籬草根

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十三

煎湯先熏後洗藩籬花似小芙蓉○又蛻皮三指許艾

葉一團如燒香法置長桶中坐熏三次凡痔發於肛內

者須用熏洗若腸口腫熱朴硝末新汲水調常常淋之

治諸痔方凡痔皆因酒麪炙博蓄熱傷血惡血結聚於

下焦不得疏通於是下墜而為痔患痔之人下部留蓄

血熱多致大小便不通小腹結急纔得一通又復閉塞

且有漱水之證此下焦留蓄血熱明矣其下焦蓄血亦

以尺脉洪盛見之合用逐瘀湯主治須得大小便通快



患處即以明白礬泡湯溫洗仍以葱湯再沃次用桐殼灰穿山甲尾間炙焦地膽去翅足秫米炒各一分為細末入膽礬少許研和酒調以筆蘸傳少頃痛來以葱湯沃去準一時許前藥又增些膽礬若痛又以葱湯沃之又等一時藥中又增些膽礬並如前法一日三次用前藥其膽礬又以漸加多於第一日矣後日三次用煎藥其膽礬又以漸加多於第二日矣痛則沃之以葱湯三日以還更不用藥只是明礬泡湯與白湯相間淋洗日三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀無膽礬以綠礬代之

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十三

逐瘀湯通利大小便取下黑物

川芎

白芷

生乾地黄

赤芍藥

五靈脂

枳殼  
製

阿膠  
炒

蓬莪朮

茯苓

茯神

木通

生甘草  
各一分

實大黃

生用

桃仁

盪去皮焙  
各一分半

右剉散每三錢井水一椀薑三片蜜三匙煎服以利為度瘀血作痛通用  
治痔五聖丹

雄黃

葉子雌黃

朴硝

綠礬

明白礬

各半兩

右件各別礪碎以銀窩一入雄黃二入雌黃三入朴硝四入綠礬五入白礬圓瓦片蓋定炭火煨一日夜看青煙出盡有紅煙上方好候冷取出紙襯頓地上

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十三

用盆蓋出火毒一日夜入乳香沒藥末各一錢同研極細每抄一匙煎甘草湯調傳外用雞羽掃藥末蓋之日二次夜一次自然乾硬而脫逐日須用葱白煎湯入朴硝溫洗軟帛拭乾然後傳藥○治痔猪膽膏猪膽七枚各取汁以建盞盛炭火熬成膏用單紙攤傳須先用槐根取白皮煎湯溫洗然後傳藥  
重痔方

五倍子日乾如燒香法置長桶內坐燻患處自然收





右燒存性隨證倍用一分為末井花水調二錢空心  
臨臥時服之

一方治熱痔疼痛不可忍者

用鮮枸杞根數莖杵爛煎湯熏洗其痛立止

四物湯

方見虛勞門

解毒湯

方見積熱門

灸法用大蒜一片頭垢捻成餅子先安頭垢餅於痔上

外安蒜艾灸之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十三

便毒

便毒論

腎為作強之官所藏者志也男女大慾不能以直遂其  
志故敗精搏血留聚中途而結為便毒矣夫人腳腿與  
小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或  
夢泄而不泄既不得偶合陰陽又不能忘情息念精與  
血交滯其不為腫結也幾希便毒處所上不在腹下不  
在腿介乎兩者之中是也嘗怪世俗無知纔覺有便毒

證狀必以為熱氣所攻每每薄衣露足遂使寒邪乘之  
熱氣轉不得散日復一日敗精宿血愈聚而愈結焉不  
思一身宗筋上絡於舌本下聚於陰器筋得寒則急急  
則縮甚至偃僂而不獲伸於斯時也百藥並陳亦難責  
效況復從事於寒涼者乎治法散寒利熱泄其腎邪活  
其血脉是為捷徑外此老人氣滯亦或有之

便毒證治

雙解散治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十三

痛

辣桂

川大黃  
生

白芍藥

澤瀉

牽牛  
炒取末

桃仁  
去皮炒乾各一分

甘草

半分

右為粗末每服三錢薑五片食前煎服日兩服先小  
便快熱從小便出後大便利皆是稠毒

連翹湯治便毒腫結

連翹

獨活

川升麻





|                                     |                              |                           |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 射干                                  | 木通                           | 桑寄生                       |
| 赤茯苓                                 | 甘草<br><small>炙各七錢半</small>   | 大黃<br><small>生用</small>   |
| 木香                                  | 乳香                           | 沉香<br><small>各半兩</small>  |
| 右剉細每服三錢慢火煎服                         |                              |                           |
| 復元通氣散便毒初發用此方                        |                              |                           |
| 穿山甲<br><small>酒浸炙二兩</small>         | 天花粉<br><small>酒浸一宿焙</small>  | 白芷                        |
| 舶上茴香<br><small>炒</small>            | 白牽牛末<br><small>炒</small>     | 延胡索<br><small>擦去皮</small> |
| 南木香                                 | 當歸                           | 甘草<br><small>炙各一兩</small> |
| 青木香<br><small>半兩</small>            |                              |                           |
| 右為細末每服二錢溫酒調食前服不飲酒南木香煎湯下             |                              |                           |
| 退毒飲治便毒腫結                            |                              |                           |
| 穿山甲<br><small>半兩 醋炙焦</small>        | 木猪苓<br><small>三錢 醋微炙</small> |                           |
| 右為末每服二錢食前老酒調下次以法醋煮肥皂研膏傳之妙           |                              |                           |
| 五苓散疎利小便以泄敗精<br><small>方見飲水門</small> | 用葱二莖煎湯調                      |                           |

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| 下○追風毒剉散治便毒熱證大便秘結<br><small>方見脚氣門</small> | 又清                         |
| 涼飲通用<br><small>方見痔門</small>              | ○和劑流氣飲治便毒大便不通加生            |
| 大黃食前服<br><small>方見腸滿門</small>            | ○究原排膿內補散便毒已消常              |
| 服之<br><small>方見癰門</small>                | 潰處以白斂白及沒藥乳香血竭為末傳           |
| 之○蠟礬圓治腫核痔漏諸癰<br><small>方見痔門</small>      | 四聖散治便毒癰                    |
| 疽腸癰神效<br><small>方見癰門</small>             |                            |
| 傳方治便毒腫痛                                  |                            |
| 雄黃                                       | 乳香<br><small>各二錢半重</small> |
| 黃栢<br><small>一錢</small>                  |                            |
| 右為細末分作兩服以新水調傳自平                          |                            |
| 皂角膏治癰疽便毒等                                |                            |
| 皂角一條長尺以上者槌碎法醋煮爛研成膏傳之                     |                            |
| 屢效                                       |                            |
| 膠方便毒初發                                   |                            |
| 水膠用水溶開塗傳若便毒已大而軟則用魚鰾膠                     |                            |
| 於熱湯中煮軟乘熱研爛傳之或要換藥以熱湯洗                     |                            |
| 去                                        |                            |



蕉葉方治便毒

蕉弓葉乾者焙焦為末法醋生薑自然汁等分調傳  
又方

紫背草研醋調傳

附諸方

秘傳蟬退散治便毒初起疼痛服之神效

蟬退  
去土並頭足

楓由蟲  
灸死各錢 蜈蚣  
三條燒存性

雄黃  
三分

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十三

右件共為細末分三服用好酒煎一二沸食前服忌

食諸熱毒物

秘傳獨聖散治一切便毒連連作痛更不腫起名曰陰

毒服之立應

取活蜈蚣一二條用炭火燒存性為末用好酒調

服食前下

雙解散治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯腫結疼

痛

辣桂

大黃

白芍藥

澤瀉

牽牛  
炒搗研

桃仁  
去皮各錢半

甘草  
五分

乾薑  
一錢

右咬咀分二貼每服用水二盞煎七分食前服

一方治便毒初發以生薑一大塊米醋一合以薑蘸醋

磨取千步峰泥敷之即散  
千步峯泥地上人經行日久其泥突起者是

附疳瘡方

秘傳鳳凰衣散治疳瘡腫痛神效

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十三

鳳凰衣  
即包雞子壳內衣是也不以多少

輕粉

冰片  
各少許

右為極細末傳患處効

麝香輕粉散治血疳陰蝕臙瘡耳疳一切惡瘡

輕粉

麝香  
各五分

乳香

沒藥

明礬  
各一兩

右為細末乾貼

一方治下疳瘡



蜜陀僧

黃連

黃柏

輕粉  
分 各等

右為細末以鹽艾湯沃洗乾摻

附妬精瘡方

津調散治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

欵花  
分 等

右為末以地骨皮蛇床子煎湯洗絹帛挹乾津調藥

敷

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十三

歌曰

陰瘡痒痛黃汁注

輕粉石膏濕乾傳

不然細研生白礬

冷水洗之根亦去

又

腦茶五倍末同調

摻傳陰瘡便可消

更有一般官局藥

水銀和粉玉龍膏

又

婦人交接妬精瘡

地龍蛇床作洗湯

細研黃連欵冬末 唾津調傳是良方

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十三

仁齋直指卷二十三



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷二十四

詳校官太醫院吏目周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱鈐

校對官主簿臣汪日贊

膳錄監生臣張鴻仁

欽定四庫全書

仁齋直指卷二十四

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

癰疹風

癰疹風論

風氣挾熱起於湊理皮膚不腫不疼發為瘙癢謂之癰疹此風熱之浮淺者也其亦有寒暑濕之氣行焉風熱在表天時炎暄而燥氣乘之則為赤疹風熱在表天時

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十四

寒涼而冷氣折之則為白疹赤者遇涼清而後消白者遇溫暖而後滅然則用藥加減可無權度於此哉其有浴後湊風與夫汗出解脫而得之者隱隱微黃似赤似白凝滯於肌肉之間而四體為之重着此風熱之挾濕外證又可推矣如其不知寒暑濕之所由生概以療風熱等輩索之按圖殆恐痰嗽嘔渴雜證交攻由癰疹而變為瘡疹

癰疹證治



|                                      |  |                                                                                   |  |      |  |       |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-------|--|
| 天麻散治風熱癰疹                             |  | 天麻                                                                                |  | 川芎   |  | 川升麻   |  |
| 半夏                                   |  | 製各三錢                                                                              |  | 防風   |  | 細辛    |  |
| 羌活                                   |  | 荆芥穗                                                                               |  | 蟬殼   |  | 去足    |  |
| 甘草                                   |  | 焙各二錢                                                                              |  |      |  |       |  |
| 右細剉每服二錢薑三片井水煎服挾寒者加官桂挾暑者加柴胡黃芩挾濕者加茯苓蒼朮 |  |                                                                                   |  |      |  |       |  |
| 加味羌活散癰疹通用                            |  |                                                                                   |  |      |  |       |  |
| 欽定四庫全書                               |  |  |  | 仁齋直指 |  |       |  |
| 卷二十四                                 |  |                                                                                   |  |      |  |       |  |
| 羌活                                   |  | 前胡                                                                                |  | 各半兩  |  | 人參    |  |
| 北梗                                   |  | 川芎                                                                                |  |      |  | 茯苓    |  |
| 天麻                                   |  | 枳殼                                                                                |  | 製    |  | 甘草    |  |
| 蟬殼                                   |  | 腦荷                                                                                |  | 半一錢  |  | 炙各二錢半 |  |
| 右末每挑二大錢匕薑錢三片煎服                       |  |                                                                                   |  |      |  |       |  |
| 消風散治癰疹瘙癢                             |  | 方見頭風門                                                                             |  |      |  |       |  |
| 川芎茶調散治風熱癰疹                           |  | 方見頭風門                                                                             |  |      |  |       |  |
| 胡麻散治風熱癰疹                             |  | 方見歷節門                                                                             |  |      |  |       |  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 人參羌活散治風熱癰疹瘙癢         | 方見眼目門        |
| 惺惺散                  |              |
| 桔梗                   | 細辛           |
| 茯苓                   | 白朮           |
|                      | 瓜蒌根          |
| 甘草                   | 炙等分          |
| 右末入薄荷煎要和氣添薑錢可夾和人參羌活散 |              |
| 治癰疹亦治瘡疹              |              |
| 羌蚕散治癰疹               |              |
| 欽定四庫全書               | 仁齋直指卷二十四     |
| 白僵蚕                  | 直者去黃焙        |
| 盡絲令黃                 |              |
| 右末好茶清入些薑汁調下          |              |
| 傳藥                   |              |
| 明礬                   | 朴硝為末井水調雞羽掃傳  |
| 又方                   |              |
| 赤小豆                  | 荆芥穗晒為末雞子清調薄傳 |
| 又方朱黛散撲傳              | 方見丹毒門        |
| 洗方蚕沙新水煎密室溫洗          |              |





|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 胡麻散治風氣挾熱癰疹瘙癢          |       |
| 胡麻子                   | 十二兩   |
| 苦參                    |       |
| 荊芥穗                   |       |
| 何首烏                   | 各八兩   |
| 威靈仙                   |       |
| 防風                    |       |
| 石昌蒲                   |       |
| 牛旁子                   | 炒     |
| 菊花                    |       |
| 蔓荊子                   |       |
| 蒺藜                    | 炒去刺   |
| 甘草                    | 炙各六兩  |
| 右末每服二錢食後薄荷湯點服或好茶清亦得   |       |
| 丹疹並不得喫醋               |       |
| 附諸方                   |       |
| 陽毒升麻湯癰在面傷寒一二日或吐下後變或陽毒 |       |
| 腰背痛煩悶不安面赤狂言見鬼下痢脉浮大咽痛  |       |
| 人參                    |       |
| 黃芩                    |       |
| 麝香                    |       |
| 犀角                    |       |
| 甘草                    | 各二錢五分 |
| 升麻                    | 半兩    |
| 右咬咀水煎取飲半盞刻許再進溫覆手足得汗出  |       |
| 解                     |       |
| 玄參升麻湯癰在身治汗下吐後毒不散表虛裏實發 |       |
| 於外甚則煩燥譫妄              |       |

|                   |     |      |
|-------------------|-----|------|
| 玄參                | 升麻  | 甘草   |
| 右咬咀水煎服            |     | 分 各等 |
| 陽毒梔子湯治傷寒壯熱百節疼痛而發癰 |     |      |
| 升麻                | 梔子仁 | 黃芩   |
| 芍藥                | 石膏  | 知母   |
| 杏仁                | 柴胡  | 甘草   |
|                   |     | 分 各等 |
| 右為粗末每五錢入薑五片豉百粒煎服  |     |      |
| 消毒犀角飲子治癰及癰疹       |     |      |
| 牛旁子               | 荊芥  | 防風   |
| 錢 六               |     | 錢 各三 |
| 甘草                |     |      |
| 錢 一               |     |      |
| 右咬咀水煎服            |     |      |
| 解毒防風湯治癰及癰疹癢痛      |     |      |
| 防風                | 地骨皮 | 黃耆   |
| 兩 一               |     |      |
| 芍藥                | 荊芥  | 枳殼   |
| 牛旁子               |     |      |
| 兩 各半              |     |      |
| 右為粗末每四五錢水煎服       |     |      |



|                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 調中湯治內傷外感而發陰癰                                                                                                                                               |                    |
| 蒼朮                                                                                                                                                         | 陳皮                 |
| <small>半一錢</small>                                                                                                                                         |                    |
| 藿香                                                                                                                                                         | 芍藥                 |
|                                                                                                                                                            | <small>炒</small>   |
| 桔梗                                                                                                                                                         | 半夏                 |
|                                                                                                                                                            |                    |
| 羌活                                                                                                                                                         | 枳殼                 |
|                                                                                                                                                            | <small>各一錢</small> |
| 麻黃                                                                                                                                                         | 桂枝                 |
|                                                                                                                                                            | <small>各五分</small> |
| 右咬咀薑三片水煎服                                                                                                                                                  |                    |
| 丹毒                                                                                                                                                         |                    |
| 丹毒方論                                                                                                                                                       |                    |
| <p>欽定四庫全書</p> <p>仁齋直指</p> <p>卷二十四</p>                                                                                                                      |                    |
| <p>丹之為候由熱毒之氣搏於榮血而風乘之所以赤浮肌肉而為之走注也然丹有五丹不特色赤或青或黃或白或黑是血熱風毒有盛有衰元冷挾熱故其色變易又不同焉要之諸瘡皆屬於心心為血之主血為熱之媒古人以丹命名蓋謂心應火色尚赤端冷揆元夫既心家血熱所致風以動之於是遊走而遍體也蔓衍而不歇則爛肌自四肢而入腹入腎則殺人惟初生於</p> |                    |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四



迪志文化出版有限公司出版

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| 曾腹然後流散於四肢者易愈                                      |                           |
| 丹毒證治                                              |                           |
| 藍葉散治諸丹發熱赤腫                                        |                           |
| 白芷                                                | 柴胡                        |
| 杏仁<br><small>皮去</small>                           | 川芎                        |
| 生地黃                                               | 川升麻                       |
| 生甘草<br><small>各一分</small>                         | 爛石膏                       |
| 藍葉<br><small>日乾一分</small>                         | 梔子仁<br><small>各半分</small> |
| <div>欽定四庫全書</div> <div>仁齋直指</div> <div>卷二十四</div> |                           |
| 右剉細每一錢半新水煎服熱甚加黃芩玄參煎服                              |                           |
| 防己散治諸丹                                            |                           |
| 漢防己<br><small>錢三</small>                          | 川升麻                       |
| 犀角                                                | 黃耆                        |
| 朴硝<br><small>錢一</small>                           | 川芎<br><small>各一分</small>  |
| 右剉每一錢半新水入少蜜并竹葉煎                                   |                           |
| 朱黛散解丹熱諸毒                                          |                           |
| 青黛                                                | 土朱<br><small>各一分</small>  |
| 軟滑石                                               |                           |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四



迪志文化出版有限公司出版

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 荊芥穗                | 各半           |
| 右為末每一錢半蜜水調下兼與撲身    |              |
| 人參羌活散              | 方見眼<br>目門    |
| 惺惺散                | 方見癰<br>疹門    |
| 夾和用竹葉煎湯            |              |
| 調下治諸丹              |              |
| 諸丹熱證加黃芩玄參冷證加黃耆白芷   |              |
| 疎風解毒散亦治丹毒          | 方見諸<br>惡瘡門   |
| 傳方                 |              |
| 紫浮萍一椀              | 中等活地龍七條研細傳   |
| 欽定四庫全書             | 仁齋直指<br>卷二十四 |
| 又方芒硝末水調傳           | 又方赤小豆末雞子清調傳  |
| 又方青澱汁傳             | 又方水藻搗傳       |
| 又方芭蕉根取汁傳           | 又方梔子大黃蜜水搗傳   |
| 又方猪糞燒灰雞子清調傳        |              |
| 洗方蠶沙一升井水煎溫和密室洗     |              |
| 青白丹竈中黃土一分豉半分為末麻油調傳 |              |
| 小兒風疹走帶方            |              |
| 薑黃                 | 荊芥           |
|                    | 黃連           |

|             |              |      |     |
|-------------|--------------|------|-----|
| 土朱          | 赤小豆          | 爛石膏  | 等分  |
| 右為末撲之服藥同前   |              |      |     |
| 附諸方         |              |      |     |
| 藍青散治一切丹毒赤腫  |              |      |     |
| 藍青          | 知母           | 甘草   |     |
| 杏仁          | 去皮尖<br>各五錢   | 黃芩   | 升麻  |
| 柴胡          | 寒水石          | 石膏   |     |
| 山梔          | 赤芍藥          | 各四錢  | 羚羊角 |
|             |              |      | 三錢  |
| 欽定四庫全書      | 仁齋直指<br>卷二十四 |      |     |
| 右剉每服三錢水煎服   |              |      |     |
| 消毒飲治赤丹火丹紫蒞丹 |              |      |     |
| 牛蒡子         | 炒研<br>三兩     | 荊芥穗  | 五錢  |
| 防風          | 升麻           | 各七錢半 | 犀角  |
|             |              |      | 三錢  |
| 麥門冬         | 桔梗           | 各五錢  |     |
| 一方加朴硝       | 二錢           |      |     |
| 右咬咀每服一二錢水煎服 |              |      |     |
| 一方治火丹毒遍身赤腫痛 |              |      |     |



|                    |                    |         |
|--------------------|--------------------|---------|
| 寒水石                | 石膏                 | 黃栢      |
| <small>各一兩</small> | <small>各三錢</small> |         |
| 甘草                 | 右為末芭蕉汁調敷           |         |
| 一方治火帶              |                    |         |
| 歌曰                 | 瘡毒細如火火帶            | 能令斑駁皮肉壞 |
| 爛研一味百合根            | 傳若頻時消亦快            |         |
| 一方治丹瘤              |                    |         |
| 大黃                 | 朴硝                 | 土蜂窩     |
| 右為末水調塗之            |                    |         |
| 洗藥方                |                    |         |
| 防風                 | 酸車草                | 赤豆      |
| 竈心土                |                    |         |
| <small>等分</small>  |                    |         |
| 右煎湯洗立効             |                    |         |
| 附天庖瘡方              |                    |         |
| 防風通聖散              | 蚯蚓泥                |         |



|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 右共為末畧炒蜜調傳極妙           | 從肚皮上起者是重熱發於外還服防風通聖散   | 風門                    |
| 癩風                    |                       |                       |
| 癩風方論                  |                       |                       |
| 癩風即經所載癘風也癩之名非一證狀多端不出五 | 種風生五種虫是爾黃風生黃虫青風生青虫赤風生 | 赤虫白風生白虫黑風生黑虫四虫猶可措手惟黑虫 |
| 未必有瘰疬此惡疾也瘡痕茶毒乍熱乍寒身體魁癰 | 手足指脫眼爛鼻塌齒豁唇翻顏色枯黃眉鬢墮落頑 | 痺痛癢不能屈伸病證之惡莫甚乎此然此雖出於風 |
| 必有所致大率多因嗜慾無度勞動氣血熱發汗出不 | 避冷濕外風遂致淫氣與榮衛相干衛氣挾邪則肌肉 | 不仁榮氣泣濁則脉絡瘀熱故遍身瘍潰變壞人形千 |
| 金所謂自作不仁極猥之業雖有悔言而無悔心故應 | 如是亦有傳染觸犯而得者此則不謹之所招也其虫 |                       |



在於病軀去來無數甚入骨髓食人肝則眉睫脫落食人肺則鼻柱頹崩食人脾則語音變散食人腎則耳鳴如雷若食其心則諸痛癢瘡心實司之心不受觸觸則死矣人有斯疾切須忌鹽及一切口味幽隱林泉屏棄世務蚤蚤救療庶為全人治法以疎風殺虫逐惡毒輩為之宣通謹勿用補此風從頭起而下者順從足起而上者逆順則易逆則難又當識此餘於直指後集歷節方論見之

大寒大熱不得行淫多致風癰或久病疰羸廢其肢體

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十四

### 癰風方論

通天再造散治大風諸癰

川鬱金 兩半 綿紋皺大黃 一兩 微焙

白牽牛 半生半炒 取仁半兩

黑色大皂莢刺 一兩 半焙

右細末每服三錢半月首五更面東好酒調下重者泄出黑頭小虫輕者泄如魚腸爛肉極臭服藥至無虫則瘥四箇月絕口味但喫白粥白飯懲忿窒慾永

斷牛馬驚鴨等物下藥條至勿令病人知恐虫匿也本事神效追命散治大風

北大黃 七錢 半 大皂莢刺 一兩 川鬱金 半兩

右細末每二錢用真大風油入好酒溫調臨睡服隔兩日再服直候泄下無虫方瘥此疾業緣果報常須至誠念佛懺悔以全其身

皂棘湯治大風

皂莢刺 燒半生半 灰二錢 北大黃 一錢

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十四

輕粉 半錢

右末酒調空心服取下惡物服藥數日齒出毒血甚臭

皂角圓治大風諸癰

肥長皂角 二十條 先去皮弦其核自脫 先炙透後

右以皂角肉多用酒慢火煎得稠粘濾出清稠者候冷入雪糕杵為圓桐子大每五十圓不飢飽酒送下硫黃酒煞癰風虫





|                                 |                    |                      |                      |         |                        |                  |                        |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|------------------------|------------------|------------------------|
| 明硫黃<br><small>乳鉢研細</small>      |                    | 右入酒調空心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前 |                      | 或添大風油更好 |                        | 黑虎丹治大風諸癩惡虫內蝕形骸變壞 |                        |
| 天靈蓋                             | <small>三兩</small>  | 蝦蟇                   | <small>二個去頭足</small> | 生人中白    | <small>浸去皮二兩</small>   | 桃仁               | <small>各二兩</small>     |
| 雄黃                              | <small>各一兩</small> | 穿山甲                  | <small>熟灰插</small>   | 老皂莢刺    | <small>燒存半生各半兩</small> | 輕粉               | <small>二錢半</small>     |
| 右末煉蜜圓桐子大每三十圓月首五更米飲連日服取虫盡則愈殺療虫通用 |                    | 烏蛇圓治風癩殺五虫            |                      | 胡麻子     |                        | 烏蛇肉              | <small>酒浸焙</small>     |
| 苦參                              | <small>四兩</small>  | 檳榔                   | <small>獨活</small>    | 桃仁      | <small>浸去皮日乾</small>   | 白蒺藜              | <small>炒杵去刺各一兩</small> |
| 皂莢刺                             | <small>炒焦</small>  | 貫衆                   | <small>各七錢半</small>  | 蕪荑      | <small>各半兩</small>     | 雄黃               | <small>各半兩</small>     |
| 雷圓                              | <small>各半兩</small> | 硫黃                   | <small>各半兩</small>   |         |                        |                  |                        |

|                   |                               |                    |                               |        |                        |                                       |                    |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 朱砂                |                               | <small>二錢半</small> | 蝦蟇                            |        | <small>二箇去頭足炙焦</small> | 右細末以長皂角十條水三升掇取濃汁去滓煎成膏和藥末圓如桐子每三十圓空心溫酒下 |                    |
| 雄黃                | <small>各一兩</small>            | 朱砂                 | <small>各一兩</small>            | 雄朱散治大風 | <small>各一兩</small>     | 雄黃                                    | <small>各一兩</small> |
| 阿魏                | <small>各一兩</small>            | 雌黃                 | <small>各一兩</small>            | 雷圓     | <small>各一兩</small>     | 生犀角屑                                  | <small>各半兩</small> |
| 芫青虫               | <small>各去翅足糯米炒透各用二十四箇</small> | 斑猫虫                | <small>各去翅足糯米炒透各用二十四箇</small> | 黑皂莢刺   | <small>焙七錢半</small>    | 右細末每服三錢天明溫酒調下明日再服                     | <small>各一兩</small> |
| 雷圓散風癩取虫           |                               | 水銀                 |                               | 硫黃     | <small>各一兩</small>     | 雄黃                                    | <small>各一兩</small> |
| 阿魏                | <small>各一兩</small>            | 貫衆末                | <small>各二錢半</small>           | 麝香     | <small>各一兩</small>     | 雷圓                                    | <small>各一兩</small> |
| 右研極細每一錢天明溫酒調下明日又服 | <small>各一兩</small>            | 蝦蟇圓治大風殺五虫          | <small>各一兩</small>            |        |                        |                                       |                    |



|                                                               |  |                      |  |                      |  |          |  |        |  |                                |  |                                              |  |            |  |                                 |  |                                                                                |  |                                                        |  |                      |  |   |  |                       |  |                                           |  |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------|--|--------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| 乾蝦蟆 <small>一兩 灸黃</small> 肥長皂角 <small>一條 先灸透後去皮 弦核蘸酒再灸</small> |  | 右為末以竹管引入羊腸內繫兩頭用麩二升鋪甌 |  | 內置麩上蒸熟去麩入麝半錢同搗圓如桐子每二 |  | 十一粒空心溫酒下 |  | 蔓荊圓治大風 |  | 蔓荊子 蒼耳 <small>即鼠粘子</small> 枸杞子 |  | 牛蒡子 <small>炒</small> 黑牽牛 <small>炒</small> 胡麻 |  | 白芷 何首烏 威靈仙 |  | 荊芥穗 獨活 蒺藜 <small>炒 剉 去刺</small> |  | 華陰細辛 <small>去苗葉 土</small> 直僵蠶 <small>炒 去絲</small> 道人頭 <small>去刺 取仁 各半兩</small> |  | 皂莢刺 <small>炒 焦</small> 苦參 大草烏 <small>去皮 尖生 各一兩</small> |  | 右細末大風油和圓桐子大每二十四圓食前茶清 |  | 下 |  | 必用厲風方并返魂追命再造散皆治大風胡麻散解 |  | 風毒熱氣癰疹瘙癢 <small>方並見歷節門</small> 蠟礬圓癰風常服以解內 |  | 毒 <small>方見癰疽門</small> 聖惠方千金方治大風單服鍊成松脂 |  |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------|--|--------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------------|--|------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------|--|---|--|-----------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|

|                |  |     |  |        |  |           |  |          |  |           |  |            |  |                                |  |                        |  |                      |  |                   |  |                    |  |                            |  |                                                     |  |             |  |             |  |
|----------------|--|-----|--|--------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|
| 癰風服藥半月後兩腰眼各灸七壯 |  | 附諸方 |  | 磨風丸治大風 |  | 川當歸 羌活 獨活 |  | 川芎 天麻 細辛 |  | 防風 荊芥 葳靈仙 |  | 麻黃 何首烏 石京子 |  | 牛蒡子 車前子 皺面草 <small>即地松</small> |  | 蒼耳子 <small>各一兩</small> |  | 右皆不見火晒乾為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子 |  | 大每服三十九食前溫酒下服後煎藥熏洗 |  | 加減大造苦參丸治大風瘡及諸風赤白癰風 |  | 苦參 <small>一斤</small> 防風 荊芥 |  | 蒼耳子 胡麻子 <small>半生 半熟</small> 皂角刺 <small>各十兩</small> |  | 蔓荊子 牛蒡子 黃荊子 |  | 枸杞子 何首烏 禹餘糧 |  |
|----------------|--|-----|--|--------|--|-----------|--|----------|--|-----------|--|------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|



|                                                  |                        |                      |              |               |                      |                  |        |                  |                                                                    |                                                                   |                                 |                    |          |          |          |                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------|
| 蛇床子 <small>兩各三</small> 香白芷 <small>半一兩</small> 薄荷 | 生地黃 <small>兩各一</small> | 右為細末用皂角搗爛熬膏入前藥勻為丸丸如梧 | 桐子大每服五十丸茶酒任下 | 一方治大風眉毛脫落肌膚拆裂 | 用防風通聖散加苦參天麻蟬蛻早晚各一服至百 | 貼必愈忌房事鹽醬葷腥生冷油膩之物 | 一方治大風風 | 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十四 | 苦參 <small>酒浸一宿</small> 牙皂 <small>兩一</small> 龜板 <small>一箇酥炙</small> | 僵蠶 <small>錢一</small> 全蝎 <small>去頭尾一錢</small> 輕粉 <small>三分</small> | 全付驚毛 <small>鍋內炒化放於地上出火毒</small> | 共為末每服一錢好酒調下每日早晚各一服 | 一方治大麻風洗藥 | 苦參 荊芥 防風 | 白芷 獨活 羌活 | 藁本 <small>兩各一</small> 落陽花 <small>四兩用燒酒一斤浸一宿酒不用</small> |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------|

|                |                            |                                         |    |     |            |                      |               |                  |        |                          |               |     |           |         |                      |               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|----|-----|------------|----------------------|---------------|------------------|--------|--------------------------|---------------|-----|-----------|---------|----------------------|---------------|
| 右咬咀勻作三次煎水洗汗出為度 | 防風通聖散 <small>方見中風門</small> | 當歸括痛湯治大麻風兩足血風瘡痛癢等証 <small>方見脚氣門</small> | 癰風 | 癰風方 | 雞子一枚用酸醋浸一宿 | 右以針刺小穿瀝清汁入砒末并綠豆末少許夾和 | 先以石札擦破次用青布蘸擦妙 | 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十四 | 治赤癰白癰方 | 硫黃 明白礬 <small>並生</small> | 右為末薑汁調茄蒂蘸擦兩三次 | 癰風方 | 雄黃 硫黃 黃骨丹 | 蜜陀僧 大南星 | 右等分為末先用薑汁擦患處次用薑蘸藥末擦擦 | 後漸黑次日再擦黑散則無事矣 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|----|-----|------------|----------------------|---------------|------------------|--------|--------------------------|---------------|-----|-----------|---------|----------------------|---------------|



附諸方

蒼耳丸治諸風及諸風癰疹白紫癰風

五月五日割取蒼耳草葉洗淨晒乾為末煉蜜丸如

梧桐子大每服十九日三服若身體有風處或如麻

豆粒此為風毒出也可以針刺黃汁出盡乃止

靈草丹治一切風疾及癰疹紫白癰風痛癢頑麻

採紫背浮萍草攤於竹篩內下着水晒乾為細末煉

蜜丸如彈子大每服一丸用黑豆淋酒化下及治脚

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十四

氣打撲傷損渾身麻痺

諸風應効酒治一切諸般風濕痺遍身骨節疼痛紫白

癰風神効  
方見歷  
節門

附汗斑方

一方治汗斑紫白色者

用白附子硫黃各等分為細末以茄帶蘸醋粘末擦

一方

用夏枯草濃煎水日洗數次

肥皂方去白癰黑黧白癬諸般瘡痕令人面色好

白芷 白附子 白殭蠶

白芨 猪牙皂角 白蒺藜

白欽 草烏 山查

甘松 白丁香 大黃

藁本 鶴白 杏仁

豆粉 猪脂 輕粉

蜜陀僧 樟腦 孩兒茶

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十四

肥皂  
去裏外皮筋并子  
只要淨肉一茶盞

右先將淨肥皂肉搗爛用雞清和晒去氣息將各藥

為末同肥皂猪脂雞清和為丸

一方

用生小茄兒分為節擦之三五次効

諸瘡

諸瘡方論

諸瘡雖不能害人然浸淫無已亦有多年不獲愈者此



皆心腎不濟飲食不節腸胃停留以致風毒與血氣搏凝滯於肌肉之間而發露也其名目療治有異焉凡人體虛感受風熱濕毒之氣發為瘡瘍癢痛焮腫身熱多汗是為惡瘡或生於手足間相對如新茱萸癢痛拆裂搔則黃汁淋漓有孔如癰久而生虫是為蝸瘡或初生如飯粒漸大而有根頭破血流濃出肉反如花開之狀是為反花瘡或初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌肉延至遍身若從口發出流散四肢者輕若從四肢發

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十四

生然後入口者重是為浸淫瘡或生於兩耳鼻面間及下部諸竅侵蝕筋絡月中則瘡盛月末則瘡衰以其隨月而生是為月蝕瘡小兒耳下瘡亦名月蝕或毒氣攻於手足指弩肉裹上指甲疼痛出血瘡中有虫是為甲姐瘡或指頭先腫焮熱掣痛然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫是為代指或人稟性畏漆見漆則中毒面痒而腫遶眼微赤痒處搔之隨起痞瘤重者遍身如豆如杏膿焮作痛是為漆瘡或盛夏腠理易開風熱毒氣搏於皮膚輕



迪志文化出版有限公司出版

者狀如撒粟重者熱汗浸漬匝匝成瘡曰癩瘡或心神鬱燥遍身發瘡多出膿血赤爛如火曰熱瘡或身觸風寒冷氣以致血溢不行其瘡頑滯不知痛痒經久難瘥曰冷瘡或身發瘡腫非癰非疽非癬非疥狀如惡瘡或瘥或劇曰無名瘡或頭生白團班剥如癬上有白皮久則成痴遂至滿頭瘡中有孔有膿細虫入裏不痛微痒少長不瘥曰禿瘡或風熱毒氣流注兩脚生瘡腫爛疼痛步履艱難惟生於膝骨者為重曰膝瘡以其骨上肉

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十四

少皮薄難愈至有多年無已瘡口開闊皮爛骨現臭穢可畏者先當取虫然後傳藥或淫夫龜上生瘡初發如粟拂之則痛由是出清膿作白孔侵蝕臭爛日漸大痛曰妬精瘡以婦人先有宿精在內或月水未斷與之交接滌穢不前傳氣而作婦人亦有生於玉門者曰陰蝕瘡或滿頰滿項發如豆梅痒而多汁延蔓兩耳內外濕爛如浸淫瘡之狀曰走皮癰瘡田野呼為悲羊瘡已上數種名目不同治各有方條列於後



迪志文化出版有限公司出版



諸瘡證治

桑螵蛸散治諸惡瘡

桑螵蛸

地龍

貝母

厚黃栢

各半

號丹

煨

乳香

各一分

粳米粉

二錢

雄黃

輕粉

各一錢

麝香

半錢

右細末以不食井水和沙糖調傳

又方

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四

蜘蛛晒為末麻油輕粉調傳

乳香蠟油膏治蝸瘡久不瘥

杏仁

水浸去皮晒

乳香

各三錢

硫黃

輕粉

各一錢半

蠟

半兩

麻油

合一

右研極細先熬油沸入蠟溶盡次入諸藥煎攪成膏

冷地出火毒磁器收用

又方

燕窠取孢子處土為末摻先以白芷大腹皮煎湯洗

拭後摻

胭脂散治反花瘡

胭脂

貝母

胡粉

各一分

硼砂

沒藥

各半

右末研細先以溫漿水洗拭後傳藥

苦練散治浸淫瘡

苦練根

日乾燒存性

右為末猪脂調傳濕則摻先用苦參大腹皮煎湯洗

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四

胡粉散治月蝕瘡

胡粉

炒微黃

白礬

煨

號丹

煨

黃連

淨

輕粉

各二錢

胭脂

一錢

麝

少許

右末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥如瘡乾麻油調

傳

綠礬散治甲瘡

綠礬

半兩燒熟

蘆會

一錢半

麝

一字



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

|                        |              |                           |                |    |             |     |                        |             |                     |                  |        |                                                |                  |        |           |
|------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----|-------------|-----|------------------------|-------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|
| 右研如粉以絹袋盛藥納所患指於袋中線札定瘡為度 | 烏梅醋法治代指手指甲頭腫 | 烏梅 <small>搥去殼肉只取仁</small> | 右研細米醋調得所入指漬之自愈 | 又方 | 中樣蚯蚓和猪脂搗如泥傳 | 漆瘡方 | 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十四 | 生蟹取黃隨瘡大小徧傳之 | 又方臘茶用麻油調塗 又方雞子中黃打開塗 | 又方磨鐵槽中取泥塗磨刀石下泥亦得 | 滑石粉治癩瘡 | 綠豆粉 <small>二兩焙透</small> 軟滑石 <small>一兩研</small> | 右末拌和以綿撲子蘸撲仍以石粉佐之 | 紫草膏治熱瘡 | 紫草茸 黃連 黃栢 |
|------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----|-------------|-----|------------------------|-------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|

|                                                  |                      |         |          |                                                                  |                |                           |                            |                  |        |            |                                                                 |              |         |              |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 漏蘆 <small>各半兩</small> 赤小豆 緣豆粉 <small>各一合</small> | 右搗細入麻油為膏日三傳常服黃連阿膠圓清心 | 又方治熱瘡淫濕 | 南星 半夏 黃栢 | 黃連 <small>各一分</small> 五倍子 <small>煨</small> 號丹 <small>各半分</small> | 右細末摻瘡加煨白礬更瘡加雄黃 | 又方熱瘡止痛收汁先用大腹皮苦參白芷煎湯泡荆芥洗次用 | 地榆 苦參 黃連 <small>等分</small> | 右為細末入些真蚌粉乾摻更去皮綠豆 | 檳榔散治冷瘡 | 雞心檳榔 木香 硫黃 | 薑黃 <small>各半兩</small> 吳茱萸 <small>二錢</small> 麝 <small>一字</small> | 右搗末麻油調傳有膿則乾摻 | 赤豆散治無名瘡 | 赤小豆 吳茱萸 赤色白膠 |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|



|                                                                     |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 厚黃栢                                                                 | 黃連                     | 貝母                   |
| 硫黃                                                                  | 糯米 <small>焙各一分</small> | 號丹 <small>煨半</small> |
| 右末麻油輕粉調抹槐枝煎湯先洗後抹                                                    |                        |                      |
| 烏羊膏治頭白禿瘡及惡瘡賺瘡                                                       |                        |                      |
| 獼猪糞                                                                 | <small>臘月收燒灰半兩</small> | 檳榔 <small>二錢</small> |
| 雄黃                                                                  | <small>錢一</small>      |                      |
| 右末先以麻油調和鴨子清約頭大小作厚餅溫覆頭上引虫不可熱覆不得動頭待十分癢忍不得令人急手揭起次用苦練根煎湯淋洗拭淨濕則摻乾則麻油輕粉調抹 |                        |                      |
| 治頭爛瘡燕窠土為末摻                                                          |                        |                      |
| 竹葉膏治兩脚骨賺瘡先用                                                         |                        |                      |
| 小網蝦                                                                 | <small>三十尾去頭殼尾</small> |                      |
| 右同糯米飯一合研細臨卧以帛扎患處上下次以青紗罩瘡却將蝦飯傳青紗上別用青紗罩蝦飯之上繫定至五更初解紗連蝦飯揭起掛空閑處皆是        |                        |                      |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                                                             |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 小赤虫即以漢椒葱白煎湯候溫淋洗次用舊茶籠內白竹葉隨瘡大小剪貼軟帛繫之一日兩換直待汁水出盡方以好膏藥貼逐日煎苦練根湯淋洗仍換膏藥直待生肉將滿則不用膏藥其瘡口只如筋尾許乃可以血竭或降真香節夾白歛收平瘡口切忌動風發氣等物 |                     |                        |
| 又賺瘡方先用荊芥葱頭入白鹽少許煎湯洗拭次用                                                                                       |                     |                        |
| 雄黃                                                                                                          | 雌黃                  | 硫黃                     |
| 白礬                                                                                                          | <small>煨各二錢</small> | 鷹爪黃連 <small>去鬚</small> |
| 輕粉                                                                                                          | <small>半錢</small>   | 號丹 <small>煨二錢</small>  |
| 右並細末外用麻油一酒盞煎巴豆肉二錢濾清筆蘸抹藥末摻其上妙甚                                                                               |                     |                        |
| 又方先用桑葉白芷煎湯洗拭次用                                                                                              |                     |                        |
| 木香                                                                                                          | 檳榔                  | 五倍子                    |
| 白芷                                                                                                          | 貝母                  | <small>等分末摻</small>    |
| 又方                                                                                                          |                     |                        |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四



迪志文化出版有限公司出版

|                                     |                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                              |              |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>又方</p> <p>右末麻油調傳先鹽湯洗拭後用藥兩日一換</p> | <p>輕粉<small>一字</small></p> | <p>獐猪糞<small>燒帶性半兩</small></p> <p>雞心檳榔<small>三錢</small></p> <p>真龍骨<small>二錢</small></p> | <p>又方</p> <p>中鯽魚<small>二尾洗淨</small></p> <p>滿尺皂角<small>一條擘開兩片夾鯽魚用麻扎煨乾燒存性</small></p> <p>穿山甲<small>炙焦入皂角內二錢</small></p> <p>右細末先以井花水洗盡膿汁用白竹葉一葉針插多孔縛於瘡上候水出盡然以麻油輕粉調藥傳</p> <p>又方先用酸漿水溫煖淋洗次用</p> | <p>生覆盆子葉<small>瓦上煨乾</small></p> <p>右碾極細乾摻紗扎次日以新水濕去痂又用溫漿水洗拭摻藥</p> <p>麝香散治妬精瘡</p> | <p>青黛乾</p> <p>欵冬花<small>等分</small></p> <p>麝<small>少許</small></p> <p>右末先以地骨皮桑白皮煎湯溫洗軟帛拭乾次以</p> | <p>津唾調藥傳</p> |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>又方久年冊皮青紙以津唾粘濕貼上明日又重貼勿動自愈舊青紙蓋取青黛涼而煞虫紙無性耳</p> <p>治陰汗濕癢方</p> <p>綠色爐甘石<small>一分</small></p> <p>真蚌粉<small>半分</small></p> <p>右細末撲傳</p> <p>豆坯散治陰蝕瘡</p> <p>綠豆粉</p> <p>蝦蟇灰<small>各一分</small></p> <p>臙脂<small>半分</small></p> <p>右細末乾摻</p> | <p>神降散治走皮癰桑寄生一小把木槁桑根取皮一握白芷黃連煎湯溫和以帛蘸洗候露出盡拭乾傳藥</p> <p>滿尺皂角<small>去弦核燒存性</small></p> <p>麻竹大籜<small>燒存性</small></p> <p>厚黃栢</p> <p>鷹爪黃連</p> <p>瓜樟葉<small>乾</small></p> <p>白芷</p> <p>右逐件為末等分麻油調抹自然生神效謹勿喫醋</p> <p>又癰瘡發歇不止</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                     |       |                 |      |
|-------------------------------------|-------|-----------------|------|
| 凌霄藤并葉煎湯溫洗凌霄傍松栢槲生數次洗                 |       | 效               |      |
| 蠟礬圓                                 | 方見癰疽門 | 諸瘡皆可服內消其毒凡洗瘡須用藥 |      |
| 草煎湯                                 |       |                 |      |
| 疎風解毒散治諸惡瘡頑癢熱及婦人血風遍身紅斑圓點斑中漸發疹癩開爛成瘡癢痛 |       |                 |      |
| 白芷                                  | 細辛    | 蒺藜              | 炒去刺  |
| 麻黃                                  | 雞心檳榔  | 當歸鬚             |      |
| 節去                                  |       |                 |      |
| 生乾地黃                                |       |                 |      |
| 川芎                                  | 赤芍藥   |                 |      |
| 川獨活                                 | 牽牛    | 蒼朮              | 炒    |
| 取仁微炒                                |       |                 |      |
| 桑白皮                                 | 枳殼    | 甘草              | 微炙等分 |
| 製                                   |       |                 |      |
| 右剉散每服三錢入黑豆七十粒紫蘇五葉薑五片                |       |                 |      |
| 同煎服如大便秘加些生大黃次用貝母膏傳瘡                 |       |                 |      |
| 貝母膏                                 |       |                 |      |
| 貝母                                  | 半夏    | 南星              |      |
| 半三錢生                                |       |                 |      |
| 五倍子                                 | 白芷    | 厚黃栢             |      |

|                                                                                     |       |     |      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|------|-----|
| 苦參                                                                                  | 錢 各二半 | 號丹  | 錢 煨一 | 雄黃   | 錢 一 |
| 右細末初用蜜水調傅兩三次後只乾摻先以蜂房                                                                |       |     |      |      |     |
| 白芷苦參大腹皮荊芥煎湯熏洗拭乾即用藥或間                                                                |       |     |      |      |     |
| 有留滯不瘥以好膏藥貼                                                                          |       |     |      |      |     |
| 惡瘡方                                                                                 |       |     |      |      |     |
| 赤色白膠                                                                                | 錢 一   | 明白礬 | 錢 三  | 黃色黃丹 | 錢 半 |
| 右細末麻油調傅先以酸漿水煖過洗瘡拭乾用                                                                 |       |     |      |      |     |
| 又方貝母為末入些雄黃摻                                                                         |       |     |      |      |     |
| 又方治久不瘥                                                                              |       |     |      |      |     |
| 欽定四庫全書                                                                              |       |     |      |      |     |
|  |       |     |      |      |     |
| 仁齋直指                                                                                |       |     |      |      |     |
| 卷二十四                                                                                |       |     |      |      |     |
| 又方治久不瘥                                                                              |       |     |      |      |     |
| 透明硫黃                                                                                |       | 黃連  | 等分   |      |     |
| 右細末以雞子清一箇打碎鋪新瓦上焙為末夾上                                                                |       |     |      |      |     |
| 項藥麻油輕粉調傅先用白芷葱頭煎洗                                                                    |       |     |      |      |     |
| 諸瘡頭瘡方                                                                               |       |     |      |      |     |
| 滿尺皂角                                                                                | 去弦核一錠 | 黃連  | 淨半兩  |      |     |
| 赤色白膠                                                                                |       | 五倍子 | 各三錢  | 蛇床   | 一錢  |
| 黃丹                                                                                  | 煨二錢   | 輕粉  | 半錢   |      |     |





|                                   |      |                                                       |       |                         |                                     |         |                                   |                   |                               |                                    |     |                                |                             |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|
| 右細末先用柳枝煎湯洗拭後摻或用黃連半兩蛇床一分晒乾為末麻油輕粉調傳 | 又頭瘡方 | 黃連<br><small>為末用麻油輕粉調得所攤於梔中將艾一撮燒煙梔覆其上熏之續再加艾熏用</small> | 治頭禿瘡方 | 五靈脂<br><br>白礬<br><br>白芷 | 青黛<br><br>好草烏<br><small>各一分</small> | 右為末麻油調傳 | 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷二十四</small> | 頭痺頭腦方頭枕後生正者為腦側者為痺 | 輕浮白浮石<br><small>燒存性各半</small> | 右麻油輕粉調雞羽刷上勿用手按即漲或用黃牛糞於瓦上焙乾加之尤好亦治頭瘡 | 治瘡方 | 大乾芭蕉葉<br><small>熨斗內燒存性</small> | 右為末麻油輕粉打和傳瘡留頭以軟紗貼換易三次或散或破無痕 |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------------|

|    |                                    |          |          |                         |     |                           |                                   |      |                                            |                         |                          |             |    |                                              |                                                                 |
|----|------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 又方 | 穿山甲<br><br>蚌粉<br><small>同炒</small> | 右末麻油輕粉調傳 | 胎癰頭熱紅餅瘡方 | 生艾<br><br>白芷<br><br>大腹皮 | 連根葱 | 右煎湯洗拭以生藍青葉入些生艾搗細蜜水為膏傳亦治惡瘡 | 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷二十四</small> | 又惡瘡方 | 硫黃<br><br>黃連<br><small>淨末各一分</small><br>黃丹 | 赤白膠<br><br>蛇床<br><br>樟腦 | 髮灰<br><small>各半分</small> | 右末濕則摻乾則麻油調傳 | 又方 | 白礬<br><small>煨</small><br><br>五倍子<br><br>厚黃栢 | 黃連<br><small>淨</small><br><br>黃丹<br><small>煨</small><br><br>海螵蛸 |
|----|------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|



|                                 |                       |                        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 貝母 <small>等分</small>            |                       | 右為末入麝少許搽痛則加地榆癢則加苦參     |
| 又方用貝母膏                          | <small>方見諸惡瘡類</small> | 加黃連蜂房爛石膏尤好或用           |
| 麻油膩粉調抹本方內去雄黃                    |                       |                        |
| 白禿頭方雄猪膽汁半入法醋須以雞羽掃傳              |                       |                        |
| 附諸方                             |                       |                        |
| 當歸飲子治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥           |                       |                        |
| 或腫痒膿水浸淫或發赤疹痞瘤                   |                       |                        |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十四</small> |                       |                        |
| 當歸                              | 川芎                    | 芍藥                     |
| 地黃                              | 防風                    | 白蒺藜 <small>炒去刺</small> |
| 荊芥穗                             | 何首烏                   | 黃耆                     |
| 甘草                              | <small>各八分半</small>   |                        |
| 右咬咀分二貼每貼水二盞薑三片煎八分溫服             |                       |                        |
| 連翹飲治諸惡瘡痛癢不定心煩口乾及婦人血風紅           |                       |                        |
| 斑圓點開爛成瘡流黃汁                      |                       |                        |
| 川芎                              | 當歸                    | 芍藥                     |

|                                 |                        |                       |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 地黃                              | 防風                     | 荊芥                    |
| 連翹                              | 牛旁子 <small>炒破研</small> | 山梔                    |
| 黃芩                              | 瞿麥                     | 木通                    |
| 爪萆根                             | 麥門冬 <small>去心</small>  | 甘草 <small>各等分</small> |
| 右咬咀每貼七錢水二盞燈心二十莖同煎八分服            |                        |                       |
| 一方治一切疥瘡                         |                        |                       |
| 雄黃                              | 樟腦                     | 大楓子                   |
| <small>錢五</small>               | <small>分五</small>      | <small>肉取</small>     |
| 斑猫                              | 狗脊                     | 蛇床子                   |
| <small>去足翅炒各十雙</small>          |                        |                       |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十四</small> |                        |                       |
| 寒水石                             | 硫黃                     |                       |
|                                 | <small>錢各五</small>     |                       |
| 右為極細末疥瘡用柏油調搽癬瘡用栢油調搽             |                        |                       |
| 一方治疥瘡神效                         |                        |                       |
| 大楓子肉                            | 獐腦                     | 水銀                    |
| <small>各一兩</small>              | <small>各一</small>      |                       |
| 皂礬                              | 油核桃肉                   | 柏燭油                   |
| <small>錢各一</small>              |                        |                       |
| 先將大風子搗爛次加獐腦水銀皂礬核桃碾和為            |                        |                       |
| 末再將柏油熬化入藥和勻抓破瘡搽之効               |                        |                       |
| 一方治凍爛脚成瘡                        |                        |                       |



黑附子生去皮臍

右為末麵水調貼

白欬散治凍耳成瘡痒痛

黃栢白欬各五錢

右為末先湯洗次用香油調傳

治手足皸裂方

瀝青二兩黃蠟一兩共熬攪勻瓦礫盛貯先以熱湯

洗令皮軟拭乾將藥於慢火上畧炙擦傳

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十四

一方治手足皸裂春夏不愈者

生薑汁紅糟  
鹽

猪膏臘月者佳

右研爛炒熟擦入皸內一時雖痛少須使皮軟皸合

再擦即安

一方治脚跟皸

用頭髮一大握桐油一椀於瓦器內熬候油沸頭髮  
化爛出火攤冷以瓦器收貯勿令灰入每用百沸湯

泡洗皸裂令軟拭乾傳其上即安一方加米粉

附楊梅瘡方

防風通聖散治楊梅瘡初起疼痛增寒壯熱方見中風門

本方每服加山牛四兩如汗多去麻黃大便澹去硝

黃服之

又方

冷飯團一名土茯苓五加皮白蘚皮

防風白芍藥  
木瓜各一兩半

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十四

皂角白丑各三十粒  
生地黄酒洗

地骨皮牛膝  
黃連

槐花川芎  
尋風藤

葳靈仙白茯苓  
杜仲炒斷絲

白芷當歸酒浸洗各一兩  
甘草炙半兩

荊芥穗一兩半

右咬咀作二十服每服用水一鍾酒一鍾煎至一鍾  
在上食後服在下食前服忌牛肉



|                                       |  |     |     |     |
|---------------------------------------|--|-----|-----|-----|
| 又方                                    |  | 當歸  | 連翹  | 羌活  |
| 荊芥穗                                   |  | 薄荷葉 | 枳殼  |     |
| 黃芩                                    |  | 茯苓  | 車前子 |     |
| 防風                                    |  | 木通  | 芍藥  |     |
| 川芎                                    |  | 山梔  | 桔梗  |     |
| 天花粉                                   |  | 僵蠶  | 白芷  |     |
| 甘草                                    |  | 金銀花 | 獨活  | 各一兩 |
| 柴胡                                    |  | 前胡  | 各半兩 |     |
| 右咬咀作二十服每服用水二鍾煎至八分溫服上多食後服下多食前服服此仍用重藥並治 |  |     |     |     |
| 一方治楊梅瘡神効                              |  |     |     |     |
| 人參                                    |  | 白朮  | 當歸  |     |
| 生地黃                                   |  | 防風  | 木通  |     |
| 苦參                                    |  | 川芎  | 連翹  |     |
| 薏苡仁                                   |  | 木瓜  | 皂角刺 |     |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四

|                                                              |      |     |    |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| 天花粉                                                          | 分各八  | 甘草  | 羌活 |
| 青風藤                                                          | 分各五  | 白蘚皮 | 山牛 |
| 金銀花                                                          | 錢一分八 | 錢一  | 兩三 |
| 右咬咀每服水三碗煎至二碗一次用渣并二次忌                                         |      |     |    |
| 燒酒茶牛肉                                                        |      |     |    |
| 薰楊梅瘡方                                                        |      |     |    |
| 雄黃                                                           | 分各三  | 沉香  | 乳香 |
| 沒藥                                                           | 分各五  | 硃砂  | 血竭 |
| 黑鉛                                                           | 錢各一  | 水銀  | 分三 |
| 右為末均作紙撚七條用香油點燈放床上令病人兩腿抱住上用單被通身蓋之口噙冷水頻頻換之則不損口頭一日用三條後每日用一條薰之有效 |      |     |    |
| 一方治楊梅癰漏腫塊                                                    |      |     |    |
| 杜枸杞子                                                         | 防風   | 牛膝  |    |
| 牙皂                                                           | 枳殼   | 當歸  |    |
| 連翹                                                           | 苦參   | 蔓栗壳 |    |

|                                                                                      |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 僵蠶                                                                                   | 赤芍藥 | 杜仲 |
| 荊芥                                                                                   | 白蘚皮 | 川芎 |
| 皂角刺                                                                                  | 木瓜  | 防己 |
| 薏苡仁                                                                                  | 天麻  | 木通 |
| 金銀花                                                                                  | 茯苓  | 黃柏 |
| <small>分各等</small>                                                                   |     |    |
| 牛旁子                                                                                  |     |    |
| 右咬咀每服一兩加冷飯團四兩用水五椀煎三椀病在上食後服病在下食前服忌食雞魚牛肉煎炒                                             |     |    |
| 虛者人參服之神効外用秘傳止血定痛生肌散摻之去腐生新收口                                                          |     |    |
| <small>方見折傷門</small>                                                                 |     |    |
| 疥癬                                                                                   |     |    |
| 疥癬方論                                                                                 |     |    |
| 疥與癬風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之沉深者為癬疥則多因風毒挾熱得之癬則多因風毒挾濕得之疥發於手足或至於遍身癬則肌肉癰疹或圓或斜或如苔莓走散內藏汁而外有筐二者莫 |     |    |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十四

|                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 不均有虫也亦莫不易為之染觸也焮赤癢痛作瘡有膿曰大疥隱起帶根搔不知痛曰馬疥瘡癰含漿摘破出水曰水疥癢而搔之皮起乾痂曰乾疥薄皮小瘡常淫汁曰濕疥此疥之名目然也乾癬則搔出白屑索然彫枯濕癬則淫如虫行搔之多汁風癬則爪擦痺頑不知痛癢牛癬則狀如牛領皮厚而堅其若時作微癢白點相連是之謂狗癬輪廓全無縱橫不定是之謂刀癬此癬之種類然也疥癬治法驅風殺虫固也然殺虫於其外亦須以硫黃輕粉蠟礬圓輩服餌而內濟之庶絕其根矣若夫腫而濕者有熱槁而乾者無熱用藥加減又當權衡 |                     |                   |
| 疥癬證治                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |
| 諸疥方                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |
| 透明生硫黃                                                                                                                                                                                                                  | 半兩                  | 明白礬               |
|                                                                                                                                                                                                                        | <small>煨半</small>   | <small>錢二</small> |
| 白葉                                                                                                                                                                                                                     | 一葉                  | 去中心               |
|                                                                                                                                                                                                                        | <small>骨燒存性</small> |                   |
| 右末麻油輕粉調抹                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |
| 又方 疥癬方                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版



|                                 |            |       |
|---------------------------------|------------|-------|
| 硫黃                              | 明礬         | 黃連    |
|                                 | 半兩 煨各      | 錢七 淨半 |
| 雌黃                              | 胡粉         | 蛇床    |
|                                 |            | 錢各半 二 |
| 右細末猪膏稀調抹                        |            |       |
| 又方                              |            |       |
| 生明硫黃                            | 黃丹         | 樟腦    |
| 兩半                              |            | 錢各一   |
| 輕粉                              |            |       |
| 錢半                              |            |       |
| 右末乾擦熱疥赤腫加荊芥                     |            |       |
| 又方                              |            |       |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十四</small> |            |       |
| 生明硫黃                            | 爛石膏        | 黃丹    |
| 兩半                              | 錢二         | 錢一    |
| 右末麻油調抹                          |            |       |
| 濕疥方                             |            |       |
| 生明硫黃                            | 胡粉         | 黃丹    |
| 兩半                              |            | 錢各二   |
| 右末乾擦                            |            |       |
| 疥癬惡瘡方                           |            |       |
| 滿尺不蛀皂角                          | 三條炙去弦核為末 醋 |       |
| 二大盞                             | 煮如鉛膠濾清汁    |       |
| 右入黃連末半兩輕粉二錢調抹太學全蝎散治瘡            |            |       |

|                                 |                           |      |
|---------------------------------|---------------------------|------|
| 疥                               | 方見 癢門                     |      |
| 諸癬妙方                            |                           |      |
| 斑猫                              | 二十一 枚生用                   | 明硫黃  |
|                                 |                           | 藥蘆   |
| 輕粉                              | 一錢 半                      | 錢各三  |
| 右細末麻油調擦                         |                           |      |
| 又方                              |                           |      |
| 鯽魚                              | 一頭                        | 生髮   |
|                                 |                           | 子一大雞 |
| 雄黃                              | 各半 兩                      | 生豬脂  |
|                                 |                           | 兩四   |
| 明硫黃                             |                           |      |
| <small>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十四</small> |                           |      |
| 右件先煮猪脂溶沸即入鯽魚煎令煙盡次入髮銷            |                           |      |
| 盡濾清即入硫黃雄黃末拌和磁器收用                |                           |      |
| 又方                              |                           |      |
| 草烏頭                             | 不去皮尖截小塊一半用猪脂 煮令浮黃一半用鹽炒令焦黃 |      |
| 右末酒麵糊圓桐子大每十五圓茶酒任下亦治諸            |                           |      |
| 風頑痺                             |                           |      |
| 王醫師癬方先用川椒連根葱紫蘇莖煎湯溫洗次用           |                           |      |
| 吳茱萸                             | 生半夏                       | 草烏   |



|                                         |     |      |
|-----------------------------------------|-----|------|
| 白芷                                      | 赤小豆 | 等分   |
| 右細末米醋夾生蜜稀調傳                             |     |      |
| 又惡癬方                                    |     |      |
| 紫背草入生明礬研細傳兩三次斷根                         |     |      |
| 又久癬方                                    |     |      |
| 生硫黃                                     | 消石  | 明礬   |
|                                         |     | 煨各半兩 |
| 雄黃                                      | 雌黃  | 各二錢半 |
|                                         | 輕粉  | 一錢   |
| 右細末好麻油調傳濕則搽                             |     |      |
| <small>欽定四庫全書<br/>仁齋直指<br/>卷二十四</small> |     |      |
| 又方猪脂蘸真膩粉擦○小兒癬猪脊骨髓條研和膩粉傳                 |     |      |
| 乾癬方                                     |     |      |
| 狼毒                                      | 草烏頭 | 各二錢半 |
|                                         | 斑猫  | 七枚去足 |
| 右生為末津唾調抹                                |     |      |
| 濕癬方                                     |     |      |
| 明礬                                      | 煨   | 黃連   |
|                                         |     | 各半兩  |
|                                         |     | 胡粉   |
| 黃丹                                      | 水銀  | 各二錢  |

|                                         |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|
| 右末用猪脂油二兩夾研令水銀星盡散磁盒收用                    |      |      |
| 又方                                      |      |      |
| 斑猫                                      | 去頭足糯 | 米炒去米 |
| 右為末以淮棗盪軟取肉研圓津唾調抹                        |      |      |
| 牛皮癬方舊皮鞋底燒存性麻油輕粉調抹                       |      |      |
| 又癬方石榴根取皮蘸明礬末擦切莫用醋則虫沉也                   |      |      |
| 輕粉治癬方五更喫炙牛肉一片細嚼下少刻以真輕粉醇酒調下              |      |      |
| <small>欽定四庫全書<br/>仁齋直指<br/>卷二十四</small> |      |      |
| 遍身牛皮癬方                                  |      |      |
| 川烏                                      | 草烏   | 去皮尖  |
|                                         | 何首烏  |      |
| 白芷                                      | 蘇木   | 等分   |
| 右截小片臘月猪脂油煮焦候冷入鹽少許磁器收                    |      |      |
| 時常挑一匙酒調空心服                              |      |      |
| 又方雌黃末入輕粉猪膏調抹                            |      |      |
| 附諸方                                     |      |      |
| 連粉散風癬濕瘡並皆治之                             |      |      |



|                        |            |           |
|------------------------|------------|-----------|
| 黃連                     | 膩粉         | 黃栢        |
| 黃丹                     | 枯白礬<br>錢各一 | 輕粉        |
| 龍骨                     | 蘆甘石<br>分各五 |           |
| 右為細末每用少許濕則乾搽乾則香油調搽     |            |           |
| 碧玉散治癬                  |            |           |
| 銅綠                     | 礪砂         | 白礬<br>分各等 |
| 右為細末香油調搽               |            |           |
| 又方                     |            |           |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十四 |            |           |
| 防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺服又用紫蘇    |            |           |
| 樟腦蒼耳浮萍煎湯洗              |            |           |
| 又方                     |            |           |
| 浮萍                     | 蒼耳         | 蒼朮<br>兩各一 |
| 苦參<br>半一兩              | 黃芩<br>兩半   | 香附<br>半二錢 |
| 右用酒糊為丸                 |            |           |
| 一方治癬神効                 |            |           |
| 巴豆<br>粒十               | 黑棗<br>箇五   |           |

|                        |    |            |
|------------------------|----|------------|
| 共搗為爛搽之立効               |    |            |
| 一方治諸癬神効                |    |            |
| 川槿皮                    | 剪草 | 木鱉子<br>分各等 |
| 右為細末用醋調塗之即愈            |    |            |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十四 |    |            |
| 仁齋直指卷二十四               |    |            |



欽定四庫全書

子部  
仁齋直指卷二十五

詳校官太醫院吏目周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

覆校官中書臣朱 鈐

校對官主簿臣汪日贊

謄錄監生臣張鴻仁

欽定四庫全書

仁齋直指卷二十五

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

諸蟲 附 折傷

諸蟲方論

經云人身中有八萬尸虫若無即人身不成不立尸虫與人俱生狀如馬尾或如薄筋出則在脾入則五臟之俞居之然人亦不必盡有有亦不必盡多也古人論臟

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十五

腑九虫多寡有無固未可必亦當備識其名目九虫者何一曰伏虫二曰白虫三曰肉虫四曰肺虫五曰胃虫六曰弱虫七曰赤虫八曰蟯虫九曰蛭虫蛭虫俗謂之食虫固不待辨而知矣其他皆由臟腑不實脾胃俱虛雜食生冷甘肥油膩鹹藏等物節宣不時腐敗停滯所以發動虫之為候嘔惡吐涎口出清沫痛有去來乍作乍止寸白虫色白形扁換人精氣力乏腰痛蟯虫細如菜虫能為痔瘻瘡癩疥癰癰疽等患寸白蟯蛭是三者



皆九虫數中之一物也外此又有兒童疳蠱昏睡煩燥  
鼻爛汁臭齒齦生瘡下利黑血支集疳論附之其傷寒  
濕蠱證候虫食下部為狐下唇有瘡虫食其臟為惑上  
唇有瘡活人總括言之詳矣

諸虫證治

蕪荑散取諸虫

雞心檳榔 錢三

蕪荑 錢二

木香 錢一

右末為一服當晚先煎酸石榴根湯至五更喫炙肉

欽定四庫全書 仁齋直指  
卷二十五

一片嚼細引虫上至喉以石榴根湯煖溫調藥服虫

自軟而下

木香檳榔圓殺下諸虫

雞心檳榔 兩一

木香

鶴虱

貫衆 錢二

乾漆 燒煙  
盡

史君子肉 兩各半

雷圓

巴豆肉 錢各二  
半

右細末飛白麪糊圓麻子大每服二十粒五更粥飲

下或昌蒲石榴根煎湯下

錫灰圓取寸白諸虫

錫灰 研細末  
一兩

雞心檳榔

貫衆 各半  
兩

木香 二錢  
半

輕粉

黃丹 為衣各  
二錢

右細末酒醋煮麪糊圓荔枝乾大每一圓米泔浸軟  
日銜先喫飯了至黃昏不飢飽時喫肉舖一片引虫  
俟少刻溫酒嚼下天明虫出又專喫葑菜治寸白虫

蝦蟇圓殺虫

欽定四庫全書 仁齋直指  
卷二十五

大蝦蟇乾 一箇炙  
令焦

木香

雞心檳榔

桃仁 水浸去  
皮晒

苦楝根

酸石榴根皮

貫衆 各三  
錢

蕪荑

鶴虱 各二  
錢

巴豆肉 二錢  
半

右末粳米粉糊研圓麻子大每服十圓五更石昌蒲

煎湯下

雄砂圓殺諸虫

鶴虱

蕪荑

乾漆 炒令  
煙盡





|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| 直僵蠶                   | 炒各錢三  | 貫衆   |
| 酸石榴根皮                 | 日乾各半兩 | 朱砂   |
| 雄黃                    | 雷圓    | 甘遂   |
|                       |       | 錢各半一 |
| 右細末粳米粉糊圓麻子大每十圓五更粥飲下   |       |      |
| 化虫散                   |       |      |
| 雷圓                    | 二箇    | 雞心檳榔 |
|                       |       | 二箇   |
| 大史君子                  | 七箇去殼  | 鶴虱   |
|                       |       | 一錢   |
| 右細末入輕粉少許分作兩服當晚用精猪肉一兩  |       |      |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十五      |       |      |
| 切成片以皂角漿浸一宿至五更微火炙熟又用些  |       |      |
| 麻油拭肉候溫取一服藥末摻於肉上畧烘過空腹  |       |      |
| 食之至已刻虫自下廼飲食           |       |      |
| 貫衆酒取寸白諸虫五更嚼炙肉一片莫吞俟虫尋肉 |       |      |
| 其頭向上却吐出肉嚼史君子三箇并輕粉一字吞下 |       |      |
| 少頃以當晚所煎貫衆酒吞解毒雄黃圓七粒瀉下皆 |       |      |
| 虫也                    |       |      |
| 酒蠟膏殺諸虫                |       |      |

|                      |        |       |     |     |     |
|----------------------|--------|-------|-----|-----|-----|
| 醇酒                   | 一盞     | 蜜     | 一合  | 蠟   | 三錢  |
| 蜀漆                   | 一兩     |       |     |     |     |
| 右銅銚內慢火同熬可圓即圓彈子大每服一圓溫 |        |       |     |     |     |
| 酒化開拂曉服之虫自下           |        |       |     |     |     |
| 附諸方                  |        |       |     |     |     |
| 萬應丸下諸虫               |        |       |     |     |     |
| 檳榔                   | 五錢末    | 大黃    | 八兩末 | 黑牽牛 | 四兩末 |
| 皂角                   | 十定用不蛀者 | 苦楝根皮  | 一斤  |     |     |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十五     |        |       |     |     |     |
| 右件將皂角苦楝根皮二味用水一大碗熬成膏子 |        |       |     |     |     |
| 一處搜和前藥二味研細末為衣先用沉香衣後用 |        |       |     |     |     |
| 雷丸木香衣每服三丸四更時分用沙糖水送下  |        |       |     |     |     |
| 一方取寸白虫               |        |       |     |     |     |
| 紫檳榔                  | 十箇     | 向陽石榴皮 | 七十片 |     |     |
| 右水煎露一宿以下虫為度          |        |       |     |     |     |
| 一方治吐虫有積              |        |       |     |     |     |
| 黑錫灰                  |        | 檳榔    |     |     |     |



右為末米飲調下

木香三稜散

瑞竹

治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛

半生半取末五錢

大腹子

二錢

檳榔

雷丸

錫灰

醋炒

三稜

煨

蓬朮

煨

木香

二錢

大黃

二錢

右為末每服五錢用沙糖水調服先將燒肉一片口

中細嚼吐出然後服藥一方加阿魏一錢蕪荑仁三

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十五

錢

一方消化虫毒在腹作痛

檳榔

酸榴根皮

焙乾各一兩

紅丹

煨

雷丸

貫衆

如雞頭者

君子肉

各二錢

甘草

炙

枳殼

製

大黃

各五錢

右為末清油打薄雞子餅抄藥一錢於上空心捲而

食之小兒糯米糊丸粟米大每服二三十丸以淡猪

肉汁或雞汁吞下空心亦佳

烏梅丸治胃冷蚘虫攻心痛嘔吐四肢冷

秘傳檳榔散治男婦心脾痛虫痛

方並見脾疼門

蠱毒

蠱毒方論

害人利己識者不為昧者競趨之而況傷人性命以圖家道之溫煥此為富不仁之甚者也夫蠱毒有數種皆妖魅變惑之氣其怪使然人有造作而得之者多取虫

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十五

蛇之類以盆盎盛之任其自相噉食其間一物獨存則以之為蠱即能變惑隨酒食以毒害於人他人受殃則蓄事之家日益富盛又有一種飛蠱條爾去來狀如鬼氣得之卒重吁毋怪乎變現惑人之不可曉也凡中蠱毒不論年月遠近但煮一雞卵去殼以小銀釵插入其中併含入口一飯之頃取視釵卵俱黑即為中毒又法以水一椀唾津液入水其唾沉則為蠱浮則非蠱又法口含天豆中蠱者豆脹爛而皮脫非蠱則豆不脫爛其



候面目青黃力乏身痛唇口乾焦煩燥而悶胃脇妨滿  
肚脹皮堅腹中唧唧切痛如虫齧又如虫行唾吐鮮血  
小便淋瀝大便膿血雜下病人所食之物皆變化而為  
虫侵蝕臟腑蝕盡則死矣死則病氣流注復染着於傍  
人夫是之謂蠱症

凡中蠱人用藥已瘥自後飲食永不得喫冷若飲食  
帶冷鬼氣乘之毒虫復生竟不能救

### 蠱毒證治

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十五

治蠱毒挑生毒神呪出大藏經典凡在外飲食先默誦  
七遍則其毒不行呪曰姑蘇琢磨耶琢吾知蠱毒生四  
角父是穹窿穹母是舍耶女眷屬百千萬吾今悉知汝  
摩訶薩摩訶如飲食上有蜘蛛絲便莫喫又法每遇所  
到處念藥王萬福七遍亦可辟之灸蠱毒於足小指尖  
處灸三壯即有物出酒得之隨酒出飯得之隨飯出肉  
菜得之隨肉菜出  
保靈丹治蠱毒諸毒一切藥毒神妙出劉涓子神仙遺



迪志文化出版有限公司出版

論雞峯普濟方一卷凡三處刊

朱砂

一兩淨細研

大山豆根

兩半

雄黃

黃丹

麝香

黃藥子

續隨子

二錢生杵末各

川巴豆

肥者二錢半  
取肉不去油

斑猫二錢半去  
頭翅足

糯米

半炒半  
生用

赤蜈蚣

二條一  
灸一生

右十味各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修合  
不令雞犬婦人見用糯米稀糊圓如圓眼核大陰乾

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十五

磁合收每服一圓好茶清吞下不得嚼破須臾病人  
自覺心頭如拽斷皮條聲將次毒物下或自口出或  
大便出嫩則是血老則成蟹或蜣螂諸雜帶命之物  
藥圓凝血並下以水洗淨收之可救三人如中毒口  
噤即挑開下藥或蛇蝎馬汗諸毒以好醋磨傳患處  
立解服藥已效如知毒害之家不必研究若訴之其  
毒再發不救瘥後更忌酒肉毒食一月惟軟飯可也  
或急用但擇吉日精潔修合



迪志文化出版有限公司出版

聖惠圓治蠱毒心腹堅痛羸瘁骨立

朱砂 研

雄黃 研 七錢 細各半

藜蘆 去頭 蘆

莽草 炙 微

鬼白 去鬚 各半兩

肥巴豆肉 去油 十五箇

麝香 錢一

青色大蝦蟇 存性 一箇 燒

斑猫 去翅足 三錢 糯米炒黃

右細末煉蜜和搗五百杵圓如小豆大每五圓空心

溫酒下少刻更喫粥飲一盞利出虫蛇惡物若不吐

利更服二丸必效

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十五

萬病解毒圓治蠱毒挑生毒藥毒草毒畜獸毒

方見癰疽門

夷堅志治蠱毒方

五倍子 兩一

硫黃 錢末二

甘草 三寸半生 半炙透

丁香

木香 錢各一

輕粉 錢半

麝香 許少

糯米 二粒十

右八味剉細入磁瓶內用水滿十分煎取七分候藥

面帶皺皮為熟生絹濾去滓空腹通口服却令病人

平正仰睡高起頭覺腹中有物衝心者三即不得動

若吐出以桶盛之如魚鰾爛肉之類乃是惡物吐罷

喫茶一盞瀉亦不妨少進白粥為補忌生冷油膩鮓

脯鹹藏五日後服萬病解毒圓二粒旬日又服二粒

自然平復

生漆圓治蠱毒

正料平胃散

右用好生漆和圓桐子大每七十粒空腹溫酒下加

至百粒

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十五

東坡雄黃圓治蠱毒及虫蛇畜獸毒

雄黃

明白礬 生研等分

右端午日研細溶黃蠟為圓桐子大每七圓念藥王

菩薩藥上菩薩七遍熟水送下

黃南衛生治蠱毒單方

破鼓皮

燒存性為末新水調二錢服之 中 蠱者雖昏眊口中言蠱主姓名

又方

蠶退紙

不拘多少以麻油紙撚燒存性



右為末研細新水調一錢頻服諸中毒面青脉絕昏迷如醉口噤吐血服之即蘇

七寶圓治蠱毒

破鼓皮

蠶退紙  
各燒存性

刺蝟皮

五倍子

續隨子

朱砂  
研

雄黃  
研

右等分為細末糯米稀糊圓桐子大每七圓空心熟水下

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十五

又方治蠱毒亦治挑生毒

川升麻細剉一兩作一服水煎常服

又方

明礬生末夾好茶水調解百毒

挑生

挑生方論

人苟愛身不可輕於濯水江南有射工毒虫其色黑形如肉鬐口中橫骨如角弓生溪澗內或因雨潦逐水而

入人家含沙射人之影得之寒熱悶亂頭目俱痛亦如中尸卒不能語又水毒虫一名溪溫得之病狀與射工相若但有爛瘡為射工無瘡為溪溫特少異耳又沙蟲虫細如疥虫視不得見遇陰雨則行出草間著人身則鑽入皮裏刺如針芒是三者為病朝輕暮劇皆能殺人以方術灸法麝犀輩治之治之不早變生飛蠱倏入患軀噉食五臟而死矣挑生之毒其類是乎挑生多於飲食過度凡魚肉果菜茶湯酒醋之中皆可挑毒以中人自嶺以南率多有此其候初覺胃腹作痛次則漸漸攪刺十日生於腹中生則能動矣治法胃痛則為生在上膈腹痛則為生在下膈在上膈者用膽礬半錢投入一盞熱茶之內候礬溶化通口服之少頃以雞翎攪刺喉中取吐在下膈者用川礬金二錢末之米湯調下即瀉出惡物吐瀉以後以人參一分白朮茯苓倍之碎為麤末新汲水和入磁瓶中慢火煨至半日每一盞通口服日兩三劑前蠱毒挑生呪常須誦之抑有聞焉二廣山

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十五





谷間有草曰胡蔓草亦曰斷腸草或以藥人急水吞之  
急死緩水吞之緩死又有取毒蛇殺之以草覆蛇以水  
洒草數日菌生採取為末入酒毒人始亦無患後再飲  
酒毒發立死其俗淫婦多偶合北人情好雖稠不肯歸  
北陰以藥置食中與之還即叩之曰子某年來若從其  
說復以藥解之若過期不來則斃矣戒之哉戒之哉

挑生證治

萬病解毒圓治挑生毒蠱毒藥毒草毒金石毒百虫毒

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十五

蛇畜獸惡毒鬼胎鬼氣癰疽諸病一切毒出入可以此  
藥隨身若覺意思不快四大不和即磨服之

方見癰疽門

治挑生方

好茶生明礬各一錢沸湯調服即吐毒

中諸毒證治

立勝散治虫蛇蜂蝎蛇蜘蛛沙虫等傷毒

大紅川椒

去核十粒

豆豉

十粒

右同入口嚼爛唾在手心次將南星末調和得所傳

傷處毒水自出續又再傳神效

又方

貝母

為末

右每服半兩令病人盡其酒量劇飲良久酒化為水  
從傷處出俟出盡又以貝母末塞瘡口妙不可言

蠮螋方蠮螋妖虫也隱於牆壁間尿射人之影令人遍  
體爛瘡如湯火所傷治法以

雞羽

燒存性

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十五

右麻油調傳雞食百虫故能治之或用燕糞水調傳  
或南向燕窠自東取土末之新水調傳

天蛇毒方

秦皮濃煎服蚌粉滑石貝母末傳

辟妖魅瘟療

朱砂雄黃等分為末法醋調入口鼻

治挑生毒蠱毒野葛毒方

川升麻多煎頻服



解諸藥毒殺腹內毒虫方

藍青葉多研水調服

五絕欲死方

半夏末水圓風乾入鼻氣回即活

頭虱方藥蘆末摻髮○又方麻油調輕粉塗髮

身虱方水銀和鶴虱末帛揉之為索繫衣自落

獨勝散解藥毒蠱毒虫蛇諸毒

大甘草節以真麻油浸年歲愈多愈妙

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十五

右取甘草嚼或水煎服神効

附跌撲損傷

跌撲損傷方論

袖珍方云折傷者謂其有所傷於身體者也或為刀斧所刃或墜墮險地打撲身體皆能使血出不止又恐瘀血停積於臟腑結而不散去之不早恐有入腹攻心之患治療之法須外用敷貼之藥散其血止其痛內則用花藥石散之類化利瘀血然後欸欸調理生肌或因折

傷而停鬱其氣又當順之子和云諸落馬墜井打撲傷損閃肭損折杖瘡腫發焮痛不止者可峻下二三十行痛止腫消宜以通經散導水丸等藥或加湯劑瀉之後服和血消腫散毒之藥

花藥石散

和劑方

治一切金刃所傷打撲傷損身體血出

者急於傷處摻藥其血自化為黃水如有內損血入

臟腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立效若

牛觝腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸為線

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十五

縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無桑白皮用生麻

縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液

潤之然後摻藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死

腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃

上色明淨者四兩搗為細末

花藥石

一兩搗為粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一箇候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚上書八卦五行字用炭一秤籠疊固匝自己午時從



下着火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿  
 罐冷取出細研以絹羅子羅至細磁合內盛依前法  
 服

金匱治馬墜及一切筋骨損方

大黃

一兩切浸成湯下

緋帛

如手大燒灰

亂髮

如雞子大燒灰

炊單布

一尺燒灰

敗蒲

一把二寸

桃仁

四十九箇去皮尖

甘草

如中指節炙剉

右七味以童子小便量多少煎湯成內酒一大盞次

欽定四庫全書



仁齋直指  
 卷二十五

下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣

被處斯須通利數行痛楚立瘥

復元活血湯

發明方

治從高墮下惡血留於脇下疼痛實

不可忍者

柴胡

半兩

當歸

六錢

甘草

川山甲

炮各二錢

大黃

酒浸一兩

桃仁

去皮尖五十箇

紅花

瓜蒌根

各二錢

右件桃仁研爛餘藥剉如麻豆大每服一兩水二盞

半酒半盞煎至七分去滓食前大溫服以利為度得  
 利後痛或不盡服乳香神應散靈樞云墜墮惡血留  
 於脇下則傷肝肝胆之經行於脇下屬厥陰少陽宜  
 以柴胡為引用為君以當歸活血脉又急者痛也以  
 甘草緩其急亦能生新血陽生陰長故也為臣川山  
 甲瓜蒌根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以  
 蕩滌敗血為之使

地龍散治腰脊痛或打撲損傷從高墮下惡血留在太

欽定四庫全書



仁齋直指  
 卷二十五

陽經中令人腰脊或脛膕臂腰中痛不可忍

中桂

地龍

各四分

羌活

二錢

黃栢

甘草

各一錢

蘇木

六分

麻黃

五分

桃仁

六箇

歸梢

一分

右咬咀每服半兩水二盞煎至一盞去滓溫服

補損當歸散療墜馬落車傷腕折臂疼痛服此藥疼痛

即止筋骨即當相連

澤蘭

炒

附子

炮各一錢

當歸

炒



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

|                                       |                             |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 蜀極 <small>炒</small>                   | 甘草 <small>炙</small>         | 桂心 <small>各三分</small> |
| 芎藭 <small>炒六分</small>                 |                             |                       |
| 右為細末每服二錢溫酒調服日三忌生葱猪肉冷水生果               |                             |                       |
| 接骨丹                                   |                             |                       |
| 沒藥                                    | 乳香                          | 當歸                    |
| 川椒                                    | 自然銅 <small>醋淬</small>       | 赤芍藥                   |
| 敗龜 <small>炙</small>                   | 虎骨                          | 白芷                    |
| 骨碎補 <small>炙</small>                  | 千金藤 <small>郁李仁是也各等分</small> |                       |
| 又方加龍骨川芎                               |                             |                       |
| 右為細末化臘半兩丸如彈子大每服一丸好酒半升化開煎用東南柳枝攪散熱服     |                             |                       |
| 秘傳止血定痛生肌散專治跌打損傷牙咬刀傷出血                 |                             |                       |
| 諸般腫毒出膿後肌肉不生痛不止者並皆治之 <small>方見</small> |                             |                       |
| 破傷風門                                  |                             |                       |
| 一方治刀傷斧斫                               |                             |                       |

|                         |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 五倍子一味為末乾貼神効             |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 桑葉陰乾為末乾貼如無旋熨乾末貼之妙       |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 湯火瘡                     |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 用臘月猪胆塗黃栢炙乾為末傳之          |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 一方治火燒                   |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 桐油                      | 水 <small>各二錢</small>  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 右二件以桃柳枝不住手攪成膏再入少水溶外用    |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 貓兒肚底毛細剪摻上               |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 一方治湯火傷未成瘡者              |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 用小麥炒黑為度研為末膩粉減半油調塗之      |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 四黃散 <small>瘡療方</small>  | 治湯盪火燒熱瘡連痛             |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 大黃                      | 黃連                    | 黃蘗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黃芩                      | 白芨 <small>各等分</small> |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 右為末水調成膏以雞翎時塗瘡上          |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 治湯火瘡 <small>瘡療方</small> |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 用螺螄殼多年乾白者火煨為末如瘡破用乾摻之    |                       |    |  |  |  |  |  |  |  |

如不破輕粉清油調傳之

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十五

仁齋直指卷二十五



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

仁齋直指卷二十六

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

婦人 附 子嗣

產婦傷寒方論

或問婦人傷寒可得聞乎曰傷寒三百九十七條一百一十三方此張氏截然之筆削也於某證則有某藥曷嘗以男女為別哉要之月事去來產前產後男子所無

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人以血為主發熱惡寒經水適來經日熱除而胃滿譫語者是則邪氣結於胃脇當刺期門隨其實而取之傷風經日續生寒熱發作似瘧而經水適斷者是則血結而不行當以小柴胡湯散之所謂治之而愈者此也至如傷寒發熱經水適來晝醒暮譫如見怪狀是則裏無留邪熱隨血散所謂不治自愈者此也前乎吐血下血兩條併以犀角地黄湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類言之詳矣抑產前產後



迪志文化出版有限公司出版



治法將何擇焉曰產前安胎產後消瘀於是遵依條例斟酌輕重而調理之安胎者何桑寄生阿膠縮砂為要藥他如桂枝半夏桃仁大黃墮胎及燥熱等輩則不可輕用也消瘀者何川芎蒲黃赤芍藥生地黃為要藥他如內補攔住敗血之劑則不可輕進也朱氏以阿膠桑寄生人參伏苓白朮等為細末糯米飲調劑為孕婦安胎以紅花一分官桂芍藥甘草半之薑棗同煎為解表消瘀以葱白生薑大劑濃汁為產前發散以小柴胡湯

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

去半夏和解熱入子宮郭稽中以枳殼防風一度甘草減半末之點服主大便秘澀又以蜜導一法真可活人然則產婦證治觀此可以問津索塗矣雖然知安胎則不可不調氣知消瘀則不可不扶虛枳殼香附陳皮以調氣也當歸川芎黃耆人參以扶虛也退熱則柴胡黃芩解肌則紫蘇乾葛滋腸則麻仁枳殼助陽則乾薑良薑其間採摭雖未備古人之經然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人之意姑存之篇末以便學者之觀覽云

婦人論

男女均有此血氣人皆曰婦人以血為本何邪蓋其血勝於氣耳血藏於肝流注子臟而主其血者在心上為乳汁下為月水合精而為胞胎獨非血乎血之所以流暢於經絡者氣實使之又不可舉一而遺一也女子十四而天癸至男子二八天癸至精氣溢任脉通太衝之脉盛故月候以時而行衝任者血之海也月候者經絡之餘也經言其常其來有期無過不及反此皆病其不

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

行則尤甚百病生焉○自其血氣和平陰陽調順則精血聚而胞胎成胞胎已成而心腎二脉其動也應手而疾蓋心之所主者血腎之所主者精精血交并而成之精勝則為男血勝則為女此亦自然之理也○自其血氣不調陰陽愆伏過於陽則經脉前期而來過於陰則經脉後期而至蓋血性得熱則宣流得寒則凝澀陰氣乘陽內寒血澀故其來乍少陽氣乘陰血熱流散故其來乍多過與不及皆致病也○然經脉不行其候有三



一則血氣盛實經絡過閉其脉滑實見之當通經一則形

體憔悴經絡涸竭其脉虛弱見之當滋養一則風冷內

傷七情內賊以致經絡庫滯其脉浮濇見之解散風冷去瘀生熱

經脉不行此諸病之所由生也○是故血虛關熱盜汗

筋攣則為虛勞血少水涸燥氣乘肺則為乾嗽宿寒留

滯血與氣搏則為腹痛敗血結塊時發寒熱則為癥瘕

或風寒滯經血化為水流溢四肢謂之血分或脾不制

水血與水并浮脹肌肉謂之虛腫或衝任氣虛內慾過

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十六

度風邪冷熱諸氣入於胞門穢液與血相兼而下冷則

多白熱則多赤冷熱不調赤白相半謂之赤白帶或衝

任勞損經海傷動脾虛衛弱不能約制其血倏然暴下

謂之崩中亦有非時血行淋瀝不斷謂之漏下崩之中

復有瘀血時崩時止謂之崩中漏下所下五色各應五臟五臟俱虛五色

俱下婦人血海挾受風邪不換金正氣散加川芎官桂主之以至眩暈煩悶嘔惡怔

忪迷亂多忘發狂妄語小便不禁此婦人以血受病最

多而血之為病遇夜愈增劇也血屬陰陰虛則夜爭○然則產育

一科可得聞乎曰產前之病其脉貴乎實產後之病其

脉貴乎虛產前為之順氣安胎產後為之扶虛消瘀此

其要也抑產育之後血衰氣弱宿瘀未盡飲食起居梳

洗解脫一有不謹得病猶甚易焉凡婦人血氣諸疾但

用四物湯加以炒吳茱萸主之陰臟加多陽臟加少無

不効者若產難若胎衣不下若胎損腹中則入醋夾煎

或生料五積散加芎歸縮砂煎之以水醋或局方黑神

散用乳香煎湯調下皆其類耳外此則有芎歸湯佐以

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十六

縮砂調理胎婦腹痛或胎動下血更以炒阿膠并熟艾

濟之至若胎婦喘咳則縮砂川芎炒阿膠等分入生薑

烏梅紫蘇梗最良胎婦艱食則調氣散枳殼散等分入

縮砂為妙大小產後津液涸燥滯血停留易至大便秘

結枳殼散加炒桃仁用蜜水同煎入醋數沸可也縮胎

之劑枳殼縮砂烏藥所不可無安胎之劑阿膠縮砂桑

寄生又不可闕婦人多因怒氣傷胎所以安胎尤莫先

於順氣其於產後發熱黑神散加川芎荊芥入生薑葱



白尤佳產後消瘀黑神散須多服餌至一臘以後腹中  
畧無疼痛方可與四物建中湯輩服之太早則補住敗  
血為害非輕若夫郭稽中所編產寶方論邇來書肆別  
有經驗節本辭簡理明此可為產科公據

附調經諸方

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與過期者有妄  
行者有色紫黑及淡者有成塊者有作疼者夫經不  
通或因墮胎及多產傷血或因久患潮熱銷血或因

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血  
或因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨證  
用之或因七情傷心心氣停結故血閉而不行宜調  
心氣通心經使血生而經自行矣如虛中有熱月事  
不來以四物湯加黃芩治之常過期者血少也以芎  
歸參朮兼痰藥治之過期紫黑有塊作痛血熱也以  
四物湯加香附黃連過期色淡挾痰者以二陳湯加  
芎歸常不及期者血熱也以四物湯加黃芩黃連香

附肥人多兼痰藥治之血枯經閉者以四物湯加紅  
花桃仁痰多拈住血海地位因而下多者目必漸昏  
肥人多有之以南星蒼朮川芎香附作丸服之肥人  
軀脂滿經閉者以導痰湯加芎歸黃連不可服地黃  
泥痰故也如用必以薑汁炒肥人少子亦由痰多脂  
膜閉塞子宮不能受精而施化也宜服上藥瘦人子  
宮無血精氣不聚亦令無子以四物湯養血養陰等  
藥經水未行臨經將來作痛者血實也一曰瘀血鬱

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

滯也以四物湯加桃仁香附黃連紅花或加玄胡索  
莪朮木香有熱加柴胡黃芩經水行後而作痛者氣  
血俱虛也以八物湯加減煎服又云血為氣之配因  
氣而行成塊者氣之凝將行而痛者氣之滯行後作  
痛者氣血虛也色淡者亦虛也而有水以混之也錯  
經妄行者氣之亂也紫者氣之熱黑則熱之甚也今  
人悉指為風冷而行溫熱之劑禍不旋踵

四物湯

和劑  
方

治衝任虛損月水不調常服調益榮衛滋



|                            |  |                                                 |  |                                                                    |  |                          |  |
|----------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| 養血氣                        |  | 當歸 <small>去蘆</small>                            |  | 川芎                                                                 |  | 白芍藥                      |  |
| 熟乾地黄 <small>酒蒸焙各等分</small> |  | 右咬咀每服四錢水一盞煎八分空心服崩中去血過多者加熟艾煎服                    |  | 大溫經湯 <small>和劑方</small> 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱 |  | 阿膠 <small>碎炒</small>     |  |
| 人參 <small>去蘆</small>       |  | 肉桂 <small>去皮</small>                            |  | 甘草 <small>炒</small>                                                |  | 當歸 <small>去蘆</small>     |  |
| 芍藥                         |  | 牡丹皮 <small>各一兩</small>                          |  | 半夏 <small>二兩</small>                                               |  | 麥門冬 <small>去心五兩半</small> |  |
| 吳茱萸 <small>二兩各湯洗七次</small> |  | 右咬咀每服三錢水一盞薑五片煎八分空心熱服調經散治經水或前或後或多或少或踰月不至或一月而來皆可服 |  | 川歸 <small>酒洗一錢半</small>                                            |  | 麥門冬 <small>去心二錢</small>  |  |

|                                   |  |                                          |  |                         |  |                                                          |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| 吳茱萸 <small>擇去閉目者沸湯泡七次焙乾半錢</small> |  | 半夏 <small>湯泡七次</small>                   |  | 川芎 <small>各一錢</small>   |  | 甘草 <small>各七分半</small>                                   |  |
| 右細切作一服水二盞加生薑三片煎至一盞空心稍熱服           |  | 逍遙散 <small>和劑方</small> 治血虛煩熱月水不調臍腸脹痛痰嗽潮熱 |  | 肉桂 <small>半錢</small>    |  | 阿膠 <small>炒</small>                                      |  |
| 甘草 <small>炙半兩</small>             |  | 當歸 <small>去蘆炒</small>                    |  | 茯苓 <small>去皮</small>    |  | 芍藥                                                       |  |
| 白朮                                |  | 柴胡 <small>去苗各一兩</small>                  |  | 右咬咀每服三錢水一盞煨薑一塊薄荷少許煎服不拘時 |  | 加減吳茱萸湯治衝任衰弱月候愆期或前或後或崩漏不止赤白帶下小腹急痛每至經脉行時頭眩飲食減少氣滿心忪肌膚不澤悉皆主之 |  |
| 吳茱萸 <small>半兩</small>             |  | 麥門冬                                      |  | 乾薑                      |  |                                                          |  |





|                                           |                           |                          |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 白茯苓                                       | 牡丹皮                       | 南木香                      |
| 苦梗<br><small>錢各三</small>                  | 甘草<br><small>半三錢</small>  | 當歸<br><small>兩半</small>  |
| 北細辛<br><small>半一錢</small>                 | 防風                        | 官桂<br><small>分各一</small> |
| 半夏<br><small>錢七</small>                   |                           |                          |
| 右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分去滓空心溫服             |                           |                          |
| 桃仁散治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四體虛翕不能飲食腹中堅痛不可行動月水 |                           |                          |
| 或前或後或經月不來舉體沉重唯欲眠睡多思酸物                     |                           |                          |
| 桃仁                                        | 粉草                        | 半夏<br><small>兩各一</small> |
| 赤芍藥                                       | 生地黄<br><small>兩各三</small> | 澤蘭葉                      |
| 川牛膝                                       | 當歸                        | 桂心                       |
| 牡丹皮                                       | 人參                        | 蒲黃                       |
| 川芎<br><small>兩各</small>                   |                           |                          |
| 右為粗末每服五大錢水盞半薑三片煎七分空心                      |                           |                          |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六



迪志文化出版有限公司出版

|                                          |                            |                             |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 去滓溫服                                     | 牡丹散<br><small>方和劑</small>  | 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肢體羸困漸成骨蒸並宜服之 |
| 桂心                                       | 牡丹皮                        | 芍藥                          |
| 玄胡索<br><small>炒</small>                  | 沒藥<br><small>研別</small>    | 陳皮<br><small>白去</small>     |
| 紅花                                       | 當歸<br><small>蘆去</small>    | 甘草                          |
| 烏藥<br><small>兩各一</small>                 | 真蓬莪朮                       | 鬼箭                          |
| 蘇木<br><small>錢各二</small>                 | 乾漆<br><small>兩炒二</small>   |                             |
| 右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時候                        |                            |                             |
| 內補當歸圓治血氣虛損月水不調或崩中漏下去血過多肌體羸困及月水將行腰腿痛重並皆治之 |                            |                             |
| 真蒲黃<br><small>錢炒七</small>                | 熟地黄<br><small>兩半</small>   | 當歸<br><small>煮酒</small>     |
| 阿膠<br><small>炒</small>                   | 白芷                         | 續斷                          |
| 乾薑<br><small>炮</small>                   | 甘草<br><small>炙</small>     | 川芎<br><small>兩各四</small>    |
| 肉桂                                       | 附子<br><small>皮炮去</small>   | 白芍藥<br><small>兩各一</small>   |
| 白朮                                       | 吳茱萸<br><small>湯洗七次</small> |                             |

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六



迪志文化出版有限公司出版



|                             |  |                                              |  |                            |  |                                      |  |                                                                       |  |                                   |  |                                                                    |  |                                  |  |                                                    |  |                             |  |                             |  |                          |  |                                          |  |                 |  |                                    |  |                                   |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <p>右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸食前溫酒下</p> |  | <p>內炙散<small>方和劑</small>治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或</p> |  | <p>凝積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭眩皆治</p> |  | <p>藿香葉 丁香皮 熟乾地黄<small>洗焙</small></p> |  | <p>肉桂<small>去皮各一兩半</small> 甘草<small>炙</small> 當歸<small>去蘆</small></p> |  | <p>白朮 山藥 白芷<small>各八兩</small></p> |  | <p>茴香<small>一兩半</small> 藁本<small>去蘆</small> 乾薑<small>炮</small></p> |  | <p>川芎 黃芪<small>去苗</small> 木香</p> |  | <p>白芍藥<small>各一兩</small> 陳皮<small>去白四兩</small></p> |  | <p>右為末每服三錢水一盞薑五片艾十葉同煎空心</p> |  | <p>熱服溫酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡</p> |  | <p>露不快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生薑煎</p> |  | <p>溫經湯<small>大全良方</small>治婦人血海虛寒月水不利</p> |  | <p>當歸 川芎 芍藥</p> |  | <p>桂心 牡丹皮 莪朮<small>各半兩</small></p> |  | <p>人參 甘草 牛膝<small>各一兩</small></p> |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|

|                             |  |          |  |                                         |  |                                    |  |                                                        |  |                                     |  |                              |  |                             |  |            |  |                                          |  |                                  |  |                        |  |                                         |  |                             |  |                                             |  |                                             |  |
|-----------------------------|--|----------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| <p>右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時</p> |  | <p>服</p> |  | <p>凌花散<small>方澹察</small>治婦人月水不行發熱腹脹</p> |  | <p>當歸<small>浸酒</small> 凌霄花 劉寄奴</p> |  | <p>紅花<small>酒浸候煎藥一二沸即入</small> 官桂<small>去皮</small></p> |  | <p>牡丹皮<small>洗酒</small> 川白芷 赤芍藥</p> |  | <p>延胡索<small>各等分</small></p> |  | <p>右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花</p> |  | <p>煎熱服</p> |  | <p>四製醋附丸<small>瑞竹堂方</small>治婦人女子經候不調</p> |  | <p>香附子<small>去毛一斤作四分</small></p> |  | <p>一分好酒浸七日 一分小便浸七日</p> |  | <p>一分鹽水浸七日 一分米醋浸七日<small>各焙</small></p> |  | <p>右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心食前</p> |  | <p>鹽酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓<small>各二兩</small></p> |  | <p>六合湯<small>濟生方</small>治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛</p> |  |
|-----------------------------|--|----------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|



|                      |           |                 |      |
|----------------------|-----------|-----------------|------|
| 當歸                   | 白芍藥       | 官桂              | 去皮   |
| 熟地黄                  | 洗         | 川芎              | 蓬朮   |
|                      |           |                 | 炮各等分 |
| 右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心服     |           |                 |      |
| 白薇圓                  | 大 全 良 方   | 治婦人月水不利四肢羸瘦漸覺虛乏 |      |
| 當歸                   | 白薇        | 栝子仁             |      |
| 白芍藥                  | 川芎        | 白朮              |      |
| 桂心                   | 附子        | 萆解              |      |
| 木香                   | 細辛        | 吳茱萸             | 各半兩  |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六     |           |                 |      |
| 人參                   | 石斛        | 白茯苓             |      |
| 川牛膝                  | 澤蘭葉       | 各七錢半            | 檳榔   |
|                      |           |                 | 兩半   |
| 熟地黄                  | 二兩        | 牡丹皮             | 紫石英  |
|                      |           |                 | 各一兩  |
| 右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五十丸空心溫酒 |           |                 |      |
| 下                    |           |                 |      |
| 茯苓補心湯                | 方 澹 寮     | 治婦人去血過多虛勞發熱     |      |
| 用四物湯一兩參蘇飲三兩和勻生薑五片煎八分 |           |                 |      |
| 溫服                   | 方 見 虛 勞 門 |                 |      |

|                      |           |                 |     |
|----------------------|-----------|-----------------|-----|
| 增損四物湯                | 蘭 室 秘 藏 方 | 治血積             |     |
| 當歸                   | 川芎        | 白芍              |     |
| 熟地黄                  | 蓬朮        | 京三稜             |     |
| 官桂                   | 乾漆        | 各等分             | 煙盡  |
| 右咬咀每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服食前  |           |                 |     |
| 磨積圓                  | 楊 氏 家 藏 方 | 治婦人積氣內攻經候不調腹脇膨脹 |     |
| 刺痛                   |           |                 |     |
| 京三稜                  | 莪朮        | 各二兩             | 煨   |
|                      | 茴香        | 炒               |     |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六     |           |                 |     |
| 附子                   | 炮         | 川楝子肉            | 白芍藥 |
| 乾薑                   | 炮各一兩半     | 巴戟              | 去心炒 |
| 艾葉                   | 醋炒各一兩七錢半  | 當歸              | 洗   |
| 右為末酒糊圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒 |           |                 |     |
| 下                    |           |                 |     |
| 麥門冬散                 | 大 全 良 方   | 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下 |     |
| 麥門冬                  | 柴胡        | 赤茯苓             | 各一兩 |
| 羚羊角                  | 赤芍藥       | 桑白皮             |     |



|                                                      |                             |            |                                                |            |                                    |                                    |                    |                         |                                  |                             |             |                                              |                                                                     |                                                     |                                                  |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>黃耆<small>各三分</small> 生地黃 甘草<small>各五錢</small></p> | <p>右咬咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓</p> | <p>通口服</p> | <p>黃耆散<small>良方大全</small> 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不</p> | <p>欲飲食</p> | <p>人參 黃芩 當歸<small>各七錢半</small></p> | <p>柴胡<small>一兩半</small> 黃耆 地骨皮</p> | <p>赤茯苓 麥門冬 生地黃</p> | <p>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六</p> | <p>赤芍藥 白芍藥<small>各一兩</small></p> | <p>右咬咀每服一兩水二盞薑五片煎至一盞去滓通</p> | <p>口食前服</p> | <p>烏雞煎圓<small>秘方</small> 治婦人百病虛勞血氣赤白帶下等證</p> | <p>人參<small>二兩</small> 茯苓<small>三兩</small> 香附子<small>四兩</small></p> | <p>當歸<small>六兩</small> 官桂 地骨皮<small>各二兩</small></p> | <p>生熟地黃<small>四兩</small> 黃耆<small>六兩</small></p> | <p>右用烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃耆末</p> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|

|                             |                             |                             |          |                                                           |                             |                             |                             |                         |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                            |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <p>和炒麵圓雞頭大喂雞服生膠吊死腸肚洗淨擇毛</p> | <p>搥碎骨入前藥雞腹內用酒醋各一瓶煮一宿取骨</p> | <p>焙枯研用汁打糊圓如梧桐子大每服五十圓鹽湯</p> | <p>下</p> | <p>勝金圓<small>一方名不換金丸治婦人諸虛不足心腹疼痛一名勝金丹有沉香</small> 治婦人久虛</p> | <p>無子產前產後一切病患兼療男子下虛無力此藥</p> | <p>能安胎催生妊娠臨月服五七圓產時減痛婦人無</p> | <p>子是子宮冷如服二十圓男女自至又治積年血風</p> | <p>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六</p> | <p>脚手麻痺半身不遂赤白帶下血如山崩及治產後</p> | <p>腹中結痛吐逆心痛子死腹中遠臍痛氣滿煩悶失</p> | <p>蓋汗不出月水不通四肢浮腫無力血勞虛勞小便</p> | <p>不禁中風不語口禁產後痢疾消渴眼前見鬼迷暈</p> | <p>敗血上衝寒熱頭痛面色痿黃淋瀝諸疾血下無度</p> | <p>血痢不止飲食無味產後傷寒虛煩勞悶產後血癖</p> | <p>產後羸瘦凡婦人衆疾不論年月日深並皆治之</p> | <p>白芍藥 藁本 石脂<small>赤白皆可</small></p> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|



|                                 |           |           |       |                                         |                                        |  |  |                    |  |  |                   |  |  |                                       |  |  |                                    |  |  |                                                             |  |  |                                                               |  |  |                                    |  |  |                                    |  |  |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| 川芎<br><small>火不見</small> 牡丹皮 當歸 | 白茯苓 人參 白薇 | 白芷 桂心 延胡索 | 白朮 沒藥 | 甘草<br><small>炙○江西安撫司<br/>沒藥甘草咸半</small> | 右十五味等分為細末煉蜜為圓如彈子大每服一圓溫酒化下初產子並用熱醋湯下空心食前 |  |  | 此方係王子宣祖傳渠家凡婦人懷身便服此 |  |  | 藥甚神妙常服尤好係在京師於能家傳到 |  |  | 七製香附丸治婦人諸虛百損血氣不調月水前後結成癥瘕或骨蒸發熱四肢無力並皆治之 |  |  | 香附 當歸<br><small>各二兩同用酒浸</small> 香附 |  |  | 莪朮<br><small>各二兩同用童便浸</small> 香附 牡丹皮<br><small>二兩一兩</small> |  |  | 艾葉<br><small>一兩同用米泔浸</small> 香附 烏藥<br><small>各二兩同用米泔浸</small> |  |  | 香附 川芎 玄胡<br><small>各一兩同用水浸</small> |  |  | 香附 三稜 柴胡<br><small>各一兩同用泔浸</small> |  |  |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六

|                                            |                                                |  |  |                                                                                   |  |  |                                                                                          |  |  |     |  |  |      |  |  |                                                |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|--|------|--|--|------------------------------------------------|--|--|
| 香附 二兩 紅花 一兩 烏梅肉<br><small>二十個同用鹽水浸</small> | 右作七處春浸三日夏浸二日秋浸七日冬浸十日晒乾為末入藥汁打糊為丸如梧桐子大每服八十丸臨卧酒調下 |  |  | 王節齋曰婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此證便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣 |  |  | 以致血少而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃耆甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經 |  |  | 附子嗣 |  |  | 子嗣方論 |  |  | 內經曰陰搏陽別謂之有子<br><small>謂陰脉搏手其是為血氣中別有陽脉也</small> |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--|--|------|--|--|------------------------------------------------|--|--|

欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六



和平陽施而陰化也蓋為人之夫婦猶天地然天地之道陰陽和而後萬物育夫婦之道陰陽和而後男女生是故欲求嗣者先須調其婦之經脉經脉既調則氣血和平氣血和平則百病不生而樂乎有子矣丹溪云若是肥盛婦人稟受盛厚恣於酒食之人經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰用半夏蒼朮台芎防風羌活滑石或導痰湯之類若是怯瘦性急之人經水不調不能成胎謂之子宮乾澁無血不能攝受精氣宜涼血降火或四物加香附黃芩柴胡養血養陰等藥可宜東垣有六味地黃丸以補婦人之陰血不足無子服之者能使胎孕

又訣云三十時中兩日半二十八九君須筭落紅滿地是佳期金水過時空霍亂霍亂之後枉費工樹頭樹底覓殘紅但解開花能結子何愁丹桂不成叢此蓋婦人月經方絕金水纔生此時子宮正開乃受精結胎之候妙合太和之時過此佳期則子宮閉而不受胎矣然男

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

女之分各有要妙存焉如月候方經一日三日五日交會者成男二日四日六日交會者成女過此則不孕矣又云陰血先至陽精後衝縱氣來乘血開裏精陰外陽內則成坎卦之象而為男若陽精先入陰血後參橫氣來助精開裏血陰內陽外則成離卦之象而為女若胎成三月之內男女未分之時亦有轉女為男之術其法以鉄斧一柄置於孕婦床蓆之下勿令人見知更佩雄黃一二兩於孕婦身左或佩萱花亦可已上三法皆驗

不可輕忽傳曰不孝有三無後為大古詩云無官一身輕有子萬事足誠哉是言也無嗣者宜深思之無怠說說圓

方利劑  
治婦人衝任虛寒胎孕不成或多損墜

|     |     |     |      |     |     |
|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 澤蘭葉 | 半一兩 | 肉桂  | 去皮五錢 | 當歸  | 焙洗  |
| 熟地黃 | 焙洗  | 川芎  |      | 石斛  | 酒洗炒 |
| 白芍藥 |     | 牡丹皮 |      | 延胡索 | 各一兩 |
| 白朮  | 半一兩 | 乾薑  | 炮半兩  |     |     |

右為末醋糊丸如梧桐子大每五十丸空心溫酒下

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六





|                                                               |  |     |          |     |                        |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|----------|-----|------------------------|
| 艾附暖宮丸治婦人子宮虛冷帶下白淫面色痿黃四肢痠痛倦怠無力飲食減少經脈不調血無顏色肚腹時痛久無子息服藥更宜戒惱怒生冷累用經驗 |  | 艾葉  | 大葉者去枝梗三兩 | 香附  | 去毛六兩俱要合時採者用醋五升以瓦礫煮一晝夜搗 |
| 爛分餅慢火焙乾                                                       |  | 吳茱萸 | 去枝梗      | 大川芎 | 雀胎者                    |
| 白芍藥                                                           |  | 黃耆  | 取黃色白者各二兩 | 生地黃 | 生用一兩酒洗焙乾               |
| 川椒                                                            |  | 續斷  | 去蘆一兩五錢   | 官桂  | 五錢                     |
| 酒洗三兩                                                          |  | 錢五  |          |     |                        |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六                                              |  |     |          |     |                        |
| 右為細末上好米醋打糊為丸如梧桐子大每服五七                                         |  |     |          |     |                        |
| 十丸淡醋湯食遠送下修合日宜天德合月德合日                                          |  |     |          |     |                        |
| 壬子日精選藥材為妙耳                                                    |  |     |          |     |                        |
| 烏雞丸治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨蒸等疾不能成胎                                  |  |     |          |     |                        |
| 用白毛烏骨公雞一隻重二斤半許閉死去毛腸淨                                          |  |     |          |     |                        |
| 用艾四兩青蒿四兩剉碎納一半在雞腸用空酒壘                                          |  |     |          |     |                        |
| 一隻納雞并餘艾蒿在內用童便和水灌令沒雞二                                          |  |     |          |     |                        |

|                                                      |  |      |                 |     |                           |
|------------------------------------------------------|--|------|-----------------|-----|---------------------------|
| 寸許煮絕乾取出去骨餘俱搗爛如薄餅狀焙乾研為細末                              |  | 南香附子 | 去毛淨一斤分作四分米泔水浸一分 | 童便  | 浸一分醋浸一分酒浸一分春秋二日夏一日冬四日取出晒乾 |
| 熟地黃                                                  |  | 當歸   | 酒浸洗             | 白芍藥 |                           |
| 鱉甲                                                   |  | 遼人參  | 各三兩             | 川牛膝 | 去蘆                        |
| 白朮                                                   |  | 知母   | 各二兩             | 川芎  | 三兩半                       |
| 牡丹皮                                                  |  | 貝母   |                 | 柴胡  | 各二兩                       |
| 地骨皮                                                  |  | 乾薑   |                 | 玄胡索 |                           |
| 黃連                                                   |  | 秦艽   | 各一兩半            | 黃耆  |                           |
| 白茯苓                                                  |  | 生地黃  | 懷慶者勿犯鉄三兩        |     |                           |
| 右并香附共為細末并雞末酒醋糊為丸如梧子大每服五六十丸漸加至七八十丸溫酒下或米飲下亦得忌煎炒辛辣之物及莧菜 |  |      |                 |     |                           |
| 白薇丸 治婦人無子                                            |  |      |                 |     |                           |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六                                     |  |      |                 |     |                           |



|                       |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| 白薇                    | 牡蒙  | 藁本  | 各五分 |
| 薑黃                    | 當歸  | 熟地黃 | 各七分 |
| 川芎                    | 人參  | 栝子仁 |     |
| 石斛                    | 桂心  | 附子  | 炮   |
| 五味子                   | 防風  | 甘草  |     |
| 川牛膝                   | 吳茱萸 | 桑寄生 | 各六分 |
| 川椒                    | 禹餘糧 |     | 八分  |
| 右為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下三十九日二  |     |     |     |
| 服忌生菜葱熱麪蕎麥蒜猪肉炙燂葵菜蕪荑菰菜  |     |     |     |
| 海藻粘食臭物                |     |     |     |
| 孕育備論                  |     |     |     |
| 經云少陰脉動甚者有子厥旨何哉曰手少陰之經屬 |     |     |     |
| 心足少陰之經屬腎心之所主者血腎之所主者精精 |     |     |     |
| 血合氣而成之也然而胞門子戶又所以為精血之會 |     |     |     |
| 其於尺部二脉尤有可驗者焉且婦人尺部之脉滑是 |     |     |     |
| 為血實必主月事不行若其來斷絕或中絕而不至者 |     |     |     |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 此皆無孕惟滑而不絕畧無間斷於其間此則真胎孕 |  |
| 之脉也○婦人懷胎臟氣擁閉不可多睡不可憂懼勞 |  |
| 役不可啖食粘滯辛辣強硬之物又不可妄施針灸所 |  |
| 貴時行數步調暢自適使氣得其平若酒麵炙燂熱毒 |  |
| 熏蒸若感觸風邪傳染熱氣若誤服藥餌破血動胎若 |  |
| 七情內傷快意縱慾則易致漏胎若腹痛方來用力太 |  |
| 早若覺則驚動胎轉未得若抱持不正奔突後趨若近 |  |
| 產多淫觸犯禁忌則易致產難既產之後或過用心力 |  |
| 或素有痰阻或血虛氣逆或虛極乘寒則血暈眩悶之 |  |
| 證生矣○然而安胎之法有二因母病以致動胎者但 |  |
| 療母病其胎自安或胎氣不堅因觸動以致母病者則 |  |
| 安胎而母自產以膠艾湯芎歸湯各半縮砂佐之為良 |  |
| 難產之劑前所謂四物湯加吳茱萸入醋夾煎黑神散 |  |
| 用乳香煎湯調下皆其要藥產後血暈先以舊漆器燒 |  |
| 煙微向其鼻次則五靈脂末半生半炒入蘇合香圓百 |  |
| 沸湯調與之或黑神散入麝少許調以紫蘇湯或花藥 |  |

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

石散用童子小便溫溫調劑可也損孕驗法婦人面色青手足冷指甲黑而且遍體不仁腰腹痛割其或面青唇青以至舌間黯黑口角沫出則不容以人力勝之大要將產腹痛萬勿驚動且須凭物而行直至腰疼子逼育門方可用力蓋腎繫於腰而胎繫於腎故也○俗於產下多用理中丸然蜜甘而滯不若但用理中湯俗於小兒初誕多用黃連然差苦傷胃不若但用甘草炙煎綿蘸入口良久迭用惡物自出俗於胎孕已成多服滑

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

胎枳殼散然枳殼微寒須以縮砂烏藥為佐產後飯食米飲勿用產後盥洗沸湯是常調血以四物逐瘀以黑神人所共知也若夫順氣等劑胎前產後尤當兼施而並用之

血暈昏迷切勿用降  
真香熏之以塞其氣

### 論王叔和劉元賓別男女法

叔和以左手太陽浮大為男右手太陰沉細為女元賓以右手浮大為女左手沉實為男較是二說不無抵牾然即其脉經本旨而詳之又有若異而實同者經曰左

手沉實為男右手浮大為女又曰左右手俱浮大者生二女俱沉實者生二男元賓之所主者此也經曰左手尺中浮大者男右手尺中沉細者女又曰尺脉俱浮產二男尺脉俱沉產二女叔和之所主者此也何者沉細之說與沉實之義不同左尺浮大之說與右手浮大者亦異欲知男女之法大抵沉實者可以為男沉細者斷然為女右手浮大者固知其女左尺浮大者大抵皆男沉細為女沉實為男即所謂諸陽為男諸陰為女者是

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

也左尺浮大為男右手浮大為女即所謂左疾為男右疾為女者是也元賓言其詳蓋合左右手而別陰陽叔和言其畧特不過脉經論尺脉之義矣尚何有異同之辨哉

聖惠云凡脉得太陽為男得太陰為女蓋太陽則浮太陰則沉也脉經云尺脉左偏大為男尺脉右偏大為女左右俱大產二子大者大而有力也左右手脉俱疾二子脈來縱橫逆而不順並主夾胎左尺脉帶強右尺帶弱者為



|                                                                  |  |       |  |                                                 |  |               |  |                |  |                                                                                |  |                                                                                                                            |  |                      |  |                    |  |                                                 |  |   |  |                                      |  |                                      |  |                                                            |  |                      |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------------------------------------------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| 男右尺脈帶強左尺帶弱者為女胎婦遣面南而行忽從後呼之左回首者為男右回首者為女或於廁所呼之亦同又胎婦其夫左乳有核者生男右乳有核者生女 |  | 附胎前諸方 |  | 安胎當歸湯<br><small>良大</small> 方全<br>療妊娠五月舉動驚愕胎動不安下 |  | 墜小腹痛引腰脇小便疼痛下血 |  | 當歸<br>阿膠<br>川芎 |  | 人參<br><small>兩各一</small><br>棗子<br><small>枚二</small><br>艾<br><small>口一虎</small> |  | 欽定四庫全書<br><br><small>仁齋直指</small><br>卷二十六 |  | 右細切酒水各三升合煮至三升內膠令烊分二服 |  | 腹中當安小便當煖也○一方有甘草無參棗 |  | 旋覆花湯<br><small>良大</small> 方全<br>療妊娠六七月間胎不安常處亦名阻 |  | 病 |  | 旋覆花<br><small>兩一</small><br>厚朴<br>白朮 |  | 枳殼<br>黃芩<br>茯苓<br><small>兩各三</small> |  | 半夏<br><small>方炒一</small><br>芍藥<br>生薑<br><small>兩各二</small> |  | 右咬咀每服一兩水鍾半煎至一鍾去滓溫服食前 |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-------|--|-------------------------------------------------|--|---------------|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|

|           |  |                                              |  |                 |  |                                                                                  |  |                          |  |                            |  |                                     |  |                                                                                                                              |  |                 |  |                                                     |  |                                          |  |     |  |                                           |  |                                                             |  |                                       |  |
|-----------|--|----------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 忌羊肉錫醋桃李雀肉 |  | 阿膠散<br><small>良大</small> 方全<br>治妊娠胎動腹中痞痛不思飲食 |  | 白茯苓<br>白朮<br>川芎 |  | 阿膠<br><small>錢炒各七</small><br>當歸<br><small>錢半</small><br>陳皮<br><small>兩各一</small> |  | 甘草<br><small>半二錢</small> |  | 右咬咀每服八錢生薑三片棗二枚水一鍾半煎至八分食前溫服 |  | 當歸散<br><small>方金匱</small><br>妊娠宜常服之 |  | 欽定四庫全書<br><br><small>仁齋直指</small><br>卷二十六 |  | 當歸<br>川芎<br>白芍藥 |  | 黃芩<br><small>兩各一</small><br>白朮<br><small>兩半</small> |  | 右五味為末酒飲調服方寸匕日二次或用酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸茶湯任下空心食前服 |  | 日三次 |  | 桑寄生散<br><small>方濟生</small><br>治胎漏經血妄行淋瀝不已 |  | 當歸<br><small>酒去蘆</small><br>桑寄生<br>川續斷<br><small>酒浸</small> |  | 川芎<br>白朮<br>香附子<br><small>毛炒去</small> |  |
|-----------|--|----------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|



|                                 |                                |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 阿膠<br><small>蛤粉炒<br/>成珠</small> | 人參                             | 茯神<br><small>去木各<br/>一兩</small> |
| 甘草<br><small>炙五錢</small>        |                                |                                 |
| 右咬咀每服四錢水一鍾薑五片煎七分去滓不拘時服          |                                |                                 |
| 半夏茯苓湯<br><small>和劑方</small>     | 治妊娠惡阻惡聞食氣胃膈痰逆嘔吐                |                                 |
| 旋覆花                             | 陳皮<br><small>去白<br/>麸炒</small> | 桔梗                              |
| 白芍藥                             | 人參<br><small>去蘆</small>        | 甘草<br><small>炙</small>          |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六                |                                |                                 |
| 川芎<br><small>兩各半</small>        | 半夏<br><small>炮二錢半</small>      | 赤茯苓                             |
| 熟苧<br><small>錢各半</small>        |                                |                                 |
| 右咬咀每服四錢水一鍾薑四片煎七分空心熱服            |                                |                                 |
| 竹茹湯<br><small>和劑方</small>       | 治妊娠嘔吐頭痛眩暈                      |                                 |
| 橘紅<br><small>去白一兩</small>       | 人參                             | 麥門冬<br><small>去心</small>        |
| 白朮<br><small>兩各半</small>        | 甘草<br><small>二錢半</small>       | 厚朴<br><small>薑製</small>         |
| 白茯苓<br><small>兩各半</small>       |                                |                                 |
| 右咬咀每服五錢水一鍾薑五片入竹茹一塊如彈            |                                |                                 |

|                             |                                   |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 子大同煎至八分溫服不拘時                |                                   |                          |
| 竹葉湯<br><small>簡易方</small>   | 治妊娠心驚膽怯終日煩悶證曰子煩                   |                          |
| 白茯苓<br><small>兩四</small>    | 防風                                | 麥門冬<br><small>去心</small> |
| 黃芩<br><small>兩各三</small>    |                                   |                          |
| 右咬咀每服四錢水一鍾竹葉五片煎服不拘時         |                                   |                          |
| 羚羊角散<br><small>永類經方</small> | 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語蹇澁痰涎不利或時發搐不省人事名曰子癇 |                          |
| 羚羊角<br><small>鎊</small>     | 川獨活                               | 酸棗仁<br><small>炒</small>  |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六            |                                   |                          |
| 五加皮<br><small>錢各半</small>   | 薏苡仁                               | 防風                       |
| 當歸                          | 川芎                                | 茯神                       |
| 杏仁<br><small>分各四</small>    | 木香                                | 甘草<br><small>分各二</small> |
| 右咬咀每服四錢水一鍾薑五片煎七分不拘時服        |                                   |                          |
| 防風湯<br><small>良方大全</small>  | 治妊娠中風卒倒心神悶亂口噤不能言                  |                          |
| 四肢強怠                        |                                   |                          |
| 防風                          | 寄生                                | 葛根<br><small>兩各一</small> |
| 菊花                          | 防己                                | 細辛                       |





|                                 |  |                            |                           |
|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| 秦艽                              |  | 當歸                         | 官桂                        |
| 茯神                              |  | 甘草                         | 羚羊角<br><small>各半兩</small> |
| 右咬咀每服四錢水一鍾半生薑三片煎至八分去滓加竹瀝半合溫服不拘時 |  |                            |                           |
| 全生白朮散<br><small>簡易方</small>     |  | 治妊娠面目虛浮肢體腫如水氣名             |                           |
| 日子腫                             |  |                            |                           |
| 白朮                              |  | 生薑皮                        | 大腹皮                       |
| 陳皮                              |  | 白茯苓皮<br><small>各半兩</small> |                           |
| 右為末每服二錢米飲調下不拘時                  |  |                            |                           |
| 腎著湯<br><small>大全良方</small>      |  | 治妊娠腰脚腫                     |                           |
| 茯苓                              |  | 白朮<br><small>各四錢</small>   | 杏仁                        |
| 甘草<br><small>各三錢</small>        |  |                            |                           |
| 右咬咀每服八錢水二鍾煎至一鍾去滓通口食前            |  |                            |                           |
| 安榮散<br><small>劑生方</small>       |  | 治妊娠小便澀少遂成淋瀝名日子淋            |                           |
| 麥門冬<br><small>去心</small>        |  | 通草                         | 滑石<br><small>各三錢</small>  |
| 當歸<br><small>去蘆酒浸</small>       |  | 燈心                         | 甘草<br><small>各半兩</small>  |

|                                       |  |                          |                              |
|---------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| 人參                                    |  | 細辛<br><small>各一兩</small> |                              |
| 右為細末煎麥門冬湯調下不拘時                        |  |                          |                              |
| 紫蘇飲<br><small>濟生方</small>             |  | 治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛謂之子懸        |                              |
| 大腹皮                                   |  | 川芎                       | 白芍藥                          |
| 陳皮<br><small>去白</small>               |  | 紫蘇葉                      | 當歸<br><small>去蘆酒浸各一兩</small> |
| 人參                                    |  | 甘草<br><small>各半兩</small> |                              |
| 右咬咀每服四錢水一鍾生薑五片葱白七寸煎至七分空心溫服            |  |                          |                              |
| 獨聖散治胎前心腹諸痛胎動不安此藥安胎止痛行氣故也若非八九箇月不宜多服    |  |                          |                              |
| 砂仁<br><small>不拘多少去皮畧炒</small>         |  |                          |                              |
| 右為細末每服一匕熱酒或艾湯米飲鹽湯皆可調服如覺胎中熱即安矣大抵妊婦不可缺此 |  |                          |                              |
| 束胎散第八箇月可服                             |  |                          |                              |
| 炒黃芩<br><small>夏一兩春秋七錢半冬五錢</small>     |  | 白朮<br><small>不見火</small> |                              |



|                          |                                  |        |          |                          |    |                            |    |    |                                  |                                          |                                                                                                  |       |    |                         |    |    |
|--------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------------|----|----------------------------|----|----|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|----|----|
| 陳皮<br><small>各二兩</small> | 茯苓<br><small>七錢半<br/>不見火</small> | 右為末粥丸服 | 達生散又名束胎散 | 大腹皮<br><small>三錢</small> | 人參 | 紫蘇<br><small>莖葉各半錢</small> | 白朮 | 芍藥 | 歸身尾<br><small>甘草<br/>炙二錢</small> | 右作一服入青葱五葉黃楊腦十箇此即黃楊樹葉稍兒也或加枳殼砂仁以水煎食後服於八九箇月 | 服十數貼甚得力夏月加黃芩冬不必加春加川芎或有別證以意消息於后氣虛加參朮氣實倍香附陳皮血虛倍當歸加地黃形實倍紫蘇性急加黃連有熱加黃芩濕痰加滑石半夏食積加山查食後易飢倍黃楊腦有痰加半夏腹痛加木香桂 | 又方治難產 | 砂仁 | 香附<br><small>醋煮</small> | 枳殼 | 甘草 |
|--------------------------|----------------------------------|--------|----------|--------------------------|----|----------------------------|----|----|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|----|----|

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六



迪志文化出版有限公司出版

|    |                      |    |     |     |    |                |       |                                   |                      |             |                             |                               |                           |                                   |                                |                                                |
|----|----------------------|----|-----|-----|----|----------------|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 草末 | 右為末湯調下以香油蜜小便和勻各半鍾調益母 | 催生 | 白芷灰 | 百草霜 | 滑石 | 右為末用芎歸煎湯調下或薑汁服 | 天麻丸易產 | 天麻<br><small>即益母草六月間連根採陰乾</small> | 右為末不拘多少煉蜜丸如龍眼大臨睡時溫酒或 | 白湯化一丸能除產後百病 | 催生丹療產婦生理不順產育艱難或橫或逆大有神効宜天醫日合 | 十二月兔腦<br><small>去膜碾如泥</small> | 通明乳香<br><small>研細</small> | 母丁香<br><small>研為末<br/>各一錢</small> | 麝香<br><small>一字<br/>研細</small> | 右以乳麝丁香拌勻入兔腦髓和丸雞頭大陰乾油紙密封固臨產服一丸溫水送下立產男左女右手中握藥出神驗 |
|----|----------------------|----|-----|-----|----|----------------|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六



迪志文化出版有限公司出版

|                  |     |                |         |
|------------------|-----|----------------|---------|
| 風寒熱病             |     |                |         |
| 表虛六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項 |         |
| 強身熱惡風脉浮而弱太陽經病宜服  |     |                |         |
| 四物湯              | 兩四  | 桂枝             | 地骨皮 各七錢 |
| 表實六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊 |         |
| 惡寒太陽經病宜服         |     |                |         |
| 四物湯              | 兩四  | 麻黃             | 細辛 各半兩  |
| 風濕六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒中風濕之氣肢節煩疼 |         |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六 |     |                |         |
| 脉浮而瀉頭痛太陽標病也宜服    |     |                |         |
| 四物湯              | 兩四  | 防風             | 蒼朮 製各七錢 |
| 升麻六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發 |         |
| 斑如錦文宜服           |     |                |         |
| 四物湯              | 兩四  | 升麻             | 連翹 各七錢  |
| 柴胡六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒胃滿痛而脉弦少陽頭 |         |
| 昏項強宜服            |     |                |         |
| 四物湯              | 兩四  | 柴胡             | 黃芩 各七錢  |

|                  |     |                |          |                 |  |
|------------------|-----|----------------|----------|-----------------|--|
| 大黃六合湯            |     | 方聖惠            |          | 若妊娠傷寒大便硬小便赤氣滿而脈 |  |
| 沉數陽明太陽本病也急下之宜服   |     |                |          |                 |  |
| 四物湯              | 兩四  | 大黃             | 錢五       | 桃仁 十箇去皮         |  |
| 厚朴六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽 |          |                 |  |
| 明本病也宜服亦治咳嗽喘滿     |     |                |          |                 |  |
| 四物湯              | 兩四  | 厚朴             | 枳實 欸炒各五錢 |                 |  |
| 人參六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜 |          |                 |  |
| 服                |     |                |          |                 |  |
| 欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六 |     |                |          |                 |  |
| 四物湯              | 兩四  | 人參             | 五味子 各五錢  |                 |  |
| 梔子六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜服 |          |                 |  |
| 四物湯              | 兩四  | 梔子             | 黃芩 各五錢   |                 |  |
| 石膏六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒身熱大渴蒸熱而煩脉 |          |                 |  |
| 長而大者宜服           |     |                |          |                 |  |
| 四物湯              | 兩四  | 石膏             | 知母 各五錢   |                 |  |
| 茯苓六合湯            | 方聖惠 | 若妊娠傷寒小便不利太陽本病宜 |          |                 |  |
| 服                |     |                |          |                 |  |



|                                                       |                                                |             |                                                       |                                                |             |                                                       |                          |                         |                                                |                     |                                                                         |                                              |                                                                        |                                    |                              |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <p>四物湯 <small>兩四</small> 茯苓 澤瀉 <small>錢各五</small></p> | <p>琥珀六合湯 <small>方聖惠</small> 若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血</p> | <p>狀者宜服</p> | <p>四物湯 <small>兩四</small> 琥珀 茯苓 <small>錢各五</small></p> | <p>膠艾六合湯 <small>方聖惠</small> 若妊娠傷寒汗下後血漏不止胎氣</p> | <p>損者宜服</p> | <p>四物湯 <small>兩四</small> 阿膠 艾葉 <small>錢各五</small></p> | <p>一方加甘草同上 一方加乾薑甘草黃耆</p> | <p>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六</p> | <p>附子六合湯 <small>方聖惠</small> 若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹</p> | <p>中痛脉沉而遲少陰病也宜服</p> | <p>四物湯 <small>兩四</small> 附子 <small>炮去皮</small> 桂 <small>錢各五</small></p> | <p>前胡湯 <small>良大方全</small> 治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼</p> | <p>石膏 <small>二錢</small> 前胡 <small>分六</small> 甜竹葉 <small>分三</small></p> | <p>黃芩 大青 <small>分各五</small> 知母</p> | <p>梔子 <small>分各四</small></p> | <p>右呶咀每服八錢水一盞半葱白三寸煎至八分去</p> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

|                     |                                         |                 |                                                      |                             |                  |                                          |                                                                      |                         |                                                       |                                                   |                             |             |                                             |                  |                                    |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>滓溫服不拘時外臺無甜竹葉</p> | <p>黃耆解肌湯 <small>方聖惠</small> 治妊娠傷風自汗</p> | <p>人參 黃耆 當歸</p> | <p>川芎 甘草 <small>兩各半</small> 芍藥 <small>錢六</small></p> | <p>右呶咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服不拘</p> | <p>時加蒼朮生地黃亦可</p> | <p>百合散 <small>方濟生</small> 治妊娠風壅咳嗽喘滿悶</p> | <p>百合 <small>蒸</small> 紫苑草 <small>洗</small> 貝母 <small>去心</small></p> | <p>欽定四庫全書 仁齋直指 卷二十六</p> | <p>白芍藥 前胡 <small>去蘆</small> 赤茯苓 <small>去皮</small></p> | <p>桔梗 <small>去蘆炒</small> 甘草 <small>炙五</small></p> | <p>右呶咀每服四錢水一盞薑五片煎至八分去滓溫</p> | <p>服不拘時</p> | <p>馬兜鈴散 <small>良大方全</small> 治妊娠胎氣壅滯咳嗽喘急</p> | <p>馬兜鈴 桔梗 人參</p> | <p>甘草 貝母 <small>錢各五</small> 陳皮</p> | <p>大腹皮 紫蘇 桑白皮 <small>兩各一</small></p> |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 五味子                         | 錢七       |
| 右咬咀每服八錢生薑三片水一盞半煎至八分去滓食後溫服   |          |
| 食公下氣湯                       | 良大<br>方全 |
| 治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢無力         |          |
| 羌活                          | 赤芍藥      |
| 甘草                          |          |
| 檳榔                          | 青皮       |
| 大腹皮                         |          |
| 陳皮                          | 赤茯苓      |
| 半夏                          |          |
| 桑白皮                         | 官桂       |
| 錢各五                         | 紫蘇       |
|                             | 兩二       |
| 右咬咀每服八錢生薑五片棗一枚水一盞半煎至八分去滓食前服 |          |
| 香桂散                         | 良大<br>方全 |
| 下死胎                         |          |
| 麝香                          | 另研<br>五分 |
| 官桂                          | 末三<br>錢  |
| 右共和勻用溫酒一盞調服須臾如手推下一字神散       | 良大<br>方全 |
| 治子死腹中胎不下胞破不生此方累有効驗          |          |



|                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 鬼白                                                                                                                                                                                                                            | 不拘多少黃<br>色者去毛 |
| 右研為末以手指撚之如粉極細為度此藥不用羅每服三錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神                                                                                                                                                                                    |               |
| 附產後諸方                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 王節齋曰凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱治法用四物湯補陰血而以炙乾薑之苦溫從治收其浮散使歸依於陰然產後脾胃虛多有過服飲食傷滯而發熱者誤作血虛則不効矣但遇產後發熱者須審問服何飲食有無傷積胃膈飽悶噯氣惡食泄瀉等證只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血證法產後無得令虛當大補氣血為先雖有雜證以末治之一切病多是血虛皆不可發表產後中風切不可作風治必大補氣血為主然後治痰當以左右手之脉分其血氣多少而治產後中風口眼喎斜切不可服小續命湯產後水腫必用 |               |





|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |     |    |     |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|----|-----|----|-----|
| 大補氣血為主少佐蒼朮茯苓使水自利產後大發熱必用乾薑輕者用茯苓淡滲其熱一應寒苦并發表之藥皆不可用產後發熱惡寒皆屬血虛左手脉不足補血藥多於補氣藥惡寒發熱腹痛者當去惡血腹滿者不是產後發熱乳汁不通及膨者無子當消用麥蘖二兩炒研細末清湯調下作四服有子者用木通通草猪蹄煎服凡產後有病先固正氣前條云產後大熱必用乾薑或曰用薑者何也曰此熱非有餘之熱乃陰虛生內熱耳故以補陰藥大劑服之且乾薑能入肺和肺氣入肝分引血藥生血然不可獨用必與補陰藥同用此造化自然之妙非天下之至神孰能與於此乎產後脉洪數產前脉細小澁弱多死懷孕者脉主洪數已產而洪數不段者多主死一方產後補虛 |  | 人參 | 白朮  | 茯苓 | 歸身尾 | 陳皮 | 川芎  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |    | 錢各一 |    |     |    | 錢各半 |

|               |  |       |         |        |              |                 |            |
|---------------|--|-------|---------|--------|--------------|-----------------|------------|
| 甘草            |  | 有熱加黃芩 | 生薑三片水煎服 | 產後消血塊方 | 滑石           | 沒藥              | 血竭         |
| 錢三            |  | 錢一    |         |        | 錢三           |                 | 各二錢如無牡丹皮代之 |
| 又方治產後泄瀉       |  | 黃芩    | 白朮      | 川芎     | 陳皮           | 炒芍藥             | 甘草         |
|               |  |       |         |        |              |                 | 錢          |
| 又方治產後惡露不盡小腹作痛 |  | 五靈脂   | 香附      | 一方加蛤粉  | 參朮膏治產後胞損成淋瀝證 | 右為末醋糊丸甚者入桃仁不去尖用 | 人參         |
|               |  |       |         |        |              |                 | 錢二         |
|               |  |       |         |        |              |                 | 白朮         |
|               |  |       |         |        |              |                 | 錢二         |
|               |  |       |         |        |              |                 | 桃仁         |



陳皮

茯苓 各一錢

黃耆 半錢

甘草 炙五分

右咬咀水煎猪羊胞後入藥作一服

奪命丹 濟生方

治產後血入衣中脹滿衝心久而不下或

去血過多肺氣喘促謂之孤陽絕陰亦難治之證宜

急取鞋底炙熱小腹上下熨之次進此藥

附子 炮去皮臍半兩

牡丹皮 去心

乾漆 炒令煙盡各一兩

右為末用酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

如梧桐子大每服五十丸溫酒送下

花藥石散治產後胎衣不下極有神效 方見跌撲門

返魂丹治生產一十六證一名益母丸

野天麻 一名益母草方梗四五月節間開紫花時採花葉子陰乾半斤

木香 五錢 赤芍藥 六錢 當歸 七錢

右同為末煉蜜丸如彈子大每服一丸隨飲子下

子死腹中冷痛小便流出腹脹四肢冷爪甲青黑童

便酒和勻煎沸化下○產後惡血不盡臍腹刺痛童

便和酒化下○產時面垢顏赤胎衣不下敗血自下

如帶或橫生不順心悶欲死童便酒薄荷自然汁和

勻化下鹽酒亦可○產後三四日起卧不得眼暗生

花口乾煩燥心亂見鬼狂言不省人事童便酒薄荷

汁下○產後煩渴呵欠不思飲食手足麻疼溫米飲

下○產後浮腫氣喘小便澀咳嗽惡心口吐酸水脇

痛要痛無力酒下○產後寒熱如瘧臍腸作痛米湯

下桂枝湯亦可○產後中風牙關緊急半身不遂失

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

音不語童便和酒下○產後大便秘心煩口渴童便

酒化下薄荷自然汁亦可○產後痢疾月未滿食冷

物與血相擊或有積棗湯化下○產後身體百節疼

痛溫米飲下○產後崩中蓋是傷酸物狀如雞肝脊

背悶倦糯米秦艽湯下桂枝湯下亦可產後食熱麪

壅結成塊四肢無力睡後汗出不止月水不調久成

骨蒸勞童便和酒下○產後嘔逆虛脹酒下○產後

鼻衄口乾舌黑童便酒下○產後赤白帶下秦艽同



|       |  |                                              |  |                                                                                          |  |                                                                        |  |                         |  |             |  |                                                           |  |                                                                                                                 |  |                    |  |                                                                   |  |
|-------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| 糯米煎湯下 |  | 黑神散 <small>和劑方</small> 治婦人產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心眩暈等證 |  | 黑豆 <small>炒半斤</small> 熟地黄 <small>酒浸去蘆</small> 當歸 <small>酒浸去蘆</small> 甘草 <small>炙</small> |  | 肉桂 <small>去皮</small> 乾薑 <small>炮</small> 蒲黃 <small>各四兩</small> 濟生方除蒲黃加 |  | 芍藥 <small>去皮</small> 附子 |  | 右為末每服二錢熱酒調下 |  | 清魂散 <small>濟生方</small> 治產後血暈昏不知人更宜先取乾漆或漆器燒烟鼻中薰之頻置醋炭房內次進此藥 |  | 澤蘭葉 <small>去蘆一兩</small> 人參 <small>去蘆一兩</small> 荊芥穗 <small>四兩</small> 甘草 <small>炙八錢</small> 川芎 <small>二兩</small> |  | 右為末每服二錢熱湯溫酒各半盞調勻灌下 |  | 愈風散 <small>聖惠方</small> 療產後中風不省人事口噤牙緊手足癱瘓如角弓狀口吐涎沫亦治血暈四肢強直或築心眼倒吐瀉欲死 |  |
|-------|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|

|                                               |  |                                                             |  |                                    |  |                         |  |                                                 |  |                                                                         |  |                                              |  |                       |  |                      |  |                                        |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------------------------|--|
| 荊芥穗 <small>畧焙</small> 當歸身尾 <small>各等分</small> |  | 右為末每服三錢豆淋酒調下用童子小便亦可其効如神口噤者幹開灌之或吹鼻中皆効一方用蜜丸或麪糊丸如梧子大每服五十丸空心米湯下 |  | 人參湯 <small>永類方</small> 治產後諸虛不足發熱盜汗 |  | 人參 <small>去蘆</small> 歸身 |  | 右等分為末猪腰子一隻去膜切作片子以水三升糯米半合葱二莖煮米熟取清汁一盞入藥二錢煎至八分不拘時服 |  | 黃龍湯 <small>大全良方</small> 治婦人寒熱頭痛嘿嘿不欲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞室寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞後餘熱不解 |  | 柴胡 <small>四分</small> 黃芩 <small>八分</small> 人參 |  | 甘草 <small>各一錢</small> |  | 右作一服用水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時服 |  | 漢防己散 <small>大全良方</small> 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫 |  |
|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------------------------|--|



|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 漢防己                                | 猪苓                  | 枳殼                  |
| 桑白皮                                | 商陸                  | 甘草                  |
| <small>各兩</small>                  |                     | <small>各七錢半</small> |
| 右咬咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服無時一方空心服     |                     |                     |
| 參蘇飲                                | 治婦人產後血入於肺面赤發腫欲死者    |                     |
| <small>聖惠方</small>                 |                     |                     |
| 人參                                 | 蘇木                  |                     |
| <small>一兩為末</small>                | <small>二兩槌碎</small> |                     |
| 右用水二碗煮取一碗去滓調人參末隨時加減服               |                     |                     |
| 玉露散                                | 治產後乳脉不行身體壯熱疼痛頭目昏    |                     |
| <small>大全良方</small>                |                     |                     |
| 欽定四庫全書                             | 仁齋直指                |                     |
| 卷二十六                               |                     |                     |
| 痛大便秘滯悉能治之涼膈壓熱下乳                    |                     |                     |
| 人參                                 | 白茯苓                 | 甘草                  |
|                                    |                     | <small>各半兩</small>  |
| 桔梗                                 | 川芎                  | 白芷                  |
| <small>炒</small>                   |                     | <small>各一兩</small>  |
| 當歸                                 | 芍藥                  |                     |
| <small>二錢半</small>                 | <small>七錢半</small>  |                     |
| 右咬咀每服四錢水一鍾半煎至七分去滓溫服食後如頭熱甚大便秘加大黃二錢半 |                     |                     |
| 湧泉散治因氣乳汁少                          |                     |                     |
| 瞿麥穗                                | 麥門冬                 | 王不留行                |
|                                    | <small>去心</small>   |                     |



|                                            |                      |  |
|--------------------------------------------|----------------------|--|
| 繫龍骨                                        | 川山甲                  |  |
|                                            | <small>炮黃各等分</small> |  |
| 右為細末每服一錢熱酒調下先食猪蹄羹後服藥以木梳左右乳上梳三十餘下日三服        |                      |  |
| 猪蹄湯                                        | 治妳婦氣少力衰脉澁不行絕乳汁       |  |
| <small>澹療方</small>                         |                      |  |
| 猪蹄                                         | 通草                   |  |
| <small>七孔者一隻</small>                       | <small>五兩</small>    |  |
| 右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同通草浸煮得四五升取汁飲之              |                      |  |
| 歌曰                                         |                      |  |
| 婦人吹乳意如何                                    | 皂角燒灰蛤粉和              |  |
| 熱酒一盃調八字                                    | 須臾揉散笑呵呵              |  |
| 理中湯                                        |                      |  |
| <small>方見中寒門</small>                       |                      |  |
| 蘇合香圓                                       |                      |  |
| <small>方見咳嗽門</small>                       |                      |  |
| 四物湯                                        |                      |  |
| <small>方見調經類</small>                       |                      |  |
| 論崩中帶下                                      |                      |  |
| 下部出血不止謂之崩中穢液常流謂之帶下崩中失血多因衝任虛損榮道受傷得之冷帶雜下多因下焦 |                      |  |



不固內挾風冷得之是固然爾然崩中者投以當歸川芎香附諸黑藥之屬血暫止而終不止帶下者投以熟艾餘糧母蠣海螵蛸之類帶暫歇而終不歇其故何哉經曰衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠理司開闔衛氣若虛則分肉不溫皮膚不充腠理不肥而開闔失其司耳況胃為血海水液會焉胃者中央之土又所以主肌肉而約血水也衛氣與胃氣俱虛則肌弱而膚空血之與水不能約制是以消涓漏卮休作無時而不暫停矣

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

然則封之止之其可不加意於固衛厚脾之劑乎此桂枝附子湯以之固衛見活人書而人參白朮茯苓草果丁香木香以之厚脾二者俱不可闕也○雖然酒家嗜好炙燂亦有協熱而下血者此則黃連圓輩所不可無肺經脉微亦主帶下此則草果白朮雖可燥水亦須以阿膠佐之若夫帶之為患出於風冷停宿官桂乾薑細辛白芷先與散其寒邪然後為之封固所貴擇之精而用之審云○一應婦人大小產及諸下血新瘥未得經久遽觸



迪志文化出版有限公司出版

房事皆作崩中漏下二帶之疾又有月事久閉纔得一通下部為風邪所搏致使敗瘀出而未盡亦作崩中漏下黃水或粉紅滲漏無時其崩中下血不止者震靈丹三粒陳米并香附煎湯食前送下又方人參白朮炮乾薑炒甘草製半夏縮砂香附木香等分薑棗煎服又方圓白半夏剉碎以薑汁和麵捏餅包裹炙令香熟去麵取半夏末之糯米稀糊圓麻子大每服伍十圓芎歸湯沉香降氣湯各半食空送下此皆止血之聖藥

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

附諸方

膠艾湯

和劑方

治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不斷及妊娠調攝失宜胎氣不安或因損動漏血傷胎並宜服之

阿膠

當歸

白芍藥

各四兩

右咬咀每服三錢水一盞酒半鍾煎八分熱服

芎藭

艾葉

炒各二兩

甘草

熟乾地黄

炙各二兩



迪志文化出版有限公司出版



|                          |  |                        |  |
|--------------------------|--|------------------------|--|
| 當歸芍藥湯 <small>東垣方</small> |  | 治婦人經脉漏下不止其色鮮紅飲         |  |
| 食減                       |  |                        |  |
| 黃耆                       |  | 橘皮                     |  |
| 蒼朮                       |  | 白朮                     |  |
| 白芍藥 <small>錢各一</small>   |  | 炙甘草                    |  |
| 生地黃 <small>分各二</small>   |  | 柴胡                     |  |
| 右呖咀煎服空心食前                |  |                        |  |
| 柴胡調經湯 <small>試効方</small> |  | 治經水不止鮮紅項筋急腦痛脊骨         |  |
| 強痛不思飲食                   |  |                        |  |
| 羌活                       |  | 蒼朮 <small>錢各一</small>  |  |
| 藁本                       |  | 升麻 <small>錢各半</small>  |  |
| 乾葛                       |  | 當歸                     |  |
| 紅花 <small>許少</small>     |  | 甘草 <small>分各三</small>  |  |
| 右呖咀水煎去滓空心稍熱服取微汗立止        |  |                        |  |
| 艾煎圓治崩傷淋瀝不已小腹滿痛常服益榮調經     |  |                        |  |
| 吳茱萸 <small>湯炮</small>    |  | 當歸 <small>錢各七半</small> |  |
|                          |  | 熟地黃                    |  |

|                          |  |                             |  |
|--------------------------|--|-----------------------------|--|
| 白芍藥 <small>兩各半</small>   |  | 石菖蒲 <small>炒</small>        |  |
| 人參                       |  | 熟艾 <small>四兩熟米飲調作餅子</small> |  |
| 右為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸酒飲任     |  | 下                           |  |
| 鹿茸丸 <small>良大方</small>   |  | 治衝任虛損以致經候過多又為風冷所            |  |
| 乘尺脉微細甚者可灸關元百壯            |  |                             |  |
| 鹿茸 <small>火去毛醋炙</small>  |  | 赤石脂                         |  |
| 艾葉                       |  | 禹餘糧 <small>兩各一</small>      |  |
| 栝葉                       |  | 附子 <small>焙去皮臍各半兩</small>   |  |
| 熟地黃 <small>洗酒</small>    |  | 當歸 <small>浸酒</small>        |  |
| 右為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫     |  | 續斷 <small>兩各二</small>       |  |
| 酒下                       |  |                             |  |
| 涼血地黃湯 <small>拔萃方</small> |  | 治婦人血崩是腎水真陰不能鎮守              |  |
| 包絡相火故血走而崩也               |  |                             |  |
| 生地                       |  | 當歸 <small>分各五</small>       |  |
| 黃栢                       |  | 知母                          |  |
| 川芎                       |  | 升麻 <small>分各二</small>       |  |
|                          |  | 柴胡                          |  |
|                          |  | 藁本                          |  |
|                          |  | 黃連                          |  |

|                      |                    |     |
|----------------------|--------------------|-----|
| 羌活                   | 防風                 | 黃芩  |
| <small>炙</small>     | <small>各三錢</small> |     |
| 甘草                   | 細辛                 | 荊芥  |
| <small>各一分</small>   | 紅花                 |     |
| <small>少許</small>    |                    |     |
| 蔓荊子                  | 紅花                 |     |
| <small>各一分</small>   | <small>少許</small>  |     |
| 右咬咀水煎通口服食前           |                    |     |
| 一方治婦人血崩不止            |                    |     |
| 槐花                   | 棕毛灰                |     |
| <small>一兩</small>    | <small>五錢</small>  |     |
| 右為末水一鍾鹽少許煎七分去滓溫服     |                    |     |
| 一方                   |                    |     |
| <small>大全良方</small>  |                    |     |
| 欽定四庫全書               | 仁齋直指               |     |
| 卷二十六                 |                    |     |
| 用棕白礬煨為末酒調二錢服         |                    |     |
| 帶下方                  |                    |     |
| 暖宮妙丸治婦人赤白帶下          |                    |     |
| 艾葉                   | 龍骨                 | 當歸  |
| 川芎                   | 牡蠣                 | 白芍藥 |
| 牡丹皮                  | 茯苓                 | 赤石脂 |
| 熟地黃                  |                    |     |
| <small>各等分</small>   |                    |     |
| 右為末麵糊為丸梧桐子大服五十丸空心艾醋湯 |                    |     |

|                       |                      |                     |                    |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 下                     | 白芷散                  | 海螵蛸                 | 胎髮                 |
|                       | <small>大全良方</small>  | <small>二箇燒</small>  | <small>一箇燒</small> |
| 白芷                    | 治婦人赤白帶下              |                     |                    |
| <small>一兩</small>     |                      |                     |                    |
| 右為末空心酒調服二錢            |                      |                     |                    |
| 當歸煎                   | 治婦人赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日     |                     |                    |
| <small>濟生方</small>    |                      |                     |                    |
| 漸羸瘦                   |                      |                     |                    |
| 當歸                    | 赤芍藥                  | 牡蠣                  |                    |
| <small>酒洗</small>     |                      | <small>火煨取粉</small> |                    |
| 熟地                    | 阿膠                   | 白芍藥                 |                    |
| <small>酒洗焙</small>    |                      |                     |                    |
| 欽定四庫全書                | 仁齋直指                 |                     |                    |
| 卷二十六                  |                      |                     |                    |
| 續斷                    | 地榆                   |                     |                    |
| <small>酒浸各一兩</small>  | <small>半兩</small>    |                     |                    |
| 右為末醋糊丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下 |                      |                     |                    |
| 一方                    | 治白帶因七情所傷而脉數者         |                     |                    |
| <small>丹溪方</small>    |                      |                     |                    |
| 黃連                    | 匾栢                   | 黃栢                  |                    |
| <small>炒</small>      | <small>酒蒸</small>    | <small>炒各半兩</small> |                    |
| 香附                    | 白芍藥                  | 白朮                  |                    |
| <small>醋炒</small>     |                      | <small>各一兩</small>  |                    |
| 椿根皮                   | 白芷                   |                     |                    |
| <small>二兩炒</small>    | <small>燒存性三錢</small> |                     |                    |
| 右為末粥糊丸梧子大每服五十丸食前米飲下   |                      |                     |                    |



|                                  |                            |                           |                           |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 伏龍肝散治婦人五色帶下                      | 伏龍肝<br><small>心即土灶</small> | 麥門冬<br><small>心去</small>  | 赤石脂<br><small>各一兩</small> |
| 甘草                               | 肉桂<br><small>錢各五</small>   | 川芎<br><small>兩三</small>   |                           |
| 艾葉                               | 熟地黄<br><small>兩各二</small>  | 乾薑<br><small>錢燒七</small>  |                           |
| 當歸頭<br><small>半七錢</small>        |                            |                           |                           |
| 右呖咀水棗煎服或作末子米飲調下                  |                            |                           |                           |
| 一方<br><small>丹溪方</small> 治婦人有孕白帶 | 蒼朮<br><small>錢三</small>    | 白芷<br><small>錢二</small>   | 黃連<br><small>錢炒二</small>  |
|                                  |                            |                           |                           |
| 黃芩<br><small>錢炒二</small>         | 白芍藥                        | 山茱<br><small>錢各二半</small> |                           |
| 椿根皮<br><small>炒</small>          | 黃栢<br><small>炒各半</small>   |                           |                           |
| 右為末糊丸空心溫酒下                       |                            |                           |                           |
| 一方<br><small>丹溪方</small> 治白帶兼風痛  | 半夏                         | 茯苓                        | 川芎                        |
| 陳皮                               | 甘草                         | 蒼朮                        |                           |
| 黃栢<br><small>炒酒</small>          | 南星                         | 牛膝<br><small>各等分</small>  |                           |
| 右呖咀水薑煎服                          |                            |                           |                           |



|                               |                            |                            |                               |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 一方治婦人白帶                       | 龜板<br><small>炙</small>     | 枳子<br><small>兩各二</small>   | 黃栢<br><small>炒一兩</small>      |
|                               | 白芍藥<br><small>錢半七</small>  | 香附<br><small>兩半</small>    | 乾薑<br><small>錢炒二半</small>     |
| 山茱萸                           | 苦參                         | 椿根皮                        |                               |
| 貝母<br><small>兩各半</small>      |                            |                            |                               |
| 右為末酒糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下           |                            |                            |                               |
| 一方治白帶或時腹痛                     | 龜板<br><small>酒炙二兩</small>  | 黃栢<br><small>炒兩</small>    | 乾薑<br><small>錢炒一</small>      |
|                               |                            |                            |                               |
| 枳子<br><small>半二錢</small>      |                            |                            |                               |
| 右為末酒糊丸梧子大每服七十丸日服二次            |                            |                            |                               |
| 桂枝附子湯<br><small>方見傷寒門</small> | 黃連丸<br><small>方見痢門</small> | 芎歸湯<br><small>方見痔類</small> | 沉香降氣湯<br><small>方見諸氣門</small> |
| 血論                            | 血附<br><small>諸血</small>    |                            |                               |



人具此陰陽即有此血氣氣陽也血陰也男以陽為主則陽勝乎陰女以陰為主則陰勝乎陽氣血之為病男女則同耳人皆知百病生於氣又孰知血為百病之胎乎血猶水也水行乎地中百川理則無壅遏之患人之血脉一或凝滯於經絡腸胃之間百病由此而根矣乍寒乍熱發黃發斑譫妄驚狂煩悶嘔惡癡痰自汗闕熱虛勞尿淋漏崩吐衄咳唾以至眩運厥冷昏遺迷忘塊痛癢疼起止遺溺凡此數證非血而何經所謂先去其

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

血然後調之良有以也夫血得寒則閉澀得熱則宣流榮氣虛竭風冷交侵固易為虛勞月閉之證其若出血等類大抵多因蓄熱致之榮道一開解血亦為之不禁矣川芎當歸血中上藥也出血諸證每每以胃藥收功蓋心主血肝藏血胃者又所以生其血而能使真氣歸元故其血自止經又云乎血隨氣行氣逆則血逆於此尤當加意

### 血疾證治

血崩芎歸湯加南木香下震靈丹

血崩帶下膠艾湯以海螵蛸炙黃刮碎和入同煎吞產寶固經圓并局方澤蘭丸

血氣虛損腰腹疼痛當歸建中湯加南木香若自汗則去木香加人參白朮

嗽血咯血局方大阿膠圓加木香末少許畧煎食後服肺熱嗽血金沸草散方見咳嗽類加桑白皮天門冬去心同

煎乘熱調大阿膠圓服

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

霍亂吐瀉瀉血不止正料治中湯

方見諸氣類

大便下血芎歸湯加炒槐花

口舌出血槐花日乾為末傅之

血遇熱則宣流故止血多用涼藥然亦有氣虛挾寒陰陽不相為守榮氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必走是爾外證必有虛冷之狀法當溫中使血自歸於經絡可用理中湯加南木香或局方七氣湯方見諸氣類加川芎或甘草乾薑湯其效甚著又有飲食傷胃或胃虛不能傳



|                       |  |                       |  |                       |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 欽定四庫全書                |  | 仁齋直指                  |  | 卷二十六                  |  |
| 化其氣逆上亦令吐衄木香理中湯甘草乾薑湯通用 |  | 五丹圓治虛極而壅氣不歸元衄血喘嗽痰作來復丹 |  | 黑錫丹震靈丹金液丹各一貼養正丹二貼右件別研 |  |
| 細末米糊圓桐子大每服三十圓空心生料理中湯加 |  | 木香送下或沸湯調蘇合香圓下         |  | 方見諸                   |  |
| 出血諸證每以胃藥收功用木香理中湯或參苓白朮 |  | 散二分枳殼散一分              |  | 方見諸                   |  |
| 方四君子湯夾和小烏沉湯米湯調下已上並用薑棗 |  | 枳殼湯                   |  | 方見諸                   |  |
| 畧煎亦得右藥不惟養胃蓋以調氣輩與之並行若夫 |  | 桔梗枳殼湯                 |  | 方見諸                   |  |
| 蘇合香圓少許佐之又調氣之上藥也       |  | 蘇合香圓                  |  | 方見諸                   |  |
| 蘇沒沉麝丸治諸血諸氣痛不可忍        |  | 蘇沒沉麝丸                 |  | 方見諸                   |  |
| 血竭                    |  | 沒藥                    |  | 沉香                    |  |
| 辰砂                    |  | 木香                    |  | 麝香                    |  |
| 右生為末磁器熬生甘草膏丸如皂子大每一丸薑  |  | 鹽湯嚼下產後血痛氣痛並主之亦治脾痛     |  |                       |  |

|                      |  |                      |  |      |  |
|----------------------|--|----------------------|--|------|--|
| 欽定四庫全書               |  | 仁齋直指                 |  | 卷二十六 |  |
| 桂香丸治月事不調心腹刺痛寒熱間作     |  | 當歸鬚                  |  | 川芎   |  |
| 牡丹皮                  |  | 南木香                  |  | 細辛   |  |
| 辣桂                   |  | 延胡索                  |  | 乳香   |  |
| 沒藥                   |  | 白芷                   |  | 延胡索  |  |
| 右煮米醋將乳香沒藥為膏餘藥末之揉和為丸桐 |  | 子大每服七十丸續斷煎湯送下有熱多加生槐花 |  | 煎湯   |  |
| 調榮湯治瘀血不消臍腹引腰背俱痛      |  | 川芎                   |  | 當歸   |  |
| 生乾地黃                 |  | 三稜                   |  | 莪朮   |  |
| 白芷                   |  | 延胡索                  |  | 蒲黃   |  |
| 香附子                  |  | 澤蘭                   |  | 細辛   |  |
| 川白薑                  |  | 厚朴                   |  | 桃仁   |  |
| 辣桂                   |  | 半夏                   |  | 甘草   |  |
| 右剉散每服三錢薑棗煎食服         |  |                      |  |      |  |





|                                |  |                                     |  |                               |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 縮砂湯治胎動腹脇腰痛或忍痛失氣胎又不動或血水間下       |  | 桑寄生<br><small>兩各半</small>           |  | 當歸                            |  |
| 縮砂                             |  | 艾葉<br><small>炒</small>              |  | 阿膠<br><small>三錢 炒 酥 各</small> |  |
| 川芎                             |  | 甘草<br><small>二錢 各</small>           |  |                               |  |
| 南木香                            |  | 右剉散每服三錢薑五片棗兩枚煎服下血水者更以真料理中湯加縮砂佐之     |  |                               |  |
| 交濟散治血結作痛                       |  |                                     |  |                               |  |
| 生地黄<br><small>半斤 生取</small>    |  | 生薑<br><small>四兩 各洗淨同杵</small>       |  |                               |  |
| 右末每服二錢溫酒調下或男女血熱心煩或產後傷風則以荊芥煎湯調下 |  |                                     |  |                               |  |
| 小柴胡湯男女諸熱出血血熱蘊隆                 |  | 柴胡<br><small>二兩</small>             |  | 黃芩                            |  |
| 人參                             |  | 甘草<br><small>錢各七 半 夏 製六錢 一字</small> |  |                               |  |
| 右剉散每服三錢薑五片棗二箇烏梅一箇煎服            |  |                                     |  |                               |  |
| 桃仁承氣湯治男女下焦蓄血小腹急痛内外有熱大          |  |                                     |  |                               |  |

|                             |  |                            |  |                            |  |
|-----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| 便秘結                         |  | 大黃<br><small>兩半</small>    |  | 桂枝                         |  |
| 桃仁<br><small>皮浸去炒</small>   |  | 芒硝<br><small>別下各錢半</small> |  | 甘草<br><small>錢各二 半</small> |  |
| 右剉散分作三服每煎至臨熟入芒硝半錢再煎沸溫服以通利為度 |  |                            |  |                            |  |
| 甘草乾薑湯男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血   |  | 甘草<br><small>炙</small>     |  | 川白薑<br><small>炮各等分</small> |  |
| 右剉散每服三錢食前煎服                 |  |                            |  |                            |  |
| 加減四物湯治血氣不足肢體乏力或瘀血腹痛或下血過多    |  | 當歸                         |  | 川芎                         |  |
| 白芍藥                         |  | 乾薑<br><small>炒各兩半</small>  |  | 南木香                        |  |
| 右剉散每服三錢食前煎服若腹不痛則無瘀血更加人參又能益血 |  | 甘草<br><small>炒各二錢半</small> |  |                            |  |
| 半夏丸治吐血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿虛腫亦       |  |                            |  |                            |  |



消宿瘀百病通用

圓白半夏

刮淨搥扁以生薑汁調和飛白麪作軟餅包拵半夏慢火炙令色黃去麪取半夏為末

右末米糊丸菴豆大日乾每三四十圓溫熱水下

黑散子諸竅出血並主之

隔年蓮蓬

敗棕蘭

頭髮

並燒存性等分

右為末每服二錢煎南木香湯調下或只用棕蘭燒

灰米湯調下亦可

茅蘇湯治吐血衄血

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

茅花

錢三

紫蘇莖葉

錢二

右散新汲水一椀煎七分乘熱調生蒲黃二錢旋服仍

以大蒜兩顆煨熟搥扁貼兩脚心少頃自覺胃中

有蒜氣其血立止若下部出血可以煨蒜傳兩掌心

豆蘇湯治上焦有熱咯血瘀血煩悶燥渴

黑豆

合三

紫蘇莖葉

條二

烏梅

兩箇

右水大椀同煎臨熟入薑汁三大匙食後旋服

阿膠散治肺破嗽血唾血

人參

茯苓

生乾地黃

天門冬

水浸去心

北五味子

各一分

阿膠

炒酥

白及

錢各二

右白及別為末餘藥剉散每服三錢水大盞入蜜二

大匙秫米百粒薑五片同煎臨熟入白及少許食後服

地黃煎治肺損吐血嗽血

生地黃

四兩取汁

鹿角膠

一兩搗碎炒黃

右為末拌和每服三錢童子小便一盞煖熱入薑汁

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

少許調下無鹿膠則以透明阿膠炒酥代用

薏苡湯治肺癰唾吐膿血

薏苡

合二

黑豆

粒百

烏梅

一箇

右水二盞煎一盞入透明阿膠生蒲黃各一錢再煎

沸食後服

艾薑湯治大便下膿血

艾葉

握一

黑豆

粒百

右新水一大盞煎六分入生薑汁三大匙稍熱服



又方

黃連  
錢一

南木香  
錢一

右剉細慢火煎食前服

蒜連丸治諸血妄行

黃連  
為日  
末乾

獨頭蒜  
取一肉顆  
研煨細熟

右入米醋些子搗和為圓桐子大日乾每三四十圓

陳米飲下

人參湯治吐血咯血

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

新羅人參慢火煎服

又方

人參

川芎

茯苓

半夏  
製各  
三分

甘草  
炒分一

右剉每服三錢薑五片煎服

蘿蔔飲治諸熱吐血衄血

生蘿蔔取汁半盞入白鹽少許服之立效如無生蘿蔔

只用蘿蔔子一分微炒紫蘇莖葉半分剉散用煎亦效



血餘散治吐血衄血

頭髮燒存性

右研細每服二錢米湯調下衄者更以少許吹入鼻

小便出血則小腸氣秘氣秘則小便難其痛者謂之淋

不痛者謂之尿血

頭髮燒存性為末新汲水調下妙

又方

車前子但曬乾為末每二錢以車前子葉煎湯調

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

下

又方

海金砂為細末新汲水調下五淋散夾五苓散竹

園尿門冬草燈心葱頭煎湯調下

法製香附方治諸下血

大香附  
日杵乾去毛皮以童子小便浸一日夜

右為末每二錢米湯調下治冷帶用炒艾葉煎湯調

下



又方

淨香附酒醋各半煮透焙

右為末黃秫米糊圓桐子大每四五十丸米湯下

又方治血下帶下

香附

杵去皮二分童尿浸一日夜

艾葉

三分米醋煮透晒焙

右為末秫米糊圓桐子大每五六十丸艾醋湯或醋

湯下

燒鹽酒治血閉腹痛產後瘀血腹痛

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

新布數重包裹白鹽一合炭火燒存性

右研細末溫酒調下新布即青麻也能逐瘀血

桂枝酒治打撲傷墜瘀血悶悶身體疼痛

辣桂

右為末每二錢溫酒調下或用辣桂一分大黃當歸

各半分每三錢生薑紫蘇煎服取下黑物即安或未

有藥倉卒且服米醋一小盞亦散瘀血

朱砂丸治打撲驚忤血入心竅不能語言

朱砂為細末

右以雄猪心生血和圓麻子大日乾每服七圓石菖

蒲煎湯下棗湯亦可

咯血方

天門冬

去心

青黛

晒乾各四錢

生蒲黃

川薑黃

油髮灰

各錢

右末煉蜜丸桐子大每五十九丸入松陽柿中濕紙包

煨香候冷桑白皮煎湯臨卧嚼下柿能戀肺咯血屬

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

肺嘔血屬脾

九竅出血方

荊芥酒煎通口服

又方暴驚風九竅血其脈虛者

靈砂百粒分三次人參煎湯下

此證不可錯認血得熱則宣流妄用

涼藥誤矣

又方治傷寒嘔血繼而齒縫皆流血不止

開口川椒四十九粒



|                                |  |                          |  |                            |  |                                     |  |                       |  |           |  |                                                         |  |                                                           |  |                        |  |                                      |  |       |  |                                                    |  |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|--|----------------------------------------------------|--|
| 右用法醋大盞同煎臨熟入白礬少許漱口含在口中少頃吐出再啜漱而含 |  | 和劑芎歸湯治諸血作痛血暈沉迷血溢難產一切出血過多 |  | 川芎<br>當歸 <small>分等</small> |  | 右為粗散每服三錢水盞半取一盞稍熱服不拘時加縮砂治胎動腹痛漏血又名芎藭湯 |  | 膠艾湯治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不斷臍 |  | 腹疼痛經血淋瀝不斷 |  | 熟乾地黄<br>白芍藥 <small>各四兩</small><br>當歸 <small>去蘆頭</small> |  | 艾葉 <small>微炒各三錢</small><br>阿膠 <small>搗碎炒令黃燥</small><br>芎藭 |  | 甘草 <small>炙各二兩</small> |  | 右為粗末每服三錢水一盞酒六分煎至八分去滓熱服空心食前日三服病甚者連夜併服 |  | 產寶固經丸 |  | 赤石脂 <small>煨</small><br>艾葉<br>補骨脂 <small>炒</small> |  |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|--|----------------------------------------------------|--|

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十六



迪志文化出版有限公司出版

|                                                |  |                        |  |              |  |                                                                            |  |                                                                               |  |                                                        |  |                                                                       |  |                                   |  |                                                          |  |                                       |  |                                     |  |                             |  |                                   |  |                       |  |
|------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| 木賊 <small>各半兩</small><br>附子 <small>炮一枚</small> |  | 右末陳米飲和丸梧桐子大每服五十九食前溫酒送下 |  | 澤蘭丸治氣血不調肢體瘦弱 |  | 熟乾地黄 <small>半一兩</small><br>澤蘭 <small>枝去大梗</small><br>人參 <small>去蘆頭</small> |  | 黃耆 <small>去蘆頭剉</small><br>牛膝 <small>去蘆酒浸一宿焙</small><br>赤石脂 <small>各一兩</small> |  | 白茯苓 <small>皮去</small><br>木香<br>草薢 <small>酒浸一宿剉</small> |  | 附子 <small>炮去臍</small><br>續斷 <small>各三分</small><br>乾薑 <small>炮</small> |  | 肉桂 <small>去粗皮</small><br>芎藭<br>白朮 |  | 當歸 <small>去蘆酒浸一宿剉碎微炒</small><br>甘草 <small>炙微赤各半兩</small> |  | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十圓溫米飲下空心食前產一百日內每日常服壯氣益血 |  | 當歸建中湯治婦人一切血氣虛損 <small>方見虛汗門</small> |  | 和劑大阿膠丸 <small>方見咳嗽門</small> |  | 理中湯治胃脇逆冷心腹痞痛 <small>方見泄瀉門</small> |  | 和劑來復丹配類陰陽扶虛補損治心腹冷痛小兒慢 |  |
|------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十六



迪志文化出版有限公司出版



驚風或吐利不止變成虛風搐搦者非風也胃氣欲

絕故也用五粒研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇

湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡露下上及赤白

帶下並用醋湯下常服和陰陽益精神散腎陰濕止

腹脇冷疼應諸疾不辨陰陽證並宜服之方見暑門

震靈丹方見濕門

和劑黑錫丹升降陰陽暖脾補腎氣衝胃腹膨脹刺痛

方見痢冷門

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十六

和劑金液丹固其氣治衄血方見脾胃類

養正丹治婦人血氣帶下腹痛助陽接真升降陰陽方見痢冷門

小烏沉湯調中快氣治心腹刺痛

烏藥一兩去心 香附子沙盆內浙去皮毛焙乾秤二兩

甘草一分

右為細末每服一錢鹽少許或不沸湯點不拘時

參苓白朮散方見虛勞門

附諸血

諸血方論

內經曰大怒則形氣絕而血菀於上又曰怒則氣逆甚則吐血又曰陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血又曰濕淫汗出為皽衄又曰脾移熱於肝則為驚衄胞移熱於膀胱則癰而溺血又曰結陰者便血一升再結二升三結三升劉宗厚曰經云榮者水穀之精也和調五臟洒陳於六腑乃能入於脈也源源而來生化於脾總統於

欽定四庫全書  
仁齋直指  
卷二十六

心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脈少則濇充則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤為血也生化旺則諸經恃此而長養衰耗竭則百脈由此而空虛可不知謹養哉故經曰一息不運則機緘窮一毫不續則穹壤判若夫失於調護者或暴喜傷心暴怒傷



肝勞役太過飲酒墜積熱三焦以致陰火沸騰血從火起故錯經妄行而出諸竅是以從肺而上溢於鼻者曰衄血從胃而上溢於口者曰嘔血咯血唾血者出於腎也咳血嗽血出者出於肺也痰中帶血絲而出者或從腎或從肺來也又有血從毛孔出者曰肌衄血從齒出者曰牙宣其血出於小便來者曰溺血曰血淋出於大便者曰腸風痔血糞前來者曰近血糞後來者曰遠血流結於腸胃之間而成積者曰血瘕血蟻大抵血從

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

下流者為順易治血從上溢者為逆難治丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上而出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經矣夫治血必血屬之藥欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證輔佐謂之大合湯者詳言之矣余故陳其氣味專司之要不可不察如川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血



迪志文化出版有限公司出版

各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能和血治虛腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨證損益摘其一二味之所宜為主治可也此特論血病而求其血藥之屬者也若氣虛血弱又當從長沙血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物者獨能主血分受傷為氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

血痛所宜肉蓯蓉瑣陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾薑桂者血寒所宜生地苦參血熱所宜特取其證治大畧耳夫人生之血賴氣升降氣升則升氣降則降氣逆則逆氣和則和氣濁則亂如此失血豈不皆由氣濁遇熱妄行之所致也大抵治血莫先清氣氣清則血和氣濁則血亂斯言信矣大凡失血當先辨其血出何經當用此經清氣之藥然後涼血審其虛實調治之東垣云傷寒家



迪志文化出版有限公司出版

|                                                                                                          |  |                                                                    |  |                              |  |                              |  |                       |  |                 |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| <p>衄血者仲景言不可發汗蓋為脈微也若浮緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯脈已微者二藥俱不可用宜黃芩芍藥湯主之經曰諸見血身熱脈大者難治是火邪勝也身涼脈靜者易治是正氣復也故脈訣云鼻衄吐血沉細宜忽然脈大即傾危此之謂也</p> |  | <p>犀角地黄湯治傷寒汗下不解鬱於經絡隨氣湧泄為衄血或溝道閉塞流入胃腹吐出血如鼻衄吐血不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之</p> |  | <p>木香理中湯甘草乾薑湯治男婦飲食傷胃虛寒嘔吐</p> |  | <p>小柴胡湯茅蘇湯人參湯薤白湯血餘散治諸嘔吐血</p> |  | <p>三黃補血湯治初見血及血多宜服</p> |  | <p>熟地 生地 當歸</p> |  | <p>川芎 柴胡 黃耆</p> |  |
| <p>衄血</p>                                                                                                |  | <p>不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之</p>                                         |  | <p>木香理中湯甘草乾薑湯治男婦飲食傷胃虛寒嘔吐</p> |  | <p>小柴胡湯茅蘇湯人參湯薤白湯血餘散治諸嘔吐血</p> |  | <p>三黃補血湯治初見血及血多宜服</p> |  | <p>熟地 生地 當歸</p> |  | <p>川芎 柴胡 黃耆</p> |  |
| <p>衄血</p>                                                                                                |  | <p>不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之</p>                                         |  | <p>木香理中湯甘草乾薑湯治男婦飲食傷胃虛寒嘔吐</p> |  | <p>小柴胡湯茅蘇湯人參湯薤白湯血餘散治諸嘔吐血</p> |  | <p>三黃補血湯治初見血及血多宜服</p> |  | <p>熟地 生地 當歸</p> |  | <p>川芎 柴胡 黃耆</p> |  |

|                  |  |                                       |  |                  |  |                   |  |                |  |              |  |                              |  |                              |  |                                                          |  |
|------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|----------------|--|--------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| <p>牡丹皮 升麻 芍藥</p> |  | <p>右以水煎服血不止可加桃仁五分酒大黃斟酌虛實用之內却去柴胡升麻</p> |  | <p>人參 黃耆 五味子</p> |  | <p>白芍藥 甘草 當歸身</p> |  | <p>麥門冬 麥門冬</p> |  | <p>去滓稍熱服</p> |  | <p>麥門冬 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血</p> |  | <p>歸脾湯治思慮傷脾不能統攝心血以致反行或吐血</p> |  | <p>下血 是齋白朮散 治積熱吐血咳血若因飲食過度負重有傷脾胃而吐血者最宜服之惟忌食熱麵煎燂一切發風之物</p> |  |
| <p>牡丹皮 升麻 芍藥</p> |  | <p>右以水煎服血不止可加桃仁五分酒大黃斟酌虛實用之內却去柴胡升麻</p> |  | <p>人參 黃耆 五味子</p> |  | <p>白芍藥 甘草 當歸身</p> |  | <p>麥門冬 麥門冬</p> |  | <p>去滓稍熱服</p> |  | <p>麥門冬 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血</p> |  | <p>歸脾湯治思慮傷脾不能統攝心血以致反行或吐血</p> |  | <p>下血 是齋白朮散 治積熱吐血咳血若因飲食過度負重有傷脾胃而吐血者最宜服之惟忌食熱麵煎燂一切發風之物</p> |  |
| <p>牡丹皮 升麻 芍藥</p> |  | <p>右以水煎服血不止可加桃仁五分酒大黃斟酌虛實用之內却去柴胡升麻</p> |  | <p>人參 黃耆 五味子</p> |  | <p>白芍藥 甘草 當歸身</p> |  | <p>麥門冬 麥門冬</p> |  | <p>去滓稍熱服</p> |  | <p>麥門冬 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血</p> |  | <p>歸脾湯治思慮傷脾不能統攝心血以致反行或吐血</p> |  | <p>下血 是齋白朮散 治積熱吐血咳血若因飲食過度負重有傷脾胃而吐血者最宜服之惟忌食熱麵煎燂一切發風之物</p> |  |

|                                          |                         |                             |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 白朮<br><small>二兩</small>                  | 人參<br><small>去蘆</small> | 白茯苓<br><small>去皮</small>    |
| 黃耆<br><small>蜜浸各一兩</small>               | 山藥                      | 百合<br><small>去心各七錢半</small> |
| 甘草<br><small>炙半兩</small>                 | 柴胡                      | 前胡<br><small>各二錢半</small>   |
| 右咬咀每服三錢水一鍾薑三片棗一枚煎六分溫服                    |                         |                             |
| 黃連解毒湯三黃丸治積熱吐血咽膈不利<br><small>並見火門</small> |                         |                             |
| 龍腦雞蘇丸治膈熱咳嗽或吐血衄血<br><small>方見積熱門</small>  |                         |                             |
| 茯苓補心湯治心虛為邪氣所傷吐血<br><small>方見虛勞門</small>  |                         |                             |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷二十六</small>        |                         |                             |
| 四生圓<br><small>良方</small> 治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行   |                         |                             |
| 生荷葉                                      | 生艾葉                     | 生栢葉                         |
| 生地黃<br><small>各等分</small>                |                         |                             |
| 右研爛丸如雞子大每服一九水三鍾煎至一鍾濾過溫服                  |                         |                             |
| 藕汁散<br><small>濟生方</small>                | 治吐衄不止                   |                             |
| 生藕汁                                      | 生地黃汁                    | 大薊汁<br><small>各三合</small>   |
| 生蜜<br><small>半匙</small>                  |                         |                             |

|                                           |                             |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 右件藥汁調和令勻每服一小鍾不拘時候                         |                             |                              |
| 雙荷散<br><small>聖惠方</small>                 | 治卒暴吐血                       |                              |
| 藕節<br><small>七箇</small>                   | 荷葉頂<br><small>七箇</small>    |                              |
| 右同蜜搗細水二鍾煎八分去滓溫服或研末蜜調下                     |                             |                              |
| 枇杷葉散治暑毒攻心嘔吐鮮血<br><small>方見中暑門</small>     |                             |                              |
| 側栢散治內損吐血下血因酒太過勞傷於內血氣妄行其血如湧泉口鼻皆流須臾不救服此即安又治 |                             |                              |
| 欽定四庫全書<br><small>仁齋直指卷二十六</small>         |                             |                              |
| 男子婦人九竅出血                                  |                             |                              |
| 人參<br><small>去蘆</small>                   | 荊芥穗<br><small>燒灰各一兩</small> | 側栢葉<br><small>蒸乾一兩五錢</small> |
| 右為末每服三錢入飛羅麵三錢拌和汲水調粘相似啜服                   |                             |                              |
| 一方治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衄血                         |                             |                              |
| 葛花<br><small>二兩</small>                   | 黃連<br><small>四兩</small>     |                              |
| 右為末以大黃末熬膏子丸如梧桐子大每服一百丸溫湯下或煎服亦可             |                             |                              |



衄血

丹溪云涼血行血為主大抵與吐血同

犀角地黄湯入鬱金黃芩升麻煎服

金液丹

方和劑

固真氣治衄血

方見氣血門

生地黃散

方河間

治鬱熱衄血或咯吐血皆治之

枸杞

柴胡

黃連

地骨

白芍

甘草

天門冬

黃芩

黃耆

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

生地

熟地

各分

右咬咀水煎服若下血加地榆

茜根散黃芩芍藥湯治鼻衄不止

方並見鼻門

鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出凡鼻衄並以

茅花調止衄散時進折二泔仍令以麻油滴於鼻或

以蘿蔔汁滴入亦可又茅花白芍藥對半尤好外迎

法以井花水濕紙頂上貼之左鼻衄以線扎左手中

指右出扎右手中指俱出兩手俱扎或炒黑蒲黃吹

鼻中或龍骨末亦可

止衄散

黃耆

錢六

赤茯苓

白芍藥

當歸

生芩

阿膠

各三錢

右為末每服二錢食黃耆湯調下

麥門冬飲治鼻衄川芎三黃散治實熱衄血

並見鼻門

清肺飲

方試効

治衄血吐血久不愈者

五味子

十箇

麥門冬

當歸身

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

人參

生地黃

各五分

黃耆

二錢

右咬咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓食後溫服用

三稜針氣街出血立愈

一方治鼻衄不止

用茅花塞鼻中外用茅花濃煎湯服

咯唾血

咯唾血者由於腎也又有瘀血內積肺氣壅遏不能下

降用天門冬麥門冬知母貝母桔梗黃柏熟地黃遠志





|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 百部或加乾薑丹溪云痰帶血絲出者用薑汁青黛童便竹瀝入血藥中用如四物湯加地黃膏牛膝膏之類主之 |           |
| 阿膠圓治肺破嗽血唾血                                   |           |
| 方見前<br>氣血門                                   |           |
| 一方治痰中見血                                      |           |
| 牡丹皮                                          | 白朮        |
|                                              | 各一錢<br>五分 |
| 當歸                                           |           |
| 芍藥                                           | 桃仁        |
|                                              | 研         |
| 貝母                                           |           |
|                                              | 各一錢       |
| 山梔                                           | 黃芩        |
| 炒<br>黑                                       | 各八分       |
| 桔梗                                           |           |
|                                              | 七分        |
| 欽定四庫全書                                       |           |
| 仁齋直指                                         |           |
| 卷二十六                                         |           |
| 甘草                                           | 青皮        |
| 三分                                           | 五分        |
| 又方治痰中血                                       |           |
| 右以水煎服                                        |           |
| 牡丹皮                                          | 白朮        |
|                                              | 各一錢<br>五分 |
| 貝母                                           |           |
| 芍藥                                           | 桑白皮       |
|                                              | 研各一錢      |
| 甘草                                           | 桃仁        |
| 三分                                           | 研各一錢      |
| 山梔                                           |           |
| 炒黑一分                                         |           |
| 右以水煎服                                        |           |
| 又方治痰中血                                       |           |

|   |  |                       |  |                      |  |       |  |                       |  |                  |  |       |  |     |  |     |  |                 |  |    |  |    |  |    |  |     |  |        |  |      |  |      |  |     |  |      |  |     |  |    |  |    |  |    |  |     |  |     |  |    |  |    |  |                      |  |      |  |     |  |                      |  |                       |  |
|---|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------|--|-----------------------|--|------------------|--|-------|--|-----|--|-----|--|-----------------|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|--------|--|------|--|------|--|-----|--|------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|----|--|----|--|----------------------|--|------|--|-----|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| 門 |  | 茯苓補心湯治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五 |  | 心煩熱咳嗽唾血及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜治之 |  | 方見虛勞門 |  | 人參芎歸湯治虛勞少血津液內耗心火自炎燥熱乘 |  | 肺咳嗽咯血及血不榮肌動輒毛寒咳嗽 |  | 方見咳嗽門 |  | 雞蘇圓 |  | 方拔粹 |  | 治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血 |  | 黃耆 |  | 防風 |  | 荊芥 |  | 各一兩 |  | 欽定四庫全書 |  | 仁齋直指 |  | 卷二十六 |  | 雞蘇葉 |  | 八兩即金 |  | 錢薄荷 |  | 川芎 |  | 甘草 |  | 菊花 |  | 生地黃 |  | 各半兩 |  | 片腦 |  | 五分 |  | 右為末煉蜜丸如彈子大每服一九用麥門冬去心 |  | 煎湯送下 |  | 牙宣血 |  | 戴氏曰牙宣有二證有風壅牙宣有腎虛牙宣風壅 |  | 宣消風散擦之仍服腎虛牙宣以腎主骨牙者骨之餘 |  |
|---|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------|--|-----------------------|--|------------------|--|-------|--|-----|--|-----|--|-----------------|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|--------|--|------|--|------|--|-----|--|------|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|-----|--|-----|--|----|--|----|--|----------------------|--|------|--|-----|--|----------------------|--|-----------------------|--|



|                       |  |                       |  |           |  |     |  |       |  |     |  |     |  |     |  |      |  |    |  |                       |  |           |  |       |  |        |  |      |  |      |  |            |  |    |  |                       |  |                       |  |    |  |                       |  |            |  |        |  |               |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|----|--|-----------------------|--|-----------|--|-------|--|--------|--|------|--|------|--|------------|--|----|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----|--|-----------------------|--|------------|--|--------|--|---------------|--|
| 虛而上炎故宣服涼劑而愈甚者此屬腎經下虛上盛 |  | 宜鹽湯下安腎丸間黑錫丹仍用薑鹽炒香附黑色為 |  | 末揩擦其妙不可言也 |  | 消風散 |  | 方見傷風門 |  | 安腎丸 |  | 方見水 |  | 黑錫丹 |  | 方見冷門 |  | 肌衄 |  | 巢氏曰肝藏血心之液為汗言肝心俱傷於邪故血從 |  | 膚腠而出也名曰肌衄 |  | 一方治肌衄 |  | 欽定四庫全書 |  | 仁齋直指 |  | 卷二十六 |  | 用男胎髮燒灰盒之立效 |  | 溺血 |  | 巢氏云心主於血與小腸合若心家有熱結於小腸故 |  | 小便血也血虛者四物湯加牛膝膏實者當歸承氣湯 |  | 下之 |  | 琥珀散治尿血增味導赤散治血淋尿血瞿麥湯薑蜜 |  | 湯五苓散並治小便尿血 |  | 方並見諸淋門 |  | 小蘗飲子治下焦結熱血淋尿血 |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------|--|-----|--|-------|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|--|----|--|-----------------------|--|-----------|--|-------|--|--------|--|------|--|------|--|------------|--|----|--|-----------------------|--|-----------------------|--|----|--|-----------------------|--|------------|--|--------|--|---------------|--|



|                                                           |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 生苻                                                        | 小薊                   | 滑石                  |
| 通草                                                        | 淡竹葉                  | 蒲黃 <small>炒</small> |
| 藕節                                                        | 當歸 <small>酒浸</small> | 梔子 <small>炒</small> |
| 甘草 <small>炙各半兩</small>                                    |                      |                     |
| 右用水煎空心服                                                   |                      |                     |
| 當歸承氣湯                                                     |                      |                     |
| 當歸                                                        | 厚朴                   | 枳實                  |
| 大黃                                                        | 芒硝                   |                     |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十六                                    |                      |                     |
| 右剉水煎                                                      |                      |                     |
| 便血                                                        |                      |                     |
| 大便下血者皆由五臟傷損所為臟氣既傷則風邪易入積熱在內而大便下血治宜四物湯加炒山梔升麻秦艽阿膠虛者加乾薑溫散之    |                      |                     |
| 法製香附方治諸下血 <small>方見氣血門</small> 黃連香薷飲治伏暑純                  |                      |                     |
| 下鮮血 <small>方見暑門</small> 敗毒散治風熱流入大腸經下血不止 <small>方見</small> |                      |                     |
| 中寒胃風湯治風濕乘虛入於腸胃或下瘀血 <small>方見痢門</small>                    |                      |                     |

|                                     |                       |     |
|-------------------------------------|-----------------------|-----|
| 當歸和血散治腸癖下血濕毒下血                      |                       |     |
| 槐花                                  | 青皮 <small>錢各六</small> | 當歸身 |
| 升麻 <small>錢各二</small>               | 荊芥穗                   | 熟地黃 |
| 白朮 <small>錢各六</small>               | 川芎 <small>錢四</small>  |     |
| 右為末每服二三錢清米飲調下                       |                       |     |
| 一方治中毒下血                             |                       |     |
| 用蝟皮燒存性研細每服二錢水調下日進三服                 |                       |     |
| 腸風下血方別有腸風門類故不載矣                     |                       |     |
| 欽定四庫全書<br>仁齋直指<br>卷二十六              |                       |     |
| 拾遺                                  |                       |     |
| 腋氣方                                 |                       |     |
| 明白礬 黃丹入麝少許末之傅                       |                       |     |
| 又方                                  |                       |     |
| 白礬研飛過臨卧以紙襯棹上伸手托壁柱以礬擦腋下令熱痛即換衣着舊衣用灰汁洗 |                       |     |
| 又方                                  |                       |     |
| 好綠礬半生半煨為細末入少輕粉研細每半錢                 |                       |     |



匕浴後以生薑汁調擦候十分熱痛即止

又方治腋下遺臭不可向邇

大蜘蛛一箇以黃泥入少赤石脂并鹽杵為窠子

納裹蜘蛛燒令通紅候冷取蜘蛛研細入輕粉一

字米醋調膏臨卧浴淨傳之腋下早早瀉黑汁惡

物為効埋之僻處

又方夜明砂為末用豉汁調傳

跌破出血方烏賊魚骨細末傳亦治湯火傷爛

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

頭破傷風方大南星末水調塗四圍水出為効

失欠頰骨差方恣酒令醉通關散入鼻嚏即止

脚筋冷縮頑痺方大川椒

去肉二分  
炒出汗

辣桂

川白薑

華陰細辛  
各一分

右為末酒麪糊圓桐子大每七十圓食前溫酒下

附諸雜方

體氣方

田螺散治體氣

患此疾者因  
內有油濕是



迪志文化出版有限公司出版

用大田螺一枚水中養之俟靨開以巴豆一粒去殼  
將針挑巴豆放在內取去拭乾仰頓蓋內夏月一宿  
冬月五七宿自然成水取搽腋下絕根

一方先用臙脂搽腋下其出狐臭之處黃色就將前說

巴豆田螺去靨掩於狐臭之上絹帛勒緊其狐臭從

大便出則絕根矣

一方

用熟蒸餅一箇擘開作兩邊搽蜜陀僧細末一錢急

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

夾在腋下畧睡少時候冷熱之除根

附倒倉法

倒倉法治癰勞蠱癩等證推陳致新扶虛補損可吐可

下用黃色肥牯牛腿精肉二十斤或十五斤順取長流

急水於大鍋內煮候水乾少再添湯不可用冷水以肉爛

成粥為度濾去滓用肉湯再熬如琥珀色隔宿不喫晚

飯大便秘者隔宿進神芎丸不秘者不用五更於密室

不通風處溫服一鍾伺隔間藥行又續續服至七八鍾



迪志文化出版有限公司出版

病人不欲服強再與之必身體皮毛皆痛方見吐下寒月則重湯溫之病在上欲吐多者須緊服又不可太緊恐其不納病在下欲利多者須疎服又不可太疎恐其不達臨時消息大抵先見下方可使吐須極吐下伺其上下積俱出盡在大便中見如胡桃肉狀無臭氣則止吐利後或渴不得與湯其小便必長取以飲病者名曰輪迴酒與一二椀非惟可以止渴抑亦可以滌盪餘垢睡一二日覺飢甚乃與粥淡食之待三日後始與少菜

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

羹自養半月覺精神煥發形體輕健沉痾悉安矣大概中間飲至七八鍾時藥力經涉經絡骨節搜逐宿垢正邪寧不牴牾悉有急悶似痛非痛自然惡况此皆好消息邪不能勝正將就擒耳尤須寧耐忍受又於欲吐未吐欲泄未泄交作皆有惱聒意思皆須歡喜樂受一以靜處之此等有大半日景象不先說知使方寸瞭然鮮有不張皇者矣未行此法前一月不可近婦人已行此法半年不可近婦人五年不可喫牛肉性急好淫不守



迪志文化出版有限公司出版

禁忌者皆不可行此法倒倉全在初起三鍾慢飲最緊要能行經隧中去丹溪曰腸胃為市以其無物不有而穀為最多故曰倉倉積穀之室也倒者傾去積垢而滌濯使之潔淨也經曰胃為受盛之官故五味入口即入於胃留毒不散積聚既久致傷冲和諸病生焉今用黃牯牛肉其義至矣夫牛坤土也黃土之色也以順為德而効法乎健以為功者壯之用也肉者胃之藥也熟而為液無形之物也橫散入肉絡由腸胃而滲透肌膚毛

欽定四庫全書

仁齋直指  
卷二十六

竅爪甲無不入也積聚久則形質成依附腸胃回薄曲折處以為栖泊之窠白阻礙津液氣血重蒸燔灼成病自非剖腸刮骨之神妙孰能去之又豈合勺銖兩之丸散所能窺犯其藩牆戶牖乎夫牛肉全重厚和順之性潤枯澤槁豈有損也其方出於西域之異人人於中年後行一二次亦却疾養壽之一助也

附取吐方

獨聖散治中風痰迷心竅癲狂煩亂人事昏沉痰涎壅



迪志文化出版有限公司出版



盛及治五癰心風等證

瓜蒂 不拘多少

右為細末每服一錢以蘆汁調下

四靈散治證同前

瓜蒂 錢一

人參蘆 錢二

赤小豆

甘草 錢各半

右為細末每服一二錢或少至半錢量情與之食後

蘆汁調下

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

四玄散治證同前

綠礬

赤小豆

猪牙皂角 不蛀者去皮弦炙

明礬 錢二

葱管藜蘆 錢五

右為細末每服半錢或一二錢漿水調下如牙關緊

閉幹開灌之

魚骨鯁方

魚骨鯁用砂糖白炭皮末紫蘇葉滑石末和丸含口中

津液嚥下骨白隨下



迪志文化出版有限公司出版

一方治魚刺骨鯁在喉內

用山查樹獨根向下者與玉簪花根同搗取自然汁

用匙或竹筒盛汁送入口內不可着牙着牙皆化累

驗

附自縊法

凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安被卧

之以一人用脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使

緩縱一人以手按據胸上數摩動之一人摩捋臂脛

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹如此一時頃

雖得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂

湯及粥清灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管

吹其兩耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可

救自暮至旦陰氣盛為難救爾

附救凍死法

凡四肢直口噤只有微氣者用大釜炒灰煖以囊盛熨

心上冷即換之目開氣出然後以粥清稍稍進之若



迪志文化出版有限公司出版

不先溫其心便將火炙則冷氣與火爭必死

孫真人救落水法

醫方大成

急解去死人衣帶艾灸臍中即活

一方治風狗咬

用小兒胎髮炒新香附子野菊花研細酒調服盡醉

欽定四庫全書



仁齋直指  
卷二十六

仁齋直指卷二十六



迪志文化出版有限公司出版