

文淵閣 四庫全書 電子版



病機氣宜保命集

【子部】



迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：病機氣宜保命集》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：<http://www.dheritage.com>
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand 版本，請瀏覽迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

子部五

保命集

醫家類

提要

臣等謹案保命集三卷金張元素撰元素字

潔古易州人八歲應童子舉二十七試進士

以犯廟諱下第乃去而學醫精通其術因抒

所心得述為此書凡分三十二門首原道原

脈攝生陰陽諸論次及處方用藥次第加減

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
提要

君臣佐使之法於醫理精蘊闡發極為深至

其書初罕傳播金末楊威始得其本刊行之

而題為河間劉完素所著明初寧王權重刊

亦沿其誤并偽撰完素序文詞調於卷首以

附會之至李時珍作本草綱目始糾其謬而定

為出於元素之手於序例中辨之甚明考李

濂醫史稱完素嘗病傷寒八日頭痛脈緊嘔

逆不食元素往候令服某藥完素大服如其

言遂愈元素自此顯名是其造詣深邃足以

自成一家原不必託完素以為重今特為改

正其偽託之序亦並從刪削焉乾隆四十六

年五月恭校上

總纂官

臣

紀昀

臣

陸錫熊

臣

孫士毅

總校官

臣

陸

費

墀

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
提要



保命集原序

天興末予北渡寓東原之長清一日過前太醫王慶先
家於几案間得一書曰素問病機氣宜保命集試閱之
廼劉高尚守真先生之遺書藁也其文則出自內經中
摭其要而述之者朱塗墨注凡三卷分三十二門門有
資次合理契經如原道則本性命之源論脉則盡死生
之說攝生則語存神養氣之理陰陽則講抱元守一之
妙病機則終始有條有例治病之法盡于此矣本草則
欽定四庫全書
原序
病機氣宜保命集

三書相為表裏非曰後之醫者龜鏡歟至如平昔不治
醫書者得之隨例驗證度已處藥則思亦過半矣予謂
是書雖在農夫工販緇衣黃冠儒宗人人家置一本可
也若已有病尋閱病源不至亂投湯劑况醫家者流
哉惜哉先生卒書不世傳使先生之道竊入小人口以
為己書者有之予憫先生道屏翳于茆茨荆棘中故存
心精校今數年矣命工鏤板擬廣世傳使先生之道出
于茆茨荆棘中亦起世膏肓之一端也歲辛亥正月望
日大鹵楊威序

欽定四庫全書
原序
病機氣宜保命集



欽定四庫全書

保命集卷上

金 張元素 撰

原道第一

經曰觀天之道執天之行盡矣蓋天一而地二北辨而南交入精神之運以行矣擬之於象則水火也畫之於卦則坎離也兩者相須彌滿六合物物得之況於人乎蓋精神生於道者也是以上古真人把握萬象仰觀日

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上

月呼吸元氣運氣流精脫骨換形執天機而行六氣分地紀而運五行食乳飲血省約儉育日夜流光獨立守神肌肉若一故能壽比天地無有終時此其道生之要也夫道者能却老而全形身安而無疾夫水火用法象也坎離交言變也萬億之書故以水為命以火為性土為人人為主性命者也是以主性命者在乎人去性命者亦在乎人何則脩短壽夭皆自人為故經曰精神內守病安從來又曰務快其心逆於生樂所以然者性命

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上

在乎人故人受天地之氣以化生性命也是知形者生之舍也氣者生之元也神者生之制也形以氣充氣耗形病神依氣位氣納神存修真之士法於陰陽和於術數持滿御神專氣抱一以神為車以氣為馬神氣相合可以長生故曰精有主氣有元呼吸元氣合於自然此之謂也智者明乎此理吹噓呼吸吐故納新熊經鳥伸導引按蹻所以調其氣也平氣定息握固凝想神宮內視五臟昭徹所以守其氣也法則天地順理陰陽交媾坎離濟用水火所以交其氣也神水華池含虛鼓漱通行榮衛入於元宮溉五臟也服氣於朝閉息於暮陽不欲迭陰不欲覆鍊陰陽也以至起居適早晏出處協時令忍怒以全陰抑喜以全陽泥丸欲多櫛天鼓欲常鳴形欲常鑑津欲常咽體欲常運食欲常少眼者身之鑑也常居欲頻修耳者體之牖也城郭欲頻治面者神之庭也神不欲覆髮者腦之華也腦不欲減體者精之元也精不欲竭明者身之寶也明不欲耗補瀉六腑陶鍊



五精可以固形可以全生此皆修真之要道也故修真之要者水火欲其相濟土金欲其相養是以全生之術形氣貴乎安安則有倫而不亂精身貴乎保保則有要而不耗故保而養之初不離於形氣精神及其至也可以通神明之出神明之出皆在於心獨不觀心為君主之官得所養則血脈之氣王而不衰生之本無得而搖也神之變無得而測也腎為作強之官得所養則骨髓之氣榮而不枯蟄封藏之本無得而傾也精之處無得

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上

而奪也夫一身之間心居而守正腎下而立始精神之居此宮不可太勞亦不可太竭故精太勞則竭其屬在腎可以專嗇之也神太用則勞其藏在心靜以養之唯靜專然後可以內守故昧者不知於此欲拂自然之理謬為求補之術是以偽勝真以人助天其可得乎

原脈第二

道之渾淪莫知其源然至道無言非立言無以明其理大象無形非立象無以測其奧道象之妙非言不明嘗

試原之脈者何也非氣非血動而不息榮行脈中衛行脈外經曰脈者血之府也自素問而下迄至於今經所不載無傳記而莫聞其名焉然而玄機奧妙聖意幽微雖英俊明哲之士非輕易可得而悟也夫脈者果何物乎脈者有三名一曰命之本二曰氣之神三曰形之道經所謂天和者是也至於折一支瞽二目亦不為害生而脈不可須臾失失則絕命害生矣經曰春弦一曰夏洪一口秋毛一曰冬石一曰此言正脈同天真造化之

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上

元氣也巡於春夏秋冬木火金水之位生長收藏和相應故稟二儀而生不離於氣故脈有生死之驗經曰脈者血之府也如世之京都州縣有公府廨署也國因置者所以禁小人為非道也公府不立則善者無以伸其枉惡者無以罰其罪邪正混同賢愚雜處而亂之根也經曰五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也既陰陽為神明之府脈為血之府而明可見焉血之無脈不得循其經絡部分



周流於身滂流奔迫或散或聚氣之無脈不能行其筋骨臟腑上下或暴或蹶故經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故氣化則物生氣變則物易氣盛則物壯氣弱則物衰氣絕則物死氣正則物和氣亂則物病皆隨氣之盛衰而為變化也脈字者從肉從永從辰從血四肢百骸得此真元之氣血肉筋骨爪髮榮茂可以倚憑而能生長也長久永固之道故從肉從水者是也從辰從血者巡之如水分流而布遍周身無所不通

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

也釋名曰脈幕也如幔幕之遮覆也幕絡一體之形

導太一真元之氣也元氣者在氣非寒非熱非暖非涼在脈者非長非鈞非濇非沉不為氣而浮沉不為血而流停乃沖和自然之氣也故春溫夏熱秋涼冬寒所以然者為元氣動而不息巡於四方木火金水之位溫涼寒暑之化生生相續新新不停日月更出四序迭遷脈不為息故人有身形之後五藏既生身中元氣即生焉故春弦夏洪秋毛冬石此四時之氣也而脈者乃在其

中矣道德經曰視之不見聽之不聞搏之不得迎之不見其首隨之不見其後此如脈之謂也又云埏埴以為器當其無有器之用故有之以為利無之以為用又曰吾不知其名字之曰道強為之名曰大斯立脈之名之本意也故道者萬物之奧脈者百骸之靈奧靈之妙其道乃同元氣者無器不有無所不至血因此而行氣因此而生故榮行脈中衛行脈外瞻之在前忽焉在後而不置者皆由於脈也分而言之曰氣曰血曰脈統而言之惟

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

脈運行血氣而已故經曰血氣者人之神不可不謹養也陰陽別論曰所謂陽者胃脘之陽也此陽者言脈也胃者土也脈乃天真造化之元氣也若土無氣何以生長收藏若氣無土何以養化萬物是無生滅也以平人之氣常稟於胃正理論曰穀入於胃脈道乃生陰陽交會胃和脈行人稟天地之候故春胃微弦曰平但弦而無胃曰死夏胃微鈞曰平但鈞而無胃曰死長夏微稟曰平但弱而無胃曰死秋胃微毛曰平但毛而無胃曰



死冬胃微石曰平但石而無胃曰死陰者真藏也見則為敗敗則必死五藏為陰肝脈至中而無外急如循刀刃責責然如按琴絃心脈至堅而搏如循薏苡仁累累然肺脈至大而虛如毛羽中人皮膚腎脈至搏而絕如以指彈石辟辟然脾脈弱而乍數乍疎夫如此脈者皆為藏脈而獨見而無胃脈五藏皆至懸絕而死故經曰別於陽者知病忌時別於陰者知生死之期故人性候躁急懷促遲緩與弱長短大小皮堅肉厚各隨其狀而脈應之常以一息四至為準者言呼出心與肺吸入腎與肝五者胃兼主四旁在呼吸之間也數則為熱遲則為寒如天之春秋二分陰陽兩停晝夜各得五十度自此添一遭則熱減一遭則寒脈之妙道從此可知矣或如散葉或如然薪或如丸泥或如絲縷或如湧泉或如土頽或如偃刀或如轉索或如遊魚假使千變萬化若失常者乃真元之氣離絕五臟六腑不相管轄如喪家之狗元氣散失而命絕矣經曰積陽為天積陰為地陽

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上

化氣陰成形此言一氣判而清濁分也元氣者天地之本天和者血氣之根華陀云脈者謂血氣之先也孔子曰天不言而四時行焉百物生焉而脈亦如之又經曰自古通天者生之本皆通乎天氣也通天者謂通元氣天真也然形體者假天地之氣而生故奉生之氣通計於天稟受陰陽而為根本天地合氣命之曰人天氣不絕真靈內屬動靜變化悉與天通易云乾坤成列而易立乎其中矣故天地之體得易而後生天地之化得易而後成故陽用事則春生夏長陰用事則秋收冬藏寒往則暑來暑往則寒來始而終之終而復始天地之化也而易也默然於其間而使其四序各因時而成功至於寒不陵暑暑不奪寒無愆陽伏陰之變而不至於大肅大溫故萬物各得其沖氣之和然後不為過而皆中節也道德經曰萬物負陰而抱陽沖氣以為和百姓日用而不知斯脈之道也故脈不得獨浮沉獨大小獨盛衰獨陰陽須可沉中有浮浮中有沉大中有小小中有

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上



大盛中有衰衰中有盛陰中有陽陽中有陰充塞一身之中盈溢百骸之內無經絡不有無氣血不至養筋骨毛髮堅壯膩澤非心非腎非肝非脾五藏之盛真氣固密不為邪傷若憂愁思慮飢飽勞逸風雨寒暑大驚卒恐真氣耗亂血氣分離為病之本噫夫萬物之中五常皆備審脈之道而何獨無五常備邪夫仁固衛一身充盈五藏四肢百骸皆得榮養無沖和之氣獨真藏脈見則死矣生則不見死則脈見好生惡死此仁之謂也分

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上

布軀體和調氣血貴之在頭目耳鼻賤之在蹠臀陰纂不得上而有不得下而無無所不施無所不至此義之謂也長人脈長短人脈短肥人脈沉瘦人脈浮大人脈壯小人脈弱若長人短短人長肥人浮瘦人沉大人弱小人壯夫如此者皆不中理而為病此禮之謂也見在寸則上病見在關則中病見在尺則下病五藏有疾各有部分而脈出見不為潛藏伏匿一一得察有餘不足而愈其病此智之謂也春弦夏洪秋毛冬石太陽之至

其脈沉太陰之至其脈大而長少陰之至其脈鉤陽明之至其脈濇而短少陽之至其脈浮厥陰之至其脈弦四序不失其期六氣為常準者此信之謂也非探賾索隱鈎深致遠學貫天人旁通物理者未能達於此矣

攝生論第三

論曰內經謂法於陰陽和於術數飲食有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去今時之人不然也以酒為漿以妄為常醉以入房以欲

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上

竭其精以耗散其真不知持滿不時御神務快其心逆於生樂起居無節故半百而衰也且飲食起居乃人生日用之法縱恣不能知節而欲傳精神服天氣者不亦難乎又經曰飲食自倍腸胃乃傷起居如驚神氣乃浮是以聖人春木旺以膏香助脾夏火旺以膏臊助肺金用事膳膏腥以助肝水用事膳膏膻以助心所謂因其不勝而助之也故食飲之常保其生之要者五穀五果五畜五菜也脾胃待此而倉廩備三焦待此而道路通



榮衛待此以清以濁筋骨待此以柔以正故經云蓋五味相濟斯無五宮之傷所以養其形也雖五味為之養形若味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於甘心氣喘滿色黑腎氣不衝味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛筋骨沮弛精神乃失所謂失五味之常而損其形也王注曰味有倫緣臟有偏絕此之謂也飲食者養其形起居者調其神是以聖人春三月夜卧早起被髮緩形見於發生之時且欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷上

曰以使志生夏三月夜卧早起無厭於日見於蕃秀之時且曰使志無怒使氣得泄秋三月早卧早起與鷄俱興見於容平之時收斂神氣且曰使志安寧以應秋氣冬三月早卧晚起去寒就溫見於閉藏之時且曰使志若伏若匿若有私意若已有得此順生長收藏之道春夏養陽秋冬養陰順四時起居法所以調其神也經所謂逆於春氣則少陽不生肝氣內變逆於夏氣則太陽不長心氣內涸逆於秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆於

冬氣則少陰不藏腎氣獨沉此失四時之氣所以傷其神也智者順四時不逆陰陽之道而不失五味損益之理故形與神俱久矣乃盡其天年而去與夫務快其心逆於生樂者何足與語此道哉故聖人行之賢者佩之豈虛語哉

陰陽論第四

論曰天地者陰陽之本也陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也故陰陽不測謂之神神用無方謂之聖儻不如此以為天自運乎地自處乎豈足以語造化之全功哉大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生所以天為陽地為陰水為陰火為陽陰陽者男女之血氣水火者陰陽之徵兆惟水火既濟血氣變革然後剛柔有體而形質立焉經所謂天覆地載萬物悉備莫貴於人人稟天地之氣生四時之法成故人生於地懸命於天人生有形不離陰陽蓋人居天之下地之上氣交之中不明陰陽而望延年未之



有也何則蒼天之氣不得無常也氣之不襲是謂非常
非常則變矣王注曰且蒼天布氣尚不越於五行人在
氣中豈不應於天道左傳曰違天不祥繫辭云一陰一
陽之謂道老子曰萬物負陰而抱陽故偏陰陽謂之疾
夫言一身之中外為陽內為陰氣為陽血為陰背為陽
腹為陰府為陽藏為陰肝心脾肺腎五藏皆為陰膽胃
大小腸膀胱三焦六府皆為陽蓋陽中有陰陰中有陽
豈偏枯而為道哉經所謂治心病必求其本者是明陰
陽之大體水火之高下盛衰之補瀉遠近之大小陰陽
之變通夫如是唯達道人可知也

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

察色論第五

論曰聲合五音色合五行聲色符同然後定立藏府之
榮枯若滋榮者其氣生如翠羽鷄冠蟹腹豕膏烏羽是
也枯夭者其氣敗如草茲蟬血枳實枯骨如燄是也至
如青赤見於春赤黃見於夏黃白見於長夏白黑見於
秋黑青見於冬是謂五藏之生者以五行之相繼也得

肝脈色見青白心脈色見赤黑脾脈色見黃青肺脈色
見白赤腎脈色見黑黃是謂真藏之見者以五行之相
尅也若乃肺風而眉白心風而口赤肝風而目青脾風
而鼻黃腎風而肌黑以風善行數變故爾肝熱而左頰
赤肺熱而右頰赤心熱而顏赤脾熱而鼻赤腎熱而頤
赤以諸熱皆屬火故爾以至青黑為痛黃白為熱青白
為寒以九氣不同故爾鼻青為腹水黑為水氣白為無
血黃為胃寒赤為有風鮮明為留飲而五色取決於此
故爾然審病者又皆以貞脾為本蓋貞脾之黃是謂天
之氣五色又明病雖久而面黃必生者以其真氣外榮
也此數者雖皆成法然自非心清見曉於冥冥不能至
於此故五色微診可以目察尤難難經曰望而知之謂
之神為見五色於外故決死生也

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

傷寒論第六

論曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死止於六七日
間若兩感於寒者必不免於死經所謂人之傷於寒者



則為病熱熱雖甚不死蓋傷寒者非雜病所比非仲景孰能明此故張先公深得玄機之理趣達六經之標本知汗下之淺深若投湯劑正與不正禍福影響何暇數日哉然仲景分三百九十七法一百一十三方其證有六其治有四經云一日巨陽受之其脈尺寸俱浮二日陽明受之其脈尺寸俱長三日少陽受之其脈尺寸俱弦至四日太陰受之其脈尺寸俱沉細五日少陰受之其脈尺寸俱微緩六日厥陰受之其脈尺寸俱沉濇其太

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

陽病者標本不同標熱本寒從標太陽發熱從本則勝肱惡寒若頭項痛腰脊強太陽經病也故宜發汗其陽明病者雖從中氣標陽本實從標則肌實從本則譫語若身熱目痛鼻乾不得卧陽明經病故宜解肌太陽傳陽明非表裏之傳若譫語從本為實故宜下便王注曰以陽感熱其少陽病者標陽本火從標則發熱從本則惡寒前有陽明後有太陰若胃脇痛而耳聾往來寒熱少陽經病故宜和解其太陰病者標陰本溫從標則身

目黃從本則腹脹滿若腹滿而噎乾太陰經病故宜泄滿下濕從其本治其少陰病者標陰本熱從標則爪甲青而身冷從本則脈沈實而發渴若口燥舌乾而渴少陰經病故宜溫標下本其厥陰病者故厥陰之中氣宜溫也若煩滿囊縮厥陰經病故為熱宜苦辛下之故經所謂知標知本萬舉萬當不知標本是謂妄行又曰各通其藏乃懼汗泄非宜此之謂也故明斯六經之標本乃為治傷寒之規矩此所謂證有六也且如發汗桂枝

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

麻黃之輩在皮者汗而發之葛根升麻之輩因其輕而揚之法也承氣陷胃之輩下者引而竭之法也瀉心十棗之輩中滿泄之法也瓜蒂梔鼓者高者因而越之法也故明此四治之輕重可為了傷寒之繩墨此之謂其治有四也若明六經四法豈有發黃生斑畜血之壞證結胸痞氣之藥過難經所謂未滿三日可汗而已其滿三日可泄而已故仲景曰太陽病脈浮緊無汗身疼痛八九日不解表證仍在當發其汗宜麻黃湯主之少陰



病得之三日口燥咽乾者急宜大承氣湯下之孰敢執於三四日汗泄之定法也是以聖人書不盡言言不盡意說其大槩此之謂也經所謂發表不遠熱攻裏不遠寒余自製雙解通聖辛涼之劑不遵仲景法桂枝麻黃發表之藥非余自銜理在其中矣故此一時彼一時奈五運六氣有所更世態居民有所變天以常火人以常動動則屬陽靜則屬陰內外皆擾故不可峻用辛溫大熱之劑縱獲一效其禍數作豈曉辛涼之劑以葱白鹽欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷上

藥性察標本虛實之併傳量老少壯弱之所宜勞逸緩急之稟性切脈明陰陽之分部詳證知邪氣之淺深故可言會通之法矣內經曰謹熟陰陽無與衆謀此之謂也

病機論第七

論曰察病機之要理施品味之性用然後明病之本焉故治病不求其本無以去深藏之大患故掉眩收引臍腫脹諸痛痒瘡皆根於內夫百病之生也皆生於風寒暑熱燥火以知化之變也經言盛者瀉之虛者補之余錫以方士而方士用之尚未能十全余欲令要道必行桴鼓相應猶拔刺雪污工神聖可得備聞靈樞經曰刺深而猶可拔汚深而猶可雪莊子曰雪猶洗也岐伯曰審察病機無失氣宜此之謂也黃帝曰願聞病機何如岐伯對曰諸風掉眩皆屬於肝少慮無怒風勝則動肝者罷極之本魂之居也其華在爪其充在筋以生血氣其味酸其色蒼



為將軍之官謀慮出焉此為陰中之少陽通於春氣其脈弦王注曰肝有二布葉一小葉如木甲拆之狀故經所謂其用為動乃木之為動火太過之政亦為動蓋火木之主暴速所以掉眩也掉搖也眩昏亂也旋運皆生風故也是以風火皆屬陽陽主動其為病也胃脘當心痛上支兩脇隔咽不通食飲不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴強仆裹剥臍戾脇痛嘔泄甚則掉眩顛疾兩脇下痛引小腹令人善怒也虛則目眈眈無所見耳

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

無所聞善恐如人將捕之凡病肝木風疾者以熱為本以風為標故火本不燔遇風烈乃焰肝本不甚熱因金衰而旺肺金不勝心火木來侮於金故諸病作矣其為治也燥勝風王注曰風自木生燥為金化風餘則制之以燥肝勝則治以清涼清涼之氣金之氣也木氣之下金氣承之又曰風淫於內治以辛涼肝欲散急食辛以散之故木主生榮而主春其性溫故風火則反涼而毀折是兼金化制其木也故風病過急而反中外燥澁是

反並金化也故非為金制其本是甚則如此中風偏枯者由心火暴甚而水衰不能制則火實尅金金不能平木則肝木勝而兼於火熱則卒暴強仆凡治消瘴仆擊偏枯痿厥氣滿發肥實膏梁之疾也故此藏氣平則敷和太過則發生不及則委和

諸痛痒瘡瘍皆屬於心

靜則神明

熱勝則腫心者生之本神之變也其華在面其充在血脈為陽中之太陽通於夏

氣其脈鉤其味苦其色赤為君主之官神明出焉此為

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

陽中之陽也王注曰心形如未敷蓮花中有七空以導引天真之氣神明之窟也經所謂其用為燥火性燥動其明於外熱甚火赫爍石流金火之變也燔炳山川旋反屋宇火之災眚也故火非同水水智而火愚其性暴速其為病也當胸中熱噤乾右肱滿皮膚痛寒熱咳嗽喘唾血血泄飢餓嘔溺色變甚則瘡痒附腫肩背臃缺盆中痛瘍疹身熱驚惑惡寒戰慄譫妄悲忘衄衄語笑瘡瘍血流狂妄目赤胸中痛脇支滿脇下痛背膂肩



甲間痛兩臂痛虛則胃腹大脇下與腰背相引而痛其為治也以寒勝熱王注曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣汗以發之發之不盡逆制之制之不盡求其屬以衰之又曰用水之主以制陽光經曰氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小此之謂也是以熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之心欲與急食鹹以與之君火之下陰精承之火氣之下水氣承之是故火主暴虐故燥萬物者莫熯乎火夏月

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

火熱極甚則天氣薰蒸而萬物反潤以水出液林木津流及體熱極而反汗液出是火極而反兼水化俗以難辨認是作非不治已極反攻王氣是不明標本但隨兼化之虛象妄為其治反助其病而害於生命多矣故此藏平則升明太過則赫曦不及則伏明王注曰百端之起皆自心生

諸濕腫滿皆屬脾土

味和氣化

濕勝則濡泄脾者倉廩之官

本營之居也名曰器能化糟粕轉味而出入者也其華

在脣其充在肌其味甘其色黃故為倉廩之官又名諫議之官五味出焉此至陰之類通於土氣為陰中之至陰也其脈緩王注曰脾形象馬蹄內包胃脘象土形也其用為化兼四氣聚散復形羣品以生灌溉肝心肺腎不主於時寄王四李經所謂善不可見惡不可見也其變驟注其災霖潰其為病也肘腫骨痛陰痺按之不得腰脊頸頭痛時眩大便難陰氣不用飲不欲食咳唾則有血積飲痞膈中滿霍亂吐下為善肌肉痿足不收行

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

脇嘔嘔吐泄注下王注曰脾熱之生虛則腹滿腸鳴飧泄食不化者有胃之寒者有胃之熱者色白澄徹清冷皆屬於寒色黃水赤渾濁皆屬於熱故仲景曰邪熱不殺穀水性疾速此之謂也其為治也風勝濕濕自土生風為木化土餘則制之以風脾盛治之以燥故濕傷肉濕勝則濡泄甚則水閉肘腫王注曰濕為水水盛則腫水下形肉已消又曰濕氣為淫皆為腫滿但除其濕腫滿自衰若濕氣在上以苦吐之濕氣在下以苦泄之以



淡滲之治濕之法不下小便非其治也故濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之若濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之脾苦濕急食苦以燥之又曰土氣之下木氣承之本草曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬王注曰半身以上濕氣有餘火氣復鬱所以明其熱能生濕經所謂風寒在下燥熱在上濕氣在中火游行其間是以熱之用矣故土主濕黔雲雨而弘靜雨熱極甚則飄驟散落是反兼風木制其土也若脾甚土自邕燥去其濕以寒除熱脾土氣衰以甘緩之所以燥泄積飲痞膈腫滿濕熱乾痼消渴慎不可以溫藥補之故積溫成熱性之溫乃勝氣之藥也故此藏喜新而惡陳常令滋澤無使乾涸土平則備化大過則敦阜不及則卑濫

諸氣贖鬱病委皆屬於肺金步清氣利燥勝則乾肺者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮其味辛其色白而為

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上



迪志文化出版有限公司出版

相傳之官治節出焉為陽中之少陽通於秋氣其脈毛王注曰肺之形象人肩二布葉一小葉中有二十四空行列以布分諸藏清濁之氣經所謂其用為固其變肅殺其青蒼落其為病也骨節內變左脇脇痛寒清於中感而瘧太涼單候咳腹中鳴注泄驚澹咳逆心脇滿引小腹善暴痛不可反側噤乾面塵色惡腰痛丈夫癰疽婦人少腹痛浮虛歇尻陰股膝髀虛則少氣不能報息欬逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀虛則少氣不能報息

耳聾噤乾其為治也熱勝燥燥自金生熱為火化金餘則治之以火肺勝則治之以苦又曰金氣之下火氣承之燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以苦下之若肺氣上逆急食苦以泄之王注曰制燥之勝必以苦溫故受乾病生焉是以金主於秋而屬陰其氣涼涼極天氣清明而萬物反燥故燥苦火是金極而反兼火化也故病血液衰也燥金之化極甚則煩熱氣鬱痿弱而手足無力不能收持也凡有聲之痛應金之氣故此藏平氣則審

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上



迪志文化出版有限公司出版

平太過則堅成不及則不從革

諸寒熱皆屬於腎水

能養動耗

寒勝則浮腎者主蟄封藏之

本精之處也其華在髮其充在骨其味鹹其色黑為作強之官伎巧出焉為陰中之陰通於冬氣其脈石王注曰腎藏有二形如豕豆相並而曲附於膂筋外有脂裹裏白表黑主藏精故仙經曰心為君火腎為相火是言在腎屬火而不屬水也經所謂臙中者臣使之官喜樂出焉故臙中者在乳之間下合在于腎是火居水位得

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

升則喜樂出焉雖君相二火之氣論其五行造化之理同為熱也故左腎屬水男子以藏精女子以繫胞右腎屬火遊行三焦興衰之道由於此故七節之傍中有小心是言命門相火也經所謂其變凝冽其膏冰電其為病也寒客心痛腰腿痛大關節不利屈身不便若厥逆痞堅腹滿寐汗實則腹脰腫喘咳身重汗出憎風虛則胃中痛大小腹痛清厥意不樂王注曰大小腹大小腸也此所謂左腎水發痛也若夫右腎命門相火之為病

少氣瘡瘍疥癬癰腫脇滿胃背首面四肢浮腫腹脹嘔逆癰瘕骨痛節有動注下溫瘧腹中暴痛血溢流注精液目赤心熱甚則脅昧暴痛脅悶懊懷噦嘔瘡瘍驚燥喉痺耳鳴嘔涌暴注嘔瘕暴死瘤氣結核丹燥皆相火熱之勝也其為治也寒勝熱燥勝寒若熱淫於內治以鹹寒火所勝平以鹹冷故相火之下水氣承之如寒淫于內治以甘熱佐以苦辛寒淫所勝平以辛熱又曰腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅食苦以堅之故水本寒寒

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

急則水冰如地而能載物水發而電雪是水寒亢極反似尅水之土化是謂兼化也所謂寒病極者反腎滿也左腎不足濟之以水右腎不足濟之以火故此藏水平則靜順不及則涸流太過則流行諸厥固泄皆屬於下厥謂氣逆固為禁固氣則肝腎失守失守則不能禁固出入無度燥濕不恒故氣下則愈也經所謂厥氣上行滿脈去形諸瘧喘嘔逆皆屬於上肺者臟之長也為心之華蓋故



肺熱葉焦發痿躄是氣鬱不利病喘息而嘔也嘔謂嘔酸水火氣炎上之象也胃膈熱甚則為嘔也若衰火之炎痿躄則愈利肺之氣喘息自調也道路開通吐嘔則除凡病嘔涌溢食皆屬之火也王注曰內路嘔逆食不得入是有火也經所謂三陽有餘則為痿易王注曰易有變易常用自痿弱無力也故此者熱之明矣

諸熱贅癰皆屬于火熱氣甚則濁亂昏昧也贅示乃昏也經所謂病筋脈相引而急名曰癰者故俗為之搐是

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

也熱勝風搏并于經絡故風主動而不寧風火相乘是以熱贅癰而生矣治法祛風滌熱之劑折其火勢熱癰可立愈若妄加灼火或飲以發表之藥則取死不旋踵諸禁鼓如喪神守皆屬於火禁慄驚惑如喪神守悸動怔忡皆熱之內作故治當以制火劑其神守血榮而愈也

諸瘰癧強皆屬于濕寒濕同性水火同居故足太陽膀胱經屬水而位下所以濕可傷也其脈起目內眥上額

交于巔上其支別從巔入絡于腦還出則下項故主項強太陽表中風加之濕客于經中內挾寒濕則筋脈抽急故瘰癧強不柔和此太陽傷食當詳有汗無汗治以流濕祛風緩發表而愈也

諸逆衝上皆屬于火衝攻也火氣炎上故嘔涌溢食不下也

諸脹腹大皆屬于熱肺主於氣貴乎通暢若熱甚則鬱于內故肺脹而腹大是以火主長而高茂形見彰顯升

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

明舒葉皆腫之相也熱去則見白利也

諸燥狂越皆屬于火胃實則四肢實而能登高也故四肢者諸陽之本經所謂陰不勝陽則脈流薄疾乃狂是以陽盛則使人妄言罵詈不避親疎神明之亂也故上善若水下愚若火此之謂也治之以補陰瀉陽奪其食則病已

諸暴強直皆屬于風暴虐而害也強勁有力而不能和柔也乃厥陰風木勢甚而成此王注曰陽鬱于內而陰



行于外千金曰強直為風治以瀉火補金木能自平也諸病有聲鼓之如鼓皆屬于熱腹脹大而鼓之有聲如鼓者熱氣甚則然也經所謂熱勝則腫此之類也是以熱氣內鬱不散而聚所以扣之如鼓也諸腹脹大皆為裏證何以明之仲景曰少陰病腹脹不大便者急下之宜大承氣湯所謂土勝堅水則乾急與大承氣湯下之以救腎水故知無寒其熱明矣

諸病腑腫疼酸驚駭皆屬于火腑腫熱勝內則陽氣滯

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

故也疼酸由火實制金不能平木則木旺而為酸酸者肝之味也故經所謂二陽一陰發病主驚駭王注曰肝主驚然肝主之原其本也自心火甚則善驚所以驚則心動而不寧也故火衰木平治之本也

諸轉反戾水液渾濁皆屬于熱熱氣燥爍于筋故筋轉而痛應風屬于肝也甚則吐不止暍熱之氣加之以泄濕勝也若三氣雜乃為霍亂故仲景曰嘔吐而利若為霍亂故有乾霍亂有濕霍亂得其吐利邪其得出名曰

濕霍亂也十存八九若不得吐利揮霍撩亂邪無出名曰乾霍亂十無一生者皆以胃暑中熱飲食不節寒熱氣不調清濁相干陰陽乖隔則為此病若妄言寒者大誤矣故熱則小便渾而不清寒則潔而不濁故井水煎湯沸則自然渾濁也

諸病水液澄徹清冷皆屬于寒水液為病寒也故水清淨其氣寒冷水穀不化而吐利其色白腥穢傳化失常食已不飢雖有邪熱不殺穀而不飢者無倦而常好動

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

其便色黃而酸王注曰寒者上下所出及吐出溺出也又法曰小寒之氣溫以和之

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱流而不腐動而不蠹吐嘔吐酸者胃膈熱甚則鬱滯於氣物不化而為酸也酸者肝木之味或言吐酸為寒者誤也暴注者是注泄也乃腸胃熱而傳化失常經所謂清氣在下則生飧泄下迫者後重裏急窘迫急痛也火性急速而能造物故也俗云虛坐努責而痛也



諸澁枯涸乾勁皺揭皆屬於燥澁枯者水液氣衰少血不榮於皮肉氣不通利故皮膚皺揭而澁也及甚則麻痺不仁涸乾者水少火多繫辭云燥萬物者莫熯乎火故火極熱甚水溢乾而不潤於身皮膚乃啓裂手足有如斧傷而深三二分者冬月甚而夏月衰故法曰寒能收斂收斂則燥澁皺揭熱能縱緩則滋榮潤澤皆屬燥金之化也王注曰物之生滑利物之死枯澁其為治也宜開通道路養陰退陽涼藥調之榮血通流麻木不仁

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

氣宜論第八

論曰治病必明六化分治五味五色所主五藏所宜五行之運行數六氣之臨御化然後明陰陽三才之數故數之可數者人中之陰陽也然所合之數可得見也夫陰陽者數之可卜推之可萬故天地陰陽者不以數推以象之謂也經曰丹天之氣經于牛女戌分齡天之氣經于心尾已分蒼天之氣經于危室柳鬼素天之氣經于亢氏昂畢玄天之氣經于張翼婁胃所謂戊已分者奎壁角軫則天地之門戶也是以將前三數與天象俱明終始之六氣所司之高下在泉淺深之勝復左右之間同與不同三紀太過不及之理故可分天地之化產民病之氣宜矣經所謂太陽司天之政故歲宜苦以燥之溫之陽明司天之政故宜以苦辛汗之清之散之又宜以鹹少陽司天之政故歲宜以鹹宜辛宜酸滲之泄之漬之發之觀氣寒溫以調其氣太陰司天之政故宜以苦燥之濕之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮坼而水血交流少陰司天之政故歲宜鹹以與

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上



之而調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之厥陰司天之政故歲宜以辛調之以鹹潤之人必折其鬱氣先資其化源是以迎而奪之主氣之法也故云六氣有餘用熱遠熱用溫遠溫用寒遠寒用涼遠涼食宜同法此其道也故王注曰夏寒甚則可以熱犯熱寒不甚則不可犯也若有表證若有裏證故法云發表不遠熱攻裏不遠寒不發不攻而犯寒犯熱使寒熱內賊其病益甚故無者生之有者甚之所以不遠熱則欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷上

之戒是以六氣上司九宮中司九元下司九宣三數俱明各分主客勝復淫治尅伐主病歲物氣味之厚薄故經所謂氣味有厚薄性用有躁靜治保有多少力化有淺深故少陽在泉寒毒不生太陽在泉熱毒不生故其氣專其味正少陰在泉寒毒不生太陰在泉燥毒不生此所謂天化地產故天地氣合氣合六節分而萬物化生矣經所謂謹候氣宜無失病機病機者寒暑燥濕風金木水火土萬病悉自此而生矣故謹察病機之本得治之要者乃能愈疾亦常有不明六氣五行之所宜氣味之厚薄所用人身為病之所由而能必獲其效者歟矣哉

本草論第九

論曰流變在乎病主治在乎物制用在乎人三者並明則可以語七方十劑宣通補瀉輕重澁滑燥濕是十劑也大小緩急奇偶復是七方也是以製方之體欲成七方十劑之用者必本於氣味生成而成方焉其寒熱溫



涼四氣者生乎天酸苦辛鹹甘淡六味者成乎地氣味生成而陰陽造化之機存焉是以一物之中氣味兼有一藥之內理性不無故有形者謂之味無形者謂之氣若有形以無形之治喘急昏昧乃生無形以有形之治開腸洞泄乃起經所謂陰味出下竅陽氣出上竅王注曰味有質故下流便瀉之竅氣無形故上出呼吸之門故陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味王注曰氣化則精生味化則形長是以有生

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

之大形精為本故地產養形形不足溫之以氣天產養精精不足補之以味形精交養充實不虧雖有苛疾弗能為害故溫之以氣者是溫之以肺補之以味者是補之以腎是以惟人萬物之靈備萬物之養飲和食德以化津液以淫筋脈以行榮衛故經所謂陰之所生本在五味氣味合而服之以補精益氣所以為全生之術故五穀五畜五菜五果甘苦酸辛鹹此為補養之要也何則穀入於口而聚於胃胃為水穀之海喜穀而惡藥藥之

所入不若穀氣之先達故治病之法必以穀氣為先是聖人論真邪之氣者謂汗生於穀不歸於藥石辨死生之候者謂安穀則生過期不惟數於五藏凡明胃氣為本以此知五味能養形也雖毒藥攻邪如國之用兵蓋出于不得已也是以聖人發表不遠熱攻裏不遠寒辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰故辛散酸收甘緩苦堅鹹與隨五藏之病證施藥性之品味然後分奇偶大小緩急之制也故奇偶者七方四制之法四制者大小緩

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

急也經謂氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小故大小者君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也又曰奇方云君一臣二君二臣三偶方云君二臣四君二臣六所以七方者四制之法奇偶四制何以明之假令小承氣調胃承氣為奇之小方也大承氣抵當湯為奇之大方也所謂因其攻下而為之用者如此桂枝麻黃為偶之小方葛根青龍為偶之大方所謂因其發而用之者如此經所



謂近者奇之遠者偶之身之表者為遠身之裏者為近汗者不以奇下者不以偶不以者不用也故補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄故味厚者為陰薄是陰之陽為味不純粹者也故味所厚則泄之以下味所薄則通氣者也王注曰味厚則泄薄則通氣氣厚者為陽薄者為陽之陰故附子乾薑味甘溫大熱為純陽之藥為氣厚者也丁香木香味辛溫平薄為陽之陰氣不純粹者也故氣所厚則發熱氣所薄則發泄經曰薄則發泄厚則發熱王注曰陰氣潤下故味薄則發泄陽氣炎上故氣厚則發熱味薄為陰少故通泄氣薄為陽少故汗出是以論氣味之薄厚合奇偶之大小腎肝位遠數多則其氣緩不能速達於下必大劑而數少取其迅急可以走下也心肺位近數少則其氣急不能發散于上必小劑而數多取其氣易散可以補上也王注曰肺服九心服七脾服五肝服三腎服一乃五藏生成之常數也若奇之不去則偶之是謂重方

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上



迪志文化出版有限公司出版

也偶之不去則反佐以取之是謂寒熱溫涼反從其病也王注曰是以聖人反其佐以同其氣令聲氣應合復令寒熱參合使其終異而始同燥潤而敗堅剛強必折柔脆自消爾故逆者正治從者反治從少從多觀其可也假令仲景曰少陰病下利而脈微者與白通湯利不止厥逆無脈者乾嘔煩者白通加豬膽人尿王注曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下泄之後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且不違而致大益此加人尿豬膽汁鹹苦寒物於白通湯熱劑中要其氣相從可去格拒之寒也經所謂熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已此之謂也若病所遠而中道氣味之者食而過之無越其制度王注曰假如病在腎而心之氣味飼而冷是仍急過之不飼以氣味腎藥凌心心腹益衰與上下遠近例同是以聖人治上不犯下治下不犯上和中上下

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上



迪志文化出版有限公司出版

俱無犯故經所謂誅罰無過命曰大惑此之謂也有中外不相及其治其主病皆論標本不令妄攻也故從所來者為本從所感者為標是以內者內調外者外治內者調之不言其治外者治之不言其調經所謂上淫于下所勝平之外淫于內所勝治之此之謂也若從內之外盛于外先調其內而後治其外從外之內而盛于內者先治其外而後調其內王注曰皆謂先除其根柢後削其枝條也是故病發有餘本而標之後治其本故仲景曰傷寒醫下之續得下利清穀身疼痛者急當救裏身疼痛清便自調者急當救表救裏四逆湯救表宜桂枝湯故裏不足必先救之清便自調知裏氣已調然後急與桂枝湯以救表是謂病發本而標之先治其本後治其標此以寒為本也故知標本者萬舉萬全不知標本者是謂妄行此之謂也雖本草曰上藥一百二十種為君應天中藥一百二十種為臣應人下藥一百二十五種為使應地若治病者特謂此三品之說未也經所謂有毒無毒所治為主適其小

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

大為治也故主病者為之君佐君者為之臣應臣者為之使非上中下三品之謂也王注曰但能破積愈疾解急脫死則為良方非必要以先毒為是後毒為非有毒為是無毒為非必量病輕重大小之治也帝曰三品何謂也岐伯曰所以明善惡之殊貫也是以聖人有毒無毒服自有約故病有新久方有大小有毒無毒宜合常制矣大毒治病十去其六常毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法王注曰法謂前四約也餘病不盡須再行之毒之小大如約而止必無太過矣是以上古聖人謂重身之毒有故無殞衰其大半而止故藥之性味本以藥治疾誠能處以中庸以疾適當且如半而止之亦何疑於攻治哉此之謂也故非調氣而得者治之柰何有毒無毒何先何後願聞其道王注曰夫病生類其有四焉一者始因氣動而內有所成為積聚癥瘕瘤氣癭起結核癰癩之類是也二者始因

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上



氣動而外有所成謂癰腫瘡瘍痂疥疽痔掉癰浮腫目赤燥胗附腫痛痒之類是也三者不因氣動而生病于內為留飲癖食飢飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也四者不因氣動而病生於外為瘴氣賊魅蠱毒蜚尸鬼擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射刺割捶扑之類是也如此四類者有獨治內而可愈大小承氣陷胃抵當湯三花神祐藏用之類是也有兼治內而愈者大小柴胡通聖洗心涼膈黃連解毒之類是也有獨治外而愈者善應膏拔毒散點眼藥生肌之類是也有兼治內而愈者撥雲散苦參散千金內托散之類是也有先治內後治外而愈者燥疹丹毒瘡瘍疹麤豆之類悉因三焦相火熱甚於內必先疎啓其中涼苦寒之劑盪滌藏府或以砭射數掃塗抹於外者是也有先治其外後治其內而愈者傷寒刺割破傷皆因風寒之邪從外之內先以發散其外發之不已量其淺深峻泄之有齊毒而攻擊者暴病大小便不利胎死堅積滿脹之類是也

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上



迪志文化出版有限公司出版

有復無毒而調引者痰滯氣痞胃虛脾弱氣不往來以通經利其氣之藥之類是也凡此之類方中所施或勝或復寒者熱之熱者寒之溫者清之散者收之抑者折之燥者潤之急者緩之剛者柔之衰者補之強者瀉之堅者削之留者攻之客者除之勞者溫之溫養也結者散之燥者濡之損者溫之溫補也逸者行之勞者動之驚者平之平常也常見常聞上之吐之下之泄之磨之火灸之浴薄之劫之燔針劫刺其下開之發之適可為度各安其氣必清必淨則病氣衰去歸其所宗此治之大體也是以聖人法無定體體變布施藥不執方合宜而用故論言治寒以熱治熱以寒而方士不能廢繩墨而更其道也有病熱者寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆在新病復起奈何治諸寒而熱者取之以陰熱而寒者取之以陽所謂求其屬也王注曰謂治之而病不衰退反因熱寒而隨生寒熱病之新者也謂其益火之原以消陰翳用水之主以制陽光故曰求其屬也夫

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷上



迪志文化出版有限公司出版

取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒但益心之陽寒亦通行若強腎之陰熱之猶可此論五味所歸五藏寒熱溫涼之主也嗚呼聖人之道久塞而後之人獨不能之也王注曰言少可以貫多舉淺可以料大何法之明也如此故非聖人之道孰能至於是邪是以治病之本須明氣味之厚薄七方十劑之法也方有七劑有十故方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用方不對病非方也劑不蠲疾非劑也今列而論之

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

七方者

大小緩急奇偶復

大方之說有二一則病有兼證而邪不專不可以一二味治之宜君一臣三佐九之類是也二則治腎肝在下而遠者宜分兩多而頓服之是也
小方之說有二一則病無兼證邪氣專一可以君一臣二小方之治也二則治心肺在上而迫者宜分兩微而頻頻少服之亦為小方之治也

緩方之說有五有甘以緩之為緩方者為糖蜜甘草之類取其戀膈也有丸以緩之為緩方者蓋丸之比湯散藥力宣行遲故也有品味羣衆之緩方者蓋藥味衆多各不能騁其性也有無毒治病之緩方者蓋藥性無毒則功自緩也有氣味俱薄之緩方者藥氣味薄則常補於上比至其下藥力既已衰為補上治上之法也

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

急方之說有四有急病急攻之急方者如腹心暴痛前後閉塞之類是也有急風蕩滌之用急方者謂中風不省口噤是也取湯劑蕩滌取其易散而施功速者是也有藥有毒之急方者如上湧下泄奪其病之大勢者是也有氣味厚之急方者藥之氣味厚者直趨于下而力不衰也謂補下治下之法也
奇方之說有二有古之單行之奇方者為獨一物是也有病近而宜用奇方者為君一臣二君二臣三數合於陽也故宜下不宜汗也
偶方之說有二有兩味相配而為偶方者蓋兩方相合



者是也有病遠而宜用偶方者君二臣四君二臣六數合於陰也故宜汗不宜下

復方之說有二有二三方相合之為復方者如桂枝二越婢湯一之類是也有分兩勻同之復方者如胃風湯各等分之類是也又曰重複之複二三方相合而用也反復之復謂奇之不去則偶之是也十劑者

宣通補瀉輕重澁滑燥濕

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

宣者宣鬱鬱而不散為壅必宣劑以散之如痞滿不通之類是也本草曰宣可去壅必宣劑以散之如薑橘之屬攻其裏則宣者上也泄者下也湧劑則瓜蒂梔豉之類是也發汗通表亦同

通留而不行為滯必通劑以行之如水病痰癖之類也本草曰通可去滯通草防己之屬攻其環則通者行也甘遂滑石茯苓芫花大戟牽牛木通之類是也

補不足為弱必補劑以扶之如氣形羸弱之類是也本

草曰補可去弱人參羊肉之屬攻其裏則補養也經所謂言而微終日乃復言者此奪氣也故形不足溫之以氣精不足補之以味是以膏梁理疾藥石蠲疾五穀五畜能補善養也

瀉有餘為閉必洩劑以逐之如腹脹脾約之類是也本草曰洩可去閉即葶藶大黃之屬經謂濁氣在上則生腹脹故氣不施化而鬱閉不通所以葶藶大黃味苦大寒專能洩熱去濕下氣仲景曰跌陽脈浮而澁浮則胃

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

強澁則小便數浮澁相搏大便難其脾為約故約束津液不得四布苦寒之劑通寒潤燥而能泄胃強也

輕劑則氣壅欲其揚也如汗不發而腠密邪勝而中蘊必輕劑以揚之本草曰輕可去實麻黃葛根之屬經所謂邪在皮者汗而發之其實者散而泄之王注曰陽實則發散重怯則氣浮欲其鎮也如喪神守而驚悸氣上厥以顛疾必重劑以鎮之本草曰重可去怯即磁石鐵粉之屬經所謂厥成為顛疾故驚乃平之所以鎮涎也



故使其物體之重則下涎而用之也

澁滑則氣脫欲其收斂也如開腸洞洩便溺遺失必澁劑以收之本草曰澁可去脫則牡蠣龍骨之屬如寧神寧聖散之類是也

滑澁則氣著欲其利也如便難內閉必滑劑以利之本草曰滑可去著即冬葵榆皮之屬滑能養竅故潤利也燥濕氣淫勝腫滿脾濕必燥劑以除之本草曰燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬所謂濕甚于上以苦泄之以淡

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

滲之是也

濕津耗為枯五藏痿弱榮衛涸流必濕劑以潤之本草曰濕可去枯即紫石英之屬故痿弱者用之王注曰心熱盛則火獨光火炎上腎之脈常不行令火盛而上炎用事故腎脈亦隨火炎爍而逆上行也陰氣厥逆火復內焰陰上隔陽下不守位心氣通脈故生脈痿是故腕樞紐如折去而不相提挈脛筋縱緩而不能任用故也可下數百行而愈

故此十劑七方者乃太古先師設繩墨而取曲直何叔世方士出規矩以為方圓王注曰嗚呼人之死者但曰命不謂方士愚昧而殺之邪是以物各有性謂物之性有盡也制而用之將使之無盡物之用有窮也變而通之將使之無窮夫惟性無盡用無窮故施於品劑以佐使斯人其功用亦不可一而足也於是有因其性而為用者有因其所勝為制者有氣同則相求者有氣相尅則相制者有氣餘而補不足者有氣相感則以意使者有質同而性異者有名異而實同者故蛇之性竄而引藥蟬之性脫而退翳蜜飲血而用以治血鼠善穿而用以治漏所謂因其性而為用者如此弩牙速產以機發而不括也杵糠下噎以杵築下也謂因其用而為使者如此萍不沈水可以勝酒獨活不搖風可以治其風所謂因其所勝而為之用制也如此麻木穀而治風豆水穀而治水所謂氣相同則相求者如此牛土畜乳可以止渴疾豕水畜心可以鎮恍惚所謂因其氣相尅則

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上



相制也如此熊肉振羸兔肝明視所謂因其氣有餘補不足也如此鯉之治水驚之利水所謂因其氣相感則以意使者如此蜂蜜成於蜂蜜溫而蜂寒油本生於麻麻溫而油寒茲同質而異性也靡蕪生於芎藭蓬蘽生於覆盆茲名異而實同者也所以如此之類不可勝舉故天地賦形不離陰陽形色自然皆有法象毛羽之類生於陽而屬於陰鱗介之類生於陰而屬於陽空青法木色青而主肝丹砂法火色赤而主心雲母法金色白而主肺磁石法水色黑而主腎黃石脂法土色黃而主脾故觸類而長之莫不有自然之理也欲為醫者上知天文下知地理中知人事三者俱明然後可以愈人之疾病不然則如無目夜遊無足登陟動致顛隕而欲愈疾者未之有也故治病者必明天地之理道陰陽更勝之先後人之壽天生化之期乃可以知人之形氣矣王注曰不明天地之理又昧陰陽之候則以壽為夭以夭為壽雖盡上聖救生之道心明經脈藥石之妙猶未免世

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上



迪志文化出版有限公司出版

中之誣斥也明乎醫者幸詳究焉

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷上

保命集卷上



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

予部
保命集卷中

詳校官太醫院吏目周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣王璜

謄錄監生臣邵士洙

欽定四庫全書

保命集卷中

中風論第十

金張元素 撰

論曰經云風者百病之始善行而數變行者動也風本生於熱以熱為本以風為標凡言風者熱也叔和云熱則生風冷生氣是以熱則風動宜以靜勝其躁是養血也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

汗下各得其宜然後宜治在經雖有汗下之戒而有中藏中府之說中府者宜汗之中藏者宜下之此雖合汗下亦不可過也仲景曰汗多則亡陽下多則亡陰亡陽則損其氣亡陰則損其形經曰氣血者人之神不可不謹養也初謂表裏不和須汗下之表裏已和是宜治之在經也其中府者面加五色有表證脈浮而惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中府也其治多易中藏者唇吻不收舌不轉而失音鼻



不聞香臭耳聾而眼瞽大小便秘結皆曰中藏也其治多難經曰六府不和流結為癰五藏不和九竅不通若外無留結內無不通必知在經也初證既定宜以大藥養之當順時令而調陰陽安藏府而和榮衛察病機審氣宜而少有不愈者若風中府者先以加減續命湯隨證發其表若忽中藏者則大便多秘澁宜以三化湯通其滯表裏證已定別無他變故以大藥和治之大抵中府者多著四肢中藏者多滯九竅雖中府者多兼中藏

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

之證至於舌強失音久服大藥能自愈也有中風濕者夏月多有之其證身重如山不能轉側宜服除濕去熱之藥治之不可用鍼可用灸今具六經續命湯方小續命湯通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總以六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加桂附芍藥又於六經別藥隨證細分加減自古名醫不能越此

凡覺中風必先審六經之候慎勿用大熱藥烏附之類故陽劑剛勝積燎原為消狂瘡腫之屬則天癸竭而榮

潤是以中風有此誠故經所謂邪風之至疾如風雨易曰橈萬物者莫疾乎風若感之淺者留於肌膚感之深者達於骨髓蓋禍患之機藏於細微非常人之豫見及其至也雖智者不能善其後是以聖人之教下皆謂之虛邪賊風避之有時故中風者俱有先兆之證凡人如覺大拇指及次指麻木不仁或手足不用或肌肉蠕動者三年內必有中風之至經曰肌肉蠕動命曰微風宜先服八風散愈風湯天麻丸各一料為效故手大指次

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

指手太陰陽明經風多著此經也先服祛風滌熱之劑辛涼之藥治內外之邪是以聖人治未病不治已病又曰善治者治皮毛是止於萌芽也故初成者獲愈固久者伐形是治未病之先也

中風之人如小便不利不可以藥利之既得自汗則津液外亡小便自少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當候熱退汗止小便自行也兼此證乃陽明大忌利小便須當識此中風之人能食者凡中風病多能食



蓋甲已化土脾盛故能食由是多食則脾氣愈盛土克制腎水水虧則病增劇也病宜廣服藥不欲多食病能自愈中風多食者風木也盛則克脾脾受敵求助於食經曰實則夢與虛則夢取是也當瀉肝木治風安脾脾安則食少是其效也中風之人不宜用龍麝犀珠譬之提鈴巡於街使盜者伏而不出益使風邪入於骨髓如油入麪莫能出也此之類焉若痰潮不省昏憤不知事宜用藥下其痰涎故風者百病之長庸可忽諸

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

小續命湯

麻黃
去節

人參

黃芩
各一兩

芍藥

防己

桂

川芎
各一兩

防風
一兩半

附子
半兩

杏仁

甘草
各一兩

右除附子杏仁外搗為麤末後入二味令勻每服五

七錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

凡中風不審六經之加減雖治之不能去其邪也內經

云開則漸然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減

續命湯隨證治之

中風無汗惡寒麻黃續命主之

麻黃

防風

杏仁

依本方添加一倍宜鍼太陽至陰出血崑崙舉蹻

中風有汗惡風桂枝續命主之

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜鍼風府已上二證皆太陽經中

風也

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之

石膏

知母
一料中各加二兩

甘草
依本方加一倍

中風有汗身熱不惡風葛根續命主之

葛根
二兩

桂枝

黃芩
依本方加一倍

宜鍼陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽明之賊刺厲兌者

瀉陽明經之實也已上二證陽明經中風也

中風無汗身涼附子續命主之

附子
加倍

乾薑
加倍一兩

甘草
加倍三兩



宜刺隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也
中風有汗無熱桂枝續命主之

桂枝

附子

甘草

依本方
加一倍

宜鍼太谿此證少陰經中風也

中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木
不仁宜羌活連翹續命主之

小續命

八兩

加羌活

四兩

連翹

六兩

古之續命混淆無六證之別今各分經治療又分經鍼

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

刺法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經絕骨灸以
引其熱是鍼灸同象法治之大體也

中風外無六經之形證內無便溺之阻格知血弱不能
養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自

榮大秦芫湯主之

秦芫

三兩

甘草

二兩

川芎

二兩

當歸

二兩

白芍藥

一兩

細辛

半兩

川羌活

防風

黃芩

各一兩

石膏

二兩

吳白芷

一兩

白朮

一兩

生地黄

一兩

熟乾地黄

一兩

白茯苓

一兩

川獨活

二兩

右一十六味剉每服一兩水煎去滓溫服無時如遇
天陰加生薑煎如心下痞每兩加楮實一錢同煎

中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內
有便溺之阻格復以三化湯主之

厚朴

大黃

枳實

羌活

各等分

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日
服之以微利為度無時法曰四肢不舉俗曰癱瘓故

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

經所謂太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜
阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏

梁之疾非肝腎經虛何以明之經所謂三陽三陰發
病為偏枯痿易四肢不舉王注曰三陰不足則發偏

枯三陽有餘則痿易易為變易常用而痿弱無力也
其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承

氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則
卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆稟氣



於胃而不能至經必因於脾乃不得稟受也令脾不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可補十全散加減四物去邪留正

愈風湯中風證內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失其通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和如此初覺風動服此不致倒仆

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

羌活	甘草	防風	蔓荊子
川芎	細辛	枳殼	人參
麻黃	甘菊	薄荷	枸杞子
當歸	知母	地骨皮	黃耆
獨活	杜仲	吳白芷	秦艽
柴胡	半夏	前胡	厚朴
熟地黃	防己 各二兩	茯苓	黃芩 各二兩

石膏 四兩	芍藥 三兩	蒼朮	生地黃 各四兩
桂 一兩	已上三十三味通七十三兩		

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生薑煎空心一服臨卧再煎藥滓服俱要食遠服空心一服喫下二丹丸為之重劑臨卧一服喫下四白丹為之輕劑動以安神靜以清肺假令一氣之微汗用愈風湯三兩麻黃一兩均作四服一服加生薑五片空心服以粥投之得微汗則佳如一旬之通利用愈風三兩大黃一兩亦均作四服如前煎臨卧服得利則妙常服之藥不可失四時之轉如望春大寒之後加半夏二兩通四兩柴胡二兩通四兩人參二兩通四兩謂迎而奪少陽之氣也望夏之月半加石膏二兩通六兩黃芩二兩通五兩知母二兩通四兩謂迎而奪陽明之氣也李夏之月加防己二兩通四兩白朮二兩茯苓二兩通五兩謂勝脾土之濕也初秋大暑之後加厚朴二兩通四兩藿香二兩桂一

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中



兩通二兩謂迎而奪太陰之氣也霜降後望冬加附子一兩桂一兩通二兩當歸二兩通四兩謂勝少陰之氣也得春減冬四時類此雖立法於四時之加減更宜臨病之際審病之虛實熱寒土地之宜邪氣之多少此藥具七情六慾四氣無使五藏偏勝及不動於榮衛如風秘服之則永不燥結如久瀉服之則能自調初覺風氣便能服此藥及新方中天麻丸各一料相為表裏治未病之勝藥也及已病者更宜常服

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

無問男子婦人及小兒驚癇搐急慢驚風等病服之神効如解利四時傷風隨四時加減法又療脾腎虛筋弱語言難精神昏憤及治內弱風濕內弱者乃風熱火光體重者乃風濕土餘內弱之為病或一臂肢體偏枯或肥而半身不隨或恐而健忘喜以多思故思忘之道皆情不足也是以心亂則百病皆生心靜則萬病悉去故此藥能安心養神調陰陽無偏勝及不動榮衛

四白丹能消肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不清利也

白朮	兩半	白芷	兩一	白茯苓	兩半	白檀	錢一
人參	兩半	知母	錢二	縮砂仁	兩半	羌活	錢二
薄荷	錢三	獨活	錢二	防風	錢各五	川芎	錢各五
細辛	錢二	甘草	錢五	甜竹葉	兩二	香附子	錢五
龍腦	錢半	麝香	錢一	牛黃	錢半	藿香	錢一

右件二十味計八兩六錢三字為細末煉蜜為丸每兩作十九丸臨卧嚼一丸分五七次嚼之上清肺氣下

強骨髓

二丹丸 治健忘養神定志和血內安心神外華腠理

丹參	錢一	丹砂	錢五	遠志	錢半	茯神	錢一
人參	錢五	菖蒲	錢五	熟地黄	錢一	天門冬	錢一
麥門冬	錢一	甘草	錢一				

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十九至一百丸空心食前常服安神定志一藥清肺一藥安神故清中清者歸肺以助天真清中濁者堅強骨髓血中

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中



之清榮養於神血中之濁華榮腠理如素有痰久病		中風津液湧溢在胸中氣所不利用獨聖散吐之後		用利氣瀉火之劑本方在後		瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此		是風熱煩燥	
當歸		龍膽		川芎		梔子		羌活	
大黃		防風		各等分		右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸竹葉湯化下		天麻丸 係新方中	
天麻		牛膝		杜仲		草解		附子	
六兩酒浸三日曝乾秤		六兩同浸		七兩剉炒去絲		六兩別碾為細末秤		一兩	
玄參		當歸		生地黃		羌活		右為細末煉蜜為丸如桐子大常服五七十九病大	
六兩		十兩		十六兩		十兩		至百丸空心食前溫酒或白湯下平明服藥至日高	
錢則止服藥大忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺		壅微以七宣丸輕疎之使藥再為用也牛膝草解治							

筋骨杜仲使筋骨相著天麻羌活和風之勝藥當歸		地黃養血能和榮衛玄參主用附子佐之行經也		獨聖散 治諸風隔實諸癰痰涎津液湧溢雜病亦然		瓜蒂		右剉如麻豆大炒令黃色為細末每服量虛實久新	
或三錢藥末茶一錢酸醃汁一盞調下若用吐法天		氣清明陰晦無用如病卒暴者不拘於此法吐時辰		午已前故內經曰平旦至日中天之陽陽中之陽也		論四時之氣仲景曰大法春宜吐是天氣在上人氣		亦在上一日之氣卯辰之寅候也故宜早不宜夜也	
先令病人隔夜不食服藥不吐再用熱蠶水投之如		吐風癰病者加全蝎半錢微炒如有蟲者加狗油五		七點雄黃末一錢甚者加芫花末半錢立吐其蟲如		濕腫滿者加赤小豆末一錢故此不可常用大要辨		其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可	
一藥用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑									



治風癰病不能愈者從厚朴丸宜春秋加添外又於每一料中加

人參 菖蒲 茯神 去木各一兩半

右依厚朴丸春秋加添法和劑服餌厚朴丸方在吐論中

防風通聖散

防風 川芎 當歸 芍藥

大黃 芒硝 連翹 薄荷

欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷中

麻黃 不去節各半兩 石膏 桔梗 黃芩 各一兩

白朮 山梔子 荊芥穗 各二錢半 滑石 三兩

甘草 二兩

右為麓末每服一兩生薑同煎溫服日再服勞汗當風汗出為皴鬱乃座勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝倍加芍藥當歸發散玄府之風當調其榮衛俗云風刺或生癰疹或赤或白倍加麻黃鹽豉葱白出其汗麻黃去節亦去芒硝鹹走血而內凝故不能發汗

罷依前方中加四物湯黃連解毒三藥合而飲之日二服故內經曰以苦發之謂熱在肌表連內也小便淋瀝去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢七麻黃主表不主於裏故去之腰脇痛走疰疼痛者加硝石當歸甘草一服各二錢調車前子末海金沙末各一錢內經曰腰者腎之府破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之兼散之汗下後通利血氣祛逐風邪每一兩內加荊芥穗大黃各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢諸風潮搐小兒急慢驚風大便結秘邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃二錢梔子二錢調茯苓末二錢如肌肉蠕動者調羌活末一錢故經曰肌肉蠕動命曰微風風傷於肺欬嗽喘急每一兩加半夏桔梗紫苑各二錢如打撲傷損支節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各三錢半調沒藥乳香末各二錢解利四時傷寒內外所傷每一兩內加益

欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷中



元散一兩葱白十莖鹽豉一合生薑半兩水一椀同煎至五七沸或煎一小椀溫冷服一半以飭投之即吐罷後服一半稍熱服汗出立解如飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連鬚二錢葱白十莖依法立愈慎勿用桂枝麻黃湯解之頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加薄荷黃連各二錢半內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不已也王注曰膽液下澄則為濁涕下不已如水泉故曰鼻淵也此為足太陽

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

脉與陽明脉俱盛也如氣逆者調木香末一錢

癰風論第十

內經曰癰風者有榮氣熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰故先風寒客於脉而不去名曰癰風又曰脉風成為癰俗云癰病也故治法云大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌內病故汗出百日王注曰泄衛氣之怫熱刺骨髓汗出百日泄榮氣之怫熱凡二百日鬚眉生而止鍼怫熱屏退陰氣內復故多汗出鬚眉生也

先樺皮散從少至多服五七日後灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈再灸後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室三年鍼灸藥止述類象形此治肺風之法也然非止肺藏有之俗云鼻屬肺而病發於肺端而言之不然如此者既鼻準腫赤脹但為瘡之類乃謂血隨氣化既氣不施化則血聚矣然血既聚使肉腐爛而生蟲也謂厥陰主生五蟲厥陰為風木故木主生五蟲蓋三焦相火熱甚而制金金衰故木來尅侮經曰侮勝也宣瀉火熱

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

利氣之劑虫自不生也法云流水不腐戶樞不蠹此之類也故此疾血熱明矣當以藥緩疎泄之煎局方內外升麻湯下錢氏內瀉青丸餘各隨經言之故病風者陽氣先受上也

樺皮散 治肺藏風毒遍身瘡疥及癰疹瘙癢搔之成瘡又治面風刺及婦人粉刺

樺皮

四兩
燒灰

荊芥穗 二兩

甘草

半兩
炙

杏仁

二兩
去尖用水一椀於銀器內熬去水一半已來放令乾

枳殼

四兩
去穰用炭火燒欲灰於溫紙上令冷



右件除杏仁外餘藥為末將杏仁別研令細次用諸藥令勻磁合內放之每服三錢食後溫酒調下

二聖散 治大風癰疾

大黃半兩 皂角刺三錢

右將皂角刺一二斤燒灰研細煎大黃半兩湯調下

二錢早服樺皮散中煎升麻湯下瀉青丸晚服二聖

散此數等之藥皆為緩疎泄血中之風熱也

七聖丸局方 七宣丸局方 皆治風壅邪熱潤利大腸中風

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

風癰風癰大便秘澀皆可服之此方局方中治法曰雖呵子味苦澀而能止藏腑此利藥中用呵子令大黃枳實緩緩而推陳泄去邪氣若年老風秘澀者乃津液內亡也故不可用峻劑攻之內經曰年四十而氣自半也起居衰矣年五十體重耳目不聰明矣年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上實涕淚出矣故曰知之則強不知則老舉世皆言年老之人無熱俱虛豈不明年四十而陰氣自半故陰虛陽盛明矣是以陰虛其下陽甚其

上故上實下虛此理明矣

破傷風論第十二

論曰夫風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能為害也故破傷風者通於表裏分別陰陽同傷寒證治間閭往往有不知者只知有發表者不知有攻裏者和解者此汗下和三法也亦同傷寒證有在表者有在裏者有半在表半在裏者在裏宜下在表宜發汗在表裏之間宜和解然汗下亦不可過其法也又

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

不可妄意處治各通其藏脉免汗泄之非宜也故破傷風者從外至內甚於內者則病也因此卒暴傷損風襲之間傳播經絡至使寒熱更作身體反強口噤不開甚者邪氣入藏則分汗下之治諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於瘡為破傷風之候故諸瘡不差時舉世皆言著灸為上是謂熟瘡而不知火熱客毒逐經諸變不可勝數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口噤目斜皆因瘡鬱結于榮衛不得宣通



而生亦有破傷不灸而病此者瘡著白痂瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易為鬱結而熱甚則生風也故表脉浮而無力太陽也脉長而有力者陽明也脉浮而弦小者少陽也太陽宜汗陽明宜下少陽宜和解若明此三法而治不中病者未之有也

羌活防風湯 治破傷風邪初傳在表

羌活 防風 川芎 藁本

當歸 芍藥 甘草 地榆

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

華細辛 各二兩

右咬咀每服五錢水一盞半同煎至七分去滓熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃二兩大便秘則加大黃一兩緩緩令過

白朮防風湯 若服煎藥之過有自汗者宜服此藥

白朮 防風 黃耆

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

不拘時候藏府和而有自汗可用此藥破傷風藏府

秘小便赤自汗不止者因用熱藥汗出不休故知無寒也宜速下之先用芎黃湯三二服後用大芎黃湯下之

芎黃湯

川芎 黃芩 甘草

右咬咀每服五錢水一盞半同煎至七分去滓溫服不拘時候三服即止再用下藥

大芎黃湯

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

川芎 羌活 黃芩 大黃

右咬咀依前煎服宜和為度發表雄黃散

雄黃 防風 草烏

右件為細末每服一字溫酒調下裏和至愈可服裏不和不可服

蜈蚣散

蜈蚣 鰮 左蟠龍 度野鴿 煙盡為是也



右件為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏和至愈可服但有裏證不可服次當下之用前蜈蚣散四錢巴豆霜半錢燒餅為丸如菉豆大每服一丸漸加六七丸清酒調蜈蚣散少許送下宣利為度內外風去可常服羌活湯緩緩而治不拘時候服之羌活湯者治半在表半在裏也

羌活湯

羌活

菊花

麻黃

川芎

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

石膏

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子

已上各
一兩 薄荷半兩

吳白芷
半兩

右咬咀每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至一

盞去滓稍熱服不拘時候日進二服

防風湯 治破傷風同傷寒表證未傳入裏宜急服此

藥

防風

羌活

獨活

川芎

各等分

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服三二服後宜調蜈蚣散大效

蜈蚣散

蜈蚣 對一

鰮 三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺轉入裏當服左龍丸漸漸看大便硬軟加巴豆霜服之

左龍丸

左蟠龍

五錢 炒

白殭蠶

五錢 炒

鰮 半兩

雄黃

一錢

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

右同為細末燒餅為丸如桐子大每服十五丸溫酒

下如裏證不已當於左龍丸末一半內入巴豆霜半

錢燒餅為丸如桐子大每服一丸同左龍丸一處合

服每服藥中加一丸如此漸加服至利為度若利後

更服後藥若搐症不已亦宜服後藥羌活湯也

羌活湯

羌活

獨活

防風

地榆

各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服如



有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全養血為度		養血當歸地黃散		當歸 地黃 芍藥 川芎		藁本 防風 白芷 各一兩 細辛 錢五		右咬咀依前煎服		雄黃散 治表藥		天南星 錢三 半夏 錢五 天麻 錢五 雄黃 半錢		右為細末每服一錢溫酒調下如有涎於此藥中加大黃為下藥		地榆防風散 治破傷風中風半在表半在裏頭微汗身無汗不可發汗宜表裏治之		地榆 防風 地丁香 馬齒莧 各等分		右件為細末每服三錢溫米飲調下		白朮湯 治破傷風大汗不止筋攣搐搦		白朮 葛根 各一兩 升麻 黃芩 各半兩	
-----------------------------	--	---------	--	-------------	--	--------------------	--	---------	--	---------	--	--------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------	--	----------------	--	------------------	--	---------------------	--

芍藥 二兩 甘草 二錢半		右咬咀每服一兩水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候		江鰮丸 治破傷風驚而發搐藏府秘澁知病在裏可用江鰮丸下之		江鰮 劉炒半兩 野鴿糞 半兩 雄黃 一錢 白殭蠶 半兩		蜈蚣 對一 天麻 一兩		右件為細末又將藥末作三分用二分燒餅為丸如桐子大硃砂為衣後將一分入巴豆霜一錢同和亦以燒餅為丸如桐子大不用硃砂衣每服硃砂為丸九二十九入巴豆霜一丸第二服二丸加至利為度再服硃砂為衣藥病愈止		沒藥散 刀箭藥止血住痛		定粉 一兩 風化灰 一兩 枯白礬 三錢 另研 乳香 半錢 另研		沒藥 一字 另研		右件各研為細末同和勻再研摻之	
--------------	--	-------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	--	---------------------------------	--	----------	--	----------------	--

解利傷寒論第十三

論曰傷寒之法先言表裏及有緩急三陽表當急裏當緩三陰表當緩裏當急又曰脉浮當汗脉沉當下脉浮汗急而下緩謂三陽表也脉沉下急而汗緩謂三陰裏也麻黃湯謂之急麻黃附子細辛湯謂之緩內經云有漬形以為汗為汗之緩裏之表也又云在皮者汗而發之為汗之急表之表也急汗者太陽緩汗者少陰是藏府之輸應也假令麻黃附子細辛湯是少陰證始得發熱脉沉裏和無汗故漬形以為汗假令麻黃湯是太陽證頭項痛腰脊強脉浮無汗裏和是也在皮者汗而發之也經曰治主以緩治客以急此之謂也

麻黃湯

麻黃

去節
五錢

桂枝

三錢

甘草

三錢
炙

杏仁

去皮尖炒
三十箇

右咬咀都作一服水煎去滓溫服

假令得肝脉其外證善潔面青善怒其三部脉俱弦而浮惡寒裏和謂清便自調也麻黃湯內加羌活防風各三錢調肝

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中



迪志文化出版有限公司出版

主風是膽經受病大便秘或泄下赤水無數皆裏不和也假令得心脉其外證面赤口乾善笑其尺寸脉俱浮而洪惡寒裏和謂清便自調也麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂主心熱是小腸受病也假令得脾脉其外證面黃善噫善思善味尺寸脉俱浮而緩裏和惡寒麻黃湯內加白朮防己各五錢謂脾主濕是胃經受病也假令得肺脉其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其尺寸脉俱浮而澁裏和惡寒麻黃湯內加桂枝生薑各三錢謂肺主燥是大腸受病也假令得腎脉其外證面黑善恐顯其尺寸脉俱浮而裏和惡寒麻黃湯加附子生薑謂腎主寒是膀胱受病也

已上各五證皆表之表謂在皮者急汗而發之也皆腑受病表之裏者下之當緩謂隨藏表證外顯尺寸脉俱浮而復有裏證謂發熱飲水便利赤澁或泄下赤水按之內實或痛麻黃湯去麻黃杏仁與隨藏元加藥同煎作五服每下一證初一服加大黃半錢邪盡則止未盡

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中



迪志文化出版有限公司出版

第二服加大黃一錢邪未盡第三服加大黃一錢半如邪未盡又加之邪盡則止此謂先緩而後急是表之裏證下之當緩也

麻黃附子細辛湯

麻黃半兩去根節

細辛半兩去苗土

附子一錢一分半炮裂去皮臍

右咬咀都作一服水煎去滓溫服

假令得肝脉其內證滿閉淋澀便難轉筋其尺寸脉俱沉而弦裏和惡寒肝經受病麻黃附子細辛內加羌活

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

防風各三錢 假令得心脉其內證煩心心痛掌中熱

而嘔其尺寸脉俱沉裏和惡寒心經受病加黃芩石膏

各三錢 假令得脾脉其內證腹脹滿食不消怠墮嗜

卧其尺寸脉俱沉裏和惡寒脾經受病加白朮防己各

三錢 假令得肺脉其內證喘咳洒淅寒熱其尺寸脉

俱沉裏和惡寒肺經受病加生薑桂各三錢 假令得

腎脉其內證泄如下重足脛寒而逆其尺寸脉俱沉裏

和惡寒腎經受病更加附子生薑各三錢

已上五證裏之表也宜漬形以為汗皆藏受病也裏之裏者下之當急謂隨藏內證以顯尺寸脉俱沉復有裏證者謂大小便秘澀或泄下赤水或瀉無數不能飲食不惡風寒發熱引飲其脉俱沉或按之內實而痛此謂裏實宜速下之麻黃附子細辛內麻黃與隨藏元加藥內分作三服每下一證初一服加大黃三錢邪盡則止如邪未盡再一服加大黃二錢又未盡第三服加大黃一錢此先急而後緩謂裏之裏也當速下之也

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

通解利傷寒不問何經之受皆能混然解之謂不犯各

經之受病雖不解盡亦無壞證

羌活湯

羌活二兩

防風一兩

川芎一兩

黃芩一兩

細辛二錢

甘草一兩炒

黑地黃一兩

薄荷半兩

白朮二兩如用蒼朮加一兩

右咬咀每服五七錢水二盞煎至一盞無時溫服清如覺發熱引飲加黃芩甘草各一兩更隨證加頭痛



惡風於白朮湯一兩內加羌活散三錢都作一服

羌活散

羌活 一兩半

川芎 七錢

細辛根 二兩半

如身熱依前加石膏湯四錢

石膏湯

石膏 二兩

知母 半兩

白芷 七錢

如腹中痛者加芍藥散三錢

芍藥散

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

芍藥 二兩

桂 五錢

如往來寒熱而嘔加柴胡散二錢

柴胡散

柴胡根 一兩

半夏 五錢
洗

加生薑煎如心下痞加枳實一錢如有裏證加大黃

初一服一錢次二錢又三錢邪盡則止

論曰有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔

疎雖有汗不當用桂枝宜用黃耆湯和解秋冬汗孔閉

雖無汗不當用麻黃宜用川芎湯和解春夏有汗脉乃

微而弱惡風惡寒者乃太陽證秋冬之脉也亦宜黃耆

湯無汗亦宜川芎湯秋冬有汗脉盛而浮發熱身熱者

乃陽明證春夏之脉也亦宜黃耆湯無汗亦宜川芎湯

大抵有汗者皆可用黃耆湯無汗者亦可用川芎湯

黃耆湯 有汗則止也

黃耆

白朮

防風 各等分

右咬咀每服五七錢至十餘錢或半兩一兩水煎溫

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

服清汗多惡風甚者加桂枝

川芎湯 無汗則發也

川芎

白朮

羌活 各等分

右咬咀同黃耆湯稍熱服惡寒甚則及脉大浮半加

麻黃法云五藏之脉寸關尺也今止言尺寸陰陽也

如陽緩而陰急表和而裏病陰緩而陽急裏和而表

病也

若傷寒食少發渴止可和胃止渴不可太涼藥止之然



恐涼藥止之損着胃氣必不能食也

和胃白朮湯

白朮 茯苓

起卧不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃芩芍藥湯起
卧不安眠睡不穩謂之煩梔豉湯竹葉石膏湯解利四
時傷寒混解六經不犯禁忌

大白朮湯

白朮 二兩 防風 一兩 羌活 一兩 川芎 一兩

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

黃芩 五錢 細辛 三錢 白芷 半兩 石膏 二兩

知母 七錢 甘草 五錢 枳實 五錢

右為麓末每服半兩水一盞半煎至一盞大溫服清
未解更一服兩服藥滓又作一服春倍防風羌活夏
倍黃芩知母李夏雨淫倍白朮白芷秋加桂五錢冬
桂八錢或一兩立夏之後至立秋處暑之間傷寒者
身多微涼微有自汗四肢沉重謂之濕溫又謂之濕
淫宜蒼朮石膏湯

蒼朮石膏湯

蒼朮 半兩 石膏末 三錢 知母 剉半 甘草 剉一錢

右同和勻都作一服水兩盞煎至一盞溫服清謂內
有濕熱也多不欲飲水如身熱脉洪無汗多渴者是
熱在上焦積於胸中宜桔梗散

桔梗散

薄荷 一錢 黃芩 一錢 甘草 一錢 桔梗 半兩

連翹 二錢 山梔子仁 一錢

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

右剉每服五錢或七錢秤半兩水煎加竹葉如大便

秘結加大黃半錢

熱論第十四

論曰有表而熱者謂之表熱也無表而熱者謂之裏熱
也有暴發而為熱者乃久不宣通而致也有服溫藥過
劑而為熱者有惡寒戰慄而熱者蓋諸熱之屬者心火
之象也王注曰百端之起皆自心生是以上善若水下
愚若火治法曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取



之甚熱之氣則汗發之發之不盡則逆治之制之不盡求其屬以衰之故曰苦者以治五藏五藏屬陰而居於內辛者以治六府六府屬陽而在外故內者下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈此所謂不治而治也故不治謂之常治治而不治謂之暴治經所謂諸寒而熱者取之陰諸熱而寒者取之陽此所謂求其屬也王注曰益火之源以消陰翳用水之主以制陽光此之謂也病有暴熱者病在心肺有積熱者病在腎肝暴熱者宜局方中雄黃解毒丸積熱者局方中妙香丸暴熱上喘者病在心肺謂之高喘木香金鈴子散上焦熱而煩者牛黃散藏府秘者大黃牽牛散上焦熱無它證者桔梗湯有虛熱不能食而熱者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之有實熱能食而熱者胃實也宜以梔子黃芩湯或三黃丸之類治之蔚金柴胡之類亦是也有病久憔悴發熱盜汗謂五藏齊損此熱勞骨蒸病也瘦弱虛煩腸癖下血皆蒸勞也宜養血

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

益陰熱自能退當歸生地黃或錢氏地黃丸是也木香金鈴子散治暴熱心肺上喘不已大黃兩半金鈴子三錢木香三錢輕粉少許朴硝二錢右為細末柳白皮湯調下三錢或四錢食後服以利用為度喘止即止牛黃散治上焦熱而煩不能睡卧梔子兩半大黃兩半蔚金兩半甘草二錢右為細末每服五錢水煎溫服食後微利則已大黃牽牛散治相火之氣遊走藏府大便秘結大黃兩一牽牛頭末五錢右為細末每服三錢有厥冷用酒調三錢無厥冷而手足煩熱者蜜湯調下食後微利為度此謂不時而熱者濕熱也地黃丸治久新憔悴寢汗發熱五藏齊損瘦弱虛煩腸癖下血骨蒸痿弱無力不能運動

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中



熟地黃 兩一	山茱萸 錢四	乾山藥 錢四	牡丹皮
白茯苓	澤瀉 錢各三		
右為細末煉蜜為丸桐子大每服五十丸空心溫酒送下			
防風當歸飲子 如煩渴皮膚索澤食後煎服防風飲子空心服地黃丸			
柴胡	人參	黃芩	甘草 各一兩
大黃	當歸	芍藥 各半兩	滑石 三兩
右為麤末每服五錢水一盞半生薑三片同煎至七分去滓溫服如痰實欬嗽加半夏如大便黃米穀完出驚悸溺血淋悶欬血衄血自汗頭痛積熱肺痿後服大金花丸			
大金花丸			
黃連	黃柏	黃芩	山梔子 各一兩
右為細末滴水為丸如小豆大每服一百丸溫水下日二三服或大便實加大黃自利不用大黃如中外			

有熱者此藥作散剉服名解毒湯或腹滿嘔吐欲作利者每服半兩解毒湯中加半夏茯苓厚朴各三錢生薑三片如白膿下痢後重者加大黃三錢			
涼膈散 加減附于后			
連翹	山梔子	大黃	薄荷葉 各半兩
黃芩 半兩	甘草 一兩半	朴硝 二錢半	
右件為麤末每服半兩水一盞半煎至一盞去滓入蜜一匙微煎溫服食後 咽嗑不利腫痛并涎嗽者			
加桔梗一兩荊芥穗半兩 欬而嘔者加半夏二錢半生薑煎 鼻衄嘔血者加當歸芍藥生地黃各半兩 一料內			
如淋瀝者加滑石四兩茯苓一兩或瀉而不通臍下收如覆碗痛悶不可忍者乃腸胃乾涸臍中氣不下故經所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故臍中者臣使之官名三焦相火下合右腎為氣海也王注曰膀胱津液之府胞內居之少腹處間毛內藏			



胞器若得氣海之氣施化則溲便注下氣海氣之不
及則閼隱不通故不得便利也先用木香沉香各三
錢酒調下或八政散甚則宜上湧之令氣通達小便
自通經所謂病在下上取之 王注曰熱攻於上不
利於下氣盛於上則溫辛散之苦以利之

當歸承氣湯

當歸

大黃 各一兩

甘草 半兩

芒硝 九錢

右剉如麻豆大每服二兩水一大碗入生薑五片棗

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

十枚同煎至半碗去滓熱服若陽狂奔走罵詈不避

親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實當歸補

血益陰甘草緩中加生薑棗胃屬土此引至於胃中

也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利為

度微緩以瓜蒂散加防風藜蘆吐其病立愈後調法

洗心散涼膈散解毒湯等藥調治之

治熱入血室發狂不認人牛黃膏

牛黃 二錢

硃砂 三錢

腦子 一錢

蔚金 三錢

甘草 一錢

牡丹皮 三錢

右為細末煉蜜為丸如皂子大新水化下

治暴熱者局方中雄黃解毒丸 治久熱者局方中妙

香丸 治虛勞骨蒸煩熱下血者錢氏地黃丸 治虛

熱不能食者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之治

實熱能食者胃實也宜以梔子黃芩或三黃丸之類治

之蔚金柴胡亦可 治表熱惡寒而渴白虎湯也 膚

如火燎而熱以手取之不甚熱為肺熱也目白睛赤煩

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

躁或引飲獨黃芩一味主之水煎 兩脇下肌熱脉浮

弦者柴胡飲子主之兩脇肋熱或一身盡熱者或日晡

肌熱者皆為血熱也四順飲子主之夜發熱主行陰乃

血熱也四順桃仁承氣選用當視其腹痛血刺痛與有

表入裏腹中轉失氣燥結之異晝則明了夜則譫語四

順飲子證與桃仁承氣相似不可不辨也發熱雖無脇

熱亦為柴胡證晝則行陽二十五度氣藥也大抵則柴

胡夜則行陰二十五度血藥也大抵四順飲子



內傷論第十五

論曰人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形令飲食反過其節腸胃不能勝氣不及化故傷焉經曰壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣痺論曰飲食自倍腸胃乃傷或失四時之調養故能為人之病也經曰氣口緊而傷於食心胸滿而口無味與氣口同氣口者乃脾之外候故脾胃傷則氣口緊盛夫傷者有多少有輕重如氣口一盛脉

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

得六至則傷於厥陰乃傷之輕也檳榔丸主之氣口二盛脉得七至則傷於少陰乃傷之重也煮黃丸厚朴丸主之氣口三盛脉得八至則傷於太陰膩塞悶亂甚則心胃大痛兀兀欲吐得吐則已俗呼食迷國是也經曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐則死宜吐之以爪蒂散如不能則無治也經曰高者因而越之下者引而竭之是也

檳榔丸

檳榔 二錢
半

陳皮 去白 一兩

木香 二錢
半

牽牛 頭末 半兩

右為細末醋糊為丸如桐子大每服十五丸至二十丸米飲下生薑湯亦可

煮黃丸

雄黃 一兩
另研

巴豆 五錢
生用去皮研爛入雄黃末

右二味再研入白麵二兩同和再研勻滴水為丸如

桐子大每服時先煎漿水冷沸下藥二十四丸煮三

十沸撈入冷漿水中沉水冷一時下一丸 二日二十時也 加至

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

微利為度用浸藥水送下此藥脇下痠癢痛如神

瓜蒂散

瓜蒂 三錢

赤小豆 三錢

右為細末溫水調一錢以吐為度如傷之太重備急

丸獨行丸皆急藥也

金露丸 治天行時疾內傷飲食心下痞悶

大黃 二兩

枳實 炒 五錢

牽牛 頭末 二兩

桔梗 二兩

右同為細末燒餅為丸如桐子大每服三五十丸食



後溫水下如常服十九二十九甚妙

治氣不下降食難消化常服進食逐飲

枳實丸

枳實五錢 麩炒 白朮一兩 剉

右為細末燒餅為丸如桐子大每服五十九水飲下

治飲食不化心腹膨悶檳榔丸主之如甚則脇肋虛

脹煮黃丸主之治氣不下降飲食難消金露丸主之

諸瘧論第十六

欽定四庫全書  病機氣宜保命集
卷中

經曰夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺者近而暴發傷之

重者遠而痼瘧痼者久瘧也是知夏傷於暑溫熱閉藏

而不能發泄於外邪氣內行至秋而發為瘧也初不知

何經受之隨其動而取之有中三陽者有中三陰者大

抵經中邪氣其證各殊同傷寒論之也故內經曰五藏

皆有瘧其治各別在太陽經者謂之風瘧治多汗之在

陽明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂風熱瘧

治多和之此三陽受病皆謂之暴瘧發在夏至後處暑

前此乃傷之淺者近而暴也在陰經則不分三經總謂

之溫瘧當從太陰經論之其病發在處暑後冬至前此

乃傷之重者遠而為痼瘧者老也故謂之久瘧氣居西

方宜毒藥療之瘧之為病因內積暑熱之氣不能宣泄

于外而為瘧也當盛夏之時能食寒涼之物而助陰氣

者後使有暑熱之氣微者自消矣更時復以藥疎利藏

府使邪氣自下內經曰春食涼夏食寒秋食溫冬食熱

是謂春夏養陽秋冬養陰人能於飲食起居之間順四

時之氣而行之邪氣何由得生也

治瘧病處暑前頭痛項強脉浮惡寒有汗桂枝羌活湯

桂枝 羌活 防風 甘草炙各半兩

右為麩末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服清迎

發而服之如吐者加半夏麩等分

治瘧病頭痛項強脉浮惡風無汗者麻黃羌活湯

麻黃去節 羌活 防風 甘草炙各半兩

同前服如吐者加半夏麩等分

欽定四庫全書  病機氣宜保命集
卷中



治法瘧如前證而夜發者麻黃桂枝湯主之

麻黃 一兩
去節

甘草 炙 三錢

桃仁 三十箇
去皮尖

黃芩 五錢

桂 二錢

右五味同為細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血聚則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長睡卧不安先以大柴

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

胡湯下之微利為度如下過外微邪未盡者宜服白芷

湯盡其邪

白芷 一兩

知母 一兩
七錢

石膏 四兩

右為麓末同前服

治瘧無他證隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯

桂枝 五錢

石膏 一兩
半

知母 一兩
半

黃芩 一兩

右為麓末分作三服每服水一盞同前煎服間日者

邪氣所舍深也

治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之大爭寒作則必戰動經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知為熱也陽盛陰虛之證當內實外虛不治必傳入陰經也桂枝芍藥湯主之

桂 三錢

黃耆 二兩

知母 一兩

石膏 一兩

芍藥 一兩

右為麓末每服五七錢至半兩水煎如前藥服之寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜用桂枝

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

黃芩湯和之

柴胡 一兩
二錢

黃芩 四錢
半

人參 四錢
半

半夏 四錢

甘草 四錢
半

石膏 五錢

知母 五錢

桂 二錢

右為麓末依前服之服藥已如外邪已罷內邪未已再詮下藥從卯至午時發者宜以大柴胡湯下之從午至酉時發者知其邪氣在血也宜以桃仁承氣湯主之

前項下藥微利為便以小柴胡湯徹其微邪之氣立



秋之後及處暑前發瘧漸瘦不能食者謂之瘵瘵此邪氣深遠而中陰經為久瘵也

治久瘵不能飲食胃中鬱鬱如吐欲吐不能吐者宜吐則已當以藜蘆雄黃散吐之

藜蘆散

大藜蘆末半錢 溫蠶水調下以吐為度

雄黃散

雄黃 瓜蒂 赤小豆各一錢

欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷中

右為細末每服半錢溫水調下以吐為度

治秋深久瘵胃中無物又無痰癖腹高而食少俗謂瘵氣入腹宜蒼朮湯主之

蒼朮四兩 草烏頭一錢 杏仁三十箇

右為麤末都作一服水三升煎至一半均作三服一日服盡迎發而服局方中七宣丸治瘵之聖藥也

局方中神効飲子乃瘵疾聖藥也又名交結飲子

吐論第十七

論曰吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主內而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熱水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其證食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝而胃發痛其治當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脉浮而匿其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以毒藥去其積檳榔木香行其氣下

欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷中

焦吐者皆從於寒地道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當以毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也

治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪宜先和中桔梗湯

桔梗一兩半 半夏二兩 陳皮去白一兩 枳實炒兩
白茯苓去皮一兩 白朮半兩 厚朴製炒香一兩



右咬咀每服一兩水一盞煎至七分取清溫調木香散二錢隔夜空腹食前服之三服之後氣漸下吐漸止然後去木香散加芍藥二兩黃耆一兩半每料中叩筭加上件分兩依前服之病愈則已如大便秘結食不盡下以大承氣湯去硝微下之少利為度再服前藥補之如大便秘結又依前再微下

木香散

木香

檳榔 各等分

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

右為細末前藥調服

治暴吐者上焦氣熱所衝也經曰諸嘔吐酸暴主下迫皆屬於火脉洪而浮者荊黃湯主之

荊芥穗 一兩

人參 五錢

甘草 二錢半

大黃 三錢

右為麤末都作一服水二盞煎至一盞去滓調檳榔散二錢空心服

檳榔散

檳榔 二錢

木香 一錢半

輕粉 少許

右為細末用前藥調服如為丸亦可用水浸蒸餅為丸如小豆大每服二十丸食後

治上焦吐頭發痛有汗脉弦青鎮丸主之

柴胡 二兩
去苗

黃芩 七錢半

甘草 兩半

半夏 湯洗兩兩

青黛 二錢半

人參 半錢

右為細末薑汁浸蒸餅為丸如桐子大每服五十九

生薑湯下食後

白朮湯 治胃中虛損及痰而吐者

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

半夏麴 兩半

白朮 一錢

檳榔 二錢半

木香 一錢

甘草 一錢

茯苓 二錢

右六味同為細末每服二錢煎生薑湯調下食前吐而食脉弦者肝盛於脾而吐乃由脾胃之虛宜治風

安脾之藥

金花丸

半夏 湯洗一兩

檳榔 二錢

雄黃 一錢半

右為細末薑汁浸蒸餅為丸如桐子大小兒另丸生



薑湯下從少至多漸次服之以吐為度羈絆於脾故飲食自下

治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而痛宜服紫沉丸

半夏麴錢三 烏梅去核一錢 代赭石錢三 杏仁去皮尖一錢

縮砂仁錢三 丁香錢二 沉香錢一 檳榔錢二

木香錢一 陳皮錢五 白豆蔻錢半 白朮錢一

巴豆霜半錢另研

右為細末入巴豆霜令勻醋糊為丸如黍米大每服

五十九食後生薑湯下吐愈則止小兒另丸

治小兒食積吐食亦大妙

一法治飏胃吐食用橘皮壹箇浸少時去白裹生薑一

塊麵裹紙封燒令熟去麵外生薑為三番並橘皮下紫

沉丸一百丸一日二服得大便通至不吐則止此主寒

積氣皆可治嘔吐腹中痛者是無積也胃強而乾嘔有

聲無物脾強而吐食持實繫強是以腹中痛當以木香

白朮散和之

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

木香錢一 白朮兩半 半夏麴兩一 檳榔錢二

右為細末濃煎芍藥生薑湯調下一二錢有積而痛

手按之愈痛無積者按之不痛

治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通宜附子丸

附子炮五錢 巴豆霜錢一 砒半錢研細

右同研極細鎔黃蠟為丸如桐子大每服一二丸冷

水送下利則為度利後更服紫沉丸常服不令再閉

厚朴丸 主反胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾

加法在後

厚朴兩半 黃連兩半 紫菀去土苗 吳茱萸湯洗七次

菖蒲 柴胡去苗 桔梗 皂角去皮炙

茯苓去皮 官桂刮 乾薑炮已上各二兩 人參兩二

巴豆霜兩一 蜀椒去日閉口者炒出汗二兩 川烏頭炮裂去皮臍二兩半減半更炒

右為細末入巴豆霜勻煉蜜和丸為劑旋丸桐子大

每服三丸漸次加至以利為度生薑湯下食後臨卧

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中



此藥治療與局方溫白丸同及治處暑以後秋冬間藏府下利大効春夏再加黃連二兩秋冬再加厚朴二兩計四兩

治風癰病不能愈者從厚朴丸依春秋加添外又於每料中加人參菖蒲茯苓去皮各一兩半右依前法和劑服餌治反胃又大便不通者是腸勝胃也服局方中半硫丸一二百丸如大便秘用後藥

附子兩半 巴豆二枚 砒許一豆

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

右為極細末生薑糊為丸如菉豆大每服一丸白湯下

霍亂論第十八

論曰醫之用藥如將帥之用兵本草曰良醫不能以無藥愈疾猶良將無兵不足以勝敵也故用藥如用兵轉筋霍亂者治法同用兵之急不可緩也故吐瀉不止者其本在於中焦或因渴大飲或飲而過量或饑而飽甚或濕內甚故陰陽交而不和是為吐瀉仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且利此為急

病也然吐利為急十死其一二如揮霍撩亂而不得吐瀉此名乾霍亂必死法曰既有其入必有所出今有其入而不得其出者否也塞也故轉筋吐瀉者其氣有三一日火二曰風三曰濕吐為暍熱也王注曰炎熱薄爍心之氣也火能炎上故吐也瀉為濕也叔和云濕多成五泄內經曰濕勝則濡瀉又經曰風勝則動筋屬肝而應於風木故腳轉筋燥急也內經曰諸筋反戾水液渾濁皆屬於熱故仲景治法曰熱多欲飲水五苓散寒多

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

不飲水者理中丸凡覺此證或先五苓益元桂苓甘露散乃吐瀉之聖藥也慎無與粟米粥湯穀入於胃則必死本草曰粟米鹹微味寒無毒主養腎氣去脾胃中熱益氣霍亂者脾胃極損不能傳化加以粟米如人欲斃更以利刀鋸其首豈有能生者邪如吐瀉多時欲住之後宜微以粥飲漸以養之以遲為妙

治霍亂轉筋吐瀉不止半夏湯
半夏麴 茯苓 白朮各半兩 淡桂一錢半



甘草

炙二錢半

右為細末渴者凉水調下不渴者溫水調下不計時

候

五苓散

白朮

茯苓

木猪苓

各一兩半

澤瀉

二兩半

桂

一兩

右為細末冷水調下或水煎三沸冷服亦得

理中丸

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

白朮

人參

乾薑

甘草

各等分

右為細末煉蜜為丸彈子大每服一九冷水化下

如吐瀉不止身冷汗出無脉者可服後瀉利論中漿水

散兼桂枝湯白朮湯皆可用後痢門中藥亦可選用

凡霍亂不可飲熱白米湯飲之死不救

瀉論第十九

論曰藏府瀉利其證多種大抵從風濕熱論是知寒少而熱多寒則不能久也故曰暴瀉非陽久瀉非陰論曰

春宜緩形形緩動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金

能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木旺而脾

土損矣輕則飧泄身熱脉洪穀不能化重則下痢膿血

稠粘皆屬於火經曰溲而使膿血知氣行而血止也宜

大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥湯為之輕劑是實則

瀉其子木能自虛而脾土實矣故經曰春傷於風夏必

飧泄此逆四時之氣人所自為也有自太陰脾經受濕

而為水泄虛滑微滿身重不知穀味假令春宜益黃散

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

補之夏宜瀉之法云宜補宜瀉宜和宜止假令和則芍

藥湯是也止則呵子湯是也久則防變而為膿血脾經

傳腎謂之賊邪故難愈若先痢而後滑謂之微邪故易

痊此皆脾土受實天行為也雖聖智不能逃口食味鼻

食氣從鼻而入留積於脾而為水瀉有厥陰經動下痢

不止其脉沉而遲手足厥逆涕唾膿血此難治宜麻黃

湯小續命汗之法曰謂有表邪縮於內當散表邪而愈

有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難布息



脉微嘔吐急以重藥溫之漿水散是也故法云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脉弦則去風血膿稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗之則愈驚澹為痢當溫之又云在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內疎之小便澁者分利之又曰盛者和之去者送之過者止之兵法云避其來銳擊其惰歸此之謂也凡病泄而惡風寒是太陰傳少陰是木來尅水也用除濕白朮茯苓安脾芍藥桂

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

黃連破血也火邪不能勝水也太陰經不能傳少陰而反火邪上乘肺經而痢必白膿也加黃連當歸之類又裏急後重脉大而洪實為裏熱而甚蔽是有物結墜也若脉浮大甚不宜下雖裏急後重而脉沉細弱者謂寒邪在內而氣散也可溫養而自愈裏急後重閉者大腸經氣不宣通也宜加檳榔木香宣通其氣如痢或泄而嘔者胃中氣不和也上焦不和治以生薑橘皮中焦不和治以芍藥當歸桂茯苓下焦不和寒治以輕熱甚以

重熱藥大便虛秘澁久不愈恐太陰傳少陰多傳變為痢太陰傳少陰是為賊邪先以枳實厚朴湯以防其變若四肢懶倦小便少或不利大便走沉困飲食減宜調胃去濕白朮芍藥茯苓三味水煎服以白朮之甘能入胃而除脾胃之濕芍藥之酸澁除胃中之濕熱四肢困茯苓之淡泄能通水道走濕此三味泄痢須用此如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也加黃連為主桂枝佐之如腹痛甚者加當

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

歸倍芍藥如見血加黃連為主桂當歸佐之如燥煩或先便白膿後血或發熱或惡寒非黃芩不止上部血也如惡寒脉沉或白腰痛或血臍下痛非黃連不能止此中部血也如惡寒脉沉先血後便非地榆不能除此下部邪也血也如便膿血相雜而脉浮大慎不可以大黃下之下之必死謂氣下竭也而陽無所收也凡陰陽不和唯可以分陰陽藥治之又云暴泄非陰久泄非陽大便完穀下有寒有熱者脉疾身多動音聲響亮暴注下



迫此陽也寒者脉沉而細疾身不動作目睛不了了飲食不下鼻準氣息者薑附湯主之若身重四肢不舉		術附湯主之		治泄痢腹痛或後重身熱久而不愈脉洪疾者反下痢		膿血稠粘黃芩芍藥湯		黃芩 芍藥 各一 兩 錢五		甘草 五錢		右為龕末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服清無		時如痛則加桂少許		欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中		治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈		者用大黃湯		大黃 一兩		右為細剉好酒二大盞同浸半日許再同煎至一盞		半去大黃不用將酒分為二服頓服之痢止一服如		未止再服以利為度服芍藥湯和之痢止再服黃芩		芍藥湯和之以徹其毒也		芍藥湯 下血調氣經曰澁而便膿氣行而血止行血	
---	--	-------	--	-----------------------	--	-----------	--	------------------	--	-------	--	----------------------	--	----------	--	-------------------	--	-----------------------	--	-------	--	-------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	------------	--	-----------------------	--

則便自愈調氣則後重除		芍藥 當歸 黃連 檳榔		木香 甘草 大黃 黃芩		官桂 半錢		右咬咀每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服清如		血痢則漸加大黃如汗後藏毒加黃蘗半兩依前服		白朮黃耆湯 服前藥痢雖已除猶宜此藥和之		白朮 黃耆 甘草		欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中		右咬咀勻作三服水一盞半煎至一盞去滓溫服清		治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗宜防風		芍藥湯		防風 芍藥 黃芩		右咬咀每服半兩或一兩水三盞煎至一盞溫服清		治太陰脾經受濕水泄注下體微重微滿困弱無力不		欲飲食暴洩無數水穀不化先宜白朮芍藥湯和之身		重暴下是大勢來亦宜和之	
------------	--	-------------	--	-------------	--	-------	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	----------	--	-------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	-----	--	----------	--	----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-------------	--



白朮芍藥湯	白朮 兩一	芍藥 兩一	甘草 錢五
右剉每服一兩水二盞煎至一盞溫服清如痛甚者宜			
蒼朮芍藥湯	蒼朮 兩二	芍藥 兩一	黃芩 兩半
右剉每服一兩加淡味桂半錢水一盞半煎至一盞			
溫服清如脉弦頭微痛者宜			
蒼朮防風湯			
欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中			
蒼朮	防風 兩各二	上使	
右剉同前煎服如下血者宜			
蒼朮地榆湯	蒼朮 兩二	地榆 兩一	下使
右剉同前煎服			
已上證如心下痞每服各加枳實一錢如小便不利每			
服各加茯苓二錢如腹痛漸已瀉下微少宜訶子散止			
之法云大勢已去而宜止之			

訶子散	訶子 生半兩熟半	木香 兩半	黃連 錢三	甘草 錢三
右為細末每服三錢以白朮芍藥湯調下如止之不				
已宜歸而送之也訶子散加厚朴一兩竭其邪氣也				
虛滑久不愈者多待變為痢疾太陰傳待少陰是為				
鬼邪先以厚朴枳實湯防其待變				
厚朴枳實湯	厚朴 剉一兩	枳實 剉一兩	訶子 半兩半生	木香 兩半
欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中				
黃連	甘草 錢二	大黃 錢三		
右為細末每服三五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服				
治暴泄如水周身汗出一身盡冷脉微而弱氣少而不				
能語其甚者加吐此謂急病宜治之以漿水散				
半夏 湯洗二兩	附子 半兩炮	乾薑 錢五	良薑 二錢半	
桂 錢五	甘草 錢五			
右為細末每服三五錢漿水二盞煎至一盞和滓熱				
服甚者三四服微者三服太陽經動下痢為驚瘧大				



腸不能禁固卒然而下成小泊光色其中或有硬物欲起而又下欲了而不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝秋冬白朮湯			
桂枝湯	桂	白朮	芍藥
		兩	各半
		甘草	二錢
		炙	
右剉每服半兩水一盞煎至七分去滓溫服清			
白朮湯	白朮	芍藥	乾薑
		錢	各三
		炒	半兩
		甘草	二錢
		炙	
右剉為麤末如前服之甚則去乾薑加附子三錢辛能發也			
治厥陰動為瀉痢者寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利或涕唾膿血瀉痢不止者為難治宜升麻湯或小續命湯以發之法云謂表邪縮于內故下痢不止當散表邪于四肢布於絡脉外無其邪則藏府自安矣			
治水積入胃名曰溢飲滑泄渴能飲水水下復瀉而又			

渴此無藥證當灸大推			
諸瀉痢久不止或暴下者皆太陰受病故不可離于芍藥若不受濕不能下痢故須用白朮是以聖人立法若四時下痢於芍藥白朮內春加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附然更詳外證寒熱處之如裏急後重須加大黃如身困倦須加白朮如通身自汗逆冷氣息微加桂附以溫之如或後重膿血稠粘雖在盛冬於溫藥內亦加大黃			
欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中			
諸下痢之後小便利而腹中虛痛不可忍者此謂陰陽交錯不和之甚也當服神效越桃散			
大梔子	錢	三	高良薑
			錢
右和勻每服三錢米飲或酒調下其痛立效			
治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血宜服黃連湯			
黃連	去	當歸	甘草
兩	各半	兩	二錢
			炙
右咬咀每服五錢水一盞煎至七分食後溫服			
治大便後下血腹中痛者謂熱毒下血當服芍藥黃連			



湯				
芍藥	當歸	黃連	大黃	
淡味 半錢	各半 兩	一錢	一錢	
右咬咀每服半兩同前煎服如痛甚者調木香檳榔末一錢服之				
治久病腸風痛痒不任大便下血地榆湯				
蒼朮	地榆			
去皮 四兩	二兩			
右咬咀每服一兩水一盞煎至七分食前多服除根				
欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中				
治濕瀉茯苓湯				
白朮	茯苓			
一兩	去皮七錢半			
右咬咀水煎一兩食前服食入而瀉謂胃中有宿穀也當枳實五錢酒入而瀉溫熱瀉也加黃芩五錢				
治寒積痢男子小兒婦人皆不同赤白或清痢如水不後重者寒也經云澄徹清冷皆屬於寒此為虛寒中有積也宜附子巴豆之類下之見利則愈空心服				
治瀉痢久藏府不止虛滑穀不化用蒼朮湯下桃花丸				

蒼朮	防風			
二兩	二兩			
右剉細水用一椀煎至一大盞絞清汁下桃花丸八十丸立愈如小便澀少以五苓散下桃花丸或赤石脂丸小便利則愈矣				
太陽為脇熱痢涼膈散主之				
陽明為痼瘕進退大承氣湯主之珍珠囊中有少陽風氣自動其脉弦大柴胡湯主之				
太陰濕勝濡瀉不可利而可溫四逆湯主之				
欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中				
少陰蟄封不動禁固可澀赤石脂九乾薑湯主之厥陰風泄以風治風小續命湯消風散主之				
治下痢膿血裏急後重日夜無度導氣湯				
芍藥	當歸	大黃	黃芩	
一兩	五錢		各一錢半	
黃連	木香	檳榔		
	各一錢	一錢		
右為末每服三五錢水一盞煎至七分去滓溫服清如未止再煎服不後重則止				
雜例				



澁而便膿者小腸泄也脉五至之上洪者宜以七宣丸如脉平者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍藥藥皮四季通用宜加減平胃散七宣丸之類後宜服此藥去其餘邪兼平胃氣芍藥藥皮丸

芍藥

黃蘗 各等分

右為細末醋糊為丸如桐子大每服五七十九至二百丸溫水下食前

加減平胃散

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

白朮

厚朴

陳皮 各一兩

甘草 七錢

檳榔 三錢

木香 三錢

桃仁

黃連

人參

阿膠 各半兩

白茯苓 去皮半兩

右為細末同平胃散煎服血多加桃仁泄加黃連小便澁加茯苓氣不下後重加檳榔木香腹痛加芍藥甘草膿加阿膠濕加白朮脉洪加大黃四時以胃氣為本久下血痢則脾虛損而血不流於四肢入於胃中為血宜滋養脾胃則愈

夫五洩者之病其治法各不同者外證各異也胃泄者飲食不化多黃承氣湯下

脾泄者腹脹滿泄注食即嘔吐逆津建中理中

大腸泄者食已逼窘迫大便白腸鳴切痛乾薑附子

小腸泄者澁便膿血少腹痛承氣湯

大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便足少陰是也

莖中痛急利小便此五瀉之病也胃小腸大瘕三證皆

清涼飲子主之其泄自止後厥陰少陰二證另有治法

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷中

厥陰證而加甘草謂主莖中痛是肝也內經曰肝苦急急食甘以緩之少陰經證多裏急後重故加大黃令急推過物去則輕矣內經曰因其重而減之又曰在下者引而竭之又有太陰陽明二經證當進退大承氣主之太陰證不能食也當先補而後瀉之乃進藥法也先煎厚朴半兩俱依本方加製水一盞半煎至一半服若三兩服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎服三兩服泄又未已如稍加食尚有熱毒又加大黃三錢推



過泄止住藥如泄未止謂腸胃有久塵垢滑粘加芒硝
半合宿垢去盡則愈也陽明證能食是也當先瀉而後
補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水一盞依前法煎
至七分稍熱服如泄未止去芒硝後稍熱退減大黃一
半煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃枳實
厚朴湯又煎三兩服如腹脹滿退泄亦自愈後服厚朴湯
數服則已

又寒熱水洩之例子后

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

洩者一也總包五法謂之六義曰六解難經有傷寒五
泄叔和云濕多成五洩仲景解四經泄痢有不可汗有
不可下者可吐可灸者仲景隨經自言之假令渴引飲
者是熱在膈上水多入則下鬲入胃中胃經本無熱不
勝其水名曰水恣故使米穀一時下此證當灸大推三
五壯立已乃瀉腎也如用藥使車前子雷丸白朮茯苓
之類可選用之五苓散亦可又有寒泄者大腹滿而泄
又有驚瘡者是寒泄也鴨瘡者大便如水中少有結糞

者是也如此者當用天麻附子乾薑之類是也
又法曰泄有虛實寒熱虛則無力粘衣不便已洩出謂
不能禁固也實則數至圍而不能便俗云虛坐努責是
也裏急後重皆依前法進退大承氣湯主之一說素問
云春傷於風夏必飧泄又云久風為飧泄泄者乃水穀
不化而完出非水入胃而成此證非前水恣也此一證
不飲水而穀完出名曰飧泄治法於後先以宣風散導
之出錢氏方中四味者是也後服蒼朮防風湯

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

蒼朮

去皮
四兩

麻黃

去根節
四兩

防風

去芦頭
五錢

右為麓末每服一兩生薑七片水二盞煎至一盞去
滓溫服泄止後服椒朮丸

蒼朮

二兩

小椒

一兩
去目炒

右為極細末醋糊為丸如桐子大每服二十九丸或三
十九食前溫水下一法惡痢久不愈者彌加如小兒
病丸如黍米大

治瀉痢膿血乃至脫肛地榆芍藥湯



蒼朮 兩 八	地榆 兩 三	卷柏 兩 三	芍藥 兩 三
右咬咀每服一兩水一大盞半煎至一半溫服清病退藥止	五泄傷寒乃分三節	初說暴	次說中
後說久泄	此說在難經二十二難是三節內包十五法初以暴藥中以的對證藥後疾得中也末治久泄法仲景論厥陰經治法是也	治久泄法先進縮煎小續命湯是發其汗使邪氣不能侵于內然後治其痢秋冬間下痢風吐論中加減厚朴丸大效	凡藏府之秘不可一例治療有虛秘有實秘胃實而秘者能飲食小便赤當以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之
厚朴 薑制 一兩	白朮 兩 五	半夏麴 兩 二	枳實 炒 一兩
陳皮 去白 一兩	甘草 炙 三兩		

右為麓末每服三五錢水一盞半生薑五片棗三枚煎至一盞去滓溫服空心實秘者物也虛秘者氣也平胃丸治病久虛弱厭厭不能食而藏府或秘或瀉此胃氣虛弱也常服和中消痰去濕及厚腸胃進飲食	厚朴 兩 一	白朮 二錢 一兩	陳皮 去白 八錢	木香 錢 一
生半夏 湯洗 二兩	檳榔 二錢 半	枳實 錢 半	甘草 炙 三錢	
右為細末薑汁浸蒸餅丸桐子大每服三五十丸生薑湯或溫水送下	心痛論第二十	論曰諸心痛者皆少陰厥氣上衝也有熱厥心痛者身熱是寒痛甚則煩燥而吐額自汗出知為熱也其脉洪大當灸大谿及崑崙謂表裏俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗通身而出者愈也灸畢服金鈴子散痛止服枳朮丸去其餘邪也有實心中痛者因氣而食卒然發痛大便或秘久而注悶心胃高起按之愈痛不能飲食急以煮黃丸利之利後以梘本湯去其餘邪有寒		



厥心痛者手足逆而通身冷汗出便利溺清或大便利而不渴氣微力弱急以术附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死當急救之是知久痛無寒而暴痛非熱也治熱厥心痛或發或止久不愈者當用金鈴子散

金鈴子

玄胡 各一兩

右為細末每服三錢酒調下

大實心痛煮黃丸

雄黃 一兩

已豆 五錢 去皮生用
研細入雄黃末

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

右再研二味白麵二兩同和再研勻滴水丸如桐子

大每服時先煎漿水令沸下藥二十四丸煮一二十

沸撈入冷漿水沉冷一時服一九二日二十四時加

至微利為度用浸藥水送下此治脇下痞痛如神

治大實心痛大便已利宜蘘本湯徹其痛也

蘘本 半兩

蒼术 一兩

右為麤末每服一兩水二盞煎至一盞溫服清

治寒厥暴痛脉微氣弱宜术附湯

术附湯

附子

一兩 炮去皮
臍細切一兩

白术 四兩

甘草

二兩 炒

右為麤末入附子令勻每服三錢水一大盞半入生薑五片棗一枚劈破同煎至一盞去滓溫服食前此藥又治風濕相搏身重疼痛不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重者不知食味暖肌補中助陽氣止自汗

治男子婦人心經中搐熱如癇病狀宜服妙香丸風癇

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷中

者煎羌活為引下妙香丸血癇當歸湯引下

刺心痛諸穴於後

真心痛手足青至節痛甚旦發夕死夕發旦死心痛

腹脹嗆嗆然大便秘不利取足太陰心痛引腰脊欲嘔

取刺足少陰心痛引小腹滿上下無常處便溺難刺

足厥陰心痛短氣刺手太陰心痛當九節刺之立已

不已上下求之得之則已

接經三法



心痛與背相接善恐如從後觸其心偃僂者腎心痛也先刺經骨崑崙不已刺合骨

心痛腹脹胃滿心尤痛者胃心痛也刺太都太白二穴

心痛如錐刺乃脾心痛也刺然谷太谿

心痛蒼然如死狀終日不得休息乃肝心痛刺行間

太衝

心痛卧若徒居心痛間動作益痛甚者其色不變此

肺心痛也刺魚際太淵宣通氣行無所凝滯則病愈

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷中

也

太谿穴足少陰腎經土也為腧在足內踝後根骨上脉

動陷中可灸三壯或五七壯此瀉熱厥心痛

崑崙足太陽膀胱經水也在足外踝後根骨上陷中可

灸三壯或五七壯亦可瀉熱厥痛

保命集卷中

欽定四庫全書

子部
保命集卷下

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣王瓚

謄錄監生臣邵士洙



欽定四庫全書

保命集卷下

金 張元素 撰

欬論第二十一

論曰欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽是無聲而有痰脾濕動而為痰也欬嗽謂有痰而有聲蓋因傷於肺氣動於脾濕欬而為嗽也脾濕者秋傷於濕積于脾也故內經曰秋傷于濕冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

肅反動之氣必上衝而為欬甚則動于脾濕發而為痰焉是知脾無留濕雖傷肺氣而不為痰也有痰寒少而熱多故欬嗽者非專主于肺而為病以肺主皮毛而司於外故風寒先能傷之也內經曰五臟六腑皆能令人欬非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時各傳而與之也所病不等寒暑燥濕風火六氣皆令人欬唯濕病痰飲入胃留之而不行上入于肺則為欬嗽假令濕在于心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在肺經謂

之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同宜隨證而治之若欬而無痰者以辛甘潤其肺故欬嗽者治痰為先治痰者下氣為上是以南星半夏勝其痰而欬嗽自愈枳殼陳皮利其氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微下之少利為度痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡四兩加石膏一两知母半兩用之冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之然此為大例更當隨證隨時加減之量其虛實此治法之大體也

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯

燒生薑胡桃

此者皆治無痰而嗽者當辛甘潤其肺故也如但使青陳皮藥皆當去白本草云陳皮味辛理上氣去痰氣滯塞青皮味苦理下氣二味俱用散三焦之氣也故聖濟云陳皮去痰穰不除即生痰麻黃發汗節不去而止汗

治風痰熱咳嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺秘澁心多



燥怒水養金花丸

南星

半夏 各一兩 生用

天麻 五錢

雄黃 二錢

白麵 三兩

寒水石 一兩 燒存性

右為細末滴水為丸每服五七十九至百丸煎漿水沸下藥煮令浮胃度漉出淡漿水浸另用生薑湯下

或通聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆可用也

小黃丸治熱痰欬嗽脉洪面赤煩熱心痛唇口乾燥多

喜笑宜小黃丸

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

南星

湯洗

半夏 各一兩 洗

黃芩 一兩 半

右為細末生薑汁浸蒸餅為桐子大每服五十九至七十九食後薑湯下及小柴胡湯中加半夏亦可

白朮丸治痰濕欬嗽脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹而食不消化宜白朮丸

南星

半夏 俱湯洗 各一兩

白朮 一兩 半

右為細末糊為丸桐子大每服五七十九生薑湯下及局方中防己丸亦可用

玉粉丸治氣痰欬嗽脉澁面白上喘氣促洒淅惡寒愁不樂宜服之

南星

半夏 俱洗 各一兩

官桂 去皮 一兩

右為細末糊為丸如桐子大每服五七十九生薑湯下食後及局方中防己丸亦可玉粉丸加減在後心

下痞者加枳實五錢身熱甚者加連五錢體重者加

茯苓一兩氣上逆者加苦亭蘼五錢氣促者加人參

桔梗各五錢浮腫者加郁李仁杏仁各五錢大便秘

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

者加大黃五錢

雙玉散治痰熱而喘痰湧如泉

寒水石

石膏 各等分

右為細末煎人參湯調下三錢食後服

治痰千緡湯

半夏 生味 一兩

大皂角 去皮子半 兩剉碎

右同於絹袋中盛之用水三升生薑七大片同煎至一半以手操洗之取清汁分作三服食後併服二服



效

防風丸治痰嗽胃中氣不清利者 枳朮丸亦妙

防風 兩半 枳殼 半兩去穢炒 白朮 兩一

右細末燒飯為丸每服五七十九生薑湯下

天麻丸

天麻 兩一 半夏 南星 各一兩 雄黃 少許

右以白麵二兩滴水為丸如桐子大每服五十九至

百丸煎淡水令沸下藥煮十餘沸漉出食前生薑湯

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下

下

利鬲丸主胃中不利痰喘促利脾胃壅滯調秘瀉藏

推陳致新消進飲食治利鬲氣之勝藥也

木香 半一錢 檳榔 半一錢 人參 錢三 當歸 錢二

藿香 半一錢 大黃 酒浸焙一兩 厚朴 薑制三兩 枳實 炒一兩

甘草 炙五錢

右為細末滴水 and 丸如桐子大每服三五十九食後

諸飲皆下

欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

青皮 白去 陳皮 白去 檳榔 木香

杏仁 尖去皮 郁李仁 皮去 茯苓 澤瀉

當歸 茂 炮 馬兜鈴 苦亭蘼

已上各三兩 人參 防己 錢各五 牽牛 取頭末一兩

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧子大每服一二十

丸加至五七十九生薑湯下食後

玉粉丸治痰結咽喉不利語音不出

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下

半夏 錢洗五 草烏 一字少 桂 一字多

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一丸

至夜含化多歲不愈者亦效

枳殼湯治久痰胃脘不利者多上焦發熱

枳殼 穢炒去穢二兩 桔梗 三兩 黃芩 半一兩

右同剉每日早用二兩半水三盞煎至二盞勻作三

服午時一服中時一服臨卧時一服三日七兩半藥

盡服生半夏湯



生半夏湯

半夏

不以多少洗七遍切作片子

右每服秤三錢水一盞半入生薑五大片同煎至一盞和滓食後服一日三二服服三日畢再服枳朮丸盡其痰為度論曰先消胃中氣後去鬲上痰再服枳朮丸謂首尾合盡消其氣謂令痰不復作也

清鎮丸治熱嗽

小柴胡湯內加人參一倍

青黛兩半

欽定四庫全書

病機氣宜保命集卷下

右為細末麵糊丸如桐子大每服五十九生薑湯下半夏丸治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒已吐加檳榔三錢

半夏

一兩湯洗切

雄黃研三錢

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服三十九生薑湯下小兒丸如黍米大

白朮散治夏暑大熱或醉飲冷痰濕不止膈不利

白朮

茯苓

半夏洗

黃芩各等分

右為麤末每服五錢至七錢水二盞入生薑十片煎至一盞去滓調陳皮末一錢神麴末一錢食後

法曰大熱大飲蓋酒味熱而引飲冷與熱凝於胃中不散而成濕故痰作矣甚者宜吐之吐後服五苓甘露勝濕去痰之劑

白朮湯治痰潮上如湧泉久不可治者

白朮

白茯苓

半夏等分

欽定四庫全書

病機氣宜保命集卷下

右為末每服半兩病大者一兩水二盞生薑七片煎至一盞取清調神麴末二錢頓服之病甚者下玉壺丸一百丸大效永除根

天門冬丸治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面目浮腫

目浮腫

天門冬

十兩去心秤

麥門冬

去心八兩

生地黄

三斤取汁為膏子

右二味為末膏子和丸如梧子大每服五十九煎逍遙散送逍遙散中去甘草加人參或服王氏博濟方中人參荊芥散亦可如面腫不已經曰面腫曰風故



宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡飲子去大黃故
論曰治藏者治其俞治府者治其合浮腫者治其經
治俞者治其土也治合者亦治其土也如兵家圍魏
救趙之法也

虛損論第二十二

論曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則
陰盛損自上而下治之宜以辛甘淡過于胃則不可治
也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以
苦酸鹹過于脾則不可治也自上而損者一損于肺皮
聚而毛落二損損于心血脉虛少不能榮于藏府婦人
月水不通三損損于胃飲食不為肌膚自下而損者一
損于腎骨痿不能起于床二損損于肝筋緩不能自收
持三損損于脾飲食不能消克論曰心肺損而色蔽腎
肝損而形痿穀不能化而脾損感此病者皆損之病也
漸漬之深皆虛勞之疾也
四君子湯治肺損而皮聚毛落益氣可也

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下



迪志文化出版有限公司出版

白朮 人參 黃耆 茯苓 各等分
右為麓末每服五錢至七錢水一盞煎至七分去滓
食遠溫服
八物湯治心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水
愆期宜益氣和血

白朮 人參 黃耆 茯苓
川芎 熟地黃 當歸 芍藥 各等分

右麓末服五七錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

十全散治心肺損及胃飲食不為肌膚宜益氣和血調
飲食

白朮 人參 黃耆 茯苓

桂 熟地黃 當歸 川芎

芍藥 甘草 等分

右為末加生薑棗同煎水一大盞藥五錢煎至七分

食前日三服

金剛丸治腎損骨痿不能起于床宜益精



迪志文化出版有限公司出版

草薺	杜仲 絲炒去	茯苓 酒浸	兔絲子 酒浸等分
右為細末酒煮猪腰子為丸每服五七十九空心酒下			
牛膝丸治腎肝損骨痿不能起于床筋緩不能收持宜益精緩中			
牛膝 酒浸	草薺	杜仲 絲炒去	茯苓 酒浸
防風	兔絲子 酒浸	白蒺藜 各等分	桂 半之
右細末酒煮猪腰子搗丸桐子大空心酒下五七十			
欽定四庫全書	病機氣宜保命集		
卷下			
丸			
煨腎丸治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中消穀			
牛膝	草薺	杜仲	茯苓
兔絲子	防風	白蒺藜	胡蘆巴
破故紙 等分	桂 半之		
右和劑服餌如金剛丸法腰痛不起者甚效			
黑地黃丸加五味子名腎氣丸治陽盛陰虛脾腎不足			
房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色宜此藥養血			

益腎	蒼朮 一斤米泔浸	熟地黃 一斤	川薑 冬一兩夏五錢春七錢
五味子 斤半			
右為細末棗肉為丸如梧子大每服一百丸至二百丸食前米飲下或酒治血虛久之甚效經曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣五味子味酸故酸以收之此雖陽盛不燥熱乃是五藏虛損於內故可益血收氣也此藥類象神品藥也			
欽定四庫全書	病機氣宜保命集		
卷下			
治陽虛陰盛心肺不足宜八味丸若形體瘦弱無力多困未知陰陽先損夏月地黃丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸			
消渴論第二十三			
論曰消渴之疾三焦受病也有上消中消腎消上消者上焦受病又謂之鬲消肺也多飲水而少食大便如常或小便清利知其燥在上焦也治宜流濕潤燥中消者胃也渴而飲食多小便黃經曰熱能消穀知熱在中法			



云宜下之至不欲飲食則愈腎消者病在下焦初發為膏淋下如膏油之狀至病成而面色黧黑形瘦而耳焦小便瀉而有脂治法宜養血以肅清分其清濁而自愈也法曰燥上而渴辛甘而祛用潤肺故可用蜜煎生薑湯大器頓之時時呷之法云心肺之病莫厭煩而少飲內經云補上治宜以緩又曰辛以潤之開腠致津液通則肺氣下流故氣下火降而燥衰矣其渴乃止又經曰二陽結為消王注曰二陽結於胃及大腸俱熱也腸胃

欽定四庫全書
病機氣宜保命集
卷下

藏熱則善消水穀可甘辛降火之劑黃連末一斤生地黃自然汁白蓮花藕自然汁牛乳汁各一斤熬成膏子劑連末為丸每服桐子大三十九少呷溫水送下日進十服渴病立止

治上焦鬲消而不欲多食小便清利宜小柴胡湯或加白虎湯或錢氏中地骨皮散內加 芍藥黃耆 石膏 黃芩 桔梗之類是也

人參石膏湯治鬲消上焦煩渴不欲多食

人參 半兩 石膏 一兩 知母 七錢 甘草 四錢

右為麓末每服五錢至七錢水煎食後溫服

順氣散治消中熱在胃而能食小便赤黃微利之為效不可多利服此藥漸漸利之不欲多食則愈

厚朴 薑制一兩 大黃 四兩 枳實 二錢

右剉每服五錢水煎飭遠服

茴香散治腎消病下焦初證小便如膏油

茴香 炒 苦練 炒

右細末酒調二錢食前

八味丸治腎消大病加減法

本方內倍加山藥外桂附從四時加減假令方內桂附一兩春各用三錢夏用一錢秋用五錢冬全用一兩

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收

黃栢一斤 於新瓦上燒令通赤為度 真蛤粉一斤

右為細末滴水丸如桐子大每服一百丸空心酒下

法曰盛陽乘陽故精泄也黃栢降火蛤粉鹹而補腎



陰也又治思想無窮所願不得之證

竹籠散治消渴

五靈脂 黑豆去皮

右等為細末每服三錢冬瓜湯調下無冬瓜苗葉皆可日二服小渴二三服效渴定不可服熱藥唯服八味丸去附子加五味子

腫脹論第二十四 小兒附

靈樞脹論云帝問岐伯脹形何如岐伯曰夫心脹者煩

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下

心氣短卧不安肺脹者虛滿而喘欬肝脹者脇下滿而痛引少腹脾脹者善噦四肢煩惋體重不能勝衣卧不安腎脹者引背央央然腰髀痛六腑脹胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨于食大便難大腸脹者腸鳴痛而濯濯冬日重於寒則飧泄食不化小腸脹者小腹臘滿引腰而痛膀胱脹者少腹氣滿而氣癢三焦脹者氣滿于皮膚中磴磴然而不堅膽脹者脇下痛脹口苦善太息又水脹篇云帝問岐伯水脹何如荅曰水始起也目窠

上微腫如新卧起之狀其頸脉動欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也帝曰膚脹何如岐伯曰膚者寒氣客于皮中鼓空空然不堅腹身大盡腫皮厚按其腹胃而不起腹色不變此其候也鼓脹何如荅曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如荅曰寒氣客于腸外與衛相搏氣不得榮因有所繫癖而內着惡氣乃起瘕肉生其始大也大如雞子稍以益大至其成如懷子狀以離歲按之則堅推之則移月事不以時下此其候也石瘕如何荅曰石瘕生于胞中寒氣客于子門閉塞氣不通惡血當瀉瘀以留止日以益大狀如懷子月事不時皆生於女子可導而下帝曰膚脹鼓脹可刺邪曰先瀉其脹之血絡復調其經刺去其血絡也經云平治權衡去菀陳剋開鬼門潔淨府平治權衡者察脉之浮沉也去菀陳剋者踈滌腸胃也開鬼門潔淨府者發汗利小便也又鼓脹之病治以雞屎醴名醫云

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下



其腫有短氣不得卧為心水兩脇痛為肝水大便鴨澇
為肺水四肢皆腫為脾水腰痛足冷為腎水口苦咽乾
為膽水乍虛乍實為大腸水各隨其經絡分其內外審
其脉證而別之大有風水皮水石水黃汗推各藏以論
之風合歸肝皮合歸肺黃汗歸脾石合歸腎風水脉浮
必惡風皮水脉亦浮按下没指石水脉沉腹滿不喘黃
汗脉沉遲發熱而多涎久而不愈必致癰膿水腫脉浮
帶數即是虛寒潛止其間久必沉伏沉伏則陽虛陰實
欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下



欽定四庫全書
病機氣宜保命集
卷下


為水必矣要知水脉必沉是也論曰脉出者死與病不
相應也諸唇黑則傷肝缺盆盈平則傷心臍出則傷脾
足平則傷腎背平則傷肺此五者必不可療也治法云
腰以上宜發汗腰以下利小便錢氏論虛實腹脹實則
不因吐瀉久病之後亦不因下利脹而喘急悶亂更有
痰有熱及有宿食不化而脹者宜服大黃丸白餅子紫
霜丸下之更詳認大小便如俱不通先利小便後利大
便虛則久病吐瀉後其脉微細肺主目胞腮虛腫手足

冷當先服塌氣丸後服異功散及和中丸益黃散溫其
氣 因于氣腫者橘皮煎丸 因于濕為腫煎防己黃
耆湯調五苓散 因于熱為腫者服八正散
又一法燥熱於肺為腫者乃絕水之源也當清肺除燥
水自生矣于豉梔湯中加黃芩如熱在下焦陰消使氣
不得化者當益陰則陽氣自化也黃蘗黃連是也

五脉論五水灸法

青水灸肝井 赤水灸心榮 黃水灸脾俞 白水灸

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下



肺經 黑水灸腎合

婦人蠱脹無脉燒青丸 五皮散亦是

論諸蠱脹者有二腫若從胃則旦食而不能夜食旦則
不脹夜則脹是也若水腫證濡泄者是也內經曰蠱脹
之病治以雞屎醴酒調服水脹之病當開鬼門潔淨府
也

白茯苓湯名變水

白茯苓 澤瀉 各二兩 郁李仁 錢二



右咬咀作一服水一椀煎至一半常服無時從少至多服或煎得澄入生薑自然汁在內和麵或做粥飯作常食五七日後覺脹下再中以白朮散		
白朮	澤瀉	各半兩
右為細末煎服三錢茯苓湯調下或丸亦可服三十丸		
未治之藥服黃耆芍藥建中之類以調養之平復後忌房室猪魚塩麵等物		
欽定四庫全書		
		
病機氣宜保命集		
卷下		
治水氣蠱脹潔淨府楮實子丸		
楮實子	一斗水二斗	
熬成膏子		
白丁香	一兩半	
茯苓	三兩	去皮
右二味為細末用楮實膏為丸如桐子大不計丸數從少至多服至小便清利及腹脹減為度後服中治藥末治藥調養藥疎啓其中忌甘苦酸補其下五補七宣		
取穴法		
治腫治其經治金火也并榮俞經陰經金也舍木水火		

陽經火也			
治腫木香散			
木香	大戟	白牽牛	各等分
右為細末每用三錢猪腰子一對批開摻藥在內燒熟空心服之如左則塌左右則塌右如水腫不能全去於腹上塗甘遂末在遶臍滿腹少飲甘草水其腫便去也			
治水腫	欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷下		
螻蛄去頭尾與葡萄心同研露七日曝乾為細末淡酒調下暑月濕用尤佳			
又方			
棗一斗鍋內入水上有四指用大戟并根苗蓋之遍盆合之煮熟為度去大戟不用旋旋喫無時盡棗決愈神效			
眼目論第二十五			
論曰眼之為病在府則為表當除風散熱在藏則為裏			



宜養血安神暴發者為表而易治久病者在裏而難愈
除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸婦人熟
乾地黃丸是也或有體肥氣盛風熱上行目昏澁者槐
子散主之此由胸中氣濁上行也重則為痰厥亦 缺
使胸中氣清無此病也又有因目疾過藥多而損
缺入之眼漸昏弱乍明乍暗不欲視物此目少血之
驗也熟乾地黃丸消風散定志丸相須而養之或有視
物不明見黑花者此謂之腎氣弱也宜補腎水駐景丸
欽定四庫全書  病機氣宜保命集
卷下
是也或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也而陰反閉
之此風邪內滿當有不測之疾也翳膜者風熱重而有
之或斑入眼此肝氣盛而發在表也翳膜已生在表明
矣當發散而去之反疎利則邪氣內擣為翳則深也邪
氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之冰翳而沉邪氣
牢而深者謂之陷翳當以煥發之物使其邪氣再動翳
膜乃浮輔之退翳之藥則能自去也病久者不能速效
當以歲月除之

治眼赤暴發腫散熱飲子
防風 羌活 黃芩 黃連 各一兩
右剉每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服如大便
秘澁加大黃一兩如痛甚者加當歸地黃如煩燥不
能眠睡加梔子一兩
川芎散治風熱上衝頭目眩熱腫及胸中不利
芎 槐子 各一兩
右細末三錢如胸中氣滯不利生薑湯調目疾茶調
風熱上攻咬咀一兩水煎食後
治眼久病昏澁因發而久不愈地黃湯
防風 羌活 黃芩 黃連
地黃 當歸 人參 茯神 各等分
右為麤末每服五七錢水一盞半煎至一盞去滓溫
服食後
槐子散
槐子 黃芩 木賊 蒼朮 各等分



右細末茶清調下食後		治眼生翳膜及斑入眼焮赤已過者瀉青丸主之當半		減大黃如大便秘焮氣未定依方服之		治水翳久不去者羚羊角散主之		羚羊角 升麻 細辛 各等分 甘草 半之		右為細末一半為散一半蜜為丸如桐子大每服五		七十丸以羚羊角散下之食後臨卧米泔水煎服		治太陽經衛虛血實腫人臉重頭中濕淫膚脉睛痛肝		欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下		風盛眼黑腎虛桔梗便丸		桔梗 一斤 牽牛 頭末 三兩		右二味為末煉蜜丸如桐子大每服四五十九加至		百丸食前溫水下日二服		金絲膏 點眼藥		生薑 四兩 白沙蜜 一斤 煉 棕猪膽汁 三錢		黃連 四兩 槌用水一 手浸煎取五升		右先煎黃連水後入薑汁次入蜜同煎去沫淨次入	
-----------	--	-----------------------	--	-----------------	--	---------------	--	---------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	-----------------------	--	-------------------	--	------------	--	----------------	--	----------------------	--	------------	--	---------	--	------------------------	--	-------------------	--	----------------------	--

下項藥末		腦子 錢四 麝香 錢三 硃砂 錢四 鵬砂 錢三		輕粉 錢五 熊膽 錢四 青塩 錢三		右極細攪勻熬令稀膏點用		治眼暴赤發嗔痛不可忍者救苦丸		黃連 兩 當歸 二錢 甘草 一錢		右同剉細新水半椀浸一宿以慢火熬約至一半以		綿濾去滓以淨為妙用火再熬作稠膏子為度攤在		欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下		椀上倒合以物蓋之用熟艾一大彈子許底下燃之		用艾熏膏子艾盡為度再入下項藥		朱砂 一錢 腦子 半錢 乳香 沒藥 等分		右同研極細入黃連膏內搜和丸如米大每用二丸		點眼大角內仰面卧藥化則起		治眼發赤腫毒氣侵睛脹痛宣毒散		盆硝 雄黃 乳香 沒藥 各等分		右為極細末以少許鼻內嚙之	
------	--	-------------------------	--	-------------------	--	-------------	--	----------------	--	------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-------------------	--	----------------------	--	----------------	--	----------------------	--	----------------------	--	--------------	--	----------------	--	-----------------	--	--------------	--



治眼風毒發腫鼻中欲嚏嚏多大損而生瘡宣風散

川芎

甘菊 錢各二

乳香

沒藥 錢各一

右和勻再研極細少許鼻內噓之

目能遠視不能近視局方中定志丸目能近視不能遠

視萬壽地芝丸

生薑 四兩

天門冬 四兩

枳殼 三兩

甘菊 二兩

右為細末煉蜜丸如桐子大茶清或溫酒下一百丸

食後此藥能愈大風熱

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

洗眼藥

呵子 二兩

黃丹 四兩

蜜 八兩

柳枝 四十寸

右以河水二椀熬至半椀用一錢熱水化洗之石器

內熬

治眼赤瞎以青塗蛆不論多少淘淨熬乾末之令害眼

人仰卧合目用藥一錢散在眼上須臾藥行待少時去

藥赤瞎亦無

治倒睫 無名異末之摻捲在紙中作撚子點看到藥

處吹殺以煙熏睫自起

瘡瘍論第二十六

論曰瘡瘍者火之屬須分內外以治其本內經曰膏粱之變足生大丁其原在裏發于表也受持如虛言內結而發諸外未知從何道而出皆是從虛而出也假令太陽經虛從背而出少陽經虛從鬢出陽明經虛從髀而出腎脉經虛從腦而出又經曰地之濕氣感則害人皮膚筋脉其在外盛則內行若其脉沉實當先疎其內以絕其原也其脉浮大當先托裏恐氣傷于內也有內外之中者邪氣至甚遏絕經絡故發癰腫經曰榮氣不從道于肉理乃生癰疽此因失托裏及失疎通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏疎通行榮衛三法托裏者治其外之內疎通者治其內之外行榮衛者治其中也內之外者其脉沉實發熱煩躁外無焮赤痛其邪氣深於內也故先疎通以絕其原外之內者其脉浮數焮腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托裏內外之中

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下



者外無熇惡之氣內亦藏府宣通知其在經當和榮衛也
用此三法之後雖未差必無變證亦可使邪氣峻減而
易痊愈故經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又曰知其要者
一言而終不知其要流散無窮

鍼灸法曰凡瘡瘍可灸刺者須分經絡部分血氣多少
俞穴遠近若從背而出當從太陽五穴隨證選用或刺
或灸泄其邪氣^缺 凡太陽多血少氣

至陰

通谷

束骨

崑崙

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

委中

從鬢而出者當從少陽五穴選用 少陽少血多氣

竅陰

夾谿

臨泣

陽輔

陽陵泉

從髭而出者當從陽明五穴選用 陽明多血少氣

厲兌

內庭

陷谷

衝陽

解谿

從腦而出者初覺腦痛不可忍且欲生瘡也腦者髓之

海當灸刺絕骨以泄邪氣髓者舍也故脉浮者從太陽
經依前選用脉長者從陽明經依前選用脉弦者從少
陽經依前選用論曰諸經各有井榮俞經合井主心下
滿及瘡色青榮主身熱及瘡赤色俞主體重節痛瘡黃
色經主欬嗽寒熱瘡白色合主氣逆而泄瘡黑色隨經
病而有此證者或宜灸宜鍼以泄邪氣經曰邪氣內擣
則腫熱宜砭射之也內經曰夫癰氣之息者宜以鍼開
除之氣勝血聚者宜石而泄之王注曰石砭也可以破
大癰出膿今以排鍼代之凡瘡瘍已覺微謾腫硬皮血
不變色脉沉不痛者當外灸之引邪氣出而方止如以
有膿水者不可灸當刺之淺者亦不灸經曰陷者灸之
如外微覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺
者不可灸慎之

諸病瘡瘍如嘔者是濕氣侵于胃也藥中宜倍加白朮
服之

內疎黃連湯治嘔哕心逆發熱而煩脉沉而實腫硬木

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下



悶而皮肉不變色根深大病在內藏府秘澁當急疎利之			
黃連	芍藥	當歸	檳榔
木香	黃芩	山梔子	薄荷
桔梗	甘草	已上各一兩 連翹二兩	
右除檳榔木香二味為細末外並剉每服一兩水一盞半煎至一盞先喫一二服次每服加大黃一錢再服加二錢以利為度如有熱證止服黃連湯大便秘澁加大黃覺無熱證少煎沒藥內托復煎散時時服之如實無熱及大小便通止服復煎散稍有熱證却服黃連湯秘則加大黃如此內外皆通榮衛和調則經絡自不遏絕矣			
治腫焮于外根槃不深形證在表其脉多浮痛在皮肉邪氣盛則必侵于內急須內托以救其裏也服內托復煎散			
地骨皮	黃耆	芍藥	黃芩

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

白朮	茯苓	人參	柳桂
			味淡者
甘草	防己	當歸	防風
		已上各一兩	二兩
右咬咀先煎蒼朮一斤用水五升煎至三升去朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎服十二味滓此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已過却服復煎散半料如此使榮衛俱行邪氣不能內侵也			
治諸瘡瘍藏府已行如痛不可忍者可服當歸黃耆湯并加減在右			
當歸	黃耆	地黃	地骨皮
川芎	芍藥		
	等分		
右咬咀每服一兩水一椀煎至五分去滓溫服如發熱者加黃芩煩熱不能卧者加梔子如嘔是濕氣侵胃也倍加白朮			

欽定四庫全書

病機氣宜保命集

卷下

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下



膏藥方

好芝蔴油 斤半 當歸 兩半 杏仁 個四十九 桃柳枝 條各四十九

右用桃柳二大枝新綿一葉包藥繫於一枝上內油

中外一枝攪於鐵器內煎成入黃丹三兩一處熬水

中滴成不散如珠子為度

治金絲瘡一云紅絲瘤其狀如線或如繩巨細不等經

所謂丹毒是也但比煙毒不甚廣闊人患此疾頭手有

之下行至心則死下有之上行亦然法當於瘡頭截經

欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷下

而刺之以出血後嚼萍草根塗之立愈

治從高墮下涎潮昏冒此驚恐得也苦杖散

苦杖 不以多少

右細末熱酒調下如產後瘀血不散或聚血皆治之

治丁瘡奪命散

烏頭尖 附子底 蝎梢 雄黃 錢各一

蜈蚣 對一 硃砂 粉霜 輕粉

麝香 乳香 錢各半 信 二錢半 腦子 許少

右為細末先破瘡出惡血畢以草杖頭用紙帶入于
內以深為妙

治瘡難消不能作膿痛不止木香散

地骨皮 一兩去土皮 木香 兩半 穿山甲 二錢半 麝香 一字

右為細末酒調下三錢及小兒斑後生癰米飲調下

效如神

治丁瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁 蟬殼 管仲 各半 丁香

欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷下

乳香 錢各一

右細末每服二錢溫酒調下

治惡瘡有死肉者及追膿

白丁香 輕粉 粉霜 雄黃

麝香 錢各一 巴豆 三個去油

右同研細新飯和作錠子用之

治諸瘡大疼痛不變肉色謾腫光色名曰附骨癰如神

三生散



露蜂房	蛇退皮	頭髮	洗淨等分
三味燒灰存性研細酒調三錢			
治膀胱移熱于小腸上為口糜好飲酒人多有此疾當用蘆赤散五苓散各半兩煎服			
治少陰口瘡半夏散若聲絕不出者是風寒遏絕陽氣不伸也			
半夏	製一兩	桂	一字
右同煎一盞水分作二服其效如神		草烏頭	一字
治太陰口瘡甘攀散	欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下		
生甘草	一寸	白攀	一栗子大
右嚙化嚥津			
治赤口瘡乳香散			
乳香	沒藥	白攀	各一錢
為細末摻用		銅綠	飛半少許
治白口瘡沒藥散			
沒藥	乳香	雄黃	各一錢
		輕粉	半錢許

巴豆霜	少許
右細末乾摻	
瘰癧論第二十七	
夫瘰癧者經所謂結核是也或在耳前後連及頤頷下連缺盆皆為瘰癧或在胸及胸之側下連兩脇皆為馬刀手足少陽主之此經多氣少血故多堅而少軟膿白而稀如泔水狀治者求水清可也如瘰癧生去別經臨時於銅人內隨其所屬經絡部分對證之穴灸之并依經內藥用之獨形而小者為結核續數連結者為瘰癧形表如蛤者為馬刀	欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下
治馬刀連翹湯	
連翹	二斤
薤麥	一斤
大黃	三兩
甘草	二兩
右咬咀一兩水兩椀煎至一盞半早食後已時服在項兩邊是屬少陽經服藥十餘日後可於臨泣穴灸二七壯服藥不可住了至六十日決效有一方加大黃不用甘草更加貝母五兩雄黃七分檳榔半兩同	



未熱水調下三五錢

治療瘰癧文武膏

桑椹也

文武實

二斗黑熟者

右以布袋取汁銀石器中熬成薄膏白湯點一匙日

三服

痔疾論第二十八

論曰手陽明大腸名曰害蜚

蜚蟲也

六元正紀論陽明又曰

司殺府

手陽明屬金

大腸名害蜚謂金能害五蟲又曰司殺府

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

謂金主殺既有此二名何以自生蟲蓋謂三焦相火盛

而能制陽明金故木來相侮內經曰侮謂勝已也木主

生五蟲叔和云氣主生于脾藏傍大腸疼痛陣難當漸

覺少瀉三焦熱莫謾多方立紀綱此言飲酒多食熱物

脾生大熱而助三焦氣盛火能生土也當瀉三焦火熱

退使金得氣而反制木木受制則五蟲不生病自愈矣

蒼朮澤瀉丸

蒼朮

四兩去皮

澤瀉

二兩

枳實

二兩

地榆

二兩

皂子

二兩燒存性

右為細末燒飯為丸桐子大每服三十九食前酒或

未飲下

又方

川烏

炮

古石灰

等分

依前丸服

淋洗藥

天仙子

荊芥

小椒

蔓荊子

等分

右以水煎洗

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

黑地黃丸治痔之聖藥也在虛損門下有方

婦人胎產論第二十九

論曰婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆

從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從

厥陰經者是祖生化之源也厥陰與少陽相為表裏故

治法無犯胃氣及上二焦為三禁不可汗不可下不可

利小便發汗者同傷寒下早之證利大便則脉數而已

動于脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不

犯三禁則榮衛自和榮衛和而寒熱止矣外則和于榮衛內則調于清便先將此法為之初治次後詳而論之見證消息同壞證傷寒為之緩治或小便不利或大便秘結或積熱於腸胃之間或以成癰或散血氣而為浮腫蓋產理多門故同傷寒壞證如發渴而白虎氣弱則黃耆血刺痛而用以當歸腹中痛而加之芍藥已上例證不犯三禁皆產後之久病也凡產後暴病禁犯不可拘也如產後熱入血室者桃仁承氣抵當湯之類是也

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

胃堅燥者大承氣不可以世藥言之產後世人多用烏

金四物是不知四時之寒熱不明血氣之虛與實盲然

一槩用藥如此而愈加增劇是醫人誤之耳大抵產病

天行從增損柴胡雜證從加添四物然春夏雖從柴胡

秋冬約同四物藥性寒熱病證虛實不可不察也四物

湯常病服餌四時各有增損今具增損于后

春倍川芎

一曰春二曰脉
弦三曰頭痛

夏倍芍藥

一曰夏二曰脉洪三曰泄

秋倍地黃

一曰秋二曰脉沉

冬倍當歸

一曰冬二曰脉沉
三曰寒而不食

此常服順四時之氣而有對

血虛



迪志文化出版有限公司出版

證不愈者謂失其輔也春防風四物加防風倍川芎夏黃芩四物

加黃芩倍芍藥

秋天門冬四物加天門冬倍地黃

冬桂枝四物加桂枝倍當歸

此四時常

服隨證用之也如血虛而腹痛微汗而惡風四物加芎

桂謂之腹痛六合如風虛眩運加秦艽羌活謂之風六

合如氣虛弱起則無力匡然而倒加厚朴陳皮謂之氣

六合如發熱而煩不能安卧者加黃連梔子謂之熱六

合如虛寒脉微氣難布息不渴清便自調加乾薑附子

謂之寒六合如中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

苓謂之濕六合此婦人常病及產後病通用之藥也治

婦人虛勞局方中謂之首尾六合者如大聖散下熟乾

地黃丸是治無熱虛勞專其養也中道藥牡丹煎丸空

心食前人參荊芥散臨卧食後是治有熱虛勞藥也

治婦人懷胎腹脹枳殼湯

枳殼三兩

黃芩一兩

右為麤末每服半兩水一盞半煎一盞去滓溫服

治產前脹滿身體沉重枳殼湯中加白朮一兩



迪志文化出版有限公司出版

治產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯

治懷孕胎漏二黃散

生地黃 熟地黃 各等分

右為細末加白朮枳殼湯調下一兩日二服

治有孕胎痛地黃當歸湯

當歸 一兩 熟地黃 二兩

右為麤末作一服水三升煎至升半去滓頓服

束胎丸

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下

白朮 枳殼 去穰炒 等分

右為末燒飯為丸如桐子大入月一日食前服三五

十丸溫熱水下胎瘦易生也服至產則已

產間藥

治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或暴血下及

胞乾而不能產者宜服半夏湯

半夏麴 一兩 桂 七錢 半 大黃 五錢 桃仁 三十箇 去

右為細末先服四物湯三兩服次服半夏湯三錢生

薑三片水一盞煎去三分食後如未效次服下胎丸

下胎丸

半夏 生 白欬 各半 兩

右為細末滴水為丸如桐子大食後用半夏湯下三

二丸續續加至五七丸如有未效者須廣大其藥榆

白皮散主之又不效大聖散主之有宿熱人宜服人

參荊芥散

產後藥

欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下

治產後經水適斷感于異證手足牽搐咬牙昏冒宜增

損柴胡湯

柴胡 八錢 黃芩 四錢 人參 三錢 半夏 三錢

石膏 四錢 知母 二錢 黃耆 五錢 甘草 四錢

右為麤末每服半兩生薑五片棗四箇水一盞半煎

至一盞溫服清無時

前證已去次服秦芫湯去其風邪

秦芫 八錢 人參 三錢 防風 四錢 芍藥 半兩



柴胡 錢八	黃芩 半四錢	半夏 錢三	甘草 炙四錢
右為麓末每服五七錢水一盞煎至七分溫服清無時二三日經水復行前證退宜服荊芥散小柴胡小料中加荊芥穗五錢枳殼五錢麩炒去穰同小柴胡湯煎服三二日後宜正脾胃之氣兼除風邪宜服防風湯			
蒼朮 兩四	防風 兩三	當歸 半一兩	羌活 半一兩
右為麓末每服一二兩水三盞煎至一盞半取清續			
續常服無時			
凡胎前之藥無犯胎氣產後變化並同傷寒無證盡從加減四物湯			
治產後腹大堅滿喘不能卧白聖散			
樟柳根 兩三	大戟 半一兩	甘遂 炒一兩	
右為極細末每服二三錢熱湯調下取大便宣利為度此藥主水氣之勝藥也			
治產後風氣在表面目四肢浮腫宜加減局方中七聖			

九每服二十九白湯下日加三四九以利為度如浮腫喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多浮則腫如頭目昏冒加羌活川芎謂多風也如只浮腫依七聖丸本方服之			
治產後日以虛勞雖日久而脉浮疾者宜服三元湯			
柴胡	黃芩	人參	半夏
錢八			洗
甘草	川芎	芍藥	熟地黄
炙已上各三錢			
當歸	右為龕末同小柴胡湯煎服		
錢各二半			
欽定四庫全書			
			
病機氣宜保命集			
卷下			
治日久勞虛微有寒熱脉沉而浮宜柴胡四物湯			
川芎	熟地黄	當歸	芍藥
			各一兩半
柴胡	人參	黃芩	甘草
錢			
半夏麴	右為龕末同四物煎服		
已上各三錢			
如日久虛勞鍼灸小藥俱不效者宜服三分散			
白朮	茯苓	黃耆	川芎
芍藥	熟地黄	當歸	柴胡
		各一兩	一兩六錢



黃芩 錢六	人參 錢一兩六	半夏 錢六	甘草 錢六
右為麤末每服一兩水一盞煎至半盞溫服清日一服			
治產後虛勞不能食宜十全散			
白朮	茯苓	黃耆 各二兩	人參
川芎	芍藥	熟地黃	當歸 各一兩
桂 半一兩	甘草 半一兩		
右剉如麻豆每服半兩水一盞半入生薑五片棗三枚同煎至七分空心食前溫服清			
欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷下			
凡虛損病者淺深治有次第虛損論中詳論之			
治產後諸風痿攣無力血風湯			
秦艽	羌活	防風	白芷
川芎	芍藥	當歸	地黃
白朮	茯苓 各等分		
右為細末一半煉蜜丸如桐子大一半散溫酒調下			
九子五七十九甚妙			
治產後諸積不可攻當養陰去熱其病自退宜服芍藥			

湯	芍藥 斤一	黃芩	茯苓 各六兩
右三味為麤末每服半兩水煎日三服去滓溫服			
治產後兒枕大痛黑白散			
烏金石 燒紅醋七遍另為細末	寒水石 燒存性末		
右二味各等分另頓放臨服各抄末一錢半粥飲湯下痛止便不可服未止再服大效			
治產後不煩而渴桃花散			
欽定四庫全書  病機氣宜保命集 卷下			
新石灰 兩一	黃丹 錢半		
右細末渴時冷漿水調一錢服			
治產後衝脹胸中有物狀是噎氣不降紫金丹			
代赭石	硃礬石 各等		
右為細末醋糊為丸如桐子大每服三五十丸酒下			
胃中痛加當歸湯下久服治血癖			
又方			
代赭石 兩一	桃仁 三錢炒去皮尖	大黃 錢五	



右為末薄荷水為糊丸如桐子大每服三五十丸溫水下無時

治臍腹痛不可忍四物湯一兩加玄胡三錢半

治血癖腹痛及血刺腰痛四物湯細末二兩加酒煮玄

胡細末三兩每服三錢酒調下

治血運血結血聚於胸中或偏于少腹或連于肋脇四

物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭紅花玄胡各一兩同為

末如四物湯煎服取清調沒藥散服之

欽定四庫全書
病機氣宜保命集
卷下

沒藥散

盲虫 一錢去
足羽炒 水蛭 一錢
麝香

沒藥 三錢

右為細末煎前藥調服血下痛止只服前藥

治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛加減四物湯

羌活 川芎 防風 香附子 炒

白芷 已上各 石膏 二兩
一兩 半 細辛 二錢 當歸 五錢

熟地黄 一兩 甘草 五錢 蒼朮 一兩六錢 去皮

右為麤末每服一兩水煎服無時如有汗者是氣弱

頭痛也方中加芍藥三兩桂一兩半加生薑煎如痰

癖頭疼加半夏三兩茯苓一兩半加生薑煎如熱厥

頭痛又加白芷三兩石膏三兩知母一兩半寒厥頭

痛加天麻三兩附子一兩半生薑煎

治產後風虛血眩精神昏昧荊芥散

荊芥穗 一兩 三錢 桃仁 五錢去
皮尖炒

右為細末溫水調服三錢微喘加杏仁 去皮 炒 甘草 各

三錢

欽定四庫全書
病機氣宜保命集
卷下

治產前證胎不動如重物下墜腹冷如冰立效散

川芎 當歸 各等分

右為麤末每服秤三錢水二盞煎至一盞去滓食前

服

治婦人胎漏及因事下血枳殼湯

枳殼 半兩 黃芩 半兩 白朮 一兩

右為麤末每服五七錢水一盞煎至七分食前空心服

治婦人筋骨痛及頭痛脉弦增寒如瘧宜服風六合



四物湯四兩加羌活防風各一兩

治婦人血氣上衝心腹肋下悶宜服治氣六合湯

四物四兩加木香檳榔各半兩

治婦人臍下冷腹痛腰脊痛宜服玄胡六合湯

四物內加玄胡苦練炒各一兩

治婦人氣充經脉月事頻併臍下痛宜芍藥六合

四物內倍加芍藥

治婦人經事欲行臍腹絞痛宜服八物湯

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

四物內加玄胡苦練各一兩檳榔木香各半兩

治婦人經水過多別無餘證

四物內加黃芩白朮各一兩

治婦人經水澁少

四物內加葵花煎

治婦人虛勞氣弱喘嗽胸滿宜氣六合

四物內加厚朴一兩製枳實半兩炒

已上煎法並同四物服之

四物主治法

熟地黃補血如臍下痛非熟地黃不能除此通腎經之

藥也

川芎治風瀉肝木如血虛頭痛非川芎不能除去此通

肝經之藥也

芍藥和血理脾治腹痛非芍藥不能除此通脾經之藥也

當歸和血如血刺痛非當歸不能除如刀刺狀此通腎

經之藥也

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

以上四味治法如顯一證於四物湯中各加二味用之

如少腹痛四物湯四兩加玄胡苦練各一兩經水暴多

四物四兩加黃芩一兩如腹痛者只加黃連如夏月用

不去黃芩經水如黑豆水加黃連黃芩各一兩如經水

少而色血和者四物四兩加熟地黃當歸各一兩如經

水適來適斷往來寒熱者先服小柴胡以去其寒熱後

以四物湯調治之如寒熱不退勿服四物是謂變證表

邪猶存不能効也依前論中變證隨證用藥調治之



治婦人血積增損四物湯

四物內加廣茂京三稜桂乾漆皆依法製各加一

兩如四物煎服

治婦人產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣皆治之名曰紅花散

乾荷葉

牡丹皮

當歸

紅花

蒲黃

炒

右各等分為細末每服半兩酒煎和滓溫服如衣不

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

下另末榆白皮煎湯調半兩立效

治婦人惡物不下

當歸

炒

芫花

炒

右細末酒調三錢又好墨醋碎末之小便酒調下妙

又治胎衣不下蛇退皮

焦炒

細末二錢酒調下

諸見血無寒衄血下血吐血溺血皆屬於熱但血家證皆宜服此藥生地黃散

生地黃

熟地黃

枸杞子

地骨皮

天門冬

黃耆

芍藥

甘草

黃芩

右各等分同剉每服一兩水一盞半煎至一盞去滓溫服脉微身涼惡風每一兩加桂半錢吐血者多有此證

治衄血不止麥門冬飲子

麥門冬

生地黃

右等分剉每服一兩煎服又衄血先硃砂蛤粉次木

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

香黃連大便結下之大黃芒硝甘草生地黃瀉軟梔

子黃芩黃連可選用

帶下論附

論曰赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本也皆濕熱結于脉故津液湧溢是為赤白帶下本不病緣五脉經虛結熱屈滯于帶故女子臍下痛痛而綿綿陰器中時下也故經曰任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚王注曰任脉自胞上過帶脉貫於臍上故男子內結七



痼女子帶下帶脉起于李脇章門如束帶狀令濕熱冤結不散故為病也經曰脾傳之腎病名曰痼痼小腹冤熱而痛出白一名曰蠱所以為帶下冤屈也冤結也屈滯而病熱不散先以十棗湯下之後服苦練丸大玄胡散調下之熱去濕除病自愈也如女子不月先瀉心火血自下也內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王注曰大腸胃發病也心脾受之心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化味不化

欽定四庫全書

病機氣宜保命集卷下

則精不足精血不足故其證不能已虧則風邪勝而真氣愈消也又經曰月事不來者胞脉閉也胞脉屬於心而絡於胞中令氣上迫肺氣不得上通故月事不來先服降心火之劑後服局方中五補丸後以衛生湯治脾養血氣也

苦練丸治婦人赤白帶下

苦練

碎酒浸

茴香

炒

當歸

右等分為細末酒糊丸如桐子大每服三五十丸空

心酒下腰腿痛疼四物四兩加羌活防風各一兩衛生湯

當歸

白芍藥

各二兩

黃耆

三兩

甘草

一兩

右為麤末每服半兩水二盞煎至一盞去滓溫服空心如虛者加人參一兩

大頭論第三十

夫大頭病者是陽明邪熱太甚資實少陽相火而為之也多在少陽或在陽明或傳太陽視其腫勢在何部分

欽定四庫全書

病機氣宜保命集卷下

隨經取之濕熱為腫木盛為痛此邪見於頭多在兩耳前後先出皆主其病也治之大不宜藥速速則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病是自外而之內者是血病况頭部分受邪見于無邪迹之部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上著無形之分部既著無形無所不至若用重劑速下過其病難已雖用緩藥若急服之或食前或頓服皆失緩體則藥不能得除病當徐徐浸漬無形之邪也或藥性味形體擬象皆要不離緩



體是也且後急者謂緩劑已瀉邪氣入於中是到陰部

染於有形質之所若不速去則損陰也此終治却為客

邪當急去之是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在

上陰邪在下各本家病也若急治之不能解紛而益亂

也此故主主當緩治客以急者謂陽分受陰邪陰分受

陽邪此客氣急除去之也假令少陽陽明為病少陽為

邪出于耳之前後也陽明為邪者首大腫是也先以黃

芩黃連甘草湯通炒過剉煎少少不住服或劑畢再用

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

大黃煨鼠粘子新瓦上炒香煎藥成去滓內芒硝俱各

等分亦時時呷之無令飲食在前得微利及邪氣已只

服前藥如不已再同前次第服之取大便利邪氣即止

如陽明渴者加石膏如少陽渴者加瓜蒌根陽明行經

升麻芍藥葛根甘草太陽行經羌活防風之類

雷頭風附

夫治雷頭者諸藥不效為與證不相對也夫雷頭者震
卦主之震仰盂故予製藥內加荷葉謂象其震之形其

色又青乃述類象形也當煎局方中升麻湯

升麻湯

兩一

蒼朮

兩一

荷葉一箇全者

右為細末每服五錢水一盞煎七分溫服食後或燒

全荷葉一箇研細調煎藥服亦妙

耳論附

論曰耳者蓋非一也以竅言之是水也以聲言之金也

以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主

也有從外不能入者經也有若蟬鳴者有若鐘聲者有

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

若火熛熛狀者各隨經見之其間虛實不可不察也假

令耳聾者腎也何謂治肺肺主聲鼻塞者肺也何謂治

心心主臭如推此法皆從受氣為始腎受氣於己心受

氣於亥肝受氣於甲肺受氣於寅脾正四李此法皆長

生之道也

小兒斑疹論第三十一

論曰斑疹之病其狀各異瘡發焮腫于外屬少陽三焦
相火謂之斑小紅壓行於皮膚之中不出者屬少陰君



火也謂之疹凡顯斑證者若自吐瀉者慎勿治則多吉
謂邪氣上下皆出也大凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動
而生變此謂少陽通表宜和之也當先安其裏以解毒
次微發之安裏解毒者謂能安和五臟防風湯是也如
大便不秘次微發之微發之藥錢氏中甚多宜選用之
如大便過秘宜微利之當歸九棗變百祥丸是也初知
是斑疹若便發之令斑併出小兒難禁是使別生他證
也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若已吐利不可

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

下也便宜安裏藥三五服如能食大便秘者內實宜微
疎利之若內虛而利者宜安裏藥三五服末後一服調
微發之藥服之大抵用安裏之藥多發表之藥少秘則
微疎之邪氣不併出能作番次使小兒易禁也身溫者
順身涼者逆則宜服防風湯以和之
防風湯

防風

兩一

地骨皮

黃耆

芍藥

枳殼

荊芥穗

牛旁子

已上各
半兩

右為細末溫水調下或為麤末煎服二三錢更妙
治大便秘而內實能食宜當歸丸

當歸

錢五

黃連

半二錢

大黃

錢二

甘草

一錢
炙

先將當歸熬作膏子入藥三味為丸漸次服十丸
治斑疹大便秘結棗變百祥丸

大戟

去骨
一兩

棗

三箇
去核

右二味用水一椀煎至水盡為度去大戟不用將棗

焙乾可和劑旋丸從少至多以利為度

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

五臟病各有所見證

熱則從心寒則從腎嗽而氣上則從肺風從肝瀉從脾
假令瀉見嗽而氣上脾肺病也瀉白益黃散合而服之又
宜黃芩厚朴湯白朮厚朴湯謂脾苦濕肺苦燥氣則上逆
也其證先瀉又兼面色黃腸鳴嘔者是也如見渴熱
多者當服厚朴湯下渴熱少者當服白朮厚朴湯其他
五臟若有兼證皆如此類然更詳後說四時經移用藥
假令春分前風寒也宜用地黃羌活防風或地黃丸及



瀉青相間服之春分後風熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸用蘗赤散下之立夏之後熱也用三黃丸蘗赤散夏至後濕熱也宜蘗赤瀉黃丸合而服之或黃芩甘草白朮茯苓之類為勝濕之藥立秋後宜用益黃散瀉白散陳皮厚朴人參木香之類秋分後用瀉白散立冬之後地黃丸主之謂腎不受瀉也大凡小兒斑疹已發有瘡有聲音者乃形病氣不病也無瘡無聲音者乃氣病形不病也有瘡而無聲音者是形氣俱病也後一證

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

當清利肺氣八風湯或涼鬲散大黃芒硝亦可或如聖湯加大黃或八味羌活湯加大黃此是春時發斑謂之風斑耳瘡疹者內經云痛痒瘡瘍皆屬心火斑子者是相君行命三焦真陽氣之所作也若氣入肺變膿胞入肝為水胞自病為斑心乃君火入於皮作癰疹為肺主皮毛心不害肺金此乃君之德也未瘡而發搐而外感寒邪內發心熱而發搐用茶粉下解毒丸或犀角地黃湯主之已發便稠密形勢如針頭者當輕發其表涼其

內連翹升麻湯主之若斑已發稠密甚而微喘飲水有熱證當以去風藥微下之若出不快清便自調知為在表不在裏當微發之升麻葛根湯主之若有乾黑陷身不大熱大小便澁則知熱在內當煎大黃湯下宣風散身表大熱者表證未罷不可利大便若斑疹已出見小熱小便不利者當利小便已發後有毒餘不散為復有身熱癰瘡之類當用解毒之藥

藥畧第三十二 針法附

欽定四庫全書

病機氣宜保命集
卷下

羌活	治支節痛太陰經風藥也	防風	療風通用	甘草	和中調諸藥	肉桂	通氣助腸
桂枝	閉汗和表	麻黃	發大陽陰經汗	桃仁	破血滋血	黃芩	瀉肝氣
雄黃	去風	白芷	治正陽明頭痛	知母	泄腎火助陰	石膏	瀉肺火是陽
半夏	去痰	柴胡	治少陽厥寒熱往來	芍藥	止脾痛安太陰	人參	補氣和中
瓜蒂	治濕在上吐藥	赤豆	便利小	杏仁	潤肺除燥	蒼朮	溫中去濕
草烏頭	熱行經藥	南星	治風痰	天麻	治頭風	神麴	消食強胃
白朮	蒼朮同	陳皮	益氣	枳實	治心下痞	枳殼	利胸中
黃連	泄火	白茯苓	止渴利小便	苦葶藶	瀉肺火	桔梗	利肺氣



大黃	泄實	厚朴	治脹滿	黃耆	止汗治諸	檳榔	破氣
荊芥	清利	烏梅肉	助脾收	沉香	益氣	肉豆蔻	治大腸
附子	補命及	朴硝	去寒燥	梔子	除煩利氣	當歸	補三陰
川芎	太痛	地黃	補腎真陰	草薢	補腎	杜仲	壯筋骨
牛膝	補脾	菝葜	益陽道及	沙苑蒺藜	補腎水	破故紙	補命門
五味子	補五臟	巴豆	去濕之	細辛	少陰頭	升麻	陽明經
蛇蛻	去皮膚	茴香	去利小便	苦練子	去小腹痛	廣茂	去積
乾薑	益氣和中	生地黃	血涼	沒藥	除血痛也	地榆	治下部
澤瀉	治少陰不渴而小便不利及膀胱中有留	欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下					

流注鍼法

形色性味體

火土 青赤黃白黑 溫涼甘苦 酸鹹輕重

輕枯虛薄緩淺假宜上厚

重實潤深真急宜下其中

平者宜中餘形色性味皆

隨藏腑所宜此處方用藥

之大槩耳知者誠用心則

思過半矣

心	缺	肝經原穴	缺	身之前足陽明原穴	缺	身之後足太陽原穴	京骨
肝經原穴	缺	緩脾經原穴	缺	身之側足少陽原穴	丘墟	針之最要	
兩脇痛針少陽經丘墟	心痛針少陰經太谿湧泉及	足厥陰原穴	腰疼不可忍針崑崙及刺委中出血太	陽喘滿痰實口中如膠針太谿穴	噦嘔無度針手厥	陰太陵穴	頭痛不可忍針足厥陰太陽經原穴
熱	無度不可止刺陷骨穴出血	骨熱不可治前板齒乾	燥當灸骨會大推	小腸疝痛當刺足厥陰肝經大衝	穴	血不止鼻衄大小便皆血崩當刺足太陰井隱	白
喉閉刺少陽手足井并刺少商及足太陰井	火	煩熱晝夜不息刺十指間出血謂之八關大刺	目疾	睛痛欲出亦大刺八關	百節疼痛實無所知三稜針	刺絕骨出血	
欽定四庫全書 病機氣宜保命集 卷下							

眼大背痛刺手太陽井穴少澤

小背痛刺少陽井穴闕衝

陰頭中痛不可忍者卒疝也婦人陰中痛皆刺足厥陰

井大敦穴

欽定四庫全書



病機氣宜保命集
卷下

保命集卷下



迪志文化出版有限公司出版