

文淵閣
四庫全書
電子版



【子部】



濟生方

迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：濟生方》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：<http://www.dheritage.com>
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand 版本，請瀏覽迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

子部五

提要

濟生方八卷

醫家類

臣等謹案濟生方八卷宋嚴用和撰用和始

末未詳考吳澄集有易簡歸一方序稱嚴子

禮剽陳氏三因方之論而附以經驗之藥以

其名推之子禮似即用和字其人蓋在陳言

後矣澄又有古今通變仁壽方序曰世之醫

欽定四庫全書

濟生方
提要

師不一惟有所傳授得之嘗試者多驗予最

喜嚴氏濟生方之藥不泛不繁用之輒有功

蓋嚴師於劉其方乃平日所嘗試而驗者也

則澄蓋甚重此書矣其書分門別類條例甚

備皆立論於前而以所處諸方次列於後自

序稱論治凡八十製方凡四百總為十卷用

之十五年收效甚多因鋟梓以傳是當時嘗

板行於世後經亡佚醫家但輾轉援引如歸

欽定四庫全書

濟生方
提要

脾湯至今尚冠以濟生之名蓋其遺法今檢

永樂大典中所採尚多以類裒輯得論五十

六方二百四十餘釐為八卷雖不能及原書

之數然其所闕亦僅十之三四而已書中議

論平正條分縷析往往深中肯綮如論補益

云藥惟平補柔而不僭專而不雜間有藥用

羣隊必使剛柔相濟佐使合宜又云用藥在

乎穩重論欬嗽云今人治嗽喜用傷脾之劑

服之未見其效穀氣先有所損論吐衄云寒

涼之劑不宜過進諸方備列參而用之蓋其

用藥主於小心畏慎雖不善學之亦可以摸

稜貽悞然用意謹嚴固可與張從正劉完素

諸家互相調劑云乾隆四十六年九月恭校

上

總纂官

臣

紀昀

臣

陸錫熊

臣

孫士毅

總校

官

臣

陸費

墀



原序

余夙嗜名書蚤印師授以醫道行世五十餘年此因暇日論治凡八十製方凡四百總為十卷號濟生方出而用之十有五年收效甚多用鋟諸梓以廣其傳或謂古者處劑不過數種針灸不過數處君之方奚以多為余應之曰醫者意也生意在天地間一息不可間斷續此方所以續此意續此意所以續此生請勿以多議余嚴用和序

欽定四庫全書

濟生方
原序

欽定四庫全書

濟生方卷一

宋 嚴用和 編

製方

論曰一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾夫人一身不外乎陰陽氣血相與流通焉耳如陰陽得其平則疾不生陰陽偏勝則為痼冷積熱之患矣所謂痼冷者陰毒沈痼而不解也積熱者陽毒蘊積而不散也故陰偏勝則偏而為痼冷陽偏勝則偏而為積熱古賢云偏勝則有

欽定四庫全書

濟生方
卷一

偏害偏害則為偏絕不可不察也大抵真陽既弱胃氣不溫復啖生冷冰雪以益其寒陰沍於內陽不能勝遂致嘔吐涎沫畏冷憎寒手足厥逆飲食不化大腑洞泄小便頻數此皆陰偏勝而為痼冷之證也其或陰血既衰三焦已燥復餌酒炙丹石以助其熱陽熾於內陰不能制遂致口苦咽乾涎稠目澁膈熱口瘡心煩喜冷大便閉結小便赤淋此皆陽偏勝而為積熱之證也施治之法冷者熱之熱者冷之痼者解之積者散之使陰陽



各得其平則二者無偏勝之患矣

補益

論曰夫人稟中和之氣以生常能保守真元何患乎有病焉不善衛生者思慮役其智嗜慾亂其真榮衛一虛因茲積微成損積損成衰及其病也既不能御氣以全身又不能餌藥以延壽聖人有言曰治未病不治已病治未亂不治已亂夫病已成而後藥亂已成而後治不亦晚乎凡人有虛損之病及早為之補益庶有延齡之

欽定四庫全書

濟生方
卷一

望後方所載藥性平補柔而不僭專而不雜間有藥用羣隊必使剛柔相濟佐使合宜可以取效前賢之書有單服附子之戒者正慮其腎惡燥也既欲用一剛劑專而易效須當用一柔劑以制其剛庶幾剛柔相濟不特取效之速亦可使無後患後方所載參附沈附茸附者附是矣若陽虛陰極之證當用薑附三建諸丹之類或升或沈為之佐使欲其剛多於柔不致太僭庶免炎上之患用藥在乎穩重故也



迪志文化出版有限公司出版

補真丸 凡不進飲食以脾胃之藥治之多不效者亦

有謂焉人之有生不善攝養房勞過度真陽衰虛坎火不溫不能上蒸脾土沖和失布中州不運是致飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑滯泄此皆真火衰虛不能蒸蘊脾土而然古人云補腎不如補脾余謂補脾不如補腎腎氣若壯丹田火經上蒸脾土脾土溫和中焦自治膈開能食矣

葫蘆巴炒 附子炮去皮 陽起石煨 川烏炮去皮 兔絲子

欽定四庫全書

濟生方
卷一

酒淘淨 沈香不見火 肉豆蔻煨 麝麝 肉蓯蓉酒浸 五味子各半 鹿茸去毛 鍾乳粉各一

右為細末用羊腰子兩對治如食法葱椒酒煮爛入少酒杵和為丸如桐子大每服七十丸空心食前米飲鹽湯任下

胃丹 硃砂稟太陰之精不經火煨以丁附等脾藥陰煉成丹平補不僭善治真陽衰虛心火怯弱不養脾土沖和失布中州虛寒飲食不進胸膈痞塞或不食而脹



迪志文化出版有限公司出版

滿或已食而不消痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒米穀不化心腹絞痛泄利不止一切脾胃諸疾不問男子婦人皆可服之

硃砂

大塊不夾石者五十兩

新羅人參

肉豆蔻

麴裏煨

縮砂

仁

華澄茄

白豆蔻仁

紅豆

高良薑

剉炒附

子

炮去皮臍去

白朮

厚朴

薑汁炒

丁香

不見火

藿香葉

五

味子

乾薑

炮去土

胡椒

益智仁

麥門冬

去心草

菓仁

橘紅

各四兩

欽定四庫全書

濟生方卷一

右將人參等二十味各如法修製剉如豆大用白沙

蜜五斤將藥一半同蜜拌勻入銀鍋內以夾生絹袋

盛貯硃砂懸宕鍋內以桑柴火重湯煮四日四夜換

蜜五斤又入前藥一半和勻再煮三日三夜取沙淘

淨焙乾入乳鉢用玉槌研直候十分細米粽為丸如

菉豆大陰乾每服十粒加至十五粒空心食前用人

參湯下棗湯亦得如或嘔吐用淡薑湯下忌食豬羊

血

生胃丹 治脾胃不足痰多嘔逆不思飲食此藥以南星粟米黃土為主蓋南星醒脾粟米養胃黃土取其以土養土性味和平為進食化痰之要劑真良方也

虛損

論曰醫經所說諸虛百損難經所有五損不過因虛而致損也素問云恬淡虛無真氣從之精神內守病安從來人能法道清淨精神內持痼疾不起乃知固養之道也

欽定四庫全書

濟生方卷一

黃耆飲子 治諸虛勞氣四肢倦怠骨節痠疼潮熱乏

力自汗怔忡日漸黃瘦胃膈痞塞不思飲食欬嗽痰多

甚則唾血

黃耆

蜜炙一兩半

當歸

去蘆酒浸

紫菀

洗去鬚

石斛

去根

地骨皮

人參

去木

桑白皮

附子

炮去皮臍去

鹿茸

酒蒸

款冬花

各一兩

半夏

湯泡七次

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至

七分去滓溫服不拘時此藥溫補榮衛枯燥者不宜



進唾血不止者加阿膠蒲黃各半兩

玉蘭丸 治諸虛不足膀胱腎經痼敗陰陽不交致生

多病水欲升而沃心火欲降而溫腎如是則坎離既濟
陰陽協和火不炎而神自清水不滲而精自固久服閉
精補益永無膏淋白濁遺精之患神效非一難以具述

辰砂一兩 鹿茸二兩 當歸酒浸 附子七錢

各切下頂剝空心中安辰砂大者二箇去皮
在內以前頂子蓋定用線扎木瓜瓢切開頂入辰
砂附子四箇在內以木瓜頂子蓋之線扎定蒸
爛訖取出附子切作片焙乾為末辰砂細研水飛

欽定四庫全書 濟生方 卷一

木瓜研如膏 栢子仁炒別 沈香研別 巴戟去心 黃芪去蘆

蜜肉為妙 茯苓酒浸 川牛膝酒去蘆 石斛去根 酒浸

杜仲去心炒 兔絲子水淘淨酒 五味子各一兩 遠志二兩

右為細末用木瓜膏杵和入少酒糊為丸如桐子大
每服七十丸空心米飲溫酒鹽湯任下

黃犬肉丸 治真精衰憊臍腹冷痛小便頻數頭暈耳

鳴足脛酸冷步履無力腰背拘痛水穀不消飲食無味

肌肉瘦悴遺泄失精

磁石三兩煨 川烏炮去皮尖 附子炮去皮臍 桑寄生 鹿茸

燎去毛 麋茸同上 仙茅酒浸 肉苁蓉酒浸 川巴戟去心

胡蘆巴炒各二兩 沈香研別 青鹽研別 陽起石煨研 龍骨生用

虎脛骨酥炙 覆盆子酒浸各一兩

右為細末用黃犬肉二斤以酒葱茴香煮爛杵和為

丸如桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下

大建中湯 治諸虛不足小腹急痛脇肋脹骨肉痠

欽定四庫全書 濟生方 卷一

痛短氣喘咄痰多欬嗽潮熱多汗心下驚悸腰背強痛

多卧少氣

黃芪去蘆 附子炮去皮臍 鹿茸酒蒸 地骨皮去木 續斷 石斛

人參去根 川芎 當歸去蘆 白芍藥 小草各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去

滓溫服不拘時候欬嗽者加款冬花欬血者加阿膠

便精遺泄者加龍骨怔忡者加茯神



芡實丸 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固
面少顏色驚悸健忘夢寐不安小便赤澀遺精白濁足
脛痠疼耳聾目昏口乾脚弱

芡實蒸去殼 蓮花鬚各二兩 茯神去木 山茱萸取肉 龍骨

五味子 枸杞子 熟地黃酒蒸 韭子炒 肉蓯蓉

川牛膝酒浸去蘆 紫石英煅七次各一兩

右為細末酒煮山藥糊為丸如桐子大每服七十丸

空心鹽酒鹽湯任下

欽定四庫全書 濟生方 卷一

白丸 治元氣虛寒精滑不禁大腑澹泄手足厥冷

陽起石煅研令極細 鍾乳粉各等分

右為細末酒煮附子末糊為丸如桐子大每服五十

丸空心米飲下

黑丸 治精血耗竭面色黧黑耳聾目昏口乾多渴腰

痛脚弱小便白濁上燥下寒不受峻補

鹿茸酒蒸 當歸去蘆酒浸

右等分為細末煮烏梅膏為丸如桐子大每服五十

丸空心米飲下

陽起石丸 治腎藏虛損陽氣全乏

陽起石煅 韭子炒 肉蓯蓉酒浸 青鹽別研 鹿茸酒蒸 鍾乳

粉 兔絲子水淘淨酒蒸 沈香別研 原蠶蛾酒浸 山

茱萸取肉各半兩 桑螵蛸酒浸 山藥剉炒各半兩

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心鹽

酒鹽湯任下

十補丸 治腎臟虛弱面色黧黑足冷足腫耳鳴耳聾

欽定四庫全書 濟生方 卷一

肢體羸瘦足膝軟弱小便不利腰脊疼痛但是腎虛之

證皆可服之

附子炮去皮 五味子各二兩 山茱萸取肉 山藥剉炒 牡丹皮

木去 鹿茸酒蒸 熟地黃酒蒸 肉桂去皮不火 白茯苓去澤

瀉各一兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心鹽

酒鹽湯任下

鹿茸丸 治腎虛少氣腹脹腰痛小腹急痛手足逆冷



飲食減少面色黧黑百節疼痛日漸無力

川牛膝去蘆酒浸 鹿茸去毛酒蒸 五味子各二兩 石斛去根 兔絲

子酒淘淨 棘刺 杜仲去皮剉炒 川巴戟去心 山藥剉炒 陽起

石煨 附子炮去皮臍各一兩 沈香別研半兩 川練子炒取肉 磁石

官桂不見火 澤瀉各一兩

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心鹽

酒鹽湯任下

助陽丹 治腎氣虛損四肢少力面色痿黃臍腹冷痛

欽定四庫全書 濟生方 卷一

牡蠣燒 川小椒炒各二兩 硫黃一兩

右為細末酒糊丸如桐子大每服十五丸食前好酒

下久服明目暖五臟健陽事去冷病

沈香丸 治脾胃虛弱食久不化胃膈痞滿腹脇膨脹

噫醋吞酸惡心嘔逆四肢倦怠心腹疼痛飲食減少泄

瀉無度大能補養脾胃助氣消穀若稟受怯弱飲食易

傷最宜服之

沈香 木香 青橘皮去白 草豆蔻仁 縮砂仁



迪志文化出版有限公司出版

川椒炒出汗 肉桂去粗皮 白豆蔻仁各一兩 白朮 陳橘

皮去白 乾薑炮 高良薑切炒 香附子炒 小麥蘗炒 半夏

薑製各二兩 京三稜炮香切 蓬莪茂炮香切 厚朴去皮生薑汁炒 吳

茱萸湯洗各四兩

右為細末用神麴末一斤生薑汁作糊為丸如桐子

大每服五十丸生薑湯下不拘時候

萆澄茄丸 治脾胃虛弱胃膈不快不進飲食

萆澄茄不拘多少

欽定四庫全書 濟生方 卷一

右為細末薑汁打神麴末煮糊為丸如桐子大每服

七十丸食後淡薑湯下

茯神湯 治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐懼不能獨處

胃中滿悶

茯神去木 酸棗仁炒去殼 黃耆去蘆 白芍藥 五味子

栝子仁炒各一兩 桂心不見火 熟地黄洗 人參 甘草炙各

半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓



迪志文化出版有限公司出版

溫服不拘時候

酸棗仁丸 治膽氣實熱不得睡神思不安

茯神去木 酸棗仁炒去殼 遠志仁炒去心 栝子仁炒別研 防

風去蘆各一兩 生地黃洗 枳殼去瓢各半兩 青竹茹二錢半

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸不拘時候熟水下

五勞六極

論曰醫經載五勞六極之證非傳尸骨蒸之比多由不

欽定四庫全書 濟生方 卷一

能衛生始於過用逆於陰陽傷於榮衛遂成五勞六極

之病焉蓋勞力謀慮成肝勞應乎筋極曲運神機成心

勞應乎脈極意外過思成脾勞應乎肉極預事而憂成

肺勞應乎氣極矜持志節成腎勞應乎骨極此五勞應

乎五極者也然精極者五臟六腑之氣衰形體皆極眼

視無明齒焦髮落體重耳聾行履不正邪氣逆於六腑

厥於五臟故成精極大抵勞極之脈多弦治療之法隨

其虛實冷熱而調之精極者當補其精也素問所謂形

不足者溫之以氣精不足者補之以味各分門類大畧如此臨病之際又當詳審

黃芩湯 治心勞實熱口瘡心煩腹滿小便利

澤瀉 梔子仁 黃芩 麥門冬去心 木通 生乾

地黃 黃連去鬚 甘草炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

遠志飲子 治心勞虛寒驚悸恍惚多忘不安夢寐驚

欽定四庫全書 濟生方 卷一

魘

遠志去草煮乾 茯神去木 桂心不見火 人參 酸棗仁炒去

殼 黃耆去蘆 當歸去蘆酒浸各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓

溫服不拘時候

小甘露飲 治脾勞實熱身體眼目悉黃舌乾咽喉痛

黃芩 升麻 茵陳 梔子仁 桔梗去蘆剉炒 生地

黃洗 石斛去根 甘草炙各等分



右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
溫服不拘時候

白朮飲 治脾勞虛寒嘔吐不食腹痛泄瀉胃滿喜噫
多臥少起情思不樂腸鳴體倦

白朮
人參
草薺仁
乾薑
厚朴
肉豆

蔻煨麪裹
 橘皮去白
 木香不見火
 麥蘖炒各一兩
 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎至七

分去滓食前溫服

欽定四庫全書

濟生方
卷一

蟹甲地黃湯 治熱勞手足煩心怔悸婦人血室有乾血身體羸瘠飲食不為肌肉

柴胡蘆去
當歸酒去
麥門冬蘆浸
冬心去
鱉甲炙醋
石斛根去
白朮

熟地黃酒浸
茯苓去皮
秦艽去蘆
人參
肉桂不見

火甘草
炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片烏梅少許煎至七分去滓溫服不拘時候此藥專治熱勞其性寒脾胃强者方可服餌虛甚而多汗者不宜服

羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利夢寐驚悸上氣小腹急痛引腰脊四肢苦寒小便白濁

熟地黃 焙酒蒸
杜仲 炒去皮
石斛 斷絲剉
兔絲子 根去
浸淘淨
焙乾酒

研別
黃老者
蘆去
川續斷
浸酒
桂心
火不
見
磁石
淬煨
醋
川牛膝

酒去
浸蘆
沈香
研別
五加皮
洗
山藥
一剉
兩炒
各

右為細末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛再入少酒和

藥為丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下

欽定四庫全書

濟生方
卷一

羊腎湯 治腎勞虛損面黑耳聾腰脚疼痛小便滑數

磁石 一兩 淘去赤汗 碎水
肉蓯蓉 一兩 去皺皮 酒炙乾 刮
白茯苓 半兩

桂心
兩半
石菖蒲
兩半
五味子
兩半
附子
去半
皮兩
臍炮
當歸
兩半

芎藭 兩半
石斛 根半 剉兩 去
桑螵蛸 微半 炒兩
杜仲 炙半 令兩 微去 黃皮

熟乾地黃

右搗篩為散每服用羊腎一對切去脂膜以水一大
盞半煎至一盞去腎下藥末半兩入生薑半分煎至
五分去滓空心溫服晚食前再服



茯苓散 治腎勞虛損羸乏欬逆氣短四肢煩疼耳鳴
骨間熱小便赤色腰脊疼痛無力

白茯苓一人參一兩去蘆頭 白芍藥一兩 甘草一兩炙

羚羊角屑兩半 防風一兩去蘆 黃耆一兩 桂心兩半 芎藭一兩

麥門冬一兩去心 地骨皮三分 磁石一兩半 當歸一兩

牛膝一兩去苗 五味子一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

空心及晚食前溫服

欽定四庫全書 濟生方 卷一

羊腎湯 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈

伸不利夢魂驚悸上氣小腹裏急痛引腰脊四肢苦寒

小便或白濁

人參一兩去蘆 白芍藥一兩 麥門冬一兩半 熟乾地黄一兩

當歸一兩 芎藭一兩 杜仲一兩去皮 遠志一兩 白茯苓

石斛一兩根剉 五味子一兩 黃耆一兩 桂心一兩 續斷

磁石一兩三兩 赤汗

右搗為散每服用羊腎一對去脂膜以水一大盞半

煎至一盞去腎下藥末五錢入生薑半分棗三枚煎
至五分去滓空心及晚食前服

巴戟丸 治勞腰脚酸疼肢節苦痛目暗眩心中恍

惚夜臥多夢覺則口乾食不得味恒多不樂常有恙怒

心腹脹滿四肢痺疼多吐酸水小腹冷痛尿有餘瀝大

便不利悉皆主之久服延年不老萬病除愈

巴戟一兩 天門冬一兩半 五味子三兩 肉蓯蓉一兩酒浸

皴皮兩 栝子仁三分 牛膝三分 兔絲子一兩酒浸 焙乾別搗為末

欽定四庫全書 濟生方 卷一

遠志三分 石斛三分 薯蕷三分 防風三分 白茯苓

人參三分 熟乾地黄一兩 覆盆子三分 石龍芮三分 草

薤三分 五加皮三分 天雄一兩 續斷三分 石南三分 杜仲

令微黃剉 沈香一兩 蛇床子三分

右搗為末煉蜜杵和丸如桐子大空心及晚食前以

溫酒下三十丸忌生冷油膩鯉魚

地黄煎丸 治腎臟虛損添精補髓益氣養神駐顏調

血脈令人輕健



生地黃五十斤揀擇好無灰酒三斗已上二味內

膏入者洗淨肉蓯蓉三兩酒浸一宿枸杞子於鍋中慢火熬成

茸二兩去毛塗薯蕷刮去皺皮炙乾山茱萸二兩五味子二兩茯苓二兩

續斷二兩去毛塗補骨脂炒微遠志心去蛇床子附子附子炮去石

斛去根覆盆子黃耆芎藭剉木香剉桂心剉

牛膝去苗兔絲子酒浸一宿焙人參去蘆沈香各一兩半

右搗為末入煎用木臼搗五七百杵丸如桐子大

每日空心及晚食前酒下四十丸

欽定四庫全書 濟生方 卷一

磁石丸 治腎虛勞損臥多盜汗小便餘瀝陰濕痿弱

名勞極

磁石一兩燒醋淬七遍五味子一兩鹿茸一兩去毛塗

兔絲子一兩酒浸一宿蛇床子一兩車前子一兩白茯苓一兩

苓一兩桂心一兩黃耆一兩肉蓯蓉一兩酒浸一宿防

風一兩山茱萸一兩陽起石一兩細研附子一兩炮

熟乾地黄一兩

右搗為末煉蜜和丸如桐子大每服空心溫酒下三

十九漸加至四十丸晚食前再服

兔絲子丸 治腎虛勞損腰疼少力補益駐顏

兔絲子三兩酒浸三車前子二兩鹿茸二兩去毛塗

肉蓯蓉二兩酒浸一宿桂心二兩杜仲三兩去皮熟

乾地黄五兩附子二兩炮牛膝二兩

右搗為末煉蜜和丸如桐子大每服空心及晚食前

溫酒下三十丸

加減腎氣丸 治勞傷腎經腎水不足心火自炎口舌

欽定四庫全書 濟生方 卷一

焦乾多渴而利精神恍惚面赤心煩腰痛脚弱肢體羸

瘦不能起止

山茱萸取肉白茯苓去皮牡丹皮去木熟地黄酒蒸五味子

澤瀉半兩鹿角鎔山藥剉炒各沈香不見火官桂不見火

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服七十丸鹽湯米

飲任下弱甚者加附子一兩兼進黃耆湯

黃耆湯

方缺



膈肭臍丸 治五勞七傷真陽衰憊臍腹冷痛肢體酸疼腰背拘急脚膝緩弱面色黧黑肌肉消瘦目眩耳鳴口苦舌乾飲食無味腹中虛鳴脇下刺痛心常慘懣夜多異夢晝少精神小便滑數大腑澹泄時有遺瀝陽事不舉但是風虛痼冷皆宜服之

膈肭臍

一對酒蒸熟打和後藥

天雄

炮去皮

附子

炮去皮臍去

川烏

炮去

皮尖

陽起石

煅

鍾乳粉

各二兩

獨體硃砂

研極細

人參

沈香

不見火別研

鹿茸

酒蒸各一兩

欽定四庫全書

濟生方

卷一

右為細末用膈肭臍膏入少酒白內杵和為丸如桐

子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下

勞瘵

方缺

論曰夫勞瘵一證為人之大患凡受此病者傳變不一積年染瘵甚至滅門可勝嘆哉大抵合而言之曰傳屍別而言之曰骨蒸淹滯復連屍瘵勞瘵蠱瘵毒瘵熱瘵冷瘵食瘵鬼瘵是也夫瘵者注也自上注下病源無異是之謂瘵又其變則有二十二種或三十六種或九十

九種又有所謂五屍者曰蜚屍遁屍寒屍喪屍屍注是也其名不同傳變尤不一感此疾而獲安者十無一二也大抵五臟所傳皆令人憎寒發熱其證各異有如傳之於肝則面白目枯口苦自汗心煩驚悸傳之於心則面黑鼻乾口瘡喜忘大便或秘或泄傳之於脾則面青唇黃舌強喉哽吐涎體瘦飲食無味傳之於肺則面赤鼻白痰吐咯血喘嗽毛枯傳之於腎則面黃耳枯腎滿脘痛白濁遺瀝

欽定四庫全書

濟生方

卷一



欽定四庫全書

濟生方卷二

宋 嚴用和 編

欬嗽

論曰夫欬者古人所謂欬是也蓋皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣以從其合也又經云五臟六腑皆令人欬非獨肺也由是觀之皮毛始受邪氣邪氣先從其合然後傳為五臟六腑之欬外則六淫所傷內則七情所感連滯歲月致傷五臟遂成勞欬者多矣且傷於風者憎寒身熱無汗惡寒而欬傷於暑者煩渴引飲而欬傷於濕者骨節煩疼四肢重著而欬又况房勞過度饑飽失宜疲極叫呼勞神傷心皆令人欬夫欬嗽之脈浮大者生沈小伏匿者死治療之法當推其所自而調之無不效者矣今人治欬多喜用罌粟烏梅之類殊不知罌粟殼其性緊澀烏梅味酸乃傷脾之劑脾胃壯實者服之猶可脾胃稍弱者未見其效穀氣先有所損矣能慎此者庶免後患也

欽定四庫全書

濟生方
卷二



迪志文化出版有限公司出版

半夏丸 治肺臟蘊熱痰嗽脅膈塞滿

瓜蘇子

去殼別研 半夏 湯泡七次焙取末各一兩

右末和勻生薑自然汁打麪糊為丸如桐子大每服五十丸食後用薑湯下

瀉白散 治肺臟實虛心胸壅悶欬煩喘大便秘不利

桑白皮

炙 桔梗 去蘆剉炒 地骨皮 去木 半夏 湯泡七次 瓜蘇子

升麻

杏仁 去皮尖 甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片煎至八分去滓

欽定四庫全書

濟生方
卷二

食後溫服

人參荊芥散 治肺感寒邪或感風熱痰多欬嗽頭目

不清言語不出咽乾痰實或項背強硬皮膚不仁

荊芥穗

麻黃 去節 細辛 去土洗 桔梗 去蘆剉炒 陳皮 去白

半夏

湯泡七次 杏仁 去皮尖 人參 通草 甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓食後溫服

團參飲子 治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜致臟氣



迪志文化出版有限公司出版

不平欬嗽膿血漸成肺痿憎寒壯熱羸瘦困頓將成勞瘵

人參 紫苑茸洗 阿膠蛤粉炒 百合蒸 細辛洗去葉土款

冬花 杏仁去皮尖炒 天門冬湯浸去心 半夏湯泡七次 經霜桑

葉 五味子各一兩 甘草炙半兩

右呖咀每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分

去滓食後溫服因氣而欬者加木香欬而唾血有熱

者加生地黃欬而唾血有寒者加鍾乳粉疲極而欬

欽定四庫全書
濟生方
卷二

嗽者加黃耆因欬損而唾血者加沒藥藕節欬而嘔

逆腹滿不食者加白朮仍倍加生薑欬而小便多者

加益智仁欬而大便溏者去杏仁加鍾乳粉欬而面

浮氣逆者加沈香柑皮煎

訶子飲 治久欬語聲不出

訶子去核一兩 杏仁泡去皮一兩 通草二錢半

右呖咀每服四錢水一盞煨生薑切五片煎至八分

去滓食後溫服

經效阿膠丸 治勞嗽並欬血吐血

阿膠蛤粉炒 生地黃洗 卷栢葉 山藥劉炒 大薊根

五味子 雞蘇各一兩 栢子仁炒別研 人參 茯苓去皮

百部洗去心 防風去蘆 遠志甘草水浸去心 麥門冬去心各半兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎

小麥湯或麥門冬湯嚥下

喘

論曰素問云諸氣者皆屬於肺喘者亦屬於肺是以人

欽定四庫全書
濟生方
卷二

之一呼一吸謂之息呼吸之間脾受其氣通乎榮衛合

乎陰陽周流一身無過不及然後權衡得其平矣將理

失宜六淫所傷七情所感或因墜墮驚恐度水跌仆飽

食過傷動作用力遂使臟氣不和榮衛失其常度不能

隨陰陽出入以成息促迫於肺不得宣通而為喘也診

其脈滑手足溫者生脈濇四肢寒者死數者亦死謂其

形損故也更有產後喘急為病尤亟因產所下過多榮

血暴竭衛氣無所主獨聚於肺故令喘急謂之孤陽絕



陰為難治醫療之法當推其所感詳其虛實冷熱而治之如產後喘急已載于產科十六論中矣茲不再叙亦有痰停胃脘痰與氣搏肺道壅塞亦令人上氣此又不可不知也

又論曰夫喘者上氣也嗽者古人所謂欬也經云諸氣者皆屬肺肺主皮毛皮毛先受邪氣以從其合也則知喘嗽之疾關係乎肺明矣但久嗽不已傳於五臟六腑至於三焦病之極也臨病之際又當審訂對證用之以

欽定四庫全書



濟生方
卷二

平為期

葶蘆散 治過食煎燂或飲酒過度致肺壅喘不得臥及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶蘆炒 桔梗去蘆 瓜蘇子 川升麻 薏苡仁

桑白皮 葛根各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓食後溫服

人參胡桃湯 治胃滿喘急不能睡臥

新羅人參寸許切 胡桃五箇取肉切片

右作一服用水一小盞生薑五片煎至七分去滓臨

臥溫服

紫苑茸湯 治飲食過度或叫呼走氣或食煎燂邪熱

傷肺欬嗽咽痒痰多唾血喘急脅痛不得安臥

紫苑茸洗 經霜桑葉 款冬花 百合蒸焙 杏仁去皮

尖阿膠蛤粉炒 貝母去心 蒲黃炒 半夏湯泡七次 犀角

甘草炙各半兩 人參半兩

欽定四庫全書



濟生方
卷二

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓食後溫服

白石英湯 治肺氣虛弱惡寒欬嗽鼻流清涕喘息氣

微

白石英 細辛洗去土 五味子 陳皮去白 鍾乳粉

阿膠剉蛤粉炒 桂心不見火 人參 甘草炙各半兩 紫苑洗一兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候未知再服



杏參飲 治因墜墮驚恐度水跌仆疲極筋力喘急不安

人參 桑白皮 橘紅 大腹皮 檳榔 白木

訶子 麪裹煨 取肉 半夏 湯泡七次 桂心 不見火 杏仁 去皮尖炒 紫菀

洗 甘草 炙

右等分咬咀每服四錢水一盞半生薑五片入紫蘇

葉七葉煎至七分去滓溫服不拘時候

四磨湯 治七情傷感上氣喘息妨悶不食

欽定四庫全書 濟生方 卷二

人參 檳榔 沈香 天台烏藥

右各濃磨水和作七分盞煎三五沸放溫服或下養

正丹尤佳

二黃丸 治停痰在胃喘息不通呼吸

雌黃 一錢 雄黃 一兩

右研極細鎔黃蠟為丸如彈子大每服一丸於半夜

時熱煮糯米粥乘熱以藥投在粥內攪和服

百花膏 治喘嗽不已或痰中有血

款冬花 百合 蒸焙

右等分為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸食後臨臥細嚼薑湯嚥下噙化尤佳

加味七氣湯 治喜怒憂思悲恐驚七氣為病發則心

腹刺痛不可忍時發時止發則欲死及外感風寒濕氣

作痛亦宜服之

半夏 湯泡七次 桂心 不見火 延胡索 炒去皮 人參 甘

草 炙各半兩 乳香 三錢

欽定四庫全書 濟生方 卷二

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至

七分去滓食前溫服婦人血痛加當歸煎

杏仁煎 治久患肺喘欬嗽不已睡臥不得服之即定

杏仁 去皮尖 胡桃肉

右等分研為膏入煉蜜少許丸如彈子大每服一丸或二丸細嚼用薑湯嚥下食後及臨臥服

吐衄

論曰夫吐血嘔血嗽血三者皆謂之失血蓋肺主於氣



心主於血肝藏於血血之與氣營周一身相隨上下無有休息者焉儻乖調攝榮衛差經血隨氣逆遂有妄行之患所致之由因大虛損或飲酒過度或強食過飽或飲啖辛熱或憂思恚怒洞擾三經而然諸失血之脈沈細者易治脈數浮大者難治且嗽血一證不嗽者易治兼嗽者難愈為肺傷故也醫經云便血猶可止效血不易醫喉不停物毫髮必效血滲入喉愈滲愈嗽愈嗽愈滲飲溲溺者十無一死服寒涼者百無一生以此觀之寒涼之劑不宜過進也諸方備列參而用之庶得萬全耳醫經所載失血有三種一曰血衄二曰肺疽三曰傷胃是也蓋心主血肝藏血肺主氣血為榮氣為衛相隨上下升降無有休息者也六氣不傷七情不鬱榮衛調平則無壅決之虞節宣失宜必致壅閉遂不得循經流注失其常度故有妄行之患焉夫血之妄行也未有不因熱之所發蓋血得熱則淖溢血氣俱熱血隨氣上乃吐衄也大抵脈芤為失血沈細者易治浮大者難治又

欽定四庫全書

濟生方
卷二



迪志文化出版有限公司出版

有感冒汗後不解鬱結經絡隨氣湧洩而成衄血思慮傷心心傷則吐衄肺傷亦令人唾血又有折傷吐血治療之法當以證別之乃可施治

天門冬湯 治思慮傷心吐衄不止

遠志

甘草水浸去心

白芍藥

天門冬

去心麥門冬去心

黃耆

去蘆 藕節

阿膠 蛤粉炒

沒藥

當歸

去蘆 生地黄 各兩

一

人參

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

欽定四庫全書

濟生方
卷二

溫服不拘時候

大薊飲 治吐血嘔血

大薊汁

生地黄汁

各一合

右和勻入薑汁少許生蜜少許攪勻冷服不拘時候

錦節丸 治嗽血嘔血

真錦灰

藕節灰

各半兩

滴乳香

一錢別研

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一九食後及臨

臥嚙化



迪志文化出版有限公司出版

犀角地黄湯 治傷風汗下不解鬱乾經絡隨氣湧洩
為衄或清道閉流入胃脘吐出清血及鼻衄吐血不盡
餘血停留以致面黃大便黑

犀角鎊 生地黄 白芍藥 牡丹皮去木

右等分咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫
服不拘時候如狂者加黃芩大黃如脈大而遲腹滿
但依本方不須加減

赤芍藥湯 治瘀血蓄胃心下滿食入即嘔血名曰血

欽定四庫全書 濟生方 卷二

嘔

赤芍藥二兩 半夏湯泡七次 橘紅一兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片煎至七分去滓

溫服不拘時候

大薊散 治飲啖辛熱熱邪傷肺嘔吐出血一合或半

升許名曰肺疽

大薊根洗 犀角鎊 升麻 桑白皮炙 蒲黃炒 杏仁去皮 桔梗去蘆各 甘草炙半

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
溫服不拘時候

加味理中湯 治飲食傷胃遂成嘔吐物與氣衝與血
吐出或心腹疼痛自汗名曰傷胃嘔血

人參 乾薑炮 白朮各一兩 乾葛 甘草炙各半兩

右為細末每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫服
不拘時候

鷄蘇散 治傷勞肺經唾內有血咽喉不利

欽定四庫全書 濟生方 卷二

鷄蘇葉 黃耆去蘆 生地黄洗 阿膠蛤粉炒 白茅根各一兩

桔梗去蘆 麥門冬去心 蒲黃炒 貝母去心 甘草炙各半兩

有桑白皮半兩棗一枚

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓

溫服不拘時候

團參散 治唾血欬嗽服涼藥不得者

人參一兩 黃耆一兩 蜜水炙 百合蒸半兩 飛羅粉一兩

右為細末每服二錢食後用白茅根煎湯調服茅花



煎湯亦可

伏龍肝膏

治吐血不止

方見前吐門聖惠方

翻胃

論曰夫翻胃者本乎胃食物嘔吐胃不受納言口翻也多因胃氣先逆飲酒過傷或積風寒或因憂思悵快或因蓄怒抑鬱宿滯痼癖積聚冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾原其所自女人得之多由血氣虛損男子得之多因下元冷憊有纔食而便吐者有食久而後

欽定四庫全書



濟生方
卷二

翻者受病既若異同醫療固宜審察如玉浮丸胃丹等藥及入藥靈砂丁附散之類皆可對證選而用之服藥未應者宜灸中脘足三里二穴中脘一穴在臍上四寸足三里一穴在膝下三寸各灸七壯或九壯其效尤著焉其諸嘔吐備載前方不復再叙也

玉浮丸 治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及久新翻

胃不問得病之由皆可服之真良方也

人參

白僵蠶

炒去絲

白朮

乾薑

炮

丁香 肉豆

蔻

麩裏煨

橘紅

白豆蔻仁

麥蘖

炒

附子

炮去皮臍木

香

不見火

南星

炮

檳榔

半夏

湯泡七次

甘草

炙

右等分為細末每藥二分用生麩一分和勻入百沸湯煮令浮攪和再取生薑自然汁和丸如桐子大每服二錢淡薑湯下不拘時候病甚者不過三服惡熱藥者去附子大便秘者去肉豆蔻

入藥靈砂

治翻胃嘔吐食飲不下

靈砂末

一兩

丁香末

木香末

胡椒末

各半錢

欽定四庫全書



濟生方
卷二

右件和勻煮棗圈肉和為丸如棗豆大每服五十粒生薑米飲下不拘時候

丁附散 治吐逆粥藥不下者附子一枚極大者坐於

磚上四面著火漸漸逼熱淬入生薑自然汁再用火逼

再淬約盡薑半碗焙乾末之每服二錢水一盞粟少許

同煎至七分不過三服為末時入丁香末二錢和勻

嘔吐

論曰夫人受天地之中以生莫不以胃為主蓋胃受水穀



脾主運化生血生氣以充四體者也若脾胃無所傷則無嘔吐之患其或飲食失節溫涼不調或喜餐腥膾乳酪或貪食生冷肥膩露臥濕處當風取涼動擾於胃胃既病矣則脾氣停滯清濁不分中焦為痞塞遂成嘔吐之患焉然此特飲食過傷風涼冷濕之所致者又如憂思傷感宿寒在胃中脘伏痰胃受邪熱瘀血停蓄亦能令人嘔吐故診其脈代者霍亂代而絕者亦霍亂也霍亂脈大者可治微細者不可治脈遲氣息不欲言者亦不可治治療之法詳具于後臨病之際更加審諦而用無不得其宜矣

欽定四庫全書

濟生方
卷二

橘皮竹茹湯 治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓

皮去

橘皮

白去

枇杷葉

毛拭去

麥門冬

心去

青竹茹

半夏

湯洗七次
各一兩

人參

甘草

炙
半兩

各

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候

丁香半夏丸 治宿寒在胃嘔吐吞酸

指迷
同



迪志文化出版有限公司出版

丁香 不見火 乾薑 炮 半夏 湯泡七次 橘紅 各二兩 白朮 一兩

右為細末生薑自然汁打糊為丸如桐子大每服五十丸食前淡薑湯下

旋覆花湯 治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花

梗去

半夏

湯泡七次

橘紅

乾薑

炮

各一兩

檳榔

參 甘草

炙

白朮

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去

欽定四庫全書

濟生方
卷二

滓溫服不拘時候

噎膈

論曰素問云陽脈結謂之隔蓋氣之與神並為陽也逸則氣神安勞則氣神耗儻或寒溫失宜食飲乖度七情傷感氣神俱擾使陽氣先結陰氣後亂陰陽不和臟腑生病結於胃膈則成隔氣流於咽嗝則成五噎五膈者憂恚寒熱氣也五噎者憂思勞食氣也其為病也令人胸膈痞悶嘔逆噎塞妨礙飲食胸痛徹背或脇下支滿



迪志文化出版有限公司出版

或心忡喜忘咽氣不舒治療之法調順陰陽化痰下氣
陰陽平均氣順痰下膈噎之疾無由作矣又有下虛氣
上控膈令人心下堅滿痞急胸中苦痺緩急如刺不得
俛仰名曰胸痞

五噎散 治五噎食不下嘔呃痰多咽喉噎塞胸痛

人參 半夏湯泡七次 桔梗去蘆剉炒 白豆蔻仁 木香不見

火杵頭糠 白朮 葶澄茄 沈香不見 枇杷葉

毛拭去 乾生薑各一兩 甘草炙半兩

欽定四庫全書 濟生方 卷二

右為細末每服二錢水一中盞生薑七片煎至六分

食後溫服

五膈散 治五膈胃膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆

惡心不進飲食李憲德生堂經驗方云治五般膈氣結胃膈痰逆滿悶惡心嘔呃

枳殼去瓢炒 青皮去白 大腹子 白朮 半夏剉炒 麴去 白朮 半夏剉炒 丁

香不見 天南星湯泡去皮 乾薑炮 麥蘖炒 草菓仁各一兩

甘草炙半兩

右為細末每服二錢水一中盞生薑五片煎至六分

溫服不拘時候

噦

論曰夫欬逆之病考詳諸書無該載者唯孫真人云欬
逆遍尋方論無此名稱但古人以欬逆為噦耳多因吐
利之後胃中虛寒遂成此證亦有胃虛膈上熱噦至八
九聲相連收氣不回者却當仔細看脈與證施以治法
大抵老人虛人久病人及婦人產後有此證者皆是病
深之後非佳兆也

欽定四庫全書 濟生方 卷二

橘皮湯 治吐利後胃中虛膈上熱欬逆者

橘皮去白二兩 人參 甘草炙各半兩

右為散每服四錢水一盞半竹茹一小塊生薑五片

棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時候

柿蒂湯 治胃滿欬逆不止衛生家寶作順氣湯

柿蒂 丁香各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓
服不拘時候



腰痛 方缺

論曰素問云腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣審如是說則知腎係於腰因嗜慾過度勞傷腎經腎臟既虛喜怒憂思風寒濕毒得以傷之遂致腰痛又有墜下閃肭氣凝血滯亦致腰痛大抵腰痛之脈脈皆沈弦沈弦而緊者寒腰痛沈弦而浮者風腰痛沈弦而濡細者濕腰痛墜下閃肭以致氣凝血滯而痛者脈多沈弦而實也當推其所因合其脈以治無不效者矣

欽定四庫全書 濟生方 卷二

又論曰夫腰痛者屬乎腎也多因勞役傷腎臟氣虛風寒冷濕得以襲之恚鬱憂思得以傷之皆致腰痛論治悉已備載但墜下閃肭血氣凝滯而病者未有藥也菴藺圓主之今之人每患腰痛不問虛實多進牽牛之藥殊不知牽牛之為性能傷腎氣服之未見作效腎氣先有所損矣倘的是氣滯腰痛進一二服則可如服之不效用橘核入鹽炒浸酒放溫送下小七香圓最佳所為看不上面自有奇功萬一腎虛腰痛牽牛豈宜服也




謹之謹之

脇痛 方缺


論曰夫脇痛之病醫經曰兩脇者肝之候又云肝病者兩脇下痛多因疲極嗔怒悲哀煩惱謀慮驚憂致傷肝臟既傷積氣攻注攻於左則左脇痛攻於右則右脇痛移逆兩脇則兩脇俱痛久而不愈流注筋脈或腰脚重墜或兩股筋急或四肢不舉漸至脊脊攣急疼痛氣遇風搏則脇下結塊氣遇寒搏則脇肋骨痛下連小腹上引心端大抵諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治神保丸能治之更有肝之積名曰肥氣在左脇下大如覆杯其病左脇下痛連引小腹足寒轉筋肺之積名曰息賁在右脇下大如覆杯其病喘息奔溢肝積肥氣丸主之肺積息賁湯主之

欽定四庫全書 濟生方 卷二





迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

濟生方卷三

宋 嚴用和 編

風 論缺

羌附湯 治風濕相搏身體疼煩掣痛不可屈伸或身微腫不仁

羌活 去蘆

附子 炮去皮臍

白朮 甘草 炙

右等分咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

欽定四庫全書

濟生
卷三方

寒 方缺

論曰素問云冬三月是謂閉藏水冰地拆無擾乎陽早卧晚起必待日光此去寒就溫之意也不善調攝觸冒之者卒然眩暈口噤失音四肢彊直或洒洒惡寒或翕翕發熱面赤多汗大抵中寒脉必遲緊挾風則脉浮眩暈不仁兼濕則脉濡腫滿疼痛治之之法切不可妄下妄吐惟當溫散之

暑

論曰夫中暑所以脉虛者蓋熱傷氣而不傷形也且暑者在天為熱在地為火在人臟為心是以暑氣傷心令人身熱頭痛狀類傷寒但背寒面垢此為異耳甚則昏倒不知人手足微冷煩渴口燥或吐或瀉或喘或滿此皆暑氣之所為也大抵中暑悶亂切不可便與冷水及卧冷濕地得冷則死唯溫養用布衣蘸熱湯熨臍中及氣海或掬熱土圈臍心乃更溺之候漸甦醒以米湯徐徐灌之然後隨證調治近來江浙之間中暑多有搐搦

欽定四庫全書

濟生
卷三方

不省人事者屢見之矣醫經所載診其脉浮而虛蓋浮則為風虛則為暑此中暑而又傷風故有是證俗命名謂之暑風若作驚癇治之多致不救倉卒之際宜以溫熱水化蘇合香丸灌之候其稍甦却以黃連香薷散加羌活煎服作效者多矣
二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞悶或頭痛惡心並皆治之

硝石

硫黃 各等分



右為末於銀石器內文武火上炒令鵝黃色再研細用糯米糊為丸如梧子大每服四十九新汲水下不拘時候

地仙散 治傷寒後伏暑後煩熱不安及虛勞煩熱

地骨皮 去木 二兩

防風 去蘆 一兩

甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候產後虛煩載產後雜治門中

霍亂

欽定四庫全書 濟生 卷三方

論曰人生稟命以五臟為主應乎五行本於五味素問云陰之所生本在五味過食尚乃有傷何況飽食狃膾復餐乳酪海陸百品無所不噉眠卧冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣壅而反戾揮霍之間變成吐利此名霍亂輕者脚多轉筋甚者遍體轉筋夏月伏暑亦令人吐利傷寒亦令人吐利當察其由施以治法大抵霍亂脉來浮洪者可治脉來微而遲氣少不語者不可治古今論定更無疑矣



通脉四逆湯 治霍亂多寒肉冷脉絕

吳茱萸 炒二兩

附子 炮去皮 臍一兩 桂心 去皮不見火

細辛 洗去葉土

白芍藥 通草

甘草 炙各半兩

當歸 去蘆三錢

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞生薑七片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時候

薑附湯 方缺

香薷飲 方缺

欽定四庫全書 濟生 卷三方

麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱不解多渴小便不利

麥門冬 去心

橘皮 去白 半夏 湯泡七次

白茯苓 去皮

白朮 各一兩 人參

甘草 炙各半兩

小麥 半合

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片烏梅少許煎至八分去滓溫服不拘時候

濕

論曰活人書云風雨襲虛山澤蒸氣令人中濕濕流關



節身體煩痛其脉沉緩為中濕大抵中濕變證萬端挾風者為煩熱為流走為拘急兼寒者為痛為浮腫與風寒二氣合則為痺皆由中濕而後挾以異氣而然也治濕之法不可大發汗慎不可以火攻之唯當利其小便醫經所謂治濕不利小便非其治也

撫芎湯 治濕流關節臂疼手重不可俛仰或自汗頭眩痰逆

撫芎 白朮 橘紅 各一兩
甘草 炙半兩

欽定四庫全書 濟生卷三方

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片煎至八分去滓

溫服不拘時候

滲濕湯 治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚弱關節

重疼發熱惡寒或多汗惡風或腿膝浮腫或小便不利

大腑澹泄

白朮 二兩
人參 半兩
乾薑 炮
白芍藥

附子 炮去
皮 白茯苓 去
皮 桂枝 不見
火 甘草 炙各
半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片大棗一枚煎

至八分去滓溫服不拘時候

痺

論曰風寒濕三氣雜至合而為痺皆因體虛腠理空疎受風寒濕氣而成痺也大率痺病總而言之凡有五種筋痺脉痺皮痺骨痺肌痺是也筋痺之為病應乎肝其狀夜卧則驚飲食多小便數脉痺之為病應乎心其狀血脉不流令人痿黃心下鼓氣卒然逆喘不通噤乾喜噫肌痺之為病應乎脾其狀四肢懈怠發欬嘔吐皮痺

欽定四庫全書 濟生卷三方

之為病應乎肺其狀皮膚無所不知覺氣奔喘滿骨痺之為病應乎腎其狀骨重不可舉不遂而痛喜脹診其脉大而濇為痺脉來急者亦為痺脉濇而緊者亦為痺又有風血痺陰邪入於血經故也外有支飲亦令人痺當隨證施治

黃芪酒 治風濕痺身體頑麻皮膚慘癢筋脉攣急

言語謇澀手足不遂時覺不仁

黃耆 去
蘆 防風 去
蘆 官桂 不見
火 石斛 去
根



虎骨 炙 酥	當歸 去 蘆	白芍藥	木香 不見 火
雲母粉	茵芋葉	仙靈脾	天麻
葶藶	甘草	川續斷 各一 兩	
右剉如麻豆大以生絹袋盛以好酒一斗浸之春五日夏三日夜七日冬十日每服一盞溫服之不拘時候常令酒氣相續為佳			
茯苓湯	治支飲手足麻痺多睡眩冒		
半夏 湯泡 七次	赤茯苓 去 皮	橘紅 各一 兩	
欽定四庫全書 濟生 卷三方			
枳實 去 瓢 麸炒	桔梗 去 蘆	甘草 炙 各 半 兩	
右咬咀每服四錢水一盞半薑七片煎至七分去滓溫服不拘時候			
蠲痺湯 治身體煩疼項背拘急或痛或重舉動艱難及手足冷痺腰腿沉重筋脉無力			
當歸 去 蘆 酒浸	赤芍藥	片子薑黃	
黃耆 去 蘆	羌活 各一 兩 半	甘草 炙 半 兩	
右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至八			

分去滓溫服不拘時候			
疝			
論曰巢氏云疝者痛也皆榮衛虛弱飲食寒溫不調致風冷邪氣乘虛入於腹中遂成諸疝發則腹疼痛痛或繞臍或逆上搶心引心皆痛甚則手足厥冷自汗嘔逆或大便秘難大抵諸疝之脉脉當弦緊蓋弦者寒也緊者痛也疝有七證厥疝癰疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝是也何以言之厥疝則心痛足冷食已則吐癰疝腹中氣乍滿氣積如臂寒疝因寒飲食卒然脇下腹中痛氣疝腹中乍滿乍減而痛盤疝腹中痛引臍傍附疝腹痛連臍下有積聚其為病也或左或右脇下有如覆杯或臍上下如臂或腹大如盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱嗜卧飲食不為肌膚或腹滿嘔泄或遇寒則痛其脉厥而緊浮而牢皆積聚之脉也但牢彊急者生虛弱者不可治			
延附湯 治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑			
欽定四庫全書 濟生 卷三方			



閉				
延胡索		炒 去皮		附子
				炮 去皮 臍 各一兩
				木香
				不 見 火 半兩
右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓溫服不拘時候				
金鈴子散 治七疝寒注下焦小腹引外腎疼痛大便多閉				
川練子		去皮核取肉一兩用巴豆七枚去殼同炒令黃色去巴豆		
右為細末每服二錢空心食前熱鹽酒調服				
欽定四庫全書				
濟生卷三方				
狼毒丸 治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬疼痛				
狼毒	剉炒 一兩	芫花	醋炒	川烏
				炮 去皮 尖 各一兩
				椒紅
				炒
乾漆	剉炒 煙盡	鱉甲	醋炙	三稜
				洛藥
				各 半 兩
乾薑	炮 半 兩	全蝎	去 毒 九 枚	
右為細末醋糊為丸如桐子大每服四十九空心薑湯溫酒任下				
又方 鹽半斤炒極熱以故帛包熨痛處				
聚香飲子 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛引腰脇				

連背不可俯仰		檀香	木香	乳香	沉香
丁香	並不見火	藿香葉	各一兩	延胡索	炒去皮
片子薑黃	炒	桔梗	去蘆剉炒	桂心	不見火
甘草	炙各半兩				
右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至七分去滓溫服不拘時候					
益智仁湯 治疝痛連小腹攣搐叫呼不已診其脉沉緊是腎經有積冷所致					
欽定四庫全書		濟生卷三方			
益智仁		乾薑	炮	甘草	炙
烏頭	炮去皮	生薑	各半兩	青皮	去白二錢
右咬咀每服四錢水二盞入鹽少許煎至七分去滓空心食前溫服					
陰癰					
論曰夫陰癰之證有四種一曰腸癰二曰氣癰三曰卵脹四曰水癰是也聖惠云腎氣虛風冷所侵流入于腎不能宣散而然也三因云陰癰屬肝係宗筋胃陽明養					



之考之衆論俱為至當多由不自衛生房室過度久蓄憂思恐怒之氣或坐卧冷濕處或勞役無節皆能致之病則卵核腫脹偏有大小或堅硬如石或臍腹絞痛甚則膚囊腫脹多成瘡毒輕則時出黃水甚者成癰潰爛大抵卵脹腸癰皆不易治氣癰水癰炙而易愈也又有小兒有生以來便如此者乃宿疾也四癰治法橘核丸用之屢驗漫錄於後

橘核丸 治四種癰病卵核腫脹偏有大小或硬堅如

欽定四庫全書

濟生
卷三方

石或引臍腹絞痛甚則膚囊腫脹或成瘡毒輕則時出

黃水甚則成癰潰爛

橘核炒

海藻洗

昆布洗

海帶洗

川練子去肉炒

桃仁一兩各炒

厚朴去皮薑汁炒

木通

枳實麸炒

延胡索皮炒去

桂心火不見

木香各半兩火

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心鹽

酒鹽湯任下虛寒甚者加炮川烏一兩堅脹久不消

者加硃砂二錢醋煑旋入永類鈴方多海帶

疸

論曰古方論有黃疸有疸病命名不同其實一也詳觀他書黃有三十六種疸有五種三十六種黃者聖惠方載之備矣其脉自沉此由脾胃有熱汗出入水浴水入汗空中故汗黃也黃疸之狀食已即飢身體面目爪甲齒牙及小便悉黃欲安卧或身體多赤多青皆見者必發寒熱此由酒食過度臟腑熱極水穀相并積於脾胃復為風濕所搏結滯不散熱氣鬱蒸所為也大抵發於

欽定四庫全書

濟生
卷三方

陰部其人必嘔發于陽部必振寒而發熱穀疸之狀食畢即頭眩心中沸鬱不安而發黃此由大饑大食胃氣衝蒸所致也酒疸之狀身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑此因酒食多進胃内生熱因大醉當風食水所致也女疸之狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由大勞大熱不能保攝房後入水所致也其間多渴而腹脹者其病難療又有時氣傷風傷寒伏暑亦令人發黃五疸口淡怔忡耳鳴脚弱微寒發熱小



便白濁當作虛證治不可妄投涼劑愈傷血氣臨病之際不可不辨明也

葛根湯 治酒疸

葛根 兩二 枳實 去瓢炒 梔子仁 豉 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不

拘時候

蠱 方缺

論曰經書所載蠱毒有數種閩中山間人造作之以蟲

欽定四庫全書 濟生 卷三方

蛇之類用器皿盛貯聽其互相食啖有一物獨存者則謂之蠱取其毒於酒食中能禍於人其中毒也令人心腹絞痛如有物咬吐下血皆如爛肉若不即治蝕人五臟即死然此病有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延引歲月周遊腹內氣力羸憊骨節沉重發即心痛煩燥而病人所食之物亦變化為蠱漸侵食腑臟則死矣死則病流注染著傍人遂成蠱注治療之法不可作他病治之切須審細凡中蠱嚼生黑豆不腥白礬味甘皆

中毒也

脚氣

論曰千金言脚氣皆由感風毒所致又經云地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之遂成脚氣然古來無脚氣之說黃帝時名為厥兩漢之間名曰緩風宋齊之後謂之脚氣其名雖不同其實一也以此觀之寒暑風濕皆能致此非特風毒而已矣脚氣之病初得不覺因他病乃始發動或奄然大悶經三兩日方乃覺之先從脚起或

欽定四庫全書 濟生 卷三方

緩弱疼痺或行起忽倒或兩脛腫滿或足膝枯細或心中忪悸或小腹不仁或舉體轉筋或見食吐逆惡聞食氣或胸滿急或遍體痠痛此其候之不同也大抵寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱誠哉斯言若論其脉浮而弦者起于風濡而弱者起于濕洪而數者起于熱遲而澀者起于寒風者汗而愈濕者溫而愈熱者下而愈寒者熨而愈凡得脚氣速宜鍼灸之唯用湯淋洗者醫之大禁也觀夫脚氣皆由腎虛而生然婦人亦有



病脚氣者必因血海既虛宿懷嗔恚復感悲傷遂成斯疾兼今婦人病此者甚衆則知婦人以血海虛而得之

與男腎虛類矣治婦人之法與男子用藥固無異但兼以治憂恚藥無不效也且補瀉之法當順四時春秋二時宜急補瀉夏月疾盛專須汗利入冬已後須量人之盛衰微加滋補不然則氣日衰必使年年遇蒸熱而作理之必然也治法大概無越于斯又當于四時之中謹加調攝不得久坐久立冷濕之地暑月亦不當露坐濕

欽定四庫全書

濟生
卷三方

處能慎于此依法隨證治之無不瘥矣

又論曰夫脚氣之病昔人命名不一今人謂之脚氣男子得之受病于腎婦人得之受病于血海寒暑風濕嗔恚悲傷皆能致此脚氣之候有輕有重有乾有濕有陰有陽有虛有實治療之法脚氣雖曰壅疾無補法惟當瀉之理固然也愚者之見亦可補之當順四時之序而補瀉之春夏宜汗利秋冬乘疾小歇微加滋補不然則血日衰必使年年遇蒸熱而疾作也外此更宜針之灸

之若用湯淋洗者醫之大禁也與後方隨證參考用之無不瘥者也

大腹皮散 治諸證脚氣腫滿小便利

大腹皮 三兩 紫蘇子 微炒 檳榔 荊芥穗

烏藥 橘紅 紫蘇葉 各一兩 蘿蔔子 炒半兩

沉香 不見火 桑白皮 炙 乾宣木瓜 去瓢二兩半

枳殼 去瓢炒各一兩半

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

欽定四庫全書

濟生
卷三方

溫服不拘時候

加減檳榔湯 治一切脚氣名曰壅疾貴乎疎通春夏

宜服之

檳榔 陳皮 去白 紫蘇葉 各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服半兩水一盞半生薑五片煎至八分去

滓溫服不拘時候如脚痛不已者加宣木瓜五加皮

煎婦人脚痛加當歸煎室女脚痛多是肝血盈實宜

加赤芍藥煎師尼寡婦亦宜服之中滿不食者加枳



實煎痰逆或嘔者加半夏煎小便不利加木通煎轉筋者加吳茱萸煎脚痛大便不通者用此湯下青木香丸如更不通加大黃煎脚腫而痛者加大腹皮木爪煎足痛而熱者加地骨皮煎

檳榔湯 治一切脚痛順風防壅

檳榔 香附子去毛 陳皮去白 紫蘇葉

木瓜去瓢 五加皮 甘草炙各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓

欽定四庫全書 濟生卷三方

溫服婦人脚氣多由血虛加當歸半兩室女脚痛多

由血實加赤芍藥一兩半如大便秘結虛弱者加枳

實壯盛者加大黃並不拘時候

神烏丸 治遠年近日乾濕脚氣

川烏炮去皮臍切片炒令變色 虎脛骨酥炙 海桐皮

川草薢各一兩 川牛膝去蘆酒浸 肉蓯蓉酒浸各一兩半

金毛狗脊燎去毛半兩

右為細末用木瓜膏為丸如桐子大每服七十九空



心食前溫酒下

造木瓜膏法 先用好艾葉以鹽水灑濕蒸炊久再灑再蒸凡三次用宣木瓜一箇生去皮瓢切下蓋作甕子填艾葉在內却用蓋子合定再蒸極軟去艾葉不用只將木瓜細研為膏

加減地仙丹 治風冷邪濕留滯下焦足膝拘攣腫滿

疼痛不能步履

地龍炒去土 五靈脂去石 烏藥 白膠香別研

欽定四庫全書 濟生卷三方

椒紅炒去汗 威靈仙 木瓜去瓢 赤小豆炒

黑豆炒去皮 天仙藤 川烏炮去皮 五加皮

蒼朮泔水浸去黑皮炒 木鱉子去殼

右等分為細末酒糊為丸如桐子大每服七十九空

心用鹽酒鹽湯下

加味四斤丸 治肝腎俱虛精血不足足膝痠弱步履

無力如受風寒濕氣以致脚痛脚弱者最宜服之

虎脛骨酥炙二兩 天蘇 宣木瓜去皮一箇 川烏炮去皮各一兩



肉苁蓉 酒潤 焙

沒藥 別研 乳香 別研 各半兩

川牛膝 洗去蘆酒 潤一兩半

右為細末入木瓜膏杵和入少酒糊為丸如桐子大
每服七十丸空心食前溫酒鹽湯任下

欽定四庫全書



濟生
卷三方

欽定四庫全書

濟生方卷四

宋 嚴用和 編

水腫 論缺

葶藶丸 治腫滿水氣蟲脹

甜葶藶 兩半

白朮 兩半

桑白皮

赤茯苓 防己 三分

牽牛子 半兩半生半熟

羌活 陳皮

澤瀉 各三分

郁李仁 湯去皮熬紫色稱三分與葶藶二味別研如膏令極細

欽定四庫全書



濟生方
卷四方

右為細末與上二味同研煉蜜和入白內杵之丸如
桐子大初服十丸空心晚食前一日二服生薑橘皮
湯下不知加至二三十丸以知為度或加蘿蔔子甘
遂二分切片炒

七皮散

大腹皮 陳皮 茯苓皮 生薑皮

青皮 地骨皮 甘草皮 以上各半兩

右為細末每三錢水一大盞煎八分溫服無時候



脾約麻仁丸 雖不言治腫然水腫人腎腫水光不可行者三服神驗

麻仁 五兩 別研

枳實 半斤 熬

厚朴 去粗皮 薑製半斤

芍藥 半斤

大黃 去皮 切

杏仁 湯去皮 炒黃 別研五兩

右前二味別研如泥用四味為細末入白杵勻蜜丸如桐子大每服二十丸臨卧溫水下以大便通利為度未利再服此是古法今治腎腫水光只一二服以退為度不必利可也

欽定四庫全書 濟生方 卷四

鴨頭丸 治水腫面赤煩渴面目肢體悉腫腹脹喘急

小便澀少 方見水腫類

赤小豆湯 治年少血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿或

煩或渴小便不利 方見水腫類

三仁丸 治水腫喘急大小便不利

郁李仁 炮去皮尖 杏仁 去尖 薏苡仁 各一兩

右為細末米糊為丸如桐子大每服四十丸不拘時候米飲下

塗臍膏 治水腫小便絕少

地龍 豬苓 去皮 針砂 各一兩

右為細末搗葱涎調成膏敷臍中約一寸高潤絹帛束之以小便多為度日兩易

加味腎氣丸 治腎虛腰重脚腫小便不利

附子 炮二箇 白茯苓 澤瀉 山茱萸 取肉

山藥 炒 車前子 酒蒸 牡丹皮 各一兩 去木 官桂 不見火

川牛膝 去蘆 酒浸 熟地黃 各半兩

欽定四庫全書 濟生方 卷四

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心米飲下

積聚

論曰夫積有五積聚有六聚積者生於五臟之陰氣也聚者成於六腑之陽氣也此由陰陽不和臟腑虛弱風邪搏之所以為積為聚也有如憂思喜怒之氣人之所不能無者過則傷乎五臟逆於四時傳剋不行乃留結為五積故在肝曰肥氣在心曰伏梁在脾曰痞氣在肺



曰息賁在腎曰奔豚其名不同其證亦異肥氣之狀在左脇下大如覆杯肥大而似有頭足是為肝積診其脉弦而細其色青其病兩脇下痛牽引小腹足寒轉筋男子為積疝女子為瘕聚伏梁之狀起于臍下其大如臂上至心下猶梁之橫架於胸膈者是為心積診其脉沉而芤其色赤其病腹熱面赤咽乾心煩甚則吐血令人食少肌瘦痞氣之狀留有胃脘覆大如杯痞塞不通是為脾積診其脉浮大而長其色黃其病饑則減飽則見腹滿嘔泄足腫肉消久不愈令人四肢不收息賁之狀在右脇下覆大如杯喘息奔溢是為肺積診其脉浮而毛其色白其病氣逆背痛少氣喜忘目瞑膚寒皮中時痛或如虱緣或如針刺奔豚之狀發於小腹上至心下上下無時有若豚走之狀是為腎積診其脉浮而急其色黑其病饑則見飽則減小腹裏急腰痛口乾目昏骨冷以不愈令人骨痿少氣又論曰積者傷滯也傷滯之久停留不化則成積矣且

欽定四庫全書

濟生方
卷四

人之臟腑皆因觸冒以成疾病惟脾胃最多受觸蓋日用飲食稍或過多停滯難化或吐或嘔或泄或痢當是之時法宜推蕩然後助養脾胃所謂推盪者更宜酌量人之虛實傷滯之輕重而推盪之停滯一消則不成積尅化失宜久之必成積聚癥瘕矣所謂積者有氣積肉積酒積茶積食積痰積更有婦室月經不通遂成血積凡治諸積之要並載於後儻有前證參酌而用之可也香稜丸 治五積破痰癖消癥塊及冷熱積聚

欽定四庫全書

濟生方
卷四

木香

不見火

丁香

各半兩

京三稜

細剉酒浸一宿

枳殼

去瓢炒

青皮

白去

川練子

剉炒

茴香

炒

蓬蘽

細剉一兩用去殼巴豆三十粒同炒黃色去巴豆不用

右等分為細末醋煑麪糊為丸如桐子大以硃砂研極細為衣每服二十九丸炒生薑鹽湯下溫酒亦得不拘時候

妙應丸 治老人虛人一切虛寒痞癖積塊攻脹疼痛

黑附子

二枚各重七錢去皮臍剉作罐子

硃砂

三錢用水一盞化在



木香 不見火 七錢半 破故紙 微炒 華撥 各一兩	右將飛過礪砂末分入附子甕內却用剗出附子末	蓋口用和成白麪裹約半指厚慢炭火內煨令黃色	去麪同木香等為細末却將元裏附子熟黃麪為末	醋調煑糊為丸如菉豆大每服十五丸至二十丸食	後生薑湯下	磨積丸 治腸胃因虛氣癖于育膜之外流于季脇氣	逆息難多日頻年醫所不治久則榮衛停凝一日敗濁	欽定四庫全書 濟生方 卷四	潰為癰膿多至不救	胡椒 一百五十粒 木香 不見火 二錢半 全蝎 去毒 十箇	右為細末粟米飲為丸如菉豆大每服十五丸橘皮	湯下	阿魏丸 治氣積肉積心腹膨滿結塊疼痛或引脇肋	疼痛或痛連背脊不思飲食	木香 不見火 檳榔 各半兩 胡椒 阿魏 用醋化開 各二錢半	右為細末用阿魏膏子并粟米飯杵和為丸如桐子
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--	-----------------------------	-----------	------------------------------	--------------------	---	-----------------------------

大每服四十丸不拘時候用生薑皮湯下	脾積丸 治食積茶積飲食減少面黃腹痛	陳倉米 半升用巴豆七粒去殼同炒令赤色去巴豆不用	右為細末好醋和丸如豌豆大每服二十丸食後淡	薑湯下	黑丸子 治中脘有宿食吞酸惡心口吐清水噫宿腐	氣或心腹疼痛及中虛積聚飧泄赤白痢下	烏梅肉 七箇 百草霜 三錢 杏仁 去皮尖別研 三七枚	欽定四庫全書 濟生方 卷四	巴豆 去殼并油 二枚 半夏 湯泡七次九枚 縮砂仁 三七枚	右為細末和勻用薄糊為丸如黍米大每服十五丸	加至二十丸用熱水下薑湯亦得更看虛實增損丸	數或因食生冷魚鱠等用治中湯下亦可	如意丸 治虛中積令氣弱有傷不能傳化心下堅痞	兩脇脹滿心腹疼痛噫宿腐氣及霍亂吐瀉米穀不消	久痢赤白膿血相雜久病黃色羸瘦及腹一切食癥之	疾並皆治之
-------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	------------	------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------



枳殼 去瓢 檳榔 橘紅 半夏 湯泡七次
蓬蘽 京三稜 乾薑 炮 黃連 去鬚各二兩
巴豆 三七粒連殼用
右除巴豆外剉如豆大用好醋合巴豆煮乾去巴豆餘藥焙為細末薄糊為丸如菉豆大每服十九加至十五丸清茶薑湯任下食後臨卧服有孕婦人不宜服
阿魏丸 治胃怯弱食肉食麪或食生果停滯中焦不能尅化致腹脹疼痛嘔吐不食或利或秘悉主之
阿魏 酒浸化 官桂 不見火 蓬蘽 炮 麥蘖 炒
神麪 炒 青皮 去白 蘿蔔子 炒 白朮
乾薑 炮各半兩 百草霜 三錢 巴豆 去殼油三七箇
右為細末和勻用薄糊為丸如菉豆大每服二十九不拘時薑湯下麪傷用麪湯下生果傷用麪香湯下
癖 論缺
麪蘖丸 治酒癖不消心腹脹滿噫醋吞酸呃逆不食

脇肋疼痛服之神效
神麪 剉炒 麥蘖 炒各一兩 黃連 去鬚半兩
巴豆 三粒去殼同炒令轉色去巴豆不用
右為細末沸湯和丸如桐子大每服五十丸食後薑湯下
枳朮湯 治飲癖氣分心下堅硬如杯水飲不下
肉桂 去皮不見火三分 附子 炮去皮臍 細辛 洗去土葉 白朮 各一兩
桔梗 去蘆剉炒 檳榔 甘草 炙各三分 枳實 熬炒二分
右呖咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去滓溫服不拘時
痰飲
論曰飲凡有六即懸飲溢飲支飲痰飲留飲伏飲巢氏載之詳矣龐安常云人身無倒上之痰天下無逆流之水誠哉斯言以此思之人之氣道貴平順順則津液流通決無痰飲之患調攝失宜氣道閉塞水飲停胃府結而成痰其為病也證狀非一為喘為咳為嘔為泄為眩



暈心嘈怔忡為慣懷寒熱疼痛為腫滿攣癖為癰閉痞隔未有不由痰飲之所致也診其脉偏弦為飲浮而滑亦為飲也觀夫治飲之法或下或汗或溫或利此固定法愚者之見溫利之差可以無害汗下之錯為病不淺矣不若順氣為先分導次之氣順則津液流通痰飲運下自小便中出有病喜吐痰唾服八味丸而作效者亦有意焉王叔和云腎寒多唾蓋腎為水之官腎能攝水腎氣溫和則水溢運下腎氣虛寒則邪水溢上其間用山茱萸山藥輩取其補附子肉桂取其溫茯苓澤瀉取其利理亦當矣臨病之際又加詳審焉又痰飲論夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾胃外感風邪皮毛屬肺風寒隨玄府而入腠理開張內外相合先傳肺而入遂成嗽嗽遇肺寒也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉中介介如梗狀甚則嗽血也胃滿氣喘痰盛稠粘皆肺氣熱也

二生湯

專治痰

澹察方
治冷痰

欽定四庫全書



濟生方
卷四



迪志文化出版有限公司出版

附子生去皮臍 半夏生用
右等分咬咀每服四錢水二盞生薑十片煎至七分去滓溫服空心入少木香煎尤佳

健忘

論曰夫健忘者常常喜忘是也蓋脾主意與思心亦主思思慮過度意舍不清神宮不職使人健忘治之之法當理心脾使神意寧靜思則得之矣李仲南永類鈴方心火熱甚則腎水衰而志不精一皆能健忘治之當先理心脾使神意清寧可也

欽定四庫全書



濟生方
卷四

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白朮

茯苓去木 黃芪去蘆 龍眼肉

酸棗仁

炒去殼 人參

木香

不見火 甘草炙二錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至

七分去滓溫服不拘時候

消渴

論曰消渴之疾皆起於腎盛壯之時不自保養快情縱慾飲酒無度喜食脯炙醢醢或服丹石遂使腎水枯竭



迪志文化出版有限公司出版

心火燔熾三焦猛烈五臟乾燥由是渴利生焉醫經所載有消渴內消強中三證消渴者多渴而利內消者由熱中所作小便多所飲食物皆消作小便而反不渴令人虛極短氣強中者莖長興盛不交精溢自出皆當審處施以治法大抵消渴之人愈與未愈當防患癰疾其所慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麪能慎此者雖不服藥而自可愈不知此者縱有金丹亦不可救深思慎之

欽定四庫全書 濟生方 卷四

豬肚丸 治消渴

豬肚 一枚 治如食法

黃連 去蘆

小麥 炒各五兩

天花粉

茯苓 去木各四兩

麥門冬 去心二兩

右五味為末內豬肚中縫塞安甑中蒸之極爛木白中杵和丸如桐子大每服七十丸米飲下如不能丸入少煉蜜

遺濁

素問云夫精者身之本也蓋五臟六府皆有精腎為都

會關司之所聽命於心人能法道清靜精氣內持火來坎戶水到離扃陰平陽秘精元密固矣若夫思慮不節嗜欲過度遂使水火不交精元失守由是為赤濁白濁之患焉赤濁者心虛有熱也多因思慮而得之白濁者腎虛有寒也過於嗜慾而得之其狀漩面如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊皆嗜慾思慮之所致耳各分受病之由施以治法使坎離既濟陰陽協和然後火不上炎而神自清水不下滲而精自固安有赤濁白濁之患哉雖然思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱而腎不足故土邪干水亦令人便下渾濁史載之云夏則土燥而水濁冬則土堅而水清醫多峻補則疾愈甚若以中和之藥療之水火既濟脾土自堅其流清矣又遺精白濁二證脉息多瀉傷精脉也醫經曰男子二八腎氣盛天癸至天癸者精也精者身之本也腎藏精藏精者不可傷皆由不善衛生喜怒勞逸憂愁思慮嗜慾過度起居不常遂致心火炎上而不息腎水散漫而無歸上

欽定四庫全書 濟生方 卷四



下不得交養心受病者令人遺精白濁腎受病者亦令人遺精白濁此皆心腎不交關鍵不牢之致也腎病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人情動於中所願不得意淫於外而有是證者施治之法不宜祕固祕固則愈甚惟當以後方豬苓丸主之蓋半夏有利性豬苓導腎水導氣使通之意也許學士詳言之矣但虛損精滑之人却不宜服此藥所增之方並載于後臨病之際更宜加審焉

欽定四庫全書

濟生方
卷四

秘精丸 治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂

腰重少力

牡礪煨

兔絲子

酒浸蒸
焙別研

龍骨生用

五味子

韭子炒

桑螵蛸

酒炙

白茯苓

去皮

白石脂

煨各分

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心鹽

酒鹽湯任下

瑞蓮丸 治思慮傷心便下赤濁

白茯苓

去皮

石蓮肉

炒去心

龍骨

生用

天門冬

去心

麥門冬去心 遠志甘草水
洗去心 栢子仁炒別
研 紫石英火煨七次
研令極細
當歸去蘆
酒浸 酸棗仁炒去
殼 龍齒各一
兩 乳香半兩
別研
右為細末煉蜜為丸如桐子大硃砂為衣每服七十丸空心溫酒棗湯任下

羊脛灰丸

治思慮傷脾脾不攝精遂致白濁

厚朴

去皮取肉薑
汁炒二兩

羊脛

炭火煨過通
紅存性一兩

右為細末白水麪糊為丸如桐子大每服百丸空心

米飲下

欽定四庫全書

濟生方
卷四

豬苓丸 治年壯氣盛情慾動心所願不得意淫於外

夢遺白濁

袁氏方作
固真丹

半夏

一兩

豬苓

一兩

右半夏剉如豆大豬苓為末先將半夏炒令黃色不令焦地上去火毒半日取半夏為末以一半豬苓末調勻糊丸如桐子大更用餘豬苓末拌丸使乾入不油沙瓶中養之每服四十丸空心溫酒鹽湯下於申未間冷酒下



固精丸 治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢遺白濁	肉苁蓉 酒浸薄切焙 陽起石 火煨研極細 鹿茸 燎去毛酥炙	赤石脂 火煨七次 川巴戟 槌去心 韭子 炒	白茯苓 去皮 鹿角霜 龍骨 生用	附子 炮去皮臍各等分	右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯任下	小草湯 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安	欽定四庫全書 濟生方 卷四 小草 黃耆 去蘆 麥門冬 去心 當歸 去蘆酒浸	酸棗仁 炒去殼各一兩 石斛 去根 人參 甘草 炙各半兩	右呶咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候	薺萐丸 治強中為病莖長興盛不交精液自出消渴之後多作癰疽多由過服丹石所致	薺萐 大豆 去皮 茯神 去木 磁石 煨研極細	玄參 括蘆根 石斛 去根 地骨皮 去木
-----------------------	---	--	--	---------------------------	---------------------------	---------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------------	---	---

熟地黃 酒蒸 鹿角 各一兩 沉香 不見火 人參 各半兩	右為細末用豬腎一具煮如食法令爛杵和為丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下如不可丸入少酒糊亦可	泄瀉 論缺	洞陽丹 治陽虛陰盛手足厥冷暴吐大下脉細羸瘦傷寒陰證悉皆治之	附子 炮去皮臍 鍾乳粉 各二兩 天雄 炮去皮三兩	川烏 炮去皮四兩 陽起石 火煨一兩 火砂 一兩別研細	右為細末酒煮神麴糊為丸如桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下	豆附丸 治久虛下寒泄瀉不止腸滑不禁日夜無度全不進食一切虛寒泄瀉困乏並皆治之	肉豆蔻 麩裏煨 附子 炮去皮臍 良薑 剉炒 訶子 麩裏煨	乾薑 炮 赤石脂 火煨 陽起石 火煨 龍骨 生用	白礬 枯各二兩 白茯苓 去皮 桂心 不見火 細辛 洗各一兩
---	---	----------------------	-------------------------------	---	---	------------------------------	---------------------------------------	--	--	---



右為細末酒煮麴糊為丸如桐子大每服七十丸空心食前米飲下

下痢

論曰夫腸風臟毒下血者皆由飽食過度房室勞損坐卧當風恣餐生冷或啖炙煇或飲酒過度或榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑因熱乘之使血性流散積熱壅遏血滲腸間故大便秘下血血清而色鮮者腸風也濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者虫蛀也又有陽氣不升

欽定四庫全書

濟生方卷四

血隨氣降而下血者下虛也下血之脉脉多洪大而芤蓋弦者勞也芤者下血也治療之法風則散之熱則清之寒則溫之虛則補之治法合宜無不效者矣

椿皮丸 治腸風瀉血不止

東行椿根白皮 剉焙不拘多少

右為細末醋糊為丸如桐子大每服七十丸空心食

前陳米飲下

聚金丸治大腸蓄熱或因酒毒下血不已

黃連 去蘆四兩一兩水浸晒乾 防風 去蘆 黃芩 各一兩

右為細末醋糊為丸如桐子大每服七十丸米飲下

不拘時候

加減四物湯 治腸風下血不止

側柏葉 生地黃 洗 當歸 去蘆酒浸 川芎 各一兩

枳殼 炒去瓢 荊芥穗 槐花 炒 甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片烏梅少許煎

至七分空心食前去滓溫服

欽定四庫全書

濟生方卷四

蒙薑黃連丸 治証見鄭汝明產經

乾薑 炮 黃連 去鬚 縮砂仁 炒 芎藭

阿膠 剉蛤炒 白朮 各一兩 乳香 別研三錢 枳殼 去瓢半兩

右為細末用鹽梅三箇取肉入少醋杵和丸如桐子

大每服四十丸白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白

痢乾薑甘草湯下並不拘時

小便 論缺

兔絲子丸 治小便多或不禁



兔絲子	淘淨酒蒸 焙二兩	五味子	一兩	牡蠣	煨取粉 一兩
肉苁蓉	酒浸 二兩	附子	炮去皮 一兩	雞胗	半兩 微炙
鹿茸	酒炙 一兩	桑螵蛸	分兩 缺		
右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸食前鹽					
湯鹽酒任下					
葶藶丸 治小便頻數日夜無時					
川葶藶 洗					
右不拘多少為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸					
欽定四庫全書 濟生方 卷四					
空心食前鹽湯鹽酒任下					
又方 治脬氣不足小便頻數不用川椒茱萸但以酒					
煮山藥末糊為丸					
破故紙丸 治腎氣虛冷小便無度					
破故紙	鹽炒	茴香	鹽炒		
右等分為細末酒糊為丸如桐子大每服五十丸或					
一百丸空心鹽酒鹽湯下妙					
赤茯苓湯 治上腸實熱面赤多汗小便不通					

木通	去節	赤茯苓	去皮	檳榔		生地黄	洗
黃芩		赤芍藥		甘草	炙	麥門冬	去心
右等分咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候							
葵子湯 治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥咽不利							
利	方見膀胱實熱門						
大便							
論曰平居之人五臟之氣貴乎平順陰陽二氣貴乎不欽定四庫全書							
濟生方 卷四							
偏然後津液流通腸胃益潤則傳送如經矣攝養乖理							
釋	洪淡察方云五臟傷和	三焦氣澀運掉不行於是乎壅結於腸					
胃之間遂成五秘之患夫五秘者風秘氣秘濕秘寒秘熱秘是也更有發汗利小便及婦人新產亡血走耗津液往往皆令人秘結燥則潤之澀則滑之秘則通之寒則溫利之此一定之法也							
又論曰秘凡有五即風秘氣秘濕秘冷秘熱秘是也多因腸胃不足風寒濕熱乘之使臟氣壅滯津液不能流							



通所以秘結也論治之法前方載之詳矣茲不再叙但年高之人以致秘結者非少壯比多服大黃恐傷真氣後方所載有葳靈仙丸最佳內用葳靈仙取其主諸風宣通五臟去腹內冷氣滯氣內用黃芪取其補氣使氣充得以運掉蜜炙取其滑潤之義枳實取其下氣寬腸藥用三品專而不雜老人諸秘結大相宜也臨病之際更以後方詳審虛實選而用之可也皂角丸治風秘專而有效不可不知

欽定四庫全書



濟生方卷四

麻仁丸

治腸胃不調熱結秘澀

方見大便難類張仲景金匱方論內但本

方以米飲送下衛生至寶作脾約麻仁丸

檳榔散

治腸胃有濕大便秘澀

檳榔

不拘多少

右為細末每服二錢用蜜湯點服不拘時候

潤腸丸

治發汗利小便亡津液大腑秘結老人虛人

皆可服

肉蓯蓉

酒浸焙二兩

沉香

別研一兩

右為細末用麻子仁汁打糊為丸如桐子大每服七十丸空心米飲下

檳榔丸

治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便秘實

檳榔

大黃

蒸

麻子仁

炒去殼別研

枳實

炒

羌活

去蘆

牽牛

炒

杏仁

去皮尖炒

白芷

黃芩

各一兩

人參

半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服四十丸空心用熟水下以大腑流利為度

欽定四庫全書



濟生方卷四

枳殼丸

治腸胃氣壅風盛大便秘實

皂角

去黑皮微炒

枳殼

去瓢炒

川大黃

二兩剉微炒

羌活

去蘆

木香

不見火

橘紅

桑白皮

蜜水炙

香白芷

各二兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心米飲薑湯任下

訶梨勒丸

治大腸虛冷腸鳴泄瀉腹脅氣痛飲食不

化



訶梨勒 煨 麪裹	附子 炮去 皮 臍	肉豆蔻 煨 麪裹
木香 火 不見	吳茱萸 炒	龍骨 生 用
白茯苓 皮 去	萆撥 兩 各半	
右為末薑汁煮糊為丸如桐子大每服七十九空心米飲下		
蜜兌法 每用蜜三合入豬膽汁兩枚在內煎如錫出冷水中捏如指大長三寸許納下部立通		
欽定四庫全書		
濟生方		
卷四		

欽定四庫全書	目	論曰人之有雙眸若天之有兩曜五臟六腑之精華宗脉之所聚周視萬化肝之外候也眼通五臟氣貫五輪由此觀之人之有生須固養身之道善攝生者養氣存神安心息視然後心氣通暢肝氣和平精氣上注于目則目無其疾矣倘將養乖理六淫外傷七情內鬱嗜慾不節飲食無度生食五辛熱啖炙燂久視勤書憂哀悲泣皆能病目况方論有八廓內外障等之證茲不復叙治療之法必須洞明形狀細察根元窮其是非若能細審無不瘥除然病眼之人不得當風看日喜怒房勞五辛炙燂酒食毒物並宜斷之惟須寬緩情性慎護調攝即無不瘥也若縱恣乖違觸犯禁忌自貽其咎必致喪明而後已可不謹歟
杏連散	治風熱上攻羞明澀痛	
欽定四庫全書		
濟生方		
卷五		



黃連 去鬚一錢槌碎		杏仁 七粒槌碎		右用水半盞二藥浸之飯上蒸一時以澄清放溫洗了用紙蓋覆安頓湯瓶上頻頻洗之		補腎丸 治腎氣不足眼目昏暗瞳神不分明漸成内障		磁石 火煨醋淬七次水飛		兔絲子 淘淨酒浸蒸別研各二兩		五味子		熟地黃 酒蒸		枸杞子		楮實子 酒浸		覆盆子		肉苁蓉 酒浸		車前子 酒蒸		石斛 去根各一兩		沉香		青鹽 別研各半兩		右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯下		冷補丸 治腎水燥少不受峻補口乾多渴耳痒耳聾腰痛腿弱小便赤澀大便或難		熟地黃 酒蒸		生地黄 洗		天門冬 去心		川牛膝		白芍藥		地骨皮 去木		白蒺藜 炒		麥門		冬心 去		石斛 去根		玄參		磁石 火煨七次細研水飛過		沉	
--------------------------	--	------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------	--	-----	--	-----------------------	--	-----	--	-----------------------	--	-----	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	----	--	-------------------------	--	------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	-----------------------	--	-----	--	-----	--	-----------------------	--	----------------------	--	----	--	---------------------	--	----------------------	--	----	--	-----------------------------	--	---	--

香 別研不見火各等分		右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯鹽酒任下		養肝丸 治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力		當歸 去蘆酒浸		車前子 酒蒸		防風 去蘆		白芍藥		熟地黃 酒蒸		川芎		楮實子 各等分		右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸溫熱水下不拘時候		羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅胃裏炎		羚羊角 鎊		柴胡 去蘆		黃芩		川當歸		決明子		羌活 去蘆		赤芍藥		甘草 炙各等分		右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候		桑白皮散 治肺氣壅塞毒熱上攻眼目白睛腫脹日夜疼痛心曾煩悶	
---------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	-----	--	-----------------------	--	----	--	------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----	--	-----	--	-----	--	----------------------	--	-----	--	------------------------	--	----------------------------	--	------------------------------	--



玄參 桑白皮 枳殼去瓢炒 川升麻 杏仁去皮	尖 旋覆花去皮梗 防風去蘆 赤芍藥 黃芩	甘菊花去枝梗 甘草炙 甜葶藶炒各一兩	右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓食後溫服	爐甘石散 治一切目疾不問得疾之因悉皆治之	爐甘石半斤用黃連四兩如豆大于銀石器內煑一伏時去黃連取石研 腦子	別研二錢半	欽定四庫全書 濟生方 卷五	右件和勻每服半字白湯泡放溫時時洗之	決明子散 治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生翳膜或眦出努肉或痒或澁羞明多淚或始則昏花漸成内障但是一切暴風客熱皆宜服之	黃芩 甘菊花去枝梗 木賊 決明子 石膏	赤芍藥 川芎 川羌活去蘆 石決明各一兩 甘	草 蔓荊子各一兩	右為細末每服三錢水一中盞生薑五片煎至六分
--	--	--	----------------------------------	-----------------------------	---	--------------	----------------------	--------------------------	--	---	--	--------------------------------	-----------------------------

食後服	太清散 治暴風客熱目赤睛痛癰澁難開	銅青半兩別研 薑粉米二錢半	右藥研細和勻每用少許沸湯泡放溫頻洗之	造薑粉法臘月間用生薑洗切碎於砂盆內搗爛以新麻布裂汁澄脚取粉陰乾	秦皮散 治暴風客熱赤眼腫痛痒澁眵淚昏暗	滑石 秦皮 黃連去鬚等分	欽定四庫全書 濟生方 卷五	右為細末每用半錢沸湯泡澄清溫洗不拘時候	後論曰夫眼者內則屬乎五藏外則應乎五藏瞳神黑水腎之主也血輪如環心之主也絡裏者脾之主也白睛屬肺總管於肝眼帶雖係於肝明孔遍通五藏五藏皆有神善攝生者調五藏以養神神安則藏和藏和則眼目清淨自無疾矣凡所感之由與夫治療皆可選而用之	耳
------------	--------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------------	--	----------



論曰夫耳者腎之候腎者精之所藏腎氣實則精氣上通聞五音而聰矣若疲勞過度精氣先虛於是乎風寒暑濕得以外入喜怒憂思得以內傷遂致熱壅耳聾耳鳴加之出血出膿則成聵耳底耳之患候其顙頰色黑者知其耳聾也亦有手少陽之脉動厥而聾者耳內渾渾煇煇也手太陽脉動厥而聾者耳內氣滿也大抵氣厥耳聾尚易治精虛耳聾不易藥諸証既殊治各有法塞耳丸 治耳聾無不効 澹察方名塞耳丹

欽定四庫全書 濟生方 卷五

石菖蒲 一寸 巴豆 一枚 全蝎 一枚 去毒

右為細末葱涎打和如棗核大綿裹納耳中

杏仁散 治耳卒痛或有水出

杏仁 一錢 炒 令焦

右研為末葱涎搜和捏如棗核大綿裹塞耳中

又方 治耳暴聾

雄黃 一錢 巴豆 一箇 去殼

右同研令細用葱涎和作一錠子紙捲定塞耳中

菴蓉丸 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴 肉菴蓉 酒浸切 山茱萸 核去 石龍芮 石菖蒲 兔絲子 淘淨酒 川羌活 去蘆 鹿茸 燎去毛切 磁石 火煨醋淬 石斛 去根 附子 炮去皮臍 全蝎 去毒二 麝香 一字 旋入 右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸加至一百丸空心鹽酒鹽湯任下 磁石丸 治風虛耳聾無聞

欽定四庫全書 濟生方 卷五

磁石 火煨 防風 去蘆 羌活 去蘆 黃耆 去蘆鹽 通皮 去蘆 白芍藥 桂心 各不見火 人參 半兩

右咬咀每服四錢水一盞半羊腎一對切片去脂膜煎至七分去滓食前溫服

犀角飲子 治風熱上壅耳內聾閉響腫掣痛濃血流

出

犀角 鎊 菖蒲 木通 玄參 赤芍藥 赤小

豆 炒 甘菊花 去枝梗 甘草 炙半



右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
溫服不拘時候

玄參湯 治腎臟實熱心胃煩悶耳聽無聲四肢拘急
腰背俛仰強痛

生地黃洗 玄參 五加皮去木 黃芩 赤茯苓

皮去 通草 石菖蒲 甘草炙 羚羊角鎊 麥

門冬去心各等分

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

欽定四庫全書 濟生方 卷五

溫服不拘時候

鼻

論曰夫鼻者肺之候職欲常和和則吸引香臭矣若七情內鬱六淫外傷飲食勞役致鼻氣不得宣調清道壅塞其為病也為衄為癰為息肉為瘡瘍為清涕為室塞不通為濁膿或不聞香臭此皆肺藏不調邪氣蘊積於鼻清道壅塞而然治之之法寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之無越於斯但時氣鼻衄不可遽止如出

三升已上恐多者方可斷之活人書所謂衄血者乃解蓋陽氣重故也不可不知

又論曰夫鼻者肺之所主職司清化調適得宜則肺臟宣暢清道自利攝養乖方則清道壅塞故鼻為之病焉蓋肺主於氣肝藏於血邪熱傷之則血熱血熱則氣亦熱血氣俱熱隨氣上逆故為鼻衄甚則生瘡風寒乘之陽經不利則為壅塞或為清涕蘊積不散則不聞香臭或為鼻鼈或生息肉鼻痛之患矣又有熱留膽府邪移於腦遂致鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄蟻瞑目故得之氣厥也

欽定四庫全書 濟生方 卷五

梔子仁丸 治肺熱鼻發赤癰俗曰酒瘡鼻

梔子仁

右為末溶黃蠟等分和為丸彈子大空心茶酒嚼下半月効忌酒炙燂

又方

枇杷葉去毛焙乾



右為末茶調下一二錢日三服

辛夷散 治肺虛風寒濕熱之氣加之鼻內壅塞涕出

不已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁 細辛洗去土葉 藁本去蘆 升麻 川芎

木通去節 防風去蘆 羌活去蘆 甘草炙 白芷等各

分

右為細末每服二錢食後茶清調服危亦林得効方加蒼耳一半熟

者茶調散
合和服

欽定四庫全書 濟生方 卷五

蒼耳散 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵孫氏仁存活法秘方云腦冷所

致此疾亦有腦熱者亦有肺寒者素問曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵又曰泣涕者腦也腦滲為涕又曰肺之液為涕其來各有由矣當審詳之
鼻淵濁涕不止清濁亦自異

辛夷仁半兩 蒼耳子二錢半 香白芷一兩 薄荷葉

錢半

右並日乾為細末每服二錢用葱茶清食後調服

口

論曰夫口者足太陰之經脾之所主五味之所入也蓋

五味入口藏於脾胃為之運化津液以養五氣五氣者

五藏之氣也節宣微爽五藏之氣偏勝由是諸疾生焉

且鹹則為寒酸則停滯澀則因燥淡則由虛熱則從苦

從甘也口臭者乃腑臟腠腐之不同蘊積於胃膈之間

而生熱衝發於口也口瘡者脾氣凝滯風熱加之而然

醫療之法各隨其所因以治無使過與不及焉

又論曰夫口者脾之候齒者骨之餘髓之所養也人之

一身此為大要凡有病起因口而成含惡氣以嚙津液

欽定四庫全書 濟生方 卷五

痰癖而在膈心胃壅滯毒氣攻烝熏之既久故齒為之

病焉其諸風寒蘊熱而得之者方載於後

芎藭膏 治口氣熱臭

香白芷 芎藭各等分

右為細末煉蜜丸如雞豆大食後臨卧嚙化

丁香丸 治口臭穢

丁香三錢 甘草一錢 芎藭二錢 白芷半錢

右為細末煉蜜丸如彈子大綿裹一丸嚙嚙津



碧雪 治一切壅熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生瘡舌根緊強言語不正腮項腫痛

蒲黃 青黛 硃砂 焰硝 甘草 各等分

右為細末每用手指捻糝於喉中津嚥或呷少冷水送下頻頻洗之

青金散 治小兒白口瘡急惡狀似木耳 洵川王

五倍子 去土垢 青黛 四兩 錢四

右為細末好油調鴉羽掃口向咽喉流入咽喉中瘡

欽定四庫全書 濟生方 卷五

爛次日便下兼治痔瘡亦佳

麝香散 治急疳惡蝕肉損

枯白礬 二兩 半錢 黃丹 一錢 半炒 麝香 一字

右為細末研勻乾擦牙疳處頻上

朱粉散 治白口瘡惡及牙疳蝕

枯白礬 一兩 半錢 乾胭脂 半錢 輕粉 半錢 麝香 少許

右研勻油調掃口瘡或乾貼

蛾黃散 治赤白瘡疼唇破兼治熱瘡

黃蘗 去皮 寒水石 燒

右各等分為細末乾貼口瘡上塗唇上兼治諸瘡較遲者

粉紅散 治小兒白口瘡咽喉惡爛聲啞

乾胭脂 一錢 枯礬 一兩

右研勻每用一錢生蜜調如稀糊掃口瘡咽喉內咽了藥來日大便退了瘡皮為驗

大青湯 治咽喉唇腫口舌糜爛疳惡口瘡

欽定四庫全書 濟生方 卷五

大青葉 升麻 大黃 剉炒各二兩 生地黄 三兩 焙

右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服微利

止

升麻散 治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍藥 人參 洗 桔梗 去蘆 乾葛 各一兩

甘草 生用 半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候



瀉黃飲子 治風熱蘊於脾經唇燥拆裂口舌生瘡	白芷 升麻 枳殼去白炒 黃芩 防風去蘆 半	夏湯洗七次 石斛各一兩 甘草生用半兩	右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘	時候	瀉黃散 治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰痛心煩	唇口乾燥壅滯不食	藿香葉七錢 石膏煨 縮砂仁 山梔子仁 甘	草炙各半兩 防風去蘆四兩	右剉碎用蜜酒炒香焙為細末每服三錢水一大盞	煎至七分溫服不拘時候	利膈湯 治上膈壅熱口苦咽乾痰唾稠粘心煩喜冷	咽喉生瘡疼痛一切上壅之證皆可服之	防風 雞蘇葉 桔梗 牛蒡子 荊芥穗各一兩	川升麻 人參 甘草炙各半兩	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
-----------------------------	--	--	-----------------------------	-----------	------------------------------	-----------------	---	---	-----------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------

溫服不拘時候	橄欖散 治唇緊燥裂生瘡	橄欖不拘多少燒灰	右為細末以豬脂和塗患處	玄參升麻湯 治心脾壅熱舌上生瘡木舌重舌腫	或連頰兩邊腫痛	玄參 赤芍藥 升麻 犀角鎔 桔梗去蘆 貫	衆洗 黃芩 甘草炙各等分	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓	溫服不拘時候	杏仁膏 治口舌熱乾燥或舌上生胎語言不真	升麻 杏仁去皮尖 甘草炙各一兩 黑豆五十粒炒去皮	右為細末入白蜜五合生地黃汁五合慢火熬成膏	子丸如雞豈大常噙一丸津化嚥下舌上生胎止用	生薑片蘸冷水擦洗之亦妙	齒
---------------	--------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------	---	---	-----------------------------	---------------	----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------



論曰夫齒乃骨之餘氣骨乃腎之所主呼吸之戶門也精氣強則齒自堅腎氣衰則齒自豁且手陽明大腸之脉入於齒灌注於牙儻風寒壅熱之氣鬱滯心胃衝發於口則齒為之病矣輕者為宣露齦頰浮腫甚則為疳蠱齦脫之證也亦有腎氣虛壅齒痛宣露當進補腎藥其諸隨證施以治法

安腎丸 治虛熱牙齒浮腫疼痛

肉苁蓉

酒浸焙

石斛

去根

桃仁

炒

破故紙

炒

欽定四庫全書



濟生方卷五

白朮 乾山藥

剉炒

白蒺藜

炒去刺

川烏

炮去皮臍

川葶藶 川巴戟

去心各等分

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十九空心鹽

湯下

莽草散 治風壅熱氣上攻齒齦浮腫或連頰車疼痛

或宣露血出

莽草 川升麻 柳枝 槐角子 鶴虱 地骨

皮 藁本 槐白皮

去蘆



迪志文化出版有限公司出版

右咬咀每服一兩水一盞入鹽少許煎至七分去滓熱含冷吐之日用三次

必勝散 治齒齦

蒲黃

炒

螺兒青

等分

右為細末每用少許擦患處少待用湯鹽水漱之

驅毒飲 治熱毒上攻宣露血出齒齦腫痛不可忍者

屋遊

即瓦屋上青苔不拘多少洗淨

右煎湯澄清入鹽一小撮放溫頻頻漱之

欽定四庫全書



濟生方卷五

牢牙散 治一切齒痛不問久新

全蝎

七個去毒

細辛

洗淨三錢

草烏

二個去皮

乳香

別研二錢

右為細末每用少許擦患處須臾以溫鹽水盥漱

香鹽散 此藥常用牢牙去風冷蛀齦宣露一切齒疾

大香附子

炒令極黑三兩

青鹽

半兩別研

右為細末和勻用如常法乃鐵甕先生良方也



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書



濟生方卷五



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

子部
濟生方卷八

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

膳錄貢生臣黃琮

瞻錄監生臣單可

欽定四庫全書

濟生方卷六

宋 嚴用和 編

血氣

論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒哀思悲恐驚者七氣也七情之外益之以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身血隨氣行氣一壅滯則血與氣併或月事不調心腹作痛或月事將行預先作痛或月

欽定四庫全書

濟生方
卷六

事已行淋瀝不斷心腹作痛或連腰脇或引背脊上下

攻刺吐逆不食甚則手足搐搦狀類驚癇或作寒熱或為癥瘕肌肉消瘦非特不能受孕久而不治轉而為瘵疾者多矣

延胡索湯 治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心

腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搐搦經候

不調但是一切血氣疼痛並可服之

當歸

去蘆酒
浸剉炒

延胡索

皮炒去

蒲黃

炒

赤芍藥

官桂

不見火
各半兩

片子薑黃

洗

乳香

沒藥

木

香

不見火
各三錢

甘草

炙二
錢半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至七分去

滓食前溫服吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散 治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍腹痛

不可忍及惡露不下血上攻心迷悶不省應有血氣腹

痛並皆治之

牡丹皮

去木

赤芍藥

蓬莪朮

剉

荊三稜

剉

欽定四庫全書

濟生方
卷六

劉寄奴

去梗
酒浸

熟地黃

蒸

延胡索

皮炒去

當歸

烏藥

去蘆
酒浸

官桂

不見火
各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同

煮豆爛為度焙乾入後五味同為細末每服二錢空

心食前溫酒調服

三神丸 治婦女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經行

澀少或經事不調以致疼痛

橘紅

二兩

延胡索

去皮醋
煮一兩

當歸

去蘆酒浸
剉

當歸

畧炒一兩



右為細末酒煮米糊為丸如桐子大每服七十九加至一百丸空心艾湯下米飲亦得

抑氣散 治婦人氣盛于血變生諸證頭暈膈滿皆可服之

香附子 炒淨四兩 茯神 去木一兩 橘紅 二兩 甘草 炙一兩

右為末每服二錢食前用沸湯調服

帶下

論曰巢氏病源論婦人有三十六疾所論三十六疾者

欽定四庫全書 濟生方 卷六

七癥八瘕九痛十二帶下是也然所謂十二帶下者亦不顯其證狀今人所患惟赤白二帶而已推其所自勞傷過度衝任虛損風冷據於胞絡此病所由生也且婦人平居之時血欲常多氣欲常少方謂主氣有原百疾不生儻或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交併則赤白俱下有室女或虛損而有此疾者皆令孕育不成以致絕嗣凡有是證速宜治之久而不治令人面色黧黯

肌肉瘦瘠腹脇脹滿攻刺疼痛甚至足脛枯細多苦逆冷疔羸不能食矣診其脉右手尺脉浮浮為陽陽絕者無子苦足冷帶下也

白堊丸 治婦人白帶久而不止面生黧黯腰膝疼痛腰膝冷痛日漸虛困產後白帶並宜服之

白堊 火煨 禹餘糧 火煨七次 鼈甲 醋炙 烏賊骨 醋炙

當歸 去蘆酒浸 鵲巢灰 乾薑 炮 紫石英 火煨七次

附子 炮去皮臍 金毛狗春 燎去毛 芎藭 各一兩 艾葉

欽定四庫全書 濟生方 卷六

灰 半兩 鹿茸 燎去毛切片

右為細末醋煮米糊為丸如桐子大每服七十九空心溫酒米飲任下

白斂圓 治室女衝任虛寒帶下純白

鹿茸 醋蒸焙二兩 白斂 金毛狗脊 燎去毛各一兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米糊為丸如桐子大每服五十九空心溫酒下

當歸煎 治婦人室女赤白不止腹內疼痛四肢煩疼



不欲飲食日漸羸瘦

當歸去蘆酒浸 赤芍藥 牡蠣火煨取分 熟地黄酒蒸焙

阿膠劉蛤粉炒成珠子 白芍藥 續斷酒浸各一兩 地榆

兩半

右為細末醋糊為丸如桐子大每服五十丸空心米

飲下

卷栢丸 治婦人室女腹臍冷熱相攻心腹絞痛腰痛

腿痛赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

欽定四庫全書 濟生方 卷六

黃耆去蘆蜜水炙 熟地黄洗各一兩半 卷栢醋炙 赤石

脂七次 鹿茸醋炙 白石脂 芎藭 代赭石

艾葉七次 桑寄生 鼈甲醋炙 當歸去蘆

地榆酒洗微炒 木香不見火 龍骨各半 乾

薑炮二分

右為末醋煮糯米糊為丸如桐子大每服七十九空

心食前米飲下

血瘕

論曰腹中之病經書所載有積有聚有癖有疝有癥有

瘕蓋積者五藏所積其痛不離其部聚者六腑所聚其

痛無有常處癖者病據兩脇之傍疝者弦急而多痛癥

者徵也有塊可驗瘕者假也假物成形其結聚浮假推

移乃動此無他皆由飲食不節寒溫不調氣血勞傷臟

腑虛弱受于風冷與氣血相結而成也惟婦人血瘕為

病異於丈夫其所以異者非獨關於飲食不節而已多

因產後勞動太早喜怒不調臟虛受寒或月水往來取

欽定四庫全書 濟生方 卷六

涼過度惡血不散遇寒搏則凝皆能成血瘕也病作之

時令人心脇攻刺少腹痛重或腰背互相引而痛久而

不消令人黃瘦羸弱遂致絕產診其脉弦急大者生虛

小弱者死不治

三稜煎丸 治婦人室女血瘕月經不通臍下堅結大

如杯升而不治必成血蠱

京三稜 蓬朮各二兩 芫花半兩 青皮去瓢淨一兩半

右剉如豆大用好醋一升煮乾焙為細末醋糊為丸



如桐子大每服五十丸食前用淡醋湯下

琥珀丸 治婦人血瘕腹中有塊攻刺小腹痛重或腰

背相引而痛久而不治黃瘦羸乏

琥珀研別 白芍藥 川烏炮去皮 川牛膝去蘆酒浸

鼈甲炙醋 蓬莪茂炮 當歸去蘆酒浸 厚朴薑製炒

木香火不見 澤蘭葉 官桂不見火 麝香別研

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心溫

酒米飲任下

欽定四庫全書 濟生方 卷六

通經丸 治室女月經不通臍下堅結大如杯發則寒

熱往來此名血瘕

當歸去蘆酒浸 蓬朮炮 桂心不見火 青皮去白

大黃炮 乾薑炮 桃仁尖去皮炒 乾漆炒令盡 紅

花 川椒去目及閉口者微炒放

右十味為末將一半用醋煮熬成膏一半入雞子清

同搗勻丸如桐子大每服二十丸空心淡醋湯下

六合湯 治婦室經事不行腹中結塊疼痛腰痛腿痛

當歸去蘆酒浸 白芍藥 官桂去皮 熟地黄 川芎

蓬朮炮各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫空心服

崩漏

論曰崩漏之疾本乎一證輕者謂之漏下甚者謂之崩

中且婦人平居經脉調適衝任二脉互相滋養陰陽二

氣不相偏勝則月事以時下儻若將理失宜喜怒不節

疲極過度大傷於肝蓋肝為血之府庫喜怒勞役一或

欽定四庫全書 濟生方 卷六

傷之肝不能藏血于宮宮不能傳血于海所以崩中漏

下漏下者淋瀝不斷是也崩中者忽然暴下乃漏證之

甚者其狀或如豚肝或成五色與血俱下又或如泔涕

如爛瓜汁又或如豆羹汁如藍靛色至有黑如乾血相

雜亦有純下瘀血此皆衝任虛損喜怒勞役之過致傷

于肝而然也久久不止面黃肌瘦虛煩口乾臍腹冷痛

吐逆不食四肢虛困甚則為脹為腫診其脉寸口脉弦

而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛虛寒相



搏其脉為革主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不可治治之之法調養衝任鎮注血海血海溫和歸于有用內養百脉外為月事自無崩中漏下之患矣又論曰崩漏之疾本乎一證然有輕重之別焉輕者為之漏下漏下者淋瀝不斷是也重者謂之崩中忽然暴下下而過多真陰走耗遂致頭暈眼花氣乏怔忡身體羸瘦飲食減少腹內冷痛四肢無力驚惕恐怖此其證也前方論治有對證服之而作効者亦有試之而罔功

欽定四庫全書

濟生方
卷六

者非藥之不應乃由衝任極虛血海極寒故爾蓋血暖則流暢外為月事內灌百脉今既虛極而又寒極血寒則凝而不運是以崩中不已狀如豚肝或下五色或與血俱下或如泔涕或如豆羹汁或如藍靛色或純下瘀血此血寒之極所致若謂血熱致崩而用涼藥誤矣每用歲丹作效始進三五粒而未愈再進十粒猶未愈服至四五十粒差愈服至百粒方能作効此歲丹之力也然歲丹之性全恃火力如水寒成冰血寒成塊血得溫

則流散四肢冰得日則烘消成水血凝得丹而流暢火力也大抵醫者意也以意醫之所以作效儻或疑而未敢輕用先進陽起石丸服之二日未効却進歲丹庶無可疑矣又有室女二七天癸當至亦有當至而未至者近十八九左右方行者有卒然暴下亦有淋瀝不止有若崩漏者却又不宜服前二藥也惟當以四物湯加香附子煎血色鮮而不止者挾熱也宜去熟地黃加生地黃煎臨病之際又在乎審處之

欽定四庫全書

濟生方
卷六

鎮宮丸 治婦人崩漏不止或下五色或赤白不定或如豆汁或狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久久不止令人黃瘦口乾胸煩不食

代赭石 火煨 醋次

紫石英 火煨 醋次

禹餘糧 火煨 醋次

七次 香附子 醋炙 各二兩

陽起石 細研 紅

芎藭 鹿

茸 燎去毛 醋蒸 焙 茯神 去木

阿膠 剉蛤粉炒 蒲黃 炒

當歸 去蘆酒浸 各一兩

血竭 別研 半兩

右為細末用艾煎醋汁打糯米和丸如桐子大每服



七十丸空心米飲下

十灰丸 治崩中下血不止

綿灰 黃絹灰 艾葉灰 馬尾灰 藕節灰

蓮蓬灰 油髮灰 赤松皮灰 欖櫚灰 蒲黃

灰

右等分為細末用醋煮糯米糊為丸如桐子大每服

七十丸加至一百丸空心米飲下

栝子仁湯 治婦人憂思過度勞傷心經心主于血心

欽定四庫全書 濟生方 卷六

虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患

當歸去蘆酒炒 芎藭 茯神去木 小草 阿膠剉蛤粉炒

成珠 鹿茸燎去毛酒蒸焙 栝子仁炒各一兩 香附子炒去

毛二 川續斷酒浸一兩半 甘草

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓

空心食前溫服

陽起石丸 治衝任不交虛寒之極崩中不止變生他

證

陽起石火煨紅別研令極細二兩 鹿茸去毛醋炙一兩

右為細末醋煎艾汁打糯米糊為丸如桐子大每服百丸空心食前米飲下

加減四物湯 治室女二七天癸至亦有當時未至而

後至者有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多

變生諸證悉宜服之

川當歸去蘆酒潤切焙一兩 川芎一兩 熟地黄洗淨一兩 白

芍藥一兩 香附子炒去毛一兩半

欽定四庫全書 濟生方 卷六

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去

滓食前溫服如血色鮮而不止者去熟地黄加生地

黃煎

搐搦

論曰婦人室女有生平無病者一旦忽感手足搐搦之證痰涎壅塞精神昏憤不省人事醫者往往便作癇證治之非也蓋婦女以肝氣為主肝乃血之府庫肝既受病經候愆期或多或少或閉斷不通肝宮壅塞隨其虛



實而生病焉婦人多由血虛七情感而生風女子血實七情感而生熱邪乘四末是以卒然手足搐搦狀類癇證也治療之法先宜多進蘇合香丸溫酒化服以快其氣俟其甦醒亟用調經之法塞者通之通者調之虛者與之實者取之婦人宜服白薇丸女子宜服澤蘭丸多服以病退為期也

白薇丸

白薇 紫石英火燉七次 琥珀別研 白芍藥 桂

欽定四庫全書

濟生方卷六

心不見火 川續斷酒浸 防風去蘆 山茱萸取肉 當

歸去蘆酒浸 栝子仁炒 川烏炮去皮尖 牡丹皮去木各一

兩 木香不見火半兩 麝香別研半錢

右為細末生薑自然汁打米糊為丸如桐子大每服七十丸空心食前溫酒米飲任下

澤蘭丸

當歸去蘆酒浸 澤蘭葉 琥珀別研 羚羊角鎔別研

防風去蘆 牡丹皮去木各一兩 麝香別研半錢 安息香

酒煮去淨砂石半錢 生地黃 赤芍藥各兩半 鐵粉半兩 橘

紅錢五

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心食前溫酒米飲任下

欽定四庫全書

濟生方卷六



欽定四庫全書

濟生方卷七

宋 嚴用和 編

求子

論曰素問云夫天地者萬物之父母也陰陽者血氣之
男女也夫有夫婦則有父子婚姻之後則有生育生育
者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血先至陽精
後衝血開裏精陰外陽內陰含陽胎而男形成矣陽精
先至陰血後參精開裏血陽外陰內陽含陰胎而女形

欽定四庫全書

濟生方
卷七

成矣男女婚姻貴乎及時夫婦貴乎強壯則易於受形
也且父少母老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯
理或男子真精氣不濃婦女血衰而氣旺是謂夫病婦
疹皆使人無子治療之法女子當養血抑氣以減喜怒
男子益腎生精以節嗜欲依方調治陰陽和平則婦人
樂有子矣

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭暈膈滿
體痛怔忡皆可服之香附子乃婦人之仙藥不可謂其



迪志文化出版有限公司出版

耗氣而勿服

釋繼洪澹察方云大藥婦人只宜血盛氣衰所以醫家多為抑陽助陰陽氣陰血

香附子

炒杵淨四兩

茯神

去木

甘草

炙各一兩

橘紅

二兩

右為細末每服二錢食前用沸湯服仍兼進紫石英

丸

陽起石丸

治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子

陽起石

火煨紅研極細

鹿茸

酒蒸焙

韭子

炒

兔絲子

水淘淨酒浸蒸焙別研細末

天雄

炮去皮

肉苁蓉

酒浸各一兩

覆盆子

酒浸

石斛

去根

桑寄生

欽定四庫全書

濟生方
卷七

沉香

研別

原蠶蛾

酒炙

五味子

各半兩

右為細末酒煮糯米糊為丸如桐子大每服七十丸

空心鹽湯鹽酒任下

妊娠

論曰內經云陰搏陽別謂之有子三部脉浮沉正等無
病者乃知有娠也妊既受矣多病惡阻惡阻者俗諺所
謂惡食是也此由婦人本虛平時喜怒不節當風取冷
中脘宿有痰飲受妊經血既閉飲血相搏氣不宣通遂



迪志文化出版有限公司出版

致心下憤悶頭暈眼花四肢沉重懈怠惡聞食氣喜食鹹酸多卧少起甚則吐逆不自勝持理療之法順氣理血豁痰導水然後安平矣

又論曰妊娠四月六月多苦煩悶按醫經四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣又有不定拘此兩月而苦煩悶者由母將理失宜七情傷感心驚膽怯而然也

論曰懷妊十月形體就成八月合進瘦胎易產之藥今

欽定四庫全書

濟生方
卷七

世多用枳殼散非為不是若胎氣肥實可以服之况枳殼大能瘦胎胎氣本怯豈宜又瘦之也不若進救生散安胎益氣令子緊小無病易產又且多少穩當安胎和氣散

訶子

去核 剉去

白朮

各一兩

陳皮

去白

高良薑

剉炒

木香

不見火

白芍藥

陳米 炒

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去

滓溫服不拘時候忌生冷物

杜仲丸 治妊娠三兩月胎動不安者可預服養胎

杜仲

去皮剉薑汁浸炒去絲

川續斷

酒浸各一兩

右為細末棗肉煮爛杵和為丸如桐子大每服七十

丸空心米飲下日二服

如聖散 治胎動腹痛者何蓋胎動腹痛其理不一或緣飲食冷熱動風毒物或因再交搖動骨節傷犯胞胎其候多嘔氣不調和或服熱藥太過氣血相半急服順氣安胎不然變成漏胎則難安矣

欽定四庫全書

濟生方
卷七

鯉魚皮

當歸 酒去蘆

熟地黃

酒蒸

阿膠

剉蛤粉炒

白芍藥

川芎

川續斷 酒浸

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞半入苧根少許生薑五片

煎至七分去滓空心食前溫服

旋覆半夏湯 治妊娠惡阻心下憤悶吐逆不食惡聞

食氣頭暈四肢百節煩痛多卧少起

旋覆花

去枝

芎藭

細辛 洗去土

人參

甘草

炙半兩

半夏

湯泡七次

赤茯苓

去皮

乾生薑



陳皮去白各一兩 當歸去蘆酒浸一兩	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓	溫服不拘時候	人參半夏丸 治妊娠惡阻病醋心胃中冷腹痛吐逆	不喜飲食	半夏泡七次 人參 乾生薑各半兩	右為細末以生地黃汁浸蒸餅為丸如桐子大每服	四十丸米飲下不拘時候	欽定四庫全書 濟生方 卷七	縮砂散 治妊娠胃虛氣逆嘔吐不食	縮砂仁不拘多少	右為細末每服二錢入生薑自然汁少許沸湯點服	不拘時候	百合散 治妊娠風熱相交欬嗽痰多心胃滿悶	百合蒸 紫菀茸洗 貝母去心 白芍藥 前胡	赤茯苓去皮 桔梗去蘆炒各一兩 甘草炙半兩	右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓
---	-----------------------------	---------------	------------------------------	-------------	--	-----------------------------	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	----------------------------	--	--	-----------------------------

溫服不拘時候	消風散 治證同前	石膏煨 甘菊花去枝梗 防風去蘆 荊芥穗	川羌活去蘆 羚羊角鎔 川芎 大豆黃卷炒	當歸去蘆酒洗 白芷各一兩 甘草炙半兩	右咬咀每服四錢水一盞半入好茶半錢煎至八分	去滓通口服食後良	芎蘇散 治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋者何	欽定四庫全書 濟生方 卷七	蓋因風寒客於皮膚傷於榮衛或洗項背或當風取涼	致令頭目昏痛增寒發熱甚至心胃煩悶大抵產前二	命所係不可輕易妄投湯劑感冒之初止宜進芎蘇散	以發散表邪其病自愈	紫蘇葉 川芎 白芍藥 白朮 麥門冬去心	陳皮去白 乾葛各一兩 甘草炙半兩	右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片蔥白二寸煎	至八分去滓溫服不拘時候
---------------	-----------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	---	--	-----------------------------	--------------------



驅邪散 治妊娠瘧疾蓋榮衛虛弱脾胃不足或感風寒或傷生冷傳成瘧疾急服驅邪散莫待吐逆見物不思卒難醫療

高良薑 劉炒 白朮 草薢仁 橘紅 藿香葉

縮砂仁 白茯苓 去皮各一兩 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至八分去滓溫服不拘時候

冬葵子散 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及

水腫 欽定四庫全書 濟生方 卷七

冬葵子 三錢 赤茯苓 去皮二錢

右為細末每服三錢米飲調服不拘時候利則住服如不通恐是轉胞加髮灰少許神效

麥門冬湯 治子煩 阮霖經驗良方云治妊娠心驚膽怯煩悶

麥門冬 去心 防風 白茯苓 去皮各一兩 人參 半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片入淡竹葉十片煎至八分去滓溫服不拘時候

羚羊角散 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語謇澀痰涎不消或發搐搦不省人事名曰子癇亦宜服之 阮霖經驗良方云心支之女患此正是雪寒之時用此效

羚羊角 鎊 川獨活 去蘆 酸棗仁 炒去殼

五加皮 去木各半錢 薏苡仁 炒 防風 去蘆

當歸 去蘆酒浸 川芎 茯神 杏仁 去皮尖各四分

木香 不見火 甘草 炙各二分半

右咬咀每服四錢水一盞生薑五片煎至七分去滓

溫服不拘時候 欽定四庫全書 濟生方 卷七

產後 論缺

芎歸湯 治大產小產對證加添服餌

芎藭 當歸 去蘆酒浸

右等分咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候腹中刺痛加白芍藥口乾煩渴加烏梅麥門冬發寒熱加乾薑白芍藥水停心下微嘔逆加茯苓生薑虛煩不得眠加人參竹葉大便秘澀加熟



地黃橘紅杏仁小便利加車前子腹脇膨脹加厚
 朴血崩不止加香附子欬嗽痰多加紫菀半夏生薑
 腰痛脚痛加牛膝心下疼痛加延胡索惡血不下腰
 腹重痛加牡丹皮

芎藭補中湯 養新血去瘀血補虛扶危

乾薑 炮 阿膠 剉蛤粉炒 芎藭 五味子 各一兩

黃耆 去蘆蜜水炙 當歸 去蘆酒浸 白朮 赤芍藥 各一兩

木香 不見火 人參 杜仲 去皮剉炒 甘草 炙各半兩

欽定四庫全書 濟生方 卷七

右呖咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓通口服
 不拘時

豬腰子粥 治產後蓐勞發熱

豬腰子一隻去白膜切作柳葉片少鹽酒拌之先用
 粳米一合入蔥椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盤底用
 熱粥蓋之如作蠶生粥狀喫之每日空心作粥極妙
 金液丸 治將產忽見橫倒者蓋不能忌口恣情多食
 五臟氣滯六腑不和胎氣既肥則用力太早胎受驚觸

急用瘦胎金液丸其兒身自順生矣

飛生毛 火燒如腋下毛尤佳半錢 血餘 無病女人髮燒炭

公母羊糞 燒灰各半錢 竈中心土 錢一

黑鉛 三錢用小銚子火上鎔投水銀半錢急攪成砂子傾出細研 硃砂 半錢別研

右為細末用粽子角為丸如菉豆大遇難產急難以
 倒流水吞下五丸兒身自順正產子母活矣

抵勝湯 治胃受水穀脾主運化生血生氣內濡腑臟
 者也因產腑臟暴虛惡露下少敗血乘虛散於脾胃脾

欽定四庫全書 濟生方 卷七

受之而腹脹胃受之則成吐逆亦有惡露過多氣無所
 主聚於脾胃脾受之則為腹脹胃受之則吐逆惡露過
 多者去澤蘭赤芍藥倍加生薑橘皮

赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參 陳皮 各一分

甘草 錢一

右呖咀每服一劑用水一碗生薑焙乾半兩煎至半
 碗去滓分三服

產後中風



論曰產後中風者蓋因產後傷動血氣勞損經絡膝理空疎勞役太早風邪乘間而入始則客於皮膚次則入於筋脉又其次也傳於諸臟隨其諸臟經絡而生病焉或身體緩急或頑痺不仁或口目不正或奄奄忽忽神情昏亂乃中風候宜服小續命湯阮霖經驗良方凡產後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神氣息欲絕暈悶不知人口噤手足痙攣醫者不識呼為暗風誠為謬矣

小續命湯 治婦人產後失血中風冒昧不知痛處拘急不得轉側四肢緩急遺失便利

欽定四庫全書

濟生方卷七

麻黃

去根節煎掠去沫焙

桂

去粗皮

甘草

炙各二兩

人參

白朮

附子炮炙去皮臍

防己

芍藥

黃芩

去黑心各一兩

防風

一兩半

右剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入生薑三

片煎取七分去滓溫服

產後血崩

方缺

論曰產後血崩者蓋因產所下過多血氣暴虛未得平復或因勞役或因驚怒致血暴崩又有榮衛蠹傷氣衰



迪志文化出版有限公司出版

血弱亦變崩中若小腹滿痛此為肝經已壞為難治若小腹脹滿此為內有瘀血未可止之止之非特淋瀝不已小腹轉加脹滿若小腹脹滿且復芤蕪湯及黑龍丹若小腹不滿急是內無瘀血可服固經丸止之惡熱藥者進十灰丸亦得

欽定四庫全書

濟生方卷七



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

濟生方卷八

宋 嚴用和 編

丁瘡

附熱瘡

論曰諸瘡莫急於丁瘡有魚眼丁多發於足非神手不能治也大凡治丁瘡先以披頭針當頭刺之直至患者知痛處纔引針而出血隨之流則以蟾酥追毒丹納針孔中仍以紙撚送下使近痛處其上封以乳香膏四膀腫處敷以烏龍膏或有赤暈敷以解毒散並如前法三

欽定四庫全書

濟生方
卷八

兩日瘡潰拔去仍覆以乳香膏膿盡生肌並如前法

嵇云有絲瘡證乃丁瘡之類醫若不識便無治法害人最速其瘡生手足間有黃泡其中或紫黑色即有一條紅絲迤邐向上而生若至心腹則使昏亂不救其紅絲或有生三兩條者治法以針橫截紅絲所至之處刺之止使血出以膏藥傳之更不復發動即愈矣此證得於喜怒不節血氣逆行而生內翰洪舜俞以惡瘡生齶上久不能治嵇云此名內疳瘡初發如蓮花痔根蒂小而



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

下垂反大治法以勾刀決斷其根燒鐵器令七八赤烙之以止血次以雄黃輕粉粉霜香白芷白斂為散敷其上令病人側卧以槐枝作枕支其牙頰間毋使口合一兩時許瘡癰定令病者自便治日得膿便可漸愈若此證久不治即四邊肉漸成死肌法用槐枝枕支病者牙毋使得合以小鎌去其惡肉令盡即撒生肌散上仍用乳香膏護之自非飲食時且令病者側卧支其牙頰毋使口合則津液不衝動瘡藥三日後肌肉漸生纔可令

欽定四庫全書

濟生方
卷八

病人自便無所礙矣洪內翰云此證緣醫家不識則無治法以至不救良可惜也此證得之作勞氣血虛憊所至治驗

嵇云治魚眼丁之法先以鍼刺之若痛則瘡根已走矣用療漏瘡之法以榆皮隨俞穴所往探之榆所不及之處則針破引榆皮而出再自針穴尋之若鍼破處病人自痛血出則是活肌肉矣即于鍼瘡納蟾酥丹覆以乳香膏再於瘡鍼孔中納蟾酥丹三二粒仍覆以乳香

二黃散 治丁腫

雄黃 雌黃 各等分

右為末先用鍼刺四圍及中心醋和塗之

蟾酥丹

蟾酥 一枚

右為末以白麵和黃丹丸如麥顆狀鍼破患處以一

粒內之神妙

灸法 治丁腫灸掌後橫紋五指男左女右七壯即瘥

欽定四庫全書

濟生方
卷八

已用得效丁腫灸法雖多然此一法甚驗出於意表也
考嵇治法金大定間有遇異人傳狗寶丹丸得之者以
獻偽主其後嵇事偽朝以外科奉御療將士金瘡有功
金主以金帛賜焉嵇治瘡凡癰疽丁漏惡瘡皆先以狗
寶丸為第一義先投狗寶丸半時次投熱葱粥以助之
厚被蓋覆病者使汗出周浹則毒勢隨汗而解若汗不
出則不可療矣汗罷則瘡之陷者必起散者必聚次以
烏龍膏傳其腫若腫之外有赤暈者則以解毒散傳之



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

凡傳藥必先自外向裏塗之看正瘡大小凡正瘡之上
並不許加分毫藥每日隨證服五香連翹湯十奇散菴
豆粉等藥大率以狗寶丸為先以烏龍膏解毒散次之
而服餌之藥則隨脉氣陰陽虛實而用之空心必服加
減八味丸以助元氣俟瘡潰以針決去敗膿訖然後以
乳香膏傳正瘡之上若尚有未盡膿則於膏藥當中直
翦一路以通膿水膿欲盡以生肌散敷瘡口仍以乳香
膏覆之更不須翦破膏藥乳香膏一日一換俟瘡口欲
合即便不加膏藥矣烏龍膏之功在於消腫解毒散之
功在於收暈即不用解毒散而烏龍膏直俟瘡潰敗膿
出盡然後已此其大畧也癰疽之證甚惡多陷下透骨
者服狗寶丸瘡四邊必起依前法用烏龍膏解毒散訖
須用針刀開瘡孔其內已潰爛不復知痛乃納追毒丹
於孔中以速其潰既潰後割去死肌洗以豬蹄湯敷以
生肌散覆以乳香膏又傳之善角散以醋熬為糊貼之
惡肉退去好肉漸生即用搜膿散翠霞散之類祗之若

欽定四庫全書

濟生方
卷八

瘡中毒氣未盡慎勿早斂忌早上生肌之藥縱復平復									
必再發其間調理次第臨時制宜將護須慎之									
狗寶丸 專治癰疽發背附骨疽諸般惡瘡									
狗寶	一兩生用癰腹中得之	蟾酥	二錢	乳香	別研	沒藥	別研		
雄黃	硃砂	輕粉	麝香	鉛白霜					
粉霜	別研各錢	金頭蜈蚣	七箇頭尾脚足炙黃色研如泥						
烏金石	即石灰袁州萍鄉縣有之二錢重								
鯉魚膽	七箇乾者用之去皮臘月者尤佳								
欽定四庫全書 濟生方 卷八									
狗膽	一箇乾者用之去皮黑狗者臘月者好	頭胎孩兒乳	一合						
黃蠟	三錢								
右先將頭胎兒乳黃蠟放在銚內文武火化開用前藥末和成劑放在甕器內要用旋丸如麻子大兩丸如病大三丸用白丁香七箇直者為妙以新汲水化開送下狗寶丸腰以下病食前服腰以上病食後服如人行三里用熱葱白粥投之即以衣被蓋定汗出為度已後只喫瓜瓞白粥常服十奇散留頭四邊以									

烏龍膏貼之	
追毒丹 治疽瘡黑陷者先用狗寶丸治次以烏龍膏收腫散毒去赤暈乃用針刀開瘡納追毒丹使之潰然後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之	
巴豆	七粒 去皮心 不去油 研如泥
白丁香	一錢
雄黃	
黃丹	各二錢
輕粉	一錢
加蟾酥尤神速	
右件研和加白麵三錢滴水為丸如麥狀針破瘡納之上覆以乳香追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去不可治亦以此法追毒去死肌乃養肉斯愈矣疾小者用一粒大者加粒數用之	
解毒散 去熱腫取赤暈	
寒水石	二兩
龍骨	半兩
黃連	去鬚
黃蘗	各一兩
輕粉	一錢
右為細末和雞子清調以雞羽掃瘡上若是熱瘡加黃丹半兩	
烏龍膏 治一切腫毒癰疽收赤暈	



木鱉子

去殼

半夏

各一兩

小粉

四兩

草烏

半兩

右於鐵銚內慢火炒令焦為細末出火毒再碾細以冷水調敷一日一換

紅膏藥 治軟癰及惡瘡風濕所搏渾身疼痛

瀝青

白膠香

各二錢

黃蠟

右於銚內煎化量用麻油三錢許煎濾於水盆中揉成劑收之每用於水內捻作餅子隨瘡大小貼之上傳以紙此藥加當歸一兩於內煎令黃色濾去滓於

欽定四庫全書



濟生方
卷八

水盆內取出藥揉成劑再加乳香末二錢和為乳香膏尤佳其加青黛者即名清金膏其加黃丹者即名紫金膏皆貨藥者誑人之術其功用一而已矣

生肌散

寒水石

二錢

黃丹

半錢

龍骨

七錢

輕粉

一錢

右為細末乾傳上貼以乳香膏

竹茹膏 治黃泡熱瘡

真麻油

二兩

青木香

二兩

青竹茹

一小團

杏仁

二七粒去皮尖

右藥入麻油內慢火煎令杏仁黃色去滓入松脂研半兩熬成膏每用少許擦瘡上

治頭瘡及諸熱瘡

先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裏乾後用百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

肺癰

欽定四庫全書



濟生方
卷八

論曰夫肺癰者由風寒之氣內舍於肺其氣結聚所成也蓋肺為五藏之華蓋其位象天候於皮毛氣之所主將理失宜勞傷氣血風寒得以乘之蓋寒則生熱風極亦生熱壅積不散遂成肺癰矣肺癰之狀寸口脉數而實欬而胃內滿隱隱痛兩胛腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭久久吐膿狀如粳米粥者難治有膿而嘔者不可治嘔膿而止者自愈凡病肺癰脉來短澀者順浮大者死其色當白而多赤者亦死

桔梗湯 治肺癰心胃氣壅欬嗽膿血心神煩悶咽乾



多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澀

桔梗去蘆 貝母去心 當歸去蘆酒浸 菰蘇子

枳殼去瓢炒 薏苡仁炒 桑白皮蜜炙

防己各一兩 甘草節生用 杏仁去皮尖炒

百合蒸各半兩 黃耆去蘆一兩半

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓溫服不拘時候若大便秘者加大黃小便秘者加

木通

欽定四庫全書 濟生方 卷八

痔

論曰痔凡有五即牡痔牝痔腸痔脉痔血痔是也素問云困而飽食筋脉橫解腸澀為痔多由飲食不節醉飽無時恣食肥膩久坐濕地情慾耽著久忍大便遂使陰陽不和關格壅塞風熱下衝乃成五痔肛門生妒或左或右或內或外或狀如鼠竅或形似櫻桃或膿或血或痒或痛或軟或硬或聾或腫久而不治則成漏矣治之之法切不可妄用毒藥亦不可輕易割取多致淹滯惟

用穩重湯劑徐徐取效不可不知

黃耆丸 治五痔出血疼痛

槿藤子煨用肉半兩 川續斷酒浸 黃耆去蘆 貫衆

附子炮去皮臍 黃礬別研 刺蝟皮燒灰 當歸去蘆酒浸

阿膠蛤粉炒各一兩 麝香別研一字

右為細末米糊為丸如桐子大每服七十丸空心米

飲下氣壯多熱之人不宜服此

斷紅丸 治陽虛臟腑久而腸風痔疾下血不止或所

欽定四庫全書 濟生方 卷八

下太多面色萎黃日漸羸瘦

側柏葉微炒 川續斷酒浸 鹿茸燎去毛

附子炮去皮臍 黃耆去蘆 阿膠剉蛤粉炒

當歸去蘆酒浸各一兩 白礬枯半兩

右為細末醋煮米糊為丸如桐子大每服七十丸空

心食前米飲下

蝸牛膏 敷痔有效

蝸牛一枚 麝香三分



右用小砂合子盛蝸牛以麝香糝之次早取汁塗痔處		枯礬散 治五痔痒多痛少或膿或脹或漏血不止		白礬 枯半錢 腦子 一字別研		右為末先用魚腥草煎湯放溫洗痔次用藥少許糝患處		蝟皮丸 治五種痔漏		豬左足懸蹄 燒灰存性 蝟皮 一枚燒灰存性		黃牛角腮 燒灰存性 貫衆 槐角子 炒 雷丸		雞冠花 槐花 炒 油髮灰 黃耆 去蘆		香白芷 當歸 去蘆酒浸 枳殼 去瓢生用 玄參		黃連 去鬚蘆 防風 去蘆 鼈甲 醋煮各半兩 麝香 別研半錢		右為細末米糊為丸如桐子大每服七十丸加至一百丸空心米飲下年高虛弱寒濕痔疾不宜服之		瘻		嵇云澄江治一婦人漏瘡此婦人先於小腹下成一漏	
-----------------------	--	----------------------	--	--	--	------------------------	--	-----------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	-----------------------	--

瘡久又於背脊腰下成一瘡嵇以榆枝自背探之乃直達於腹前之漏瘡乃兩用追毒丹乳香膏烏龍膏而愈		嵇云癰之根脚淺而濶儻治之遲則有潰爛肌肉之患		若久而不合則多為漏瘡治癰已具於前		嵇云漏瘡當探其深淺渠在北地時有一人害漏瘡於脇間嵇以榆皮細枝刮去皮取線以綿裹其尖以線牢繫之以榆皮探瘡中之穴乃自脇而達於腰在皮膚之間遂於病者腰間以針決破用追毒丹三粒納於瘡中		三日即潰而脇間之漏遂止其膿悉自腰間針孔中出		膿盡生肌散愈其服狗寶丸數烏龍膏乳香膏生肌散並如前法		疥		論曰夫疥瘡之為病雖若不害人然亦至難忍矣素問云諸痛痒瘡皆屬於心多由心氣鬱滯或飲食不節毒蘊於腸胃發見於皮膚古方有所謂馬疥水疥乾疥濕疥種類不一生於手足乃至遍體或痛或癢或腫或皮	
--	--	-----------------------	--	------------------	--	--	--	-----------------------	--	---------------------------	--	---	--	--	--



肉隱嶙或抓之凸起或瘡癰或膿水浸淫治之內則當理心血祛散風熱外則加以敷洗理無不愈

當歸引子 治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡

疥或腫或痒或膿水浸淫或發赤疹瘡癰

當歸去蘆 白芍藥 川芎各一兩 生地黄洗

白蒺藜炒去尖 防風去蘆 荊芥穗各一兩

何首烏 黃耆去蘆 甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

欽定四庫全書 濟生方 卷八

溫服不拘時候

神異膏 治一切瘡疥

全蝎七箇去毒 皂角一錢剉碎 巴豆七箇去殼 蛇床末三錢

麻油一兩 黃蠟半兩 輕粉半字 雄黃別研三錢

右先用皂角全蝎巴豆煎油變色去了三味入黃蠟

化開取出冷處入雄黃蛇床末輕粉和勻成膏先用

苦參湯溫洗以藥擦瘡疥上

苦參湯

苦參 蛇床子 白礬 荊芥穗各等分

右四味煎湯放溫洗

癬

論曰夫癬之為病種狀不同古方有所謂乾癬風癬苔癬之類癰疹如錢漸漸滋蔓或痒或痛或圓或斜其中生蟲搔之有汁此有風濕毒氣與血相搏凝滯而為此疾也

胡粉散 治一切癬神效

欽定四庫全書 濟生方 卷八

胡粉一分 砒半分 硫黃別研一分 班貓一枚 麝香少許

蝎稍七枚 雄黃別研一分 大草烏生用一箇

右為細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

處

癰瘤

論曰夫癰瘤者多由喜怒不節憂思過度而成斯疾焉大抵人之氣血循環一身常欲無滯留之患調攝失宜氣凝血滯為癰為瘤癰者多結於頸項之間瘤者隨氣



凝結於皮肉之中忽然腫起狀如梅李子久則滋長醫經所謂癰有五種瘤有六證五癰者石癰肉癰筋癰血癰氣癰是也六瘤者骨瘤脂瘤膿瘤血瘤石瘤肉瘤是也治療之法五癰不可決破破則膿血崩潰多致夭枉六瘤者脂瘤可破去脂粉則愈外五證亦不可輕易決潰慎之慎之

破結散 治石癰氣癰筋癰血癰肉癰等證

海藻 洗 龍膽 海蛤 通草 昆布 洗

欽定四庫全書

濟生方卷八

礬石 枯 松蘿 各三分 麥麴 四分 半夏 二分湯泡七次

貝母 去心二分

右為細末酒服方寸匕日三忌甘草鯽魚豬肉五辛

菜諸雜等物

昆布丸 治一切癰瘤不問久新

昆布 洗 海藻 洗 小麥 各一兩好醋煮乾

右為細末煉蜜為丸如杏核大每服一丸食後噙嚥

療癰

論曰夫癰癰之病即九漏是也古方所載名狀不一難以詳述及其生也多結於項腋之間累累大小無定發作寒熱膿水潰漏肺主蚘蟬漏心主蟻螬漏膽主浮蛆漏腎主癰癰漏小腸主轉脉漏原其所自多因寒暑不調飲食乖節遂致血氣壅結而成

皂子丸 治癰癰滿項不破及結核腫痛者

好皂角子 升一 玄參 連翹仁 各一兩

右用水五升砂鍋內慢火煎水盡為度每服揀取好

欽定四庫全書

濟生方卷八

皂角子軟者三粒食後臨卧時細嚼津下硬者搗爛

蜜和如榛子大含化半月必差忌酒麪熱毒物

三聖丸 治癰癰

丁香 五十箇 斑貓 十箇 麝香 一錢別研

右為細末用鹽豉五十粒湯浸研如泥和前藥令勻

丸如菉豆大每服五七丸食前溫酒下日三服如至

五七日外覺小便淋瀝是藥之效便加服或便下如

青筋膜之狀是病之根也忌濕麪魚肉一切動風物



連翹丸 治療癰結核破或未破者

薄荷

新者二觔
裂取汁

好皂角

一挺水浸去皮裂取汁
已上二味同於銀石器

內熬
成膏

青皮

一兩

連翹

半兩

陳皮

一兩
去白

皂角子

慢火炮去皮取皂子
仁搗羅為末一兩半

黑牽牛

一兩半
生半炒

右五味為末用前膏子為丸如桐子大每服三十丸

煎連翹湯下食後十日見效

金瘡

奪命散 治金瘡打損及從高墜下木石所壓內損瘀

欽定四庫全書



濟生方
卷八

血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死

紅蛭

用石灰慢火炒
令焦黃色半兩

大黃

二兩

黑牽牛

二兩

右各為細末每服三錢用熱酒調下如人行四五里
再用熱酒調牽牛末二錢催之須臾轉下惡血成
塊或成片惡血盡即愈

