

文淵閣
四庫全書 電子版



子部

產寶諸方



迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：產寶諸方》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：<http://www.dheritage.com>
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted
by any means, electronic, mechanical, photocopying,
recording, or otherwise, without written permission
from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand版本，請瀏
覽迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

子部五

提要

產寶諸方一卷

醫家類

欽定四庫全書

產寶諸方

臣等謹案產寶諸方一卷不著撰人名氏宋史藝文志不載惟陳振孫書錄解題有之自明以來諸家書目亦罕有著錄者今檢永樂大典所載尚得七十餘方又十二月產圖一

篇與振孫所記並合蓋即宋時之原本又別

有序論一首王卿月序一首皆殘缺當亦原書之佚簡也其方於保產之法頗為賅備而原第為永樂大典所亂已不可復考謹詳加釐訂以類分排首調經養血次安胎次胎中諸病次催生次產後次雜病仍為一卷其中所引各方多為後人所承用如人參飲子一方與朱震亨所製達生散雖品味多寡不同而以大腹皮為君人參為輔命意無異知震

亨實本此而增損之又如張元素以枳殼白

术為束胎丸後人以為不宜於藜藿之軀易

以白术黃芩相沿至今為便產良藥而不知

亦本是書所載之枳殼湯又今世治產後血風有所謂舉卿古拜者核其所用惟荆芥一味即此書之青金散蓋荆芥主治風寒問東方主風而肝屬於木平肝木即所以助肺金故以青金為名後人竊用其方而又翻切荆

欽定四庫全書

產寶諸方

芥字音詭名以炫俗耳凡此類皆可以證古今傳授之由惟所用多降氣破血之品辛熱震動之劑則古人稟厚可受攻伐有未可槩施於後來者此則神而明之存乎其人矣乾

隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

原序

按產後禁忌調護之法載諸古方固非一條要以作勞為大戒蓋百日之內篇脉未續血氣未充凡遷徙次舍換易麻榻乘虛起行理髮盥面小則貽終身之疾大則有不測之禍故遠者百日近者一月皆須極加調護毋大喜怒毋縱笑語毋極思慮務令安靜以養血氣正新

種之木根土未附一經動搖不復發生必不得已而遷徙動作猶須旬日之外為庶幾焉世因有深山窮谷及

欽定四庫全書

▲ 產寶諸方
原序

田野之人飲食藥餌不繼甚至汲水浣兒躬自襁褓此皆平日異稟少欲而善飯故雖氣血少耗而根本自強然不可為常也王卿月序

大率治病先論其所主男子調其氣女人調其血氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血為基本氣血宣行其神自清所謂血室不蓄則氣和血凝結則水火相刑月水如期謂之月信血凝成孕此乃調燮之常其血不來則因風熱傷於經血故血不通或外感風寒內受邪

熱脾胃虛弱不能飲食食既不充榮衛抑遏肌膚黃燥面無光澤時發寒熱腹脹作痛難於子息子藏冷熱久而勞損必挾帶下便多淋瀝忽致崩漏經云腹中如塊忽聚忽散其病乃癥血涸不流而搏腹脹時作寒熱此乃成瘕或先後爽期雖通而或多或少或寡究病之源蓋本於此

欽定四庫全書

▲ 產寶諸方
原序



文淵閣四庫全書電子版

欽定四庫全書

產寶諸方

產圖

三月壬位安產吉 丙位藏衣吉

四月庚位安產吉 甲位藏衣吉

五月丙位安產吉 丙位藏衣吉 乾天德藏衣吉

六月甲位安產吉 庚位藏衣吉

七月壬位安產吉 丙位藏衣吉

欽定四庫全書

產寶諸方

八月庚位安產吉 甲位藏衣吉 艮天德藏衣吉

九月丙位安產吉 壬位藏衣吉

十月甲位安產吉 庚位藏衣吉

十一月壬位安產吉 丙位藏衣吉 巽天德藏衣吉

十二月庚位安產吉 甲位藏衣吉

溫經湯 治女人曾經小產成帶三十六病腹脹唇口

乾日晚發熱小腹急痛手足煩熱大腸不調時泄利

經脈不勻火不懷妊方

文淵閣四庫全書電子版

吳茱萸

培沸湯洗三
乾秤三兩

當歸

大芎

人參

白芍藥

各二

麥門冬

三兩半去
心培乾

桂

研末去皮別

阿膠

色炒白

牡丹皮

去心一兩

甘草

炙各一兩半夏

右為粗末每服二錢水一盞薑五片煎至七分去
滓空心溫服忌生冷滑物

八珍散 治脾弱血虛心忪多困盜汗無力進食養氣
益衛產前後可服

欽定四庫全書

產寶諸方

白术

人參 蓮肉去皮
心各二

甘草

炙各一兩

白茯

苓

烏藥

白匾豆去皮
心各二

熟地黃

一兩半

右為細末每服二大錢水一盞薑三片大棗一箇
煎至七分空心服加黃耆八錢尤妙

油錢散 治婦人血風

五加皮

牡丹皮

芍藥各半

當歸

羌活

右為末每服一錢水一盞銅錢一文蘸油入銚內



煎七分溫服

千金散 治婦人赤白帶下

百草霜 一兩 龍骨 一錢 白石脂 二錢

右為末空心溫酒調二錢

振振丸 治婦人經虛蓄冷積聚成瘕成塊月候不調時作諸疾因而凝滯半產不實以至絕產

生地黃汁 <small>一升</small>	生艾汁 <small>一升</small>	牛膝末
<small>半兩酒浸</small>	<small>半兩同熬成膏</small>	
當歸末 <small>一兩</small>	乾漆 <small>炒烟盡取</small>	
	<small>半兩</small>	

生地黃汁 <small>一升</small>	生艾汁 <small>一升</small>	牛膝末
<small>半兩酒浸</small>	<small>半兩同熬成膏</small>	
當歸末 <small>一兩</small>	乾漆 <small>炒烟盡取</small>	
	<small>半兩</small>	

右三味末取一半入膏內再熬令稠入餘末和搏丸如桐子大三十粒麝香溫酒下食前日三服半月效

勝灸丹 子宮虛冷累細經半生瘀血內治

艾葉 <small>二兩</small>	吳茱萸 <small>二兩</small>	蒼朮 <small>二兩</small>	陳皮 <small>二兩</small>
	<small>揀淨</small>	<small>剉</small>	

右用醋三斤同浸一伏時鍋中慢火煮候爛即入白杵令勻如未爛時添醋以爛為度丸如桐子大空心溫酒或飲下三十粒晚再服

羊肉地黃湯 補中益氣

生地黃 三合 桂心 當歸 甘草 炙 芩

人參

右㕮咀每服三錢用羊肉汁一盞煎至六分去滓溫服空心

治中丸 治脾胃寒濕飲食不消酸心嘔逆泄利腸腹痛

白术 人參 白茯苓 神麴 炒 麥蘖 肉桂 乾薑 炮

半夏 <small>湯洗七次切</small>	陳皮 <small>各六兩</small>	白茯苓 <small>各六兩</small>
		前胡
枳殼 <small>麸炒赤去瓢</small>	甘草 <small>炙三兩</small>	

右等分為末蜜丸梧桐子大三十九空心米湯下前胡散 治脾虛心下有結氣不能服溫藥者宜服此

增損四物湯 治損血傷氣四肢無力腿腳疼痛血不	右為龜末每服二錢水一盞煎至六分去滓熱服
	日二三不以時此藥有氣疾即可服

潮心自汗膈滿

川芎二兩 川當歸二兩 茜藥一兩 熟地黃一兩
人參一兩 麥門冬一兩去心 枳殼半兩炒去瓢 甘草

分一

右為龕末每服三錢薑二片水一盞煎八分去滓

空心服

牡丹圓 婦人常服養血氣

當歸 生地黃 川芎 牡丹皮各半兩 紫蘇

欽定四庫全書

產寶諸方

子 薏苡仁 荆芥穗各一兩

右為末麪糊丸如梧桐子大食後米飲下二十九

芎桂散 治婦人月脉惡露不止

生地黃四兩切竹刀 生薑四兩 川芎 肉桂 茜

藥各半兩

右為末每服一錢溫酒調下日進三服

二槲散 治血崩

槲葉半燒存生半性

右為末溫酒調二錢

柏葉散 治血崩不止

柏葉不以多少瓦上燙乾

右為末米飲調三錢

七星散 安胎

生苧根二合切片 糯米一合 阿膠五片 人參一分

紫蘇葉二十片 薑錢一合 栗子一枚

右七味用水二大椀煎至一碗分兩三服尋常合

半料用水一碗煎至一盞去滓服之

人參飲子 安胎寬氣止腹痛

大腹連皮碎剉各半兩 人參各半兩 甘草炙半兩 陳橘

皮和瓢兩箇

右為粗末每服三大錢水一盞銀石器內煎至八

分溫服不計時

人參散 治姪娠心氣不足調正脾胃進食補胎流利

關膈

欽定四庫全書 產寶諸方	右等分為末恐性涼減甘草一半每服二錢水一盞薑二片棗子一箇同煎七分通口服不以時安胎入膠艾煎嗽用五味子如腹痛下痢入乾薑白痢常服入薑棗必應散安胎養氣和血辟邪冷免難產此方似勝枳殼瓢麩炒甘草二兩阿膠二兩黃耆川芎半兩不	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草散安胎清膈進食	右為細末每服一錢麥門冬熟水調下日午夜卧服	甘芎散安胎清膈進食	右為末每服二錢水一盞煎七分去滓空心臨卧溫服	百順散安胎和氣尤理傷寒	阿膠碎炒焦當歸剉碎炒芎藶散	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛
欽定四庫全書 產寶諸方	右等分為末恐性涼減甘草一半每服二錢水一盞薑二片棗子一箇同煎七分通口服不以時安胎入膠艾煎嗽用五味子如腹痛下痢入乾薑白痢常服入薑棗必應散安胎養氣和血辟邪冷免難產此方似勝枳殼瓢麩炒甘草二兩阿膠二兩黃耆川芎半兩不	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草散安胎清膈進食	右為細末每服一錢麥門冬熟水調下日午夜卧服	甘芎散安胎清膈進食	右為末每服二錢水一盞煎七分去滓空心臨卧溫服	百順散安胎和氣尤理傷寒	阿膠碎炒焦當歸剉碎炒芎藶散	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛
欽定四庫全書 產寶諸方	右等分為末恐性涼減甘草一半每服二錢水一盞薑二片棗子一箇同煎七分通口服不以時安胎入膠艾煎嗽用五味子如腹痛下痢入乾薑白痢常服入薑棗必應散安胎養氣和血辟邪冷免難產此方似勝枳殼瓢麩炒甘草二兩阿膠二兩黃耆川芎半兩不	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草散安胎清膈進食	右為細末每服一錢麥門冬熟水調下日午夜卧服	甘芎散安胎清膈進食	右為末每服二錢水一盞煎七分去滓空心臨卧溫服	百順散安胎和氣尤理傷寒	阿膠碎炒焦當歸剉碎炒芎藶散	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛
欽定四庫全書 產寶諸方	右等分為末恐性涼減甘草一半每服二錢水一盞薑二片棗子一箇同煎七分通口服不以時安胎入膠艾煎嗽用五味子如腹痛下痢入乾薑白痢常服入薑棗必應散安胎養氣和血辟邪冷免難產此方似勝枳殼瓢麩炒甘草二兩阿膠二兩黃耆川芎半兩不	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草散安胎清膈進食	右為細末每服一錢麥門冬熟水調下日午夜卧服	甘芎散安胎清膈進食	右為末每服二錢水一盞煎七分去滓空心臨卧溫服	百順散安胎和氣尤理傷寒	阿膠碎炒焦當歸剉碎炒芎藶散	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛
欽定四庫全書 產寶諸方	右等分為末恐性涼減甘草一半每服二錢水一盞薑二片棗子一箇同煎七分通口服不以時安胎入膠艾煎嗽用五味子如腹痛下痢入乾薑白痢常服入薑棗必應散安胎養氣和血辟邪冷免難產此方似勝枳殼瓢麩炒甘草二兩阿膠二兩黃耆川芎半兩不	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草炙白芍藥白朮焙川芎阿膠糯去米炒却	甘草散安胎清膈進食	右為細末每服一錢麥門冬熟水調下日午夜卧服	甘芎散安胎清膈進食	右為末每服二錢水一盞煎七分去滓空心臨卧溫服	百順散安胎和氣尤理傷寒	阿膠碎炒焦當歸剉碎炒芎藶散	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛

欽定四庫全書 產寶諸方	右等分末一大錢空心茶點服有孕五箇月外日進三服能除產後諸病	木賊草節川芎剉	右等分末一錢水一盞入金銀同煎六分去滓空	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛
欽定四庫全書 產寶諸方	右等分末一大錢空心茶點服有孕五箇月外日進三服能除產後諸病	木賊草節川芎剉	右等分末一錢水一盞入金銀同煎六分去滓空	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛
欽定四庫全書 產寶諸方	右等分末一大錢空心茶點服有孕五箇月外日進三服能除產後諸病	木賊草節川芎剉	右等分末一錢水一盞入金銀同煎六分去滓空	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛
欽定四庫全書 產寶諸方	右等分末一大錢空心茶點服有孕五箇月外日進三服能除產後諸病	木賊草節川芎剉	右等分末一錢水一盞入金銀同煎六分去滓空	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛
欽定四庫全書 產寶諸方	右等分末一大錢空心茶點服有孕五箇月外日進三服能除產後諸病	木賊草節川芎剉	右等分末一錢水一盞入金銀同煎六分去滓空	芎藶散孕婦七八箇月胎不安治妊娠胎動不安腹痛

心服日二三服	右等分為末羊脰炭燒紅浸酒調下二錢	附子 <small>一箇</small>	地黃	櫻櫚灰	木香	肉桂	保安散	治婦人姪娠不調血海火病帶下諸虛
藕汁	治婦人姪忽然牙關緊							
竹茹湯	妊娠瘧疾涼胎退寒熱							
取生藕汁半盞灌之								
陳皮 <small>一兩</small>	不	竹茹 <small>兩</small>	半	陳皮 <small>一兩</small>	去白	不	竹茹 <small>兩</small>	半
欽定四庫全書 產寶諸方		欽定四庫全書 產寶諸方		欽定四庫全書 產寶諸方		欽定四庫全書 產寶諸方		欽定四庫全書 產寶諸方
右為龜末分四服每服水一盞半煎八分去滓不	計時	右為龜末分四服薑三片棗一枚水一盞煎七分	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不	右為龜末以水六升煮取三升去滓分溫三服小		右為龜末以水六升煮取二升分溫三服小便利	右為龜末以水六升煮取二升分溫三服小便利	右為龜末以水六升煮取三升去滓分溫三服小
療姪娠遍身洪腫		茯苓 <small>四兩</small>	杏仁 <small>一兩</small>	白术 <small>一兩</small>	桑白皮 <small>兩</small>	郁李仁 <small>八分</small>	白术 <small>二十</small> 分	桑白皮 <small>二兩</small>
保命集名 葶藶散		柏榔 <small>各三兩</small>	旋覆花 <small>各五兩</small>	澤瀉 <small>各三兩</small>	茯苓 <small>各六兩</small>	葶藶子 <small>十分</small>	白术 <small>二十</small> 分	桑白皮 <small>二兩</small>
仁各一	郁李	茯苓 <small>四兩</small>	杏仁 <small>一兩</small>	澤瀉 <small>各三兩</small>	茯苓 <small>各六兩</small>	郁李仁 <small>八分</small>	白术 <small>二十</small> 分	桑白皮 <small>二兩</small>
又方	即差	又方	即差	又方	即差	又方	即差	又方
白术 <small>一兩</small>	黃芩 <small>半兩</small>	白术 <small>一兩</small>	黃芩 <small>半兩</small>	白术 <small>一兩</small>	黃芩 <small>半兩</small>	白术 <small>一兩</small>	黃芩 <small>半兩</small>	白术 <small>一兩</small>
右龜末分四服薑三片棗一枚水一盞煎七分	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不	右為龜末分四服薑三片棗一枚水一盞煎七分	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不
療姪娠身腫有水氣心腹脹滿小便少	按此方不另	宜即服之	神仙紫金丸	治十種水氣逐陰固陽扶危正命妙不	可言凡足膝腫上氣喘滿小便不利便是水氣證候	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即
茯苓 <small>四兩</small>	杏仁 <small>一兩</small>		生地黃 <small>大而圓者三兩</small>	治十種水氣逐陰固陽扶危正命妙不	可言凡足膝腫上氣喘滿小便不利便是水氣證候	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即
仁各一	郁李		生地黃 <small>大而圓者三兩</small>	治十種水氣逐陰固陽扶危正命妙不	可言凡足膝腫上氣喘滿小便不利便是水氣證候	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即



右為龜末以水六升煮取三升去滓分溫三服小便利即差								
療姪娠遍身洪腫	保命集名 葶藶散	白术 <small>二十</small> 分						
郁李仁 <small>八分</small>	郁李仁 <small>八分</small>	桑白皮 <small>兩</small>						
葶藶子 <small>十分</small>	葶藶子 <small>十分</small>	茯苓 <small>二兩</small>						
白术 <small>二十</small> 分								
又方								
生地黃 <small>大而圓者三兩</small>								
研如粉 <small>內候冷取</small>								
針砂 <small>真者五兩</small>								
子細揀擇水淘淨控乾入生								
又方								
神仙紫金丸	治十種水氣逐陰固陽扶危正命妙不	可言凡足膝腫上氣喘滿小便不利便是水氣證候	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即
治十種水氣逐陰固陽扶危正命妙不	可言凡足膝腫上氣喘滿小便不利便是水氣證候	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即						
又方								
白术 <small>一兩</small>	黃芩 <small>半兩</small>	白术 <small>一兩</small>						
右為龜末分四服薑三片棗一枚水一盞煎七分	右為龜末分四服水一盞半煎八分去滓不							
疗姪娠身腫有水氣心腹脹滿小便少	按此方不另	宜即服之	神仙紫金丸	治十種水氣逐陰固陽扶危正命妙不	可言凡足膝腫上氣喘滿小便不利便是水氣證候	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即
茯苓 <small>四兩</small>	杏仁 <small>一兩</small>		生地黃 <small>大而圓者三兩</small>	治十種水氣逐陰固陽扶危正命妙不	可言凡足膝腫上氣喘滿小便不利便是水氣證候	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即
仁各一	郁李		生地黃 <small>大而圓者三兩</small>	治十種水氣逐陰固陽扶危正命妙不	可言凡足膝腫上氣喘滿小便不利便是水氣證候	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即	右細切以水六升煮取二升分溫二服小便利即



鐵銚子同禹餘糧三兩一處用釀醋二升煮醋乾并銚子同禹餘糧三兩一處用釀醋二升煮醋	羌活	木香炒	白茯苓去皮	牛膝去苗
如粉宿焙乾酒浸一宿焙乾酒浸一	川芎	肉豆蔻炮	船上茴香炮	蓬
義木炒京三稜炒	白术	桂去皮	乾薑炮	青皮去白
炒陳皮去白	桂皮	桂皮	乾薑炮	青皮去白
當歸以上各半兩	白蒺藜	附子炮	附子炮	蓬

右虛人壯人全用諸藥壯人減半入前三藥內為

細末拌勻湯浸蒸餅為丸杵千下丸如梧桐子

大空心食前溫酒或白湯下三十粒忌鹽數月

若不忌鹽服此無功病自小便去後每日一服
別以溫和調補脾丸血氣藥將理此神方也

人參枳殼散 潘適道治妊娠脅膈氣煩悶時或腹痛

人參一枳殼一兩半去半兩 糯米二合 炒
炙 乾薑一分

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓服如腹

痛加吳萸滴醋炒為末每服入半字許同煎

又方	人參半	枳殼去皮麸炒	赤茯苓半	桔梗
	半兩	大檳榔半兩	甘草半兩	大黃一分
	府熱秘即用如無此証候即不須用			蒸如覺藏

右為末每服二錢水一盞薑三片紫蘇七葉棗一

箇同煎至七分去滓不拘時

四物湯 治妊娠至產前脹痛不可忍及治月事或多或少或前或後腹疼痛等疾

欽定四庫全書	人參半	枳殼去皮麸炒	赤茯苓半	桔梗
產寶諸方	半兩	大檳榔半兩	甘草半兩	大黃一分
				蒸如覺藏

當歸切 川芎 熟地黃 白芍藥

右等分為麩末每服四錢水一盞半煎至八九分取六分極清汁帶熱服日二三以知為度若妊娠下血入艾五七葉阿膠末一錢同煎如上法以知為度疾勢甚大散藥不支以四味各半兩細剉以水四盞煎至二盞半去滓分四服熱服食前服之一日中令盡產後兒枕未消只入生薑五片煎七分經脈不調溫調二錢

枳殼湯 治五月已後宜服不惟易產兼亦消痰下氣

利脣中諸疾仍無危難此乃滑胎散恐五月便服太
驗良方云常服養胎益氣安

和子藏治胎中一切惡疾

枳殼 去瓢秤炒

甘草 炙二兩

右為末每服一大錢七沸湯點空腹服日一服入

月日三服忌登高廁等處昔湖陽公主以難產
服之但覺此兒初生微黑百日後復白

黑散 **催生順道如神** 濟世方又名神應散

欽定四庫全書

產寶諸方

百草霜 **香白芷** 末為

右等分研勻每服二錢童子小便一盞醋一茶脚

以調勻更入五分蓋沸湯浸令服良久便正生

未知再作不待再服以防萬一甚者再服之妙

催生丹 治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並宜
服之

服之

十二月兔腦 去皮膜研細別

乳香 研細別

母丁香

末 一錢研極細別

麝香

研極細別

右拌勻以兔腦和丸如雞頭瓢大陰地用油紙密
封每一丸溫水下即時產男左女右手握藥出
為驗

催生藥 **極驗黃龍散** 累試有效

地龍 錢子者洗去土新瓦上焙令微黃

陳皮 **蒲黃** 隔紙炒

右等分各自為末各自貼著如經日不產各抄一

錢新井水調下便產若兩三日艱難者只一服

即分娩子母全安

欽定四庫全書

產寶諸方

保生散 **令子母氣順臨產每日一服纔覺痛速進三**

服減十分辛苦

神麵 炒

大麥蘖 炒

陳皮 去瓢

人參 **訶子**

核 煨去

白朮

右六味等分每服二錢空心用水一盞煎至七分
熱服

催生槐頭散

產乳 一兩月前預服

槐頭 炒令香熟

當歸 焙酒浸

貝母 炒

京芎 生



右等分為細末每日空心溫酒調下二錢產後服

逐敗血炒生薑豆淋酒下

催生草豆膏 難產救不可者方用

萆麻去皮四粒 巴豆去皮二粒

右爛研貼臍中纔產了便去之以蛤粉撲臍中

觀音散 難產

辰砂成塊 乳香 人參 滑石研

右四味為末臨產每四錢雞子清一箇生薑汁半

合無灰酒一盞同調熱下

黃金散 催生歌曰黃葵之子七七粒爛擣細研酒煎

汁若遇產難危急時子母當下免悲泣蜀葵子也

半白散 催生滑胎又名二奇散

半夏湯洗遍切七研各一兩 白斂

右為細末如催生每一錢如橫生二服如倒生三服如死胎在腹四服如胎衣不下血暈血迷瘀血敗血每二錢溫酒下一時內連兩服入生薑

自然汁少許如母氣絕加瞿麥二兩服止
甘豆散 治難產三日子母不相見

黑豆升三炒兩 生薑三兩 甘草一寸

右用水五升煎豆熟為度取汁緩緩服不唯易產

兼治風纔覺產便服之甚妙

返魂散 治死胎腹中經五七日但看母腹脹臍下冷便是子死也若夏月腹中子死脹母氣未絕心頭

略溫可下藥灌入口中纔嚥得藥此母即不用憂也

須臾之間立就前待得子母相見

多年陳豆醬二合取於地上攤少時為末用之

黑鯉鱗口肉燒灰存性并皮作片起取

右每服魚末三錢醬末一錢二味和勻用陳米飲

調下良久有效纔察其胎脹須臾却彼此藥縮胎軟如綿輕一服極重者二服立得子母相見合時忌婦人見神效

子母散 治難產胞衣不出子死腹中



蒺藜子 貝母

右各四兩為末米飲下一匙如人行五里再服

內補當歸建中湯 治產後虛羸不足腹中疔痛不止
呼吸少氣或并小腹拘急痛引腰脊不能飲食產後

一月日得服四五劑為善一方加黃耆三兩

當歸四兩 苓藥六兩 甘草二兩 桂心三兩

右咬咀每服四錢薑十片棗三枚水一盞半煎至

七分去滓入糯米飲湯一匙再煎腹空溫服日

三去血過多崩傷內竭不止加地黃六兩阿膠

二兩無當歸以芎藭代取七分清汁服之

寄生湯 治產後百損腹脇痛不下食

桑寄生去苗肉桂心當歸白茯苓白芍

藥人參熟地黃麥門冬去心甘草各半

黃耆兩 龜甲一兩牛膝三分

右十二味咬咀先用獐豬石子一枚批破去筋膜
水二大盞生薑四片棗一枚煎至一盞却去石

欽定四庫全書

產寶諸方

子等取汁入藥三錢煎至六分絞汁食前日二
三服

鍾乳健脾丸 治產後羸瘦身重胃冷食不化腹鳴泄

痢不止

鍾乳粉三兩赤石脂好薑大麥糵當歸

黃連人參細辛龍骨乾薑茯苓

石斛桂心各二兩附子一兩蜀椒六兩

右十五味末子蜜丸如梧桐子大酒服十九日三

欽定四庫全書

產寶諸方

加至三十九丸弱者飲服此方通治男子婦人

十全散 治五勞七傷一切虛乏氣劣兼大病後氣血

未完婦人產前後虛羸等疾並可服之此藥益血補

氣極有效須多服

綿黃耆二兩白芍藥當歸人參芎藭

白术地黃者甘草炙桂心火不見白茯

苓各一兩甘草桂心減半亦可依方尤妙
嗽加五味子止汗入礪末少許

右為麩末每服三大錢水一盞半煎至八分空心



理中散 治新產可服	服日二三
當歸 錢二 黃連 錢二 艾葉 地榆 甘草 炙	右為龜末每服二錢水一盞煎至七分去滓食前
龍骨 厚朴 炙黃芩 乾薑 錢半 各一	又方
芍藥 阿膠 艾葉 錢各二 熟地黃 甘草 炙	芍藥 阿膠 艾葉 錢各二 熟地黃 甘草 炙
欽定四庫全書 產寶諸方	欽定四庫全書 產寶諸方
當歸 錢各二	當歸 錢各二
草 炙	白薑 方作乾薑
當歸 洗溫湯	熟乾地黃 洗
肉桂 取心	白芍藥 亦得
蒲黃 視紙	甘

右為末空心日午溫酒下二錢忌生水菜菓油膩 毒魚濕麪鹹酸淹藏米食等新產七日內以小 便調為候	右為末空心日午溫酒下二錢忌生水菜菓油膩 毒魚濕麪鹹酸淹藏米食等新產七日內以小 便調為候
五靈散 治婦人種種血氣疼	五靈脂 半兩 乾薑 半兩二味同炒 蓬莪茂 一兩炮
萬靈散 治婦人產後虛汗不止前桂枝湯調服之	右熱酒調一錢產後虛汗不止前桂枝湯調服之
甚妙	甚妙
欽定四庫全書 產寶諸方	欽定四庫全書 產寶諸方
牡丹芍藥與當歸 蓬茂川烏青橘皮	牡丹芍藥與當歸 蓬茂川烏青橘皮
官桂更將牛膝等 產前產後號神奇	官桂更將牛膝等 產前產後號神奇
右等分修事了為末每二錢溫酒下	右等分修事了為末每二錢溫酒下
青金散 治產婦產後血暈血邪不省人事口噤牙車 不開手足搐掣上視恍惚譫言中風身體強直一切 等疾	青金散 治產婦產後血暈血邪不省人事口噤牙車 不開手足搐掣上視恍惚譫言中風身體強直一切 等疾
荆芥穗	荆芥穗

右為末用溫酒調二錢炒生薑童子小便調尤妙

日三服

蒜湯 治產後血暈

用蒜少許研碎溫湯調下

勝金湯 纔產了便服去惡血止暈

地黃汁二分 生薑汁一分

右用童子小便一分同煎十餘沸溫服地黃生薑

須是潔淨砂盆內取自然汁不得犯生水

欽定四庫全書

產寶諸方

漬小便方 產後宜服纔產了先以尋常小便一服未

可使用此

烏梅五箇 湯 内洗 炙甘草二錢 炮乾薑末一錢

右三味先於碗內用湯少許浸少時候烏梅喫即

以熱小便一盞許碗內浸令產婦作一服如欲

再服即別用烏梅等一依前法重浸服之

劉寄奴飲子

聖濟總錄治產後百病血暈

劉寄奴一握 甘草半兩 剁炙

右以水椀半煎七分去滓服纔覺血暈服一錢甚者再服無事覺腹痛即先煎恐緩急不及也

烏金散 產後血暈或惡露不盡死胎不下並可服

大豆兩 黃連一錢 當歸一兩 生薑四兩 蓬莪

茂兩 檟皮二兩

右先下生薑大豆炒候薑乾即下當歸蓬莪茂黃

連炒看豆紫透心即以櫟皮點火入藥銚中櫟皮盡黑即傾地上以紙襯出火毒為末每服二

錢小便調下產後雖無事服之亦佳

金花散 產後血暈一切腹脇痛不以虛實可服

薑黃 熟乾地黃各二錢 肉桂去皮 牛膝 劉

寄奴 虎杖 蒿蕎 赤芍藥 蒲黃 乾葛

兩各一

右為細末每服二錢如疾勢輕即以酒或用水一盞煎至七分和滓溫服重急者以豆淋酒一盞

同煎服

羊肉湯 治虛人及產婦腹中痛虛眩不支兩脇當臍急痛上衝前後相引痛治之如神

精羊肉 四兩 切 當歸 半兩 切 芍 生薑 各半兩

右以水十盞煎至三盞掠去沫去滓分四服熱服

空腹服一日盡來日再作二日滓合為一日煎

之當一劑服

理中丸

新產可服

甘草 一兩 人參 一兩 白朮 一兩 乾薑 一兩

欽定四庫全書
產寶諸方

右四味為末糯米糊丸用溫酒飲下如梧桐子大

稍加至二三十丸婦人之於產號為急切無以

比方何者俄頃之間生死所繫豈可使不學之

人妄投湯藥予家諸女諸婦莫不親教使之治

療草蓐之間皆獲全濟其法固宜家至而戶曉

也妊娠五月以後先服枳殼散瘦胎產後腹痛

服四物湯胞阻下血加膠艾煎四物湯橫生難

產服黑散既產服理中丸以養胎氣三日內服

四物湯惡露盡臍下塊散方服羊肉當歸湯三

五劑諸苦悉去服枳殼湯

豆蔻散 治產後服不生百病極治兒枕痛神效此藥不破

血極平穩定痛
溫中真良藥也

肉豆蔻 小箇用小刀子剜開一小箇入乳香一皂子大

右用麪裹煨熟去麪為末纔產了溫酒調一服下

兒枕痛用童子小便煎熱服

又烏金散 治產後血逆心悶腹痛不可常服

欽定四庫全書
產寶諸方

紅芍藥 川當歸 乾薑 蒲黃 乾地黃

甘草

右等分別入黑豆一合炒令香熟去皮除蒲黃與

別藥同為末於銀器內熳火炒令紫色後入蒲

黃如產後別無疾每日只一服豆淋酒下之

當术散 治婦人敗血衝心

蒼术不以多少炒黑色為末入當歸少許每服二

錢酒一盞煎至七分



地黃湯	主產後心腎煩悶血氣凝澀腹脇有妨不能飲食并惡露不快並宜服之
地黃汁	當歸末 <small>五分</small> 生薑汁 <small>約一分</small>
酒	童子小便 <small>三分</small>
右同煎二三十沸去滓服半小盞如腹脇不和不須服	右同煎二三十沸去滓服半小盞如腹脇不和不須服
琥珀散	治產後調順心經開水道解血結利小腸
琥珀	真者 <small>一分</small>
欽定四庫全書	產寶諸方
右研如粉每服二錢以芍藥飲子調絕妙	右研如粉每服二錢以芍藥飲子調絕妙
芍藥飲子	
赤芍藥	白茯苓
兩半	兩一
甘草	漢防已
半炙	
一分	
分	檳榔
一箇	
右咬咀每服二大錢燈心五莖水一盞半煎至七分去滓熱調琥珀服	右咬咀每服二大錢燈心五莖水一盞半煎至七分去滓熱調琥珀服
阿膠散	治產後三四日猶有惡物或一兩日一度來
乾艾	赤石脂
桂	白芷
各半	阿膠各一



右為末每三錢薑半錢水一盞煎七分	當歸續斷丸	治產後虛少氣腹痛引腰背多血不止晝夜不得眠崩中漏下唇口乾面無色
地黃	當歸 <small>去蘆</small>	芍 <small>續斷</small>
兩十	兩	兩
欽定四庫全書	產寶諸方	
右為末蜜丸桐子大每三十丸淡醋湯空心下	歸魂散	治婦人血氣垂死者并敗血不盡
	石菖蒲	當歸
	一兩米泔浸洗切焙	一兩酒浸
		一宿火炙
右為末每二錢熱酒下		
治腰痛下血		
熟艾		
兩		
右用酒五盞煮四盞去滓再煎二盞口閉者灌之		
產後止喘		
陳小麥半兩紙裹槌碎水一盞石銀器內煎七分		



一味散治產後瀉不止

烏梅不以多少搗碎以竹杖穿于火上炙為末米

飲調二錢

又方

蓮心為末米飲調下

產後淋渫方

獨活 蒼朮 防風 荆芥 吳茱萸 蛇牀

子 烏頭 生去皮
各一兩

欽定四庫全書

產寶諸方

右咬咀每用二兩水七升煎取四升滓淋渫欲先

薰即乘熱薰之候溫方淋洗產後諸疾並皆淋

渫但須慎風神妙

治產後痢方

白蒺藜炒為末米飲調下一錢

又方

栗子肉炒焦末之酒調一錢

治產後冷痢一伏時百回者

陳粟米炒焦為末二錢米飲調下

治產前產後下痢方

烏鵲子四箇或一箇

蒲黃末一分

右鵲子取黃去白入蒲黃和勻先用黃蠟少許潤

鑄內候鎔入前藥成餅分作四片每服一片細

嚼臘茶下立效又方取黃清用薤白研細相和

勻却用黃蠟攤盤子或銚內做成黃餅每箇作

二服以臘茶送下

欽定四庫全書

產寶諸方

橘芥飲子 治產後妳脉行作寒熱頭痛

橘葉四十葉

薄荷七葉

荆芥七葉

右用小便一盞煎七分通口服

湧泉散 下妳

漏蘆 百部 麥門冬炒去心 没藥 乳香各一錢

研分

右以前三味後二味研細為末每服一大錢熱酒
調下併兩服右手梳左乳四十九左手梳右乳

四十九度大效

百單六 妊脉不行

白丁香少許
為末 白麪一二兩

右和作棊子煮熟服如乳行即已

乳母生妳核子痛

玄參不以多少研每二錢熱酒下

陰汗濕痒生瘡方

蛇床子 五加皮

欽定四庫全書
產寶諸方

右水五升煎三升熱洗冷即溫身微汗意倦為度

不揩被蓋

玉戶內瘡方

瓦上年久苔蘚畧洗過瓦上焙乾入輕粉傅

青黃散 凡覺是毒蟲咬及癰疽纔作服此毒氣不行

青黛 雄黃各等分

右為細末每二錢新水調下

陰上中毒

訶子 煥 黃藥 煥

右等分為末鹽漿水含洗貼

欽定四庫全書
產寶諸方

欽定四庫全書
產寶諸方