

文淵閣
四庫全書
電子版



【子部】



世醫得效方

迪志文化出版有限公司 出版
迪志文化出版有限公司為宜高科技集團成員

《文淵閣四庫全書電子書：世醫得效方》

出版：迪志文化出版有限公司
地址：香港中環皇后大道中99號中環中心29樓
電話：(+852) 2735 1263
傳真：(+852) 2730 8686
網址：<http://www.dheritage.com>
電郵：dvm.customer@dvm.com.hk
客戶服務熱線：(+852) 2302 3043

2001年7月初版

版權所有，請勿翻印

Copyright (C) 2000 Digital Heritage Publishing
All rights reserved. No part of this book shall be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission from the publisher.

迪志電子書坊

下載電子書，訂購 Print On Demand 版本，請瀏覽
迪志電子書坊。

網址：<http://www.digiebooks.com>

欽定四庫全書

子部五

世醫得效方

醫家類

提要

臣等謹案世醫得效方二十卷元危亦林撰

亦林字達齋南豐人官本州醫學教授是編積其高祖以下五世所集醫方合而成書一曰大方脈科分子目九十有一二曰小方脈科分子目七十有一三曰風科分子目十四

欽定四庫全書



世醫得效方
提要

曰產科兼婦人雜病科分子目三十有三五曰眼科分子目十二六曰口齒兼咽喉科分子目六七曰正骨兼金鏹科分子目二十九八曰瘡腫科分子目二十四共十九卷附以孫真人養生法節文一卷其總目針灸一科有錄無書校檢其文皆散附各科之中蓋標題疎舛實非闕佚自序稱初始于天曆元年迄功于後至元三年其用力亦云勤篤前有



迪志文化出版有限公司出版

至元五年太醫院題識備列院使十一人同

知院事二人僉院事二人判官二人經歷二

人都事二人掾史一人銜名蓋江西官醫提

舉司以是書牒醫院下諸路提舉司重校覆

白于醫院而後刊行亦頗矜慎序中稱其高

祖遇仙人董奉二十五世孫傳其秘方雖技

術家依託之言不足深詰而所載古方至多

皆可以資考據未可以罕所發明廢之也乾

欽定四庫全書



世醫得效方
提要

隆四十六年十月恭校上

總纂官 臣紀昀 臣陸錫熊 臣孫士毅

總校官 臣陸費墀



迪志文化出版有限公司出版

世醫得效方題識

南豐危亦林世醫得效方編次有法科目無遺江西提舉司校正之牋上于院下諸路提舉司重校之復白于院院之長貳僚屬皆曰善付其屬俾綉梓焉噫是方之效豈以此一言而遂傳歟至元五年太醫院識

欽定四庫全書

世醫得效方
題識

世醫得效方銜名

掾

史蒙智

奉直大夫太醫院都事郭毅

承直郎太醫院都事阿老丁

奉直大夫太醫院經歷田守信

奉直大夫太醫院經歷卜顏帖木兒

成和郎太醫院判官郎師顏

承直郎太醫院判官齊顯

欽定四庫全書
世醫得效方
銜名

成和郎同僉太醫院事胡缺

成安郎同僉太醫院事弓叔正

承直郎僉太醫院事賈文炳

承務郎僉太醫院事馬文瑾

奉訓大夫同知太醫院事許文美

奉議大夫同知太醫院事趙良

嘉議大夫太醫院使趙惟寅

嘉議大夫太醫院使趙權



嘉議大夫太醫院使馮適	院使	中奉大夫太醫院使張元珪	資善大夫太醫院使張元澤	資善大夫太醫院使張翼	資善大夫太醫院使伴哥	資德大夫太醫院使五十四	資善大夫太醫院使石卜尼	資政大夫太醫院使哈刺歹
欽定四庫全書								
世醫得效方								
街名								

世醫得效方序

工欲善其事必先利其器器利而後工乃精醫者舍方書何以為療病之本自難經湯液靈樞傷寒論等篇出而後之醫師著述者殆如百家蓋發縱指示俾對病而知體因體而得藥其用心亦仁矣哉僕幼而好學弱冠而業醫重念先世授受之難由鼻祖自撫而遷于南豐高祖雲企遊學東京遇董奉廿五世醫方授以大方脉還家而醫道日行伯祖子美復傳婦人正骨金鏃等科

欽定四庫全書

世醫得效方

大父碧崖得小方科於周氏伯熙載進學眼科及療瘵疾至僕再參究瘡腫咽喉口齒等科及儲積古方并近代名醫諸方由高祖至僕凡五世其隨試隨效然而方卷浩若滄海卒有所索目不能周乃於天歷初元以十三科名目依按古方參之家傳昕夕弗怠刻苦凡十稔編次甫成為十有九卷名曰世醫得效方首論脉病證治次由大方脉雜醫科以發端至瘡腫科而終編分門析類一開卷間綱舉而目張由博以見約固非敢求異



於昔人直不過欲便於觀覽云耳欽惟國朝念羣黎之疾苦惠民有局設教有學於醫尤切然自愧山林鄙陋見閣士傳妥協纂集舛謬惟多尤望當道縉紳醫師進而教之訂其訛補其偏俾綉諸科則庶幾廣聖皇好生之仁於無窮豈不韙歟仍至元三年歲丁丑七月既望嘉禾後學達齋危亦林拜手謹書

欽定四庫全書

世醫得效方



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

世醫得效方卷一

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

集脈說

人之有生血氣順則周流一身脈息和而諸疾不作氣血逆則運動遲澀脈息亂而百病生然脈之精微心中了了指下難明故西晉王叔和猶為切慮凡診之際須

欽定四庫全書

世醫得效方



卷一

澄神靜慮以呼吸息數定病人之脈候兩手各三部分為寸關尺左三部正臟心肝腎小腸膽與膀胱為腑右三部正臟肺脾命大腸胃與三焦為腑每部浮按消息之次中按消息之又沈按消息之浮以診其腑見六腑之盛衰沈以診其臟見五臟死生盈虛中則診其胃氣蓋胃為水穀之海人以食為命有胃氣則生無胃氣則死每三部三三如九乃為九候復有七表八裏九道脈風寒暑濕中傷之脈七情虛損寒熱之脈當析而論之七



迪志文化出版有限公司出版

表屬陽浮芤滑實弦緊洪浮如指按蔥葉芤則中空有兩頭滑似流珠實則健而有力弦如琴絃緊如弓弦洪則舉指極大八裏屬陰微沈緩濇遲伏濡弱微於指下如細絲沈若爛綿尋之至骨緩則來往不急不慢濇如刀刮竹狀遲則尋之隱隱伏潛於骨重指乃得濡湊指邊似怯弱而去來無力九道之脈長短虛促結代牢動細長促屬陽短虛結代牢動細為陰長脈三關通度促脈尋之極數短脈按之不及虛脈尋之不足舉之有餘

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

結脈指下聚而却還代脈動中一止停久乃還有疾見之難治若氣逆得之則無憂牢脈固結不移之狀三部若見皆死候也動脈再再尋之不離其處細脈細細如絲來往極微凡此二十四脈分別錙銖總而括之浮沈遲數也至於傷寒寒泣血其脈緊傷寒復見風則浮而緩兩感之脈沈大者太陽少陰沈長者陽明太陰沈弦者少陽厥陰陽病見沈濇弱弦微者死陰病見浮大數動滑者生陽毒之脈極浮洪陰毒之脈附骨取之方有

按之即無陰陽二厥脈皆沈所以使人疑之陰厥脈沈遲而弱陽厥脈沈伏而滑發熱下利脈沈弦者下重也脈大者為未止脈微弱者自愈雖發熱不死中寒之脈亦緊但肝中加弦心中加洪脾中加沈肺中加遲濇腎中加沈滑傷風則風散氣其脈浮復見寒則浮而緊中風之脈亦浮五臟所中脈與中寒類也大抵遲浮則吉實大弦數則難治傷暑氣血消散脈虛弱無力中則陽弱陰虛微遲似芤傷濕之脈濡而弱若沈而細微中之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

明矣七情喜怒憂思悲恐驚喜則脈散怒則脈促悲則脈結恐思則脈俱沈憂則脈濇驚則脈顫皆生於氣也虛損者脈來或浮大而無力或沈細而微弱實熱者見於指下弦數殊甚或細數異常總而說之春弦夏鉤秋毛冬石濡弱而長曰弦來疾去遲曰鉤輕虛以浮曰毛沈濇而弱曰石此四時之常脈也其有太過不及有覆有溢有關有格太過者氣有餘寸脈本浮又加實大是為陽太過也尺脈本沈又加實大是為陰太過也不及者



氣不足浮之損小者是陽不及也沈之損小者是陰不及也覆溢二脈者溢自關前進上於魚際為外關內格陰乘之脈也覆脈自關後退下入於尺澤為內關外格此陽乘之脈也見如此者乃諸臟相乘四時相尅雖未病病即死不可治也又曰三關通度過於洪大則或風或痰設若沈細則為之不療六部相貫按之不及極浮微者殂再再尋之至骨不絕者天年有永矣至於衆病生死之脈若諸氣脹滿浮大可療虛小難保下痢宜微小不宜洪大恍惚顛狂者實大為順沈細為逆瘠渴數大者生虛小難愈水氣浮大則宜沈細則愈而復作霍亂浮洪可救微遲不語氣少難瘥鼻衄吐血利於沈細不利於浮大心腹痛宜見沈細不宜見浮大頭痛浮滑易除短澇不愈上氣浮腫浮滑可安微細難療中惡緊細易治浮大難瘥金瘡出血虛細則宜實大則傾中毒洪大則存細微則亡十怪脈者釜沸魚翔彈石解索屋漏蝦遊雀啄偃刀轉豆麻促釜沸如湯湧沸息數俱無

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

乃三陽數極無陰之候旦見夕死夕見旦死魚翔脈浮膚泛泛三陰數極又曰亡陽當以死斷彈石脈來辟辟湊指急促而堅乃腎經真臟脈現遇戊巳日則不治解索脈散散無序腎與命門之氣皆亡戊巳日篤辰巳日不治屋漏之脈如水下滴濺地貌胃氣榮衛俱絕七八日間危矣蝦遊狀如蝦遊水面杳然不見須臾又來隱隱然不動依前又去醒者七日死沈困者三日不治雀啄之脈指下來三去一如雀啄食之狀脾元穀氣已絕於內醒者十二日死困者六七日亡偃刀之脈尋之如手循刀刃無進無退其數無准由心元血枯衛氣獨居無所歸宿見之四日難療轉豆形如豆周旋展轉並無息數臟腑空虛正氣飄散象曰行尸其死可立待也麻促之脈應指如麻子之紛亂細微至甚蓋衛枯榮血獨澀輕者三日重者一日殂矣又論四十五動止脈以二十四氣七十二候應死期之准的孟春立春日十五動一止明年東風解凍蟄蟲始振魚陟負冰時二十動一

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

止二年雨水獺祭魚候鴈北時三十動一止三年草木萌動驚蟄桃始華時四十動一止四年倉庚鳴鴈化為鳩時且如仲春驚蟄桃始華日脈二十動一止明年春分玄鳥至雷乃發聲時三十動一止三年春分始電桐始華時四十動一止四年季春清明田鼠化為鴽虹始見穀雨萍始生鳴鳩拂其羽戴勝降于桑時以下倣此

孟夏立夏螳螂鳴蚯蚓出王瓜生小滿苦菜秀靡草死
麥秋至仲夏芒種螳螂生鵙始鳴反舌無聲夏至鹿角
解蠲始鳴半夏生季夏小暑溫風至蟋蟀居壁鷹始摯
大暑腐草為螢土潤溽暑大雨時行○孟秋立秋涼風
欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

至白露降寒蟬鳴處暑鷹乃祭鳥天地始肅禾乃登仲
秋白露鴻鴈來玄鳥歸羣鳥養羞秋分雷乃收聲蟄蟲
坯戶水始涸季秋寒露鴻鴈來賓雀入大水為蛤菊有
黃華霜降豺乃祭獸草木黃落蟄蟲咸俯○孟冬立冬
水始冰地始凍雉入大水為蜃小雪虹藏不見天氣上
升地氣下降閉塞而成冬仲冬大雪鶡鴒鳴不鳴虎始交
荔挺出冬至蚯蚓結麋角解水泉動季冬小寒鴈厲若時
北鄉鵲始巢雉始雊大寒雞乳征鳥厲疾水澤腹堅

疫之脈則無定據隨時審思乃得未可輕議欲知崇害
心脈虛散肝脈洪盛或浮沈長短大小無定或錯雜不
倫尤宜加意凡此諸脈固鄙見莫之敢遺然其或逆或
順猶在詳審而消息之毋固執而有變通則可得之矣



集病說

傳曰名不正則言不順病之名狀其類至多原其所由似是而非者尤多若體認之明辨其所因之的則何患其多也夫傷寒六經之病足太陽膀胱經頭項強腰脊痛無汗足陽明胃經身熱目疼鼻乾足少陽膽經脅脇痛耳聾足太陰脾經自利不渴腹痛足少陰腎經口燥舌乾背惡寒足厥陰肝經煩滿寒熱甚則囊縮傳變不一或愈或死愈者多出旬日之外死則在六七日之間

獨寒獨熱亦難治世號為大病陽毒之為病乃陽氣獨盛陰氣暴絕陰毒之為病本因腎氣虛寒或因冷物傷脾胃內既伏陰外又感寒所致陽厥初病身熱頭痛至二三日四五日方發厥半日却身熱蓋熱深方能發厥陰厥初得病便四肢厥冷乃陰勝於陽也厥者陰陽不相順接厥少熱多者其病當愈厥多熱少者其病為進或加以上氣腳縮則為六腑氣先絕於外也至於下利清穀不可攻表汗出必脹滿下利有微熱而渴自愈中

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一



之者皆因下虛氣弱凌犯霜露及冒風雪中行所致傷風之病在表在經絡中循經流注以日傳變中之者非正順長養萬物之風乃八方偏邪之風肥偉人多得之蓋風性緊暴善行數變其中人也卒其眩人也暈激人涎浮昏人神亂所以推為百病長傷暑乃三伏時月炎熱大行草萎河涸血消氣沮之人偶或傷之病在頃刻中之則名中暍輕則為傷重則為中傷濕乃坐卧卑濕或為雨露所襲或汗出衣裏漸漬染之其中有中者乃脾元又虛或為泄疾土不制水因茲而得復有四氣伏於人身隱微而不知覺作為百端之病綿延歲月不已必須深思求其所以為病之因然人之平居神靜則寧情動則亂故喜則氣緩怒則氣上悲則氣下憂則氣沈思則氣結恐則氣怯驚則氣亂故有所謂七情之病也若真氣既微胃氣不實復啗生冷冰雪之屬致腸胃虛寒或大病未復便合陰陽或疲極筋力飢飽失節或刻意苦思盡神度量叫呼走氣而虛損病所由生也精血既

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

衰臟腑多燥三焦煩壅復餌丹石酒醢炙烤致腸胃蘊毒而實熱病所由生也以諸病總而論之中氣有類中風中風而以中氣治之亦無所傷中氣而以中風藥投之莫不旋踵告斃先代醫師許學士張子和以親故痛念醫之不明所以懲其弊而見於著述也若痰癰之病未有不由隔季所感風寒暑濕及飲食勞役瘴癘之氣為之赤白痢疾古人所謂滯下者是也究疾之原無非外感五邪之氣內傷生硬冷熱之食不能尅化致令積滯而成亦有久虛傳變而成下之不禁甚者手足不仁則五臟氣將絕於內也失血之病十種走失莫重於此皆因四氣所傷或調養失宜所致時疫流行則當審其因春合暖而寒夏合熱而冷秋當涼而熱冬當寒而煖是皆六氣愆和而生斯疾大則流毒天下小則蔓延一鄉一家必辨其各季所因不可以尋常微病目之故重則禍至滅門輕則病至危篤外此觀形候聽聲而知病之可治不可治經中所謂視精明者蓋五臟精明聚於目

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

目精全則目明神定則視審審視不瞭精明敗矣又云目赤色者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃色不可明病在胃中所謂五色者乃氣之華也赤欲如帛裏朱不欲如赭白欲如白璧之澤不欲如垚青欲如蒼玉之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土黑欲如漆重澤不欲如炭五臟精敗壽不久矣五聲者臟之音中之守也中盛則氣盛中衰則氣衰聲如從室中言者氣澀也言微終日乃復言是氣之奪也譫妄不避善

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

惡神明之亂也鄭聲言意不相續陰陽失守也得守者生失守者死六府強弱以候形之盛衰頭者精明之府頭傾視深精神奪矣背者胃之府背曲肩隨胃將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣骨者髓之府行則振掉骨將憊矣倉廩不能藏者腸胃不固也水泉不止者膀胱不藏也得強者生失強者死且兼而明之又如五臟已奪神明不守聲嘶身冷循衣譫語撮空面赤如衄血白如枯管黑如烟煤



迪志文化出版有限公司出版

面青目白面黑目白面黃目青面赤目白耳鼻有黑色趨入口耳目顙頰赤者黑色出于額上髮際直鼻脊兩顙上黑色出天中下至鼻上顙上面忽如馬肝色望之如青近之如黑目直視惡風面黑唇青面青唇黑面黑兩脇下滿不能自反轉頭目久痛卒視無所見陰結陽絕目精光脫恍惚陰陽竭絕目眶陷口如魚口不能復閉氣出不返唇反齒齮乾枯天柱骨倒指拳攣縮汗出不流舌卷黑髮直髮如乾麻善怒髮與眉衝起爪甲青

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

大腑自遺不覺身熱喘息臍下硬如鐵唇裂鼻黑舌根焦四肢逆冷汗出如油不流尸臭不可近目睛直視不回一日病人健人黑色或白色起入目及口鼻二日陰陽俱絕失音不能言三日半口張唇青人中滿三日目無精光若土色不受飲食四日面赤目青六日面黑目白爪甲下黑八日齒忽變黑十三日肝病皮黑庚辛日心病目黑壬癸日脾病唇青甲乙日肺病頰赤目腫丙丁日腎病面腫唇黃戊巳日以上俱不可治也面目黃



迪志文化出版有限公司出版

色起其病方愈面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑面黑目青面目俱黃面黑目白均可治也大抵言病動以百計雖積萬言莫能盡述但當留心殷勤學之博通乃得不可以粗解一二為是果某疾而正某名庶不誤投湯劑則何患病之不瘳矣

集證說

古之醫者有云外病自經絡入內病自五臟鬱發然當求所以證驗庶無差失如傷寒有陰陽表裏陽證多語

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

陰證無聲陽證則晝劇陰證則夜爭陽證似陰糞黑而脈滑陰證似陽面赤而脈微矣身重背疼煩悶狂言奔走咽痛身斑斑若錦文或下利赤黃多因妄服燥藥熱味陽毒是也背強腹中絞痛身如被杖燥渴嘔泄冷汗鄭聲多因脾胃虛寒重感於寒陰毒明矣陰陽二厥若陽厥則指爪時溫或畏熱或飲水或揚手擲足燥煩不得眠大便秘小便赤外證多昏憤陰厥則指爪常冷足多攣卧惡寒自引衣蓋覆不飲水或下利或清便如常



迪志文化出版有限公司出版

小便數外證惺惺而靜表證多惡寒不渴發熱而身體痛裏證多渴只惡熱而喘滿口燥咽乾手心腋下澀澀汗出大便鞭澀赤譫語復有傷寒初證發熱惡寒無汗其色悽慘復見風則多寒手足微厥發熱下利手足溫煖者生手足厥逆炙不溫證之極矣中寒則口噤四肢強直失音不語或卒然暈倒吐逆涎沫手足攣搐狀如暗風或復燥熱傷風有汗惡風面色光而不慘復見寒手足微溫發熱多煩其或中者半身不遂手足癱瘓涎

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

潮昏塞口眼喎斜肌膚麻痺歸於六腑者特為偏緩猶可苟延歲月歸於五臟者眼閉口開手散身如鼾睡遺尿惡證迭出朝不及夕傷暑身熱惡寒頭痛或煩而渴眩暈背寒面垢或嘔或泄其中入心使人噎悶昏不知人入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿癢變入腎則消渴利小便至於傷渴身重關節重疼發熱惡寒大便秘而小便澀腰脚冷而腿膝浮或自利不渴若氣不平中之亦使人半身不遂口眼喎斜涎潮昏塞



迪志文化出版有限公司出版

又如七情喜傷心者不可疾行不可久立怒傷肝者上氣不可忍熱來盪心短氣欲絕不得息憂傷肺者心系急上焦閉榮衛不通夜卧不安思傷脾者氣留不行積聚中脘不得飲食腹脹滿四肢怠惰悲傷心胞者善忘不識人置物在處還取不得筋攣四肢浮腫恐傷腎者上焦氣閉下行下焦回還不散猶豫不決嘔逆惡心驚傷膽者神無所歸慮無所定說物不意而道凡此七者證雖不同本乎一氣臟氣不行鬱而不舒結成痰涎隨氣積聚堅大如塊在心腹間或塞咽喉如粉絮梅核樣咯不出嚥不下每發欲絕逆害飲食若諸虛損證則眩暈眼花鼻多清涕凝濁遺精冷滑洞泄水穀不化洒淅自汗嘔吐清痰皆陽虛陰盛也諸實熱則五臟積熱口苦咽乾唇裂生瘡腸胃乾澀煩燥喜冷涎唾稠粘眵淚眼赤或遍體癰瘍至於總說則痰瘧證惟多先寒后熱名寒瘧先熱後寒名溫瘧但熱不寒名暑瘧寒熱身重煩疼脹滿名渴瘧寒多不熱名牝瘧若一日一發則易

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

愈二日一發猶可三日一發則難痊且斯疾俗在忌醫之列然得其所因何忌其難時疫證雜發熱腰痛強急腳縮不伸腑中欲折目中生花或濇濇增寒復熱名曰溫疫身體煩先不能自禁或內熱口乾舌破咽塞聲嘶名曰燥疫頭重頸直皮肉強痺或蘊而結核起於咽喉頸項之側布熱毒於皮膚分肉之中名曰寒疫乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣名曰濕疫四時之感其證百端皆當因其時而詳辨則得之喘急為患吐痰續續則生自汗譫語目直視則亡失血諸證有暴吐鼻衄泄出或一二升至斗餘者因感四氣流傳經絡陰陽相勝或怒氣傷肝風入腸胃故血得寒則凝泣得熱則淖溢各隨臟腑經絡湧溢凝停胃胃因即滿悶或吐或衄或泄下復有咳嗽中見紅絲者為難愈無故忽然瀉下黑血名心絕癆瘵之證得之者多諱而未肯求醫殊不知其根有蟲嚙其心肺可不深憂中蠱毒之候令人心腹絞痛如物嚙狀吐下血如爛肉若欲



驗其證狀先令病人唾於水中若沈即其實矣痛渴與漩濁為鄰慎莫作疽瘡等證鮮有安之日矣至於下痢身涼能食小便通易安體熱多汗渴甚小便不利或手足厥冷灸不溫兼微喘不食者死二便秘澁之證暫秘小漩還有點滴利者易愈若秘日久膨上心脅切痛氣促身冷面色黑前後俱無名曰氣實轉盼而殂脹滿得之未久或脹或消腹皮稍軟不泄不喘隨治隨瘥若臍心突起利後復脹急久病羸乏喘息不得安名曰脾腎俱敗無有愈期腫滿善證男從上腫下女從下腫上所患未久利漩退腫定喘則愈矣若證不善則手足盤骨腫臍與掌心俱凸嗽咳失聲青筋紋橫肚上及爪甲青卒腫頭面蒼黑嘔吐頭重豈復能救若霍亂一證猶為卒暴之最蓋人之起居無常攝調不善揮霍之至便至變亂悶絕不救甚為可畏臨深履薄縱蹈虎尾不足以諭其危其如厲風名大風惡疾故其色敗戰裂瘍潰眉面白皮如蛇蛻久則鼻梁闌壞又名風癰十無一生若

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

癰疽之為病癰者堅也堅則難破癰者假也假物成形能動者是至於蛟龍蛇鱉肉髮蟲米之證初非定名偶因食物相感而致斯患夢寐不祥多生恐怖為祟惑證矣吁內外之證其發萬端皆須細辨且頃刻之變無定一有所作其可忽諸

集治說

嘗謂用藥如用刑一有所誤人命繫焉故書曰言之非艱行之難艱如張仲景傷寒一百一十三方猶缺其一三百九十七法俚指未即周知蓋謂此也夫處方大法則有七方十劑七方者奇方耦方大方小方緩方急方復方十劑者宣通補瀉輕重澀滑燥濕然積學而用之則可矣傷寒之病太陽屬膀胱非發汗則不愈必用麻黃之類蓋其性能通陽氣却外寒也陽明屬胃非通泄不能愈須用大黃芒硝以利之少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗佐以黃芩則鮮矣太陰屬脾性惡寒濕非乾姜白朮不能燥少陰屬腎性畏寒燥非附子不

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

能溫厥陰屬肝藏血養筋非溫中之藥不能潤外此有汗下吐三法毫釐不可差誤經云桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛以亡故在表宜汗在裏宜下在胃宜吐半表半裏宜和解表裏俱見隨證滲泄無表裏證則宜下之下利清穀身體痛急當救裏身體疼痛清便自調急當救表身熱不渴為表有熱清而煩悶為裏有熱傷寒見風大青龍湯為治之最陽毒內外結熱輕則白虎湯重則承氣湯之屬陽厥亦用舌卷焦黑鼻中如煙煤非水漬法不可陰毒疾勢困重面黑四肢厥冷則理中湯四逆湯投之未效則灼艾法惟良復以蔥熨法佐之陰厥同此法治之發熱下利白頭翁湯黃連阿膠丸最為的切中寒則急拊置煖室燃以薪火向之令通身煖透或置於熱炕上令有力人扶策仍以手附火或人懷令熱亟摩病人手足胃腹間續用薑附湯併服若猶未省則依上法灸傷風主治之法汗出惡風者當解其肌裏證雖其惡風未罷亦須先解其外也傷風見寒大青

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

龍湯均為調理中風昏悶先須通關散探鼻令噴嚏次以蘇合香丸行其氣仍須分辨冷熱為治不可混濫五臟正中者迅雷不及掩耳手足偏中者但徐服順氣疎風豁痰等藥不宜用大風藥急治則不得盡其天年其有牙關緊閉亦用通關散搐鼻噴嚏即開矣傷暑者暑氣耗血消氣生痰速用解暑之劑仍啜熱湯得汗即甦若中之者急扶在陰涼處不可與冷當以布巾衣物蘸熱湯熨臍中及氣海以湯淋布上令透徹臍腹暖即漸醒矣如倉卒無湯處則掬道上熱土置臍上以多為佳冷即易之古法道途無湯即掬熱土於臍中仍撥開作窩令人溺其中以代湯淋續與解暑毒藥併急嚼生薑一大塊冷水送下如已迷悶則嚼大蒜一二瓣冷水送下如不能嚼即用水研灌之立醒但遇無湯處則嚼生蔥二寸許津嚥下可抵飲水二升傷濕中濕只宜利小便忌不得以火攻并轉利之若濕家下之額上汗出微喘小便不利者死下利不止者亦死治濕不利小便非

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一



迪志文化出版有限公司出版

其治也七情之患惟當利氣豁痰寬中進食仍須怡養以溫平之藥調之如宿血滯氣停凝結為癥瘕腹中塊堅硬作楚當以破氣藥伐之或以類相從如敗梳治蟲瘕銅屑治龍瘕麴蘖治米瘕石灰治髮瘕等類所謂醫者意也氣積膨痛至甚或有熱痞結聚須宣泄之虛損為治宜大作湯劑峻補者烏附天雄薑桂之屬不可無潤補者鹿茸當歸菟蓉之類安可缺清補則天門冬麥門冬人參地黃之類宜用也至於諸熱為治有泛熱

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

有實熱泛熱者荊芥薄荷梔子黃芩等投之正其所宜實熱者非大黃芒硝則不能效若夫總說為治之備要如南北風土之殊人物厚薄之異北方土厚水深水性沈下人體多實而少虛且所殮無非肉麵寒則衣重裘坐煖炕若有所治則宜多以清涼之劑如南方用大黃巴豆之屬其分兩皆當倍而用之或用水漬法或尋甜水一二甌飲之即醒間有所稟稍弱不自保惜勞役致虛則亦但當潤補之無有不愈南方屬火火性輕炎人



迪志文化出版有限公司出版

體多虛而少實況所食不過蔬食而已必須投以溫和之藥以調之其有習尚北方之風置酒終日非至醉不已燒燂肥鮮恣其厭飫偶有所患亦須以平昔所稟施以涼劑然虛者亦不可妄施痰癰熱多者投以半冷半熱解散分陰陽減寒熱之劑度其所作之日先一時進以抵截之藥去其痰水則收效矣寒多者投以半生半熟壯脾進食之劑次以抵截之藥則痰癰去而疾愈矣猶須令其戒慎飲食謹起居則無復攻之患若久瘡而

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

復作虛浮不食者未之有瘳時疫之治須以時斟酌不可偏執治之者須辨其所因而投之以藥不可以日滿自差遂至枉亡良可太息至於病愈必須湯食競進折其毒勢不可令病氣攻人則屏息矣或有云斯疾之召或溝渠不泄穢惡不修薰蒸而成者或地多死氣鬱發而成者或官吏枉抑怨讟而成之者可於州治六合處穿地深至三尺濶亦如之取淨沙三斛實之以醇酒三升沃其上俾使君祝之斯亦消除疫癘之良術故併記



迪志文化出版有限公司出版

之喘急虛者升降鎮墜熱者清心涼肺未有不愈下痢感於四氣者先須隨其所感解散分利陰陽次須辨其冷熱手足和煖則為陽中和之劑可用手足厥冷則為陰溫燥之藥可行無不切效大法虛者補之實者瀉之滑者澀之閉者通之有積者推之熱則涼之冷則溫之冷熱不調者平之失血明其所因辨其冷熱如血下鮮紅則治以清和純下瘀色則當溫養二便秘則須潤滑以行之脹滿則須正氣以虛實平治之腫滿實者利水

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

虛者壯脾元兼用消浮等劑自有奇效仍須戒鹹斷慾庶不再復霍亂須明辨虛實所因亟治無遲遲則殞命至於乾霍亂則猶為難治也三疳治法滋腎為主抑心火兼之然須多服湯丸俾水升火降而引飲無度莫之見矣真心痛者手足青至節不在治療之數真頭痛者上穿風府陷入泥丸非藥能愈金瘡主治備見後科用藥之工誠可嘉嘆中蠱毒之法以敗鼓皮燒灰為末飲服一匕則病人自呼蠱家姓名可語令呼喚將去則愈



迪志文化出版有限公司出版

矣瘵疾一染人當其未深入之時則宜先取其蟲不爾則損於心肺蓋心主血肺主氣人身含氣血之本其能生乎取蟲而後相忘世慮和以潤養藥食庶幾可瘳傷晚則不及也魔寐產乳自縊壓溺諸暴絕須平時熟記後所載治法併產蓐一科臨用庶不倉惶應驗在頃刻間不然則世無良醫枉死者半是也厲風初發則宜宣泄風毒去而病漸愈長久之惟當幽隱林泉依法亟治庶乎可愈不惟愈疾亦或可因此而至仙道矣或為崇

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

害若移精變氣祝由不可則宜外尋禁避厭禳法以除之外此病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并臟氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也生候尚存形色不改病未深入腠裏針藥及時能將息調理委以良醫病無不愈至於五味亦可對治五臟之病肝酸心苦脾甘肺辛腎鹹用之中病則止過則酸走筋鹹走血辛走氣苦走骨甘走肉則無益矣又如



迪志文化出版有限公司出版

以所宜而治者肺燥咳嗽嚼芝麻啗油餅瘧疾脾冷糟
鯉魚糟藏瓜久冷痢野鷄餛飩等類是也瓜果亦可隨
冷熱施之愈疾必矣若夫炮製之法又當以相需相合

相反相惡相需者以桂得蔥而軟相合者磁石引針相
反者大戟芫花等反并草之類也相惡者如牛黃忌龍
骨是也且方中各有禁忌此亦舉其略或以并草擊起
芫花之性而用者猶在斟量更須甄別藥味新陳選擇
州土所生採取時月分君臣佐使俾分兩無差炙燂炮

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

熅精虔不苟斯為治之善矣其有自恃已長不肯訪問
以意臆度攻寒以寒療熱以熱妄施一匕邀為已功偶
或中之實非的見不過僥倖於萬一其或不中則十手
所指十目所視所謂一甌之藥誤入於咽五臟俱裂生
可再復可不戒之況醫者人之司命有病急召慎勿以
遠近寒暑而拒之若至病家尤須敬謹勿為他務以敗
正事給藥亦量其多寡表汗宜四吐下宜一加二極矣
補藥愈多愈效餘則隨證為之輕重明批湯引病若未

瘡囑其再來庶病可瘳而治有方矣僕少而學之長而行
之所謂治病之道盡在是矣

古云凡曰治病推其所因
生死預定方為醫人敬之

傷寒

撮要

發汗法凡發汗欲令手足俱周濺濺然一時許為佳不
欲如水淋漓服湯中病即已不必盡劑然發汗須如
常覆腰以上厚衣覆腰以下蓋腰以上淋漓而腰以
下至足心微潤病終不解凡發汗病證仍在者三日

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

內可二三汗之令腰腳間周遍為度

轉下法凡轉下須體認得合下之證明白在陽明胃經
則不拘日數過時失下則氣血不通四肢便厥不識
返疑是陰厥復進熱藥禍如反掌若少陰腎經太陰
脾經下證悉具湯已更衣者止不須盡劑陽明病得
利瘡慎不中服補藥熱氣得補復成更復下之是重
困也宜消息安養之

取吐法凡取吐服吐藥後不大吐則當以手指撻之便



吐矣不吐稍增藥以吐為度若吐少病不除明日再服吐藥可至再三但虛人宜少吐藥力過時不吐者啜熱湯一升以助藥力不必盡劑吐訖便可食無復餘毒若服藥過多者飲水解之

水漬法以疊布數重新水漬之稍拭去水搭於脅上須臾蒸熱又漬令冷如前用之仍數易新水日數拾易熱甚者置病人於水中熱勢纔退則已亦良法也

葱熨法以葱一束以索纏如餅餠大去根葉惟存白三

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

寸許先以火熨一面令通熱勿至灼人乃以熱處著病人臍下以土熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹中更作三四餅遇一餅壞不可熨則易一餅候病人醒手足溫有汗乃止

蒸法以薪火燒地良久掃除去火可以水洒之取蠶沙柏葉桃葉糠粃皆可用相和鋪燒地上可側手厚上鋪草蓆令病人當上卧溫覆之夏月熱只布單覆之汗移時立至俟周身至脚心自汗熱熱乃用溫粉撲

止汗移上牀最得力者蠶沙桃葉柏葉也無蠶沙亦得單桃單柏葉亦得蒴藿葉亦可用粃糠乃助添令隨多少不用亦得此極急則可如治病得愈明年斯時慎莫再作再作或不治矣

凡煎藥之法須用銀石器微火熟煮不可太猛表汗下之藥每服煎至八分對病藥煎至七分滋補藥煎至六分不可極乾亦不可猛火驟乾恐傷藥力去滓服後留滓再煎

陽證

麻黃湯治足太陽膀胱經發熱頭痛身疼惡風無汗

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

而喘陽明合病喘而胃滿太陽病八九日不解以此發汗必衄乃解及治不得汗發衄陽明脈浮無汗而喘宜服脈但浮無餘證者與服若不溺腹滿加噦者不治

麻黃 三兩 去節 桂枝 二兩 甘草 一兩 杏仁 七十箇 去皮尖

右不此用服五錢水盞半煎八分去滓食前服覆取微汁夏至欲加知母半兩石膏一兩黃芩一分或汗出後無大熱而喘者去桂加石膏一兩春冬只依正方升麻葛根湯治傷寒時疫頭痛增寒壯熱肢體痛發熱



惡寒鼻乾不得睡小兒大人瘡疹已發未發皆可服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫衣及暴熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石及解傷酒膈熱口瘡咽疼

升麻 一兩

白芍藥 一兩

甘草 一兩

葛根 二兩

右剉散每服四錢水一盞半不拘時潮熱頭痛生薑三片葱白二根煎咳嗽涎盛生薑三片桑白皮七寸煎上膈熱薄荷黃芩各少許煎斑瘡未出加紫草楂根各半錢葱白貳根煎挾熱酒後傷風感寒痰盛氣

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

促金沸草散方見後合和生薑三片薄荷七葉桑白

皮七寸烏梅一箇煎小兒量度多少老人加人參倍

白芍藥各五錢大段寒即熱服熱即溫服

近人以藥性寒涼不

肯輕服然治證相對服之何妨

金沸草湯治風壅痰盛頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩疼胃膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠粘時行寒疫壯熱惡風有寒一則汗出風盛則解利

金沸草

去梗三兩

荊芥穗

四兩

麻黃

去根節三兩

甘草

一兩

半夏

湯洗七次一兩

赤芍藥

一兩

前胡

三兩

右剉散每服三錢水一盞半入生薑三片桑白皮七寸烏梅一箇煎頭疼柚葉半皮牙疼熟煎灌嗽諸風及大腑風秘左脇刺痛每料加枳殼一兩去穰風熱結在臟腑煩燥氣壅腹痛大便秘以葱白研爛微火炒過布巾盛熨臍後加大黃朴消薄荷各五錢服速效諸風發散並用姪婦傷寒頭痛旋疼肚熱心燥加白朮人參黃芩生石膏各一兩熱嗽加甜葶藶馬兜

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

鈴薄荷生桑白皮各半兩烏梅四錢仍就吞半夏丸

方見後咳嗽類咽喉焦燥加朴消五錢食後服

小柴胡湯治傷寒四五日寒熱胃脇滿痛默默不欲食

心煩或嘔渴或腹痛或脇下痞鞭或心下悸小便不

利或不渴胸有微熱或咳或過經未解潮熱未除半表

半裏非汗非下之證瘥後勞復昏熱婦人傷風經水適

斷此為熱入血室故便如瘧狀產後傷寒頭疼發熱小

兒寒熱亦治之



柴胡 二兩
去蘆

半夏 湯洗七
次六錢

人參 去蘆

粉草 各三錢

右剉散每五錢水一盞半薑五片棗一枚煎至六分
食前服腹痛去黃芩每料加芍藥三分心下悸小便
不利去黃芩加茯苓一兩不渴外寒裏熱去人參加
桂三分溫服覆取微汗愈咳嗽加五味子潤者三錢
胃中煩加枳實五錢渴加人參枳實各五錢脇下痞
鞭去棗加煨牡蠣粉枳實各五錢過經不解日晡發
熱已而微利加芒消五錢引飲有汗加茯苓桂枝各
五錢身熱臟腑微澹加厚朴五錢煩熱每服加白茅
根二根白竹青一塊如大指頭大麥門冬半錢熱腹
疼加白竹葉七皮赤芍藥枳殼各一錢鼻衄加生地
黃二錢白茅花一握痰盛或喘加桑白皮七寸烏梅
一箇煎服裏熱外寒加桂半錢
大柴胡湯治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便
祕澀腹滿脹痛語言譫妄心中痞鞭飲食不下或心下

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

急鬱鬱微煩或口生白胎或不大便五六日繞臍刺痛
時發煩燥及汗後如瘧日晚發熱或發熱汗出或六七
日目中不了了睛不和無表裏證身微熱者裏實也凡
臟腑實脈有力者可服之輕則柴胡重則承氣

枳實

去穰炙
半兩

柴胡

去毛蘆
半斤

大黃

二兩

赤芍藥

三兩

半夏

湯洗七次
二兩半

黃芩

三兩
去心

右五味勻散入半夏拌勻每服三大錢水一盞半入
生薑三片紅棗一枚或加苦竹葉十皮煎至一中盞
去滓溫服食後臨睡服大熱用苦竹瀝一合此藥治
傷寒內熱裏實若身體疼痛表證未解不可服之春
合溫而清涼夏發燥疫此方妙
小承氣湯治傷寒日深恐有燥屎腹中轉失氣乃可攻
之不轉失氣者必初硬後澹未可攻之攻之則腹滿不
能食飲水而噦其後熱大便復硬若腹大滿不通或陽
明多汗津液外出腸胃燥熱大便必硬而譫語脈滑吐
下微煩小便數大便結或下利譫語自得病二三日脈



弱無太陽證柴胡證煩燥心下結至四五日雖能食少
少與承氣湯和之令小安

大黃 四兩 厚朴 去麤皮 炙 二兩 枳實 炙 去穰 五錢

右剉散每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服以利
為度未利再服

大承氣湯治表裏俱熱病勢更甚者陽明脈遲汗出不
惡寒反惡熱身重短氣狂語如見鬼狀劇者發則不識
人循衣摸牀惕而不安微喘直視陽明裏熱或吐下後

欽定四庫全書
世醫得效方
卷一

不解大便五六日不利日晡潮熱心胃煩熱而懊懣復
如瘧狀脈沈實或小便不利或腹滿實痛而渴脈實數
而沈腸胃燥甚留飲不散胸腹高起痛不可忍但嘔冷
液大渴反不能飲強飲不能止喘急悶者

大黃 酒洗 四兩 芒消 三合 厚朴 半斤 炙 去麤皮 枳實 一兩 炙

右剉散每服五錢水二盞先煮厚朴枳實至一盞餘
下大黃煮取八分去滓入消再煎一沸溫服以利為
度未利再服

調胃承氣湯治諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸然者
或日深心下溫溫欲吐胃中痛大便澹腹滿鬱鬱微煩
先此時吐下者或日深裏熱譫語法當下之以銀粉巴
豆燥熱大毒丸藥下之致真陰損虛邪熱轉甚因而協
熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成結胃
但為熱利不止心下滿鞭或痛煩渴咽乾膝骨數而實
諸腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便鞭脈滑實緊

大黃 芒消 甘草 各等分

欽定四庫全書
世醫得效方
卷一

右剉散每服五錢水二盞煎至六分去滓下消再煎
一沸溫頓服之

三物湯治感冒風寒鼻塞語音不出頭痛拘倦 方見咳

敗毒散治傷寒時氣頭痛項強發熱惡寒肢體煩疼咳

嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱

人參 去蘆 赤茯苓 去蘆 甘草 前胡 去苗

川芎 羌活 去蘆 北柴胡 去苗 枳殼 去穰 炒

桔梗 去蘆 已上 各等分



右剉散每服四錢水一盞半生薑三片薄荷葉五皮同煎熱服不拘時候傷濕腰疼加白朮木瓜各等分		脚痛加天麻一兩脚氣壅盛多熱赤腫加大黃炒蒼朮各等分不過一二服立愈瘟疫傷寒頭痛目昏發		熱增寒脚腰疼甚多風多痰多氣或處卑濕脚弱亦		效傷寒鼻衄加白茅根生地黃各一兩瘡瘍癰疹加		蟬蛻十箇 食去足 防風五錢癰疽初發赤腫寒熱用升		麻葛根湯 方見前 合和加生地黃紅內消麥門冬 去心		各一兩煎熱服立散尋常風寒溫氣流入經絡腰脚		疼痛或痺弱五積散 方見後 對合加木瓜川牛膝 去苗		檳榔切碎各一半煎立效冬合寒而溫暖春發瘟疫		大效		陰證		治中湯治太陰傷寒手足溫自利不渴腹滿時痛咽乾		其脈尺寸俱沈細		人參		乾薑 炮		白朮		甘草 炙	

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服		五積散調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹		滿胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞		悶頭目昏暈肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進		及婦人血氣不調心腹撮痛經候不調或閉不通及口		中冷背心惡寒並宜服之除麻黃又名異功散		白芷 一兩半 陳皮 去白三兩 厚朴 去麤皮切薑汁炒乾三兩		桔梗 去蘆六兩 枳殼 去穰三兩 川芎		白茯苓 去皮各一兩半 蒼朮 十二兩米泔浸去皮汁炒赤		當歸 去蘆尾一兩半 麻黃 去根節三兩 楊芍藥 一兩半		半夏 湯洗七次一兩半 肉桂 去麤皮一兩半		右除白芷肉桂二味為散另入外一十三味同為剉		散慢火炒令色轉攤冷次入肉桂白芷冷勻每服三		錢水一盞半入生薑三片煎至一中盞去滓稍熱服		如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄利清	



欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

穀及瘕癖癥瘕膀胱小腸氣痛即入煨生薑三片鹽
少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背強
痛入葱白三寸豉七粒同煎若但覺惡寒或身不甚
熱肢體拘急手足厥冷即入炒茱萸七粒鹽少許同
煎如寒熱不調咳嗽喘滿入棗二枚煎風寒溫氣交
互頸項強或半身偏疼或復麻痺及卒中風重者多
加麝香末寒溫腰痛每服加桃仁七枚去皮尖滿身疼
加白膠香太陽經傷寒手足逆冷或積聚腹痛及虛
汗不止脈細疾面青嘔吐加熟附子數片炒茴香一
捻冷氣煨薑三片鹽少許煎婦人經候不調或腹中
血塊加酸米醋一合難產亦加米醋一合脚氣冷者
每服加茱萸十粒木瓜三片大便秘加大黃二錢脚
氣下疰蒸然赤腫增寒壯熱亦加大黃一錢利之久
虛脾泄傷食腹痛冷瀉不止每用略炒過加陳米一
撮烏梅一箇煎名和氣散特效心腹膨脹不食亦效
乳癰初作加川牛膝生地黃各二根產後或尋常血

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

氣痛並加木香玄胡索半錢醋炒陳艾葉七皮烏藥
半錢婦人體虛脚疼加生川烏去皮臍切四片麝香少
許夏合熱寒氣折之秋發寒疫大效
人參養胃湯治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏
疼肢體拘急不問風寒二證均可治療須令澀澀微汗
自然解散若先有汗則溫服不須更汗兼治飲食傷脾
或外感風寒濕氣發為痲瘡及山嵐瘴疫常服尤佳
厚朴去麤皮切薑汁拌炒乾蒼朮米泔浸切炒黃色
半夏湯洗七次各一兩白茯苓去皮半兩甘草二錢半
人參去蘆草果去煨皮藿香去土各半兩橘紅去白七錢半
右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎
空心熱服虛寒加炮附子數片體虛寒瘧加肉桂炮
附子各一錢重兼紅丸子每服三十五粒方見後瘧瘧類
藿香正氣散治傷寒頭疼增寒作熱上喘咳嗽五勞七
傷五般風痰五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡氣泄霍亂
臟腑虛鳴山嵐瘴癘偏身虛腫婦人產前產後血氣刺



痛小兒疳傷並宜服之

大腹皮

一兩 洗

藿香

三兩 洗去土

厚朴

去麤皮切薑汁拌炒

白朮

各二兩 去蘆

陳皮

三兩 去白

白芷

一兩

苦梗

二兩 去蘆

白茯苓

去皮一兩

甘草

炙二兩

半夏

七次 湯洗

紫蘇

各二兩 去土

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗一枚同

煎熱服如欲出汗加葱白二根以衣被蓋再煎服冷

嗽喘滿每服加人參一錢鹽梅一箇杏仁七粒去皮

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

尖北五味子十粒就吞青州白丸子三十五粒效氣

促氣壅加人參一錢沈香半錢心腹痛加木香半錢

玄胡索七粒切碎嘔惡甚加生薑五片木瓜二片痰

嘔加烏梅一箇寒濕腰痛心腹膨滿加生薑三片木

瓜二片蒼朮切炒枳殼煨去穰切各半錢檳榔半箇

切片一方治憂怒鬱氣流走遍身刺痛緊滿加木香

一錢縮砂五粒名增減順氣木香散

四逆湯治陰證傷寒自利不渴嘔噦不止吐利俱作小

便或澀或利脈微欲絕汗出過多腹痛脹滿手足厥冷

或欬或悸內寒外熱下利清穀四肢沈重汗出熱不去

者一切虛寒厥冷傷寒病在表誤下藥下利不止雖覺

頭疼體痛發熱惡寒四肢拘急表證悉具未可攻表先

服此藥助陽救裏少陰病背惡寒口燥咽乾此主之

丁香

五分

乾薑

二兩

附子

去殼一枚生用去皮臍

右剉散每服四錢水一盞半煎六分去滓溫服服此

藥利止而無血者加人參半兩面赤加連根葱白九

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

莖臨煎熟旋入腹痛去葱白加芍藥二兩嘔者加生

薑二兩咽痛去芍藥加苦梗一兩利止脈不出者去

苦梗加人參二兩霍亂吐瀉後亦宜服此大汗出熱

不去內拘急四肢疼下利厥逆惡寒大下利厥冷者

主之

四逆散治少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或

腹中痛或泄利下重者此主之

甘草

炙

柴胡

枳殼

去白穰炒黃

芍藥

各一兩



右為末米飲調下二錢日三服效者加五味子乾薑各半兩下利悸者加桂半兩小便不利者加茯苓半兩腹中痛者加附子半枚炮製泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢匕再煮一二沸溫服	
順元散此藥能溫內外感寒脈遲細沈伏手足冷毛髮慄慄傷寒裏證大嘔數盃手足溫汗出乃愈治氣亦效通血脈和一切氣無出此藥冒風濕手足緩弱不能動轉倒頭須數人扶策三服後次日能步履脫然	
欽定四庫全書	世醫得效方
三建湯	方見病類
脈微身體冷重自汗嘔吐加丁香胡椒各半兩	
瓜蒂散治手足厥冷脈乍緊邪結在胃中心中滿而煩飢不能食病在胃中當須吐之	
	方見後
茯苓甘草湯治厥而心下悸宜先治水却治厥不爾水清入胃必作利	
茯苓	桂枝 各二兩
	生薑 三兩
	甘草 一兩
	各細切
右四味以水四升煮取二升去滓溫分三服	



麻黃升麻湯治傷寒六七日大下後寸脈沈而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止為難治此方主之	
麻黃	二兩半
升麻	一兩
當歸	一分
知母	一分
黃芩	各十八銖
芍藥	各十八銖
石膏	白朮
天門冬	去心
桂枝	各六銖
甘草	細剉
右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮去三升去滓分溫三服相去如三斗炊米頃令盡汗出愈	
灸法治陰證傷寒於臍下一寸半氣海穴二七壯小作艾炷於臍心以鹽填實灸七壯立效二寸丹田三寸關元皆可灸	
和解	
香蘇散一方加沈香名沈香飲子治四時傷寒傷風傷濕傷食大人小兒皆可服	



香附子 五兩 炒去毛 紫蘇 去根 二兩半 陳皮 二兩 甘草 二兩

蒼朮 二兩 切片 米泔浸炒黃

右剉散每服四錢水盞半生薑三片葱白二根煎不拘時候得汗為妙頭痛加川芎白芷北細辛荊芥穗每服各半錢咳嗽聲重痰多涕稠加半夏苦梗烏梅各半錢桑白皮七寸心疼加石菖蒲半夏各半錢泄瀉木瓜藿香各半錢傷濕自汗時行暴瀉生薑三片車前子一撮或用香附子陳皮各一兩以石器滴酒

欽定四庫全書
世醫得效方
卷一

炒黃色為散煎熱服感寒濕日久腰脚疼行步難酒煎服或濕氣久留脾疼身體與手足倦怠腹脹滿或有氣上衝有類虛損實非虛損此主之食積腹痛泄瀉葱白二根烏梅一箇并吞服盧氏感應丸菉豆大三七粒 方見諸積類 脚氣每服檳榔木瓜大腹皮枳殼木香各少許鹽酒水煎空心服感風宿食不化潮寒腹痛作瀉惡風四肢拘急生薑三片烏梅一箇葱白二根就服盧氏感應丸瘧疾桃柳枝七寸薤白二箇頭痛

作惡加鹽少許男女冷氣加茱萸一撮食鹽少許婦人血氣加莪朮茴香烏藥當歸所加量病人虛實增減除香附子紫蘇加厚朴桔梗藁本各四兩名和解散乃平和之劑隨病用之

香葛湯治四時感冒不正之氣頭痛身疼項強寒熱嘔惡痰嗽腹痛泄瀉不問陰陽兩感或風寒濕痺服之大效

紫蘇 去根 白芍藥 香附子 炒去毛 川升麻

白乾葛 薄陳皮 各一兩 白芷 大川芎 各半兩

欽定四庫全書
世醫得效方
卷一

蒼朮 米泔浸切炒 黃色一兩 大甘草 半兩

右剉散每服四大錢水一盞半生薑三片煎熱服不拘時候如發熱無汗遍身疼痛加葱白二根豆豉七粒煎熱服得汗即解嘔去蒼朮加白朮數片藿香數葉中脘脹滿大便秘加枳實檳榔各半錢有痰加半夏半錢咳嗽加五味子七粒鼻塞加桑白皮三寸腹痛加枳殼半片去穰切泄瀉加木香二片老人產婦嬰兒皆可服如傷寒不分表裏以此藥導引經絡不



致變動其功非淺如熱多口渴心煩臟腑堅或加前
胡無汗可加麻黃汗太過加麻黃根時行寒溫泄瀉
頭疼發熱自汗大效

參蘇飲治一切發熱頭疼體痛服之皆效不必拘其所
因小兒室女尤得其宜用藥致和而且平故也痰因停
積中脘閉塞眩暈嘈煩怱悻悻嘔逆不食有如氣隔
痰氣停滯關節不利手足譁曳筋脈攣急類乎中風食
已即吐發熱頭痛百節煩疼狀似傷寒但連日頻進此

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

藥以病退為期不可預止蓋本方乃集二陳湯半夏茯
苓湯枳實半夏湯也

人參 去蘆

白茯苓 去皮

紫蘇葉

半夏

湯洗七次

乾葛 去皮

前胡 去蘆各七錢半

枳殼 去穰炒

陳皮 去白

桔梗 去蘆

粉草 炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚同
煎熱服不拘時候發熱頭疼每服加川芎半錢葱白
二根咳嗽加五味子七粒桑白皮七寸煩燥麥門冬



迪志文化出版有限公司出版

二十粒 去心 痰嘔口燥咽乾烏梅一箇男子婦人虛
勞發熱加麥門冬二十粒 去心 氣盛或氣虛人痰氣
上壅咽喉不利哮喘有聲氣息短急上盛下虛加木
瓜半錢北五味子五粒乾桑白皮七寸尋常感冒風
寒鼻塞流涕頭目昏重加川芎白芷各一錢葱白
二莖疝氣初發必先增寒壯熱甚者嘔逆惡心每用
此藥加木香半錢寒熱必退腹痛加揚芍藥一錢
沖和散治寒溫不節將理失宜乍煖脫衣甚熱飲冰坐

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

卧當風居處暴露風雨行路衝冒霜冷臨晨早起呼
吸冷氣久晴暴煖忽變陰寒久雨積寒致生陰濕如此
之候皆為邪厲侵傷肌膚入于腠理使人身體沈重肢
節酸疼項背拘急頭目不清鼻塞聲重伸欠淚出氣壅
上盛咽渴不利胃膈凝滯飲食不入凡此之證若不便
行解利伏留經絡傳變不已

蒼朮 六兩

荊芥穗 二兩

甘草 一兩一錢半

右剉散每服三錢水一盞半煎至八分去滓熱服不



迪志文化出版有限公司出版

拘時候并滓再煎纔覺傷寒及覺勞倦亦須服之不問虛實老幼悉皆治之

小柴胡湯為用最多而諸家屢稱述之蓋以柴胡半夏能利能汗凡半表半裏之間以之和解皆可用也抑不知小柴胡非特為表裏和解設其於解血熱消惡血誠有功焉蓋傷寒發熱一二日間解散不去其熱必至於傷血不問男女皆然此藥內有黃芩柴胡最行血熱所以屢獲奇功但藥性差寒用之貴能加減今推明活法

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

凡表發熱裏又有燥渴糞硬熱證者是為內外俱熱小柴胡加大黃裏無熱證但發熱在表者小柴胡加桂枝主解表可以溫血所謂陰盛惡寒并辛發散者此也大黃主攻裏可以蕩滌血熱所謂陽盛內熱酸苦湧泄者此也是又別其解表以溫攻裏以寒之義若遇少陽本證又無表裏證或表裏不分之證但依本方用之並不須加減此為正訣虛者少與尤在酌量治療傷寒輒用當歸其意蓋為調血既不思一滯中脘二佐痰飲三泥

胃氣而血熱又非當歸之所能除惑之甚矣否則熱入血室張氏特以小柴胡主之何哉雖然均是和解耳局方以和解散平穩之劑為和解張氏以小柴胡差寒之劑為和解意安在哉蓋局方和解散為尋常感冒平和解散設也若夫熱在半表半裏既不可汗又不可下非小柴胡一劑孰能內和而外解之乎淋家衄血家法不可汗亦可以此和解然而學者僅以小柴胡收效不遵格法輕用大柴胡立意一差禍不旋踵吁可畏哉又今人但聞小柴胡之藥多見棄而不服殊不知陰證似陽浮熱於外用之則誤人多矣的是陽證或半表半裏用之無不伐病所愧者醫之不審陰陽致使病家之惑聞者但當責之於醫不當輕議於藥

方見前

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

藁本

去

羌活

去

甘草

炙

香白芷

細辛

去
及土

川芎

各一兩

蒼朮

五兩
米泔浸
一宿切炒



右剉散每服三錢水一盞生薑三片葱白三寸煎七分溫服不拘時候傷風鼻塞為末葱白水清調下
二香散治四時感冒冷濕寒暑嘔惡泄利腹痛瘴氣飲冷當風頭疼身熱傷食不化

紫蘇

陳皮

蒼朮

各一兩

香薷

去根二兩

香附子

二兩半
炒去毛

厚朴

去麁皮薑汁拌炒

甘草

扁豆
各一兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片木瓜二片葱

欽定四庫全書



世醫得效方
卷一

白二根煎熱服外感腫滿先以此多加車前子木瓜

煎效

相類

痰證金沸草散治增寒發熱惡風自汗寸口脈浮胷膈痞滿氣上衝咽不得息頭不疼項不强
大半夏湯治膈間有寒痰

半夏

湯洗如法
薄切焙乾

白茯苓

生薑

各一兩

右剉散水二盞半煎至一盞去滓臨睡溫呷如有熱



迪志文化出版有限公司出版

痰加炙甘草一分脾胃不和去甘草入陳橘皮一分
瓜蒂散治胃有寒痰當吐之諸亡血虛家不可與服

瓜蒂

熬黃

赤小豆

各半兩

右為末取二錢豆豉一合湯七合煎去滓取汁和末頓服藥下咽便卧欲吐且忍良久不吐取三錢豆湯二合和服之立便吐倉卒無藥糟瓜頓喫亦吐
稀涎散治涎結胸膈作為寒熱飲食減少

猪牙皂角

圓白半夏

各一兩

欽定四庫全書



世醫得效方
卷一

右剉散每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服入

咽便吐去涎即愈

食積治中湯治頭疼脈數發熱惡寒滿身不痛左手脈

平和名食積

方見前

虛人五積散人參養胃湯均可服

方見前

重者香蘇散取五錢水一盞半煎去滓併吞服感應丸

二七粒未效再服

感應丸方
見秘澀類

虛煩竹葉石膏湯治惡寒身不痛頭不疼脈不緊但煩



迪志文化出版有限公司出版

熱名虛煩凡有熱不宜大攻之熱去則寒起止宜服

此方見後

橘皮湯治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩

骨節疼痛目暈惡寒食則反惡穀不得入宜服此

橘皮 一兩半 枳實 半兩 人參 一分 竹茹 半兩

右剉散每服五錢水一盞半薑三片棗一枚煎食前服

溫膽湯治虛煩 方見雜病類

腳氣加減小續命湯治身熱肢節痛頭疼大便秘或嘔

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

逆但卒起腳弱為異耳名腳氣 方見風科虛證類

通治五積散性溫敗毒散性涼凡人遇些感冒對半雜

和煎服名交加散亦多驗小小感冒因風雨寒冷所襲

猝然得之正氣未耗邪氣未深用此先以助其正氣使

益壯則邪氣自當屏散若倉卒藥未能辦只以葱白連

鬚數莖豆豉一捻生薑數片水煎熱啜連進三兩盞亦

能發散若邪氣已入經絡及時行疫癘則須依經按法

表裏汗下不可差殊戒之 二方見前

雙解散治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷無問自汗汗後雜病但覺不快便可通解得愈小兒生瘡疹使其出快亦能氣通宣而愈

益元散 方見中暑類 防風通聖散 方見風科熱證類 三兩半

右一處和勻名雙解散每服三錢水一盞半生薑三片

葱白五寸豉二十粒煎至一盞溫服北方此藥大效

麻黃桂枝湯治厥陰傷寒煩滿發熱惡寒往來如瘧或囊

縮其脈尺寸俱微緩者主之若脈沈短其囊必縮急以承

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

氣湯下之可保五死一生承氣湯乃利陽明藥耳若病到

厥陰其勢已甚蓋陽明養宗筋為熱毒所攻乃以承氣湯

瀉其能養故利陽以救陰此猶假虞以伐虢圍魏救趙之

意也太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其

人不嘔清便自可一日三二度發脈微緩者為欲愈也脈微

惡寒者此陰陽俱解也以其不能得少汗出身必瘥宜服

桂枝 四錢 芍藥 麻黃 去節 杏仁 十二箇 甘草 炙各 一字

右剉散每服五錢水一盞半入生薑三片紅棗二枚煎



八分去滓食前服

白虎湯治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴欲飲水

及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時惡

風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中

暑毒汗出惡寒身熱而渴及治口中不仁背上惡寒效三陽

合病腹滿身重面垢譫語遺溺並不可汗下但少與服之效

石膏 一斤 知母 六兩 甘草 二兩

右剉散每服三大錢水一盞半加入粳米五十餘粒

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

同煎至一盞去滓溫服小兒量力少少與之或加人

參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服

春時及立秋後并亡血虛家並不可服不惡寒反惡

熱大便秘者亦服

大青龍湯治太陽中風傷寒脈緊發熱惡寒身疼不汗

出而煩渴或脈浮緩身不疼但重乍有輕時或傷寒見

風脈傷風見寒脈榮衛俱傷煩燥則用若脈微弱汗出

惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

桂枝 一兩 甘草 一兩 石膏 如半箇雞

杏仁 二十粒 麻黃 三兩 去節湯泡

右剉散每服五錢水一盞半生薑四片棗子一枚煎

至八分去滓溫服取汗為度若汗周身潤止後服未

周身潤可停待相次服盡不欲汗汗多恐亡陽故也

若汗多不止用溫粉撲之 方見後

小青龍湯治傷寒表未解心下水氣乾嘔發熱而欬

或渴或利或噎或小便不利小腹滿而喘者

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

麻黃 去節 細辛 去苗 乾薑 炮 甘草 炙

桂枝 芍藥 各三兩 半夏 湯去滑 五味子 各二兩半

右剉散每服五錢水二盞煎食前溫服虛噎去麻黃

加熟附子一錢小便不利小腹滿加茯苓一錢喘加

杏仁七粒去皮尖

溫粉凡發汗不欲多多則亡陽宜用此粉撲之神效

白朮 藁本 川芎 白芷

右為末一兩入米粉三兩均和撲之



真武湯治傷寒數日以後發熱腹疼頭目昏沈四肢疼痛大便自利小便或利或澀或嘔或咳並宜服之已經汗不解仍發熱者心下悸頭眩暈肉瞤動振振欲蹶地者此由渴後飲水停留中脘所致

白茯苓

白芍藥

白朮

各一兩

熟附子

一枚

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片葱六分食前溫服小便利者去茯苓大便利去芍藥加乾薑二兩咳者加五味子三分細辛乾薑各二兩嘔者去附子

欽定四庫全書



世醫得效方
卷一

每服加生薑五片又云水飲內蓄上乘於肺為喘為

咳因水而咳病在陽明則用小青龍湯主之病在陰

此藥主之

桂枝二越婢湯太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者

此無陽也不可發汗宜服之

屬太陽

桂枝

芍藥

甘草

石膏

六錢
欸碎

麻黃

半兩湯洗去
黃汁焙乾

右剉散每用五錢水一盞半生薑四片棗子一枚煎

八分溫服

小建中湯治陽脈濇陰脈弦腹中急痛服此不差者小

柴胡湯主之

前方見

芍藥

三兩

甘草

一兩

桂枝

去麤皮
一兩半

右剉散每服五錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎八分去滓下膠飴一兩許再煎化溫服兼治熱多寒少尺脈遲榮氣不足血少故也加黃耆一兩半尺脈尚遲再作一劑寒傷榮甚至入弱倦昏沈

加人參黃耆
各一兩半效

欽定四庫全書



世醫得效方
卷一

梔子升麻散治晚發傷寒三月至夏為晚發

梔子

十枚擘
碎蒸

升麻

一兩半

生地黄

半斤
切碎

柴胡

石膏

各二兩半

右剉散每服五錢水一盞半煎八分頻服病不解更

作頭面赤去石膏入乾葛二兩無地黃以鼓代之

解肌湯治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根

一兩

黃芩

各半兩

芍藥

各半兩

甘草

炙

右剉散每服五錢水一盞半棗子一枚煎八分日三服



三四日不解脈浮者宜重服發汗脈沈實者宜下之
漢防已湯治風濕脈浮身重汗出

甘草 炙 黃耆 蜜炙 各二兩 漢防已 四兩 白朮 三兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑四片棗子一枚煎
一中盞飲訖乃坐被中汗出如蟲行或被卧取其汗

白虎加蒼朮湯治濕溫多汗

知母 六兩 甘草 二兩 炙 石膏 一斤 蒼朮 三兩

粳米 三兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

右剉散每服五錢水盞半煎至八分取六分清汁溫服

葛根湯治傷風頭項強急身體反張屬太陽經先因傷
風又感寒濕名瘧病外證發熱惡寒與傷寒相似但其

脈沈遲弦細項背反張強硬如發癰之狀無汗惡寒名

剛瘧有汗不惡寒名柔瘧此藥主之 方見後有汗桂枝湯
加葛根方見傷寒類

小續命湯治剛柔二瘧有汗去麻黃加葛根 方見風科
虛證類

大承氣湯治剛瘧仰目胃滿口噤其人卧不著席脚攣

急咬齒與服得利則減極熱作瘧者難治 方見前

敗毒散治剛瘧加防風天麻黃芩全蝎各五錢生薑三
片薄荷七葉煎 方見前 仍用加味壽星丸薑汁竹瀝湯服

累用有效 方見風邪
通治類

附朮散治傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止項強直
搖頭口噤時發時止不食下泄者難治

附子 泡 白朮 各一兩 川芎 三錢 獨活 半兩

桂心 二錢

右剉散每服三錢水一中盞棗子二箇煎至五分溫

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

服不拘時候

附子防風散治傷寒柔瘧閉目合面手足厥冷筋脈拘
急出汗不止

白朮 五味子 白茯苓 川芎

乾薑 炮製 甘草 炙微 附子 炮製 去皮臍 防風 各三分
去蘆

桂心 半兩 柴胡 一兩半
去苗

右剉散每服三錢水一盞生薑四片煎至六分去滓

溫服不拘時候



八物白朮散治傷寒柔痙三日不瘥手足厥冷筋脈拘急汗不出恐陰氣內傷

白朮

白茯苓

麻黃

去節湯泡沸焙

五味子

羌活

各半兩

良薑 一分

附子

泡去皮臍

桂心

各三分

右散每服四錢水一盞薑四片煎至五分不拘時溫服

竹葉石膏湯治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胃煩悶得汗已解內無津液虛羸少氣胸中煩滿氣逆欲吐諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼頭不痛脈不

欽定四庫全書



世醫得效方
卷一

緊數不可汗下宜服

石膏

一兩六錢研碎

半夏

二錢半湯泡七次

人參

二錢去蘆

麥門冬

五錢半去心

甘草

炙二錢

右剉散入石膏末停勻每服四錢水兩盞入青竹葉

生薑各五片煎至盞半入粳米一百餘粒再煎米熟

湯成去米溫服不拘時候

附子細辛湯治少陰傷寒口中和而背惡寒反熱倦怠

無汗而渴其脈尺寸俱沈而緊者

麻黃

去節

細辛

附子

各半兩泡去皮臍

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

手足厥者去麻黃細辛加乾薑半兩甘草一分或口

燥舌乾而渴宜急下之

附子湯治少陰病得之一二日口中和背惡寒者即當

炙之少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沈者並宜服之

茯苓

芍藥 各一兩半

人參

一兩

白朮

二兩

附子

一錢炮去皮

欽定四庫全書



世醫得效方
卷一

右散每服四錢水盞半煎至七分去滓溫服日進三服

四逆湯治傷寒表裏俱病名兩感一日與太陽少陰俱

病頭痛口乾咽滿而渴二日陽明與太陰俱病腹滿身

熱不食譫語三日少陽與厥陰俱病耳聾囊縮而厥兩

病俱作治有先後先宜救裏臟氣內正急宜攻表救內

固宜急而表亦不可緩也救裏宜四逆湯身體疼痛清

便自調急當救表宜桂枝湯兩感傷寒古無治法惟證

治論并活人書解仲景治有先後之說皆云治有先後



者宜先救裏內纔溫則可醫矣然後救表亦不可緩也
以上所論並先救裏然後救表如下利不止身體疼痛
則先救裏如不下利身體疼痛則先救表此亦謂之治
有先後也兩感病亦有可活之理而不可必也方見前
人參養胃湯方見前 每用四錢生薑三片棗子二枚煎吞服
來復丹方見前 五十粒調和陰陽其病頓瘳世無不可
治之病醫不善醫信乎

葛根湯治太陽病項背強兀兀然無汗惡寒並治三陽

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

合病自利

葛根 一兩

麻黃 去節 三分

桂心

甘草 炙

芍藥 各半兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚煎七分

去滓食前溫服三陽合病不下利但嘔者加半夏六錢

脾約丸治太陽陽明脾約是也大便秘堅小便利者其脾為約

大黃 二兩 酒浸

厚朴 去麤皮

枳殼 去穰

白芍藥 各半兩

麻子仁 三分

杏仁 一兩半 另研

右為末煉蜜和杵一千下丸如梧桐子大每服二十
丸溫水下不拘時候未效加五丸十丸至五十丸下
利後服麋粥將理

附子散治陰毒傷寒為病手足冷腰背強頭疼腹痛或
煩渴精神恍惚額與手背時出冷汗聲鄭重爪甲唇面
色青黑多因脾腎虛寒伏陰重感於寒所致或因服冷
藥過多心腹脹滿昏不知人

附子

炮 去皮 三分 桂心

當歸 去尾

白朮 各半兩 去蘆

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

半夏

湯泡 去滑

乾薑 各一分 炮

右剉散每服三錢水二盞生薑三片煎至六分不以

時熱服衣覆取汗

返陰丹治陰毒傷寒心神煩燥頭痛四肢逆冷面青腹

脹脈沈伏者

硫黃

通明 五兩 別研

消石 別研

太陰玄精 各二兩 別研

乾薑

炮

桂心 各半兩

附子

炮 半兩

右用鐵銚先鋪玄精次下消末各一半中間鋪硫黃



末又將二石餘末蓋上以小盞合著熟炭火三斤燒令得所勿令煙出急取瓦盆合著地上四面灰蓋勿令煙出候冷取出研細入後藥為末同研勻米糊丸梧桐子大每服二三十丸煎艾湯下頓服汗出為度未退乃大著艾炷灸臍下丹田氣海更不退則以葱啗熨之其法亦治氣虛陽脫體冷無脈氣息欲絕不省人事及傷寒陰厥百藥不效其法見前

四逆湯治陰毒要藥 方見前

欽定四庫全書 世醫得效方卷一

當歸四逆湯治手足厥寒脈細欲絕者亦陰毒要藥

當歸 去尾 桂枝 芍藥 細辛 各三兩

大棗 二十枚 甘草 炙 通草 各二兩

右剉散以水八升煮二升去滓溫服一升日三服內有久寒者加吳茱萸生薑主之

升麻湯治陽毒傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或走或見鬼或下利面赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血脈浮大數五

日可治七日不可治大抵宜早發汗

升麻 二兩 犀角屑 射干 黃芩

人參 甘草 炙 各一分

右剉散每服五錢水一盞煎至七分熱服併進三四服溫覆汗出為度甚者大承氣湯除厚朴加木通并草大腹皮桃仁各一兩以利為效 方見前

梔子仁湯治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子 赤芍藥 大青 知母 各一兩

欽定四庫全書 世醫得效方卷一

升麻 黃芩 石膏 杏仁

柴胡 甘草 各半兩

右剉散每服四錢水一盞薑三片豉二十粒煎至七分不拘時候服

大陷胷湯治傷寒表未解醫反下之膈內拒痛兩手不可近短氣煩燥心中懊懣心下鞭大便不通舌燥而渴熱實脈沈而緊又治身無大熱有水結在胸脇間者

大黃 半兩 芒硝 四兩 甘草 半兩



右剉散用水三盞先煎大黃至一大盞入芒消煑鎔下并遂末煑一沸分二服得利止

小陷胷湯治胸結病正在心按之則痛脈浮滑者

黃連 一分 半夏 湯洗去滑六錢 栝樓實 四分

右剉散水二盞先煎栝樓至一盞半入前藥煎至六分去滓分二服利黃涎沫即安一方加枳實去穰黃芩各一分苦梗六錢累用有效

大陷胷丸治熱實結胸滿發於陽而反下之熱入因作

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

結胸以下之太早故也其病項強如柔瘕狀下之則和

大黃 二兩 葶藶 杏仁 去皮尖炒 芒消 各三分

右前二味為末將杏仁芒消合研為脂和藥取如彈子大一枚別研并遂末一錢白蜜一大匕水二盞煎至七分頓服一宿乃下如不下更服取下為效并遂性猛宜斟酌虛實入之

治結胷灸法

巴豆 小四粒 黃連 七寸連皮用

右為末用津唾和成膏填入臍心以艾炷其上腹中有聲其病去矣不拘壯數病去為度纔灸了便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡

枳實理中丸治寒實結胸及傷寒諸吐利後胸痞欲絕膈高起急痛手不得近

枳實 去穰麵炒 茯苓 人參 白朮

乾薑 炮 甘草 各等分炙

右為末蜜和一兩作四丸熱湯化下渴加栝樓根下

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

利加牡蠣粉各等分為末服亦可

桔梗枳殼湯治傷寒氣痞胸滿欲死

枳殼 去穰麵炒 桔梗 去蘆 甘草 各等分

右剉散每服五錢水一盞半煎七分食前服痰多加半夏生薑有熱加黃芩

三黃湯治傷寒陰證下之太早致心下痞按之軟其脈關上浮者主之若未解未可攻宜先隨風寒二證投桂枝麻黃湯表解已即服此



大黃 蒸

黃連

黃芩 去心

右剉散每服五錢沸湯二盞熱漬之一時久去滓分二服暖服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合同服半夏瀉心湯治心下痞滿而不痛者

半夏 一兩一錢湯洗七次

黃芩 去心 人參 去蘆

甘草 炙

乾薑 炮各兩半 黃連 半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分

溫服或傷寒中風醫反下之下利日數十行穀不化

欽定四庫全書

世醫得效方卷一

腹中鳴心下痞鞭乾嘔心煩者加甘草半兩人參一

兩名甘草瀉心湯或汗出解後胃中不和心下痞硬

乾噎食臭脇下水鳴下利者加生薑一兩減乾薑一

兩餘如正方名生薑洗心湯一方治痰熱心胃煩痞

半夏丸酒蒸黃連丸合和每服三十五丸米飲下特

效 方見痰麻及下痢類

近效方治陽證結胸死無可藥者曲蟻活者十一條

蛭即

也 搗爛用蜜半盞水半碗灌服無蜜用沙糖

丁香柿蒂散治欬逆 諸方並見後第四卷

百合知母湯治病人欲食復不能食常默默欲卧復不能卧欲行復不能行有寒如無寒有熱如無熱飲食或美或不美如強健人而卧不能行口苦小便赤藥入口即吐利此因虛勞大病之後不平復變成此疾名百合候此主之發汗後者服

百合 七枚擘 知母 三兩切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉

欽定四庫全書

世醫得效方卷一

水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母每取

一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯治百合病下之後者

百合 七粒擘 滑石 三兩碎綿裹 代赭 如彈子大一枚碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉

水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭

取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服不拘時候

雞子湯治百合病吐之後者



百合七枚 雞子黃十箇

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉

水二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻五分溫服

百合洗方治百合病一月不解變成渴者

百合 水一斗漬一宿以洗身已食煑餅勿以鹽豉

玄參升麻湯治傷寒失下不當下而下之熱毒在胃發

斑如錦紋甚則煩燥譫語兼治喉關腫痛

玄參 升麻 甘草各半兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

右剉散每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服溫毒

亦能發斑也

知母麻黃湯治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守言

語錯謬或潮熱頰赤寒熱如瘧皆由汗下不止毒在心

胞間所致也

知母一兩半 麻黃去節 甘草炙 芍藥

黃芩去心 桂心各半兩

右剉散每服五錢水一盞半煎七分溫服日三四服

若心煩欲飲水稍稍與之

黑奴丸治傷寒調理失序醫所不治及時行疫病七日

不汗脈洪數面赤目瞪身熱煩燥狂言欲走大渴或口

噤精魄已散但心下暖幹開口灌藥下咽即活亦治陽

毒發斑

麻黃去節 大黃各二兩 芒消 釜底煤別研

梁塵別研 小麥奴 竈突墨各一兩

右為末煉蜜為丸彈子大新汲水研下一丸渴者與

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

冷水盡飲之須臾當寒寒竟汗出便瘥若日移五尺

不汗依前法服一丸差須病人大渴乃可與之不渴

者勿服

無憂散治傷寒調理失序毒氣內結胸腹脹滿坐卧不

安日久不瘥狂言妄語大小便不通或復吐逆

腦月黃牛膽以天南星為末入膽內縛令緊當風避日懸之候乾取用

右為末以人參半兩煎湯七分盞調末二錢乘熱服

遲頃更以熱人參湯投之或睡便溺下黃黑惡物是效



桃仁湯治狐惑默默欲眠目不瞑惡飲食面目乍赤乍白乍黑齒無色舌上白聲啞咽乾此因大病後腸胃虛空三蟲求食食人五臟食其喉則為惑其聲啞食下部則為狐其咽乾當看上唇有瘡蟲食其臟下唇有瘡蟲食其肝

桃仁 去皮尖 槐子 碎 艾 各一兩

右剉散每服五錢水一大盞薑三片棗二枚煎七分

食前服之

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

白頭翁湯治熱利下重及欲飲水者

白頭翁 二兩 黃連 黃柏 秦皮 各三兩

右剉散水七升煮水二升去滓溫服一升不愈更飲

一升即效

黃連阿膠丸治同上 方見泄瀉類

黃連解毒湯治時疾三日已汗解或因飲酒後劇苦煩

悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧

黃連 三分 黃蘗 半兩 梔子 四枚 黃芩 一兩

右剉散每服五錢水一盞半煎取一湯盞去滓服未
知再服進粥以此漸差外臺云凡大熱盛煩嘔呻吟
詩語不得眠者傳此方諸人用之亦效此直解毒熱
除酷熱不必飲酒劇者

黃連犀角湯治傷寒及諸病後內有瘡出下部

黃連 半兩 烏梅 七個 犀角 无則以升麻代 木香 各一兩

右剉散每服五錢水一盞半煎七分食前服

雄黃兌散治下部蠱瘡

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

雄黃 研 青箱子 苦參 黃連 各二兩

桃仁 去皮尖 研一分

右為末以生艾搗汁和如棗核大綿裹納下部扁竹

汁更佳無艾只用綿裹散子納下部亦得

四逆湯治傷寒厥或表熱裏寒下利清穀食入則吐

或大汗大吐大下之後四肢冰冷五內拘急舉體疼痛

不渴脈沈者 方見前

白虎湯治熱厥腹滿身重難以轉側面垢譫語遺溺手



足厥冷自汗脈沈滑裏有熱也

方見前

大承氣湯亦治熱厥當觀病淺深量多寡飲之

方見前

黃連阿膠湯治少陰病得之二三日已上心中煩不得卧者

黃連 一兩 阿膠 三分 雞子黃 半箇 黃芩 一分

芍藥 半兩

右剉散每服四錢水二盞煎取一盞去滓內膠消盡

內雞子黃攪令和溫服日二服

文蛤散病在陽應以汗解之反以冷水噉之熱被寒水入

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

裏却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者宜

服若不差者與五苓散寒實結胸無熱證者與三物白散

文蛤 一兩

右為散沸湯和服方寸匕湯用五合

三物白散治寒實結胸無熱證者

屬太陽

貝母 三分 桔梗 三分 巴豆 去心皮熬黑

去蘆 研如脂 一分

右為散內巴豆研和以白飲和服強人半錢匕羸人

可減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一



盃利過不止進冷粥一盃身熱皮粟不解欲引衣自

覆若以水噉之洗之益令熱却不得出當汗而不汗

則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

十棗湯太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人挾

穢汗出發作有時頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短

氣汗出不惡寒者此表解裏未和也宜服

方見痰飲類

抵當湯太陽病六七日表證仍在脈微而沈反不結胸

其人發狂者以熱在下焦小腹鞭滿小便自利者下血

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也或太陽病

身黃脈沈結小腹鞭小便不利者為無血也小便自利

其人如狂者血證諦也或傷寒有熱小腹滿應小便不

利今反利者為有血也當下之不可餘藥並宜服

屬太陽

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血

故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑者宜此藥下之

或病人無表裏證發熱七八日雖脈浮數者可下之假

令已下脈數不解今熱則消穀喜飢至六七日不大便

者有瘀血宜服屬陽明

大黃一兩去皮酒洗 蟪蟲十箇去足 桃仁七粒去皮尖槌碎

水蛭十箇熬去子杵碎水蛭入腹再生化為害尤甚須剉折用石灰炒再熬

右為散作二服水二盞煎七分去滓溫服

吳茱萸湯食穀欲嘔屬陽明也此主之得湯反劇者屬

上焦也屬陽明 少陰病吐利手足逆冷煩燥欲死者或乾

嘔吐涎沫頭痛者此病主之屬少陰

人參一兩去蘆 吳茱萸一兩六錢半湯洗三次

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

右為散每服四錢生薑四片棗子一枚水二盞半煎

八分去滓分二服

苦酒湯苦酒米醋是也 治少陰病喉中傷生瘡不能語言聲不

出者

半夏洗碎如棗核十四枚 雞子一箇去黃內苦酒著雞子殼中

右內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令

二三沸去滓少少含嚥之不差再服

牡蠣湯治發汗多頭眩汗出筋惕肉瞤

白朮 牡蠣粉炒黃 防風獨荳者去蘆頭各等分

右為末每服二錢以酒調下米飲亦可日二三服汗

止便服小建中湯方見前

陰旦湯治傷寒肢節疼痛內寒外熱虛煩

芍藥二兩 甘草二兩炙 乾薑三兩炮 黃芩三兩

桂四兩

右剉散每服五錢棗子二枚水一盞半煎八分去滓

溫服日三夜二覆令小汗

欽定四庫全書 世醫得效方 卷一

大白朮湯治陰毒傷寒心間煩燥四肢逆冷

白朮 附子炮製去皮臍 川烏頭製同 桔梗去蘆頭

右為末每服二錢水一中盞煎至六分不拘時稍熱服

回陽丹治陰毒傷寒面青手足逆冷心腹氣脹脈候沈細

華澄茄 木香 乾蠍 附子炮製去皮臍

硫黃細研 吳茱萸湯浸七次焙乾微炒各半兩 乾薑一分

右為末酒煮麵糊丸如梧子大每服三十丸不計時候

生薑湯下頻服三服復以熱酒一盞投之厚衣蓋取汗



正陽散治陰毒傷寒面青口張出氣心下硬身不熱只額上有汗煩渴不止舌黑多睡四肢俱冷

甘草 一分炙微赤剉 麝香 一錢細研入 附子 一兩炮製去皮尖

乾薑 一分炮製剉 皂莢 一挺去皮塗酥炙令黃色去子

右為末每服二錢水一中盞煎至五分不拘時熱服肉桂散治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆冷昏沈不識人變為陰毒

肉桂 去麤皮 高良薑 剉 厚朴 去皮薑汁炙令香熟

欽定四庫全書
世醫得效方
卷一

白朮 各三分 人參 去蘆頭 赤芍藥

陳橘皮 炮製去 前胡 去蘆頭 當歸 各一兩

吳茱萸 半兩炒黃

右剉散每服四錢水一盞棗三枚煎六分去滓不拘

時稍熱頻服

陽毒升麻湯治傷寒三日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或走或見鬼或下利脈浮大數面赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血五日

可治七日不可治

升麻 二兩 犀角屑 射干 黃芩

人參 甘草 各一分

右剉散每服四錢水一盞半煎至一盞去滓飲半盞

食頃再服溫覆手足出汗則解不解再服

大黃散治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂

甘草 炙微赤 木通 剉 大腹皮 各一兩剉 桂心 三兩

川芒消 二兩 川大黃 兩半剉碎 桃仁 二十一枚湯浸去皮尖雙仁麝炒令微青

欽定四庫全書
世醫得效方
卷一

右剉散每服四錢水一中盞煎至六分不拘時候溫

服通利為度

五柔丸老人虛人脚氣亡津液虛秘大便結調補三焦

大黃 四兩 前胡 一兩 半夏 洗七次 茯苓 浸酒

芍藥 茯苓 去皮 細辛 當歸

葶藶 炒各半兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大溫水下二十九以通為度



葛根橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癰癤如錦紋而欬心悶但嘔吐清水服此湯即靜

葛根

橘皮

杏仁

去皮尖
研炒

知母

黃芩

麻黃

去節
湯泡

甘草

炙
各半兩

右剉散每服五錢水一大盞煎至一中盞去滓溫服

知母桂心湯治傷寒後不差朝夕有熱如瘧

麻黃

一兩
去節

甘草

一兩
炙

知母

二兩或
作一兩

芍藥

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

黃芩

各一兩

桂心

二兩或
作一兩

右為散每服四錢水一盞半生薑四片煎一盞去滓

取八分清汁溫熱服日三覆令微汗若心煩不眠其

人欲飲水當稍稍與之令胃中和則愈

增損四物湯治少陰下利手足冷無熱候者

甘草

二兩
炙

人參

龍骨
各二兩

黃連

乾薑

各一兩

附子

一枚
去皮臍

右剉散每服三錢水一盞煎七分日三服不差復作

下利腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩

化斑湯治斑毒

人參

石膏

各半兩

萎蕤

知母

甘草

各一分

右剉散每服五錢匕水一盞半入糯米一合煎八分取米熟為度去滓溫服

黃連橘皮湯治溫毒發斑

黃連

四兩
去蘆

陳橘皮

杏仁

去皮
尖

枳實

炙

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

麻黃

去節
湯泡

葛根

各二兩

厚朴

薑汁
炒

甘草

各一兩
炙

右剉散每服五錢水一小盞半煎至一盞去滓服下

利當先止

陽旦湯治中風傷寒脈浮發熱往來汗出惡風項強鼻

鳴乾嘔

桂心

芍藥

各三兩

甘草

黃芩

各二兩

右剉散每服五錢水一盞半棗子一枚生薑三片煎至一盞取八分清汁溫服自汗者去桂心加附子一



枚炮渴者去桂心加栝樓三兩利者去芍藥桂加乾薑三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴為佳若脈浮緊無汗發熱者不可與

竹皮湯療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕

刮竹青皮一升

右用水三升煮取一升半絞去滓分服立愈

乾薑湯療治婦人得溫病雖差未復未滿一百日不可

欽定四庫全書



世醫得效方
卷一

與交合為陰易之病病必拘急手足拳皆死丈夫病以傷婦人名為陽易速當療之可瘥滿一百日不可療也宜服此藥

右剉散水二盞煎六分溫服汗出無解止手足伸遂愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胷手足拘急搐搦如中風狀

栝樓根

無黃根者二兩

青竹茹

刮半斤淡竹者

右水二升煮取一升二合去滓溫服作二三服嚥立效

當歸白朮湯婦人未平復因其所動小腹急痛腰膝疼四肢不任舉身無熱發者

白朮

桂枝 去皮

甘草 炙

人參

黃耆

蜜炙

芍藥 各一分 生薑 半兩

當歸 一兩

附子

一枚 破分八片 去皮

右剉散水三升煮取一升半去滓通口服一半食頃

再服一半溫服微汗便差

知母麻黃湯傷寒差後或十數日或半月二十日終不

欽定四庫全書



世醫得效方
卷一

惺惺常昏沈似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或風疾多般治不差或朝夕潮熱煩赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞絡間所致

知母

一兩

麻黃 去節

甘草 炙

芍藥

黃芩

各半兩

桂枝 去皮半兩 盛暑中可加桂枝作一分

右剉散每服五錢水一盞半煎八分去滓溫服半日

可相次二三服溫覆令微汗若心煩不眠欲飲水當

稍稍與之令胃中和即愈未汗再服



應手方治傷寒舌出寸餘連日不收

以梅花腦子為末摻舌上應手而收當用五錢病方愈

白朮散治傷寒氣脈不和增寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠

粘痰咳壅滯或冒涉風濕增寒發熱骨節煩痛或中暑

嘔吐眩暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初悉

主之又五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡卧不寧肢體

倦怠潮熱盜汗脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸

水臟腑滑泄腹內虛鳴反胃吐逆心腹絞痛久瘧久痢

欽定四庫全書
世醫得效方
卷一

及膈氣噎塞上氣喘促坐卧不安或飲食所傷胸膈痞

悶腹脇膜脹婦人產前產後血氣不和霍亂吐瀉氣

厥不省人事並宜服之常服避四時不正之氣及山

嵐瘴疫

白芷 甘草 青皮 白茯苓
去蘆 炙 去白 去皮

桔梗 山藥 香附子
去蘆 以上各三兩

乾薑 白朮
半兩 去蘆一兩

右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚木瓜一片

紫蘇葉二三皮煎七分食前服若吐瀉入白梅煎喘

加桑白皮杏仁傷寒勞役入薄荷膈氣木通三寸麝

香少許中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入荆

芥霍亂入藿香氣厥入鹽煎服

又方白朮散治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣

弱保衰老及治酒積嘔噦

白朮 茯苓 人參 甘草
去皮 各半兩 炙

木香 藿香 葛根
一分 半兩 一兩

欽定四庫全書
世醫得效方
卷一

右為末白湯調服二錢煩渴加滑石二兩甚者加薑

汁續續飲之

蜜煎溫法陽明病自汗出若發汗小便利者此為津

液內竭屎雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而

通之若土瓜根及大猪膽汁皆可為導

右蜜四兩銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令

焦著欲可丸捻作鋌如指許長二寸當熱時急作令

頭銳內穀道中以手急抱欲大便時乃去之



猪膽汁方

右以大猪膽一枚瀉汁和法醋少許以灌穀道中如一食須當大便

蜜漬柏皮治口瘡舌潰爛

右以大藥去麤皮蜜漬一宿合之吞汁勿絕差或用

蜜炙焦黃色研為末每服半錢摻

灸法初得病或先頭痛身寒熱或瀉瀉欲守火或腰背

強直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但烈火灸

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

心下三處第一處去心下一寸名巨闕第二處去心

下二寸名上管第三處去心下三寸名胃管各灸五

十壯然或人形大小不同恐寸數有異可繩度隨其

長短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔

中屈繩取半當繩頭名胃管又中屈半繩更分為二

分從胃管向上度一分即是上管又上度取一分即

是巨闕大人可灸五十壯小兒可三壯亦隨其年灸

之大小以意斟量也若病者三四日以上宜先灸臍

上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去平便從髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顙顙穴在耳前動處又灸內風池穴在項後髮際陷中又灸肝腧穴在第九推下兩旁相去各一寸半百壯餘處各二十壯又灸太衝穴在足大指末節後二寸或一寸半陷中三十壯神驗

欽定四庫全書

世醫得效方
卷一

世醫得效方卷一



欽定四庫全書

子部
世醫得效方卷二

詳校官太醫院醫士 臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈
校對官中書 臣李斯咏
騰錄監生 臣張仲芳

欽定四庫全書

世醫得效方卷二

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

傷風

桂枝湯治足太陽膀胱經傷風脈陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出濇濇惡寒洒洒惡風翕翕然發熱鼻鳴乾嘔又太陽證宜汗其人失血及下利則頻與

欽定四庫全書
世醫得效方
卷二

服使體潤繫繫連日當自解

桂枝 去皮 芍藥 各三兩 甘草 一兩

右剉散每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚擘破共煎至七分去滓溫服不拘時惟冬春初可行自春及夏至以前可加黃芩半兩夏至以後加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減無汗者不宜服之

杏子湯治足陽明胃經傷風惡食口苦咽乾腹滿微喘



發熱惡風自汗嗜臥身重小便難潮熱而嘔其脈浮弦長而數悉主之

杏仁 去皮尖 半夏 湯去滑 五味子 各三錢半 芍藥

桂心 細辛 乾薑 大黃 蒸

甘草 炙各三錢 茯苓 四錢

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服

柴胡加桂湯治足少陽膽經傷風四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫口苦而渴自汗其脈陽浮陰弦或

欽定四庫全書
世醫得效方
卷二

發汗多亡陽譫語可以此和其榮衛通具津液自愈

柴胡 一兩三錢 半夏 湯去滑四錢 甘草 炙一錢

芍藥 黃芩 人參 辣桂 各半兩

右剉散每服五錢水一盞半薑五片棗一枚煎至七

分去滓空心溫服

桂枝芍藥湯治足太陰脾經傷風自汗咽乾腹滿自利

不渴四肢倦怠手足自溫其脈弦大而緩者

桂心 半兩 白芍藥 三兩

右挫散每服五錢鹽水一盞半薑五片棗一枚煎七分去滓溫服腹痛甚者加大黃一兩

桂附湯治足少陰腎經傷風胸滿心煩咽喉痛自汗腰

疼連胛骨酸痛嘔吐涎沫頭痛其脈沈弦者

附子 生去皮臍 桂心 乾薑 芍藥

甘草 炙 茯苓 桃仁 去皮尖剉

右剉散每服四錢水二盞煎七分去滓食前服或咽喉痛加桔梗半兩

欽定四庫全書
世醫得效方
卷二

八物湯治足厥陰肝經傷風惡風而勸自汗小腹急痛

寒熱如瘧骨節煩疼其脈尺寸俱微而遲者

桂心 當歸 川芎 前胡

防風 各三分 芍藥 一兩半 甘草 炙 茯苓 各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎至八

分去滓空心服

傷暑

五苓散治傷暑煩渴引飲無度兼治傷風溫熱表裏未



解煩渴引水水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴
不止又治霍亂吐利黃疸瘟疫

澤瀉 二兩半 桂心 一兩

猪苓 去皮

赤茯苓 去皮

白朮 去蘆各一兩半

右為末每服二錢沸湯調下不拘時候服訖多飲熱
湯汗出即愈溫熱病加甘草一兩炙瘵熱在裏身發
黃疸濃煎茵陳湯食前服疸病發渴及中暑引飲白
水調服小兒加白朮末少許發虛熱每料綿黃芪人

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

參麥門冬去心各一兩分陰陽退實熱山茵陳車前
草每服各二根止瀉加紫蘇陳米各少許薑汁半匕
久痢加肉豆蔻五錢每服鹽梅一枚赤痢烏梅一枚
粟殼二枚去蒂赤膜醋炒白痢粟殼二枚製同上粟米一
撮腹痛南木香半錢渴烏梅一箇枇杷葉二片去白
毛糯米一撮伏暑鼻衄白茅花一把小便血以生料
者每服加梔子三箇車前子一撮煩熱心神恍惚朱
砂一字燈心二十莖麥門冬二十粒去心淡竹葉十

片車前草二根傷暑吐血白茅花一握熱瀉車前子
一撮麥門冬二十粒去心暑濕瀉紫蘇五葉木瓜三
片車前子一撮傷暑頭痛濃煎葱白湯大便秘水瀉小
便不利加真車前子末少許又方治燥渴去桂心加
人參謂之春澤湯濕瀉身痛加蒼朮少許秋多淫雨
人患濕疫在冬時服之效

縮脾飲治伏暑熱煩渴燥悶乾霍亂

草果 去皮

縮砂

烏梅 去核 乾葛

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

白扁豆

生薑 切片日乾各五錢重

右剉散每服五錢水一盃煎至八分浸冷服或欲溫
欲熱亦可斟酌傷暑發熱頭目痛用以吞消暑丸方
見後中暑類

卻暑散治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐瀉利煩渴背寒面
垢

赤茯苓 去皮

甘草 生各四兩

寒食麪

生薑 各一斤細切搜麪令勻



右為末每服二錢新汲水調下或湯點服不拘時候
香薷丸治大人小兒傷暑伏熱燥渴脅悶頭目昏眩胸
膈煩滿嘔噦惡心口苦咽乾肢體困倦不思飲食或發
霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷 去梗

紫蘇 去梗

乾木瓜 各一兩

丁香

甘草 炙

檀香

白茯苓 去皮

藿香 各十兩

右為末蜜丸彈子大每一丸至二丸熱水嚼下或新

汲水化下亦得小兒半丸

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

桂苓甘露散治傷寒中暑冒風飲食中外一切所傷傳
受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴喜飲冷小便赤澀大
便急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風

茯苓 去皮

甘草 炙

白朮 半兩

澤瀉 一兩

桂 半兩

去皮

石膏 二兩

寒水石 二兩

滑石 半兩

猪苓 半兩

右為末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良

小兒每服一錢



迪志文化出版有限公司出版

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒
熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥
倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成
痢疾中酒煩渴不食婦人胎前產後並宜服之

人參

縮砂

甘草 炙

杏仁 去皮

半夏 湯泡七次

各三兩

白扁豆 薑汁

略炒

赤茯苓 去皮

藿香葉 拂去

木瓜 各二兩

各二兩

香薷 去梗

厚朴 薑汁

各四兩

右剉每服四錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

八分去滓不拘時候服

冷香飲子老人虛人伏暑煩燥引飲無度惡人疲倦服

涼藥不得者

草果仁 三兩

附子 炮去

皮臍

橘紅 各一兩

甘草 炙

右剉散每服一盞水二盞生薑十片煎半盞去滓沈

冷旋旋服不拘時

潑火散傷暑煩燥發渴口乾及治血痢婦人熱崩

青皮 去白

赤芍藥

黃連 去鬚

地榆 各等分



迪志文化出版有限公司出版

右為細末每服一錢冷水調下如蓄熱而氣血妄行加甘草等分

枇杷葉散治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩燥

枇杷葉去毛炙半兩 香薷三兩 白茅根

甘草炙 麥門冬去心 乾木瓜各一兩

陳皮去白焙半兩 丁香 厚朴去皮薑汁炙各半兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑三片煎服煩燥沈

欽定四庫全書 世醫得效方 卷二

冷服如脾虛感暑嘔吐不食以此藥煎去滓吞消暑

丸六十粒立効體本虛嘔吐昏倦手足冷除茅根麥

門冬加附子炮用

香薷散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度起居不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化米穀致令真邪相干腸胃虛弱飲食變亂於腸胃之間致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐

利俱發者有發熱頭痛體疼而復利吐虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出者或四肢逆冷而脈欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能主之

香薷去梗四兩 厚朴去麤皮切碎薑汁炒令黃 白扁豆各二兩

右剉散每服五錢水一盞酒一分同煎七分去滓水

中沈冷連喫二服立效不拘時候治中暑復傷風擋

搦不省人事者宜先服蘇合香丸候其甦省却以此

欽定四庫全書 世醫得效方 卷二

藥加黃連羌活各一錢暑濕腫滿香蘇散合和加生

薑三片木瓜二片車前草二根伏暑頭疼小便澀濁

加山茵陳車前草各二根霍亂吐利加木瓜二片藿

香少許生薑三片傷暑腹痛加陳大蓼三寸陳壁土

一指頭大木瓜二片臟腑有熱便血加黃連厚朴枳殼

烏梅各一錢小便血加瞿麥穗一錢車前子一撮燈

心二十莖感暑濕手足繃痛痺冷合和香蘇散每服

四錢薑三片木瓜二片陳大蓼三寸煎服留滓再加



葱葉橘葉竹葉陳大蓼各一握水一斗煮七分先薰後洗立效脚氣作痛行步艱辛每料加入木瓜羌活炒蒼朮枳殼去穰陳皮半夏甘草各一兩成十味每服加生薑三片葱白二根脾胃不和嘔逆惡心冒暑心腹脹滿去羌活加藿香烏梅各一錢壯熱大渴肚皮熱或五心熱加燈心二十莖麥門冬去心白茅根各一錢淡竹葉十片晚禾根淨洗一握四時感冒嘔泄亦合和香薷散每服四錢加生薑五片木瓜二片諸熱毒小便赤濁每服四錢加車前子黃連去鬚各一錢則清利以上皆溫服暑月煩燥潮熱甚加茵陳車前草各二莖苦竹葉十片山梔子三枚擘破心胸煩燥只依本方宜清前血冷服暑月潮瀉亦加烏梅車前子一錢陳米一撮暑月虛人腹痛嘔血加丁香白朮炮附子木瓜各半錢生薑五片亦名六和湯解暑和脾胃加人參陳皮白朮白茯苓黃芪木瓜甘草每料各一兩亦名十味香薷散傷暑單有頭痛正方

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

加山茵陳多服取效以上並熱服常服消暑健脾或為末煉蜜為膏酒服亦妙

陳大蓼須用家園種者江邊赤蓼則不用

小黃龍湯治伏暑發熱作渴嘔吐惡心及年深暑毒不差

黃連 一斤
去鬚 酒 二升半

右將黃連以酒煮乾為度焙為末用麪糊丸如梧子大每服三十丸熟水吞下又治傷酒過度臟毒下血或泄瀉米飲下食前日二服酒及熱物過度吐血茅

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

花湯下

來復丹治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水及治中

暑

方見後痢冷類

小柴胡湯治傷暑外熱內渴於內更加生薑三片烏梅

一箇麥門冬三十粒去心煎服不拘時候

方見前傷寒陽證類

竹葉石膏湯治伏暑內外熱熾煩燥大渴

方見前傷寒通治類

二陳湯治傷暑復感冷及內傷生冷嘔吐

方見前飲類

濯執散治傷暑迷昏及泄瀉霍亂作渴立效亦能解諸



毒

白礬

五倍子

烏梅

去核

甘草

各一兩

右為末入飛羅麪四兩拌勻每服二錢新汲水調下
雖平日不敢飲冷者服之不妨真有奇效為丸如彈
大陰乾冷水調下亦可

通苓散治傷暑潮熱煩渴小便不利

方見後
泄瀉類

每服三錢水一盞半燈心二十莖麥門冬二十粒去

心淡竹葉十片車前穗五莖煎不拘時候服渴甚晚

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

禾根少許白茅根五莖枇杷葉二皮去白毛蜜塗微

炙煎服

傷濕

香蘇散加蒼朮川芎白芷木瓜對合各用四錢生薑三

片煎服日近遠年傷濕倦弱如虛損多服取効

方見前
傷寒和

解類

黃耆建中湯治傷濕鼻塞身痛

黃耆

微炙

辣桂

各二兩

甘草

炙二兩

白芍藥

六兩

右挫散每服三錢薑四片棗一枚煎食前服

不換金正氣散治傷濕益脾順氣加茯苓一兩生薑每

服三片

方見後時疫類

朮附湯治傷濕大小便利

方見後中濕類

茵陳湯治濕氣瘀熱發黃小便秘澀渴引水漿

茵陳

一兩半

大黃

半兩

小紅梔子

十枚

右剉散每服三錢水煎服

腎著湯治身重腰冷痺如坐水中形如水狀及不渴小

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

便自利飲食如故病屬下焦從身勞汗出衣裏冷濕

而得之腰以下冷痛腰重如帶五千錢

甘草

炙

白朮

各二兩
去蘆

乾薑

炮

茯苓

各四兩
去皮

右剉散每服四大錢水一盞半煎十分去渣食前服

滲濕湯治坐臥濕地或為雨露所襲身重脚弱關節重

疼發熱惡寒或小便秘澀大便飡泄或汗出衣裏濕漬

得之腿膝或腫小便利反不渴

蒼朮

米泔
浸

白朮

去蘆

甘草

炙各
二兩

乾薑

炮



茯苓 各四兩 陳皮 丁香 各半兩		右剉散每服四錢用水一盞半生薑三片紅棗一枚煎至七分去渣溫服或腹膨腰脚重滯 青木香丸熟水下兼服方		見諸病類		爪蒂搐鼻法治傷濕鼻塞頭疼爪蒂不以多少咬咀為細末口含水搐一字許入鼻中流出黃水即效		中寒		附子理中湯治五臟中寒口噤四肢強直失音不語		欽定四庫全書 世醫得效方 卷二		大附子 炮去皮 人參 乾薑 炮 甘草 炙		白朮 各等分		右為剉散每服四大錢水一盞半煎七分去渣不以時服口噤則斡開灌之		薑附湯治中寒卒然暈倒或吐逆涎沫狀如暗風手脚攣搐口噤四肢厥冷或復燥熱		乾薑 炮 附子 炮去皮臍各一兩		右為剉散每服四錢水盞半煎七分去渣食前服入	

肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加白朮入心加茯苓隨證加之挾風加防風兼濕多加白朮筋脈牽急加木瓜肢節疼痛加桂心人參白朮各等分仍須暖室添衣被火等圍護		中暑 又名中暈		大黃龍丸治中暑眩暈不知人身熱惡寒頭疼狀如傷寒或往來寒熱煩燥渴甚嘔吐泄瀉常服去暑毒分陰陽		欽定四庫全書 世醫得效方 卷二		硫黃 消石 各一兩 雄黃 通明者 滑石		白礬 寒食麪 四兩		右為末滴水為丸如梧桐子大每服五丸至七丸漸加至二十九丸新汲水下昏塞不知人事以水化開灌之中暑忌得冷此藥却以冷水下之乃熱因寒用疑者釋之		益元散治中暑身熱嘔吐熱瀉赤痢癰閉澀痛利小便益精氣通九竅六府消畜水止渴除煩熱心燥百藥酒	



食等毒解疫癘及兩感傷寒及婦人下乳催生兼吹乳
乳癰孕婦莫服

白滑石 六兩 甘草 一兩 炙

右為極細末每服三錢蜜少許溫水調下無蜜亦得

日三服欲冷新汲水調下發汗煎葱白豆豉湯并三

四服此藥解散暑熱多服無害有益

消暑丸治中暑煩渴暈眩寒熱煩燥悶亂或似欲絕者

半夏 一斤湯洗七次去滑 茯苓 去皮 甘草 生各半斤

欽定四庫全書 世醫得效方 卷二

右為末薑汁麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸新

汲水下中暑為患藥下即甦夏中常服止渴利小便

若痰飲停滯中脘不快頭眩喜嘔薑湯吞下 正名生料消暑丸

九

皂莢湯治中暑不省人事

猪牙皂莢 一兩 燒灰 甘草 一兩 微炒

右為細末每服二錢溫熱水調下

來復丹 方見後癰冷類 治中暑昏迷霍亂吐瀉每服五

原缺

欽定四庫全書 世醫得效方 卷二



白朮

半兩 去蘆

苦酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代日三服夜

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

一服

甘草附子湯治中濕小便不利大便自利

附子

炮一箇七錢淨者

甘草

炙各一兩

辣桂

去麋皮二兩

右剉散每服三錢水一盞半薑七片煎食前微溫服

汗出加防風悸氣加茯苓各二錢

四氣兼中

附子湯治五臟中風寒手足不仁口面喎斜昏暈失音

眼目瞶動牙車緊閉不得轉動

附子

炮去皮臍

桂心

各半兩

細辛

去苗

防風

去叉

人參

去蘆

乾薑

炮各六錢

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分

食前服或為末酒調二錢服

防風湯治中風挾暑卒然暈倒面青黑四肢緩弱喜伸

欠口喎斜四肢不仁好笑

防風

去叉

澤瀉

桂心

杏仁

麵炒去皮尖

乾薑

炮

甘草

炙各等分

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

生附白朮湯治中風濕昏悶恍惚脹滿身重手足緩縱

繫繫自汗失音不語便利不禁

附子

生去皮臍

乾薑

各半兩

白朮

一兩

甘草

炙一兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服

附子麻黃湯治寒濕所中昏暈緩弱或腰背強急口喎

斜語音混濁心腹脹氣上喘不能動轉



附子 炮去皮臍 麻黃 去節湯洗 白朮 去蘆 乾薑	甘草 炙 人參 各等分	右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服	苓朮湯治冒暑遭雨暑濕鬱發四肢不仁半身不遂骨節離解緩弱不收或入浴暈倒口眼喎斜手足躄曳皆	濕溫類也	附子 炮去皮臍 茯苓 白朮 乾薑 炮	澤瀉 桂心 各等分	右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服	四氣相感	麻黃白朮湯治寒濕身體煩疼無汗惡寒發熱者	麻黃 去節三兩 桂心 二兩 甘草 炙一兩 杏仁 二十粒去皮尖	白朮 四兩去蘆	右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前溫服	桂枝附子湯治風濕相搏身體煩疼掣痛不得屈伸汗	出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫

桂枝 去皮四兩 白朮 去蘆 附子 炮去皮臍各三兩 甘草 炙二兩	右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗二枚煎	七分空心溫服或大便秘則去桂小便利悸	氣加茯苓三兩痺加防已四兩腹痛加芍藥四	兩	防已黃耆湯治陽風濕寒脈浮緊細身重汗出惡風并	治風水脈浮身重不渴	防已 四兩 黃耆 四兩去蘆 甘草 炙二兩 白朮 三兩去蘆	右剉散每服五錢水盞半薑五片棗二枚煎七分去	滓空心服喘者加麻黃一兩胃中不和加芍藥二兩	氣上衝加桂一兩有陳寒加細辛一兩服後當如蟲	行皮中從腰下如水後坐被上又以被遶腰以溫下	微汗瘥	白朮茯苓乾薑湯治伏暑中風濕煩渴引飲心腹疼痛燥	悶口乾面垢洒洒惡寒淅淅惡風微汗饑不能食者	白朮 去蘆 乾薑 茯苓 細辛



桂心	乾葛	甘草 炙	橘皮
烏梅	豆豉		
右等分為末每服二錢白湯點下			
茯苓白朮湯冒暑毒加以著濕或汗未乾即浴皆成暑濕			
茯苓	乾薑 炮	甘草 炙	白朮
桂心	各一兩		
右剉散每服四錢水一盞半煎七分食前服			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷二			
萎蕤湯治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩 痛咽喉乾舌強胸內疼痛痞滿腰背拘急			
葛根	麻黃 湯泡焙乾	甘草 炙	
白薇	川芎	羌活	杏仁 各半兩去皮尖
石膏 一兩碎	萎蕤 三分	青木香 一分	
右剉散每服五錢水一盞半煎七分食前服青木香冬用一兩春半兩渴加栝樓根二片			
痰瘧			

風證加減桂枝湯治先熱後寒煩燥自汗惡風名溫瘧			
石膏 四兩半	知母 一兩半	甘草 炙	桂枝 一兩
粳米	一合		
右剉散每服四錢水一盞半煎七分未發前進三服			
白朮散治傷風不留經絡與衛氣相併病以日作寒熱交煎			
麻黃 去節	白朮 去蘆	茯苓	桂心 各一兩
陳皮	青皮 去白	桔梗 去蘆	白芷
甘草	半夏 麴	紫蘇	烏梅 各三分核
乾薑 半兩			
右剉散每服四錢水二盞薑三片棗二枚煎七分當發日空心一服臨發一服尤妙亦治時疫			
寒證五積散治體虛作瘧先寒後熱寒則湯火不能溫熱則冰雪不能冷惡寒無汗 方見傷寒陰證類			
養正丹 見癰冷類	薑附湯 見中湯寒類	子理中湯 並見中	總治寒瘧
暑證香薷散治但熱不寒陰氣孤絕陽氣獨發少氣煩			



冤手足熱而欲嘔兼渴

方見傷暑類

一方加黃連每料二兩名黃連香薷散治暑瘧獨熱

燥煩大渴引飲小便不利或背寒面垢每服加燈心

二十莖麥門冬去心二十粒淡竹葉七皮車前草二

根晚禾根一握檳榔一箇刀切煎不拘時候

小柴胡湯治傷暑發瘧熱多寒少或但熱不寒咳嗽煩

渴小便赤每服加生薑三片烏梅一箇麥門冬二十粒

去心地骨皮少許煎溫服不拘時候熱盛大腑不通加

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

大黃枳殼各一錢一服立效

方見傷寒陽證類

清脾湯治瘧瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少膈滿

能食口苦舌乾心煩渴大小便黃赤大腑不利

青皮

去白

厚朴

去蘆皮薑汁炒

白朮

去蘆

草果仁

柴胡

去蘆

茯苓

去皮

半夏

湯洗七次

黃芩

甘草

炙各等分

或加人參亦可

右剉散每服四錢水盞半薑五片煎七分不拘時溫

服

消暑丸治傷暑發瘧痰多煩悶眩暈每服五十丸淡薑

湯吞下

方見中暑類與前藥相兼多服取效

濕證朮附湯治寒熱身重骨節煩疼脹滿澀澀自汗喜

嘔因汗出復浴濕舍皮膚及冒雨濕所致

除濕湯治同上

二方見中暑傷濕類除濕湯即滲濕湯

五苓散治傷濕小便不利發瘧

方見傷暑類

食證二陳湯治傷食發瘧痰多

陳皮

半夏

製各五兩

白茯苓

三兩

甘草

炙一兩

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

右剉散每服三錢薑五片烏梅一箇煎服寒多者加

草果熱多加前胡青皮檳榔縮砂白豆蔻之類隨意

增減

小清脾湯治胃瘧發作有時先覺伸欠乃作寒慄鼓振

頤頤中外皆寒腰背俱痛寒戰既已內外皆熱頭疼如

破渴欲飲冷或痰聚結胸中煩滿欲嘔或先熱後寒先

寒後熱寒多熱少寒少熱多或寒熱相半或但熱不寒

但寒不熱或隔日一發一日一發或三五日一發者悉



主之

厚朴

製同前
四兩

烏梅

去核

半夏

湯去滑

青皮

良薑

各二兩

草果

去皮
一兩

甘草

炙
半兩

右剉散每服四錢水二盞薑三片棗一枚煎七分去

滓未發前併三服忌生冷油膩時果此藥溫脾化痰

治胸膈痞悶心腹脹滿噫醋吞酸自可常服

紅丸子治食癰食積氣滯腹脹

京三稜

水浸軟切片

蓬莪術

煨

青皮

去白

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

陳皮

去白
各五兩

胡椒

乾薑

炮
各三兩

右為末米醋煮米粉糊丸梧桐子大礬紅為衣每服

五十丸淡薑湯下或二陳湯下

方見前

七情四獸飲治五臟氣虛喜怒不節勞逸兼并致陰陽

相勝結聚痰飲與衛氣相搏發為瘧疾

人參

去蘆

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

甘草

橘紅

半夏

草果

去皮

烏梅

去核

紅棗

生薑

右等分剉散每用半兩以鹽少許淹少時厚皮紙裹

水濕慢火煨香熟取出用水二盞煎未發前服

痰癰枳梗半夏湯除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心

下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗

陳皮

去白
五兩

半夏

湯洗七次
五兩

枳實

炒
二兩半

右剉散每服二錢水一中盞生薑五片烏梅一箇煎

至七分溫服不拘時候

半夏丸治瘧咳嗽涎盛痞滿煩悶咽膈不利嘔吐不利

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

神思昏憤心忪面熱並皆治之

半夏

十六兩湯洗去滑
薑汁淹一宿

白礬

八兩
枯過

右為末生薑自然汁為丸梧桐子大每服三十九至

五十丸食後臨卧淡薑湯吞下

瘴瘧附子湯治瘴瘧經久不瘥止氣羸弱身熱如火極

寒極熱連日方醒發時沈著枕簟不能擡身戰掉不堪

便溺飲食俱不便

附子

二枚一枚生去皮臍一枚
炮去皮臍鹽水浸各一兩



右剉散每服三錢水一盞半生薑七片紅棗七枚煎至七分去滓攤冷就吞靈砂丹五十粒或百粒未效

再以七棗湯吞黃芽丹二十粒仍服黑錫丹以墜痰

亦可回元氣凡有此瘧但當守續真元沈虛熱為法

小柴胡湯治挾嵐瘴溪源蒸毒之氣自嶺以南地毒苦

炎燥濕不常人多患此其狀血乘上焦病欲來時令人

迷困甚則發燥狂妄亦有啞不能言者皆由敗血瘀心

毒涎聚於脾所致於此藥中加大黃枳殼各五錢方見傷寒類

欽定四庫全書
世醫得效方
卷二

地龍飲治瘴瘧諸瘧大熱煩燥

生地龍三條研末

右入生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調下如熱

熾加腦子少許服效

觀音丸取下暑毒瘴氣毒

圓白半夏生 烏梅肉 川巴豆不去油 母丁香

已上各十枚兼右為末薑汁麵糊丸如麻子大上下

以厚紙蓋貼有油又再易紙每服五丸臨卧冷水下

勞瘧芎歸鱉甲散治表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復來

當歸 川芎 白茯苓去皮 青皮去白

陳皮去白 半夏湯洗七次 鼈甲去裙醋炙黃 芍藥各二錢半

右剉散每服三錢薑五片棗二枚烏梅一箇水煎不

以時服熱多加柴胡寒多加草果少許

瘧毋消癖丸治彌年經吐汗下榮衛虧損邪氣伏藏脇

間結為癥癖腹脇堅痛

欽定四庫全書
世醫得效方
卷二

芫花炒 朱砂研各等分

右為末煉蜜丸如小豆每服十丸濃煎棗湯下去癖

須用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯方見傷寒陰証

類

熱瘧八正散治瘧發則心煩臉赤聲叫煩燥極熱欲冷

地上臥及冷漿加牛黃燈心白竹青煎即效方見積熱類

白虎湯治熱瘧表裏俱熱時時惡寒大渴口舌乾燥加

人參二錢方見傷寒通治類



虛癰分利順元散治虛怯人患癰未可進常山等藥者

川烏 一兩

附子 一兩
或二兩

南星 二兩

木香

別剉五錢旋入

右除木香不見火三味各一半去皮生用即三生飲

一半炮熟即順元散合和切片每服四錢生薑十片

棗七枚水一盞煎至七分當發前一日及當發之日

早晨連進二三服以化去痰諺云無痰不成癰又半

生半熟乃能分解陰陽也

四將軍飲治癰作時仆厥撼掖不醒是中心抑鬱陰陽

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

交戰所致先依灸法後仍服此藥

附子 一兩

訶子 四箇

陳皮 四箇
全者

甘草 四寸

右剉散每服四錢水二盞生薑七片棗七枚煎至七

分初服或不納再進則漸能嚙四服盡頓愈更不

復作

七棗湯治五臟氣虛陰陽相勝作為痲癰不問寒熱先

後與夫獨作疊間日悉主之

附子

一枚炮製以鹽水浸再泡如此
凡七次至七次不浸去皮臍

右剉散水一椀生薑七片棗七枚煎至八分當發日

空心溫服仍吃棗子四五枚

理脾飲治脾臟不和癰疾瀉利腹痛下部無力體重足

痿脚下痛飲食中滿四肢不舉此方極驗

橘皮 主用

甘草 炙

厚朴

去麤皮一兩
薑汁炒

羌活

防風

肉豆蔻

白茯苓

各二錢半

川芎 半兩

吳茱萸 一錢

去梗

右剉散每服二錢水一盞煎至八分空心食前服

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

菓附湯治脾寒癰疾不愈振寒少熱面青不食或大便

溏泄小便反多訶

草果仁

附子

炮去皮臍
各等分

右剉散每服半兩水二盞薑七片棗一枚煎至七分

溫服不拘時候

黑錫丹治冷痰作癰

方見癰冷類

冷附湯治癰疾無過是痰實痞塞不通脾胃弱虛熱在

上停於胸膈不得入於臟腑所以五更冷服乃使藥下



達壯脾胃去痰實除虛熱降心氣屢用屢效

附子

重九文一兩
炮去皮臍

右切作片分二服水二大盞生薑十片煎至一盞隔

夜煎下用薄綿覆蓋面露一宿五更初冷服

久瘧丁香煑散患瘧經年不安黃瘦飲食減少雖有時

歇三兩日或勞力或吃少毒物相犯寒熱立至多服效

見嘔
吐類

大已寒丸治瘧久不愈每發則極寒極熱瘧退汗如雨

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

生薑枳實煎湯服一服不作

方見泄瀉類

橘皮煎丸治久瘧扶虛理脾胃

方見痢冷類

通治瘧疾陰陽交爭寒熱互作用藥須半生半熟半冷

半熱乃收十全之功

草果平胃散治脾虛作瘧不問寒熱先後飲食不進宜

服

右以生料平胃散四兩加入草果大腹皮檳榔青皮

各二兩剉碎相和勻每服五錢水一盞半薑三片棗

二枚煎七分空心多服收效

人參養胃湯治寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心胸滿

嘔逆身體疼痛

缺

寒面色青白不進飲食脈來弦

數每服生薑七片棗二枚多寒加炮附子

方見傷寒
陰證類

小柴胡湯與養胃湯合和名加減清脾湯寒多熱少多

用養胃湯熱多寒少多用柴胡湯寒熱均則平用生薑

桃柳枝地骨皮紅棗煎多服取效

藿香正氣散治瘧偏身腫滿加草果縮砂一兩

方見傷寒
陰證類

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

小柴胡湯與五苓散合和名柴苓湯治傷風傷暑瘧大

效每服薑三片麥門冬二十粒去心地骨皮少許煎溫

服

方見傷寒熱證類
五苓散方傷暑類

柴胡桂薑湯治瘧或有寒者但寒不熱者亦治久不愈

者

北柴胡

四分

桂心

一分半

黃芩

一分半

枳實

二分

牡蠣

杵碎炒

甘草

乾薑

各一分

右剉散每服五錢水一盞半煎八分溫服



加味二陳湯每服四錢薑五大片加旋覆花四錢煎日四服不拘時候久瘧有效虛弱人菓附湯兼服

方見前

截瘧勝金丸治一切瘧病發作有時蓋因外邪客於臟腑生冷之物內傷脾胃或先寒後熱先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多或但熱不寒或但寒不熱或連日不發或間日而發或發後三五日再發寒則肢體顫掉熱則舉身如火頭痛惡心煩渴引飲氣喘急口苦咽乾背脊痠疼腸鳴腹痛或痰聚胸中煩滿欲嘔並皆治之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

檳榔 四兩

常山 酒浸煎
焙一斤

右為末水麪糊為丸梧桐子大每服三十丸於發前日晚臨卧用冷酒吞下便睡不得喫熱物茶湯之類至四更盡再用冷酒吞十五丸忌食一切熱羹湯粥食牛間可食溫粥至晚方可食熱忌一切生冷魚腥等物

又方川恒山二兩為末雞卵二箇取漬為丸 治證服餌
一如上法

露星飲



迪志文化出版有限公司出版

常山一味細剉每用五錢半酒半水煎去滓於當空以薄綿封蓋椀露至天微明時取溫服些小嘔泄無妨

辰砂丸治瘧之為苦異於諸疾世人治之不過用常山砒霜之類發吐取涎而已雖安所損和氣多矣有人病瘧半年前人方術用之略盡皆不能效服此遂愈

辰砂

有牆壁
光明者
阿魏
真者
各一兩

右研勻和稀米糊丸如皂角子大空心濃煎人參湯

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

下一丸瘧之為病雖在忌醫之列但體認得所因真的按方用藥無不切效

一方用白茯苓甘草各三錢
分三服水一盞煎臨發時頓

服自
效

又方生薑四兩連皮搗爛止用自然汁納明日當發隔夜安排將紗片遮蓋露一宿五更初攪動澄者一上吞吃或有痰吐任之即安或微利亦安

灸法大椎在第一椎下陷中宛宛中灸三七壯至四十九不止或灸第三骨節亦可



迪志文化出版有限公司出版

大陵穴在掌後兩骨間灸三壯立效

噫謔二穴在肩膊內廉第六椎兩傍三寸其穴抱肘

取之灸二七壯至一百壯止

凡灸瘡必先問其病所發之先尋穴灸之亦可

針法於十指近甲梢針出血及看兩舌下

有紫腫紅筋亦須針去血效

痰病

順元散治暴患痰厥氣虛身微冷面淡白昏悶不知人

事 方見風科虛證類

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

星香飲治暴患痰厥氣盛身熱面赤

方見中風熱証類

單方治暴患痰厥不省人事

右用生清油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立愈

眩冒

白薇湯治乎居無苦疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由已汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通

故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之

白薇 當歸 各一兩 人參 去蘆 半兩 甘草 一分

右剉每服五大錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘

時

倉公散

瓜蒂 藜蘆 礬石 煨 雄黃 各等

右為細末少許吹入鼻中得嚏為度此藥能起死人

卒厥尸厥

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二

追魂湯治卒厥暴死及主客忤鬼擊飛尸奄忽絕氣不

覺口噤

麻黃 去節 三兩 杏仁 去皮尖 二百五十箇 甘草 炙 一兩

右為剉散每服四錢水一觔半煎七分去渣灌之通

治諸感忤或口噤拗口不開去齒下湯入口活不下

分病人髮左右提搦肩引之藥下漸甦令服盡取效

千金有桂心二兩金匱云寸脈沈大而滑沈則為實

滑則為氣實氣相搏血氣入臟則死入胃則愈若卒



厥唇口青身冷為入臟即死身和汗出則愈

內鼻散治尸厥脈動而無氣氣閉不通靜而若死名卒

厥

菖蒲 去毛

為末每用二字內兩鼻中吹之令入仍以桂末安於

舌下

硫黃散治尸厥奄然死去四肢逆冷不省人事腹中氣

走如雷鳴

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

焰硝 半兩

硫黃 一兩

右二件細研如粉分作三服每服用好酒一大盞煎

覺焰起傾於盞內蓋候溫灌與服如人行五里又進

一服不過三服即安

又方附子七錢炮熟去皮臍為散分作二服每服用酒

三盞煎至二盞溫服

又方生薑自然汁半盞酒一觔煎令百沸灌二服却用灸

灸法頭上百會穴四十九壯兼臍下氣海丹田穴三百

壯覺身體溫暖即止

沙證

艾湯試沙證江南舊無今所在有之原其證古方不載
所感如傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指末微厥或腹
痛悶亂須臾能殺人先濃煎艾湯試之如吐即是

右用五月蠶退紙碎剪安枕中以碟蓋之以百沸湯

泡艾椀許仍以別紙封裹縫良久乘熱飲之就臥

以厚被蓋之汗出愈

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

又近時多有頭額上及胸前兩邊有小紅點在於皮膚

者却用紙撚成條或大燈草微蘸香油於香油燈上點

燒於紅點上煖爆者是又名水傷寒却用樟木煎湯服

或葱頭湯汗出愈如腹痛不止又用針於兩手十指近

甲梢針出血即愈

鹽湯吐法治心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂攪腸沙

今攷之此證乃名乾霍亂此亦由山嵐瘴氣或因饑飽

失時陰陽暴亂而致急用鹽湯吐法此法救人不一



右用鹽半錢許以熱湯數椀泡鹽令患人盡服連致數椀不得住手方可却以雞羽埽咽喉間即時吐所吃鹽湯盡出即時愈

又法治沙證但用苧麻蘸水於頸項兩肘臂兩膝腕等處戛掠見得血凝皮膚中紅點如粟粒狀然後蓋覆衣被吃少粥湯或葱頭湯或清油生葱茶得汗即愈此皆使皮膚腠理開發鬆利誠不藥之良法也

又法兩足墜痛亦名水沙

可於兩顯曲腕內兩筋兩骨間刺出血愈名委中穴

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

時疫

十神湯治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此藥不問陰陽兩感風寒並宜服之

川芎

甘草 炙

麻黃 去根

乾葛

升麻

赤芍藥

白芷

陳皮

香附子

炒
去毛 紫蘇 各四兩

右剉散每服三錢水盞半薑五片煎七分去渣熱服不以時候如發熱頭痛加連鬚葱白中滿氣實加枳

殼煎

不換金正氣散治四時傷寒瘧疫時氣頭痛肚熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嗽痰涎行步喘乏或霍亂吐瀉臟腑虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴

去皮薑汁炒

藿香

甘草

半夏

蒼朮

米泔浸

陳皮

各等分

右剉散每服三錢水一椀半生薑三片棗二枚煎八

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

分去渣食前稍熱服忌生冷油煎毒物不伏水土宜服之常服進飲食調脾胃一方加白茯苓

桂枝黃芩湯治風疫脈浮數而不弱頭項疼腰痛發

熱惡風通相傳染

缺



傷寒證候頃刻傳變傷寒治法繩尺謹嚴非可以輕心視之也其間種類不一條例浩繁是固難矣至於陰極發燥熱極發厥陰證如陽陽證如陰脚氣似乎傷寒中暑似乎熱病與去蓄血一證上熱下冷乍閤乍寒甚至四肢發厥昏迷悶絕凡此等類尤當審思而明辨之若疑似未別體認未明姑且試探切不可妄投決病之劑方已雖微死生係也謹之哉

傷寒篤證

搖頭直視形如烟熏心絕 唇反青四肢多汗肝絕
反目直視狂言遺尿腎絕 汗出髮潤喘而不休肺絕
環口鰓黑柔汗發黃脾絕 汗出如油喘促無已
水漿不下形體不仁命絕 大發濕家汗則成瘥熱而

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

瘥不治 發濕溫汗身青面變耳聾不語曰重暈不治
發風溫汗必譫語並不治 發風濕中濕汗並逆
發動氣汗不治 發少陰汗九竅出血曰下厥上殞不治
治 發少陽汗則譫語發汗只在頭面不至遍身鼻衄
不止者逆 發汗不至足者逆 諸逆發汗劇者言亂
目眩並不治 當汗無汗服麻黃數劑七日汗不出者
不治 汗出如珠不流不治 汗出如油口噤肉戰呻
吟喘促不治 汗後嘔吐水藥不入口者逆 熱病脈
燥盛而不得汗不治 汗後不為汗衰復大熱脈躁疾
狂言不食曰陰陽交不治 忽冒昧無脈服藥提汗解
則生若無汗脈不至者不治 少陰厥逆無脈服藥通
脈其脈漸續則生暴出則不治 下利厥逆無脈灸之
脈不回身不溫微喘不治 少陰四逆下利惡寒而拳
發躁無脈不治 下利日十餘行其脈反實者逆 少
陽陽明合病下利脈長大而弦曰負不治 陽病見陰
脈不治 發斑屬陽見陰脈不治 代脈不治 吐血



衄血脈反浮大而牢不治 陰易陽易脈離經外腎腫
腹中絞痛手足拳攣不治 欬逆上氣脈散者不治
謔語脈反沈微四肢厥冷不治 脈陰陽俱虛熱不止
者不治 七八日以上發大熱難治 舌本爛熱不止
者逆 下利發熱或汗不止厥不止並不治 下利發
熱厥逆燥不得眠不治 謔語直視或喘滿或下利並
不治 謔語屬陽見陰證者逆 傷寒脈乍疎乍數不
治 發斑先赤後黯面色黧晦不治 發斑大便自利
不治 發黃而變黑不治 口乾舌黑不治 口張目
陷不治 張口出氣乾嘔骨骸熱痛者逆咳逆不止者
不治 心下痞悶上氣喘麤者逆 霍亂喘脹煩燥不
治 誤下溫家額汗喘促或小便不利大便自利不治
頭汗內外關格小便不利此為陽脫不治 腹滿欬
逆不得小便不治 腹大滿而下泄不治若脈洪緊而
滑尤可慮 臟結如結胸舌白胎陰筋引臍腹痛時時
下利不治 結胸證具加煩躁不治 臟厥七八日發

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二



迪志文化出版有限公司出版

厥膚冷煩燥下利無時暫安不治 少陰吐利厥逆煩
燥不治 利反能食者曰除中不治 四肢厥
逆臍下絞痛石硬眼定者逆 厥陰脣青舌卷黑而耳
聾囊縮不治 頭連腦痛甚手足俱寒不治 陰毒陽
毒過六七日不治 兩感難治 狐惑咽乾聲啞脣瘡
不治 赤斑五救其一 黑斑十救其一 尋衣摸空
者逆

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二

世醫得效方卷二



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

子部
世醫得效方卷三

詳校官太醫院醫士 臣 舒 依

編修臣 倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣 倉聖脈
校對官中書 臣 李斯咏
謄錄監生 臣 張增

欽定四庫全書

世醫得效方卷三

元 危亦林 撰

大方脉雜醫科

諸氣

縮砂香附湯調中快氣治心腹刺痛利三焦順臟腑

香附子 炒去毛
十兩

烏藥 去心
五兩

粉草 炒
二兩

兩

縮砂 去殼二兩

欽定四庫全書
世醫得效方
卷三

右為末每服二錢紫蘇葉三皮鹽少許沸湯調下不
拘時候大便秘橘皮湯下亦名寬氣湯

沉香降氣湯治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹
滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜卧減食
又治胃痺留飲噫醋聞酸脇下支結常覺妨悶及中寒
欬逆脾濕洞泄兩脇虛鳴臍下撮痛皆能治之患腳氣
人毒氣上衝心腹堅滿肢體浮腫者尤宜服之常服開
胃消痰散壅思食



香附子 炒去毛 一十兩	沉香 四錢六分 不見火	縮砂 去殼十 二兩	粉草 炒 三兩	右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服凌旦霧露空	心服食去邪惡氣使無瘴疫	木香檳榔圓疎導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食	木香 不見火 檳榔	枳殼 麸炒 杏仁 去皮 尖麸	炒 郁李仁 去皮 各二兩	右為末別以皂角四兩用漿水一椀搓揉熬膏更入	熟蜜少許和圓如梧桐子大每服五十圓食後生薑	湯下	歸氣湯治氣不升降胸膈痞滿心腹刺痛不進飲食	沉香 木香 丁香 並 見火 白薑 炮	川練子肉 炒 肉桂 去皮 見火 陳皮 去 白 當歸	甘草 炙 附子 一箇十二錢 者炮去皮臍 縮砂	益智 炒 各去殼 葫蘆巴 炒 白朮 舶上茴香

欽定四庫全書

世醫得效方
卷三



炒 豆蔻 麩裹 各一兩	右剉散每服三錢水一盞紫蘇三葉木瓜四片鹽少	許煎服	木香流氣飲調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟	治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食肩背	走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結	水道赤澁又治憂思大過怔忡鬱積脚氣風濕聚結腫	痛喘滿脹急不寧	欽定四庫全書	世醫得效方 卷三	陳皮 去 白 青皮 去 白 紫蘇 去 皮梗 甘草	厚朴 去 蘆汁製 香附 炒去 毛 木通 去 節 大腹皮	丁皮 檳榔 肉桂 去 麩皮 藿香葉	蓬莪木 煨切 草果仁 木香 不 見火 麥門冬 去 心	人參 去 蘆 白朮 去 蘆 乾木瓜 石菖蒲 刮 去	赤茯苓 去 皮 川白芷 各二 兩 半夏 一兩 湯洗	七次 倍乾 右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎

欽定四庫全書

世醫得效方
卷三



至七分去渣熱服如傷寒頭痛纔覺得疾入連根葱
白三寸煎服升降陰陽汗出立愈如臟腑自利入粳
米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候

秘傳降氣湯治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾
胃酒色無節耗損腎元水火交攻陰陽關隔遂使氣不
升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥
飲食無味下弱則腰脚無力大便秘澀裏急後重臍腹
冷疼若治以涼則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦

欽定四庫全書

世醫得效方
卷三

壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥
却以所主藥治之氣壅耳聾泛熱咽疼亦效

五加皮

半兩酒浸半日炒黃色

枳殼

一兩湯浸去穰麩炒

柴胡

去毛蘆洗一兩

骨碎補

燎去毛剉炒半兩

地骨皮

半兩

炒黃

桔梗

半兩黃色炒

桑白皮

二兩剉炒

陳皮

一兩黃炒

色

訶子

炮取肉半兩炒

甘草

一兩炒

半夏

半兩生薑末生薑自然汁為餅再碎炒

草果

去皮膜半兩淨洗炒黃

右剉散和勻以椀盛就飯甑上蒸一伏時傾出攤令

冷收之每服二錢紫蘇三葉生薑三片水一盞同煎
七分食後通口服痰欬加半夏麴心肺虛每料加人
參茯苓一兩上膈熱加北黃芩五錢下部大段虛加
少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當
歸一兩煎

蘇子降氣湯治中脘不快心腹脹滿陰陽壅滯氣不升
降胸膈壅塞喘促短氣乾噫煩滿欬嗽痰涎口中無味
嗜卧減食宿寒留飲停積不消脅下支結常覺妨悶專

欽定四庫全書

世醫得效方
卷三

治脚氣上衝心腹堅滿肢體浮腫有妨飲食

蘇子

淨炒

半夏

洗七次各二兩半

甘草

炙

前胡

去蘆

厚朴

去麁皮薑汁製各一兩

陳皮

去白一兩

川當歸

去蘆一兩半

肉桂

去麁皮一兩不見火

右剉散每服二錢至三錢水一大盞生薑三片煎至
七分去渣溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食
體虛痰喘加人參一錢北五味子七粒鹽梅一箇杏
仁七粒去皮尖紅棗二枚煎虛煩加知母人參每料



各一兩

分心氣飲治男子婦人一切氣不和或因憂愁思慮或因酒色過傷或臨食憂煩或事不遂意以此不足留滯不散停於胸膈不能流暢致使心胸痞悶脇肋脹滿噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘竝皆療之常服升降陰陽調順三焦消化滯氣進美飲食此方獨清而疎快常服大效

欽定四庫全書

世醫得效方卷三

紫蘇

莖葉俱用四兩

羌活

半夏

湯洗七次

肉桂

去皮

青皮

去白

陳皮

去白

大腹皮

桑白皮

炒

木通

去皮節

芍藥

甘草

炙

赤茯苓

各一兩

右剉散每服三錢水一盞生薑三片棗二枚燈心十

莖取七分去渣溫服氣秘每服加枳殼去穰粟殼蘿

蔔子皂角子各半錢咳嗽不利加人參一錢五味子

七粒桔梗一錢氣滯腰疼加木瓜二片枳殼一錢半

水氣面目浮腫加車前子麥門冬去心甜葶藶子木

瓜澤瀉猪苓去皮每料各一兩又名小流氣飲推氣圓治三焦痞塞氣不升降胸腹滿悶大便澁小便赤黃

檳榔

枳實

陳皮

黃

大黃

黑牽牛
炒等分

右為末生薑自然汁煮糊圓如梧子大每服三四十圓淡薑湯下

神保圓治諸氣刺痛流入背脊及脇下諸藥不能治

欽定四庫全書

世醫得效方卷三

木香

胡椒

各一錢

全蝎

七枚

巴豆

十箇
去皮

研心

右為末湯和蒸餅圓麻子大朱砂為衣每服五粒心

膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑

醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹一分同研

為末煎桑白皮糯米飲調三錢下小喘桑白皮糯米

飲下腎氣脇下痛茴香酒下

五香連翹湯治壯盛人胸膈痞塞氣不升降百藥不效



服之奏功必矣 方見瘡腫雜證類

神仙九氣湯治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣怒氣山嵐瘴氣積聚堅牢如盃心腹刺痛不能飲食

時去時來發則欲死

川薑黃 甘草 香附子 各等分

右為末每服一大錢入鹽少許百沸湯點空心服立

效

賺氣散治心胸痞悶腹脇虛脹飲食減少氣不宣通及

傷寒兩脇刺痛攻心 欽定四庫全書 世醫得效方 卷三

京三稜 蓬莪茂 煨熟 各五兩

木香 半兩 枳殼 去白 欸炒 一兩 白木 三兩

右剉散每服二錢水一盞生薑三片煎至六分食前

溫服用砂糖少許壓下

參附正氣散治陰陽不和臟腑虛弱頭目昏眩腹脇刺

痛嘔逆惡心飲食不進氣虛盜汗咳嗽上喘四肢厥冷

腰背酸疼脾虛泄瀉脾腎俱損精血傷竭氣短脉沉耳

灸法凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝穴

乾焦黑面黃體瘦怠惰多困小便頻數小腸氣痛霍亂吐瀉及卒中風氣昏亂不常大病疴羸倦弱妊娠失調理產后虛損長久服之大能補虛正氣調理氣血固腎消痰

人參 木香 白豆蔻 各二錢半 川芎

乾薑 甘草 藿香 茯苓

黃耆 當歸 去尾 丁香 桂心

陳皮 白芷 縮砂仁 青皮 各半兩去

白 欽定四庫全書 世醫得效方 卷三

白木 附子 炮 半夏麴 各七

錢 此方屢有奇效

右剉散每服半錢生薑五片棗二箇煎服

破兜圓治受瘴結成氣塊腹中不能消散服之立效

華撥 一兩 大黃 一兩 各生用

右為末入生麝香少許煉蜜為圓如梧子大每服三

十圓空心冷酒下或溫冷湯下日三服

灸法凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝穴



在足大指本節後二寸陷中不限壯數從痛至不痛
不痛至痛止心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣心痛吐
下食不清灸太倉穴在心下四寸胃脘下一寸
臍下攪痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯
穴在臍下三寸及灸膏肓二穴
短氣不語灸大椎隨年壯又灸肺腧百壯臍孔中二
七壯乏氣灸第五椎下隨年壯

中氣

欽定四庫全書
世醫得效方
卷三

蘇合香圓治中氣雖不見方書所載然暴喜傷陽暴怒
傷陰憂愁失意氣多厥逆往往多得此疾便覺涎壅于
關緊急若作中風用藥非惟不相當多能死人昔有一
婦人因憂戚中忽然氣厥牙噤涎潮里醫作中風用藥
以大通利藥下之大泄數行一夕而卒可不戒之如遇
此證急化蘇合香圓四五粒灌之便醒然後隨其調理
無不痊愈

蘇合香油 一兩入安
息香膏內
薰陸香 一兩研

青木香 剉 白朮 去蘆 丁香 白檀香
朱砂 研 沉香 香附子 炒 烏犀 鎔屑
華撥 安息香 引為末用无灰 麝香 研
訶黎勒 煨 龍腦 研 已上各一兩
右為末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服
旋圓如梧子大取井花水溫冷任意下四圓老人小
兒可服一圓溫酒化服亦得並空心服之用蠟帟裹
一圓如彈子大緋絹袋盛當心帶之一切邪神不敢

欽定四庫全書
世醫得效方
卷三

近

獨香湯治中氣閉目不語四肢不收昏沉等證

南木香 不拘多少

右為末冬瓜子煎湯調下痰盛加南星為散生薑煎
木附湯治中寒中氣之候四肢厥逆口噤牙關緊急痰
涎壅盛如中風狀者

白朮 一兩 綿附子 炮去皮臍薄切片 甘草 炙
去蘆 一兩半

右剉散每服三錢水一盞薑十片煎取八分去滓後



調蘇合香圓二粒併進二服或氣短頭暈手足厥逆
未退者可進養正丹三十粒至百粒奇效不拘時服
回陽湯治中氣脉弱大段虛怯等證

川烏

生去皮臍

附子

生去皮臍各半兩

乾薑

炮二錢

青皮

去穰一兩

益智仁

去殼一兩

右剉散每服三錢薑七片紅棗一枚煎服或入少木

香不拘時候

八味順氣散中風亦當間服此藥中氣者尤得其宜

欽定四庫全書

世醫得效方卷三

白朮

炒

白茯苓

去皮

青皮

去白

白芷

陳皮

去白

天台烏藥

人參

去蘆各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服三錢水一大盞煎至七分溫服不拘時

候

諸症

風寒證烏頭桂枝湯治風寒疝腹中痛逆冷手足不仁
身體疼痛灸刺諸藥不能療及賊風入腹攻刺五臟拘
急不得轉側發作叫呼陰縮悉主之

大烏頭

一枚實者去皮尖蜜壹大盞煎減半出湯切洗

肉桂

去麤皮

芍藥

各三錢三字

甘草

炙二分半

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片大棗三箇入

前煎烏頭蜜半合同煎至七分盞去渣食前服一法

用附子一箇不使烏頭為蜜附湯

寒證倉卒散治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣痛

刺脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如

石白汗出

欽定四庫全書

世醫得效方卷三

山梔子

四兩半過

附子

一枚

右剉散每服二錢水一盞酒半盞煎至七分入鹽一

捻溫服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服四錢食

鹽少許煎服

生料木香勻氣散治寒疝作痛和氣

丁香

檀香

木香

各一兩

甘草

炙四兩

縮砂

去殼二兩

白豆蔻仁

沉香

各一兩

藿香

去土四兩

右剉散每服二錢水一盞半生薑三片紫蘇葉五皮



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

食鹽少許煎熱服不拘時候或為末炒茴香鹽酒調亦可		七情聚香飲子治七情所傷遂成七疝心腹脹痛痛引腰脇連背不可俛仰		檀香 木香 乳香 沉香		丁香 並不見火 藿香葉 去土各一兩		玄胡索 炒去皮 片子薑黃 洗 川烏 炮去皮犬 桔梗 去蘆炒		桂心 不見火 甘草 炙各半兩		右剉散每服四錢水一盞半生薑七片紅棗一枚煎至七分去渣溫服不拘時候		熱證加味通心飲治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腑不通		瞿麥穗 木通 去皮節 梔子 去殼 黃芩		連翹 甘草 枳殼 去穰		川練子 去核各等分		右剉散每服五錢水一盞半燈心二十莖車前草五	

莖同煎空心溫服		八正散治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門俱熱大小便不利作痛每服四錢燈心二十莖枳殼半斤去穰煎食前溫服熱盛加淡竹葉二十皮 方見秘結類		虛冷五積散治體虛膀胱小腸氣作痛不可忍每服五錢生薑三片鹽炒茱萸五粒茴香一撮葱白五寸煎空心熱服 方見前傷寒陰證類		蟠葱散治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛		連胸脇膀胱小腸腎氣又婦人血氣刺痛並皆治療		蒼朮 泔浸一宿切焙 甘草 炙各四兩 延胡索 一兩 官桂 去皮		乾薑 炮各一兩 縮砂 去殼 丁皮 檳榔 各二兩		蓬朮 煨 三稜 煨 白茯苓 去皮 青皮 去白各三兩		右剉散每服五錢水一盞半入連根葱白一莖煎至七分空心熱服		通治荆芥散治風疝陰腎腫大荆芥穗不拘多少新瓦上焙為末每服二錢熱酒調下效	



硃砂圓治諸疝作痛大效

木香

沉香

巴豆肉

全者各一兩

青皮

不去皮二兩

銅青

半兩研

硃砂

二錢半製如前研

右以二香青皮三味細判同巴豆漫火炒令紫色為度去巴為末入青砂二味研勻蒸餅和圓如梧子大

每服七圓至十圓湯吞下空心日進二三服

奪命散治小腸疝氣

玄胡索不拘多少鹽炒過入全蝎半錢為末每服一

欽定四庫全書



世醫得效方卷三

錢溫酒調下立效

五苓散治撮聚疝氣連根葱白二寸燈心十莖鹽炒茴香一撮川練子三箇去核煎湯調下大效傷暑濕作痛亦效吞青木香圓亦可

方見傷暑類

青木香圓治膀胱疝氣腫痛及胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛

六兩炒香搗末三兩

補骨脂

炒香

華澄茄

檳榔

酸粟米飯裹以濕紙包火中煨紙焦去飯各二兩

青木香

一兩

右為末入牽牛末令勻以清水拌和為圓如梧子大每服五十圓溫熱水吞下

又法用二伯粒斑蝥七箇去頭足翅為末同於文武火上漫炒令圓子微香以磁碟蓋銚上頓在冷處少頃去斑蝥末取圓子每服五十圓茴香酒下

三茱圓治小腸氣痛外腎腫墜

山茱萸

去核

吳茱萸

去梗

石茱萸

去梗

各二兩

川練子

一兩用斑蝥十四個去翅背同炒赤色去斑蝥不用

欽定四庫全書



世醫得效方卷三

破故紙

一兩七錢炒

青皮

去白

青鹽

各三兩

黑牽牛

一兩炒

茴香

炒三兩

右為末醋煮麪糊圓如梧子大每服五十圓用桃仁十五箇炒酒送下或茴香酒亦可

失笑散治小腸氣痛婦人血痛欲死者

川五靈脂

蒲黃

隔紙微炒

右剉散每服二錢酒半盞水半盞煎至七分食前服血痛臨熟入真米醋少許未效加玄胡索各等分



葫蘆巴圓治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍者

葫蘆巴炒八兩 茴香去土炒六兩 吳茱萸湯洗七次炒五兩

川練子炒九兩 大巴戟去心炒 川烏炮去皮尖各三兩

右為末酒煮麪糊圓如梧子大每服十五圓空心溫

酒送下小兒五圓茴香湯吞下又方加牽牛

玄附湯治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑滑泄

玄胡索炒去皮 附子炮去皮臍各一兩 木香不見火

欽定四庫全書 世醫得效方 卷三

右剉散每服四錢水一盞薑七片煎七分不拘時溫服

立效散治疝氣

川芎 川練子 青皮去白 茴香船上者

桃仁 黑牽牛炒各一兩

右剉散每服二錢無灰酒一盞煎八分溫服

金鈴圓治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

金鈴子肉五兩 茴香炒 馬蘭花炒

海蛤 破故紙 兔絲子 海帶各一兩

右為末加木香丁香末各一兩糊丸梧子大酒下三十圓去鈴圓治疝氣

用茴香一斤以老生薑二斤取自然汁浸茴香一夜約薑汁盡入茴香內以好食鹽二兩同炒赤取出焙燥碾羅為末無灰酒煮糊圓如梧子大每日空心食前服三十圓或五十圓溫酒米飲任下此藥專實脾胃以其有鹽引入下部遂大治小腸疝氣服之累有效尋常治疝氣藥多是疎導久而未有不為害者此

欽定四庫全書 世醫得效方 卷三

藥用薑汁專一發散而無疎導之害所以為妙也

三增茴香圓治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成寒疝伏留不散臍腹撮痛陰核偏大膚囊擁腫重墜滋長有妨行步瘙痒不止時行黃水浸成瘡瘍或長恠肉累治不痊致令腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸漸醜大皆由頓服熱藥內攻或因兜取以至如此此藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝煖養腎經能使復元應小腸氣寒疝之疾久新不過三料第一料



茴香	炮上者用鹽半兩 同炒焦黃	川練子	炮 去核	沙參	洗 剉
木香	洗 各一兩				
右為末水煮米粉稠糊圓如梧子大每服二十圓溫酒鹽湯空心食前日進三服小病此一料可安纔盡可服第二料					
第二料加下項藥					
萆撥	一兩	檳榔	半兩		
右入前藥共六味重五兩半依前法糊圓湯引圓數服之若病久未愈便服第三料					
第三料又加下項藥					
白茯苓	四兩 紫小實 者去黑皮	黑附子	半兩 炮去皮臍 秤或作一兩		
右通前藥共八味重十兩並依前法糊圓數服之加至三十圓新久大病不過此三料可愈小腸氣頻發及三十年者寒疝漸至栲栳大者皆可消散神效					
消堅圓					
牡丹皮	去骨 各一兩	桂心	各一兩	川烏	炮去皮尖

桃仁	麩炒黃去皮尖 別研各五錢				
右為末酒糊為圓如梧子大每服三十圓溫酒下					
川練子圓治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖多年服此藥永去根本					
川練子	一斤淨肉 同炒麩黃色去麩斑	四兩用麩一合	斑毛	四十九	
麩	一合巴豆四十九粒	同炒麩黃色去麩	巴豆	不	
用	四兩用麩一合	巴戟一兩	同炒麩黃色去麩	麩	
巴戟	不用	四兩用鹽一兩	茴香	不用	
合同炒黃色為度	去鹽及茴香	不用			
木香	一兩 不見火	破故紙	一兩炒香為度		
右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯下甚者日進三兩服空心食前					
海藻圓治偏墜小腸氣效					
海藻	海帶	各一兩	斑蝥	二十八箇 去足	
巴豆	二十八箇 殼完全者	去			
右斑蝥巴豆二味一處生絹袋盛用好醋一碗以瓦銚盛四味同煮將乾去斑蝥巴豆不用只將海帶二味細研為末以淡豆豉一百粒以煮藥餘醋畧浸蒸					



研為膏和末藥為圓如梧子大每服用麝香少許硃砂三錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勻為衣日乾以新瓦瓶收之每初服七粒二服十粒三服十五粒若未愈再進三兩服皆用十五粒仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病三五服效此藥貴新合效速若合下稍久多服為佳

敷法治腎囊偏墜

牡礪一兩 良薑一兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷三

右為末津唾調傳大偏處須臾如火熱著痛即安

灸法治諸氣心腹痛小腸氣外腎吊痛疝氣小腹急痛不可忍足大姆指次指下中節橫紋當中灸五壯男左女右極妙又治疝氣偏墜

量患人口角兩角為一折斷如此則三折成三角如▲樣以一角臍心兩角在臍之下兩傍盡處是穴左偏灸右右偏灸左二七壯若灸兩邊亦無害

治腎氣外腎腫小腸氣痛腹內虛鳴灸風市穴五七

壯灸氣海穴七壯灸臍左右各去一寸半兩穴各七壯灸之立效後永不發名外陵穴風市穴在膝上外廉五寸氣海穴在臍下一寸半

腰痛

獨活寄生湯治風傷腎經腰痛如掣久不治流入脚膝為偏枯冷痺緩弱之患及新產腰脚攣疼除風活血

獨活二兩 真桑寄生無則用川續斷代 杜仲切炒

北細辛 白芍藥 桂心 芎藭

欽定四庫全書 世醫得效方 卷三

防風去蘆 甘草 人參 熟地黄洗

大當歸各二兩

右剉散每服四錢水二盞煎空心服或小續命湯加桃仁煎氣血不和不食除地黃

五積散治寒傷腎經腰痛不可俛仰每服可加桃仁七粒去皮尖煎疼甚或加黑牽牛少許熟炒研特效方見傷寒

陰證類

腎著湯治久處卑濕濕傷腎經腰重冷痛如帶五千錢



冷如水洗以熱物着痛處方少寬不渴小便自利食飲如故虛弱人加附子或用白朮芍藥官桂附子各等分		為末每服二錢酒調服	方見傷濕類
薑附湯治體虛傷冷腰痛加官桂製杜仲	各五錢食前服方見中寒類	敗毒散治風熱腰痛加續斷天麻薄荷木瓜	各等分方見傷寒湯證類
舒筋散治血滯腰痛亦治閃挫	玄胡索	當歸	官桂
右為末每服二錢溫酒調下食前服或加牛膝桃仁		川續斷亦效	
人參順氣散治氣滯腰痛加五加皮煎服		木香流氣飲立效	
小七香圓治鬱怒憂思氣滯腰疼		甘松	炒一兩
丁香皮		甘草	炒十兩
蓬莪朮		香附子	炒去毛十五兩
縮砂仁		益智仁	炒七兩半
右為圓每服五十圓橘子一錢鹽少許煎湯空心服			

或用沉香降氣湯打和勻氣散		神麴酒治閃挫腰痛	神麴一塊約如拳大燒令通赤好酒二大盞燂酒便飲令盡仰卧少頃即安或用枳殼散	方見婦人類
或以縮砂烏沉湯木瓜鹽酒調熱服亦效		安腎圓治腎虛腰疼橘皮鹽煎湯吞加華蘼尤佳	方見諸虛類	青娥圓治腎虛勞力腰疼益精助陽烏髭健脚力神效
破故紙		杜仲	去麤皮切薑汁拌炒去絲八兩	右為末用胡桃肉五十箇大蒜二十箇研膏圓如梧子大每服三十五圓鹽湯服虛極人十補湯吞服
一方加川續斷桃仁去皮尖玄胡索黑牽牛炒酌量入		八味圓加鹿茸當歸木瓜續斷治房勞傷腎腰痛鹽湯下	方見虛損類	二至圓治老人虛弱人腎氣虛損腰痛不可屈伸
鹿角		麋角	二兩	附子
桂心		補骨脂	炒各一兩	杜仲
			去皮剉炒絲斷一兩	



鹿茸 酒蒸焙一兩 青鹽 別研半兩	右為末酒糊圓如梧子大每服七十圓空心用胡桃肉細嚼以鹽酒鹽湯任下惡熱藥去附子加肉蓯蓉	一兩酒浸微炙乾用	牽牛圓治冷氣流注腰疼不能俛仰	延胡索 破故紙 炒各二兩 黑牽牛 炒二兩	右為末研煨蒜為圓如梧子大每服三十圓葱酒鹽湯任下	赴痛圓治腰痛極效亦治關肭	附子 炮半兩 黑牽牛 一兩	右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽湯食前服	熟大黃湯治打撲腰痛惡血蓄瘀痛不可忍	大黃 生薑 並切如豆大各半兩	右同炒令焦黃以水一大盞浸一宿五更去渣頓服	天明所下如雞肝即惡物也	二效方治坐立或熟睡濕地濕入腎經外腎腫腰背曲

欽定四庫全書
世醫得效方
卷三



痛楚甚用五苓散每服二錢用坯子少許下青木香圓三十粒數服臟腑微動腫消腰直其痛立止	又方赴痛圓治腰臂痛	五靈脂 赤芍藥 各半兩 川烏 一箇	沒藥 四錢 麝香 一錢	右為末酒糊圓空心溫酒送下	導引法理腰背痛正東坐收手抱心一人於前據躡其兩膝一人後捧其頭徐牽令偃卧頭到地三起三卧	便瘥	針灸法	腰背痛針決膝腰句畫中青赤路脉出血便瘥	腰痛不得俛仰者令患人正立以竹拄地度至臍斷	竹乃度背灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人知	灸腎腧穴亦可	眩暈	風證川芎散治眩暈惡風自汗或身體不仁氣上衝胸

欽定四庫全書
世醫得效方
卷三



戰搖如在舟船之上

川芎 一兩 北細辛 三分 白茯苓 一兩 白朮 一兩

粉草 半兩 桂枝 三分

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎不拘時服

有痰兼服青州白圓子 方見風科通治類

感寒三五七散治陽虛眩暈頭痛惡寒耳鳴或耳聾

人參 附子 北細辛 各三錢 甘草

乾薑 山茱萸 防風 山藥 各五錢

欽定四庫全書 世醫得效方卷三

右剉散每服四錢生薑五片棗二枚煎食前服中寒

眩暈欲倒服薑附湯 方見中寒類

傷暑消暑圓治胃暑眩暈煩悶不甦用香薷散生薑煎

吞下每服七十圓 方見中暑類

中濕芎朮散治胃雨中濕眩暈嘔吐涎沫頭重不食經

久不瘥者

川芎 半夏 白朮 各一兩 甘草 半兩

右剉散每服四錢生薑五片木瓜二片不拘時候溫服

七情茯神湯治喜怒憂思悲恐驚所感臟氣不行鬱而生涎結為飲隨氣上厥伏留陽經心中忪悸四肢緩弱翕然面熱頭目眩胃如欲搖動

人參 麥門冬 去心 山藥 各二兩 前胡

熟地黃 洗酒拌炒各一兩 枳殼 去穢麩炒三分

遠志 甘草水煮去心薑汁拌炒三分 白茯苓 茯神 各一兩半

半夏 湯洗七次 黃耆 炙各一兩 甘草 半兩

右剉散每服四錢流水盪半薑五片秫米一撮煎食

欽定四庫全書 世醫得效方卷三

前服

痰證加味二陳湯治痰暈或因冷食所傷

陳皮 半夏 白茯苓 各一兩 甘草 五錢

丁香 胡椒 各三錢

右剉散每服四錢薑三片烏梅一箇同煎不拘時熱

服體虛甚者順元散 方見痰癰類

失血芎歸湯治去血過多頭重目昏眩暈不省舉頭欲

倒



大芎藭

大當歸 去尾各三兩

右剉散每服三錢水一盞半煎不拘時候

下虛增損黑錫丹治陰陽不升降上熱下冷頭目眩暈
病至危篤或煖藥上僭愈甚者

黑錫丹頭 二兩

川練子

陽起石

木香

沉香

青皮 炒各半兩

肉豆蔻

茴香

官桂

去麤皮不見火 綿附 炮去臍

葫蘆巴

破故紙

炒各一兩 烏藥 去木剉一分

磁石 火煨醋淬七次細研水飛

欽定四庫全書 世醫得效方卷三

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓加至七十圓

濃煎人參茯苓薑棗湯空心吞下

身疼

風證烏藥順氣散又名通氣驅風湯加大川芎 方見虛證類

寒證香葛湯發汗即效或用敗毒散 方並見傷寒類

濕證除濕湯五苓散 方見傷濕暑類

血滯當歸建中湯 方見腹痛類

或用舒筋散於內有延胡索活血除風理氣 方見腰痛類

冷痰用二陳湯加辣桂生薑烏梅煎 方見瘧瘧類

勞倦秦艽鱉甲散治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌
體羸瘦骨節煩疼頭昏頰赤肢體枯槁面色萎黃唇焦

口乾心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧
神情恍惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴

氣寒熱往來並能治之

荊芥 去梗一兩

貝母 去心一兩 白芷 半兩

山藥

天仙藤

前胡 去蘆各一兩

羌活

肉桂 各半兩

欽定四庫全書 世醫得效方卷三

鱉甲 去裙醋炙

陳皮 去白

秦艽 去蘆洗

甘草 炙各一兩

右剉散每服二錢水一盞薑三片同煎至八分稍熱
服不拘時酒調亦得常服養氣調血解倦怠

虛損證十補湯加半夏秦艽肉桂每服各半錢 方見虛損類

臂痛

風證烏藥順氣散 方見風科虛證類

五靈脂散治臂脾痛

五靈脂

荊芥穗

防風

羌活



獨活	甘草節	川山甲	骨碎補
草烏	麝		
錢各五	少許		
右為末用溫酒調下臨睡服如渾身損痛加沒藥木			
香酒調空心服			
寒證五積散和敗毒散加川牛膝木瓜葱白			
陰證類			
濕證活絡湯治風濕臂痛諸藥不效			
白朮	當歸	獨活	
薄切	淨洗	淨洗	
一兩	切乾秤		
羌活	甘草	川芎	
淨洗去蘆切乾	炙	各半兩	
右剉散每服三大錢水一盞半薑五片慢火煎至一			
盞去渣溫服合滓不拘時候			
二方用蒼朮切炒川白芷各二兩為末每服二			
錢酒調效			
七情白芥子散治臂痛外連肌肉牽引背脾時發時止			
此由榮衛之氣循行失度留滯經絡與正氣相搏其痛			
發則有似癱瘓			
真白芥子	木鱉子	沒藥	
	去穰各二兩		
桂心	木香		
	各半兩		

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下			
流氣飲子	治同上		
紫蘇葉	青皮	苦梗	當歸
芍藥	烏藥	茯苓	川芎
黃耆	枳殼	防風	甘草
	麸炒	各半兩	
橘皮	木香	連皮大腹子	薑片炒
各三		二兩	剉
右剉散每服水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去滓服			
服			
欽定四庫全書	世醫得效方卷三		
痰證茯苓圓	方見痰飲類		
芎活湯治水飲停蓄注於經絡發為臂痛皆因脾土有虧平日多飲水漿不能傳化所致			
川芎	半夏	白茯苓	川獨活
	湯洗		
陳皮	枳殼	白朮	甘草
	去穰炒各半兩		各一分
右為散每服三錢水一盞半生薑五片同煎去滓食後停少時溫服			
控涎丹凡人忽患胸背手脚腰胯隱痛不可忍連筋骨			

牽引釣痛坐卧不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注使用風藥及針灸皆無益又疑風毒結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃是痰涎伏在心鬲上下變為此疾或令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲多流睡涎手脚重腿冷痺氣脉不通誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但以是藥不過數服其疾如失

甘遂 去心

紫大戟 去皮

白芥子 真者各等分

欽定四庫全書

世醫得效方卷三

右為末煑糊圓如梧子大曬乾食後臨睡薑湯或熟水下五七圓至十圓如疾猛氣實加圓數不妨其效如神加味控涎圓一方見喘急類

氣滯神保圓 方見諸氣類

血氣滯舒經湯治血氣滯留經絡不行臂痛不可忍者

片子薑黃 四兩如無用嫩莖木代不可用染物者

白朮 炒二兩

羌活 炙 甘草 各一兩 當歸 二兩

海桐皮 去麤皮二兩 赤芍藥 一兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分空心服熱證防風通聖散 方見風科熱證類

敷貼藥治臂腿間忽一兩點痛著骨不可忍

芫花根一味研為末米醋調隨大小傳之立止敷貼

不住須以紙花覆其上用絹帛扎定

針法肩隅一穴隨時而愈

脇痛

傷寒小柴胡湯加白牡蠣粉研碎枳殼去穰切片各半

欽定四庫全書

世醫得效方卷三

錢煎 方見傷寒陽證類

氣滯神保圓治膀胱氣脇下痛或項筋痛久不愈流入

背脊臂脾並皆治之每服七粒用茴香酒下 方見諸氣類

七情枳殼煑散治悲哀煩惱傷肝氣至兩腋骨疼筋脉

拘急腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至

背脊攣急大治脇痛

防風 去蘆

川芎

細辛

枳殼 去穰炒

桔梗 炒各四兩 甘草 炒二兩

乾葛 一兩半



右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎至七分去渣空心溫服	
通治推氣散治右脇疼痛脹滿不食	
枳殼 去穢炒 桂心 去皮不見火 甘草 炒二錢	
片子薑黃 洗半兩	
右為末每服二錢薑棗湯調服酒亦可	
川芎散治左脇刺痛不可忍者	
枳實 川芎 各半兩 粉草 炙二錢半	
右為末每服二錢薑棗湯調服酒亦可	
枳殼散治脇間痛如有物以挿然及氣疾也	
枳殼 去穢炒二兩半 甘草 炙七錢半	
右為末每服二錢濃煎葱白湯調下不拘時候	
腹痛	
風證胃風湯治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉下注腹中虛滿日夕滾痛或下瘀血或如豆羹汁服熱藥無效者此風痛也加入濃磨木香水一合 方見泄瀉類	



寒證體虛者五積散生薑三片煨葱白二根木瓜二片鹽炒茺萸七粒煎體實者藿香正氣散生薑三片枳殼半片木香少許煎 方並見傷寒陰證類	
暑證香薷散加生薑陳大蓼木瓜陳壁土煎五苓散以熱蘇鹽湯調香薷散為末服亦效湯引五苓散同 方並見傷寒類	
濕證香蘇散加炒蒼朮煨枳殼煎末效用不換金正氣散生薑木瓜紅棗車前子煎效 方見傷寒和解類及時疫類以上所加隨意增減	
熱證四順清原飲治腹痛大便秘小便赤喜飲冷以手按之轉甚不可近病者或兩手熱痛處亦熱 方見積熱類	
或用大柴胡湯 方見傷寒陽證類	
或用小三黃圓八正散 方見積熱類	
老人大麻仁圓 方見秘結類	
冷證椒附圓治臍下極冷痛楚異常手足亦冷不任冷水冷食面黃肌瘦按之病稍止者	



綿附 一箇十胡椒 一百粒
二錢者

右為末姜汁糊為圓如梧子大每服五十圓薑湯或鹽湯空心吞下

蟠葱散加茱萸木香煎亦效 方見諸痢類

氣證虛者嘉禾散木香勻氣散木香流氣飲治滿腹脹膨痛流走不定傍衝兩脇及腰間實者分心氣飲青木

香圓熱盛大便秘三和散木香檳榔圓加大黃 方並見諸氣諸

痢類

欽定四庫全書 世醫得效方
卷三

積證香蘇散用生薑烏梅縮砂煎吞感應圓治食多噫

醋吞酸口出清水惡心腹中緊痛每服三七粒棗豆大

服後得通仍佐以三稜煎圓及紅圓子平胃散縮砂香

附湯等藥方得全安 方見脾胃諸氣痰癰類

神保圓治寒氣停積逾旬不愈大便虛澁小便赤急痛

甚用治中湯加縮砂仁二十粒搥碎水二盞生薑十片

煎服五粒未效再服七粒立愈 方見諸氣及傷寒陰證類

蟲證化蟲圓治腹中有塊起以手按之不見作聚往來

痛無休止亦治心痛五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫或吐清水及夢中齧齒面色青黃飲食雖多不作肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不知病之去處其蟲不療則子母相生无有休止長一尺則害人

胡粉 炒五錢 鶴蟲 三錢 白礬 五錢 檳榔 五錢

苦楝根 五錢

右為末麪糊圓如麻子大每服十五圓溫漿入生麻油一兩點打勻下之溫米飲下亦得不拘時候其虫

欽定四庫全書 世醫得效方
卷三

細小者化為水大者自下

虛證當歸建中湯治勞傷虛羸腹痛呼吸少氣小腹拘

急連腰背時自汗出不思飲食

當歸 二兩 桂心 一兩半 楊芍藥 二兩 黃耆 一兩半

右剉散每服水二盞半薑三片棗二枚同煎食前溫

服

通治大抵宜通塞則為痛凡痛甚須通利臟腑乃愈隨

冷熱須用巴豆大黃牽牛此最要法



小理中圓治三脫氣弱中焦積寒脾虛不磨飲食遲化
喫物頻傷胸膈滿悶脇肋痛刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹
脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣翻胃吐食飲食減少

草豆蔻 煨

京三稜 煨 乘 乾薑 炮

青皮

陳皮 淨洗 去蒂

肉桂 去 麤皮 各二兩

牽牛 炒 香 熟

良薑 炒 各 三斤

阿魏 去沙石 研

縮砂仁

紅豆

蓬莪朮 各一斤

炒 乘 熱 碎

右為末用水煮麪糊圓如梧子大每服三十粒生薑

欽定四庫全書



世醫得效方 卷三

橘皮湯下溫湯亦得不拘時此藥無利性不損脾胃

氣偏虛寒者最宜服之與三稜煎圓和同服尤妙

諸氣類

腹痛作嘔欲利大便諸藥皆吐惟蘇感圓用薑汁泡

湯吞服最妙蘇合香圓

見中氣類

感應圓

見秘結類

氣滯腹痛神保圓柿蒂燈心湯下二七圓最為捷效

方見諸氣類或肚腹作痛以磁石數斤杵為末鋪席
睡其上再以磁石煎湯調小調氣散服效

諸痺

風寒濕合痺附子湯治合痺骨節疼痛皮膚不仁肌肉
重著四肢緩縱腰脚酸疼

生附子 一兩

白芍藥

官桂

甘草

白茯苓

人參 半兩

白朮 三錢

右剉散每服四錢水二盞生薑七片煎至六分去渣
食前服惡甜者減甘草一半兼治瘦極筋脉氣虛倦

怠偏體酸疼

烏頭湯治寒冷濕痺流於經絡攣縮不得轉側

欽定四庫全書



世醫得效方 卷三

大烏頭

細辛

川椒

甘草

秦艽

附子

官桂

白芍

各七分

川獨活

一兩三錢半

右剉散每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分去

滓空心食前服

理中湯治寒濕痺加附子天麻四分之一

方見霍亂類

黃蓍酒治風濕痺身體頑麻皮膚瘙癢筋脉攣急言語

謬澁手足不遂時覺不仁



黃蓍 去蘆	防風 去蘆	官桂 不見火	天麻
草薢	白芍藥	當歸 去蘆	雲母粉
白朮	茵芋葉	木香 不見火	仙靈皮
甘草	川續斷 各一兩		
右剉散以生絹袋盛以酒一斗浸之春五日夏三日			
秋七日冬十日每服一盞溫煖服之不拘時候常令			
酒氣相續為佳			
蒼耳散治一切風濕痺四肢拘攣			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷三			
蒼耳子三兩為散水一升半煎去滓分作三服或細			
末水糊圓如梧桐子大每服五十圓溫酒吞下			
薏苡粥治久風濕痺正氣除骨中邪氣利腸胃消水腫			
久服輕身益氣			
薏苡 一升為末以水作粥空心服			
寒證麻痺五積散 方見傷寒通治類			
痰飲茯苓湯治痰飲手足麻痺多睡眩冒			
半夏 湯炮七次	赤茯苓 去皮	橘皮 各一兩	枳殼 去穰炒

桔梗	去蘆	甘草	炙各半兩	右剉散每服四錢水一盞半薑七片煎至七分去渣	
溫服不拘時候				血氣滯三痺湯治血氣凝滯手足拘攣療風痺氣痺等疾	
川續斷	杜仲	去皮切薑汁炒	防風	桂心	
華陰細辛	人參	白茯苓	當歸		
白芍藥	甘草	各一兩	秦艽	生地黃	
川芎	川獨活	各半兩	黃蓍	川牛膝	各兩
右剉散每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎至一盞	去渣熱服不拘時但腹稍空服				
筋痺羚羊角湯治筋痺肢節束痛				羚羊角	
羚羊角	薄桂	附子	各一兩三錢半	川芎	一兩
獨活	錢一兩半	白芍藥	防風	各一兩	
右剉散每服三大錢水一盞半生薑三片同煎至八	分取清汁服日可一二服				

欽定四庫全書

世醫得效方

卷三

熱證升麻湯治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱
皮色變兼諸風皆治

升麻 三兩

茯神 去皮

人參

防風

犀角 鎔

羚羊角 鎔

羌活 各一兩

官桂 半兩

右剉散每服四錢水二盞生薑二片竹瀝少許同煎
至一盞不拘時溫服

諸疸

風證艾煎丸治因傷風癢熱不解發為風疸舉身黃小

欽定四庫全書



世醫得效方
卷三

便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱

生艾 二月採一束搗爛銅器煎如膏

大黃 蒸

黃連 炒

括樓根

凝水石 煨

苦參

甘草

葶藶 紙隔炒各等分

右為末以艾膏和得所丸如梧子大初服六七圓漸
加至二十丸有熱加苦參渴加括樓根小便澁加葶
藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃
並倍加

麻黃酒治傷寒不解發為黃疸其脉緊以汗解之

麻黃 三兩

右用水酒五升煎至二升每服一盞溫服汗愈 春夏秋水

暑證五苓散治伏暑中熱發黃小便不利煩渴茵陳煎
湯調下一方治疸通用 方見傷暑類

茵陳湯治濕熱癢黃小便秘澁頭汗而渴

茵陳蒿 半一兩

大黃 半兩

小紅梔子 十枚

右剉散每服三錢水煎服五苓散亦治發黃二藥夾

欽定四庫全書



世醫得效方
卷三

煎

濕證礬石滑石散治濕疸得之一身盡疼發熱面色黑
黃七八日後壯熱在裏有血下如狔肝狀小腹滿者急
下之身目盡黃小便不利其脉沉細

礬石 煨

滑石 各等分

右為末每服二大錢麥粥飲調下日三服食前便利
如血者效或汗愈
時行梔子圓治時行病急黃及瘴瘧疫癘



茵陳	梔子	芒硝	縮砂
大黃	杏仁	甘草	
蒸一兩一分	去皮尖炒		
豆豉	恒山	檳榔	
二分半湯浸軟別研			
鰾甲	巴豆		
醋炙各半兩	去皮壓去油一分		
右為末錫飴為圓如梧子大每服三圓飲下吐利為效未效加一圓覺體氣有異急服之			
黃汗苦酒湯治身體洪腫發熱自汗如藥汁其脉沉			
黃耆	芍藥	桂心	
五兩		三兩	
右剉散每服四錢苦酒三合水一盞半煎至七分去渣不以時服初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍愈桂枝加黃耆湯治黃汗身腫汗出已輒輕久久必身困胸中痛腰以下無汗腰臃弛痛如有物在皮中劇者不能食煩燥小便不利			
桂枝	芍藥	甘草	黃耆
去皮	各三兩	二兩	五兩
右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎至七分去渣溫服仍飲熱粥以助藥力覆取微汗未汗再服			

欽定四庫全書



世醫得效方
卷三



迪志文化出版有限公司出版

黃疸茵陳散治黃疸食已即飢身體面目爪甲牙齒及小便悉黃寒熱或身體多赤多青皆由酒食過度為風濕所搏熱氣鬱蒸而成			
茵陳	木通	梔子仁	大黃
一箇	二兩	各一兩	炒
瓜蒌	石膏	甘草	
一箇	二兩	炙半兩	兩
右剉散每服水一盞半生薑五片葱白一莖煎至八分去滓溫服不拘時候大小便閉加枳實赤茯苓薤子小半夏湯治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不			
可除熱熱去必噦			
半夏			
右剉散每服三錢水二錢薑十片煎至七分不以時服單方治黃疸身眼黃如金色不可使婦人鷄犬見修製			
東引桃根	以細如筋若釵股者以下一握		
右以水一大升煎取一小升適溫空腹頻服後三日其黃離離如薄雨散最後瘥百日方平復身黃後可時時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食麪猪魚肉			

欽定四庫全書



世醫得效方
卷三



迪志文化出版有限公司出版

穀疸苦參圓治胃暑瘵熱氣濁食谷不消大小便不利		脹滿不下食少陽脉緊而數亦治因勞發熱熱鬱發黃		苦參 三兩 龍膽草 一兩 梔子 去皮炒 半兩 人參 三分		右為末以猪膽汁入熟蜜少許搜和圓如梧子大以		大麥煑飲下五十圓日三服不效稍加之		脾疸龍腦圓治胸中鬱熱肺熱喘嗽口臭喉腥或口甜		丈夫吐血婦人熱血崩並皆治		龍腦薄荷 五兩 淨葉 真蒲黃 一兩 麥門冬 去心 二兩		欽定四庫全書 世醫得效方 卷三		阿膠 一兩 甘草 一兩 人參 一兩 川當歸		黃耆 一兩 半 木通 一兩 生乾地黄 三兩		柴胡 好者 半兩		右為末煉蜜圓如梧子大每服二十圓上焦食後用		熱水吞下微嚼破更好病下焦空心服小兒加減與		之此藥大有奇效不可盡述		紅圓子治穀疸腹滿眩暈怫鬱怔忡酒疸通用二陳湯		加縮砂煎湯下 方見痰癰類	

酒疸葛根湯治酒疸因下後久久為黑疸目青面黑心		中如啖非蠶狀大便正黑小便亦或黑其脉微而數大		抵五疸惟酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同		有盈石而不醉者有濡唇而輒亂者以醞釀而成有大		熱毒滲入百脉為病則不待發黃溢于皮膚為黑為腫		流於清氣道中則眼黃鼻腫種種不同故方中論酒疸		外有肉疸黑疸辯疸勞役疸		葛根 一兩 枳實 去穰 炒 梔子仁 豉 各一兩		欽定四庫全書 世醫得效方 卷三		甘草 炙 半兩		右剉散每服四錢水盞半煎至八分去渣溫服不拘時		酒蒸黃連圓治酒疸		黃連去鬚淨四兩剉碎以酒洒醃一宿日乾為末粟		米糊為圓梧桐子大每服三四十圓以二陳湯加葛		根茵陳薑棗煎湯送下		六物飲治酒疸肚脹		華撥 荊芥穗 不蛀川練子 連皮核用	



生薑母

軟烏梅

甘草

右件等分於石臼中搗細用磁器盛以自己滿腹小

便去其首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星一宿

拂明飲其汁續用車前子山茵陳竹園荳煎湯乘熱

調五苓散服自覺黃水從小便出而肚不脹妙

人參散治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失常

人參

白芍藥

栝樓根

枳殼

去麩炒

茯神

酸棗仁

甘草

炙各一兩

熟地黃二兩

欽定四庫全書



世醫得效方卷三

右剉散每服四大錢水一盞煎至七分食後臨卧溫服

辰砂妙香散治飲酒行房酒熱瘀於心經致成黃疸再加

辰砂末少許每服二錢茵陳二根煎湯日三服

方見心恙類

土瓜方治酒疸熱疸土瓜搗汁取服任意

如神散治酒毒不散發黃久久浸漬流入清氣道中宜

引藥內鼻滴出黃水愈

苦瓠子

去殼

苦葫蘆子

各三七箇

米

百粒

黃黍米

三百粒

安息香

二皂角子大

右為末以一字搐入鼻中滴盡黃水三升或過多則

以香穰燒灰麝香末各少許搐入鼻中立止

女勞疸石膏散治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒小

腹急足下熱其脉浮緊腹或滿者難治

滑石

石膏

煨各等分

右為末大麥粥飲調下二錢七日三四服小便利則瘥

熱疸一清飲治疸發熱諸熱通用

柴胡

三兩

赤茯苓

二兩

桑白皮製

川芎

一兩

欽定四庫全書



世醫得效方卷三

甘草

炙半兩

右剉散每服三錢生薑棗子煎服

虛勞疸秦艽飲治五疸口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白濁

秦艽

去蘆

當歸

去蘆酒浸

芍藥

白朮

官桂

去皮不見火

赤茯苓

去皮

熟地黃

酒蒸

橘紅

小草

川芎

各一兩

半夏

湯洗

甘草

炙各兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去渣

溫服不拘時候



養勞湯治證同上 方見虛損類		久黃苦參散治人無故忽然振寒皮膚黯塵出小便赤		澁大便時秘氣無異飲食不妨諸藥湯不除因為久黃		苦參 黃連 瓜蒂 黃蘗 去皮		大黃 蒸各一分 葶藶 炒半兩		右為末每服一大錢米飲調服當吐下隨時消息加減		積黃無忌紫金圓理脾胃退黃		針砂 醋煑通紅 紫金皮 酒浸 香附子 炒 三稜 醋浸一宿煑		蒼朮 米泔浸 陳皮 青皮 去白 厚朴 薑製		縮砂 各一兩		右醋糊圓每服三十圓酒熟水下川椒湯服亦可立效		五噎		五噎散治五種噎食飲不下胸背痛嘔噦不徹攻刺疼		痛淚與涎俱出		人參 茯苓 厚朴 去麤皮薑汁製 甘草 炙		枳殼 麸炒去穰 訶子 炮去核 桂心 白朮	



橘皮 白薑 三稜 炮 神麴 炒		麥牙 炒各二兩 木香 檳榔 蓬莪朮 泡各兩		右剉散每服二錢水一盞生薑三片棗子一枚煎至十分空心服為末鹽湯亦得		沉香散治五噎五膈胸中久寒諸氣結聚嘔逆噎塞食飲不化結氣不消常服寬氣通噎寬中進食		白朮 茯苓 各半兩 木通 當歸		橘皮 青皮 大腹子 檳榔		芍藥 各一兩 甘草 炙一兩半 白芷 三兩 紫蘇葉 四兩		枳殼 麸炒去穰三兩		右剉散每服水一盞薑三片棗二枚煎至六分空腹溫服		嘉禾散治同上		大七氣湯治喜怒不節憂思兼并多生悲恐或時振驚致臟氣不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉有如炙鬻吐嚥不下皆七氣所生	



半夏 湯泡七次五兩	白茯苓 四兩	厚朴 薑製炒三兩	紫蘇 二兩
右剉散每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎空腹溫服			
五膈			
寬中散治因憂恚寒熱動氣成五種膈氣不進飲食			
白豆蔻 去皮二兩	縮砂 四兩	香附子 炒去毛十六兩	
丁香 四兩	木香 三兩	青皮 去白四兩	甘草 炙五兩
厚朴 去皮薑汁炙令熟一斤	陳皮 去白四兩		
右為末每服二錢入生薑二片鹽少許沸湯點服不以時候諸冷氣用之亦效			
五膈散治五膈胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡心不進飲食			
枳殼 去穰炒	木香 不見火	青皮 去白	大腹子
白朮	半夏 剉炒	丁香 不見火	天南星 湯泡皮
乾薑 炮	麥牙 炒	草果仁 各一兩	甘草 炙半兩
右為末每服二錢水一中盞生薑五片煎至六分溫			

欽定四庫全書



世醫得效方卷三



迪志文化出版有限公司出版

服不拘時候			
五膈圓治憂恚思慮膈塞不通及食冷物即發其病苦心病不得氣息引背痛如刺心下堅大如粉絮緊痛欲吐吐即差食飲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆者			
麥門冬 去心	甘草 炙各五兩	人參 四兩	川椒 炒出汗
遠志 去心炒	細辛 去苗	桂心 各三兩	乾薑 炮二兩
附子 一兩			
右為末蜜圓彈子大含化日三服夜二服胸中當熱七日愈亦可圓如梧子大米湯下二三十圓夏加麥門冬甘草人參各一兩一方以吳茱萸代桂治遇寒冷則心痛咽中有物吐不出嚥不入飲食減少並可服不拘時			
寬膈圓治氣不升降胸膈結痞			
木香	京三稜	青皮 各半兩	縮砂 五錢
半夏 三兩湯洗七次	大腹子 一分		

欽定四庫全書



世醫得效方卷三



迪志文化出版有限公司出版

右為末薑汁糊為圓如梧子大食後米湯下二三十圓

瓜萋實圓治胸中痛徹背喘急妨悶

瓜萋實 別研 枳殼 去穰 半夏 湯泡七次

桔梗 各一兩

右為末薑汁打糊圓如梧子大每服五十圓食後淡薑湯下

欽定四庫全書

世醫得效方
卷三

世醫得效方卷三



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

元 危亦林 撰

大方脉雜醫科

諸積

肉積三稜煎圓治脾虛為肉食所傷停久不散作為腹

滿膨痛或洩瀉每服三十五圓淡薑湯食後服方見諸氣類

阿魏圓治脾胃怯弱食肉食麪或食生菜停滯中焦不

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

能尅化致脹滿腹疼嘔惡不食或利或秘

阿魏酒浸化官桂不見火蓬朮炮

麥蘖炒

神麪炒青皮去白蘿蔔子炒

白朮各半兩

百草霜三錢巴豆去殼油三十個乾薑炮半兩

右為末和勻用薄糊圓如菉豆大每服二十圓不拘

時薑湯送下麪傷用麪湯送下生菜傷用麪香湯下

血積抵當湯治療血凝滯腹內刺痛或膀胱痛身面微

黃

水礮剉炒

蜜虫去翅足炒三十箇

桃仁三十箇

皮臍炒去

大黃蒸三錢三字

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服血未

利更服

氣積木香流氣飲熱者分心氣飲方並見諸氣類

水積重者拾棗湯治泛飲水漿多感冷濕胸腹脹滿瀝

洛有聲喘急氣促面色痿黃

芫花炒赤

甘遂 大戟

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

黑牽牛炒取為末

右各等分為末每服一錢先將紅棗十枚煎湯一盞

調溫再單飲棗湯送下平旦服病不除明日更服加

半錢利後糜粥自養但服加味控涎圓尤效方見諸喘急類

輕者青木香圓方見諸病通治類

涎積炒粉圓治積聚涎塊結於心腹之間致令心腹刺

痛日久不愈或乾嘔減食

蚌粉一兩巴豆七粒去殼及膜



右二味同炒令赤色去巴豆不用只以醋圓其粉如

梧桐子大丈夫腹臍痛炒茴香酒吞下二十圓婦人

血氣炒薑酒下敗血衝心童子小便和當歸酒服常

服薑酒下

控涎圓空心茶清下三七粒

方見臂痛類

魚蟹積香蘊散多加生薑陳皮煎

菓菜積平胃散加丁香麝香為末熱鹽湯調服麝香湯

送下阿魏圓三十粒立效

方見脾胃類阿魏圓見前

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

酒積冷者平胃散加丁香縮砂麥芽神麴或香蘊散亦

可加入並用薑棗鹽煎空腹服

丁香縮砂香附子甘草各少許為散細嚼名醉

鄉寶屑效

熱者麴藥圓治酒癖不消心腹脹滿噫醋吞酸哕逆不

食脇肋疼痛

神麴 剉炒

麥藥 炒

各一兩 黃連 去鬚半兩巴豆三粒去殼同炒令轉

色去巴豆不用

右為末沸湯搜圓如梧子大每服五十圓食後薑湯

下

茶積磨積圓治茶積飲食減少面黃腹痛

陳倉米

半升用巴豆七粒去殼同炒令赤色去巴豆不用

青皮

去穰炒

陳橘紅

各二兩

右為末好醋搜和為圓如豌豆大每服二十圓食後

用淡薑湯下

粉片索粉積紫蘇濃煎汁加杏泥服即愈

麴積阿魏圓濃煎蘿蔔子湯下

方見前

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

糍糕傷積加味青木香圓治糍糕傷脾噫酸不食心腹

作痛百藥不效宜用青木香圓三百粒白丁香十粒小

酒麴二錢同為末入巴豆三粒更研和令勻蒸餅為圓

如梧子大每服二十圓漸加至三十圓生薑橘皮湯下

宿滯既去其疾自安又用小酒麴木香二件為末鹽湯

調服口有酒香是效

虛人沈積盧氏感應圓治虛弱人久積不可直取宜此

藥多用蠟置庶使久留腸胃又不傷氣能消磨至盡又



右腸氣偏虛飲食遲化止宜助脾養胃不須用尅化藥自然平復又名如神木香圓

黃蠟 真者十兩 巴豆 百粒去皮尖研為粉用紙數重裹透再易紙至油盡成白霜

妙為 杏仁 七十粒去皮尖研細依巴豆法去油 丁香 懷乾一兩

木香 濕紙裹一兩 乾薑 炮 肉豆蔻 麪裹 檳榔

華澄茄 各一兩 乳香 研三錢 百草霜 青皮 洗去穢炒

片子薑黃 各一兩

右除巴豆粉百草霜杏仁乳香外並為末却同前四

欽定四庫全書 世醫得效方 卷四

味拌和研勻先將上項黃蠟十兩於銀石器內溶化作汁用重綿濾去渣以無灰酒一升於銀石器內煮蠟鎔滾取起候冷其蠟自浮於酒上去酒不用春夏修合用清油一兩秋冬用一兩半大銀器內熬令香熱次下酒煮糊同蠟化作汁乘熱拌和前項藥末十分均勻了候稍凝分作劑子用罐子盛之半月後方可服旋圓如蘿蔔子大任意服之二三十圓加至五十圓無礙此藥以蠟多雖難圓然圓子愈細其功愈

博臨睡須常服之若欲治病不拘時候治豆積香藴散三錢水一盞煎服加白芥子一撮炒研入用

通治大抵治積以所惡者攻之以所喜者誘之則易愈

太乙神明再造感應圓治虛中積冷氣弱有傷不能傳

化心下堅滿兩脇膨脹心腹疼痛噫宿腐氣及霍亂吐

瀉或復遲澁赤白膿血相雜米穀不消久病形羸面黃

口淡不能飲食多服有效又能消化酒毒

肉豆蔻 川薑 炮 百草霜 各二兩 木香 一兩半

欽定四庫全書 世醫得效方 卷四

華澄茄 京三稜 炮各一兩 巴豆 一百粒去心另研

酒蠟 四兩 杏仁 一百粒去皮尖別研 清油

丁香 各一兩

右除巴豆杏仁外並為末次下巴豆杏仁等和勻先將油煎蠟令鎔化傾在藥末內和成劑入白內杵千餘下旋圓如菉豆大每服三五圓熱水吞下食後臨卧服小兒如粟米大二十圓乾薑湯下傷滯糞白有效



圓子治冷積停滯腹痛淡薑下三十圓		方見痰癰類
縮砂香附湯合和平胃散治食積食前鹽蘇湯調服		見方
諸氣脾胃類		
五積散香蘇散合和亦治冷積生薑煨葱白烏梅煎空		
心服		方見傷寒陰證及和解類
握藥宣積		
巴豆	乾薑	莢子
良薑		
硫黃	甘遂	白檳榔
各等分		
右為末研飯為圓如中指頭大用時早朝用椒湯洗		
手了麻油塗手掌中握藥一圓移時便瀉欲得瀉止		
即以冷水洗手		
利藥蕩積		
巴豆	五靈脂	白薑
水一百粒去殼		
赤茯苓	一兩	
右為末醋糊圓如菉豆大每服七圓冷茶清五更初		
服或欲瀉止冷水洗手面脚三處立住		

萬金圓治諸般食積氣積血積蠱脹之類		
石菖蒲去根節剉如米大半斤重斑貓半斤重去足		
翅同菖蒲慢火炒不可燒了如菖蒲黃色揀去斑貓		
用小布袋盛起菖蒲兩人牽掣布袋去盡斑貓屑止		
將菖蒲研為末用米醋煮糊為圓如梧桐子大每服		
二三十圓隨意加減溫酒熟水不拘時候治蠱脹加		
香附子末湯調吞下治腫亦快		
五積		
肝積肥氣圓治肝之積在左脇下如覆杯有頭足龜螯		
狀久久不愈發咳嘔逆痰瘧連歲月不已其脉弦而細		
青皮	炒	當歸鬚
二兩		蒼朮
各一		蓬朮
三稜	切	鐵孕粉
各三兩與三稜蓬朮		
同入醋煮一伏時		
蛇含石	煨醋淬	
三分		
右為末醋煮米糊圓菉豆大每服四十圓當歸浸酒		
下		
心積伏梁圓治心之積起於臍上至心大如臂久久不		



已病煩心身體髀股皆腫環臍而痛其脉沈而芤

茯苓

厚朴薑汁炒

人參

枳殼麸炒去穰

白朮

半夏洗七次

三稜慢火燉熟乘熱剉

右等分為末煑糊圓梧子大米飲下二十圓食前日

兩服作末酒調服絕勝

脾積痞氣圓治脾之積在胃管覆大如盤久久不愈病

四肢不收黃瘡飲食不為肌膚心痛徹背背痛徹心脉

浮大而長

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

大烏頭

一分炮去皮尖

附子

半兩炮去皮臍

赤石脂

煨醋淬

川椒炒出汗

乾薑

炮各二兩

桂心

半兩

右為末蜜圓如梧子大朱砂為衣每服五七圓米飲

下漸加圓數

肺積息貢圓治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈

病洒洒寒熱氣逆喘嗽發為肺癰其脉浮而毛

半夏

湯洗七次

吳茱萸湯洗

桂心

各二兩半

甘草

桑白皮

炙

葶藶

炒各二兩半

右剉散每服四錢水一盞半薑三片紅棗二枚煎七分去滓食前服

腎積奔豚湯治腎之積發於小腹上至心如豚奔走上

下無時久久不已病喘逆骨痠少氣其脉沈而滑

甘李根皮

焙乾

乾葛各一兩一分

當歸

川芎

白芍藥

甘草

炙

黃芩

各二兩

半夏

湯洗十次四兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去渣服

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

灸法

卒厥逆上氣氣攻兩脇心上痛滿奄奄欲絕此為奔

豚氣先急作湯以浸兩手足頻頻易之後炙氣海百

壯穴在臍下一寸半又灸關元百壯穴在臍下三寸

又灸期門百壯穴直兩乳下第二肋間端傍一寸五

分

奔豚腹腫灸章門百壯穴在大橫外直臍季肋端

奔豚槍心不得息灸中極在十壯穴在臍下四寸



六聚

散聚湯治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹疔痛攻刺腰脇上氣窒塞喘咳滿悶小腹膜脹大小便不利或復泄瀉淋瀝無度遺精白濁狀若虛勞

半夏湯洗七次

檳榔

當歸各三分

橘皮

杏仁麸炒去皮尖

桂心各二兩

茯苓

甘草炙

附子炮去皮臍

川芎

枳殼去穰麸炒

厚朴薑汁製炒

吳茱萸湯洗各一兩

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去渣食前服大

便不利加大黃煎服

荊蓬煎圓方見痰飲類治同上

息積

荊積圓治腸胃因虛氣癖於育膜之外流於季脇氣逆息難積日頻年醫所不治久則榮衛停凝一旦敗濁潰為癰膿多致不救

胡椒五百粒 木香一分

全蝎十箇去苗

右為末粟米飲圓如菴豆大每服十五圓橘皮湯下化氣湯治息積癖於腹脇之下偏脹膨滿不妨飲食諸藥不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

縮砂仁

桂心

木香各一分 甘草炙

茴香炒

丁香皮

青皮炒

陳皮

生乾薑

蓬朮炒各半兩

胡椒

沈香各一錢一字

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

右為末每服二錢薑蘓鹽湯調下婦人醋湯調服

導引法

以兩手指壓無名指本節作拳按髀趺坐扣齒三十六屏息二十一息噓氣三口再屏息再嚥如是三作以氣通為效遇子午卯酉時則行然按摩導引之法甚多隨意用之皆可不拘此法餘見養生書

癥瘕

大消石圓治七癥八瘕聚結杯塊及婦人帶下絕產并



欲服丹藥服中有癥瘕者當先下此藥但去癥瘕不令人困

消石 三兩 大黃 四兩 人參 甘草 各一兩半

右為末以三年苦酒三升置銅石器中以竹作準每一升作一刻拄器中先納大黃常攪不息使微沸盡一刻乃內餘藥又盡一刻極微火熬使可圓則圓如梧桐子大每服三十圓米飲下四日一服婦人服之或下如雞肝或如米泔正赤黑等三二升後忌風冷

欽定四庫全書
世醫得效方
卷四

如產婦

小三稜煎治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噎醋吞酸脇肋刺痛胸膈痞悶并脾氣橫泄

京三稜 蓬莪術 各四兩 芫花 一兩
去梗葉

右同入磁器中用米醋五升浸滿封器口以灰火煨令乾取出稜術將芫花以餘醋炒令微焦焙乾為末醋糊圓如菉豆大每服十五圓生薑湯下婦人血分



迪志文化出版有限公司出版

男子脾氣橫泄腫滿如水桑白皮煎湯下三聖圓治積年癥瘕癖塊諸藥療理不瘥至效

舶上硫黃 一兩 水銀 半兩 硃砂 一分
製如

右三物乳鉢內滾研如粉却以生鐵銚內用文武火熬鎔成汁以火筋攪令勻停冷刀剗下以紙裹置地坑內埋一宿取出再研細次以

赤芍藥 當歸 京三稜 蓬莪術

紅花 各一分
同用

欽定四庫全書
世醫得效方
卷四

並細剉以法酒一升煎及一半漉出砂盆內研生布裂汁再熬放冷入飛羅麪為糊搜圓如菉豆大治因產後傷於飲食結伏在腹脇時發疼痛不可忍者當歸浸酒一升遂旋取酒煖下七圓至十圓每服磨癖塊空心溫酒下三圓至五圓所是藥渣裂了焙乾為末別入

乾地黃 半 真蒲黃 芫花 各一兩
微炒焦黃

右為末以前一般糊圓如菉豆大治女人血臟冷氣



迪志文化出版有限公司出版

攻心疼及一切血疾溫酒下十圓

一握七圓治臟腑宿蘊風冷氣血不和停滯宿飲結為癥瘕痞塊及婦人血瘕腸胃中寒飲食不下欬逆脹滿及下痢赤白霍亂轉筋及踠臂拳攣脚膝疼痛行步不能常服健脾暖胃堅骨強陽

神麴

半斤炒黃

大附子

二隻炮去皮臍

甘草

二兩炙

右為末煉蜜圓每左手一握分作七圓細嚼米飲下

妙應丹治諸臟氣虛積聚煩悶及飲食中蠱毒或食水

欽定四庫全書



世醫得效方卷四

木果蘇子卵入腹而成虫蛇魚鱉或宿食留飲婦人產後敗血不消女子月水不通結為癥瘕時發寒熱唇口焦黑肢體瘦削嗜卧多魘食少腹痛大便糟粕變成冷痢

附子

四箇六七錢重者生去皮臍宛作窠入研砂共一兩七錢重麴齊裏煨熟去麴不用

華撥

木香

煨

青皮

破故紙

各三兩

右為末麴糊搜圓如梧子大每服三十圓生薑橘皮

湯下洩痢米湯下加至五十圓

灸法灸內踝後宛宛中隨年壯又灸氣海百壯其穴在臍下一寸五分

久冷及婦人癥瘕腸鳴洩痢遶臍絞痛灸天樞百壯其穴在臍傍二寸勿針

積聚堅大如盤冷脹灸胃管二伯壯其在上管下一寸

心痛

腹疼附

欽定四庫全書



世醫得效方卷四

風證重者蜜附湯治胃涉風邪入腹拘急切痛或吐或

泄狀如霍亂

附子

去皮臍切作四斤以蜜煎令附子變色以湯洗去蜜切半斤

桂心

芍藥

各三分 甘草

四錢炙

右剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗一枚煎八

分去渣食前服大便秘結入白蜜半匙同煎一沸

輕者分心氣飲加厚朴枳殼炒蘿蔔子各半錢南木香

少許煎食前服

方見諸氣類



寒證加味麻黃湯治惡寒發熱外因心痛內攻五臟拘急不得轉側

麻黃

去節湯洗焙乾

桂心

白芍藥

細辛

乾薑

炮

甘草

炙各三兩

半夏

湯洗七次

香附子

炒去毛各半兩

右剉散每服四大錢水一盞半生薑五片煎七分去

滓食前服大便秘大黃如棊子大兩枚煎

加味四七湯治寒邪客搏心痛

欽定四庫全書



世醫得效方卷四

桂枝

白芍藥

半夏

洗各一兩

白茯苓

厚朴

去麁皮薑汁炒

枳殼

麪炒

甘草

炙各半兩

人參

紫蘇葉

各一兩

一方加明乳香玄胡索各半兩

右剉散每服四錢薑七片棊二枚煎食前服

七情七氣湯治七情之氣鬱結于中心腹疔痛不可忍

半夏

人參

甘草

肉桂

各一兩半

右剉散每服三錢生薑三片煎不拘時服

沈香降氣湯每服二錢枳殼半片煨切片蘓葉三皮食

鹽少許煎湯再入濃磨沈香水一合服未效再加乳香三粒

方見諸氣類

方心氣散加栗殼二枚木香少許煎

食傷香蘇散加生薑石菖蒲半夏煨枳殼煎不拘時候

服

方見傷寒和解類

感應圓每服三七粒鹽梅湯下

方見諸氣類

熱證氣針圓治久積風熱踈利滯氣寬胸膈止刺痛

木香

青皮

去白

大黃

炮

檳榔

炙一兩

欽定四庫全書



世醫得效方卷四

刀尺鐵匙幹開口灌下

缺

散治風壅痰盛四體重著或軟痠疼痛或拘攣

麻痺顫掉口乾目赤煩熱睡卧不寧

條參

去蘆

川羌活

去蘆

枳殼

去穰

秦艽

去蘆

赤芍藥

苦梗

去蘆

前胡

去蘆

川芎

白芷

黃芩

薄荷

桑白皮

去赤

天麻

防己

防風

粉草

荊芥穗

赤茯苓

木瓜



川牛膝

去苗
各等分

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎溫服不以時候

通關散治卒暴中風昏塞不省牙關緊急藥不得下咽喉

細辛

薄荷葉

牙皂

去子

雄黃

各一錢

右研為末每用少許銅管吹入鼻中候噴嚏然後進藥或用白梅擦牙更以菖蒲末著舌下牙關即開倉

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

卒可用

通治

解語湯治中風客於心脾二經舌強不能言半身不遂口眼喎斜神氣不清一切風氣並皆治之

附子

炮

防風

去蘆

天麻

酸棗仁

炒各二兩

羚羊角屑

官桂

甘草

炙

羌活

各半兩

右剉散每服半兩水二盞煎八分去滓入竹瀝兩匙

再煎三兩沸溫服不拘時候

缺

生圓治因事驚憂涎留心包精神不守事多健忘狂言妄語如有所見不得安卧或風痰潮作手足抽搐或心虛煩躁

天南星

三兩

母真味

一錢

真琥珀

五錢

圓白半夏

五兩

枯礬

五錢

大朱砂

一兩

細研為衣

右為末生薑自然汁煮麪糊為圓梧桐子大每三五圓淡薑湯下心氣狂甚加鐵膩粉一兩氣不順

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

人參湯下

驚悸金銀器竈心土湯

上熱煩燥淡

竹葉麥門冬湯

寧心定志石菖蒲湯

痰盛喘急

桑白皮湯

小兒急驚麥門冬青竹葉湯

慢驚冬

瓜仁木香湯下

缺

風湯治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆沫嘔肋滿頭眩不聞人聲偏枯肋急曲踈而卧心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食無味



夢寐顛倒與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上
氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰
冷脾骨疼諸有此證令人心驚志意不定恍惚多忘服
此安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾悉主之

白鮮皮

白朮

芍藥

桂心

川芎

當歸

杏仁

湯洗
去皮尖

防風

去
叉

甘草

炙
各二兩

獨活

麻黃

去
節

茯苓

各
三兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎溫服

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

缺

白圓子治男子婦人半身不遂手足頑麻口眼喎

斜痰涎壅塞及一切風他藥不能痊者小兒驚風大人

頭風

右為末每服三錢溫水七分盞調和服不拘時候甚

者不過三服小兒每服半錢重

真心痛大抵心為諸臟之主其正經不可傷傷之而痛

者則手足青至節朝發夕死夕發旦死不假履治其久

心痛者是心之支別絡為風邪冷熱所乘痛故成疹不

死發作有時經久不得瘥也

通治手拈散主心脾疼

草果仁

玄胡索

五靈脂

沒藥

右等分為末每服二三錢溫酒調下米飲亦可

香附散治心脾疼不可忍者

高良薑

去
蘆

香附子

去
毛

炒
各一兩

右為末每服二錢入鹽米飲調下

訶子散治心脾疼冷痛不可忍一服見效及老幼霍亂

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

吐瀉其效如神

訶子

炮
去核

甘草

炙

厚朴

薑
汁

乾薑

炮

草果

去
皮

陳皮

良薑

炒

茯苓

神麴

炒

麴藥

炒
各等分

右為末每服二錢候發刺不可忍時用水一盞煎七

分入鹽服

九痛圓治九種心痛蟲痛症痛風痛悸痛食痛飲痛冷

痛熱痛往來痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連



年積冷流在心胸并冷腫痛上氣落馬墜車等疾		附子 三兩炮 去皮臍 狼毒 巴豆 去皮心 膜炒稗 人參		乾薑 炮 吳茱萸 浸洗炒 各一兩		右為末煉蜜圓如梧桐子大每服空腹溫下三圓卒		中惡心痛不能言服三圓		撞氣阿魏圓治九種心痛五種噎疾痲痺氣塊冷氣攻		刺及脾胃停寒胸滿膨脹腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小		腸氣婦人血氣血刺等		欽定四庫全書 世醫得效方 卷四		阿魏 酒浸一宿 麪為糊 胡椒 各二錢半 甘草		茴香 炒 川芎 青皮 陳皮		丁香皮 炒 莪朮 炒各一兩 縮砂 桂心		白芷 炒各半兩 生薑 四兩切作片用鹽一兩淹一宿炒黑芭		右為末阿魏糊圓如雞頭大每藥一斤用朱砂七錢		為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下二粒至三粒婦人血氣		酸湯下常服茶酒任下二粒並嚼細嚥食前服		失笑散治敗血冷氣心痛 方見疝氣類	

浮椒丸治脾疼不可忍及療冷氣疼		陳茱萸 二兩 浮椒 即胡 蚌粉 炒赤色 各一兩		右為末醋糊圓如梧子大每服二十丸用溫酒或鹽		湯下遇發時服甚者不過二三服立效		附朮湯治脾積氣婦人諸般氣痛		香附子 五兩炒去毛 赤色止 莪朮 醋煮 甘草 各二兩		右為末每服二錢入鹽少許百沸湯空心點服		九氣湯治心脾疼不可忍一九痛圓一服而止 與諸氣類 神仙		欽定四庫全書 世醫得效方 卷四		九氣湯 同一丸 痛圓 方見前		三和散治腹脹脾疼中滿痞悶不食大小便或澁加生		薑燈心縮砂仁煎服仍服理中湯半貼立效或加白茯		苓厚朴各二錢 方見諸氣及泄瀉類		神保丸治心氣築刺痛甚掃蒂燈心湯下 方見諸氣類		奪命抱刀散治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛		痞腹中痛胸脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫		酸吞酸口苦無味不思飲食及婦人久患冷氣刺痛男	



子或當空露卧感受風露之邪得心痛積年服之大效

乾薑

剉入巴豆半錢同炒至黑色去巴豆不用

良薑

入斑猫一百個同炒去斑猫各二兩

石菖蒲

二兩二錢不見火

糯米

二兩半炒

右為末每服二錢鹽少許沸湯點服不拘時或溫酒調尤佳一方以去殼巴豆炒蚌粉去巴豆加蚌粉入抽刀散內煎服若尋常氣痛不用巴豆只加炒蚌粉亦得或甚而心腹痛大便秘者巴豆同粉研爛同抽刀散醋糊丸服二三粒大腑通為度

欽定四庫全書



世醫得效方卷四

參朮散治虛弱人脾疼

人參

白朮去蘆炒

乾薑

炮

白豆蔻仁

砂仁

丁香

橘皮

甘草

畧炒

右等分剉散每服三錢薑三片煎取藥汁調炒過真

蚌粉一大錢并服

加味烏沈湯生氣補血心腎虛損之人服此勝大建中

湯

人參

當歸大者去蘆

白朮

炒各一兩

沈香

半兩

天台烏藥

白茯苓

去皮

附子

燂去皮臍各一兩

肉桂

去皮半兩

右剉散每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎空心服單方治苦熱食冰雪過多又頻飲冷漿積冷于中脾疼半歲不愈

法椒

二十粒浸於漿水盆中一宿取出還原水吞之其病即脫更不復作

大理中圓治因食水太過脾疼久不愈以水煎一二圓服立效又方治心脾氣痛加泡過茱萸三十粒入圓末

欽定四庫全書



世醫得效方卷四

皆可

方見泄瀉類

神效散治遠年近日一切脾疼遇食冷物或天氣寒陰冷便作胸間一點痛起或引入背脊痛不可忍服之即絕根

南木香

青皮

陳皮

麥蘖

炒

大枳殼

炮

京三稜

蓬莪朮

神麴

炒

甘草

炙各二錢半

北白芍藥

川白芷

肉桂

去皮

玄胡索

破故紙各二錢半

華澄茄

丁香

各一錢



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至七分空心服臨睡加鹽一捻再煎兩沸忌麪食豆腐一切生冷

茴香 二兩半 青皮 一兩 良薑 一兩 酒浸炒

九粒鹽湯吞下婦人當歸醋湯下空心服病甚者加

至十五粒忌茶立效如神

奇方治中風牙已緊無門下藥

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

天南星末半錢白龍腦一字頻擦令熱牙自開

又治暗風倒地北細辛為末每挑一字搐鼻中

神應方治諸風癰久服其涎自大便中出生白礬一兩

研好臘茶半兩煉蜜為圓梧子大三十圓再用臘茶

湯下

烏蝎圓治手足拳攣痛不可忍者

乳香 沒藥 另研

地龍 去土

全蝎 去足

草烏 各五錢 烏藥 炒

麝香 一兩

蜈蚣 一條 去足炒 川烏 二隻 生用 去皮尖

右為末麪糊圓梧桐子大每服七圓至十圓十五圓用麝香少許好小酒送下空心服服至七日畧利至半月或滿身發風丹經月方沒名服其病安全后常用生川烏沒藥浸酒日二服通氣驢風湯加乳香沒藥生川烏麝香少許酒調服不飲木瓜湯下服此忌熱食一時

四神圓治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

大天麻

大南星

各湯洗淨

防風 去蘆

薄荷葉 半兩

右為末酒煮薄麪糊圓菜豆大每服二十圓荊芥生

薑煎湯送下

腎瀝湯腎虛為厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯胣脚跛

蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利耳聾塞腰背相引

羊腎 一具

黃耆

芎藭

桂心

當歸

人參

防風

甘草

五味子 各一兩

玄參

芍藥



茯苓 各一兩 二錢半 磁石 一兩 七錢 地骨皮 五錢 生薑 二兩

右剉散以水一斗煮羊腎取五升下諸藥取二升分

三服

缺

痛圓治中風癱瘓不遂手足躄曳口眼喎斜或

旋運僵卧涎潮搐搦卒中急風不省人事每服二十圓

黑豆淋酒下風虛眩冒項筋拘急太陽穴疼痛亦用生

地黃汁調酒下腰膝疼痛重行步艱辛筋脉攣促俛仰不

利賊風所中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺不仁或血脉不

欽定四庫全書 世醫得效方 卷四

行肌拘乾瘦生葱酒下或生葱茶亦可風濕脚氣腿膝

無力或腫或疼不能舉步兩脚生瘡膿血浸清痒痛無

時愈而又發溫鹽酒下打撲閃肭筋骨內損已經多年

每遇天寒時發疼痛沒藥酒下

乳香 川烏 沒藥 五靈脂

白膠香 地龍 白薑 半夏

五加皮 赤小豆 各等分

右為末糊圓隨證湯引如前並空心服

牛黃清心圓治諸風緩縱不曠語言蹇澁痰涎壅盛心
怔健忘或發顛狂並皆治之

白芍藥 一兩 半 柴胡 去苗 桔梗 各一兩 二錢半 甘草 劉炒 五兩

乾山藥 麥門冬 去心 黃芩 各一兩 半

食證二陳湯治胸腹脹滿因傷宿食或吐後噫敗卵氣

加丁香縮砂生薑七片烏梅一箇煎未效服治中湯治

同前兼療中寒飲食不化吞酸嘔碗食則膨亨脹滿嘔

逆

欽定四庫全書 世醫得效方 卷四

人參 白朮 乾薑 炮 甘草 炙

青皮 陳皮 各等分

右剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓大便秘

入大黃棊子大兩枚

血證茯苓湯治憂怒並氣攻血溢停留胃管噯聞血腥

嘔吐食飲及妊娠中脘宿冷冷血侵脾惡聞食氣病名

惡阻

半夏 一兩 湯洗七次 茯苓 熟地黃 各二兩 橘皮



細辛 人參 芍藥	川芎 各一兩 二錢	右剉散每服四大錢水二盞薑七片煎七分去滓空 腹服有客熱煩渴口瘡者去橘皮細辛加前胡知母 腹冷不利者去地黃入桂心炒胃中虛熱大便秘小 便澀去地黃加大黃一兩八錢黃芩六錢	當歸湯治三焦虛損或上下發泄唾血皆從三焦起或 因熱損發或因酒發主之	欽定四庫全書 世醫得效方 卷四	當歸 乾薑 熟地黃 藥皮	小蘗 羚羊角 阿膠 芍藥	黃芩 甘草	右剉散每服三錢水二盞竹茹一塊如指大煎至八 分去滓入伏龍肝頭髮灰蒲黃各半錢再煎至七分 不以時服	氣嘔茱萸人參湯治氣嘔胸滿不納食嘔吐涎沫頭疼 吳茱萸 人參

右剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗三枚煎七 分不以時服	藿香正氣散治氣嘔大效每服三錢水一盞半生薑三 片木瓜二片煎熱服	加減七氣湯治氣鬱嘔吐	半夏 人參 辣桂	厚朴 茯苓 甘草	右剉散每服三錢半薑七片棗一枚煎服加木香亦 得	欽定四庫全書 世醫得效方 卷四	熱嘔竹茹湯治胃受邪熱心煩喜冷嘔吐不止	葛根 半夏 甘草	右剉散每服五錢水二盞入竹茹如棗許大薑五片 煎至七分去滓取清汁微冷服不以時候二陳湯加 白竹青煎效	通心飲治心脾蘊熱作嘔每服三錢燈心藿香葉煎 小兒科急驚類



小柴胡湯治胃中挾熱煩燥聚結涎沫水入即吐或因胃熱伏暑及傷寒伏熱不解每服三錢加人參烏梅生薑五片紅棗一枚煎

方見傷寒陽證類

三乙承氣湯治嘔吐水漿不入或食已即吐大便秘或利而不鬆快時覺腹滿者或下痢赤白而嘔吐食不下者或大腸小腸膀胱結而不上為嘔吐隔食

大黃

厚朴 薑炒

枳殼

芒硝 各半兩

甘草 一兩

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎六分却入硝

細細啜服

冷證嘔吐四逆湯治胃中虛四肢厥冷食即嘔吐或因冷食傷胃或累經汗下致虛胃氣但脉弱小便多復利身有微熱見厥者難治

方見傷寒陰證類

未效服金液丹每服

九圓米飲下丁胡三建湯生薑十片煎吞下

方見痢冷類

通治藿香正氣散治胃口有虛熱作嘔生薑三片木瓜

二片煎

方見傷寒陰證類

香白圓治氣不順痰涎壅盛嘔吐不止

青州白圓子

方見風科通治類

青木香圓

方見諸痢類

右各三十圓生薑湯吞下

炮附子圓治胃腕有熱胃中有寒嘔吐不止

附子

炮去皮臍二兩

右為末以糊圓如梧子大就濕以大黃末五錢為衣每服十圓加至二十圓用薑湯下

快氣圓治一切氣心腹脹痛胸膈噎塞噫氣吞酸胃中

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

痰逆嘔吐及宿酒不解不思飲食

香附

去毛三兩二錢

甘草 四錢

縮砂仁

去皮殼八錢

右為末每服一錢鹽湯點下常服快氣美飲食養脾胃理湯治體虛上氣壅盛中脘痞塞嘔逆翻吐水飲不入其證急速

木香勻氣散

方見諸痢類

理中湯

方見霍亂類

右二藥合和鹽湯調服一匕立效

人參散治吐逆及瀉後除煩渴常服調中和氣



白茯苓

人參 各半兩

白乾薑 一兩 藿香

木香

甘草 各一錢半

嫩黃耆 去蘆一錢半

右剉散每服三錢水一盞半煎七分去滓溫服瀉後

渴甚者每服加滑石末二錢同煎

丁香煑散治脾臟伏冷胃脘受寒胸膈痞悶腹心刺痛

痰逆惡心寒嗽中滿臟腑虛滑飲食減少翻胃吐逆四

肢逆冷但是沈寒痼冷無問久新功效不可具述

丁香 不見火

紅豆 去皮

青皮 去白

甘草 炙

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

川烏

炮去
皮臍

陳皮 去白

乾薑 炮各
四兩

良薑

炮去
頭四兩

益智 去皮五
兩半

胡椒 二兩

右剉散每服二錢水一盞生薑三片鹽一捻煎至七

分空心食前稍熱服滓再煎病退即止極妙

灸法乾嘔灸尺二穴在肘約上動脈灸三壯又灸乳下

一寸三十壯

乾嘔不止粥藥皆吐入間使穴三十壯其穴在掌後

二寸兩筋間若四厥脈沈絕不至者亦灸之便通此

起死人法

吐嘔宿汁吞酸灸神光穴百壯其穴在二肋傍二寸

上直兩乳

嘔逆噦噫灸石關百壯其穴在陰都穴下一寸

霍亂

風證桂枝湯治惡風自汗嘔吐下利增寒發熱頭痛眩

暈 方見傷寒類

寒證陰經理痞湯治惡寒無汗霍亂吐下脹滿食不消

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

心腹痛胸膈痞塞家昏暈緩弱

人參 去蘆

乾薑 炮

白朮 去蘆

甘草 炙各
三兩

右剉散每服四大錢水一盞煎七分去渣食前服遠

暈防霍亂煉蜜為圓如梧子大每服三十五圓如作

末每服方寸匕酒調下亦得若轉筋骨加石膏煨三

兩若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩腹惡燥

故去朮恐作奔豚故加桂吐多者去朮加生薑三兩

下多者復用朮悸者加茯苓二兩渴欲得水加朮合



前成四兩半腹滿加人參合前成四兩半若寒者加
乾薑合前成四兩半腹滿者去朮加附子服藥食頃
食熱粥一盃微自溫覆勿發揭衣被噦則加丁香吐
利止身體痛不休者審其元因以和解之如初因傷
風用桂枝之類所謂治有本也

陽經香薷散治身熱無汗霍亂吐下臉赤多痰加藿香
葉土烏藥烏梅生薑煎甚妙 方見傷寒和解類

暑證香薷散治傷暑飲冷霍亂作渴熱煩每料加丁香

欽定四庫全書 世醫得效方 卷四

半夏藿香烏梅陳皮紫蘓木瓜各一兩生薑五片煎四

肢冷加熱附子煩渴生薑自然汁調五苓散 方並見傷暑類

仍用半夏圓熱薑湯吞立效 方見痲瘧類 每用三十圓

濕證除濕湯治滿身重著或多食生冷揮霍之間吐利俱

作

半夏 湯洗 厚朴 去麤皮切薑汁炒各一兩

藿香葉 五錢 陳皮 去白五錢 甘草 三錢

蒼朮 米水浸一兩切炒赤

右劉散每服四錢水一盞半生薑七片紅棗一枚煎
熱服不以時候

七情七氣湯治喜怒憂思悲恐驚七氣鬱發致五臟互
相刑剋陰陽反戾揮霍變亂吐利交作寒熱眩暈痞滿
噎塞

半夏 湯洗五兩 厚朴 去麤皮薑汁炒 桂心 各三兩 白茯苓 去皮

白芍藥 各四兩 紫蘇 橘皮各二兩 人參 去蘆一兩

右劉散每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎七分

欽定四庫全書 世醫得效方 卷四

去滓空心服

胃氣圓治憂思過度脾肺氣閉聚結涎飲留滯腸胃氣
鬱於陰凝寒於陽陰陽反戾吐利交作四肢厥冷頭目
眩暈或復發熱兼治老人胃寒大便反秘妊娠惡阻全

不納食

硫黃 不拘錢數入猪臟內符兩頭以米甘酒童子小便各一盞煮乾一半取出先斷穢氣控乾

秤一兩 半夏 湯洗去滑五兩 人參 去蘆各一兩

石膏 一分煨一法 白茯苓 一兩



右為末生薑自然汁釋炊餅糊為圓如梧子大每服五十圓至百丸空心米湯入少生薑汁下

食傷紅圓子治脾胃虛冷飲食不節宿食留飲聚癖腸胃或因氣不調衝胃寒濕忽作霍亂吐利併心腹疔痛腸胃纏刺疲倦不勝

方見痰癰類

理中湯加青皮陳皮治胃脘有寒亦效

方見前

轉筋木瓜湯治霍亂吐下不已舉體轉筋入腹則悶絕

木瓜乾一兩 吳茱萸半兩 湯洗 茴香二錢半 甘草炙一錢

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

右剉散每服四大錢水一盞半生薑三片紫蘇十葉

食鹽一撮煎七分去渣食前服仍研生蒜貼心下脚

心上

煩渴茯苓澤瀉湯治霍亂吐利後煩渴欲飲水

赤茯苓去皮四兩 澤瀉二兩 甘草炙一兩 桂心一兩

白朮去蘆一兩半

右剉散每服四大錢水一盞薑三片煎七分去滓食

前溫服又方有小麥五兩

麥門冬湯治霍亂已愈煩熱不解多渴飲水小便不利

麥門冬去心 橘皮 半夏湯泡七次 白茯苓去皮

白朮去蘆炒各一兩 人參 甘草炙各半兩 小麥半合

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片烏梅一個煎至八分去渣溫服不拘時候

水浸丹治伏暑傷冷熱不調霍亂吐利口乾煩渴

黃丹一兩二錢半炒 巴豆二十五個去皮心

右同研勻用黃蠟鎔作汁和為圓如梧子大每服五

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

圓水浸少頃別以新汲水吞下不拘時候

又用薑附湯清煎沈冷服之大效熱因寒用之法也

見中寒類

乾霍亂鹽湯治忽然心腹脹滿痞刺疼痛蠱毒煩冤欲

吐不吐欲利不利狀若神靈所附頃刻之間便至悶絕

亦涉三因或臟虛或腸胃素實故吐利不行

極鹹鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不吐

更服吐訖復飲三吐乃止此法大勝諸治俗人以為



田舍淺近鄙而不用守死而已凡有此病即先用之
續以理中湯倍加橘紅與之或藿香正氣散加官桂
茯苓煨枳殼就吞蘇合香圓炒

通治藿香正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂小使
不利加車前子每料各一兩

訶子散治老幼霍亂吐利一服取效

方見心痛類

加味薑附湯治吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脉沈

伏

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

附子

炮

乾薑

人參

各一兩

甘草

五錢

右剉散每服四錢水二盞煎至一盞空心服腹痛加

官桂小便不利加茯苓每料各五錢

養正丹治霍亂轉筋咳逆不定病勢危篤每服三十圓

鹽湯下

方見痢冷類

胡椒湯治霍亂吐瀉

胡椒

七粒

生菴豆

二十一粒

右為末宜木瓜湯溫和調下



迪志文化出版有限公司出版

奇方鹽一撮醋一盞同煎八分溫服二盞鹽梅鹹酸等
物皆可煮服

又方星南末三錢棗三枚薑五片煎極熟服治吐下四
肢逆冷不省人事一服可效半夏為末薑汁點亦一服
效白礬為末每服一大錢沸湯點服亦驗

熏洗法治霍亂轉筋

陳大蓼一把水三升煮取二升乘熱熏洗仍飲半盞

九用蓼須家園種者

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

鹽熨法治霍亂吐瀉心腹作痛

炒鹽二盃紙包紗護頓其胸前并腹肚上一截以熨

斗火熨氣透則蘇續又以炒鹽熨其背則十分無事

灸法治霍亂轉筋欲死氣絕惟腹中有煖氣者可用其

法納鹽於臍中令實就鹽上灸二七壯名神闕穴立

效併灸臍下一寸半名氣海穴二七壯妙

痰飲

懸飲十棗湯治飲水流在脇下咳唾引痛一歲不愈者



迪志文化出版有限公司出版

芫花 微炒

甘遂

大戟 炒

右等分剉散水一盞半棗十枚煎八分去棗調藥壯人一錢羸人半錢平旦溫服不下者次日更加半錢下后糜粥自養若已下不可服

五苓散治流行水飲每服二錢沸湯調小便更不利加防己佐之 方見傷暑類

支飲防己桂枝湯治隔間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

漢防己

三兩

桂心

二兩

人參

四兩

石膏

六兩

右剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓溫服虛者即愈實者二日復發再服不愈去石膏加茯苓四兩芒硝一兩半微利則愈

茯苓五味子湯治支飲手足冷多唾口燥氣促小腹上衝胸咽手足痺面熱翕然如醉因復下流陰服小便難時復咳胃嘔腫

茯苓 四兩

桂心

甘草

炙各三兩

五味子

二兩半



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服服之衝氣却低久更咳滿者去桂加乾薑細辛各三兩咳滿止而復渴衝氣更發者以細辛乾薑為熱藥此法不當逐渴反止者為支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏二兩半以去其飲飲去嘔則止其有形腫與痺加杏仁二兩半若面赤如醉以胃中熱上熏加大黃三兩須詳證加減

溢飲大青丸湯治溢飲身體疼重汗不出拘急痛

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

麻黃

去節湯洗七次

桂心

甘草

炙各二錢半

石膏

雞子大

杏仁

四十個炒去皮尖

便鞭也甘草瀉心湯主之屬太陽

三陰可汗

陰病不當發汗發汗即動經然太陰脉浮少陰病發熱亦須微微出汗但不可正汗耳太陰脉浮者宜桂枝湯少陰發熱脉沈宜麻黃細辛附子湯少陰二日常見少陰證無陽證者宜麻黃甘草附子湯微發汗皆陰證

表藥也

差后昏沈

傷寒差後十數日或半月二十日終不醒惺常昏沈似失精神言語錯謬又無寒熱醫或作鬼祟或作風疾多般治之不差或朝夕潮熱頰赤或有寒熱似瘧皆緣發汗不盡餘毒在心胞絡間所致也知母麻黃湯主之

飲酒復劇

傷寒時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

呻吟錯語不得卧黃連解毒湯主之

循衣摸牀

傷寒若吐若下後不解不大便五六日以上至十餘日晡時發熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視若微者但發熱譫語大承氣湯主之者一服利則止後服脉弦者生脉濇者死

傷寒別名

清便自調自可謂大小便如常也 大便秘而堅則曰

鞭 小便不利小便少下利清穀皆謂水穀不分 得

大便秘更堅 大便秘小便利曰脾約 下利曰飧泄

腸僻謂痔也 寒蔽利曰鴨瀉熱而利曰腸垢 轉

失氣謂氣轉而響時時失下即後分泄氣蓋腹中有積

大汗傷氣大下傷血或火邪逼迫驚狂或尺寸脉緊

而反有汗或發汗後汗不止曰漏風或陰病本無汗而

反有汗或其脉浮遲微弱不能作汗皆曰亡陽 吐汗

欽定四庫全書

世醫得效方
卷四

下溫針以後其病不解曰壞病曰何逆 瘥後更發熱

曰遺熱 脉相尅賊曰負 兩手無脉曰雙伏一手無

脉曰單伏 左關脉曰人迎右關脉曰氣口是跌上動

脉曰衝陽足后根上陷中動脉曰太谿 婦人乳頭直

下近腹處曰期門 臍下一寸半曰氣海二寸曰丹田

三寸曰關元 玄府即汗空也 臍下動氣曰奔豚

筋惕肉動曰瞤 中暑曰中暈 妄發濕溫汗曰重暈

渴欲飲水水入即吐曰水逆 心下停水怔忡身無



大熱頭額微汗曰水結胸 乾嘔曰哕咳逆曰噦 目中不了了謂不明了也睛不和謂不和平如常也 三月至夏方發病曰晚發

傷寒戒忌

傷寒新瘥後但少喫糜粥常令稍饑不得飽食反此則復發不得早起不得梳頭洗面不得多言不得勞心費力反此則復發瘥後百日內氣體未得平復犯房室者死忌食羊雞狗肉肥魚油膩諸骨汁及鹹藏鮓脯油餅

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

麪病再發

臨治警省

川芎

細辛

防風

桔梗

白芷

甘草

羌活

各一兩

桑白皮

半兩

右剉散每服二錢水一盞半薑二片薄荷三葉煎至

七分不饑不飽時溫服

枳殼半夏湯除熱痰下氣寬中利膈清上治痞滿

枳殼

半夏

黃芩

桔梗

各二兩



迪志文化出版有限公司出版

甘草

五分

右剉散每服四錢生薑三片桑白皮七寸烏梅一個煎未效加甜葶藶馬兜鈴防已薄荷立效熱痰黃色是也

虛證順元散治氣虛痰甚不得伸卧氣中痰厥尤宜服

之

方見傷寒陰類

黑錫丹治下虛上壅頭暈痰盛服之立愈

方見痢冷類

靈砂丹治上盛下虛痰涎壅盛此藥最能鎮墜升降陰

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

陽安和五臟

方見痢冷類

七味圓治脾虛不得剋制腎水多吐痰唾而不咳者

方見

虛損類

暖胃圓去虛痰利冷飲

硫黃

研

白礬

各一兩

半夏

二兩

薑汁

炒

丁香

茴香

炒

木散

各一兩

右為末薑汁痰麪糊丸梧子大每服二十圓空心米

飲下



迪志文化出版有限公司出版

靈白圓治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂

青州白圓子

各一兩
各研

右和勻生薑自然汁和米糊丸如梧桐子大每服三十圓空腹人參湯或棗湯下

通治二賢湯治痰實食後胸滿年遠痰飲服之愈

薄橘皮

四兩

甘草 一兩

右為末沸湯調服其功在茯苓半夏枳實南星之上
萊菔圓治頭疼背寒嘔吐酸汁不思飲食小便不利氣

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

壅昏眩

白茯苓

吳茱萸

各二兩
湯洗去末

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸不拘時候熟水吞下服後便溺中作茱萸氣是驗他痰藥不能及
此一方只將萊萸酒浸三宿以茯苓末拌之候乾或湯或酒下百餘粒亦效

快活圓常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼

一兩
半炒

桂 一兩

桔梗 二兩

半夏

湯洗七次二兩

右為末薑汁糊丸梧子大每服二十丸食後薑湯下

茯苓圓治臂痛不能舉手或左右時復轉移由伏痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾滯而氣不支故上行攻臂其脉沈細者是也後人謂此臂痛乃痰証也用治痰無不效者

茯苓

一兩

枳殼

麩炒去穰半兩

半夏 二兩

風化朴消

一分

欽定四庫全書



世醫得效方
卷四

右為末薑汁煮糊丸如梧子大每服三十丸生薑湯下累有人為痰所苦夜間兩臂常若有人抽牽兩手戰炸至於茶盞亦不能舉只以此藥治之皆隨服隨愈世間所謂痰藥者多矣至於立效未有如此藥之妙也

倍術散治酒癖五飲

停水在心下或兩脇胃中膈上腸間動搖有聲皆由飲酒胃寒飲水

過多

白朮

二兩

附子

炮去皮臍一兩



右剉散分三服水一大盞薑十片煎空腹服臟腑微		動即安		桂辛湯下痰飲散風邪止痰嗽聰耳鼻宣關竅利咽膈		清頭目解胃眩進飲食	
一方除附子加乾薑肉桂各一兩為末蜜丸梧桐子大每服二十五丸米飲下食前大效		去麤皮		去苗		去蘆	
桂		細辛		乾薑		人參	
去皮		土		炮		去	
白茯苓		甘草		五倍子		陳皮	
去皮		炙各二兩		去白		去白	
白朮		半夏		右剉散每服二錢水二盞煎至一盞去渣食前溫服		丁香半夏圓治脾胃宿冷嘔吐痰水噎氣吞酸	
湯洗七次各三分		湯洗七次各三分		欽定四庫全書		世醫得效方	
卷四		世醫得效方		卷四		世醫得效方	
人參		丁香		木香		肉豆蔻	
各一分		半兩		湯洗七次薑汁		湯洗七次薑汁	
陳皮		藿香葉		半夏		右為末薑汁糊丸如小豆大每服四十丸薑湯下	
各一分		半兩		湯洗七次薑汁		湯洗七次薑汁	
令炒黃三兩		令炒黃三兩		二陳湯煎送下青州白圓子治眉心并眉梁骨疼又治		臂疼或麻木或戰掉皆痰飲所作宜服	
方見臂痛類		方見痰癰類白		方見痰癰類白		方見痰癰類白	
控涎圓治同上		方見臂痛類		方見臂痛類		方見臂痛類	

二生湯專主治痰	
附子	生去皮
半夏	生用
右等分剉散每服四錢水二盞生薑十片七分去滓煎空腹溫服少許木香煎尤佳	
關	
痰消飲圓治一切停痰留飲	
青皮	並洗
陳皮	並洗
京三稜	泡槌碎用
川薑	炮
草果	麪裏煨
蓬朮	泡槌碎
良薑	濕紙裏煨
各一兩	
右為末水麪糊丸如梧子大陰乾每服五十丸薑湯	
下	
欽定四庫全書	
世醫得效方	
卷四	
破飲圓治五飲停蓄胸腹結為癥癖支滿胸脇傍攻兩脇搶心疼痛飲食不下翻胃吐逆九種心痛積年宿食不消久瘧久痢遁尸疰忤顛癇厥暈心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉能治療久服尤妙且不傷臟氣	
華撥	
丁香	不見火
胡椒	
縮砂仁	
木香	不見火
蝎稍	
烏梅	
青皮	
巴豆	去殼膜
各等分	

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久研細為膏入藥末和勻丸如菉豆大每服五七丸臨卧薑湯吞下曾有婦人頭風服之亦效且斷根不復發豈頭風即痰飲耶

導痰湯一切痰頭目旋暈或痰飲留積不散胸膈痞塞脇肋脹滿頭痛吐逆喘急痰嗽涕唾稠粘坐卧不安不思飲食

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

半夏

泡七次
四兩

天南星

炮去
皮

橘紅

枳實

去穢
炒

赤茯苓

去皮各一兩

甘草

炙
半兩

右剉散每服四錢水二盞生薑十片煎八分食後溫服

工陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘快或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之一方加丁香

方見痰癰類

荊蓬煎圓破痰癖消癥塊冷熱積聚胃膈痞悶通和三

焦升降陰陽順氣消化宿食

荊三稜

酒浸三日
夏一日

蓬莪朮

酒浸三日
夏一日

以上二味用去皮巴豆二十粒於銀石器內文武火炒令乾黃色去巴豆却用湯浸去白

木香

枳殼
去穢

青皮
去穢

川茴香
微炒

檳榔
剉各一兩

右為末麪糊丸如菉豆大每服三十丸食後生薑湯下

理中湯治停痰留飲加茯苓半夏導利之

方見霍亂類

欽定四庫全書

世醫得效方卷四

咳逆

冷證丁香柿蒂散治吐利及病後胃中虛寒咳逆至七八聲相連收氣不回者難治

人參

茯苓

橘皮

半夏

良薑

炒

丁香

柿蒂
各一兩

生薑
一兩半

甘草
五錢

右剉散每服三錢水一盞煎乘熱頓服或用此調蘘香丸亦妙



木香勻氣散治同上用萊菔子湯泡研取汁調熱服
諸病類

沈香降氣湯縮砂烏沈湯治同前蘼葉三皮鹽少許煎

湯點熱服
方見諸氣類

橘皮乾薑湯治胃中有寒咳逆

橘皮 通草 乾薑 桂心

人參 甘草

右散等分剉散每服四錢水盞半煎六分溫服日三

欽定四庫全書
世醫得效方

卷四

服

羌活附子湯治吐利後背寒咳逆

羌活 附子 芍藥 乾薑
去蘆 炮去 皮臍 炒各 炮

丁香
各一兩

右剉散每服二錢水一盞鹽少許煎至七分空心熱

服

華澄茹散療噫氣咳逆

華澄茹 良薑
各二兩

右剉散每服二錢水一盞煎六分沸投醋半盞取出
時哈之甚妙

熱證小柴胡湯治同上每服三錢水一盞半薑三片柿

蒂三個煎熱服
方見傷寒泄瀉類

橘皮竹茹湯治胃虛膈熱者

橘皮 人參 甘草
去白 二兩 炙 各半兩

右剉散每服四錢水一盞半竹茹一小塊生薑五片

棗二枚煎至七分去滓溫服不以時

欽定四庫全書
世醫得效方

卷四

灸咳逆法乳下一指許正與乳相直骨間陷處婦人即

屈乳頭度之乳頭齊處是穴艾灸炷如小豆大灸三

壯男左女右只灸一處火到肌即瘥不瘥不可治也

其穴只當取乳下骨間動脈處是

世醫得效方卷四



欽定四庫全書

世醫得效方卷五

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

脾胃

虛證丁沈透膈湯治氣滿不快飲食不入胃膈痞悶或時膨脹腹中刺痛等證

丁香錢五 沈香錢五 木香錢五 人參去蘆半兩 青皮去白

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

神麴兩各一 茯苓皮去 甘草炙 陳皮白去 厚朴薑汁製 草果

仁 藿香葉土去 半夏泡七次 縮砂仁去殼各二兩 白豆蔻

白朮殼去炒 麥蘖炒 香附子炒去毛各一兩

右剉散每服三錢水一盞半入生薑三片紅棗一枚

同煎去渣熱服又方治氣滿不食以四味香蘇散同

煎大人尤宜服未效更服丁香煑散加葦撥良薑各一

兩方見嘔吐類

穀神嘉禾散治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胸膈痞

悶脇肋脹滿心腹刺痛可進飲食或多痰逆口苦吞酸胸滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不任攻擊臟氣虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不能多食尤宜服之常服育神養氣和補脾胃進美飲食

枇杷葉去毛姜汁炙 石斛細剉酒拌和 沈香鎰三分

薏苡仁微炒 木香三分 縮砂去殼一兩 杜仲去粗皮用姜

塗炙令香 藿香葉去土三分 隨風子如無陳小緊訶子熟焦三分

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

穀蘖微炒 丁香半兩 半夏一分 青皮去白二兩 大腹子微炒三分 枳榔

爛做餅 白朮去蘆炒 桑白皮微炒 白豆蔻微炒去 人參

炒半兩 陳皮三分 白茯苓去皮一兩 神麴微炒一分 甘草微炒

一兩 五味子微炒半兩 白茯苓去皮一兩 神麴微炒一分 甘草微炒

右剉散每服三錢水一盞入生薑三片肥棗二枚同

煎至七分溫服不拘時候及療四時傷寒能調理陰

陽使無變動尅日得安如療五噎入乾柿一枚同煎



十服見效如膈氣吐逆羸困入薤白三寸棗五枚同煎婦人亦可服

四君子湯治脾胃不調不思飲食

人參去蘆 甘草炙 白茯苓去皮 白朮去蘆各等分

右剉散每服三錢水一盞煎至七分不拘時服一方

加橘紅名異功散又方加陳皮半夏名六君子湯嘔

吐加藿香縮砂泄瀉加木香肉豆蔻

附子建中湯治脾氣虛寒腹脇脹滿身體沈重面色萎

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

黃嘔吐不食水穀不化大腑自利

肉豆蔻炒 白豆蔻仁炒 附子炮去皮 厚朴去蘆汁

白朮炒 乾薑炮 紅豆 神麴炒各一兩 丁香 胡椒

木香不見火 甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片紅棗一枚煎

至七分去渣溫服

參苓白朮散理心脾氣弱神昏體倦飲食不進多困少

力中滿痞噎心忪上喘嘔吐瀉利

人參 白茯苓去皮 白朮去蘆 山藥 甘草各一兩 縮砂

仁 桔梗去蘆 薏苡仁 蓮肉 扁豆薑汁浸去皮七錢半

右為末每服二錢棗湯下小兒量歲數與之此藥中

和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

千金養脾圓治脾胃虛弱停寒畱飲膈氣噎塞反胃吐

食心胸痞滿脇肋虛脹胸腹刺痛牽引背脊食少易傷

言微氣短口苦舌澁惡心嘔噦喜睡噦酸夕病泄利腸

胃虛滑病後氣不復常飲食無味形容憔悴酒後痰多

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

人參 白朮 白茯苓去皮 甘草 山藥炒 木香

丁香 白扁豆炒 縮砂仁 薏苡仁 益智仁

藿香葉 紅豆 肉豆蔻 乾薑炮 高良薑 三

稜炮 莪朮炮 神麴炒 麥蘖炒 陳皮 枳殼 茴香炒

苦梗炒各一兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼白湯下溫

酒亦得空心食前常服溫養脾元進美飲食

治中湯治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致泄瀉

見方



傷寒陰
證類

平胃散治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

蒼朮

去粗皮米湯浸二日一斤二兩

厚朴

去粗皮薑汁拌炒

陳皮

去白各一兩二

錢甘草
炒三

右為末每服二錢以生薑三片紅棗二枚煎湯調服

欽定四庫全書



世醫得效方
卷五

或塩湯調空心食前熱服常服調氣煖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣為散煎亦可加人參尤妙

胃丹朱砂稟太陰之精不經火煨以朮附等脾藥陰煉成用平補不僭善治真陽衰虛心火怯弱不養脾土沖和失布中州虛寒飲食不進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒米穀不化心腹絞痛泄利不止應是一切脾胃諸疾不問男子



迪志文化出版有限公司出版

婦人皆可服

朱砂

大塊不夾石者十二兩半

羅參

去蘆

縮砂

去殼

肉豆蔻

麩裏煨

萆澄茄

白豆蔻

去殼

紅豆

高良薑

挫碎

附子

炮去皮臍

白朮

去蘆

厚朴

去皮薑汁拌炒

丁香

不見火

藿香葉

去土

五味子

去梗

乾薑

炮土

胡椒

益智仁

麥門冬

去心

草果仁

橘紅

去白已上各一兩

右將人參等二十味各如法修製剉如豆大以銀鍋一口用白砂蜜二十兩將藥一半同蜜拌勻入銀鍋

欽定四庫全書



世醫得效方
卷五

內以夾生絹袋盛貯朱砂懸胎入銀鍋內以桑柴火重湯煮三日三夜取沙淘淨焙乾入乳鉢用玉槌研直候十分細米粽為丸如菉豆大陰乾每服十粒加至十五粒空心食前用人參湯送下棗湯亦得如或嘔吐用淡薑湯送下忌食猪羊血

補真丸大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不效者亦有謂焉人之有生不善攝養房勞過度真陽衰虛坎火不溫不能上蒸脾土沖和失布中州不運是致飲食不



迪志文化出版有限公司出版

進胸膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消大腑澹泄此皆真火衰虛不能蒸蘊脾土而然古云補腎不如補脾予謂補脾不若補腎腎氣若壯丹田火經上蒸脾土脾土溫和中焦自治膈開能食矣

葫蘆巴炒 附子炮去 陽起石煨 川烏炮去 兔絲子

酒淘淨 沈香別研 肉豆蔻麩裏 肉蓯蓉酒浸 五味

子去枝梗 鹿茸去毛酒 川巴戟去心 鍾乳粉各一

右為末用羊腰子二對治如食法葱椒酒煮爛入少

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

酒糊杵和為圓如梧子大每服七十丸空心食前米

飲鹽湯任下

進食散理脾元虛冷不思飲食久病脾虛全不食者及

胃虛有風不食只三服便效

甘草炙一兩 肉桂去粗皮 良薑炒 陳皮去白 青皮去穰各一分

訶子五箇煨去核 草豆蔻三箇去皮 川烏一箇炮

右剉散每服二錢水一中盞生薑二片煎七分空心

服

熱證瀉黃散治脾胃壅實口内生瘡煩悶多渴頰痛心煩唇口乾燥壅滯不食

藿香葉去土七錢 石膏煨 縮砂去殼 山梔子去殼 甘草炙各半兩

防風去蘆四兩

右剉碎同蜜酒炒香焙為細末每服三錢水一大盞

煎至七分溫服不拘時候

枳殼丸治脾實心腹壅滯四肢疼悶兩脇脹滿大小便

不利方見秘結類

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

橘皮竹茹湯治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓去皮 陳皮去白 枇杷葉去毛 麥門冬去心 青竹茹

半夏湯泡七次各一兩 人參去蘆 甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去渣

溫服不拘時候

翻胃

安脾散治胃氣先逆飲食過傷或憂思蓄怒宿食痼癖積聚冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得



之多由血氣虛損男子得之多因下元冷憊有食罷即吐有朝食暮吐暮食朝吐所吐酸臭可畏或吐黃水凡有斯疾乃是脾敗惟當速療遲則發煩渴大便秘水飲纖悉不得入咽不旋踵斃矣

高良姜 一兩以百年壁上土三合敲碎用水二碗煮乾薄切成片 南木香

草果 去殼 胡椒 白茯苓 白朮 丁香

陳橘皮 湯洗去穢 人參 去蘆各半兩 甘草 炙一兩半

右為末每服二大錢食前米飲入鹽點服鹽酒亦得

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

薤白粥治翻胃無問久遠冷熱

人參 一兩細切以水一大升煎取三合 雞子 三箇去黃 薤白 二熟稀粟

米粥

右以雞子白及薤白粟等三味熟調攪然後煖人參湯相和更調攪頓服之不限早晚服無忌當時便定准前服萬不失一如思飲食即與粟米粥飲漸漸加粳米和之

熟水草果飲法

烏梅肉 四兩 草果 乾薑 炮各三兩 赤茯苓 二兩 甘草 炙半兩

右剉散每服用半兩水一碗半煎至一碗去滓磁器盛和熟水隨意服之

桂苓散治翻胃發渴

半夏 錢四 桂心 甘草 各三錢 赤茯苓 四兩 澤瀉 四兩

右剉散每服四錢生薑煎服

三稜煎丸治宿食積聚翻吐酸穢 方見諸氣類

正胃散治翻胃嘔逆藥食俱不下結腸三五日至七八

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

日來大便不通如此者必死之疾

白水牛喉 一條去兩頭節并筋膜脂肉節節取下加阿膠片黑牛不可用須就宰牛人買

下修治好臨病時旋炙修合

右用喉節以好米醋一大盞浸頻翻令勻微火炙乾再蘸再炙醋盡為度存性不得見太陽研為末每服一錢食前用陳米飲調下輕者一服見效

靈砂丹治脾疼翻胃

靈砂 一兩 蚌粉 同炒畧變色二兩 丁香 胡椒 各四十粒



右為末生姜自然汁煮半夏糊圓如梧子大每服三十丸翻胃煨生薑湯吞下虛人脾痛炒鹽湯下

青金丹治一切吐逆

水銀錢八生硫黃

右二件入無油銚內用慢火化開以柳木篦子撥炒或有烟焰以醋洒之結成砂子再研為細末用米粽尖杵和為圓如菉豆大每服三十丸用姜橘皮煎湯送下不拘時服

欽定四庫全書

世醫得效方
卷五

大掌中金治翻胃服水藥不得者

大綿附一箇生姜自然汁一椀煮乾為度母丁香一箇為末以少許安掌中心舐喫立效

丁附散治翻胃

大附子一箇切去蓋剉令空入丁香四十九粒以蓋覆之線縛着置銀器中浸以生姜自然汁及蓋而止慢火煮乾為度

右為末用一錢匕糝舌上漱津下若煩渴徐徐食糜粥忌油膩生冷

大倉圓治脾胃虛弱不進飲食翻胃不食亦宜服之

陳倉米一升用黃土炒米熟去土不用白豆蔻二兩縮砂仁二兩

右為末用生姜自然汁法圓如梧子大每服一百圓食後用淡姜湯送下

小半夏圓治翻胃及不悅飲食

半夏湯洗十次胡椒

右等分為末薑汁圓如梧子大每服三五十圓薑湯下

欽定四庫全書

世醫得效方
卷五

六丁圓治翻胃如神

五靈脂醋炙生辰砂一錢母丁香一兩不見火

右為末入黃狗膽糯米粽子尖為圓如雞頭大每用姜湯化下

香牛飲治噎噎翻胃吐食神效

先以羯牛用繩掛開牛口以淨布巾抹令口舌淨却拖牛舌出來候有涎出以椀盛之每服用八分盞為一服研好麝香末一捻打勻却以銀盞盪令溫先以



絹帛束縛中脘胃口令極緊候氣喘乘熱解開隨氣喘一二口便服服時先對病人說煮白粥惱煩之并煎丁香汁和粥服藥罷隨與粥喫

鹽滾圓治翻胃膈氣

丁香 木香 肉豆蔻 縮砂 厚朴 陳皮

胡椒 萆撥 沉香 各等分

右為末以大蒜瓣子不拘多少每瓣作二瓣入去殼

巴豆一粒用餅藥調麪裹蒜片慢火煨熟去巴豆及

欽定四庫全書



世醫得效方
卷五

麪只將蒜研成膏將前項藥末一半搜和為圓如梧

子大每服三十圓於鹽內滾過蘿蔔湯調前藥末二

錢吞下神效

溫胃散治翻胃

真附子 一箇去皮臍分作四塊生薑一兩研水一盞慢火同煮至水盡取附子切焙

右為末每服一錢空服鹽湯下

治翻胃嘔吐便秘結虛冷者用靈砂或養正丹溫而利

之又蘇合香圓用四分感應圓用六分夾研作細圓

薑汁泡沸湯下此亦溫利若大便熱結用蜜煮凝捻作指鉗納後部導之或用獐猪膽一枚取汁入法醋少許以筆蘸滴灌於後部或燒皂角於桶內熏穀道或用連根葱白一握漢椒五十粒搗細作餅焙熱和輕粉掩臍續以葱椒煎湯熏盪身下

又方治翻胃

真蚌粉

右每服二錢薑汁米飲調下

欽定四庫全書



世醫得效方
卷五

治吐逆不止

真黃丹 四兩研細用米醋半升入銚內煎令乾更以火煨通紅令研細為末

水米飯為圓如梧子大醋酵湯吞七圓不以時服

灸法兩乳下各一寸以瘡為度又灸臍上一寸二十壯

又灸內踝下三指稍斜向前三壯中腕一穴在臍上

四寸足三里二穴在膝下三寸各灸七壯或九壯其

效尤著

導引方除腹肚冷風宿疾積胃口冷食欲進退吐逆不



下正坐兩手向後捉腕反拓席盡勢使腹絃絃上下
七左右換手亦然

乾食方惟食乾飯餅餌盡去羹飲水漿藥亦用圓自不
反動調理旬日奇效有人三世死於胃及至孫收效
此方

咳嗽

風證神朮散治四時瘟疫頭痛項強發熱增寒身體疼
痛及傷寒鼻塞聲重咳嗽頭昏並皆治之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷五

蒼朮

五兩米汁浸
一宿切焙

香白芷

細辛

去葉
土

羌活

去蘆

川芎

甘草

炙各
一兩

右剉散每服三錢水一盞生薑三片葱白三寸煎七
分溫服不拘時候如覺傷風鼻塞為末葱茶調下
三物湯治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷
頭目痛眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿短氣
方見傷寒
陽證類
杏蘇湯治傷風身熱有汗惡風病證挾熱服杏子湯不
得者此藥穩當也



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

橘紅 紫蘇葉 杏仁去皮尖 五味子 半夏湯泡七次

桑白皮蜜畧炙 貝母去皮 白朮炒各一兩 甘草炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去
滓溫服不拘時候

人參荊芥散治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言語不
出咽乾項強鼻流清涕

荊芥穗 麻黃去根節 細辛去土洗 桔梗去蘆炒 陳皮去白

半夏湯洗七次 杏仁去皮尖 人參 通草 甘草炙各半兩

欽定四庫全書

世醫得效方
卷五

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎八分食後溫

服

寒證金沸草散治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已增寒
發熱無汗惡寒煩燥或風熱壅在膈間唾黃濁水甚者

咯血
方見傷寒
陽證類

加味青龍湯治表有寒邪喘水飲咳嗽急不得睡卧
方見傷寒

通治
類

華蓋散治肺感寒邪咳嗽上氣胃膈煩滿項背拘急聲

重鼻塞頭目眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子

炒

赤茯苓

去皮

陳皮

去白

桑白皮

炙

杏仁

去尖皮

麻黃

去根節各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服二錢水一錢煎至七分去渣食後溫服

暑證六和湯治傷暑痰生咳嗽喘滿加麥門冬烏梅煎

就吞消暑圓

方見伏暑中暑類

濕證白朮散治五臟傷濕咳嗽痰涎增寒發熱上氣喘

急

欽定四庫全書

世醫得效方卷五

白朮

二兩

五味子

各一兩

茯苓

各一兩

甘草

一半

半夏

四箇洗去滑破

作十片

右剉散作十六服每服水一盞半薑五片紅棗二枚

煎至七分空腹服

不換金正氣散治傷濕四肢重著骨節疼痛洒淅咳嗽

厚朴

去皮薑汁製

藿香

去土

甘草

炙

半夏

炙

蒼朮

米汁浸

陳皮

去白

加木瓜

每藥一兩只用五錢

右等分剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子二

枚煎至八分去渣食前稍熱服忌生冷油膩

傷寒陰證用之

效亦

七情團參飲子治因抑鬱憂思喜怒飢飽等失節致臟

氣不平咳嗽膿血漸成肺痿增寒壯熱羸瘦困頓將成

癆瘵

人參

紫苑草

洗

阿膠

蛤粉炒

百合

蒸

細辛

洗去葉土

款冬花

杏仁

去皮尖炒

天門冬

湯洗七次

半夏

湯洗七次

經霜桑葉

五味子

各一兩

甘草

炙半兩

欽定四庫全書

世醫得效方卷五

右剉散每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分

去渣食後溫服因氣而嗽者宜加木香欬而唾血有

熱加生地黃欬而唾血有寒者加鍾乳粉因疲極而

欬嗽者加黃耆因損而唾血者加沒藥藕節欬而嘔

逆腹滿不食者加白朮倍加生薑欬而小便多者加

益智仁欬而大便澹者去杏仁加鍾乳粉欬而面浮

氣逆者加沈香相皮煎

分心氣飲治憂鬱得嗽

每服三錢加枳殼去穰一錢比五味十粒生薑三片煎方見諸



氣類		熱證枳殼半夏湯治上焦有熱咳嗽黃痰痞滿阻食加
類飲		防己甜葶藶馬兜鈴薄荷葉各半兩 每服姜三片桑白皮七寸煎方見痰
貝母散治熱嗽辰時喫酉時可安兼治痰喘		
知母	新瓦上焙	貝母 巴豆七粒同貝母炒畧熟去巴豆不用各一兩
右剉散錫糖一塊同煎服一方以二母為末入巴豆		
霜少許臨卧用生姜二片蘸藥夾定細嚼咽下		
紫苑膏治同上		
枇杷葉 木通 欵冬花 紫苑 杏仁 桑白皮		
皮	各等分	大黃 減半
右如常製為末蜜圓櫻桃大食後夜卧噙化		
玉芝圓治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽膈不利		
人參	去蘆	乾薄荷 白茯苓 去皮 白礬 枯過 天南星 米泔浸焙
各三兩	半夏 湯洗七次姜汁和作曲六兩	
右為末生薑汁煮麪糊圓如梧子大每服三十圓食		

後薑湯下如痰盛燥熱薄荷湯下		
金沸草散治同上	每服三錢生薑桑白皮烏梅煎就吞服半夏丸方見傷寒陽證及痰瘧類	
黃連阿膠圓治肺熱咯血亦治熱瀉		
黃連	淨三兩	赤茯苓 二阿膠 炒一兩
右黃連茯苓為末水調阿膠和圓如梧子大每服三十圓食後米飲下黃連茯苓能抑心火肺得其清則嗽止		
小柴胡湯治嗽久瘥身有煩熱啜冷水而暫止者加桑		
白皮北五味子棗子煎不拘時服煩熱加麥門冬嗜卧		
減食加白朮煎	方見傷寒陽證類	
洗心散治心熱上炎肺經胸膈滿痛咽乾口燥咳嗽殊		
甚	方見積熱類	
冷證藿香正氣散寧肺和胃祛痰治嗽通暢三焦進美		
飲食生薑三片鹽梅一箇杏仁七粒去皮尖北五味子		
七粒同煎就服青州白圓子	方見傷寒陰證風科通治類	
理中湯治肺虛咳嗽痰唾清白飲食日減多嘔當溫養		



脾土則生肺金用五味子炒阿膠煎湯調服立效方見脾方
杏子湯治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰飲停積

人參 半夏泡 茯苓 細辛 乾薑 官桂

杏仁 白芍藥 甘草 五味子

右各等分剉散每服四錢以水二盞薑四片煎至七分去渣溫服不以時此藥最宜冷嗽熱嗽非所宜若脈浮緊身熱無汗惡風脈浮身熱無汗惡寒而咳加

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

少麻黃去節熱服

丁香半夏圓治肺胃虛寒咳嗽方見痰飲類

胡椒理中圓治寒嗽冷痰吐白涎沫續續不止不能飲食

欸冬花 胡椒去梗 華撥 陳皮 乾薑 甘草

良薑 細辛去葉各二兩 白朮二兩半

右為末蜜圓如梧子大每服十圓溫湯米飲任下不拘時候

黃耆建中湯治冷嗽加半夏麴乾薑五味子同煎空心服方見傷濕類

養榮湯治冷極嗽可加熟附子白豆蔻北五味子蜜炙
粟穀蜂粉炒阿膠方見虛損類以上二方所用各少許

皺肺圓治久嗽

欸冬花 人參 五味子 官桂去皮 紫苑 白石

英微帶青色者 鍾乳粉

右等分為末用羯羊肺一具去皮尖杏仁半斤水煮

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

肺爛為度去筋膜與杏仁同研極爛和衆藥圓如梧

子大陰乾每服五七十圓至百圓糯米飲下食後臨

卧服

時行人參飲子治寒熱上壅咳嗽痰涎

人參 苦梗去蘆 五味子 赤茯苓去皮 白朮炒各一兩

枳殼麸炒 甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去渣食前溫服嗽多者加桑白皮一兩痰多加半夏麴一



兩寒暑之交氣盛人衣厚作壅忽痰盛微熱此藥最
宜若作感冒發其汗攻其邪必成大病此方佳處在
赤茯苓能導心熱枳殼能疎肺壅故易效一方有半
夏一兩又云寒壅者加杏仁不去皮尖紫蘇各半兩
一服散治咳嗽

阿膠二片生薑十片大烏梅二箇甘草一錢紫蘇十葉杏仁去皮
尖七筒大半夏三筒罌粟殼三筒

右剉散水一盃煎至六分去渣臨卧服

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

敗毒散升麻葛根湯香葛湯各件每用四錢生薑烏梅

桑白皮煎有效酌量用之方竝見傷寒陽證及和解類

勞嗽蛤蚧散治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食

蛤蚧一對人參去蘆百部去心款冬花去皮紫苑茸各半兩

貝母 阿膠蛤粉炒鱉甲醋炙柴胡去蘆肉桂去粗皮炒黃耆蜜炙

甘草 杏仁湯浸去皮尖半夏生薑汁浸各一兩

右為末每服三錢水一盞半生薑三片煎至一盞不
拘時溫服肉桂雖去風寒有熱人不肯服則當改用

細辛

風痰嗽白圓子散治一種咳嗽直至嗽頓吐飲食痰物
皆出盡方少定此乃肝木剋脾土風痰壅盛宜以青州
白圓子方作生料更加少木香丁香橘紅天麻全蝎去
毒足僵蚕炒去嘴足服有效

損嗽當歸飲治男子因打損負重女子因勞苦用力而
傷肺經肺經既損遇風寒則為咳嗽或咳血或至紫黑
宜用此藥去心肺間瘀血仍灸肺腧病即甦肺腧穴在三椎下兩

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

傍各一寸半

蘇木 生地黃 當歸 大黃 赤芍藥

右為末酒調服得利去瘀血即止服養榮湯調理

通治澄清飲治諸證痰嗽服他藥不效者

南星 蚌粉 知母 貝母 半夏 白礬

右各等分剉散每服三錢水一大盞生薑五片去渣

澄清俟溫徐徐吸服食後臨睡服小兒亦用得效

青金丹治肺虛壅咳嗽喘滿咯痰血



杏仁去皮尖一兩牡蠣煨取粉入杏同炒黃青黛一兩	右研勻入黃蠟一兩鎔搜和圓如彈子大壓匾如餅	每日中用柿一箇去核藥在內濕紙裏煨俟藥鎔方	取出去火毒細嚼糯米飲送下一方名甲乙餅治咳	出血片兼涎內有血條不問年久月深但須服一服	效用青黛一分牡蠣粉二錢巴杏仁七粒去皮尖研	蠟圓了湯使並同前	人參清肺湯治肺胃虛寒咳嗽喘急胸膈噎悶脇肋脹	欽定四庫全書 世醫得效方 卷五	滿道塞短氣喜欲飲冷咽噎引痛及療肺痿勞嗽唾血	腥臭乾嘔煩熱聲音未出肌肉消瘦倦怠減食	地骨皮 人參 甘草 阿膠 杏仁去皮炒桑白皮	知母 烏梅去核桔梗去蘆罌粟殼去蒂蓋蜜炙	右等分剉散每服三錢水一椀半烏梅棗子各一枚	同煎至一盞去渣食後臨卧加蜜半匙攪勻澄清吸	服效	蠟煎散順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花 紫苑洗土焙乾甘草炙各七錢五味子炒半兩桑白	皮炒桔梗 杏仁去皮炒紫蘇葉各一兩	右剉散每服四錢水一盞黃蠟少許煎食後臨卧溫	服	神效散治一切喘嗽	用皂角一條作兩邊去子每孔入巴豆一粒線繫定	童子小便浸一宿火上炙令焦黃去巴豆不用或入	二粒亦不妨却以杏仁半夏各一合入麻油內煎令	欽定四庫全書 世醫得效方 卷五	拆裂為度同為末每服一字乾柿點藥細嚼或用白	米糖蘸喫亦可臨卧時服服了不可喫湯水一應物	妙不可言	參蘇飲治上膈泛熱咳嗽聲重方見傷寒和解類	寧肺散治大人小兒諸咳嗽	玄胡索一兩二錢桔礬半	右為末每服二錢用軟錫糖一塊和藥含化小兒一	錢用蜜亦可



杏仁煎治咳嗽失音不出

杏仁

去皮尖
研三兩

生薑汁

蜜

砂糖

各一兩半

桑白皮

木通

貝母各一分
紫苑

五味子

各一兩

右剉散用水三升煎至半升入杏仁砂糖蜜薑汁再

煎成稀膏每服挑一匙頭含化更加知母欸冬花各

一兩效

二陳湯治咳嗽嘔痰

方見痰癰類

欸冬花散治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿脅煩悶

欽定四庫全書



世醫得效方
卷五

痰實涎盛喉中呀呷鼻塞清涕頭痛眩冒肢體倦疾咽

噤痛

知母

一兩
麻黃去根節

桑白皮

焙洗

半夏

各一兩

阿膠

蚌粉

炒去粉

貝母

去心麪炒
各四兩

杏仁

去皮尖
麪炒

甘草

燻二兩

欸冬

花

去梗
一兩

右剉散每服水一盞薑三片煎至七分去滓食後溫

服

單方葶藶散治肺壅咳唾膿血喘嗽不得睡卧

甜葶藶

二兩半隔
紙炒令紫

右為末每服二錢水一盞煎至六分不拘時溫服

又方治穀氣素壯人久嗽即效粟殼一味淨去筋膜蜜

炙為末每服用蜜湯下

又方治羸弱久嗽屢效九尖拒霜葉為末用魚鮓蘸服

又方治久嗽漸成癆瘵鳳尾草為末用魚鮓蘸服即效

嚼藥防已散

薄荷

百藥煎

枯礬

防已

甘草

欽定四庫全書



世醫得效方
卷五

右剉散入口細嚼旋旋嚥下治熱嗽失聲有效

星砂圓治一切風痰利膈壯脾胃及消痰積溫中順

氣內傷生冷腹脇脹痛酒後痰實嘔吐服之神效

南星

四兩湯
洗七次

良薑

縮砂仁

各一兩

香附子

去毛炒

右為末生薑自然汁煮麪糊為圓如梧桐子大每服

三十圓生薑湯下不計時候夏月傷生冷尤宜服

捷徑方治久病痰嗽百藥未效

橘紅

一斤去白
要陳久者

甘草

鹽

各四兩



右用水五盞慢火煮煎藥焙乾為末白湯點服

滴油散治痰嗽面浮

箕蚌粉一味新丸炒令通紅地上出火毒拌青黛少

許同淡蘆水滴麻油數點服即愈

灸法上氣欬逆短氣胸滿多唾唾惡冷痰灸肺膺五十

壯又法灸兩乳下黑白際各百壯即瘥咳嗽咽冷聲

破喉漬漬灸天突五十壯穴與灸喘急同膏肓膺在四椎

下五椎上各去脊三寸近胛骨僅容一指許多灸之

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

亦效

喘急

風證麻黃散治傷風喘急坐卧不安痰涎壅塞涕唾稠

粘手足冷痺

麻黃去根節十兩肉桂去皮六兩不見火欵冬花三兩去蘆枝梗訶子

皮五兩甘草五兩杏仁三兩去尖熬炒

右剉散每服三錢水一盞半入好茶一盞煎至八分

食後夜卧通口服如半夜不能煎但以藥末入茶和

勻沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙烤猪肉腥臊等物

溫肺湯治肺虛久感風邪喘咳不能坐卧不思飲食

白芍藥二兩五味子去核炒乾薑炮肉桂去粗皮半夏煮熟焙

陳皮去白杏仁炒甘草炒各三兩細辛去蘆葉各二兩

右剉散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹帛搥

汁食後服兩服渣再煎一服一方向芍藥細辛可加

減用

金沸草散治肺熱傷風喘嗽痰實方見咳類

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

寒證加味子拘湯治肺感寒邪發喘

杏仁去皮尖七錢半陳皮一兩甘草三錢半麻黃二兩北五味

子七錢半辣桂五錢

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎喘甚加馬

兜鈴桑白皮夏月減麻黃

香葛湯參蘇飲素有熱者宜服此方見傷寒和解類

藿香正氣散治渾身拘急增寒喘嗽頭目昏重加北五

味子杏仁去皮尖鹽梅煎有泄不用杏仁方見傷寒陰證類



七情四磨湯治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 枳榔 沈香 天台烏藥

右各濃磨水和作七分盞煎三五沸稍溫服或下養

正丹黑錫丹

四七湯治驚憂氣遏上喘

半夏製二兩半 茯苓二兩 厚朴製一兩半 紫蘇葉一兩

右剉散每服三錢半薑七片棗二枚煎服

紫蘇子湯治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩惡

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脈虛緊而澀

紫蘇子一兩 大腹皮 草果仁 半夏湯洗七次 厚朴去皮

薑汁 木香不見火 陳皮 木通 白朮 枳實去穰炒

人參 甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分

不拘時

熱證洗心散治心肺俱熱致胸滿壅盛口乾作渴發喘

滿中噎氣每服二錢薄荷茶清調下

八正散治同前用燈心二十莖淡竹葉一皮煎方註見積熱類

葶藶散治過食煎煇或飲酒過度致肺壅喘不得卧及

肺癰咽燥

甜葶藶炒 桔梗去蘆 瓜蒌子 川升麻 薏苡仁

桑白皮炙 葛根各一兩 甘草炙半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片同煎食後溫

服

小柴胡湯治服熱藥過多或身有煩熱作喘數服即安

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

方見傷寒類

金沸草散加甜葶藶桑白皮煎方見傷寒類

枳殼半夏湯加防已薄荷煎方見痰飲類以上二方所加各半兩

加味控涎圓治風熱上壅或中脘停留水飲喘急治四

肢浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱諸氣結聚服之得利

則效

大戟 芫花 甘遂 甜葶藶 巴豆去殼各一兩

黑牽牛三兩炒 白芥子炒二兩



右為末米糊圓粟米大每服三七粒茶清吞下或溫水亦可服後未可服甘草藥及熱水

虛證蘇子降氣湯治氣虛發喘不得安枕宜用舊鹽梅杏仁去皮尖北五味子各少許煎吞黑錫丹五十粒方見

鍾乳圓治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不能坐卧遠年日近並皆治之

滑石半兩鍾乳粉見成者一兩南星炮切片生薑製

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

右為末煑乾柿去蒂核搗細搜藥為圓如梧子大每

服四十圓薑棗煎湯下氣弱人更服養正丹方見痢冷類

四物理中圓治肺胃受冷氣短減食時吐痰水喘促濃

煎人參湯吞服甚妙方見咳類

安腎圓治腎寒多唾上喘人參鹽湯下八味圓亦可方並

見虛損類
養正丹均有效方見痢冷類凡動仆喘甚者均宜服效

紅椒圓治虛勞喘嗽眩暈

靈沙一兩人參細研木香各二錢半大香附子杵碎大紅椒

去合口并子焙出汗各半兩

右為末糕糊圓如麻子大每服二十圓空心橘皮湯下

通治人參定喘湯治肺氣喘喉中有聲坐卧不安胸膈緊滿及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參去蘆一兩罌粟殼蜜炙二兩麻黃去節半夏炙甘草各

一桑白皮半兩阿膠炒一兩五味子半兩

右剉散每服三錢水一盞薑三片煎至七分食後溫

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

服

九寶湯治經年喘嗽通用常服屢效

麻黃去節橘紅腦苛各一兩辣桂紫蘇桑白皮炒

杏仁去皮尖大腹子連皮甘草炙各半兩

右剉散每服三錢薑五片烏梅一箇水一盞半同煎

食後臨卧服或入童子小便半盞尤妙

杏參飲治因墜墮驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘急不

足



人參 桑白皮 橘紅 大腹皮 枳櫛 白朮	訶子 麪裹煨取肉 半夏 湯炮七次 桂心 不見火 杏仁 去皮炒 紫苑 洗	甘草 炙	右等分剉散每服四錢水一盞半生薑五片紫蘇七	葉煎至七分去滓溫服不拘時候	分心氣飲治氣逆脈伏發厥而喘者 方見諸氣類	秘肆降氣湯治氣不升降上熱下冷作喘生薑紫蘇葉	同煎就服玉華白丹效 方見諸氣類玉華白丹方見癰冷類	欽定四庫全書 世醫得效方卷五	加味白朮散	陳皮 半夏 人參 白茯苓 白朮 甘草 炙	山藥 炮二兩各 白扁豆 製一兩半 縮砂 桔梗 炒 石蓮肉	薏苡仁 各一兩	右剉散治喘嗽每遇飲酒必發生薑桑白皮煎服效	水蘘木香丸治喘急泄瀉加官桂生薑煎服 方見下利類	神保丸治久喘胸膈滿悶飲食不進每服七丸生薑柿	蒂湯下 方見諸氣類

玉液散治久近喘嗽口乾作渴	栝樓根 知母 貝母 去心炒各一兩 甘草 炙半兩 人參 半兩	右末每服二錢先鎔下黃蠟二錢同入米飲調下食	後服	神應丹治肺氣喘急晨夕不得睡不問久新一服見效	砒石 一兩一錢六 萊豆 六錢	右二味同煮以豆爛為度取出砒石入黃丹一兩同	研爛用紙做卷五七重如竹筒又入砒石黃丹以黃	欽定四庫全書 世醫得效方卷五	泥固濟復燒紅為度又入黃丹一兩麪四分為圓如	粟米大又以黃丹二兩為衣每服二粒新井花水下	得效即止	胡桃湯治痰喘	胡桃肉 三箇 生薑 三片	右臨卧食畢飲湯三兩呷又再嚼如前飲湯就被即	安	亭蔭圓又名防己圓大治肺氣咳嗽面浮目腫喘促睡



卧不得步履艱難小便赤澀等疾	漢防己 貝母 煨令微黃 木通 各一兩 甜葶藶 隔布炒 杏	仁 去皮尖及雙仁麁炒	右為末棗肉為圓如梧子大每服三十圓煎桑白皮	湯下不拘時候	炙肝散治喘併痰嗽兩服病不復作	白礬 飛過研 五倍子 為末	右每服各一錢以生猪肝火上炙熟蘸藥食後臨卧	欽定四庫全書 世醫得效方 卷五	服	人參清肺飲治喘急噎塞加桔梗欵冬花 方見嗽類	清膈散治喘嗽吐唾不利膈熱口中苦氣	南星 一兩 鉛白霜 少許 桑白皮 一兩 白附子 五錢	右剉散生薑三片煎食後臨睡服	灸法肺腧各十一壯穴在第三椎下兩旁各去一寸五	分天突穴在頸結喉下五寸宛宛中灸七壯立效	泄瀉

風證香薷香蘇散治傷風自汗飧泄每服四錢生薑木	瓜煎服	方見傷寒和 解及傷暑類	不換金正氣散體虛傷風冷瀉加官桂烏梅	方見時 疫類	胃風湯治腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉注下膈	中虛滿大腸受濕下如豆羹汁或下瘀血日夜無度並	宜服	人參	白茯苓	去 皮	芎藭	桂心	不 見 火	當歸	白芍	藥	白朮	火 炙	甘草	火 炙	欽定四庫全書	世醫得效方 卷五	右等分剉散每服四錢水一盞半入粟米百餘粒煎	至七分去滓空腹稍熱服胃氣弱者不宜多服	火炊丸治風氣行於腸胃泄瀉	火炊草一味為末醋糊丸每服三十丸空心服	寒證風下湯治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒泄瀉青黑	兼治傷寒挾寒而利臍下冷名驚澹證效	人參	白朮	乾薑	炒	甘草	炒	各 一 兩	茯苓	厚朴	薑 製	各二 兩



右剉散每服三錢水一盞煎空心服

加味治中湯治腸胃虛弱腹內痛身體怯寒泄瀉

乾薑炮 白朮炒 青皮去白 陳皮去白 縮砂仁各一人參

甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎

至七分去滓溫服不拘時或兼進感應圓

暑證香薷散治傷暑煩渴引飲所下如水方見傷暑類

胃苓湯治傷暑煩渴引飲所下如水

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

五苓散方見傷暑類 平胃散方見脾胃類

右二錢合和紫蘇烏梅煎湯下未效加木香縮砂白

朮丁香煎服來復丹亦可方見痢冷類或感寒濕水泄平胃散理中湯蘇梅米

湯調下

通來散分利水穀解煩熱止泄瀉

猪苓去皮 白朮去蘆 澤瀉去毛 赤茯苓去皮 車前子 木通

茵陳 瞿麥

右剉散每服四錢水一盞半燈心麥門冬煎服

六和湯治暑瀉小便赤澀方見傷暑類

水浸丹治感暑口乾煩渴頻瀉方見霍亂類

濕證藿香正氣散治腰脚冷痺小便自利肢體重著所

下黃黑方見傷寒陰證類

胃苓湯治傷濕瀉每服二錢蘇葉三皮食鹽少許調熱

服

白朮附子湯治腸胃虛受濕腸鳴泄瀉自汗

白朮二兩 附子炮 茯苓去皮各一兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

右剉散每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎

至七分去滓溫服不拘時候

麴芎丸治臟腑受風濕泄瀉不止

芎藭 神麴 白朮 附子各等分

右為末糊圓如梧子大每服五十丸米飲下

七情加味藿香正氣散治飲食中憂怒傷脾腹內膨脹

吐瀉頻併或作晨泄加丁香縮砂良薑南木香各半錢

生薑三片紅棗二枚煎效



木香散治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下泄米穀不化
飲食無味肌肉瘦痺心多嗔恚婦人產后虛冷下泄及
一切水瀉冷痢

木香 破故紙 各一兩 良薑 砂仁 厚朴 薑製各三分

赤芍藥 陳皮 肉桂 白木 各半兩 胡椒 茱萸

各一分 肉豆蔻 四餘 檳榔 一箇

右為末每服三大錢用不經水猪肝四兩批薄重重

糝藥漿水一碗入醋茶脚少許入甑蓋覆煮熟入鹽

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

葱白三箇生薑彈子大同煮欲盡空心作一服冷食
之初微瘡不妨此是逐下冷氣少時自住經年冷痢
滑泄只是一服渴則飲粥湯忌冷油膩如不能食冷
則漿水煖食之若只用漿水煮猪肝為圓如梧子大
每服五十丸用粥飲下亦效若暴瀉只一服

熱證黃連香薷散治熱瀉瘡利大便熱煩燥小便赤喜
飲冷香薷散每一兩加宣連五錢剉碎合和燈心二十

莖車前草二根同煎 方見傷暑類

五苓散治法湯引同上 方見傷暑類

黃連阿膠九每服五十丸米飲下空腹服 方見咳嗽類

升麻葛根湯小柴胡湯治傷寒身熱目疼煩渴泄瀉二

藥和合用生薑陳米烏梅煎服立效 方並見傷寒陽證類

藥皮湯治挾熱泄瀉亦治血痢

藥皮 三兩 黃芩 二兩 黃連 一兩

右剉散每服四錢水一大盞煎至七分入阿膠末半

錢再煎少頃溫服

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

調胃承氣湯治大實熱下利謔言此有燥屎也夫泄瀉
反用大黃者乃因所利而利之此治熱瀉也非大實勿
妄輕用之 方見傷寒陽證類

冷證去麻黃五積散炒過名和氣飲治脾胃宿冷腹內

切痛或外感風寒內傷生冷泄瀉黃白色不止或肝經

受寒面色青慘厥而泄利生薑三片鹽梅一箇紅棗二

枚同煎大效 方見傷寒陰證類

豆附丸治丈夫婦人腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄



瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不效者此藥主之

肉豆蔻

炮四兩

木香

二兩不見火

白茯苓

四兩乾薑炮四兩

附子

炮去皮臍

肉桂

去粗皮二兩

丁香

一兩不見火

右為末薑汁糊為丸如梧子大每服五十圓加至一

百圓薑湯吞下粥飲亦可空心食前服

薑附湯治下泄如水或青或白臍腹痛手足冷脈細欲

絕漸漸短氣由陽氣暴絕為陰所迫則注下不止陽復

則生不復則死又不止灸氣海百壯傷寒虛證驚澹亦

欽定四庫全書

世醫得效方卷五

效方見大方科中寒類

太已寒丸治沈寒痼冷臟腑虛憊心腹疼痛脇肋脹滿

泄瀉腸鳴自利自汗久痢休息

華撥

肉桂各四兩

乾薑

炮高良薑各六兩

右為末煮麪糊圓如梧子大每服三十圓空心米飲

下

加味四柱散治臟腑虛怯本氣衰弱脾胃不快不進飲

食時加泄利晝夜不息

人參

去蘆

白茯苓

去皮附子炮去皮臍各一兩

木香

濕紙包訶

子

濕布包炮取皮用各半兩

右剉散每服二錢薑三片棗一枚煎至六分服

加味三建湯治洞泄不止

大川烏

綿附

天雄三味並炮鹽水浸去皮臍

肉豆

蔻訶子

煨裂去核各一兩

右剉散每服三錢生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇陳

米一撮同煎空腹熱服未效仍服來復丹

欽定四庫全書

世醫得效方卷五

來復丹治同上

方見痢冷類

茱萸斷下圓治臟寒腹痛泄瀉不止

艾葉

炒赤石脂

川薑各半兩

吳茱萸

炒二兩半

肉豆蔻

附子

炮去皮臍各七分

右為末煮麪糊圓如梧子大每服五十圓食前米飲下

猪臟圓治臟寒泄瀉不進飲食氣體倦怠

吳茱萸

淨去枝梗不以多少用水浸透

右用猪臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟內兩



頭扎定慢火煮令極爛用甑蒸熟尤好將二味於白
內杵千下令極細圓如梧子大每服五十圓米飲下
猪肚圓治臟寒泄瀉先用製成厚朴附子二味生薑棗
子煎服空心仍服此猪肚圓

川烏 附子炮各二兩 乾薑炮 白朮 厚朴各一兩半 良薑

炒 肉豆蔻煨 華撥 禹餘糧火煨醋碎 縮砂仁 丁香

桂心各一兩

右為末用獐猪肚一隻淨洗以川椒一兩去目茴香

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

一兩大麴二兩入猪肚內用線縫定酒醋煮爛取出

川椒茴香大麴焙乾為末均和煎藥以猪肚杵和得

所為圓如梧子大每服五十圓空心米飲送下

椒艾圓治臟腑虛寒泄痢不止

烏梅去核二兩半醋浸布裏蒸 揉成無滓艾一兩半 川椒炒去目 乾

薑 赤石脂 黑附炮製各一兩

右除烏梅外同為末將蒸過烏梅肉研勻更入熟棗

肉蜜少許和圓如梧子大每服二十圓米飲下

茱萸湯治脾泄多老人腎虛謂之水土同化

吳茱萸取淨不以多少

右用白水煮去滓入鹽少許通口服蓋茱萸能煖膀

胱水道既清大腸自固餘藥雖熱不能分解清濁也

大理中圓治大便虛滑不禁每一圓用平胃散一貼煎

化服便止加鹽梅同煎尤妙

人參 白朮 乾薑 甘草各等分

右為末煉蜜圓如指頭大每服十圓米飲下

欽定四庫全書 世醫得效方 卷五

六君子湯治臟腑虛怯心腹脹滿嘔噦不食腸鳴泄瀉

人參 甘草 白茯苓 白朮 肉豆蔻濕帑裏煨熟剉

碎以厚帑盛壓去油 訶子煨去核各等分

右剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎服或為末

熱鹽湯調服亦可

養氣丹治久冷泄瀉及休息痢疾每服三十圓空心米

飲吞下多服收功方見痢冷類

冷熱不調參連圓治腸胃虛弱冷熱不調泄痢腸鳴日



夜無度

艾葉

取用糯米糊拌勻焙乾薑炮取末二兩用艾末

膏宣連

半一兩半劉如麻豆大用吳茱萸兩同黃連炒色紫揀去茱萸不用訶子煨

核一木香

一兩半別用黃連一兩半為粗末將木香一兩升慢火煨盡水去黃連不用

乾切焙人參

蘆去白朮烏梅乾去核焙百草霜研別白茯苓

苓皮去酸石榴皮

炒當歸一兩半地榆一兩赤石脂三分龍骨

脂三分龍骨

一兩三分火煨阿膠二兩半嬰粟殼二箇蜜炙

右為末將前項艾膏和為圓如梧子大每服五十圓

欽定四庫全書

世醫得效方卷五

陳米飲下

戊巳圓治脾胃不足濕熱泄瀉不止米穀不化腸鳴腹

痛

黃連

白芍藥吳茱萸泡七次焙乾

右等分為末用糊圓如梧子大每服三四十圓空心

食前濃米飲下

腎泄安腎圓治腎洩腹痛無定處似痢非痢骨痛面鰲

腰脚時冷用七氣湯送下安腎圓

方見虛損類

七氣湯見心痛類

震靈丹治同前每服三十圓炒破故紙棗子煎湯調鍾

乳粉少許空心送下小兒腎洩白膿褐汁面黯齒脫偃

人怯寒震靈丹末入些鍾乳粉以棗煎炒破故紙取熱

汁調下效

方見痛冷類

金鎖正元丹治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛

冷之證並皆治之

方見痛冷類

脾泄炙肝散治久患不愈

白朮白芷白芍藥桔梗

欽定四庫全書

世醫得效方卷五

右等分為末炙鹽肝蘸服

和氣散即除麻黃五積散治久虛脾泄大效

方見傷寒陰證類

朴附圓治脾元虛弱久患脾泄冷瀉不止及翻胃惡心

臟腑滑泄

厚朴

去粗皮薑汁製一兩綿附子炮去皮臍神麴炒五乾薑

炮三兩

右為末酒煮麪糊圓如梧子大每服三十圓空心食

前米飲或鹽湯下

脾腎泄木香散治脾胃俱虛泄瀉

肉豆蔻

麩炒
煨

破故紙

炒

白朮

白茯苓

各半
兩

木香

甘草

炙各
七錢

右剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎食前溫服

二神圓治脾胃虛弱泄瀉不止全不進食

肉豆蔻

二兩

破故紙

四兩
炒熟

右為末用肥棗四十九箇生薑四兩切片同煮棗爛

去薑取棗剝去皮核用肉研為膏入藥和杵圓如梧

欽定四庫全書



世醫得效方
卷五

子大每服三十圓鹽湯下立效弱甚加茯苓二兩木

香一兩

積證香蘇散治食傷脾胃噫生熟氣及所泄穢氣殊甚

或腹緊塊痛水煎吞盧氏感應圓每服三七粒立效久

患食積泄瀉不止經驗

方見傷寒和
解及諸積類

縮砂香附湯治傷食成積下瀉與平胃散合和每服二

錢紫蘇葉食鹽煎湯調常服有效

方見諸氣
及脾胃類

酒泄虛者香茸圓治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但

再飲一二盞泄作幾年矣

嫩鹿茸

草火燎去
毛酥炙黃

肉豆蔻

火煨

生麝香

另研

右為末白陳米飯為圓如梧子大每服五十圓空腹

米飲下熱者酒蒸黃連圓

方見下
痢類

平胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂麥芽神麴各

五錢為末空腹米飲調二錢立愈

晨泄又名瀉泄香薑散

生薑

四兩切
如豆大

黃連

二兩
剉

欽定四庫全書



世醫得效方
卷五

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連末

每服二錢用臘茶清調一劑而愈又用米飲酒調治

白痢尤妙若欲速效一料只作二服

五味子散治五更天明溏泄一次名腎虛泄感陰氣而

然

五味子

揀去梗
二兩

吳茱萸

半兩

右同炒香熟研為末每服二錢用陳米飲調下食前

空腹服或加破故紙炒香肉豆蔻煨裂為末蒜膏為



圓如梧子大每服三十圓米飲下大效

滑泄大斷下圓治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脈細
皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗則氣奪
由穀氣不入胃胃無主以養故形氣消索五臟之液不
收謂之五虛此為難治畧能食者生

附子炮 肉豆蔻煨 牡蠣一兩 細辛 乾薑炮 良薑

薑 白龍骨 赤石脂 酸石榴皮醋 乾薑各一兩

白礬半 訶子去核各一兩

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

右為末糊圓如梧子大每服三十圓粟米湯下

豆蔻飲治滑泄神效

陳米一兩 肉豆蔻煨 五味子 赤石脂研各半兩

右為末每服二錢粟米湯飲調下日進三服

乳豆圓治滑泄不止諸藥無效

肉豆蔻生為末

右以通明乳香用酒浸透研成膏和前藥末為圓如

梧子大每服五十圓空腹飯飲下



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書
世醫得效方
卷五

世醫得效方卷五

欽定四庫全書

子部
世醫得效方卷六

詳校官太醫院恩糧_臣孔毓秀

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修_臣倉聖脈

校對官中書_臣李斯咏

滕錄監生_臣杜三泰

欽定四庫全書

世醫得效方卷六

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

下痢

風證神術散治胃經傷風自汗小便難下痢

_{方見咳嗽類}

露宿湯治風痢純下清血

杏仁

_{七個去皮尖}

苦木瘡

_{一掌}

烏梅

_{二個}

欽定四庫全書

_{世醫得效方卷六}

草果

_{一個}

酸石榴皮

_{半皮}

青皮

_{二個}

甘草

右剉散作一劑水二碗生薑叁片煎土分露星一宿

次早空腹服

間風湯治法藥件

_{並見泄瀉類}

寒證人參敗毒散治寒邪壯熱下痢及所下似痢非痢

似血非血色如濁酒者加陳米百粒煎

_{方見傷安陽証類}

不換金正氣散治臟腑受寒下痢赤白加烏梅陳光煎

_方



見時疫類

暑證六和湯治胃暑伏熱致成痢疾煩渴小便赤澀

見傷暑類

五苓散治同上能分陰陽利水道

方見傷暑類

藥皮湯治暑痢

方見泄瀉類

酒蒸黃連圓治伏熱瀉痢不止用香薷散燈心二十莖

車前草二根煎吞服立效

方見後面及傷暑類

濕證加味除濕湯治一身盡痛重者浮黃下痢如豆羹

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

汁

半夏麴

厚朴

去麴皮
薑汁削
蒼朮
兩炒各一

藿香葉

陳皮

炒
茯苓
各五錢

粉草

宮桂

木香
各三錢

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎

服空心仍以五苓散兼服利其小水

艾薑圓治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉

四兩炒焦存性

川白薑
一兩炮

右為末醋煮麪糊圓如梧子大每服三十圓溫米飲

下

苦散治脾受濕氣泄痢不止米穀不化

黃連

去鬚剉
如豆

吳茱萸

白芍藥

剉如豆各二兩
同炒令赤色

右剉散每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

熱證小承氣湯治下痢赤黃但煩飲冷小便不利得熱則極心煩燥喜渴先服一二服蕩之須審是實熱方可

次用

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

五苓散加車前子以利小便黃連阿膠圓佐治之即效

方見傷暑及咳嗽類

小柴胡湯治下痢赤白心中煩燥潮熱加赤芍藥地榆

麥門冬淡竹葉煎效

方見傷寒陽証類

敗毒散治同上加陳米煎

方見傷寒陽証類

烏梅圓治下痢純血臍腹絞痛脈急大數由腸胃久虛

或先經下血痢未止服熱藥蘊毒伏熱滲成血痢

烏梅

二兩焙

黃連

三兩

茱萸



酸石榴皮 各一兩

右為末醋糊圓如梧子大每服三十圓米飲湯下更
以意加減服

地榆散治熱留腸胃下痢鮮血亦名潑火散 方見傷暑類

藥皮湯治熱證發熱下痢 方見泄瀉類

芍藥藥皮圓治一切濕熱惡痢頻并窘痛無問膿血並
宜服

芍藥 各一兩 黃連 各半 當歸

欽定四庫全書 世醫得效方 卷六

右為末水圓小豆大溫水下三四十圓無時候及夜

五六服忌油膩脂肥發熱等物熱痢大效

三黃熟艾湯治傷寒四五日大下熱痢諸藥不止宜服

此除熱止痢亦作圓子熟水吞下四十圓治時行毒痢
良驗

黃芩 黃連 黃蘗 各二分

熟艾

右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

酒蒸黃連圓治身熱下痢鮮血煩燥多渴或傷熱物過
度

黃連 一斤 去鬚 好酒 二斤半

右用酒浸瓦器盛置甑上蒸至爛取出曬乾研為末
用麪糊為圓如梧子大每服三十圓熱水吞下又療
傷酒過多臟毒下血大便泄瀉用溫米飲下食前一

日兩服

欽定四庫全書 世醫得效方 卷六

白頭翁湯治熱痢下血連月不瘥

白頭翁 二兩 黃連 黃蘗皮 秦皮 各三兩

右剉散每服四錢水一盞半煎至八分不拘時溫服

冷證當歸圓治冷痢淒清腸鳴所下純白腹痛不止手
足冷者宜服之

當歸 白芍藥 附子 炮 白朮

乾薑 炮 厚朴 製炒 阿膠 粉炒 各一兩 烏梅 二兩

右為末醋糊圓如梧子大每服五十圓米飲吞下空



心服腹痛甚加桂半兩小便不利加白茯苓一兩									
大凡痢疾雖體寒手足逆冷冷汗自出六脈沉伏不宜輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自出四肢逆冷六脉虛弱但背寒面垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴引飲此伏暑證也小柴胡湯五苓散酒蒸黃連圓必能奏效學者宜審思耳									
方見傷寒陽証傷暑類及見類									
水煑木香圓治純下白痢及淡紅黑痢									
罌粟殼		二兩去蒂毫		訶子肉		六錢		乾薑	
								四兩	
欽定四庫全書									
世醫得效方									
卷六									
木香		青皮		陳皮		甘草		各二錢	
當歸		白芍藥		各半兩					
右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓熟水空心服									
豆寇散治脾虛腸鳴									
大肉豆蔻		一枚剉小		孔子入乳香		三小塊		在內以麪裹煨麪熟為度去麪	
右為末每服一錢米飲調下									
附子理中湯正理中湯加炮附子每料一兩 朮附湯									
薑附湯治同上									
方見霍亂中濕中暑類									

玉華白丹治臟腑久虛下痢空心米飲下渴者人參湯下亦治腸風下血	
震靈丹橘皮煎圓治同上	
方並見痢冷及虛	
鍾乳健脾圓治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃冷滯飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛積冷清痢清穀或下純白腹中疴痛及久痢赤白腸滑不禁少氣羸弱不思飲食並宜服之	
由桂	去麤皮
人參	去蘆
黃連	去鬚
乾薑	
欽定四庫全書	
世醫得效方	
卷六	
龍骨	各二兩
蜀椒	去目及閉口者微炒出汗三兩半
當歸	去蘆
大麥蘖	炒
石斛	去根各一兩
附子	炮去皮臍五刃
茯苓	去皮
細辛	去苗上
神麴	炒
赤石脂	各一兩
鍾乳粉	一兩半
右為末入鍾乳粉和勻煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓食前溫米飲下日三服	
未効用三建湯吞金粟黃芽丹數粒方見	
病冷類	
木香散治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍	



下痢痛腹中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁	藿香葉 洗焙四兩 赤石脂 附子去皮臍醋炙切焙各一兩	丁香 去蘆焙 當歸 去蘆 肉豆蔻仁 木香	甘 炙各二兩 訶子皮 一兩半	右剉散每服三錢生薑三片棗子二枚煎空心溫服	五積散治內傷生冷下痢加縮砂木香製粟殼炒阿膠	大效 方見傷寒陰証類	椒艾圓治虛寒下痢不止 方見泄瀉類	欽定四庫全書 世醫得效方卷六	四注散治下痢又復洩瀉耳鳴手冷腹痛加木香生薑	棗子粟米煎就後後藥 方見泄瀉類	赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴	及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛遍數頻多脇肋虛滿	胸膈痞悶肢體困倦飲食減少	赤石脂 甘草炙各一兩二錢半	肉豆蔻 麪裹煨令熟十兩 縮砂仁 五兩為末二錢一粟米飲調	冷熱不調下痢真人養臟湯

香連圓治同上 二兩並洩瀉類	駐車圓治同上 方見後並已上三方用皆立効	氣痢牛乳治氣痢泄如蟹渤	萆撥 二錢 牛乳 半升	右同煎減半空腹服効	木香流氣飲治同上 方見諸氣類	五膈寬中散治同上 方見五膈類	異香散治憂鬱氣滯不散腹中膨滿刺痛下痛不止	欽定四庫全書 世醫得效方卷六	蓬莪茂 煨 益知仁 炙 甘草 炙	京三稜 煨各六兩 青皮 去白	陳皮 去白各三兩 石蓮肉 一兩 厚朴 薑汁浸炒二兩	右剉散每服二錢水一盞薑三片棗一枚塩一捻煎	七分通口服不計時或塩湯塩酒亦可	木香勻氣散治氣痢腹痛經驗 方見諸痢類	積痢治食積下痢腹內緊痛不進飲食塩梅湯或米飲	多服盧氏感應圓或用蘇合香圓和圓仍用平胃散五



苓散二末藥鹽湯空心服調理立安

方見積中氣脾胃傷暑類

蠟匱圓又名靈妙圓治痢止水瀉

硃砂研一分

辰砂研一分

巴豆去殼

黃蠟半兩

右以二砂為末外將巴豆黃蠟銀石器內重湯煮一伏時候巴豆紫色為度去十四粒將七粒與貳砂末同研極勻再鎔蠟匱藥每旋圓如菉豆大每服三粒至五粒水瀉生薑湯吞下白痢艾湯赤痢烏梅湯五更空心時服服畢一時不須喫食臨卧服尤佳

欽定四庫全書

世醫得效方卷六

禁口痢敗毒散治心煩手足熱頭痛此乃毒氣上衝心

肺所以嘔而不食每服四錢水一盞半陳倉米一百粒

薑三片棗一枚煎溫服

方見傷寒陽証類

加料參苓白朮散治禁口痢食飲不下棗湯調效

方見脾胃

類

又方用石蓮肉留心為末陳米飲下

又方治心腹虛膨手足厥冷或飲過苦澁涼劑晨朝未食先嘔或聞食即吐不思飲食此乃脾胃虛弱山藥一

味剉如小豆大一半銀石器內炒熟一半生用為末米

飲調下自獲其功

煨即魚方治禁口痢

鯽魚撚去膽與腸肚入白礬一大豆許同煨熟入鹽醋喫不過兩枚與痢俱效

休息痢加味養臟湯加炮附子青皮烏藥茯苓各五錢治傷酒肉炙燂後發為痢疾休作無時名曰休息生薑三片紅棗二枚煎

方見泄瀉類

欽定四庫全書

世醫得效方卷六

神效散治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸焙 烏梅肉 黃連

右等分為末研大蒜成膏為圓如梧子大每服二三十圓厚朴湯下一方加阿膠

炒五積散治同上生薑三片紅棗二枚鹽梅一箇木香

半錢煎

方見傷寒陰証類

駐車圓治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛不可忍者及治休息痢下大效痢方之魁



黃連 去鬚 六兩 阿膠 蛤粉炒 三兩 當歸 去蘆洗 焙三兩 乾薑 炮 二兩	右為末醋煮米糊圓如梧子大每服五十圓加至七十圓空心米飲下	秘方養臟湯治同上 方見後	大巴寒圓虛冷者效 方見泄瀉類	薑苓圓止休息痢大效	乾薑 炮 各一兩 建茶 各一兩	右以烏梅取肉圓如梧子大每服三十圓食前米飲下	毒痢茜根圓治毒痢及蠱注下血如豚肝心煩腹痛又脈或大或小浮焰而起下血如豚肝五內切痛此因服五石湯圓逼損陰氣甚則其血自百脈經絡而來注下成蠱毒此為難治	茜根 去蘆 川升麻 去蘆 犀角 地榆 黃連 當歸 去蘆 枳殼 去穰 白芍藥	右等分為末醋糊圓如梧子大每五十圓米飲空心

下	魚鮓湯治痢下五色膿血或如爛魚腸並無大便腸中攪痛不可忍呻吟呌呼聲聞於外	粉霜 研 輕粉 朱砂 砂 研去 白丁香 各一錢 乳香 半錢 巴豆 二十個去殼不去油	右為末蒸棗肉為圓嬰孩三圓如粟米大二三歲四五歲如麻粒大每用三四圓並旋圓煎鮓湯吞下仍間服調胃藥此證緣久積而成故小兒多有之	蠱症痢羚羊角圓治下血黑如鷄肝色相似時發渴者	羚羊角 一兩半 黃連 二兩 白茯苓 一兩 黃柏 去黑皮 一兩半	右為末煉蜜圓如梧子大每服五六十圓蠟茶送下	病危者復生若血鮮滑泄不固欲作厥狀此藥不可服當灸臍下氣海關元貳穴更服玉華白丹 方見痢	冷類 人參 綿附 炮去皮 肉豆蔻 微火煨裂	



右剉散每服二錢水盪半生薑七片棗二枚煎食前服

腹痛不止薑茶方治痢下腹痛肚皮熱手不可近

右用生薑切碎如粟米大草茶相等煎服效又方煮

茶白痢用蜜赤痢用薑

未效用真人養臟湯再加楊芍藥當歸立止方見泄瀉類

香連圓治冷熱下痢腹痛甚肛門所泄皆熱

方見泄瀉類

木香勻氣散治宿冷不消氣滯腹痛用紫蘇湯調下未

效用乳香沒藥湯調服

方見諸病類

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

瘧痢六和湯治夏月冒暑瘧痢俱作瘧則間日而寒戰

掉煩燥難禁當發瘧之時痢或暫止痢則腹痛晝夜頻

數又胸滿乾嘔食藥莫下以此藥治之用生薑三片烏

梅一个紅棗二枚麥門冬二十粒去心煎仍間服香連

圓米飲下未效用五苓散消暑圓仍多服加減清脾更

用勝金圓繼之

方見傷暑泄瀉中暑瘧瘧類

痢風加味敗毒散治痢手足拘攣疼痛加檳榔木

瓜虛人五積散合和生薑紅棗煎

方見傷寒陰証

類

大防風湯祛風順氣活血脉壯筋骨逐寒濕逐冷氣又

治患痢後脚痛癢不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛

脾脛枯腊但存皮骨拘攣跼卧不能屈伸名曰鶴膝風

服之氣血流暢肌肉漸生自然行履如故

熟乾地黄

湯

白木

各二兩

羌活

去蘆

人參

去蘆

川芎

洗

附子

炮去皮臍參一兩半

防風

去蘆二兩

牛膝

去蘆酒浸切微炒一兩

川當歸

洗去蘆酒浸焙炒二兩

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

黃芩

去蘆微炒

杜仲

去皮炒

白芍藥

各二兩

甘草

一兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑七片大棗一枚煎

八分空腹溫服

郁李圓治痢後風手足不能屈伸或麻豆證傳變手足

筋脈急亦能治之

郁李仁

枳殼

川獨活

鱉甲

醋炙黃

右等分為末木瓜湯調下酒亦可



又方治脚手皆腫不能行步		川烏	赤芍藥	蒼朮	酒浸	土朱
右為末糊圓如梧子大引子同上						
通治木香散住腹痛痢		南木香	地榆	一兩	黃連	七錢
赤芍藥		枳殼	煨去穰	乳香	甘草	各五錢
右為末每服二錢熱湯調服						
黑豆散						
小黑豆		炒	川練子	烏梅	甘草	
乾薑		罌粟殼	二个去蒂	當歸	去尾	
右罌剉煎至七分將紗濾過梔自然汁空腹服						
當歸散住瀉痢		地榆	陳皮	罌粟殼	去蒂	當歸
赤芍藥		甘草	肉豆蔻	煨	加黃連	
右等分為末每服二錢冷水調服						
獨神圓治痢神效						

神應散治痢緊嚴絕妙		金罌草	肉豆蔻	訶子	地榆
白朮		甘草	當歸	去尾	茯苓
木香		陳皮	一兩取紅生血	烏梅	各一兩
右為圓或末五花痢用春茶陳皮煎湯下如是末用		蜜一匙春茶烏梅煎湯調服			
又方		金罌華葉及子	罌粟殼	去蒂	醋炒
右為末用蜜圓如手指大湯引同上		秘方養臟湯治五色痢經驗	陳皮	去白	枳殼
效		嚙下白痢烏梅甘草節但為末二錢陳米塩梅湯亦	黃連	去鬚	南木香
罌粟殼		十兩重分作三分	一分醋炒	一分生用	
右為末用蜜圓如小指頭大紅痢生地黃春茶煎湯					
嚙下白痢烏梅甘草節但為末二錢陳米塩梅湯亦					

烏梅 去核各五錢重 厚朴 去蘆皮薑汁皮 罌粟殼 去蒂膜蜜炒一兩		杏仁 去皮尖 甘草 各五錢重		右剉散五色黑豆棗子煎紅痢生地黃春茶甘草節煎服五色久不效加龍骨赤石脂人參楊芍藥各一兩為末蜜圓烏梅甘草湯下粟米飲亦可立效		大阿膠圓治發熱下痢腹痛至甚肛門痛欲絕者		當歸 阿膠 炒 豆蔻 煨 龍骨		赤石脂 大艾 黃連 各半兩 木香		乳香 別研五錢 白礬		右為末塩梅肉圓每服三十圓如梧子大陳米飲下		四物湯治血痢 方見婦人科通治類		駐車圓治同上 方見前		九聖圓治下痢赤白日夜無度裏急外重緊痛服之特效		罌粟 去蒂膜米醋炒一兩重 川烏 炮去皮臍 黃連 去鬚		南木香 北赤石脂 枯礬 肉豆蔻	



乾薑 白茯苓 去皮各五錢重		右為末醋煮陳米粉糊為圓梧桐子大每服五十圓空心米飲下腹痛不止當歸乳香湯下又名緊皮圓立效散治同上		罌粟殼 六兩去蒂萼穰蜜炒赤 當歸 一兩 芍藥		榴皮 地榆 各二兩 甘草 一兩		右剉散每服三錢水一盞同煎溫服		大斷下圓治久痢不止 方見泄瀉類		沒石手圓治臟氣虛弱大腸滑洩次數頻併日漸羸瘠不進飲食或久患赤白痢脾瀉等疾並皆治之		白朮 三錢 白茯苓 三錢 白薑 切作片畧炒		訶子 紙裏炮取皮 赤石脂 別研 丁香 不見皮各二錢		肉豆蔻 麪裏炮 沒石麪 裏炮		右和勻用湯泡蒸餅為圓小梧桐子大每服三四十圓米飲吞下粥食前一日三四服棗肉圓亦可		荊芥湯治白痢血痢或婦人血崩	



荊芥 楮樹皮

右等分剉散治血崩每服二錢水一盞煎至七分去滓放溫服如血痢則為末冷醋調徐徐呷服白痢熱謝調下神效不可具述

香茸圓治下痢危困

麝香 半錢別研

鹿茸 一兩火燎去毛酥炙

右鹿茸為末方入麝香以燈心煑棗肉圓如梧子大每服五十圓空心服每料加滴乳香半兩尤效有人

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

苦痢疾凡平時所用罌粟殼之類不可向口往往不救而死唯服此等藥或沒石子圓作效

平胃散治血痢 方見前

右秤一兩入川續斷麤末二錢半拌勻每服二錢水一盞煎七分服 方見脾胃類

樗白皮散治下痢諸藥不效

樗白皮一握粳米五十粒葱白一握甘草一二寸豉二合水一升取半升頓服小兒量大小加減

百中散治一切痢不問赤白或一日之間一二百行不

一服便疎再二三服即愈

罌粟殼

二兩半去上下蒂及穰剉成片子蜜炒令赤色淨秤

厚朴

二兩半去麤皮淨秤用生薑汁淹一宿炙冷薑汁盡為度

右為末每服二三錢米飲調下忌生冷油膩魚鮓毒物

酸石榴皮散治同上

石榴皮

陳皮

甘草

川當歸

罌粟殼

去蒂萼穰各半兩

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

右剉散用水十盞煎取三盞次用下藥

茯苓 七分

粉草 七分

北五味子 七个

右為末將前藥汁入此三味再煎五七沸去滓空心

溫甚者不過兩劑輕者一劑立效

乳香散治痢疾甚者數服止

人參

白朮

當歸

地榆

阿膠

各一分 蚌粉 炒黃

甘草

各一分

乳香 少許

肉豆蔻 二个



右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服仍兼服來復丹

方見痢冷類

加減木香煑散治一切痢神妙

木香

甘草

當歸

肉豆蔻

人參

官桂

揚芍藥

訶子

烏梅

去核

阿膠

蚌粉炒

白茯苓

各五錢

罌粟殼

一兩半

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚同

欽定四庫全書



世醫得效方
卷六

煎去滓空腹服

加味四君子湯治久患痢疾服藥已多而疾不愈且治痢多是攻擊臟腑之藥轉覺難安宜用輕清和氣之藥即愈

人參

白朮

白茯苓

川芎

黃耆

甘草

罌粟殼

製同上

右各等分剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚烏梅一个煎溫服

蒲黃散治婦人胎前產後赤白痢

生薑自然汁

年少者十兩
年老二十兩

鴨子

一个打碎入
薑汁內攪勻

右二味煎至八分入蒲黃三錢煎五七沸空心溫服效

服效

治痢無問赤白

玄胡索不以多少新瓦上炒過為末每服二錢米飲

調下只一服取效

又方治暑毒濕氣下痢

欽定四庫全書



世醫得效方
卷六

雄黃一味乾蒸研為末甘草湯調服即效

灸法泄利食不消不作肌膚灸脾腧隨年壯其穴在第十一椎下兩傍各去一寸半

泄利不禁小腹絞痛灸丹田百壯其穴在臍下一寸

又灸臍中一二十壯灸關元穴百壯

泄利不嗜食雖食不消灸三報穴在俠臍相去五寸

一名循際

秘澁



小便不通熱證八正散治心經邪熱小便赤澀不通加

燈心枳殼車前草地膚子煎

方見積熱類所加並半錢

五苓散治小便不通壅上心滿燈心十莖車前草二根

煎湯調

方見傷暑類

通心飲治心經有熱唇焦面赤發熱小便不通每服四

錢水一盞半燈心十莖滑石末一匙麥門冬二十粒桑

白皮七寸煎去滓再入生車前草汁一合攪勻服

方見

小方科諸熱類

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

瓜蒌散治腹脹小便不通

苳蒌仁不以多少為末每服三錢溫酒調

不飲用米湯頻服通

為度

虛證八味圓治腎虛小便秘澀不通或過服涼藥者每

服五十圓溫鹽湯下立效

方見虛損類

附子散治小便不通兩尺脈俱沉微乃陰虛故也用淋

閉通滑之劑不效者

綿附子

一兩重炮去皮臍鹽水內浸良久

澤瀉

不蛀者一兩重

右剉散每服四錢水一盞半燈心七莖煎隨通而愈

琥珀散治老人虛人心氣閉小便不通

琥珀一味為末每服一錢濃煎人參湯下有驗

利氣散治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃耆

去蘆

陳皮

去白

甘草

各等分

右剉散每服三錢水一盞煎服自然流通

參耆湯治心虛客熱乘之小便澀數數而瀝

赤茯苓

七錢半

生乾地黄

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

綿黃耆

去蘆

桑螵蛸

微炙

地骨皮

去骨各半兩

人參

去蘆

北五味子

去梗

免絲子

酒浸研

甘草

炙各二錢半

右剉散每服新水一盞煎臨熟入燈心二十一莖溫

服

轉胞滑石散治胞為熱所迫或忍小便俱令水氣迫於

胞屈辟不得充張外水應入不得入內澁應出不得出

小腹急痛不得小便小腹脹不治害人



寒水石 二兩 白滑石 一兩 葵子 一合 亂髮灰	車前子 木通 去皮節 各一兩	右剉散水一斗煮取五升時時服一升即利	八味圓治虛人下元冷胞轉不得小便膨急切痛經四	五日困篤欲死每服五十圓塩湯下 方見虛損類	葱白湯治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絕欲	死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉而不流	氣衝胞系不正	欽定四庫全書 世醫得效方 卷六	陳皮 三兩 葵子 一兩 葱白 二莖	右剉散水五升煮取二升分三服	洗方治胞轉小便不能通先用	良薑 葱頭 紫蘇莖葉 各一握	右煎湯密室內熏洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿	洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣	次用	蜀葵子 二分半 赤茯苓 赤芍藥

白芍藥 各半兩	右剉散每服三錢煎取清汁再暖乘熱調蘇合香圓	三圓并研細青塩半錢食前温服	又方炒塩半斤囊熨小腹	治小便難小腸脹不急治殺人用葱白三斤細	剉炒令熟以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通	大便不通風秘脾約麻仁圓治風秘脾約證小便數大	便秘	欽定四庫全書 世醫得效方 卷六	大黃 赤芍藥 枳殼 炒 各一兩	厚朴 薑汁炒 半兩 麻仁 別研 一兩	右為末煉蜜圓如梧子大每服三十五圓温水吞服	枳殼散温水調送下尤妙 方見婦人科護胎類	皂角圓專治有風人臟腑秘澁大效	猪牙皂角 厚枳殼 去穰 羌活 桑白皮	厚枳殼 杏仁 製同下 別研 麻仁 防風	川白芷 陳皮 去白



右等分為末蜜圓如梧子大每服三十五圓溫水吞下蜜湯亦可		又方皂角圓治大腸有風大便秘結之人宜服		皂角 炙去子 枳殼 去穰		右等分為末煉蜜圓如梧子大每服七十圓空心食前米飲送下		疎風散治風毒秘結		枳殼 製半兩 防風 羌活獨活		欽定四庫全書 世醫得效方 卷六		檳榔 白芷 葳靈仙		蒺藜 炒赤去刺 麻仁 炒另研 杏仁 湯洗去皮尖炒另研		甘草 炙各一兩		右剉散每服二錢半生薑五片蜜一匙水一盞半煎服		枳殼圓治腸胃氣壅風盛大便秘實		皂角 去皮弦子炙 枳殼 炒 大黃 羌活		木香 橘紅 桑白皮 香白芷 各等分		右為末煉蜜圓如梧桐子大每服七十圓空心米飲	



又方只用枳實皂角等分為末飯飲為圓亦妙		順氣圓治三十六種風七十二般氣上熱下冷腰脚疼痛四肢無力惡瘡下疳疎風順氣專治大腸秘澁真良方也		大黃 五兩半溫紙裏煨 山藥 刮去皮		山茱萸肉 麻子仁 微炒退殼		郁李仁 炮去皮研 兔絲子 酒浸炒 川牛膝 酒浸一宿各二兩		欽定四庫全書 世醫得效方 卷六		防風 枳殼 炒 川獨活 各一兩		檳榔 二兩 車前子 二兩半		右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服二三十圓用茶酒米飲任下百無所忌平旦臨卧各一服久服自然精神強健百病不生		搜風散治大便秘結		青皮 去白 威靈仙 去頭各二兩 大黃 一兩		大戟 一兩 牛蒡子 四兩	



右為末每服一錢人壯實每服三錢蜜酒調服畢嗽口

二仁圓專治虛人老人風秘不可服大黃藥者

杏仁 去皮尖 麻仁 各另研 枳殼 去穰

訶子 漫火炒
槌去核

右等分末煉蜜圓如梧子大每服三十圓溫水下

氣秘三和散 方見諸氣類

四磨湯治氣滯腹急大便秘澀

欽定四庫全書 世醫得效方
卷六

大檳榔 沉香 木香 烏藥

右四味於搗盆內各磨半盞和勻溫服有熱者加大

黃枳殼名六磨湯

蘇子降氣湯治氣不下降大便不通加枳殼杏仁 方見

諸氣類

橘杏圓治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅 取末 杏仁 湯浸去皮
尖另研

右各等分煉蜜圓如梧子大每服七十圓空心米飲



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

下

蘇麻粥此藥順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁

右二味不拘多少研爛水濾取斗羹粥食之

小通氣散治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳送致令秘

澀服燥藥過大便秘亦可用

陳皮 去白 蘇嫩莖葉 枳殼 去穰 木通 去皮節

右等分剉散每服四錢水一盞煎溫服立通

欽定四庫全書 世醫得效方
卷六

積滯秘結脾積圓治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大

便秘結

蓬莪木 三兩 良薑 半兩已上用米醋一升於
磁瓶內煮干乘熱切碎焙

京三稜 二兩 青皮 去白 南木香 半兩

不蛀皂角 叁大錢
燒存性 百草霜 村家家鍋底者
佳

右末用川巴豆半兩只去殼研如泥漸入藥末研和

麪糊圓麻子大每服五十圓加至六十圓橘皮煎湯

送下

木香逐氣圓治食積氣滯通利大便兼治腳氣小腸氣
諸氣攻刺腹痛

橘紅 青皮 去白 檳榔 鷄心者 各半兩

南木香 二錢半 川巴豆肉 一錢半 研如泥 漸入藥夾研

右為末生薑自然汁調神麴末為糊圓如麻子大每

服十圓薑湯下如氣攻腹痛枳殼木瓜煎湯下

感應圓治飲食所傷三焦氣滯大便秘澀

百草霜 用村庄家鍋底上 新揀丁香 一兩半 者細研二兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷六

杏仁 去雙仁陳肥者一百四十個去尖 湯浸一宿去皮別研及爛如膏

南木香 去蘆頭 肉豆蔻 去麁皮用滑 二兩半 皮仁二十個

川乾薑 炮製 巴豆 七十個去皮心膜 一兩 研細出盡油加粉

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味擣為末與

三味同拌研令細用好蠟匱和先將蠟六兩溶化作

汁以重綿濾去滓更以好酒一升於銀石器內煮蠟

溶滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用凡

春夏修合用清油一兩於鉢內熬令末散香熟次下

下酒煮蠟四兩化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末
秋冬修合用清油一兩半同煎煮熱作汁和蠟匱藥
末成劑分作小鉸子以油單紙裹之旋圓服餌

虛秘半硫圓治年高冷秘及痲痺冷氣

生硫黃 半夏 等分

右為末生薑自然汁煮麴糊為圓如梧子大每服三

十圓空心飯飲下酒亦可

金液丹治大便挾冷結滯用麻仁杏仁煎湯下傷寒陰

欽定四庫全書 世醫得效方 卷六

結亦用 方見痢冷類

葳靈仙圓治年高氣衰津液枯燥大便秘結

黃耆 蜜炙 枳實 葳靈仙

右等分為末用蜜圓如梧子大每服五六十圓薑湯

熱水下一方用防風無黃耆忌茶

五仁圓治津液枯竭大腸秘澀傳導艱難

桃仁 杏仁 炒去皮 柏子仁 半兩 各一兩

松子仁 一錢 郁李仁 炒刃



陳皮 四兩
另為末

右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜為丸如梧子大每服五十圓空心米飲下

潤腸圓治發汗利小便亡津液大腑秘老人虛人皆可

服

沉香 另研
一兩 肉蓯蓉 酒浸焙
二兩

右為末用麻子仁汁打糊為圓如梧子大每服七十

丸空心米飲送下

欽定四庫全書 世醫得效方
卷六

又方治大便秘澀連日不通

麻子仁 一盞半
浸濾去皮取濃汁 脂麻 半盞
微炒研用

桃仁 湯洗去皮麩
炒黃研如泥 荊芥穗 搗末
各一兩

右用前藥入塩少許同煎可以當茶飲之以利為度

葱白散治老人大便不通

葱白 二莖 阿膠 一片

右以水煎葱候熟不用却入阿膠溶開溫服

胃氣散治老人胃寒氣怯大便反秘每服五十丸米飲

空腹下未效生薑自然汁著熱水少許吞下 方見霍亂類

黃耆湯治年高老人大便秘澀

綿黃耆 陳皮 去白
各半兩

右為末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿

水一盞濾去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜

一大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過

兩服愈常服即無秘澀之患此藥不冷不燥其效如

神

欽定四庫全書 世醫得效方
卷六

熱秘神功圓治氣壅風盛大便秘澀後重疼痛煩悶此

藥當量虛實加減

大黃 四兩
煨可 人參 二兩 訶子皮 四兩 麻仁 二兩
另研

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸溫湯酒米飲

任意下食後臨卧服

檳榔圓治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便秘結

檳榔 大黃 蒸 麻子仁 炒去殼
別研

枳實 麩炒 羌活 去蘆 杏仁 去皮尖
炒 牽牛 炒



白芷

黃芩 各一兩 人參 半兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十九空心熟水下

四順清涼飲治同上每服三錢水一盞半燈心十莖枳

殼十片去穰煎立效

方見積熱類

小三黃圓治熱証大便秘結每服三十圓溫水下

方見

積熱類

小柴胡湯治傷寒陽結能食而大便秘不下

方見傷寒陽証類

濕秘檳榔散治腸胃有濕大便秘澀

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

檳榔

不拘多少

右為末每服二錢用蜜湯點服不以時候

香蘇散多加枳殼檳榔亦效

方見傷寒和解類

通治甘遂散治大小便不通

右以甘遂二兩赤皮者為末煉蜜二合和勻每一兩

重分作四服日進一服蜜水下未知日二脈漸加之

又方葵子末三合青竹葉一把水一升煮五沸頓服

又方葵子末三合水一升煮去滓分作二服猪脂二兩

空心服

又方治大小便關格不通經三五日者用不蛀皂角燒

灰米湯調下即通

又方猪脂二兩水一升煮三沸飲汁立通

八正散治同上

方見積熱類

推車散治大小便秘經月欲死者

推車客 七個

土狗 七個

如男子病推車客用頭土狗用身
如女子病土狗用頭推車客用身

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

右新瓦土焙乾為末用虎目樹皮向南者濃煎汁調

只一服經驗如神

又掩臍法治大小便不通用連根葱一莖帶土不洗以

生薑一塊淡豉二十一粒塩二匙同研爛揭餅烘熱

掩臍中以帛札定良久氣透自通不然再換壹劑

通治大便不通大潤腸圓大便秘澀通用

杏仁 去皮尖微炒 枳殼 浸去穰 麻仁

陳皮 各半兩 阿膠 炒 防風 各二錢半



右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸老者蘇子煎湯下壯者荊芥泡湯下

獨棗湯治大便積日不通

大好棗 一枚 擘開入輕粉半錢

右以棗相合麻線扎縛慢火煑熟嚼細以棗汁送下敷藥治閉結至亟昏不知人生大螺一二枚以塩一匙和殼生搗碎置病者臍下一寸三分用寬帛繫繫之即大通未效烏柏木根三寸研井水服亦效就多研

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

爛敷臍下亦可

蜜兌法蜜三合入猪膽汁兩枚在內煎如飴以井水出冷候凝撚如指大長三寸許納下部立通活人書單用蜜一法入皂角末在人斟酌用一法入薄荷末代皂角用尤好又或偶無蜜只嚼薄荷以津液調作挺用之亦妙

煨蒜方獨頭蒜煨熟去皮以綿裹納後部自通
熏方不蛀皂角用碗燒置於桶內其後部自通

老人臟腑秘不可用大黃老人津液少所以臟腑秘澁更服大黃以瀉之津液皆去定須再秘甚於前只可服寬潤大腸之藥更用槐花煎湯淋洗亦效更有老人發熱而大腑秘澁或因多服丹藥脾胃虛弱煑化不行遂為臟腑積熱須用神保圓得通瀉一行熱亦即退

脹滿

風寒暑濕脹大正氣散治脾胃怯風寒濕氣傷動冲和

欽定四庫全書

世醫得效方
卷六

心腹脹滿有妨飲食

厚朴

薑製

藿香葉

半夏

橘紅

白朮

各一兩

甘草

炙

檳榔

桂枝

不見尖

枳殼

去穢炒

乾薑

炮各半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片棗子二枚煎至七分去滓不以時溫服

疏順飲子治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿連兩脇妨悶頭暈嘔逆脈來浮弦



防風 去蘆 桂枝 不見火 枳殼 去穰炒 赤芍藥	桔梗 去蘆炒 木香 不見火 人參 檳榔	當歸 去蘆酒浸 川芎 橘紅 甘草 炙各半兩	右剉散每服四錢水一盞薑五片煎七分不拘時溫服	五膈寬中散治七氣流滯飲食不下氣滿膨脹 方見五膈類	木香流氣飲調榮衛利三焦行痞滯消脹滿 方見諸氣類	附子粳米湯治憂怒相乘神志不守思慮兼并擾亂臟	欽定四庫全書 世醫得效方卷六	氣不主傳使諸陽不舒反順為逆中寒氣脹腸鳴腹痛	胸脇逆滿嘔吐不食	附子 一個去生皮 半夏 湯洗七次	粳米 各三錢 甘草 炙一錢半 乾薑 一分	右剉每服二錢水一盞棗三個煎至七分去滓食前服	溫胃湯治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與胃氣不平脹滿衝欬食不得下脈虛而緊瀉

附子 炮去皮劑 當歸 厚朴 去麤皮生用 人參	橘皮 白芍藥 甘草 炙各一兩 乾薑 一分	川椒 炒出汗去合口者三分	右剉散每服四大錢水二盞煎七分去滓食前服	沉香降氣湯治中脘脹滿時復脇肚痛楚每噫則覺氣快氣不噫則悶漸覺面浮磨檳榔入紫蘇同煎下神丸	五七圓 二方並見諸氣類	穀脹大異香散治失飢傷飽痞悶停酸早食暮不能食	名穀脹	京三稜 蓬朮 青皮 陳皮	半夏麴 藿香 北梗 益智仁	枳殼 製 香附子 炒各半兩 甘草 炙三分	右剉散每服三錢水盞半薑五片棗二枚煎服	華澄茄圓治痞滿脹痛穀脹氣脹通用	華澄茄 白豆蔻仁 縮砂仁 青皮	蘿蔔子 木香 各二分 肉豆蔻 煨 茴香 炒



辣桂 丁香各一分半 陳皮三分	右為末麪煑稀糊丸梧桐子大每服三十丸陳皮湯下	水脹大半夏湯治脾土受濕不能制水水漬於腸胃溢於皮膚漉漉有聲怔忡喘息名水脹	半夏湯洗 陳皮 茯苓 桔梗	檳榔 甘草各等分	右剉散每服三錢水一盞半薑三片煎溫服	欽定四庫全書 世醫得效方 卷六	青木香圓治同上 方見諸病類	血脹人參芎歸湯治煩燥嗽水迷忘驚狂痛悶喘惡虛汗厥逆小便多大便黑名血脹	當歸 半夏製同上 川芎一兩 蓬朮煨	木香 縮砂仁 烏藥 甘草炙各半兩	人參 辣桂去麋皮 五靈脂炒各一分	右剉散每服三錢薑五片棗二枚紫蘇四葉煎食前服

熱脹七物厚朴湯治腹滿發熱以陽并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱脈必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如故致脹滿者為熱脹	厚朴薑汁炒 甘草炙 大黃蒸各三字	枳實麸炒去穢 桂心一分	右剉散每服四錢水盞半生薑七片棗三枚煎至七分食煎服嘔加半夏利者去大黃寒多則加生薑十片煎	欽定四庫全書 世醫得效方 卷六	推氣圓治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿大便秘澀小便赤少並宜服之	大黃 陳皮 檳榔 枳殼小者去穢	黃芩 黑牽牛生用各等分	右為蜜丸如梧桐子大每服五七十丸臨卧以溫然水下更量虛實加減	寒脹朴附湯治老人虛人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脈來浮遲而弱此名寒脹



附子 炮去皮臍 厚朴 薑製炒		右等分剉散每服四錢水二盞生薑七片紅棗二枚煎至八分去滓溫服不拘時候加少木香尤佳		順氣木香散治氣不升降嘔逆惡心胸膈痞悶脇肋脹滿及酒食所傷噎氣吞酸心脾刺痛大便不調面色痿黃肌肉消瘦不思飲食兼婦人血氣刺痛及一切冷氣並治之		丁香 不見火 縮砂仁 良薑 去蘆 肉桂 去麤皮		乾薑 炮 甘草 炙 陳皮 去白		厚朴 去麤皮汁炙 蒼朮 米泔浸炒 桔梗 去蘆 茴香 炒各三兩		右剉每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至八分稍熱不拘時或入塩少許沸湯點服寬中順氣和胃進食		食脹強中湯治脾胃不和食啖生冷過飲寒漿多致腹脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛		乾薑 炮去土 白朮 各一兩 青皮 去白 橘紅	

人參 附子 炮去皮臍 厚朴 薑製 甘草 炙各半兩		草果仁 丁香 各三兩		右剉散每服四錢水一盞半生薑五片大棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時嘔者加半夏半兩或食麪致脹滿加蘿蔔子半兩		溫中散治虛人老人喜啖生冷多致腹脹心下痞滿有妨飲食或刺痛洩利氣痞滯悶		厚朴 去皮剉 甘草 細剉 青州棗 生薑 洗切		右以厚朴甘草搗令得所方入生薑再杵令勻取出同棗焙令浥浥微燥却入鍋內慢火炒至紫色再焙乾為末每服一大錢擦生薑少許沸湯點空腹以和為度氣味甚美兼能愈疾又易修合		桂香圓治大人小兒過食雜果腹脹氣急		肉桂 不見火一兩 麝香 另研		右為末飯丸如菜豆大大人十五圓小兒七圓不拘時熱水送下未痊再服	



獨聖散治脾胃不足過食瓜菓心腹堅脹痛悶不安

鹽 五合

右用水一升煎消頓服自吐下即定或因食麥令人

腹脹暖酒和薑汁飲一兩盃即消

感應圖治積食停滯脾胃作脹 方見秘澁類

北亭圖治稟受怯弱脾胃易傷因此積聚中脘脹滿心

腹堅硬疔痛攻衝牽引小腹如蠱之狀 方見虛損類

溫中圓治心腹積聚九癥癖塊腹脹心下堅結大如杯

欽定四庫全書 世醫得效方 卷六

梔子散治兩脇心痛積年食不消化

吳茱萸 湯洗七次焙炒 桔梗 柴胡 去蘆

菖蒲 紫苑 黃連 去鬚 乾薑 炮

肉桂 去麋皮 茯苓 去皮 蜀椒 去目及閉口者炒出汗

人參 去蘆 厚朴 去麋皮薑汁製 巴豆 去皮心膜出油炒研已上各半兩

川烏 炮去皮臍二兩半 皂莢 去皮子炙半兩

右為末入巴豆令勻煉蜜圓如梧子大每服三十九

紫蘇湯下取下積滯如魚腦爛綿而安

鼓脹嘉禾散四柱散治脾胃虛憊腹脹如絢鼓氣宇喘

促食後愈甚 方見脾胃類 四柱散方見泄瀉類

厚朴橘皮煎治傷冷瘡下腹肚脹其狀如覆拷棹喘

息奔急鼻張口吐氣上下不得分泄

厚朴 去麋皮薑製三兩 枳殼 麸炒 乾薑 炮

良薑 切各一兩二錢 青皮 去白 陳皮 去白 肉桂 去麋皮

全蝎 去尾足毒斟酌分兩

右為末醋糊圓如梧子大每服三十九生薑橘皮湯

欽定四庫全書 世醫得效方 卷六

吞下或紫蘇湯下

三稜煎圓青木香圓治心腹堅脹喘滿短氣緊促噫氣

不通飲食不消或嘔逆吐痰或腸中水聲大便或秘或

泄二藥合和每服三十圓食後米飲下 方見諸氣諸病類

四炒枳殼圓主腹脹鼓疾

枳殼 去穰四兩

右分作四分每分一兩一分用剉散碎蒼朮一兩同

炒一分用蘿蔔子一合同炒一分用乾漆一兩同炒



一分用茴香一兩同炒各以枳殼黃為度只取枳殼一味為末却將蒼朮等四味用水二碗煮至一碗半去滓取汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後米飲下

氣針圓專治氣膨

全蝎 去毒并足

木香

丁香 不見火

胡椒

肉豆蔻 煨各一兩

片子薑黃

青皮 去白各二兩

右為末用蘿蔔子炒淨退殼取仁四兩爛研和藥令

欽定四庫全書

世醫得效方卷六

勻紅酒生薑汁各少許煮糊丸如梧子大每服四五

十圓紫蘇陳皮湯下不以時候

丁沉透膈湯治氣滿不食腹中膨脹刺痛

方見脾胃類

導氣圓治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便結秘等証

又腎氣小腸氣等功効尤速

青皮

水蛭等分同炒赤去水蛭

蓬莪朮

蜜虫等分同炒去蜜虫

胡椒

茴香炒三稜去乾漆炒

茺蔚

牽牛炒去牽牛

赤芍

川椒炒石菖蒲去桃仁炒

檳榔 斑貓炒去斑貓乾薑去礪砂炒 附子 青鹽炒去鹽 右各剉碎與所註藥炒熟去水蛭等不用祇以青皮等十味為末酒糊丸如梧子大每服五十丸加至七十圓空心紫蘇湯吞下

熨法治腹脹緊如鼓澁如木皮樣

杜烏藥

荊芥

蒼朮

茵草

山茵陳

夏蚕沙

松毛

樟根葉

北蒜

螃蚬葉

橘葉

椒目

欽定四庫全書

世醫得效方卷六

烏豆

赤豆

葛 各等分

右剉細分作二次炒熟以布袋盛熨腫處冷又炒熨三四十度或後用煎水熏洗或服神保圓微瀉泄去其氣

敷藥治腹緊硬如石或陰囊腫大先用熱水嚼甘草後

用

大戟

芫花

甘遂

海藻 各等分

右為末醋調塗或用白麪和藥調一片覆肚上



通治沉香飲治腹脹氣喘坐卧不得

沉香

木香

枳殼

各半兩

蘿蔔子

炒

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎七分溫服

檳榔治脾虛腹脹不進飲食快氣寬中

蘿蔔子

炒

檳榔

煨

黑牽牛

炒

木香

各半兩

右末水煮麪糊圓梧桐子大每服三十圓薑湯食前

下

灸法脹滿水腫灸法踰隨年壯穴在第十一椎下兩傍

欽定四庫全書



世醫得效方
卷六

各去一寸半

胸滿心腹積聚痞痛灸肝腧百壯穴在第九椎下兩

傍各去一寸半

腹脹滿繞臍結痛堅不能食灸中守穴百壯在臍上

一寸一名水分

胸滿癥聚滯下冷疼灸氣海十壯穴在臍下一寸五

分

腸中膨脹不消灸大腸腧四十九壯穴在第十六椎



迪志文化出版有限公司出版

下兩傍各一寸半

腸中雷鳴相逐痢下灸承滿五十壯穴在俠巨闕相

去五寸巨闕在心下一寸灸之者俠巨闕兩邊各二

寸半五臟六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來

小便利羸瘦少氣灸三焦腧隨年壯穴在十三椎

下兩傍各一寸半

欽定四庫全書



世醫得效方
卷六

世醫得效方卷六



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

世醫得效方卷七

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

消渴

肺癆澄源丹治氣實血虛熱在上焦心煩燥渴引飲無度小便數晝夜一二十行有麩片形者此疾多得之飲啖炙煇日就羸瘦咽喉唇口焦燥吸吸少氣不能多語

欽定四庫全書

世醫得效方卷七

兩脚瘦食倍於常不為氣力

牡礪粉 苦參 蜜陀僧 知母

水銀 以白蠟半錢結 栝樓根 一兩 黃丹 一兩與水銀沙同研

右為末男子用雌猪肚一箇女人用雄猪肚一箇入藥在內以線縫定用繩縛在新磚上別用生栝樓半斤切碎同煮早晨至午時取藥出不用栝樓根只爛研猪肚和藥為圓如梧桐子大每服三十粒食前米湯下日三服十日可去病根

真味圓治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲過多致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

知母 一分 川連 一兩去毛 苦參 玄參 各一兩

鐵屑粉 一分 牡礪 一分 朱砂 另研

麥門冬 去心 天花粉 各半 金箔 銀箔 二百片

白扁豆 煮去皮

右為末煉蜜入生栝樓根汁少許圓如梧子大用金銀箔為衣每服二十圓至三十圓先用栝樓根汁下

欽定四庫全書

世醫得效方卷七

一服次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙煇酒色

次投茯苓圓補之

茯苓圓

茯苓 酒浸 磁石 煨碎 熟地黄 洗 山茱萸 去核

黃耆 去蘆鹽湯浸 澤瀉 鹿茸 去毛切 遠志 去心姜汁炒

石斛 覆盆子 五味子 去梗 葶藶

破故紙 炒 巴戟 酒浸 兔絲子 酒浸 龍骨

杜仲 去皮剉姜汁拌炒斷絲各半兩 附子 炮去皮臍一箇重八錢



右為末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓空腹米飲下
生地黄膏治渴證通用

生地黄 揀如常碗大一把

冬蜜 一碗

人參 半兩

白茯苓 去皮一兩

右將地黄洗切研細以新水一碗調開同蜜煎至半
次入參苓末拌和磁器密收匙挑服

脾瘕之證飲食入腹如湯澆雪隨小便而出落於溷僻
溝渠中皆旋結如白脂肌膚日益消瘦用熱藥則熱愈

欽定四庫全書

世醫得效方
卷七

甚用涼藥則愈見虛羸不能起止精神恍惚口舌焦乾
或陽強興盛不交而泄其斃不久無治法姑錄一二方
聊為備用

薑粉散治消中多因外傷瘴熱內積憂思喜啖鹹食及
麵致脾胃乾燥飲食倍常不為肌膚大便反堅小便無
度

生薑 研汁 輕粉

右搜勻每服二錢匕長流水調下齒浮是效次投附

子猪肚圓補

附子猪肚圓

附子 炮去皮臍

檳榔 焙各一兩 鱉甲 醋煮七錢半 當歸

知母

木香 川楝子 去核 秦艽 去苗土炒

大黃 酒蒸

龍膽草 白芍藥 破故紙 酒浸炒

枳殼 麸炒去穰各半兩

右為末分作三分將二分入猪肚內縫定用蜜酒三
升童子小便五升同入砂鉢內熬乾爛研細入一分

欽定四庫全書

世醫得效方
卷七

末同搜搗為圓梧桐子大每服五十圓溫酒米湯任
下

白朮散治消中消穀善饑

人參 去蘆

白朮 去蘆 白茯苓 甘草 炙

藿香葉 去土各一兩

白乾葛 二兩 木香 半兩

加北五味 去梗 柴胡 去毛

枳殼 去穰各半兩

右剉散每服三錢新水煎去滓不拘時候

茯神圓治消中煩熱消穀小便數



人參 去蘆	茯神 去木	生乾地黄 去土	黃連 淨
麥門冬 去心	枳殼 去穰	牡蠣粉 各一兩	蓮肉 去心
黃耆 去蘆	知母 去毛各半兩	瓜根 七錢半	
右為末煉蜜和搗三伯杵圓如梧桐子大每服五十圓清粥飲下			
腎疝加減八味圓治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能既濟煎熬而生心煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌膚漸漸如削或腿腫脚先瘦小宜降心火生			
腎水其煩渴煩止			
熟地黄 大者洗焙乾切片酒	真山藥 微		
山茱萸 去核取肉焙	肉桂 去麋皮不見		
澤瀉 水洗切酒	牡丹皮 去骨		
白茯苓 去皮為末飛	真北五味 畧炒別為		
右為末煉蜜圓梧桐子大五更初未言語時溫酒鹽湯下三五十圓午前及晚間空腹再服此方用真北五味子最為得力服此不惟止渴亦免生癰疽久服			

欽定四庫全書

世醫得效方
卷七



迪志文化出版有限公司出版

永除渴疾氣血加壯	天王補心丹寧心保神益血固精壯力強志令人不忘	清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口燥育養心氣	熟地黄 洗	人參 去蘆	白茯苓 去皮	遠志 去心	石菖蒲 去毛	黑參	柏子仁	桔梗 去蘆	天門冬 去心	丹參 洗	酸棗仁 去骨	甘草 炙	麥門冬 去心	百部 洗	杜仲 薑汁炒	茯神 去木	當歸 去尾	五味子 去枝梗	右為末煉蜜圓每一兩作十圓金箔為衣每服一圓	燈心棗湯化下食後臨卧服作梧子大圓吞服亦可	鹿茸圓治失志傷腎腎虛消渴小便無度	鹿茸 去毛切酒浸	麥門冬 去心	熟地黄 洗	黃耆 去蘆	雞肫脰 麩炒	茯苓 酒浸	山茱萸 去核	破故紙 炒	川牛膝 酒浸	五味子 各三	白茯苓 去皮	地骨皮 去骨	人參 去蘆	右為末蜜圓如梧子大每服三十圓至五十圓米湯下

欽定四庫全書

世醫得效方
卷七



迪志文化出版有限公司出版

雙補圓治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠 二兩 沉香 半兩 澤瀉 截塊酒 蒸半兩 覆盆子

白茯苓 去皮 人參 去蘆 宣木瓜 薏苡仁 炒

黃耆 炙 熟地黃 洗酒 蒸 茯苓 酒浸 兔絲子 酒浸 蒸焙

五味子 石斛 炒 當歸 去尾酒浸 焙各一兩

生麝 一錢 別研

右為末煉蜜圓梧桐子大朱砂為衣每服五十圓空

心棗湯送下

欽定四庫全書 世醫得效方 卷七

丹石毒瓜萆散治盛壯之時不自謹惜恣情縱慾年長

腎氣虛弱惟不能房多服丹石真氣既盡石氣孤立唇

口乾焦精液自洩小便赤黃大便乾實小便晝夜百十

行須當除熱補虛

白茯苓 去皮 天花粉 宣連 白扁豆

人參 去蘆 石膏 甘草節 寒水石

白朮 去蘆 猪苓 各等分

右為末每服二錢熱湯調服立效

石膏薺芩湯治強中多因耽嗜色慾及快意飲食或服丹石真氣既脫藥氣陰發致煩渴引水飲食倍常陰氣常興不交精出故中焦虛熱注於下焦三消之中最為難治

薺芩 石膏 各三兩 人參 去蘆 茯苓 去木

栝樓根 磁石 煨淬 知母 去毛 乾葛

黃芩 去心 甘草 各二兩

右剉散每服用水三盞腰子一箇去脂膜黑豆一合

欽定四庫全書 世醫得效方 卷七

煮至一盞半去腰子黑豆入藥四錢煎至七分去滓

食后服下焦熱則夜間服渴止勿服次投補藥

黃連猪肚圓治強中消渴服瓜萆散薺芩湯後便可服

此亦能補養

猪肚 一枚治 黃連 去蘆 小麥 炒各 五兩 天花粉

茯苓 去木各 麥門冬 去心 二兩

右五味為末內猪肚中縫塞安甑中蒸之極爛木白

小杵可圓如梧桐子大每服七十圓米飲送下隨意



服之如不能圓入少煉蜜

嬰粟湯治腎渴解五石毒

嬰粟子

右煑稀粥入蜜飲之

加減三黃圓治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用

春 黃芩 四兩 大黃 三兩 黃連 四兩

夏 黃芩 六兩 大黃 一兩 黃連 七兩

秋 黃芩 六兩 大黃 二兩 黃連 三兩

欽定四庫全書
世醫得效方
卷七

冬 黃芩 三兩 大黃 四兩 黃連 二兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服十圓服一月病愈

甘草烏梅木瓜湯治飲酒多發積為酷熱熏蒸五臟津

液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿

木瓜乾 烏梅 打破不
去仁 麥蘖 炒 甘草

草果 去皮各
半兩

右剉散每服四錢水盞半生薑五片煎七分不拘時服

枳椇子圓治同上

枳椇子 二兩 麝香 一錢

右為末麪糊圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯吞下

三神湯治同上

烏梅肉 遠志 去心甘草水煑過卻
以薑汁拌炒各一兩 枳實 去穰
一兩

夏加黃連五錢春秋冬不用

右剉散每服四錢水兩盞糯禾根一握煎七分去滓

不拘時溫服若無糯禾根白茅根亦可如無白茅根

禾稈繩代之亦可

欽定四庫全書
世醫得效方
卷七

龍鳳圓治同上

鹿茸 火燎去毛
兩酒浸炙 山藥 兔絲子 酒浸炒
各二兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓食前米飲下

濃煎人參湯亦可

薑連圓治消渴小便滑如油頻數者

黃連 去須 瓜蒌 連穰各
等分

右為末生地黃自然汁圓如梧子大每服五十圓食

後牛乳汁下酪湯下一日二服忌冷水猪肉或研麥



門冬自然汁為圓熟水吞下		朱砂黃連圓治心虛蘊執或因飲酒過多發為消渴	
朱砂	一兩 別研	宣連	三兩
生地黃	二兩	右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓燈心棗湯吞下	
酒蒸黃連圓治膈熱解酒毒止渴厚腸胃		方見下	
通治玄兔丹治三消渴利神藥常服禁精止白濁延年		免絲子	
酒浸	通軟	焙乾	末十兩
白茯苓	去皮	乾蓮肉	各三兩
五味子	去梗	酒浸	秤七兩
右為末別研山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊		為圓如梧子大每服五十圓天花粉北五味子煎湯	
下溫酒鹽湯亦可脚膝無力木瓜湯下		清心蓮子飲治心中蓄熱時常煩燥因而思慮勞力憂	
愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澀痛		便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎上肺金受	
尅口舌乾燥漸成消渴睡卧不安四肢倦怠男子五淋		婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽浮於外五心煩熱	

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七



迪志文化出版有限公司出版

藥性溫平不冷不熱常服清心養神秘精補虛滋潤腸		胃調順血氣	
黃芩	去心 半兩	黃耆	去蘆 蜜炙
石蓮肉	去心	白茯苓	去皮
人參	去蘆 各七錢	麥門冬	去心
甘草		地骨皮	去骨
車前子	去沙土 五錢	右剉散每服三錢麥門冬十粒去心水一盞半煎取	
八分去滓水中沉冷空腹服發熱加柴胡薄荷煎		六神湯治三消渴疾	
蓮房		乾葛	
枇杷葉	去毛	甘草	炙
栝樓根	綿黃耆	去蘆	蜜炙
右剉散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服小便不利加赤茯苓		子童桑白皮湯治三消渴病或飲多利少或不飲自利	
肌膚瘦削四肢倦怠常服補虛止渴利		童根桑白皮	
即未多時裁者去	乾皮曬乾不焙	白茯苓	去皮
人參	去蘆	麥門冬	去心
乾葛		乾山藥	

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七



迪志文化出版有限公司出版

桂心	去麤皮 各一兩 甘草半兩 生用
右剉散水一盞半煎至七分去滓溫服	
梅花湯治三消渴利神效	
糯谷	旋炒作爆
桑根白皮	厚者切 細等分
右每用秤一兩許水一大椀煮取半椀渴則飲不拘時	
文蛤散治渴欲飲水不止	
文蛤	即五倍子 最能回津
右為末以水飲任調方寸匕不拘時服	
欽定四庫全書	世醫得效方 卷七
羊乳丸治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱脚虛弱	
滿而渴者	
宣連	去鬚不拘 多少為末
生栝樓根汁	
生地黄取汁	羊乳無羊乳牛乳 人乳亦得
右以三汁搜和為丸如梧子大每服三五十丸米飲	
下一法濃煮小麥飲下	
益元散白虎湯去桂五苓散合和大治消渴	方見中暑傷 寒傷暑類
生地黄飲子治消渴咽乾面赤煩燥	

人參	去蘆
生乾地黄	洗
熟乾地黄	洗
黃耆	蜜炙
天門冬	去心
麥門冬	去心
枳殼	去穰 麸炒
石斛	去根 炒
枇杷葉	去毛
澤瀉	
甘草	炙各 等分
右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓食後臨卧	
溫服此方乃全用二黃丸甘露飲料生精補血潤燥	
止渴佐以澤瀉枳殼疎導二腑使心火下行則小腑	
清利肺經潤澤則大腑流暢宿熱既消其渴自止造	
化精深妙無踰此	
欽定四庫全書	世醫得效方 卷七
栝樓粉治大渴	
右深掘大栝樓根削去麤皮寸切以水浸一日夜一	
易浸五日取出爛研細綃絞汁如作粉法乾之水服	
方寸一日三四服入牛乳一合服尤好	
降心湯治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消	
人參	去蘆
遠志	去骨以甘草水煮過 去甘草姜汁拌炒乾
當歸	去尾
熟地黄	洗去 土蒸
白茯苓	去皮
黃耆	去蘆 蜜炙
北五味子	去 梗
甘草	微炙各 半兩
天花粉	一兩



右剉散每服三錢水一盞半棗一枚煎食前服

蠟苓丸補虛治濁止渴潤腸婦人血海冷白帶白淫白濁

黃蠟

雪白茯苓
去皮各四兩

右茯苓為末溶蠟和圓彈子大每服一圓不饑飽細

嚼下棗湯亦可

辰砂妙香散治渴證小便澁數而瀝兼有油濁用燈心

茯苓煎湯下
方見心恙類

神效散治渴疾飲水不止

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

白浮石

蛤粉

蟬殼

右為末用鯽魚膽七箇調七錢服不拘時候神效

三瘡圓治消渴骨蒸

宣連去鬚為末不以多少剉冬瓜肉研柵自然汁和

成餅子陰乾再為末再用汁浸和如是七次即用冬

瓜汁為圓如梧桐子大每服三四十圓以冬瓜汁煎

大麥仁湯送下尋常渴止一服

浮萍圓治消渴虛熱者大佳

乾浮萍

栝樓根

等分

右為末以人乳汁和圓每服二十圓空腹米飲下日

三服三年病者三日可又白芷末水調服止

又方

鉛丹
二兩

附子
一兩

乾葛

栝樓根
各三兩

右為末煉蜜圓每服十圓米飲下日三服渴則服之

治日飲水至一石者春夏去附子

白朮散治胃虛發渴

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

白朮
一兩

人參
去蘆

白茯苓

甘草
各半兩

右為末每服七錢水一盞半煎至七分服凡渴之後

多有腫疾仍預服復元丹數服

參耆湯治消渴

人參
去蘆

桔梗
去蘆

天花粉

甘草
各一兩

綿黃耆
鹽湯浸炙

白芍藥
各二兩

白茯苓
去皮

北五味
各半兩

右剉散每服四大錢水盞半煎八分日進四服合滓煎

雞蘊圓治病後虛羸發渴



右雞蘓圓以北五味煎湯吞下仍服安腎圓
方見失血虛損類

蜜陀僧
二兩別研極細

川黃連
一兩為細末

右用蒸餅圓如梧子大每服五圓煎蠶空茄根湯下
臨卧服次日加至五十圓以後每日五圓至三十圓
止服藥後以見水惡心為度即住服不過五六服必
效若覺惡心但每日食乾物壓之旬日後自定奇甚
奇甚蠶空是出蠶蛾子空蠶殼

欽定四庫全書
世醫得效方
卷七

忍冬圓治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草
不以多少根莖花朶皆可用一名老翁鬚一名蜜啜花一名金銀花以洗淨用之

右以米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入
甘草少許為末即以所浸酒為糊圓如梧子大每服
五十圓至百圓酒飲任下不拘時候此藥不特治癰
亦能止渴並五痔諸漏

牡蠣散治不渴而小便失利以牡蠣末取患人小便煎服
單方治渴



糯稻稈灰取中一尺燒淋汁飲或不燒便煎服亦妙
或生牛乳細呷或生蘿蔔搗取汁時飲少許

蠶絲湯治渴神效

煮蠶繅絲湯任意飲之頗效如非時以絲或綿煎湯服
熬蟲方治消渴有蟲

苦楝根取新白皮一握切焙入麝少許水二椀煎至
一椀空心飲之雖困頓不妨自後下虫三四條狀如
蛭虫其色真紅而渴頓止乃知消渴一證有蟲耗其

欽定四庫全書
世醫得效方
卷七

津液

凡消渴大忌飲酒房事食油麵煎炙糟藏鹹物及一切
熱物百日以上不可鍼灸鍼灸則生瘡膿或成癰疽
膿水不止則死

漩濁

心濁瑞蓮圓治思慮傷心便下赤濁

白茯苓
去皮 石蓮肉
炒去心 龍骨
生用 天門冬
洗去心

遠志
洗去心 柏子仁
炒別研 紫石英
火煨七次研令極細



當歸 去蘆酒浸	酸棗仁 炒去殼	龍齒 已上一兩	乳香 半兩別研
右為末煉蜜圓梧桐子大朱砂為衣每服七十丸空			
心溫酒棗湯任下			
加味清心飲治心中客熱煩躁赤濁肥脂			
石蓮肉	白茯苓 各一兩	益智仁	麥門冬
遠志 水浸取肉薑製炒	人參 各半兩	石菖蒲	
車前子	白朮	澤瀉	甘草 微炙各二分
右剉散每服三錢燈心二十莖煎服有熱加薄荷少許			
寧志膏治心臟虧虛神志不守恐怖赤濁常多恍惚易			
於健忘睡卧不寧夢涉危險一切心疾並皆治之			
人參 去蘆	酸棗仁 微炒去皮各一兩		
辰砂 研細水飛半兩	乳香 七分以乳鉢坐水盆中研		
右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓溫酒化下棗湯			
亦可空心臨卧服			
十四友圓補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不寧精			
神昏倦睡卧不安赤白濁甚			

柏子仁 別研	遠志 去心	酸棗仁 炒去殼	紫石英 明亮者
熟乾地黄 洗	川當歸 洗淨去尾蘆	白茯苓 去皮	
茯神 去皮	人參 去蘆	黃耆 蜜炙去蘆	阿膠 蚌粉炒
肉桂 不見火已上各一兩	龍齒 半兩	辰砂 半兩別研	
右為末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓棗湯食後			
臨卧吞服			
香苓散治男子婦人小便赤濁諸藥不效者			
五苓散	辰砂妙香散		
欽定四庫全書 世醫得效方 卷七			
右和勻用天門冬麥門冬去心煎湯空心調服一大			
錢一日三服當頓愈			
桑螵蛸散治小便日數十次如稠米泔色心神恍惚			
悴食減以女勞得之服此不終劑而愈乃主安神魂定			
心志			
菖蒲 鹽炒	龍骨	人參 去蘆	茯神 去木
當歸 去尾	鱉甲 醋炙		
右等分為末每服二錢夜卧人參湯調服			



蠟苓圓治同上 方見消渴類		遠志圓治小便赤濁如神		遠志 去心用甘草 薑半斤		茯神 去木		益智仁 各二兩		右為末酒糊圓每服五十圓臨卧棗湯下		心腎圓治水火不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺		牛膝 去苗酒浸		熟地黃 洗蒸		茯苓 酒浸各二兩		鹿茸 火去毛酒潤炙		附子 炮去皮臍		五味子 去枝		人參 去蘆		黃耆 蜜炙去蘆		遠志 去心甘草水 薑汁炒		白茯神 去木		山藥 炒		當歸 去蘆尾酒浸		龍骨 煨各一兩		兔絲子 酒浸研成餅三兩		右為末浸藥酒煮糊圓如梧子大每服七十圓棗湯下		腎濁秘精圓治元氣不固遺精夢泄		大附子 炮去皮濟		龍骨 煨通赤		肉苁蓉 酒浸一夕		牛膝 酒浸一宿焙		巴戟 去心各一兩		右末煉蜜圓如梧子大每服三十圓鹽酒鹽湯空心下		震靈丹治腎經虛憊漏濁不止用二陳湯加白茯苓煎	

湯送下 方見泄瀉類		鎖精圓治小便白濁		破故紙 炒		青鹽 各四兩		白茯苓		五倍子 各二兩		右為末酒糊圓空心三十圓鹽湯酒任意下		芡實圓治勞傷心腎水火不交漩白如油光彩不定漩		脚盛下凝如膏糊頻數無度又治遺泄不禁之疾 方見虛損類		固精圓治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂腰重少力		牡礪 煨		兔絲子 酒蒸焙乾		韭子 炒		龍骨		五味子		白茯苓 去皮		桑螵蛸 酒浸炙		白石脂 各等分		右為末酒糊圓如梧子大每服七十圓空心鹽湯送下		地黃圓治心腎水火不濟或因酒色遂至已甚謂之土淫盖脾有虛熱而腎不足故土邪干水先賢常言夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚此方中和補瀉兼之水火既濟而土自堅其流清矣	



熟地黄 九蒸十兩 兔絲子 洗酒浸蒸 鹿角霜 各五兩 茯苓	
柏子仁 各三兩 附子 一兩	
右為末鹿角膠煑糊圓如梧子大每服百十圓鹽酒下	
四精圓治濁渴	
鹿茸 肉蓯蓉 山藥 茯苓 各等分	
右為末米糊圓如梧子大每服三十圓棗湯下 或加沉香	
香木	
蒜圓治濁	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷七	
杜仲 川烏 破故紙 人參	
巴戟 各等分	
右為末蒜膏圓如梧子大每服三十圓鹽湯溫酒任下	
入藥靈砂圓治諸虛白濁耳鳴大效	
當歸 酒洗 鹿茸 去毛鹽炙 黃耆 鹽水炙 沉香 鎊	
北五味 炒 遠志肉 酸棗仁 炒 吳茱萸 去枝	
茴香 炒 破故紙 炒 牡蠣 煨 熟地黄 蒸	
人參 去蘆 龍骨 煨 附子 炮 巴戟 各一兩淨	

靈砂 二兩研	
右各煨製如法為末酒糊圓每服五十粒至七十粒	
空心溫酒鹽湯任下	
小兒絲子圓治腎氣虛損五勞七傷小腹拘急四肢酸疼面色鰲黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷七	
傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目	
石蓮肉 二兩 兔絲子 酒浸焙研為末五兩 白茯苓 焙一兩	
山藥 二兩七錢半打糊	
右為末山藥糊搜和為圓如梧子大每服五十圓空心溫酒或鹽湯下如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服	
四五湯治小兒白濁	
生料四君子湯 生料五積散	
右和勻每服二錢燈心一握水一盞煎服 方見脾胃傷暑類	



安腎圓白圓子山藥圓治虛勞羸瘦浮膩白濁三藥夾和每服七十圓食前煎雙和湯下 方見虛損風科通治類	茯苓蒼朮難名丹治元陽氣衰脾精不禁漏濁淋瀝腰痛力疲	蒼朮 杵去麤皮半斤米泔浸一日夜焙乾用	川練子 蒸去皮取肉焙乾各一兩半	白茯苓 龍骨別研各一兩	右為末酒麪糊圓梧桐子大朱砂為衣每服五十圓	空心縮砂煎湯下粳米湯亦可	七情四七湯治小便渾濁生薑煎吞青州白圓子 方見喘急類	芡實圓治思慮傷心小便赤澁遺精白濁 方見虛損類	通治還少丹治心腎俱虛漏精白濁	山藥 炮	牛膝 酒浸焙去苗	白茯苓 山茱萸去核洗	船上茴香 炒各一兩半	免絲子 酒浸續斷去蘆各一兩	右為末煉蜜圓如梧子大每服三十圓鹽湯下	分清飲通心氣補漏精治小便餘瀝並赤白濁

益智 川草薢 石菖蒲 鹽炒	右等分剉散入鹽少許煎空心服	蠟苓圓治赤白濁 方見消渴類	玉鎖固真丹治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固漩有遺瀝小便經歲白濁或淡赤或如膏夢寐精泄甚則身體拘倦骨節酸疼飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇口乾燥虛煩盜汗舉動力乏多服取效	白龍骨 半斤磁石醋淬七次	朱砂 各一兩	牡蠣 煨一兩	紫梢花 半兩	家韭子 兔絲子各二兩半	鹿茸 酒浸炙	肉蓯蓉 酒浸炙	白茯苓 川巴戟	官桂 當歸去尾	桑螵蛸 酒浸炙	遠志 甘草水煮取皮薑汁炒	蒼朮 切酒炒	桑寄生 真者沉香不見火	木香 不見火	黃耆 去蘆	綿附子 熟炮已上各一兩	右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒鹽湯任下	小溫金散治心虛泛熱或觸冒暑熱漩下或赤或白或



淋瀝不行時發煩鬱自汗

人參 去蘆

石蓮肉 去心

川巴戟 去心

益智仁 去殼

黃耆 去蘆

萆薢 切酒浸炒

麥門冬 去心

赤茯苓 去皮

甘草 各等分

右為散每服三錢水一盞半燈心二十莖紅棗二枚

煎食前溫服以後藥相兼

子午圓治心腎俱虛夢寐驚悸體常自汗煩悶短氣悲

憂不樂消渴引飲漩下赤白停疑濁甚四體無力眼昏

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

形容瘦悴耳鳴頭暈惡風怯冷

榧子 去殼

蓮肉 去心

枸杞子

白龍骨

川巴戟 去心

破故紙 炒

真琥珀 另研

芡實

苦櫛實 去殼

白礬 枯

赤茯苓 去皮

白茯苓 去皮

文蛤

蓮花鬚 鹽蒸

白牡蠣 煅各一兩

右為末酒蒸肉蓯蓉一斤二兩爛研為圓梧桐子大

朱砂一兩半重細研為圓濃煎萆薢湯空心吞下忌

勞力房事專心服餌渴止濁清自有奇效

漩多

丹方五子圓治小便夜多脚弱老人虛人多有此證令

人卒死大能耗人精液頭昏

兔絲子 酒蒸

家韭子 畧炒

益智子 去皮

茴香子 炒

蛇床子 去皮

殼炒

右等分為末酒糊圓如梧子大每服五七十圓糯米

飲鹽湯任下

又方治夜多小便

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

右取純糯米糍一片臨卧炙令軟熟啖之仍以溫酒

下不飲酒湯下多啖愈佳行坐良久待心間空便睡

一夜十餘行者當夜便止

又方

右用茴香不以多少淘淨入少鹽炒為末如前炙糯

米糍蘸喫或用豬胞盛以糯米煮爛或入椒鹽少

許同煮去糯米只用胞切片蘸藥或更飲好酒半杯

臨晚臨卧各一服尤妙



兔絲子圓治小便多或不禁

兔絲子

酒蒸二兩

桑螵蛸

酒炙半兩

牡蠣

煨取粉一兩

肉苁蓉

酒潤二兩

附子

炮去皮臍

五味子

各一兩

雞胫

半兩

鹿茸

酒炙一兩

右為末酒糊圓如梧子大每服七十圓食前鹽酒任

下一方加巴戟去心破故紙微炒赤石脂煨革薺各

一兩

橘皮煎圓治小便利數每服三十圓溫酒鹽湯下

方見虛損類

革薺圓治小便頻數日夜無時

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

右用川革薺洗不拘多少為末酒糊圓如梧子大每

服七十圓空心食前鹽酒鹽湯任下

縮泉圓治脬氣不足小便頻數

天台烏藥

益智仁

各等分

右為末酒煮山藥末糊圓如梧子大每服七十圓臨

卧鹽酒吞下

遺溺

家韭子圓治沙長道溺及男子虛劇陽氣衰敗小便白



迪志文化出版有限公司出版

濁夜夢泄精此藥補養元氣進美飲食

家韭子

六兩

鹿茸

四兩

苁蓉

酒浸

牛膝

酒浸

熟地黃

各二兩

當歸

各二兩

兔絲子

酒浸

巴戟

去心各一兩

杜仲

炒

石斛

去苗

桂心

各一兩

乾薑

各一兩

右為末酒糊圓梧桐子大每服五十圓加至百圓空

心食前鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟

受陽氣不足故也別作一樣小圓服

雞內金散治溺床失禁

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

右以雞胫脰一具並腸淨洗燒為灰男用雌女用雄

者研細每服方寸匕酒飲調服

又方用猪胞洗淨鍤鏟上炙香熟嚼細溫酒下

固元丹治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨

三兩

訶子

十箇

縮砂

一兩

去皮

右為末糯米粥圓梧桐子大每服五十圓空心鹽酒下

桑螵蛸散治小便日數十次如稠米泔色心神恍惚瘦

悴食減以女勞得之



迪志文化出版有限公司出版

桑螵蛸	鹽水炙	遠志	去心	菖蒲	鹽炒	龍骨
人參		茯神		當歸		鱉甲
						醋炙
右各等分為末每服二錢夜卧人參湯調下						
補脬飲治婦人產後傷動胞破終日不能小便但漏濕不乾						
黃絲絹	生者一尺剪碎	白牡丹根皮末	千葉者			
白芨末	一錢					
右用水一椀煎至絹爛如錫空心頓服服時不得作聲作聲不效						
欽定四庫全書						
世醫得效方						
卷七						
遺精						
桑螵蛸圓治下焦虛冷精滑不固遺瀝不斷						
附子	去皮尖	五味子		龍骨	各半兩	桑螵蛸
						七箇切炒
右為末純糯米糊圓每服三十圓空心鹽酒吞下						
仙方固真丹專治精洩不禁						
禹餘糧	石中黃	赤石脂	紫石英			
石燕子	五件各一兩炭火煨通紅米醋三升淬乾為度					

右以白茯苓四兩人參二兩青鹽一兩同為末入無灰酒約量多少打糊拌和衆藥為圓以朱砂為衣如小指頭大每服二圓至三圓溫酒或鹽湯下空心臨卧服	
固陽丹治脫精泄不禁	
桑螵蛸	三兩瓦焙燥
龍骨	別研
白茯苓	各一兩
右末糊圓如梧子大每服七十圓煎茯苓鹽湯食前服辰砂妙香散治夢中遺精每服一匕虛者溫酒調熱者麥門冬去心濃煎湯調方見心恙類	
欽定四庫全書	
世醫得效方	
卷七	
三仙圓治夢泄	
益智仁	二兩用鹽二兩炒去鹽
烏藥	一兩半炒
右為末用山藥一兩為糊圓如梧子大每服五十圓空心臨卧鹽湯下以朱砂為衣凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒或熱用補澁之藥不效其脈浮軟而散蓋非虛也亦非房室過度此無他因有所覩心有所慕意有所樂慾想方興不遂所欲而致斯疾既以	



藥補且固不效將何治之緣心有愛則神不歸意有
想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心安次調其脾
脾氣和則志自定心腎交媾精神內守其病自愈其
法用人參三錢當歸一錢洗焙為末作三服糯米飲
調下服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎三錢人
參一錢焙為末作三服沸湯調服頭眩遂差精不禁
者用白芍藥半兩丁香三錢木香三錢剉散每服用
生薑五片棗二枚煎空心服即心安神定精固神悅

欽定四庫全書

世醫得效方
卷七

清心圓治經絡熱而夢泄心忪恍惚

大柏皮 一兩
去柏皮

右為末入腦子一錢同研煉蜜圓如梧子大每服十
五圓至十九圓濃煎去心麥門冬湯下

猪苓圓治年壯氣盛情慾動中所願不得意淫於外致
夢遺白濁

半夏 一兩
猪苓 二兩

右用半夏剉如豆大用猪苓為末先將一半炒半夏



迪志文化出版有限公司出版

黃色不令焦地上出火毒半日取半夏為末糊圓如
梧子大候乾更用猪苓末炒微裂入不油沙瓶中養
之每服四十圓空心溫酒鹽湯送下如常服於申未
間冷酒下

理脾圓治遺泄尋常只治心腎緣脾虛亦有此疾

厚朴 去粗皮切生薑
自然汁拌炒

羊脛炭 又名火炭火蝦通
紅別研如粉一兩

右為末水麵糊為圓如梧子大每服百十圓米湯下

失血

欽定四庫全書
世醫得效方
卷七

風證桂枝栝樓根湯治傷風汗下不解鬱于經絡隨氣
湧泄衄出清血或清道閉流入胃管出清血遇寒咳之
色必瘀黑者

桂心
白芍藥
甘草
川芎

栝樓根

右等分剉散每服四大錢水一盞半薑三片棗一枚
煎服頭痛加石膏

胃風湯治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄



迪志文化出版有限公司出版

瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度
方見
泄瀉類

寒證麻黃升麻湯治傷寒發熱解利不行血隨氣壅世

謂失汗者

麻黃 去節

升麻 一分

黃芩

芍藥

甘草

石膏 煨

茯苓 各一兩

右剉散每服四大錢水一盞生薑三片煎熱服微汗解

犀角地黃湯治傷寒及濕病應發汗而不汗內蓄為瘀

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

血及鼻衄吐血不盡餘血停留致面黃大便黑

犀角 一兩

生地黃 八兩

芍藥 三兩

牡丹皮 二兩

右挫散水煎狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脈大

來遲腹不滿自言滿為無熱不須加也

小柴胡湯治同上

方見傷寒

暑證五苓散治伏暑飲熱暑氣流入經絡壅滯發衄或

胃氣虛血滲入胃停留不散吐出一二升許治衄則以

茅花煎湯調下屢用得效

枇杷葉散治同上
方並見傷暑類

濕證除濕湯治冒雨著濕鬱于經絡血溢作衄或脾不

和濕著經絡流入胃吐血

茯苓

乾薑 各二兩

甘草 炙

白朮 各一兩

右剉散每服四大錢水煎服頭疼加川芎二錢最止

浴室發衄

七情木香勻氣散治氣逆嘔血衄血用側柏葉白茅花

煎湯下
方見諸氣類

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

蘊合香圓治因氣作衄或吐嘔血濃煎白茅花湯化
方類中

氣衄散治氣鬱發衄無比神方

黃耆 六錢

赤茯苓

白芍藥 各三錢

當歸

生乾地黃 阿膠 炙各三錢

右為末煎黃耆湯調下為剉散煎亦可

歸脾湯治思慮傷脾心多健忘為脾不能統攝心血以

致妄行或吐血下血

白朮

茯苓

黃耆

酸棗仁 炒去殼



龍眼肉 各一兩 人參 木香 各半兩 甘草 二錢半	右剉散每服水一盞薑五片棗一枚煎不拘時候溫服	天門冬湯治思慮傷心吐衄不止	遠志 去心甘 白芍藥 天門冬 去心 藕節	麥門冬 去心 黃耆 去蘆 阿膠 蚌粉炒 沒藥	當歸 去蘆 生地黃 各一兩 人參 甘草 各半兩	右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時服	虛證加味理中湯治飲食過度傷胃不化致嘔吐其色	欽定四庫全書 世醫得效方 卷七	鮮紅或心腹絞痛自汗名曰傷胃嘔血	人參 乾薑 炮 白朮 各一兩 乾葛	甘草 各半兩	右剉散每服三錢水一大盞煎不拘時候溫服去乾	葛加川芎治鼻衄理中脘分利陰陽安定血脈	又方治暴吐血桂末二錢水湯各半盞調猛喫甚者只	兩服效	養榮湯治吐血自汗大效 方見痢冷類

加味四物湯治咯血用毛頭白紙燒灰入麝香煎調二	錢服之如神 方見婦人崩漏類四君子湯二錢加蒲黃藕節灰少許人乳汁調服效	熱證大薊散治飲啖辛熱熱邪傷肺嘔吐出血一合或半升許名曰肺疽	大薊根 洗 犀角 鎔 升麻 桑白皮 炙	蒲黃 炒 杏仁 去皮尖 桔梗 去蘆炒 甘草 半兩	右挫散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時溫服	犀角地黃湯治同上 方見前	欽定四庫全書 世醫得效方 卷七	茜根散治鼻衄終日不止心神煩悶	茜根 黃芩 阿膠 蚌粉炒 側柏葉	生地黃 各一兩 甘草 半兩	右剉散每服四錢水一盞半生薑三片煎不拘時溫服	萬金散治咯血	右用槐花不以多少為末每服二錢食后熱酒調服	龍腦雞蘇圓治肺熱咳嗽鼻衄吐血血崩下血血淋熱	淋勞淋氣淋止渴除驚涼上鬲解酒毒口臭喉腥口甜



口苦		柴胡	二兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞取汁後取膏	麥門冬	去心四兩
黃耆	一兩	阿膠	二兩炒	生乾地黄末	六兩後入膏
蒲黃	二兩	雞蘇	淨葉一斤	甘草	一兩半
木通	剉二兩同柴胡浸	人參	二兩		
右除別研藥後入外為末用好蜜二斤先煉一二沸然後入生乾地黄末不住手攪時時入柴胡木通汁慢慢熬成膏勿令焦同餘藥和為圓如蠶豆大每服二十圓以去心麥門冬煎湯食後臨卧服血崩下血諸淋疾並空心食前服					
三黃圓治肛門腫痛或下鮮血					
黃連	去鬚	黃芩		大黃	各十兩
右為末煉蜜圓如梧子大每服四十圓熱水吞下					
白朮散治積熱吐血咳血若因飲食過度負重傷胃而吐血者最宜服之忌食熱麵煎燂一切發風之物					
白朮	二兩	人參		白茯苓	黃耆
					蜜炙各一兩

欽定四庫全書



世醫得效方卷七



迪志文化出版有限公司出版

山藥	百合	去心三分	甘草	半兩	前胡	去蘆
柴胡	去蘆各一分					
右挫散每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎溫服						
勞傷雞蘇散治勞傷肺經唾內有血咽喉不利						
雞蘇葉	黃耆	去蘆	生地黃	洗	阿膠	蛤粉炒
白茅根	各一兩	桔梗	去蘆	麥門冬	去心	蒲黃
貝母	去心	甘草	各半兩	桑白皮	半兩	
右挫散每服四錢生薑三片水一盞半棗一枚煎溫服						
蓮心散治勞心吐血						
右以蓮子心五十箇糯米五十粒為末酒調服效						
大阿膠圓治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血並勞傷肺胃吐血嘔血並宜服之						
麥門冬	去心半兩	乾山藥	熟乾地黄	五味子	各一兩	
遠志	去心一分	丹參	貝母	炒	防風	去蘆各一兩
阿膠	炒一兩	茯苓	去木	柏子仁	百部根	
杜仲	炒各半兩	茯苓	一兩	人參	一分	

欽定四庫全書



世醫得效方卷七



迪志文化出版有限公司出版

右為末煉蜜圓如彈子大水一盞煎六分滓服
傷損奪命散治金瘡打損及從高墜下木石所壓內損
瘀血心腹疼痛大小便不通氣絕欲死

紅蛭 用石火慢火炒
令焦黃色半兩 大黃 黑牽牛 各二兩

右為末每服三錢熱酒調下如人行四五里再用熱
酒調牽牛末二錢催之須臾轉下惡血塊或片血
盡愈

花蕊石散治一切金瘡打撲傷損猫犬咬傷並於傷處

欽定四庫全書 世醫得效方
卷七

摻傳或內損血入臟腑壅溢作衄及婦人產後敗血不
散

花蕊石 研細
一斤 上色硫黃 研細
四兩

右和勻入藏瓶中以紙筋搗黃泥固濟候乾焙令熟
透以磚盛用白炭一秤頂上發火燒炭盡候冷取出
再研極細諸臟傷及婦人產後瘀血不行並用童子
小便溫酒一二錢匕取瘀血效

雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積

氣絕欲死並久積瘀血煩燥疼痛叫呼不得並以此藥
利去瘀血即愈推陳致新折傷神效

大黃 一兩
酒蒸 杏仁 三七粒
去皮尖

右研細用酒一碗煎至六分捌去滓雞鳴時服次日
取下瘀血即愈若便覺氣絕取藥不及急擘開口以
熱小便灌之

當歸川芎湯治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血或
如豆羹汁

欽定四庫全書 世醫得效方
卷七

川芎 當歸 白芍藥 百合 水浸
半日

荊芥穗 各等分

右剉散每服四錢水一盞酒半盞同煎不拘時服

茯苓補心湯治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五
心煩熱咳嗽唾血及婦人懷娠惡阻嘔吐亦宜服之

白茯苓 去皮 人參 去蘆 前胡 去鬚 半夏

川芎 各三分 陳皮 枳殼 去穰 紫蘇

桔梗 去蘆 甘草 乾葛 各半兩 當歸 一兩
三錢



白芍藥 二兩 熟地黄 酒炒 一兩半

右剉散每服四錢生薑五片棗一枚煎食前服

通治立效散治吐血

側柏葉焙乾如倉卒難乾新瓦焙為末每服三錢米

飲調食後服一方柏葉加赤土拌勻煉蜜為餅子服

單方治鼻衄不止或吐血

蘿蔔搗汁入鹽服一盞立效或蘿蔔汁藕汁滴入鼻

中

欽定四庫全書 世醫得效方 卷七

麝香散治鼻衄不止

白礬 枯 研 白龍骨 粘 舌 者 別 研 各 半 兩

麝香 別 研 半 字

右和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然後吹

藥於鼻中或以濕紙蘸藥於鼻內尤妙

黑神散治大吐血及傷酒食飽低頭掬損吐血至多並

血妄行口鼻中俱出但聲未失無有不效

百草霜 村中燒草 鍋 底 煤 最 妙

不拘多少羅細為末每服一錢糯米飲調下鼻衄搗

一字皮破血出灸瘡出血搽上止並治舌忽然腫破
乾摻

川芎三黃散治實熱衄血

大黃 濕紙 畏 蒸 川芎 黃連 淨 黃芩 等 分

右為末每服二錢食後井水調服

敗毒散加桑白皮麥門冬煎吞雞蘇圓治肺熱胸中鬱

熱反惡寒治血淋吐血口臭 方 見 傷 寒 陽 證 類 及 見 前

蘇子降氣湯治虛壅鼻血 方 見 諸 氣 類

欽定四庫全書 世醫得效方 卷七

衄血方

用鬱金末井水調下亦治吐血 又茆花煎湯通口

服又方血餘散用頭髮燒存性研米湯調下仍吹少

許入鼻中 曾服燒煉藥致鼻血者山梔子煎湯解

之仍燒山梔子存性為末入鼻 又方烏賊魚骨槐

花等末入鼻 又方槐花半生半炒為末入鼻 又

方成片人中白燒去穢為末入麝香少許入鼻或加

油髮灰



又方大蒜煨香取三瓣研傅脚底鼻中有蒜氣即去之

天門冬圓治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬 一兩 甘草 杏仁 炒 貝母

茯苓 阿膠 各半兩

右為末煉蜜丸彈子大每一丸嚥津噙化日夜可十丸

龍骨散治鼻衄過多

右以龍骨不拘多少研為末用少許吹入鼻中凡九

竅出血皆可用一方用梔子如前法

欽定四庫全書 世醫得效方 卷七

白及散治鼻衄嘔血咯血肺損或食飽負重得者服之愈

白及 不拘多少

右為末米飲調或用井水調一匕用紙花貼鼻衄中

一方用阿膠末調貼

黃耆建中湯治汗出污衣甚如坯染皆由大喜傷心喜

則氣散血隨氣行兼服妙香散金銀器麥子麥門冬煎

湯下病名紅汗 方見虛損心恙類

葶草汁治產婦大喜汗出污衣赤色及膏淋尿血

葶草 不拘多少

右搗取汁二升醋二合和空腹飲一盃或煮濃汁飲

亦治淋瀝尿血

側柏散治內損吐血下血或因酒太過勞傷於內血氣

妄行其出如湧泉口鼻皆流須臾不救則死服此即安

栝葉 一兩半 蒸乾 人參 荊芥穗 燒灰 各二兩

右為末每服三錢入飛羅麵二錢拌和新汲水調如

稀糊相似啜服立效又方用百草霜川白芷研為末

欽定四庫全書 世醫得效方 卷七

每服三錢濃米飲併服

神效方治鼻衄不止

右以蒲黃血竭為末吹入鼻中

灸法虛勞吐血灸胃脘三伯壯

吐血唾血上氣欬逆灸肺膺隨年壯

吐血嘔逆灸大陵穴在掌後兩骨間是

口鼻出血不止名腦衄灸上星穴五十壯入髮際一

寸衄不止灸足大指節橫理三毛中十壯劇者伯壯



並治陰卵腫

大便秘下血熱證酒蒸黃連圓治酒毒積熱便下鮮紅或

肛門作熱

方見消渴類

槐角圓治五種腸風瀉血糞前有血名外痔糞後有血

名內痔大腸不收名脫肛穀道四面努內如脉名舉痔

頭上有孔名瘻並皆治之

槐角

去枝梗
炒一兩

地榆

八兩

當歸

八兩
去蘆

黃芩

半斤

防風

八兩

枳殼

去穰
半斤

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓不拘時米飲下

人參敗毒散治同上每服三錢生姜三片薄荷葉七皮

桑白皮七寸烏梅一箇煎

方見傷寒
陽證類

防風散治因食熱物過度風氣蕃盛銷鑠大腸膏脂以

致榮衛之血滲流而下此方獨效

羌活

荊芥

防風

枳殼

姜蠶

炒
去絲

薄荷

各等分

右剉散白水煎空心溫服忌再喫熱物

黃連阿膠圓治同上米飲下

方見咳嗽類

加減四物湯治腸風下血不止

側柏葉

生地黃

當歸

酒浸

川芎

各二兩

枳殼

去白
炒

荊芥穗

槐花

炒

甘草

各半兩

右剉散每服三錢生薑三片烏梅一箇煎空心服一

方加防風烏梅各半兩效

虛證腸風黑散大便鮮血臍腹痛裏急後重脫肛酒痢

荊芥

二兩
燒

亂髮

燒

槐花

燒

槐角

燒
各一兩

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

枳殼

二兩
炒

甘草

炙

蝟皮

燒
各一兩半

右將合燒藥同入甕瓶內黃泥固濟燒存三分性出

火氣同甘草枳殼一兩搗為末每服二錢白水煎空

心服溫酒調亦可

黑五丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻著床頭痛不可忍

者服此不過三四次見效初得此疾發痒或疼穀道周

回多生硬核此是痔如破為瘻只下血是風皆因酒色

氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸



自有虫若不去根本其病不除此藥的效

刺蝟皮

剉研 四兩

猪懸蹄

五十箇

牛角腮

剉碎 三兩

雷丸

一兩

槐角

一兩半

敗棕

剉 二兩

亂髮

皂角水洗 淨焙 二兩

脂麻

一兩

苦楝根皮

錢半 一兩二

右剉碎入甕罐內燒存性碾為末入麝香二錢乳香

五錢研令和勻用酒打麵糊為丸如梧子大每服八

粒先細嚼胡桃一枚空心晚食前溫酒吞日二服病

甚日三服切忌別藥不過三兩日可除根本

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

加味雙和湯加側柏葉每服三皮炒過生薑三片棗二

枚烏梅一箇煎空心服

方見虛損類治同上

卷柏散治臟毒下血神效

卷柏

生土石塆上高四五寸根黃如絲莖細上有黃點子止以柏枝曝乾用

黃耆

右等分為末每服二錢米飲調下

聖金圓治腸風下血溺血

百藥煎

三兩 一兩生 一兩燒存性

一兩炒焦

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心米飲下

神丹治腸風痔漏

刺蝟皮

一箇鐵器中 炒焦黑為度

皂角刺

燒存性

硫黃

研

猪牙皂角

去黑皮 蜜塗炙

白礬

炒

枳殼

炒

黃耆

蜜炙

附子

去皮 各半兩

白雞冠花子

一兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七丸至十九丸空心

食前溫酒下不飲米飲下以年漏痔服至三四十丸

肉滿平安諸痔服之即自消外痔用藥十九丸同朱砂

細研蜜調塗常服永除根本若服藥覺熱加白雞冠

欽定四庫全書



世醫得效方
卷七

花子一兩半或二兩更加三五丸服之臟腑自調

小烏沉湯

香附子

杵去皮毛 焙二兩

天台烏藥

去心 一兩

甘草

炒一分

右為末每服一錢空心鹽湯點服治同上

震靈丹玉葉白丹治臟腑虛損大腸不收以作腸風下

血二藥夾用每服五十丸煎不換金正氣散加川芎空

心嚙下

方並見痢冷類

理中湯治同上加木香妙

方見霍亂類



香梅圓治腸風臟毒下血

烏梅

同核燒灰存性

香白芷

不見火

百藥煎

燒存性各等分

右為末米糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲下

斷紅圓治臟腑虛寒下血不止面色痿黃日漸羸瘦

側柏葉

炒黃

川續斷

酒浸

鹿茸

火去毛醋炙

附子

炮去皮臍

黃耆

阿膠

蛤粉炒

當歸

酒浸各一兩

白礬

半兩枯

右為末醋煑米糊丸梧子大每服七十丸空心米飲下

冷熱不調黃連香薷散

欽定四庫全書



世醫得效方卷七

香薷

扁豆

厚朴

薑製

黃連

去鬚

右剉散用水煎服

香連圓治冷熱不調下血

方見泄瀉類

芎歸湯熱加茯苓槐花冷加白茯苓丁香

方見婦人科保產類即佛手散

真人養臟湯治大人小兒冷熱不調便下膿血魚腦裏

急後重

方見泄瀉類

消風散米飲調熱者吞酒蒸黃連丸冷者吞烏梅丸

方見

風科熱證通治及下痢類

通治單方治腸風下血百藥不效

山裏棗俗名鼻涕團取乾者為末米飲調立效

又方柏子十四枚撚破紗囊貯以好酒三盞煎至八

分服之初服反覺加多再服立止非飲酒而致斯疾

以艾葉煎湯服之神效勝如它藥

又方生豬臟一條切控乾以槐花炒乾為末填入臍

內兩頭線縛了以好米醋於磁瓦器內慢火煑爛切

片沙鉢內研爛為丸梧桐子大每服二十丸煎當歸

欽定四庫全書



世醫得效方卷七

酒下

又方荊芥穗縮砂仁各等分為末糯米飲下

灸法第二十椎隨年壯

又法平立一杖子比臍平却向後脊骨當中灸七壯

或年深於脊骨兩傍各一寸灸七壯余謂寸半則是

腎腧自佳

小便出血酒蒸黃連圓白茆根濃煎湯放溫吞下

方見下痢類

五苓散加辰沙一字燈心一握煎湯調下

方見傷暑類



茯苓調血湯治酒麵過度房勞後小便出血	半赤茯苓 一兩 赤芍藥	川芎	半夏麴 各半兩
前胡	柴胡	青皮	枳殼
北梗	桑白皮	白茅根	燈心
甘草	各二分半		
右剉散每服三錢半姜五片蜜二匙新水煎服			
薑蜜湯治小便出血不止	生薑 七片	蜜 半盞	白茅根 一握
右用水同煎服神效			
鹿角膠圓治房室勞傷小便尿血			
鹿角膠	半兩	沒藥 別研	油頭髮灰 各三分
右為末用白茅根汁打糊丸如梧桐子大每服五十			
丸鹽湯送下			
髮灰散			
右用自己頭髮一握洗淨燒灰溫酒調下一服立效			
鏡而散治小便出血			

鏡面草取清汁入蜜少許同水調服效	單方療小遺出血條	淡豆豉一撮煎湯服效	又方治小便出血	竹茹一大塊水煎服妙	又方川牛膝一兩去蘆水一碗煎至半碗頓服	又方生地黃取自然汁半升生薑自然汁半合相和服	未止再服	又方當歸川白芷為末每服二錢溫米飲下	脫肛	文蛤散治大腸寒肛門脫出不收用力過多及小兒叫	呼久痢後皆使脫肛	五倍子	右為末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤佳洗後用	赤石脂為末以少許摻在芭蕉上頻用托入或長尺	餘者以兩床相接中空一尺以甕瓶盛藥水滿架起



與床平令病者仰卧以其所脫浸在瓶中換藥逐日如此浸縮盡為度

木賊散

右用木賊一味為末摻肛上

槐花散治脫肛

槐花 槐角

右等分炒香黃為末用羊血蘸藥炙熱食之以酒送下或以猪膏去皮蘸藥炙服

欽定四庫全書



世醫得效方卷七

釣腸圓治同上

方見諸痔類

蝟皮散治肛門或因洞泄或因用力太過脫出不收

蝟皮 一箇 燒存性 磁石 煨碎 桂心 各半兩

右為末每服二錢米飲空心調下治女人陰脫加鱉

頭一枚燒灰研入

香荊散治肛門脫出大人小兒悉皆治之

香附子 一兩半 炒去毛 荊芥穗 二兩

右為末每服三匙水一大碗煎熟淋洗

灸法治寒冷脫肛出灸臍中隨年壯

脫肛歷年不愈灸橫骨百壯又灸脊窮骨上七壯

諸痔

冷證釣腸圓治久新諸痔肛邊腫痛或生瘡痒時有濃

血

栝樓 二箇 燒存性 蝟皮 兩箇 剉碎 罐 白礬 煨

綠礬 枯 胡桃仁 十五箇 不油者 白附子 生用

半夏 天南星 雞冠花 五兩 剉炒 枳殼 炒

欽定四庫全書



世醫得效方卷七

附子 去皮 臍 訶子 去核 各二兩

右為末醋麵糊丸如梧子大每服二十九空心臨卧

溫酒下遠年不差者服十日見效久服除根

黑玉丹治同上 方見失血類

橘皮湯治氣痔

橘皮 枳殼 炒 川芎 槐花 炒 各

檳榔 木香 桃仁 浸去皮 紫蘊莖葉

香附子 甘草 各二分半



右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎服立效圓

百藥煎研為末每服三錢煮稀白粥攪勻服之立愈

糊丸米飲下亦可

黑圓子專治久年痔漏下血用之屢驗

乾薑 百草霜 各一兩 木饅頭 二兩 烏梅

敗棕 柏葉 亂髮 各五分

右各燒灰存性再入桂心三錢白芷五錢同為末醋

欽定四庫全書 世醫得效方 卷七

糊丸梧桐子大空心三十九米飲下

熱證逐瘀湯通利大小便取下黑物

川芎 白芷 生乾地黄 赤芍藥

五靈脂 枳殼 製 阿膠 炒 蓬莪朮 煨

茯苓 茯神 大木通 生甘草 各一分

實大黃 桃仁 湯去皮焙各一分半

右剉散每服三錢井水一碗生薑三片蜜三匙煎服

以利為度瘀血作痛通用

白玉丹治久年腸痔下血服藥不效者

寒水石 不以多少

右煨紅研細水飛再入銀窩中煨紅用糯米糊丸梧

桐子大每服五六十圓陳米飲下只一服

黃連阿膠圓解熱調血枳殼散送下 方見泄瀉及婦人護胎類

槐角圓治腸風痔瘡內生虫裏急下膿血止痒痛消腫

聚祛濕毒服之除根 方見前

乾葛湯專治酒痢

欽定四庫全書 世醫得效方 卷七

白乾葛 枳殼 炒 半夏 茯苓

生乾地黄 杏仁 各半兩 黃芩 甘草 炙各一分

右剉散每服三錢黑豆百粒薑五片白梅一箇煎服

寬腸圓五灰膏塗痔瘡之後或臟腑秘結不通者用此藥

寬腸五灰膏 方見后

黃連 枳殼 各等分

右為末麵糊丸如梧子大每服五十丸空心米飲下

通治秘方治諸痔捷效



右用白礬信石各少許於新瓦上煨過為末再入朱砂末少許以新汲井水調成膏用舊金紙上藥隨瘡大小貼之先用鬱金國丹末以鵝翎刷於瘡四畔圍護恐傷好肉凡上藥貴宜人肉理嬌脆薄少用之愚俗人肉理麤厚稍多少許用之大抵上藥後多疼不可太過為妙仍用大青根晚蠶砂煎水洗後再上藥兼服槐角圓皂角圓臟腑結熱秘甚八正散加燈心枳殼薄荷葉煎再用大黃茶莽草荊芥穗防風煎水

欽定四庫全書

世醫得效方
卷七

洗效

八正散方
見積熱類

又方用川白芷煑白苧作線快手緊繫痔上微疼不妨其痔自然乾痿而落七日後安

五灰膏治臟腑一切蘊毒發為痔瘡不問遠年近日形似雞冠蓮花核桃牛乳或內或外並皆治之

蕎麥

灰七升

荆柴

薊柴

山白竹

老杉枝

右以四件柴竹截作一尺許長以斧劈破成片各取

一束曬乾於火上燒過置壘內為炭防為風所化俟燒盡却以水於鍋內煮出炭汁又用酒漏以布帛實其竅而置蕎麥灰於酒漏內以所煮炭汁淋之然後取汁於鍋內慢火熬汁約取一小碗候冷入石灰國丹調和成膏以瓦瓶貯之上用石灰傅面不令走氣臨用却去石灰以冷水調開令病者以水洗淨痔瘡仰卧搭起一足先以濕紙於瘡四圍貼護却用收效必矣

欽定四庫全書

世醫得效方
卷七

世醫得效方卷七



欽定四庫全書

子部
世醫得效方卷八

詳校官太醫院恩權臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈
校對官待詔臣胡士震
謄錄監生臣祝雯

欽定四庫全書

世醫得效方卷八

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

諸淋

冷證生附湯治冷淋小便秘澀數起不通竅中疼痛增
寒凜凜多因飲水過度或為寒濕心虛志耗皆有此證

附子

去皮臍

滑石

各半兩

瞿麥

木通

各三分

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

半夏

右剉散每服二大錢水二盞生薑七片燈心二十莖

蜜半匙煎去滓空心服

八味間治同上

方見腳氣類

熱證八正散治熱淋血淋加燈心車前草煎不拘時候

服方見積熱類

地膚子湯治下焦有熱及諸淋閉不通

地膚子

一兩

知母

黃芩

猪苓

去皮



瞿麥	枳實 去穰切炒	升麻	通草
葵子	海藻 洗去腥各壹兩		
右剉散每服四錢水一盞半煎空心服大便俱閉者加大黃女人房勞小便難大腸滿痛脈沉細者用猪腎半隻水二盞煎一盞半去腎入藥煎七分服			
石葦散治熱淋多因腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝下宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦則發或尿如豆汁或便出砂石疼痛兼治大病後餘熱為淋			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷八			
木通	石葦 去毛各一兩	甘草	當歸
王不留行	滑石	白朮	瞿麥
赤芍藥	葵子 各一兩半		
右為末每服二錢煎小麥湯調食前日三服			
清心蓮子飲治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並宜服之 方見痾渴類			
火府丹治心經熱小便澁及治五淋			
生乾地黃 二兩	木通 一兩	黃芩 一兩	

右為末煉蜜杵圓梧桐子大每服三十粒木通煎湯下			
膏淋鹿角霜圓治膏淋多因憂思失志意舍不寧濁氣干清小便淋閉或復黃赤白黯如脂膏狀疲極筋力或傷寒濕多有此證			
鹿角霜	白茯苓	秋石 各等分	
右為末糊圓梧桐子大每服五十圓米湯下			
海金沙散治膏淋			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷八			
海金沙	滑石末 各一兩	甘草末 一分	
右研勻每服一匙用麥門冬湯下燈心湯亦可			
氣淋沉香散治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便便利			
沉香	石葦 去毛	滑石	王不留行
當歸 各半兩	葵子	白芍藥 各三分	甘草
橘皮 各一分			
右為末每服二錢煎大麥湯調下			



血淋髮灰散治血淋若單小便出血如尿此為莖劬此主之

右以亂髮不以多少燒為灰入麝香少許每服用米醋泡湯調下治淋以葵子末等分用米飲調下最治婦人胞轉不尿

柿焚散治血淋

右用乾柿燒灰存性為末米飲調服

犀角地黃湯治血淋或血瘀乃風冷傷腎宜煎木通湯

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

下

兔絲子圓三十圓不可專以血得熱則淖溢為說

方見
失血

虛損

乳石散治血淋及五淋等

右揀乳香中夾石者研細以米飲或麥門冬湯調下每服以飢飽適中時服空心亦可

小蘗飲子治下焦結熱尿血成淋

生地黃

洗四兩

小蘗根

滑石

通草

蒲黃

炒

淡竹葉

藕節

當歸

山梔子仁

甘草

各半兩

右剉散每服四錢水煎空心服

導赤散治心虛蘊熱小便赤澁或成淋痛

生乾地黃

木通

甘草

各等分

右剉散每服三錢竹葉十皮煎不拘時服

白微散治血淋熱淋

白薇

芍藥

各等分

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

右為末每服二錢酒調下立效或加檳榔

通秘散治血淋痛不可忍

陳皮

香附子

赤茯苓

各等分

右剉散每服三錢水煎空心服

砂石淋石燕圓治小便滲痛不可忍出砂石而後方通

石燕

燒紅水淬
二次研細

滑石

石葦

去毛

瞿麥穗

右等分為末糊圓梧桐子大每服五十圓瞿麥穗燈

心湯下日三服



又方乳石散治同上 方見前

瞑眩膏治諸淋疼痛不可忍及砂石淋

右以大蘿蔔切作一指厚四五片用好蜜淹少時安

鉄鏟上慢火炙乾又蘸又炙取盡一二兩蜜翻覆炙

令香熟不可焦候冷細嚼以鹽湯送下

苦杖散治砂石淋諸淋每溺時器中剝剝有聲痛楚不

堪

右以杜牛膝淨洗碎之凡一合用水五盞煎耗其四

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

而留其一去滓以麝香乳香少許研調服之單酒濃

煎亦效

通治透膈散治諸淋

滑石 一兩 研細

右勞淋勞倦虛損則發用葵花末煎湯調二錢服

血淋熱淋井花水調 氣淋木通湯調 石淋將藥

下入銚子內隔紙炒至紙焦再研細同溫水調 小

便不通小麥湯下 諸淋並冷水調亦可空心

地髓湯治五淋 方見前 苦杖散同

猪苓湯治五淋

猪苓 去皮

赤茯苓

阿膠 炙過

澤瀉

白滑石 各一兩

右剉散每服五錢水一盞半煎溫服

五淋散治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或

如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱沸便血並皆治之

赤茯苓 一兩

赤芍藥

山梔子仁 三兩半

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

當歸 各一兩

右剉散每服三錢水一盞半煎空心服

通草湯治同上

通草

葵子

茆根

桃膠

瞿麥

當歸

蒲黃

滑石 各一兩

甘草 半兩 王不留行 一兩

右剉散每服三錢生薑五片煎不拘時服

品方治淋疾數年不愈者



右以四君子湯去甘草每服三錢水一盞煎服

淡竹葉湯

淡竹葉

甘草

燈心

棗子

烏豆

車前子

右不拘多少以水濃煎湯代熟水服甚妙

葵子湯治小便微痛漸難欲出不出痛不可忍

赤茯苓 一兩

葵子

石葦 去毛

澤瀉 各半兩

白朮 二錢半

欽定四庫全書
世醫得效方
卷八

右剉散每服三錢水一盞半煎七分溫服

虛損

養榮湯治積勞虛損四肢沉滯骨肉酸疼吸少氣行

動喘之小便拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食

無味陰陽衰弱悲憂慘戚多卧少起久者積年急者百

日漸至虛損五臟氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛

咳嗽下利喘促少氣嘔吐痰涎

黃耆

當歸

桂心

甘草

橘皮

白朮

人參 各一兩

白芍藥 三兩

熟地黃

五味子

茯苓 各三兩

遠志 姜炒

兩半

右剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎空腹服遺

精夢泄加龍骨一兩咳嗽加阿膠甚妙

參香散治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情思不樂夜

多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒無時口乾涸燥渴欲

飲水飲食減少肌肉瘦悴漸成勞瘵常服補精血調心

欽定四庫全書
世醫得效方
卷八

氣進飲食安神守中功效不可盡述

人參

黃芪

白茯苓

白朮

山藥

蓮肉 去心各一兩

烏藥

縮砂仁

橘紅

乾薑 炮各半兩

甘草 炙三分

丁香

南木香

檀香 各一分

沉香 二錢

右剉散每服三錢薑三片棗一枚煎食前服一法有

炮熟附子半兩或為末一匙蘇鹽湯調亦可

黃耆益損湯治男子婦人童男室女諸虛不足榮衛俱



弱五勞七傷骨蒸潮熱腰背拘急百節酸疼夜多盜汗
心常驚惕咽燥唇焦嗜卧少力肌膚瘦瘁咳嗽多痰咯
唾血絲寒熱往來頰赤神昏全不用食服熱藥則煩燥
衝滿上焦進涼藥則膈滿而腹痛宜服此藥極有神效
兼治大病後榮衛不調婦人產後血氣未復

人參 去蘆

石斛 去根

甘草

黃耆 去蘆

木香

白朮

當歸

官桂

茯苓

芍藥

半夏

川芎

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

熟地黃 去土炒

山藥

五味子

牡丹皮 去骨

麥門冬 去心各等分

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚小麥

五十粒烏梅一箇煎空心食前服

正元散治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自

汗陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷

利少氣羸困一切虛寒並宜服之常服助陽消陰正元

氣溫脾胃進飲食



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

人參

白茯苓

白朮

黃耆 各二兩半

甘草

烏藥

山藥

附子 薑汁浸炒皮去

川芎

乾葛

桂心

烏頭 炮去皮尖半兩

紅豆 炒

乾薑 炮

橘皮 各三錢

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚鹽少

許煎食前冷服自汗加浮麥

萬安圓補下經起陰發陽能令陽氣入腦安魂定魄開

三焦破積聚消五穀益精氣安臟腑除心中虛熱強筋

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

骨輕身明目去冷除風無所不治補益極多常服最妙

七十老兒服之當有非常力

茯苓 酒浸

乾薯芋

五味子

杜仲 各二兩半

牛膝 酒浸

兔絲子

赤石脂

白茯苓 皮去

澤瀉

山茱萸

巴戟

熟乾地黄

已上各二兩

附子 去皮臍

牡丹皮

官桂 去皮各

一兩

右為末別用茯苓末半斤酒熬膏和圓梧桐子大每

服五七十圓空心溫酒下不在將息別無所忌只忌		醞醋及陳臭之物七日後四體光澤口唇赤手足熱		面有光潤消食體輕舌厚聲響是其驗也十日長肌		肉其藥通中入腦鼻辛酸不可怪也又加減法若要		肥加燉煌石膏二兩如失狂多忘加遠志一兩體少		津潤加柏子仁一兩欲進房事加白馬莖若無用鹿		茸代之二兩去毛酥炙陰下濕痒加蛇床子一兩		色如火		欽定四庫全書		世醫得效方		卷八		增益歸茸圓滋養肝腎益心血利足膝實肌膚悅顏色		真男子衛生之良藥也此方專理肝心腎之血澤瀉則		引諸藥入腎		熟乾地黄		酒浸九蒸		鹿茸		去毛酥		五味子		各四兩		山藥		酒浸		川牛膝		酒浸一宿		白茯苓		牡丹皮		去骨		澤瀉		酒浸一宿		大當歸		去蘆		黃連		二兩		錢		右為末用真鹿角膠半斤剉細入銀石器中煮酒圓	

梧桐子大每服五十圓空心溫酒鹽湯下		增損樂令湯治諸虛不足小腹急痛脇肋脹臍下虛		滿胸中煩悸面色痿黃唇乾口燥手足逆冷體常自汗		腰背強急骨肉酸痛咳嗽喘乏不飲食或因勞傷過度		遠行後不復		黃耆		去蘆		人參		去蘆		橘皮		去白		當歸		去尾		桂心		細辛		前胡		去蘆		甘草		茯苓		麥門冬		去心		芍藥		各二兩		附子		炮去		皮臍		熟地黄		酒炒		各一兩		半夏		湯洗		二兩半		遠志		三分		去心		右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗子二枚煎		食前服腹滿食少去棗下焦虛冷不甚渴小便數者		倍人參當歸附子煩渴引飲加栝樓根遺泄白濁加		龍骨白欽小腹急引心痛者加乾薑		黃耆圓治丈夫腎臟風虛上攻頭面虛浮耳內蟬聲頭		目昏眩項背拘急下注腰脚脚膝生瘡行步艱難脚下	



隱粟不能踏地筋脉拘攣不得屈伸四肢少力百節酸疼腰腿冷重小便滑數及癱緩風痺遍身頑麻又療婦人血風肢體痒痛脚膝緩弱起坐艱難並宜服之

黃耆去蘆 杜蒺藜去刺 茴香炒 川練子去核

川烏炮皮臍 赤小豆 地龍去土炒 烏藥二兩

防風去蘆

右為末酒煮麪糊圓梧桐子大每服十五圓溫酒鹽

湯吞下婦人醋湯下空心服

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

茴香圓治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹疔痛腰背拘急面色萎黃飲食減少及膀胱小腸氣痛并腎臟風毒頭面虛浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血臟虛冷食減少力肢體疼痛並宜服之久服補虛損除風冷壯筋骨明耳目

葳靈仙土洗去 川練子炒 川烏去皮臍

杜烏藥五兩 川椒去目及開口者

地龍去土炒 赤小豆八兩 陳皮 葶藶各三兩

茴香炒 防風去苗

右為末煮麪糊圓如梧子大空心晚食前溫酒下二

十圓鹽湯亦可糊用酒煮 小腸氣痛炒茴香生薑

酒下 脚轉筋木瓜湯下 婦人血臟虛冷溫醋湯

下 臍腹絞痛滑泄冷痢濃艾湯下

還少丹補心腎虛損脾胃怯弱神志俱耗腰脚沉重精

神昏亂氣血凝滯飲食無味肌體瘦倦小便白濁耳聾

目暗等疾

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

山藥 川牛膝酒浸 白茯苓去皮

楮實子 舶上茴香 巴戟酒浸

杜仲去皮 肉蓯蓉酒浸

五味子 石菖蒲微炒 枸杞子各一兩

遠志一兩甘草水煮 熟地黃酒洗蒸

山茱萸去核

右為末煉蜜入棗子蒸熟去皮核同為圓梧桐子大

朱砂末五錢為衣每服三十圓空心溫酒鹽湯下日



進三服心氣不寧加麥門冬少精神加五味子陽弱
加續斷久服百病不侵

天真圓治男子婦人先曾損血及脫血肌瘦絕不入食
行步不得手足痿弱軟遂血氣枯槁形神不足如滑腸
不食守死無法可治者如咽喉窄下食不得只能五七
粒漸漸服之粒數多便可養起久服令人面色紅潤無
血者使生血并津液乾大便燥者服之自潤實中有虛
虛中有實皆可治之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

羊肉

七斤精者去筋膜
脂皮批開入藥

肉蓯蓉

十兩

濕山藥

去皮
十兩

當歸

去蘆洗
十二兩

天門冬

炮去心切
焙十兩

右四味安在羊肉內裹定用麻縷扎縛取上色糯酒
四瓶煮令盡再入水二升又煮直候肉如泥再入黃
蓍末五兩人參末三兩白朮末二兩熟糯米飲焙乾
為末一十兩前後藥末同劑為圓梧桐子大一日約
服三百粒初服百粒加至前數服之覺有精神美飲
食手足添力血脈便行輕健如久瘡不言者服之半

月語言有聲血下喘咳行步不得服之效恐難圓即
入蒸餅五七枚焙乾為末同搜和之酒送下空心食
前鹽湯亦可

地仙丹治男子五勞七傷腎氣虛憊行步難苦女人血
海虛冷月經不調臟寒少子又治痔瘻腸風下血諸風
諸氣並皆治之有人得風氣疾攣結疼痛服之頓除

川牛膝

酒浸
四兩

肉蓯蓉

酒浸
四兩

覆盆子

白附子

兔絲子

酒浸

赤小豆

天南星

川羌活

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

骨碎補

去毛

金毛狗脊

去毛

何首烏

萆薢

防風

去蘆義

烏藥

各二兩

川椒

去目

綿附

炮去皮
各一兩

白朮

甘草

白茯苓

川烏

炮去皮
各一兩

人參

黃耆

各一兩半

木鱉子

去皮

地龍

去土
各三兩

右為末酒麪糊為圓梧桐子大每服三十圓空心酒
下

補骨脂散治因感卑濕致疾久之陽氣衰絕乳石補益
藥不效服此收功常服延年益氣悅心明目補益筋骨



忌食芸薹羊血

好破故紙

十兩揀淨
洗為末

胡桃肉

去皮二十
兩研如泥

右煉蜜和二味均如飴盛瓦器中旦日以溫酒化藥

一匙熟水亦可或為圓服

官方瑞蓮圓治濕定心消痰暖腎水勻血去黑痣

蒼朮

主脾一斤酒浸四兩醋浸四
兩米泔浸四兩生用四兩

蓮肉

主心一斤去皮心酒浸軟入猪肚內煮極爛
取出焙乾研猪肚為膏蓮肉一斤約肚二箇

枸杞子

主肝二兩
去枝梗

北五味子

主肺二兩
去枝梗

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

破故紙

主腎二兩
微炒

熟地黄

主血二兩
酒洗蒸

右為末猪肚膏酒煮麪為圓如梧子大每服四十圓

空心溫酒鹽湯下

無名丹補虛守神澁精固陽道男子服之有奇功

蒼朮

一斤不浸杵春令
稍滑淨篩去麤皮

龍骨

一兩

赤石脂

二兩
大川烏 一斤兩炮
去皮臍

破故紙

二兩
微炒

川練子

三兩
舶上茴香 一斤兩
去核微炒

蓮肉

去心

白茯苓

去皮
遠志 一斤兩
薑汁拌炒各一兩
去皮

右為末酒煮麪糊圓如梧子大朱砂一兩另研為衣

三十圓漸加至百圓食前溫酒米飲鹽湯皆可婦人

無子服之效

大建中湯治諸虛不足小腹急痛脇肋脹骨肉酸痛

短氣喘咄痰多咳嗽潮熱多汗心下驚悸腰背強痛多

卧少起

黃耆

去蘆

附子

炮
去皮臍

鹿茸

酒蒸

地骨皮

去木

續斷

去蘆

石斛

去根

人參

去蘆

川芎

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

當歸

去蘆
酒浸

白芍藥

各一兩

甘草

炙
半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎不以時服

咳嗽加欵冬花 唾血加阿膠 便精遺泄加龍骨

怔忡加茯神

黃耆建中湯治男子女人諸虛不足小腹急痛脇肋脹

脹臍下虛滿胸中煩悸面色萎黃唇乾口燥少力身重

胸滿短氣腰背強痛骨肉酸疼行動喘乏不能飲食或

因勞傷過度或因病後不復並宜服之



黃耆 去蘆 三兩	肉桂 三兩	甘草 炙 二兩	白芍藥 六兩
右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎去滓入錫少許再煎令溶空心稍熱服	人參黃耆散治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利減食多渴欬唾稠粘時有膿血	天門冬 去心 三兩	半夏 湯洗七次 滑薑汁炒 去
驚甲 去裙 炙二錢	知母 紫苑 各一兩半	秦艽 二兩	桑白皮 炒 各兩半
欽定四庫全書 世醫得效方 卷八	人參 一兩	白茯苓 二兩	黃耆 赤芍藥 各一兩半
柴胡 地骨皮 各二兩	甘草 一兩	桔梗 一兩	右剉散每服三大錢水一盞半煎食後溫服
安腎圓治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅疼下部濕癢夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便澀泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補元陽益腎氣功效殊甚			

桃仁 麩炒 四兩	肉桂 一兩	白茯苓 炒 去刺	巴戟 去心
肉苁蓉 酒浸 炙	山藥 破故紙 茯苓	石斛 去根 炙	草薢 白朮 各四兩
六錢	一兩	川烏 炮 去臍	右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓溫酒鹽湯任下空心食前小腸氣炒茴香鹽酒下
雙和湯治男子婦人五勞六極七傷心腎俱虛精血氣少遂成虛勞百骸枯痺四肢倦怠寒熱往來咳嗽咽乾行動喘乏面色痿黃略有所觸易成他疾或傷於冷則宿食不消脾疼腹痛瀉痢吐逆或傷於熱則頭旋眼暈痰涎氣促五心煩熱或因飢飽動作喜怒驚恐病隨而至或虛脹而不思食或多食而不生肌肉心煩則虛汗盜汗一切虛勞不敢服燥藥者並宜服之常服調中養氣益血育神和胃進食補虛損	白芍藥 三兩	當歸 洗淨 酒浸	熟地黃 洗 酒蒸
甘草 炙 一兩	川芎 去蘆 一兩	肉桂 一兩	各一兩半
欽定四庫全書 世醫得效方 卷八			



右剉散每服三錢生薑三片棗二枚煎空心食前服
忌生冷果核等物

十四味建中湯治榮衛不足腑臟俱傷積勞虛損形體
羸瘠短氣嗜卧寒熱頭痛咳嗽喘促嘔吐痰沫手足多
冷面白脫色小腹拘急百節盡疼夜卧汗多夢寐驚悸
小便滑利大便頻數失血虛極心忪面黑脾腎久虛飲
食失虧

當歸去蘆洗酒浸焙 白芍藥 白朮洗 麥門冬去心

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

甘草酒浸一宿焙乾 肉蓯蓉酒浸一宿焙乾 人參去蘆

川芎 肉桂去麁皮 附子炮去皮臍 黃耆炙

半夏湯洗 茯苓去皮 熟地黃酒浸一宿焙乾

右等分剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎食前

服

青娥圓治腎氣虛弱風冷乘之或血氣相搏腰痛如折
起坐艱難俯仰不利轉側不能或因勞役過度傷於腎
經或處卑濕地氣傷腰或墜墮傷損或風寒客搏或氣



迪志文化出版有限公司出版

滯不散皆令腰痛或腰間似有重物繫墜起坐艱辛悉
能治之方見腰痛類

十全大補湯治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲
食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精
面色痿黃脚膝無力一切病後氣不如舊憂愁思慮傷
動血氣喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之此藥
性溫不熱平補有效養氣育神醒脾止渴順正辟邪溫
煖脾腎其效不可具述又名十補湯

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

人參去蘆 肉桂去麁皮 川芎 熟地黃洗酒蒸焙

茯苓去皮 白朮 甘草 黃耆去蘆

川當歸去尾 白芍藥各等分

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎空

心服

秦艽鱉甲散治男子婦人氣血勞傷四肢倦怠肌體瘦
弱骨節煩疼頭昏頰赤肢體枯槁面色痿黃唇焦口乾
五心煩熱痰涎咳嗽腰背引痛乍起乍卧夢寐不寧神



迪志文化出版有限公司出版

情恍惚時有盜汗口苦無味不美飲食及治山嵐瘴氣
寒熱往來

荊芥 去梗

貝母 去心

白芷 半兩

乾葛 二兩

天仙藤

前胡 各一兩

羌活

肉桂 各半兩

青皮

柴胡 去鬚

甘草

秦艽 去蘆

鱉甲 去裙醋

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎不拘時為

末酒調亦得常服養氣血調榮衛解倦怠

欽定四庫全書



世醫得效方
卷八

沉香鱉甲散治男子婦人五勞七傷支血虛損腰背拘
急手足沉重百節痠疼面色黑黃肢體倦怠行動喘乏
胸膈不快咳嗽痰涎夜多異夢盜汗失精嗜卧少力肌
肉瘦悴不思飲食日漸羸弱一切勞傷諸虛百損並能
治之

乾蝎 二錢

沉香

人參

木香

巴戟 去心各半兩

附子 去皮臍

肉豆蔻 四箇

肉桂 一兩

川當歸 去尾

熟乾地黄 淨洗酒蒸

白茯苓

牛膝 去蘆

黃耆 各半兩

羌活 七錢半

柴胡 去蘆

荊芥 去梗

半夏 薑汁炒

鱉甲 去裙醋

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片葱白二寸棗

二枚擘破煎空心食前服

小安腎圓治腎氣虛乏下元冷憊夜多漩濁肢體倦怠

漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憤耳作蟬鳴面

無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛並皆治之

香附子

川烏

川練子 各半兩用鹽二兩水二升同煮

欽定四庫全書



世醫得效方
卷八

剉乾

熟乾地黄 二兩

茴香 六兩

川椒 二兩

及開目者
炒出汗

右為末酒糊圓如梧子大每服二十圓至三十圓空

心鹽湯鹽酒任下常服補虛損下元冷憊

橘皮煎圓治久虛積冷心腹疼痛嘔吐痰水飲食減少

脇肋虛滿臍腹弦急大腸虛滑小便利數肌膚羸瘦面

色萎黃肢體怠惰腰膝緩弱及治瘰癧積聚上氣咳嗽

久瘧久痢腸風痔瘻婦人血海虛冷赤白帶下久無子



息並宜服

荊三稜

煨熟乘熱
搗碎三兩

陳橘紅

淨洗焙
十五兩

當歸

洗去
蘆焙

葶藶

厚朴

去皮薑
汁炒

肉苁蓉

酒浸
焙乾

肉桂

附子

炮去
臍

陽起石

酒浸研
焙如粉

巴戟

去心

石斛

去根

鹿茸

子者燎去毛
劈開酒浸炙乾

牛膝

去苗酒
浸焙

兔絲子

酒浸焙
乾炒

杜仲

薑汁炒
薑汁

吳茱萸

洗焙

乾薑

炮以上
各三兩

甘草

炙一兩

欽定四庫全書



世醫得效方
卷八

右為末用酒五升於銀石器內將橘皮末熬如錫却

入諸藥末攪和搜勻仍以白內搗五百杵圓如梧子

大每服二十圓空心溫酒或鹽湯吞下

生犀散治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗五

心煩燥及大病瘥後餘毒不解

犀角

螳

地骨皮

去骨

秦艽

去蘆

麥門冬

去心

枳殼

煨去穰

大黃

煨

柴胡

去鬚

茯苓

去皮

赤芍藥

桑白皮

去赤

黃耆

去蘆蜜炙

人參

去蘆

鰲甲

醋炙

知母

各等分

右剉散每服三錢陳青蒿一根煎桃枝亦可小兒疳

病熱似骨蒸者及久病後或虛後時復來作潮熱者

瘧疾亦用有痰加半夏熱輕去大黃加黃芩

北亭圓治脾元氣弱久積陰冷心腹脇肋脹滿刺痛面

色青黃肌體瘦弱怠惰嗜卧食少多傷噫氣吞酸噦逆

惡心腹中虛鳴大便洩利胸膈痞塞飲食不下嘔噦霍

亂體冷轉筋及五膈五噫瘕瘕瘕聚翻胃吐食久痛久

欽定四庫全書



世醫得效方
卷八

痢並治之

縮砂仁

胡椒

肉桂

厚朴

去麤皮
薑汁炒

附子

炮去
臍

川芎

當歸

陳皮

乾薑

甘草

各四兩

阿魏

醋化去沙石
二兩別研

白朮

三兩

青鹽

別研
二兩

北亭

醋淘去沙石
二兩別研

五味子

揀一兩半

右為末用銀石鍋內入好酒醋五升白沙蜜十兩先
下北亭阿魏青鹽三味并好頭麪一升同煎稠粘便

下藥末半斤以來更煎如稀麪糊漸漸入藥末煎得所離火取出更以乾藥末和搜成劑更搗千杵圓如梧桐子大每服十五圓微嚼破用生薑鹽湯下溫酒亦可空心服忌羊血豉汁

鹿茸大補湯治男子婦人諸虛不足產後血氣耗傷一切虛損

人參 肉蓯蓉 遠志 杜仲

山藥 熟地黃 山萸 蒸去核 各四兩 鹿茸 去毛 全副

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

白蒺藜 丹皮 各八兩 鹿角膠 兔絲子

川牛膝 巴戟 魚膠 補骨脂

白茯苓 女貞實 各三兩 川附子 枸杞子

巨勝子 各二兩 五味子 桂心 青鹽

栢子仁 各一兩

右各為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服三錢清晨

空心淡鹽湯下

資生大造圓治同上

人參 山藥 山萸 牛膝

補骨脂 鹿角膠 蓯蓉 杜仲 各二兩

五味子 覆盆子 楮實子 龜板 酥炙

兔絲子 蒸各一兩 紫河車 一具 白茯苓 熟地黃

當歸 酒洗各四兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每早空心服四錢滾水

下或鹽湯亦可忌生薑胡椒蘿蔔油麵炒等物此藥

能添精補髓益氣生血固元陽健脾胃壯筋骨安五

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

臟驅風濕令人耳目聰明不受外邪久服更能延年

益壽

延年却病方

真兔絲子不拘多少洗淨用好酒入砂鍋內煮吐絲

為度放竹器內晒乾磨粉再用炒米粉拌和加白沙

糖調和滾湯下常服大有補益

十補圓治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛亡

血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲



食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五臟行
榮衛益精髓進飲食

附子炮去
皮臍 乾薑 兔絲子酒浸
別研

桂心 厚樸去麄皮
薑汁炒 巴戟去心

遠志去心薑
汁浸炒 破故紙炒 赤石脂煨各
一兩

川椒炒出汗去子并
合口者二兩

右為末酒糊圓梧桐子大溫酒或鹽湯下三十圓空

心

欽定四庫全書
世醫得效方
卷八

白圓治元陽虛寒精滑不禁大腑滑泄手足厥冷

陽起石煨 鍾乳粉

右等分為末酒煮附子末為圓梧桐子大每服五十

圓空心米飲下

黑圓治精血耗竭面色黧黑耳聾目昏口乾多渴脚弱
腰疼小便白濁上燥下寒不受峻補

鹿茸一兩燎
去毛 當歸二兩
酒浸

右各為末煮烏梅膏子為圓梧子大每服五十圓空

心溫酒下

芡實圓治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固面

少顏色驚悸健忘夢寐不安小便赤澁遺精白濁足脛

痠疼耳聾目昏口乾脚弱

芡實蒸去殼 蓮花鬚二兩 茯神去木 龍骨

山茱萸取肉 五味子 枸杞子 熟地黃酒
蒸

韭子炒 肉蓯蓉 川牛膝去
蘆

酒浸 紫石英煨七次
各一兩

欽定四庫全書
世醫得效方
卷八

右為末酒煮山藥糊為圓梧桐子大每服七十圓空

心鹽酒或鹽湯下

天地煎治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍惚小

便黃赤或生瘡瘍

天門冬去心
二兩 熟地黃九蒸
一兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服百圓熟水人參湯任

下不拘時候

石刻安腎圓治真氣虛憊脚膝緩弱目暗耳鳴舉動倦



乏夜夢遺精小便頻數一切虛損久服壯元陽益腎氣
健筋骨生血駐顏扶老資壽

蒼朮 四兩 一兩用茴香一兩炒 一兩用青鹽一兩炒 一兩用猪苓

一兩炒各炒令 川烏 炮去皮 附子 同上

川練子 酒浸 去核 巴戟 去心 白朮 炒 陳皮 炒各

肉苁蓉 酒浸 破故紙 炒各 茯苓 炒一兩 肉豆蔻 裹麪

煨 木香 不見火 當歸 火焙各一兩 杜仲 炒去絲 二兩

兩 熟地黃 酒浸 蒸十 兔絲子 酒浸

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

炒 茴香 黑牽牛 半生 山藥 炒各

晚蚕蛾 去頭足 葫蘆巴 酒浸 肉桂 火不見

石斛 炒 川牛膝 酒浸 炒各一兩

右為末酒煮麪糊圓梧桐子大每服四十圓空心鹽

湯下

青鹽圓補虛益腎氣明目治腰疼及治精滑漩多四體

困乏久服有效

黑牽牛 二兩 炒別 研取頭末

山藥 去皮 杜仲 炒斷



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

川烏 炮去皮 川練子 去核 茴香 炒 紅椒皮 炒

青鹽 別入 破故紙 炒 陳皮 去白 蒼朮 切炒 黃色

附子 炮去皮 臍

右等分為末入青鹽同酒煮麪糊圓梧桐子大每服

三十圓空腹鹽湯下

無比山藥圓治丈夫諸虛百損五勞七傷頭痛目眩手

足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髁不生肌肉食少

脹滿陽氣衰絕陰氣不行此藥補經脈起陰陽安魂魄

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

開三焦破積聚厚腸胃強筋練骨輕身明目除風去冷

無所不治 赤石脂 茯神 各一兩 山藥 二兩 苁蓉 酒浸 四兩

巴戟 去心 杜仲 去皮 炒 牛膝 去苗 酒浸 一兩

五味子 揀六 澤瀉 一兩 兔絲子 酒浸 三兩

熟乾地黃 酒 山茱萸 各一兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓至三十圓食

前溫酒或米飲下此藥通中入腦服後鼻必酸疼勿

恠

拱辰丹男子方當壯年而真氣猶怯此乃稟賦素弱非虛而然僭燥之藥尤宜速戒勿謂手足厥逆便云陰多如斯治之不惟不能愈疾大病自此生矣滋益之方羣品稍衆藥力微細難見功效但固天元一氣使水升火降則五臟自和百病自去此方主之

鹿茸

酥炙去
皮毛

川當歸

洗去
土

山茱萸

新好有肉紅潤
者去核各四兩

麝香

半兩
別研

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

右三件為末入麝香伴勻酒煮麪糊為圓梧桐子大每服一百粒或五十粒溫酒鹽湯任下

免絲子圓治腎氣虛面色黧黑目暗耳鳴心忪氣短舉動乏力脚膝緩弱小便滑數房室不舉股內濕痒小便澀痛出血遺瀝久服補五臟去萬病益顏色聰耳明目

免絲子

淨洗酒浸
炒一兩

石斛

去根
三分

熟地黄

去土
酒炒

白茯苓

去皮
三分

川牛膝

去苗酒浸
焙乾三分

五味子

半兩

澤瀉

一兩

山茱萸

水洗去核
三分

鹿茸

去毛酥
炙一兩

川續斷

三分

桑螵蛸

酒浸
炒

覆盆子

去枝葉并
萼各半兩

防風

去苗
義

杜仲

去麤皮炒
各三分

石龍芮

去土
一兩

肉苁蓉

酒浸
切焙

補骨脂

酒炒

萆澄茄

黑角沉香

炒

川巴戟

去心
各三分

大川芎

半兩

肉桂

去麤皮

綿附子

炮去皮
臍一兩

右為末酒煮麪糊為圓梧桐子大每服二十圓溫酒或鹽湯下空心脚膝無力木瓜湯下晚食前服

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

大固陽湯治脫陽證或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接不醒人事或傷寒新瘥誤行房小腹緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽證須臾不救

附子

一兩重炮
切作八片

白朮

乾薑
各半兩

木香

一分

右剉散用水二椀煎至八分去滓放冷灌服須臾又進一服合滓併

又方桂枝二兩好酒二升煎至一升候溫分作二服灌



之

又方白蓮鬚三七莖細剉砂盆內研細用酒五升煮至二升分作三服灌之陽氣即回又生薑二七寸切碎研酒煎服亦效仍炒葱白或鹽熨臍下氣海勿令氣冷正氣補虛湯治憂恚思慮喜怒不常失饑勞力或飲食不調肌肉減耗榮衛虛弱外邪所襲入於經絡頭痛昏悶拘攣增寒壯熱身疼腰倦脚弱轉筋自汗手足冷四體麻痺五臟諸虛百病並皆治之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

人參

藿香葉

厚朴

薑去麤皮
汁炒

黃耆

兩各二

交趾桂

一兩

川白芷

二兩

大當歸

二兩去尾

五味子

白朮

兩各一

半夏

綿附子

一兩炮各

熟地黄

炒洗酒

川芎

白茯苓

兩各二

丁香

南木香

乾薑

甘草

兩各一

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗子二枚煎空心溫服

痼冷

金粟黃芽丹又名太乙紫霞丹此丹養火不計歲年有起死回生之功蘊脫胎換骨之妙昔鍾呂陰三真人張柏子所煉皆此丹也粒至小功甚大應諸虛百損五勞七傷八風五痺沉寒痼冷水腫蠱氣久痢久瘧一切男女老幼困憊之疾百藥不能療者悉皆主之初服覺腹中微擾或欲吐瀉則是驅逐諸病無病則不動再服則不覺經云服丹之人能絕嗜慾斷五腥不食雞魚大蒜陳臭等物當為地仙矣若未免此服及一兩延壽一紀

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

大率救憊扶危衛生伐病無出此丹之右服時以平旦取一粒在手內搓令暖置口中可加至十粒或用棗肉圓面東叩齒密念呪曰返我常歸我鄉服之千日朝虛皇一氣七遍以井花水或人參棗湯送下孕婦不可服此丹無方惟有丹母不知是何藥修煉得成修煉時以大朱砂一斤抽汞置丹母於鼎內以汞安於丹母上覆以真金箔五十片於靜室養火朝東北暮西南一日後開鼎如覺丹母傷火以濃煎沉香水浴一載



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

後丹成如穀芽樣或如花果樣用銀剪刀剪下入大蘿蔔內蒸一伏時以蘿蔔深黑為度取出用玉石杵白研為細末以木蜜為圓圓如粟米大依前湯引服大有功效所惜者此丹母自北而南多為名宦巨室收藏不入醫家抽汞修煉家另有法

聚寶養氣丹治諸虛不足氣血怯弱頭目昏眩肢節倦怠心志昏憤夜夢失精小便滑數脾胃氣虛又治諸風癱瘓半身不遂語言寒澁肢體重痛寒濕氣脾或久寒

欽定四庫全書
世醫得效方
卷八

宿冷嘔瀉發瘧寒熱下痢赤白及腸風痔瘻下血不止婦人子臟久冷崩漏帶下五色月候不調腹脇刺痛血痕血閉運行乏力並皆治之

代赭石 紫石英 赤石脂 禹餘糧

以上四味各二兩醋煑水飛過搜作錠子候十分乾入小合內養火三日罐子埋地中出火毒一宿

陽起石 煨 肉豆蔻 麪包 鹿茸 酒炙 破故紙 酒炒

鍾乳粉 五靈脂 酒研 茴香 酒炒 柏子仁

當歸 酒浸炙 遠志 去心 沒藥 別研 白茯苓

附子 炮 天雄 炮 胡椒 沉香
丁香 木香 乳香 黃耆 蜜炙
山藥 茯苓 焙 肉桂 巴戟 各半
血竭 琥珀 朱砂 麝香 錢各三

右為末糯米糊圓梧桐子大留朱砂麝香為衣每服三十圓空心人參湯或棗湯下婦人醋湯

黑錫丹治丈夫元臟虛冷真陽不固三焦不和上熱下冷耳內虛鳴腰背疼痛心氣虛乏飲食無味膀胱久冷

欽定四庫全書
世醫得效方
卷八

夜多小便婦人月事愆期血海久冷惡露不止赤白帶下及陰毒傷寒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一二百粒即便回陽此藥大能調治榮衛升降陰陽補損益虛回陽返陰

黑錫 洗溶了 硫黃 透明者 附子 炮去皮

破故紙 酒浸 肉豆蔻 麪包 茴香 炒

金鈴子 蒸去核 陽起石 酒炙 木香

沉香 各一兩 肉桂 半兩 胡盧巴 酒浸炒



右用新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒自朝至暮研令極細餘藥並杵羅為細末一處和停入研酒糊圓梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服五七十圓空心薑鹽湯或棗湯下婦人艾醋湯下如一切冷疾鹽酒鹽湯空心下三四十圓年高時有客熱服之大效

靈砂性溫無毒主五臟百病益精養神補氣明目安魂魄通血脈止煩滿殺邪魅善治榮衛不交養陰陽不升

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

降上盛下虛頭旋氣促心腹冷痛翻胃吐逆霍亂轉筋臟腑滑泄赤白下痢久服通神輕身不老令人心靈此丹按仙經服餌之法會五行符合之妙體性輕清不隨煙焰飛走男女老幼皆可服

水銀 一斤
硫黃 四兩

右二味用新鐵銚炒成沙子或有煙焰即以醋酒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口鉄線札縛曬乾鹽泥固濟用炭二十斤煨如鼎子裂筆蘸赤石脂頻抹



迪志文化出版有限公司出版

其處火盡為度經宿取出研為細末糯米糊為圓如麻子大每服三粒空心棗湯米飲或井花水人參湯服量病輕重增至五七粒忌猪羊血菘豆粉冷滑之物

歲丹以前靈砂養火十二月乃名歲丹補諸虛用之其功十倍

三建湯治真氣不足元陽久虛寒邪攻衝肢節煩疼腰背痠楚自汗厥冷大便滑泄小便白濁及中風涎潮不

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

省人事傷寒陰證厥逆脈微皆可服之

天雄 附子 大川烏
各炮去皮臍淨秤一兩

右剉散每服四錢水二盞薑十片煎不拘時服氣不順加木香沉香加丁香胡椒名丁胡三建湯

金液丹固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中諸虫失精遺溺形羸力劣腳膝疼弱冷風頑痺上氣衄血咳逆寒熱霍亂轉筋虛滑下痢又治痔瘻濕蠱生瘡下



迪志文化出版有限公司出版

血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔

硫黃

淨揀去沙石十兩研細飛過用瓦合子盛以水和赤石脂封口以鹽泥固濟曬乾地內先

埋一小罐子盛水令滿安合子在上用泥固濟訖漫火養七日七夜候足加頂火一斤煨候冷取出

研為細末

右藥末一兩用蒸餅一兩湯浸握去水和為圓梧桐

子大每服三十圓多至百圓溫米飲下空心服之又

治傷寒陰證身冷脈微手足厥逆或吐或痢或自汗

不止或小便不禁不拘圓數宜併服之得身熱脈出

欽定四庫全書



世醫得效方
卷八

為度

附子理中圓治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐泄痢霍亂轉

筋體冷微汗手足厥寒心下逆滿腹中雷鳴嘔噦不止

飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之

附子

炮去皮臍

人參

乾薑

炮

甘草

白朮

各三兩

右為末煉蜜圓每兩作十圓每服一圓以水一盞化

破煎七分空心稍熱服



迪志文化出版有限公司出版

震靈丹此丹不犯金石飛走有性之藥不僭不燥奪造

化冲和之功大治男子真元衰憊五勞七傷臍腹冷疼

肢體痠痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及

中風癱緩手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目

暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱

疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五

痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏

虛損帶下久冷胎臍無子服之無不愈者

欽定四庫全書



世醫得效方
卷八

禹餘糧

火煨醋炒不計遍次以手撚得碎炒

丁頭代赭石

如禹餘糧製同

紫石英

赤石脂

已上四味並作小塊入瓦罐內鹽泥固濟候乾用炭十斤

煨通紅火盡為度入

地坑埋出火毒二宿

的乳香

別研

沒藥

去沙

五靈脂

去沙石研各二兩

朱砂

水飛過一兩

右為末以糯米為糊圓如小雞頭大曬乾出光每一

粒空心溫酒下冷水亦可常服鎮心神駐顏色溫脾

腎理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入



迪志文化出版有限公司出版

仙道忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服
極有神效不可盡述

來復丹此藥配類二氣均調陰陽奪天地冲和之氣乃
水火既濟之方可冷可熱可緩可急善治榮衛不交養
心腎不升降上實下虛氣閉痰厥心腹冷痛臟腑虛滑
不問男女老幼危急之證但有胃氣無不獲安補損扶
虛救陰助陽為效殊甚

硝石

一兩同硫黃並為末入定磗內以微火慢炒
用柳杖子不住手攪令陰陽氣相入不可火

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

太過恐傷藥
力再研極細

太陰玄精石

一兩飛

青皮

去白二兩

陳皮

去白二兩

五靈脂

須擇五臺山者用水澄去沙石曬乾二兩

舶上硫黃

用透明不夾沙石者一兩

右用五靈脂青皮陳皮為末次入玄精石末及前硝
石硫黃末拌勻以好酒醋打糊圓豌豆大每服三十
粒空心粥飲吞下甚者五十粒小兒三五粒新生嬰
兒一粒小兒漫驚風或吐痢不止變成虛風搐搦者
非風也胃氣欲絕故也用五粒研碎米飲送下老人

伏暑迷悶紫蘇湯下婦人產後血逆上搶悶絕并惡
露不止及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽益精
神散腰腎陰濕止腹脇冷疼立見神效應諸疾不辨
陰陽證者並宜服之靈異不可具記

養正丹却邪輔正助陽接真治元氣虛虧陰邪交蕩正
氣乖常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神
怯弱夢寐驚悸遍體盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾
上喘胸胃吐食霍亂轉筋咳逆不定又治中風涎潮不
省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗唇青脈
沉最宜服之及婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹
痛悉能治療常服濟心火強腎水進飲食

水銀

黑錫

去沙淨秤與水銀結沙子

硫黃

研細

朱砂

研細各一兩

右用黑蓋一隻火上鎔黑鉛成汁次下水銀以柳杖
子攪勻次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫
黃末急攪成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研



如粉極細用糯米粉煮糊圓菜豆大每服二十粒加至三十粒鹽湯下此藥升降陰陽既濟心腎空心棗湯送下神效不可具述

玉華白丹清上實下助養根元扶衰救危補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脈沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄肌肉瘦瘁目暗耳鳴胃虛食減久瘡久痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神

欽定四庫全書

世醫得效方卷八

白石脂

淨瓦閣起火煅紅研細水飛半兩

鍾乳粉

煉成者一兩

陽起石

用甘草鍋盛於大火中煅令通紅取出酒淬放在陰地上令乾不可驟半兩

左顧牡蠣

七次洗用韭菜搗鹽泥固濟火煅放冷取白者秤半兩

右各細研如粉拌和作一處令勻研一二日以糯米粉煮糊圓如雞頭大入地坑出火毒一宿每服一粒空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦可常服溫平不僭不燥澤肌悅色祛除舊患婦人久無姙者以當歸熟地黃浸酒下便有符合造化之妙或久冷崩帶虛

損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少白粥壓之忌猪羊血菜豆粉恐解藥力尤治久患腸風臟毒

金鎖正元丹治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百節痠疼頭昏眩痛目暗耳鳴面色黃黑鬢髮脫落頭皮腫痒精神昏困手足多冷心胸痞悶繞臍切痛膝脛痠疼不能久立或膝弱隱痛步履艱難腰背拘急不得俯仰腹痛氣刺兩脇虛脹水穀不消大便不調嘔逆惡心飲食減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑

欽定四庫全書

世醫得效方卷八

數遺精白濁一切元臟虛冷皆治之

五倍子

四兩

巴戟

去心十三兩

茯苓

四兩

葫蘆巴

炒一兩

補骨脂

酒炒五兩

肉蓯蓉

洗焙半斤

龍骨

朱砂一兩半

右為末入研藥令勻酒糊圓梧桐子大每服十五圓至二十圓空心食前溫酒吞下鹽湯亦可四柱散治丈夫元臟氣虛真陽耗散兩耳常鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢倦怠小便滑數洩瀉不止凡臟氣虛弱者悉宜服之



木香濕紙 畏煨 茯苓 附子炮去 皮臍 人參各一 兩	右剉散生薑二片棗子一枚鹽少許煎空心食前服 薑附湯治同上方見中寒類	斂陽丹治諸虛不足心腎不安氣弱頭暈自汗力倦陽 氣不斂安神益志順氣調榮甚妙	靈砂 鍾乳各研 末二兩 金鈴子蒸熟 去皮核	沉香鎊 木香 附子炮去 臍	葫蘆巴酒浸 炒 陽起石研細 水飛 破故紙酒浸 炒	欽定四庫全書 世醫得效方 卷八	舶上茴香炒 肉豆蔻麪裹 煨 鹿茸酒炙	菝葜酒洗 牛膝酒浸 去蘆 巴戟去心 各一兩 肉桂半兩	當歸頭 一兩	右為末研和令勻酒煮糯米糊圓梧桐子大日乾每 服三十圓空心棗湯下鹽湯或溫酒亦可	沉附湯治上盛下虛氣不升降陰陽不和胸膈痞滿飲 食不進肢節痛倦	附子炮去 臍一兩 沉香剉分 半兩

右剉散分作三服水二盞薑十片煎至八分食前溫 服	著附湯治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠 黃耆去蘆 蜜炙 附子炮去 皮臍	右等分剉散每服四錢水二盞薑十片煎不拘時服 參附湯治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈但 是陽虛氣弱之證並宜服之	人參半兩 附子炮去 臍一兩	欽定四庫全書 世醫得效方 卷八	右剉散分作三服水二盞薑十片煎食前溫服 茸附湯治精血俱虛榮衛耗損潮熱自汗怔忡驚悸肢 體倦乏但是一切虛弱之證悉宜服之	鹿茸去毛 酒蒸一兩 附子炮去 皮臍一兩	右剉散分作四服水二盞生薑十片煎至八分去滓 食前溫服	桂附湯治虛汗不止及體虛失血大效	交趾桂一兩 去皮 綿附子一枚 炮去皮 臍

右剉散每服三錢水二盞薑三片棗二枚煎食前溫服

元陽秋石丹治羸弱久嗽針灸不效頭眩腹脹喘滿積年腫滿年少色慾過度未老眼昏膝疼遺泄白濁腰背時痛服之真還元衛生之寶

如竹器損以竹補之金器損以金補之

陰煉法小便三五石夏月雖腐敗亦堪用分置大盆中以新水一半以上相和旋轉攪百匝放令澄清辟去清者只留濁脚又以新水同攪水多為妙又澄去

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

清者直候無臭氣再研以乳男子乳和如膏烈日中暴乾如此九度仍須待好日色乃和蓋假太陽氣也第九度即圓之如梧桐子大暴乾每服三十圓溫酒下

陽煉法小便不計多少大約兩桶為一擔先以清水搗好皂角濃汁以布絞去滓每小便一桶入皂角汁一盞用竹篋急攪令百餘遭乃止直候小便澄清白濁皆碇乃止徐辟去清水不用只取濁脚併作一桶



迪志文化出版有限公司出版

又用竹篋子攪百餘匝更候澄清又辟去清者不用凡十數擔不過取得濃脚一二斗其小便須先以布濾去滓物取得濃汁入淨鍋內熬乾刮下搗碎再入鍋以清湯煮令化乃於筭箕內布筋紙兩重傾入紙筭箕內丁淋過取淋下清汁再入鍋熬乾又用湯煮化再依前法丁淋如熬乾色未潔白更准前丁淋直候色如霜雪即止乃入固濟沙合內歇口火煨成汁傾出如藥生成渴更煨一兩遍候瑩白玉色即止細

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

研入沙合內固濟頂火四兩養七晝夜久養火尤善再研每服二錢空心溫水下或酒棗肉為圓如梧桐子大每服三十圓亦得空心服陽煉陰煉日午各一服 又名還元丹咳嗽羸瘠針灸不效服此立愈常病顛眩腹鼓久之漸加喘滿經年垂困服此有驗皆只是火煉者又傳陰煉法云須得二法相兼其藥能洞入骨髓無所不至非惟治疾可以常服有功無毒火煉秋石人皆能之煎煉時大作爐鼎煎煉數日臭



迪志文化出版有限公司出版

達四隣此法極費力只一小鍋便可煉體如金石永不暴潤與常法功力不侔久病人只數服極為神效實能再生人也

灸法腎與膀胱俱虛灸腎脬伯壯穴在對臍兩邊向後夾脊相去各一寸五分兼治便濁失精五臟虛勞瘕冷小腹弦急

夢泄精三陰交二七壯夢斷神良穴在內踝上大脈並四指是

欽定四庫全書
世醫得效方
卷八

諸虛極灸膏肓膈氣海穴壯數愈多愈妙

五痿

加味四斤圓治腎熱肝虛熱淫於內致筋骨痿弱自不勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

菴蓉 酒浸 牛膝 酒浸

天麻 木瓜乾

鹿茸 燎去毛 熟地黃 五味子 酒浸 兔絲子 酒浸

研別

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒米飲食前任下一法不用五味子有杜仲

麋角圓治五痿皮緩毛痺血脈枯槁肌肉薄著筋骨羸弱飲食不滋庶事不興四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥疲倦不能支持

麋角 鎊一斤重 酒浸一宿 大附子 生去皮臍 一兩半 熟地黃 四兩

右用大麥米二升以一半藉底以一半在上以二布中隔覆炊一日取出藥與麥別焙乾為末以浸藥酒

欽定四庫全書
世醫得效方
卷八

添清酒煮麥粉為糊搜和得所杵三千下圓如梧子

大每服五十圓溫酒或米湯下食前服

芎桂散治四肢疼痛輭弱行履不便

川烏頭 二兩切作片水浸一宿切作筭子條更以米湯浸一宿不洗日乾麪炒微赤為度乾

川芎 兩半 桂心 一兩 甘草 炙

乾薑 炙 各一分

右為末每服二錢溫鹽酒調下日三服

藿香養胃湯治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽



明虛宗筋無所養遂成痿痺

藿香

白朮

白茯苓

神麴炒

烏藥去木

縮砂仁

薏苡仁炒

半夏麴

人參各半兩

華澄茄

甘草炙各三錢半

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片棗一枚同煎七分去滓不以時服

積熱

三黃圓治三焦積熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱

欽定四庫全書



世醫得效方卷八

氣上衝口苦唇咽喉腫痛痰涎壅滯眼赤睛疼及大便

秘澀或下鮮血

大黃酒蒸

黃連去鬚

黃芩各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓不拘時熱水

下臟腑壅實可加圓數以利為度

荊黃湯治風熱結滯或生瘡癰

荊芥四兩

大黃一兩

右剉散每服三錢水一盞半煎空心服

涼膈散治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩

燥多渴腸胃秘澀便溺不利一切風熱並能治之

連翹四兩

甘草

川大黃

朴硝各二兩

薄荷去梗

黃芩

山梔子仁各一兩

右剉散每服三錢竹葉七片蜜少許煎食後服為末用薄荷湯調亦可

洗心散治風壅涎盛心經積熱口苦唇燥眼澀多淚大

便秘結小便赤澀

欽定四庫全書



世醫得效方卷八

白朮一兩半

麻黃和節

當歸去苗洗

荊芥穗

芍藥

甘草

大黃麴炒各六兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片薄荷葉七皮煎服為末茶清調亦可

八正散治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大

渴引飲心忪面熱煩燥不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌

生瘡咽喉腫痛又治小便赤澀或癰閉不通及熱淋血

淋



車前子	瞿麥	扁畜	或用薄荷代	白滑石
甘草	梔子仁	木通	去皮節	大黃
			各半斤	
右剉散每服三錢水一盞半用燈心十莖煎食後臨				
卧溫服小兒量力少與之或加麥門冬去心尤妙				
甘露飲治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齲腫				
爛時出膿血目臉垂重常欲合閉或即饑煩不欲飲食				
及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發				
未發皆可服之又療脾胃受濕瘰癧熱在裏或醉飽房勞				
欽定四庫全書	世醫得效方	卷八		
濕熱相搏致生疽病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大				
便不調小便黃澁或時身熱並皆治之				
枇杷葉	去毛	乾熟地黃	天門冬	去心
山茵陳				
枳殼	去穰炒	石斛	去蘆	甘草
黃芩				
生乾地黃	麥門冬	去心		
右等分剉散每服二錢水一盞煎食後臨卧溫服小				
兒一服作兩服仍量歲數加減				
消毒犀角飲治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅				

急眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚徧身風癰瘡毒赤癰				
及瘡疹已出未出不能快透並皆治療小兒疹痘欲出				
及已出熱未解急進此藥三四服快透消毒應手神效				
防風	二兩	鼠粘子	炒	一斤
荆芥穗	八兩	甘草	半斤	
右剉散每服三錢水一盞煎食後溫服				
青金丹清心解熱除潮治譫語舌生白胎痰盛氣壅煩				
渴引飲及時行熱疫發熱如火連日不愈或熱極生風				
大人小兒均可服				
欽定四庫全書	世醫得效方	卷八		
天門冬	去心	麥門冬	各一兩	天麻
二分				全蝎
雄黃	一錢			
牙硝	二錢	天竺黃	二分	礞砂
一錢				雄黃
一錢				水粉
一兩				
紫粉	四錢	白附子	二分	辰砂
一錢				水粉
一兩				
片腦子	半錢	生麝香	半錢	金銀箔
各十片				
右另研腦麝辰砂水粉金銀箔同前藥末入白麪二				
兩水圓以靛花為衣如筋頭大每圓用麥門冬生地				
黃燈心薄荷煎湯磨化服合時加甘草人參尤妙				
薄荷煎治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛				



薄荷 一斤取頭末 用二兩半 腦子 半錢 別研川芎 半兩取末二錢	甘草 半兩取末 二錢半 縮砂仁 半兩取末二錢	右和勻煉蜜成劑任意嚼嚥一方無腦子有桔梗	玄明粉治邪熱所干膈上氣滯五臟秘澀	右以朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用甕罐子按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煨便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研	為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨卧酌量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下	朴硝性本寒燒過性溫無毒	天竺黃散治臟腑積熱煩燥多渴口舌頰生瘡咽喉腫痛目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛上壅痰喘伏暑燥熱瘡疹	山梔子 去殼連翹 各三錢 甘草 二錢兩 芩薤根 一錢兩	雄黃 雞冠色 天竺黃 五錢 鬱金 用皂角水煮切 片焙乾三錢

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八



迪志文化出版有限公司出版

右為末每服一錢食後臨卧汲新水調下妙凡積熱病服之胸次頓爽或瘡痢瘡疾服之厚痂成片自落	神芎圓治諸熱 方見頭痛類	四順清涼飲治血脈壅實腑臟生熱頰赤多渴五心煩燥睡卧不寧四肢抽掣及因飲食不時寒溫失度血氣不理腸胃不調或溫壯連滯欲成伏熱不歇欲發風癰又治風熱結核頭面瘡癬目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服	大黃 米下蒸 赤芍藥 當歸 去蘆 甘草 各等分	右剉散每服三錢水一盞半煎食後臨卧溫服小兒量大小虛實加減微澹利為度加荊芥穗尤妙	大三黃圓治三焦脹熱咽喉腫閉心膈煩燥小便赤澀口舌生瘡目赤睛疼燥渴心煩齒痛	大柏皮 黃連 山豆根 黃芩 各四錢	滑石 二錢 黃藥 四錢 鵬砂 二錢 腦子	麝香 甘草 各錢 百草霜 四錢

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八



迪志文化出版有限公司出版

右為末新汲井花水圓如小指頭大每服一圓入口
噙化旋旋嚥下

解毒雄黃圓取積下熱去風毒

雄黃 研飛 川鬱金 各一分 巴豆 十四個去油

右為末稀水麪糊圓或水圓如麻子大每服五圓加
至七圓熱茶清下裏實用此喉閉以熱茶清調灌下

牛黃涼膈圓治上焦壅熱口乾咽痛煩燥涎潮

馬牙硝 寒水石 煨 硬石膏 各二兩 甘草 炙一兩

欽定四庫全書 世醫得效方卷八

紫石英 半兩研飛 牛黃 腦子 麝香 各一兩

牛膽南星 三分

右為末煉蜜圓每兩作四十圓每服一圓溫薄荷人

參湯調下

防風通聖散治一切風熱鬱結氣血壅滯筋脈拘攣手
足麻痺頭痛昏眩腰脊強痛口苦舌乾咽嗑不利胸膈
痞塞咳嗽喘滿腸胃燥澀大小便秘難中風暴痞不語
風熱瘡疥并酒熱毒小兒熱甚驚風並宜服之 方見風科熱證

類

灸法治胃中熱病灸三里三十壯穴在膝下三寸

心恙

熱證朱砂圓鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴

鐵粉 天竺黃 各一兩 金銀箔 各二十片 人參 二錢

腦子 半錢 生麝香 一錢 輕粉 二錢 真犀角 二錢

海金砂 一兩 朱砂 五錢

右為末水圓朱砂為衣共圓作六百圓每一圓至五

欽定四庫全書 世醫得效方卷八

圓痰盛潮熱薄荷沙糖生薑自然汁井水下狂言譫

語涎壅膈上地龍三兩薄荷及沙糖水研心神不寧

金銀箔薄荷湯下

洗心散治心神煩燥涎壅咽乾口苦多渴 方見積熱類

澄心湯治心受積熱譫言發狂逾牆上屋

大黃 黃芩 黃連 各五錢

右剉散每服四錢水一盞半煎服

甘遂散治癰瘤及婦女心風血邪



右以甘遂一錢為末用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作兩片入在內再合線縛定外用皮紙裹濕慢火煨熟不可焦過取藥細碾入辰砂末一錢和勻分作四圓每服一圓將所煨猪心煎湯化下再服別用猪心亦可過半日大便秘下惡物後調和胃氣凡此病乍作乍醒者甦不食迷癡者死

辰砂妙香散治男子婦人心氣不足志意不定驚悸恐怖悲憂慘憾虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味

欽定四庫全書

世醫得效方卷八

頭目昏眩

麝香一錢別研

山藥薑汁炙一兩

人參半兩

木香煨一兩半

茯苓不焙

茯神去皮不焙

黃耆各一兩

桔梗半兩

甘草炙半兩

遠志去心薑汁炒一兩

辰砂三錢別研

右為末每服二錢溫酒調不以時候

虛證引神歸舍丹治心氣亦治心風

大天南星

剉去皮取心秤一兩生用

附子

一枚重七錢以上者炮去皮臍

朱砂

一兩飛

右為末用猪心血圓梧子大如不稠粘入麪糊少許煎忘憂草根湯下

茯神圓治心虛或癲或痰

附子

大者一枚作罌入塊粒朱砂半兩依舊用元物塞之以茯神和麪作劑通裏煨

右為末豬猪心血為圓人參湯下

驚氣圓治驚憂積氣心受風邪發則牙關緊急涎潮昏

塞醒則精神若癡

附子

炮去皮臍

南木香

白僵蚕炒

花蛇酒浸炙去

欽定四庫全書

世醫得效方卷八

骨皮

橘皮

麻黃去節各半兩

乾蝎去毒一分

紫蘇子炒一兩

天南星

洗浸薄片薑汁浸一夕半兩

朱砂留一分少

許為衣

右為末入研腦子麝香少許同研勻煉蜜圓如龍眼

大用少朱砂為衣每服一圓金銀薄荷湯化下溫酒

亦可

鎮心圓治心氣不足老人虛人及用心過度者心脈虛

弱而心恙並宜服之



右用大附子一箇去皮臍切作片子疎絹袋盛用地

黃自然汁一大升銀石器中慢火熬候地黃汁將盡

取出附子曬乾為末再入餘地黃汁研成劑圓如菴

豆大每服三十圓米飲下若病二三十年者只兩箇

附子可較二三年者一箇附子較矣

通治鐵粉散治顛狂譫語亂說神祟不避親疎登高履

險或歌或笑裸體不飲食數日昏不知人及風證狂怒

或如醉如癡

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

顛塊大朱砂 一兩
另研

紅明琥珀 一兩
另研

大南星 二兩
圓白半夏 二兩
白礬 五錢

真鐵粉

白附子 各二兩
大川烏 一兩
生去皮臍

羌活 二兩
半

全蝎 五十箇
真金箔 三十片

殭蠶 一兩
去絲

嘴

右為末每服四錢生薑四兩淨洗取自然汁溫暖調

服如不任辣味加溫水少許服之立效

十四友圓補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不寧精

神昏倦睡卧不安

柏子仁 別研 遠志 去心酒浸炒 酸棗仁 炒香

紫石英 明亮者 熟乾地黃 洗 川當歸 洗 白茯苓 去皮去

茯神 去皮 人參 去蘆 黃耆 蜜炙 阿膠 炒各

肉桂 去麤皮 龍齒 二兩 辰砂 半兩
另研

右為末煉蜜圓如梧子大每服三四十圓棗湯食後

臨卧服舊有患心疾怔忡健忘夢寐恍惚多不得睡

異狀無不有心藥無不服未能收效蓋此疾本憂愁

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

思慮耗心血而得之今欲安心當用當歸地黃等滋

養心血若更服發散藥如菖蒲之類心氣愈散必收

斂之始見功效緣用心過而成此疾也服之大覺有

神效

寧志圓好朱砂一兩將熟絹一小片包裹以線扎定殭

猪心一枚竹刀子切破不得犯鐵用紙拭去血入朱砂

包子於猪心內却用麻線縛合猪心又以甜筍殼再裹

了麻皮扎定無灰酒二升入砂罐子或銀器內煮酒盡



為度去線并筍殼取朱砂別研將猪心竹刀細切砂盆內研令爛却入後藥末并朱砂棗肉為圓留少朱砂為衣藥末須隔日碾下棗肉於煮猪心日絕早煮熟剝去皮核取肉四兩用患心風服此一料其病頓減

人參

白茯苓

當歸洗去土及蘆

石菖蒲

乳香別研

酸棗仁

用五兩湯浸去皮可剝半兩用仁炒令赤香熱為度各半

重兩

右為末和圓如梧子大以留下朱砂為衣每服五十

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

圓人參湯下

抱膽圓治男子婦人一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致者及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪蘊結頓服此累曾經效

水銀二兩

朱砂一兩細研

黑鉛一兩半

乳香一兩細研

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木搥研勻圓如雞頭大每服一圓空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再一圓

可除根

一醉散治心恙

無灰酒

二碗 真麻油 四兩

右和勻用楊柳枝二十條逐條攪一二百下換遍柳條直候油酒相入如膏煎至七分椀狂者強灌之令

熟睡或吐或不吐覺來即醒

又方蕊珠圓

大猪心

一枚 大朱砂 二兩 青靛花 一匙

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

右先將青靛花同猪心血一處同研次以朱砂末共

圓如梧子大每服二十圓茶酒下不拘時甚者不過

三服

飲盆散治顛狂可畏數年不愈多因驚憂得之痰涎留

療心竅

蟬肚鬱金

七兩真蜀川來者

明礬 三兩

右為末薄糊為圓如梧子大每服五十圓湯水任服初服覺心胸間有物脫去神氣洒然再服稍甦多服



此藥大能去痰安平必矣

朱雀圓治心神不定恍惚不樂火不下降時復振跳常服消陰養火全心氣

茯神 二兩 去皮 沉香 半兩

右為末煉蜜圓如小豆大每服三十圓食後人參湯

下

陳艾湯治盜汗只自心頭出者名曰心汗

茯苓 二兩 半

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

右為末每服二錢濃煎艾湯調下

歸神丹治一切驚憂思慮恍惚作事多忘心氣不足癲癇狂亂及大病後心虛神不守舍久服養神思益眼力

顆塊大朱砂 二兩 入猪心內燈心纏縛用無灰酒蒸二炊久取出另研

金箔 二十片 另研 真金箔 二十片 別研 深紅琥珀 一兩 別研

酸棗仁 二兩 去殼 大遠志 一兩 取淨皮薑汁拌炒

白茯神 二兩 去木 羅參 二兩 大當歸 二兩 去毛

龍齒 一兩

右為末酒煮稀糊圓如梧子大每服二九圓至三九圓去心麥門冬湯下癲癇甚至者乳香人參湯下夜寢不寐或多亂夢炒酸棗仁湯下

平補鎮心丹治丈夫婦人心氣不足志意不定神情恍

惚夜多異夢忪悸煩鬱及腎氣傷敗血少氣多四肢倦

怠足麻酸疼睡卧不穩夢寐遺精時有白濁漸至羸弱

酸棗仁 去皮 炒二錢半 車前子 去砂土 碾破 一兩二錢半

白茯苓 去皮 五味子 去枝梗 一兩二錢半

欽定四庫全書 世醫得效方 卷八

熟地黄 洗酒 蒸 天門冬 去心 草水浸 遠志 去心 甘草

山藥 洗淨薑汁製 各一兩半 茯神 去皮 麥門冬 去心

肉桂 不見火 各一兩二錢半 人參 五錢 龍齒 一兩 半

朱砂 細研半兩 為衣

右為末煉蜜圓如梧子大每服三十圓空心飯飲下

溫酒亦可加至五十圓常服益精髓養氣血悅顏色

獨效苦丁香散治忽患心疾癲狂不止得之驚憂之極

痰氣上犯心包當伐其源



右以苦丁香即爪蒂半兩為末每服一錢重井花水調滿一盞投之得大吐之後熟睡勿令人驚起凡吐能令人目翻吐時令閉雙目或不省人事則令人以手密掩之信乎深痼之疾必投瞑眩之藥吐不止以生麝香少許溫湯調即解

灸法狂癇不識人癲病眩亂灸百會九壯 狂邪鬼語

灸天憑九壯其穴在頸大筋前曲頰下扶突後動應

手陷中是 狂言恍惚灸天樞百壯其穴去育脢一

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

寸半直臍傍二寸 狂癇哭泣灸手逆注三十壯穴

在左右手腕後六寸 癲狂風癇吐舌灸胃脘百壯

不針 狂邪發無常被髮大喚欲殺人不避水火及

狂言妄語灸間使參十壯穴在腕後五寸臂上兩骨

間 狂走喜怒悲泣灸臣覺穴隨年壯穴在背上夾

內側反手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也 鬼

魅灸入髮一寸百壯 狐魅合手大指縛指灸合間

參七壯當狐鳴即瘥

卒狂言鬼語以帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肋頭兩處各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手 卒中邪魅恍惚振噤灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾圓半在爪上半在肉上各七壯不止十四壯艾炷如雀糞大 卒狂鬼語針其足大拇指甲下入少許即止

怔忡

益榮湯治思慮過制耗傷心血心帝無輔怔忡恍惚善

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

悲憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸

去蘆酒浸

黃耆

去蘆

小草

酸棗仁

炒殼

柏子仁

炒

麥門冬

去心

茯神

去木

白芍藥

紫石英

研各一兩

木香

不見火

人參

甘草

各半兩

右剉散每服四錢生薑五片棗一枚煎不以時溫服

龍齒丹治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒

附子

炮去皮臍切片薑汁浸一宿



遠志 去心 甘草 酸棗仁 炒去殼	官桂 不見火 琥珀 別研	木香 不見火 沉香 別研	熟地黃 酒蒸 焙 各半兩	右為末煉蜜圓如梧子大朱砂為衣每服五十圓不拘時候棗湯吞下	茯苓飲子治痰飲蓄於心胃怔忡不已	赤茯苓 去皮 半夏 湯炮 七次	橘皮 去白 各一兩 沉香 不見火	右剉散每服三錢薑五片煎不拘時候溫服	排風湯治風虛冷濕閉塞諸經怔忡 方見風科通治類 加酸棗仁一撮煎	加味壽星圓治驚憂思慮氣結成痰留蓄心胞怔忡驚	惕痰逆惡心睡卧不安 方見風科通治類	棗肉靈砂專治虛人夜不得睡夢中驚魘自汗忪悸	靈砂 二分 研	人參 半分	酸棗仁肉 一分	右為末棗肉圓臨卧時棗湯吞下五七粒



薑朮湯治虛證停飲怔忡	白薑 生	白朮	茯苓	半夏 各半兩	辣桂	甘草 炙 各一分	右剉散每服三錢水一盞生薑三片紅棗一枚煎溫服不拘時候	五苓散治水氣心下怔忡 方見傷暑類	驚悸	十味溫膽湯治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象惑遂致心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安	半夏 湯洗 七次	枳實 去穢 切 炒	陳皮 去白 各三兩	白茯苓 去皮 兩半	酸棗仁 微炒	大遠志 去心 薑汁炒 一兩	北五味子 熟地黃 酒切 炒	條參 各一兩	粉草 五錢	右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎不以時服



遠志圓治因事有所大驚夢寐不祥登高陟險神魂不安驚悸恐怯

遠志

去心薑汁淹

石菖蒲

各二錢

茯神

去皮木

茯苓

人參

龍齒

各一兩

右為末煉蜜圓如梧子大辰砂為衣每服七十圓食

後臨卧熟水下

十四友圓治驚悸不寧

驚氣圓治挾風驚懾

同上方並見心恙類

欽定四庫全書



世醫得效方卷八

加味四七湯治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏

製二兩半

茯苓

厚樸

各兩半薑汁炒

茯神

紫蘇葉

各兩

遠志

薑汁炒溫取肉焙乾

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢薑七片石菖蒲半寸棗二枚煎服

疰疰

還魂湯治精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或復附著奄忽氣絕無復覺知或謔言罵詈如醉如狂人有起心先知其肇其狀萬端不可槩舉及卒心腹脹滿吐利

不行如乾霍亂狀世所謂衝惡是也或已死口噤不開去齒下湯或湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡二升須臾立甦

杏仁

去皮尖一百五十粒

甘草

桂

去麤皮各一兩

麻黃

去節洗一兩半

右剉散每服四大錢水一盞半煎不以時服

桃奴圓治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤

厭夢不祥小兒驚癇並宜服之

欽定四庫全書



世醫得效方卷八

桃奴

七枚別研

辰砂

半兩別研

桃仁

十四枚去皮別研

生玳瑁

蚌末一兩

麝香

別研一分

牛黃

別研一分

龍腦

別研一分

雄黃

用桃葉煮水飛取二分

黑犀

石上以水磨澄去水取細末半兩

安息香

一兩以無灰酒斟酌多少研飛去沙上銀器中入桃仁琥珀熬成膏

真琥珀

別研三分

右為末和入前膏圓如雞頭大陰乾密器封閉淨室

安置煎人參湯研下一圓食後臨卧服

蘇合香圓治卒中惡忤疰

方見中氣類



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

灸法治飛尸遁尸寒尸喪尸尸症其狀腹痛脹急不得
息氣上衝心胸傍攻兩脇或壘塊踊起或攣引腰背
灸乳後三寸男左女右可二七壯不止者多其壯數
取愈止又灸兩大拇指頭七壯

一切症無新久先仰卧灸兩乳邊斜下三寸第三肋
間隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名疰市

五毒症不能食灸心下三寸胃管穴十壯

水疰口中涌水乃肺來乘腎食後吐水灸肺腧九壯

欽定四庫全書

世醫得效方
卷八

世醫得效方卷八

欽定四庫全書

子部
世醫得效方卷九

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣王鐸



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

健忘

小定志圓治心氣不定五臟不足甚者憂憂愁愁不樂忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發及因事有所大驚夢寐不祥登高履險致神魂不安驚悸恐怯

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

菖蒲 炒

遠志 去心薑汁淹各二兩

茯苓

茯神

人參 各三兩

辰砂 一兩為衣

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五十圓米湯下一

方去茯神名開心散每服二錢匕不以時服

菖蒲益智圓治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰耳

明目

菖蒲 炒

遠志 去心薑汁淹炒

桔梗 炒

人參 各三兩三分

桂心 三分

茯苓 一兩三分

附子 一兩去炮



迪志文化出版有限公司出版

臍皮

右為末煉蜜圓梧子大每服三十圓食前溫酒米湯

下

加味茯苓湯治痰迷心胞健忘失事言語如癡

人參 去蘆

半夏 湯洗

陳皮 去白一兩 白茯苓 去皮一兩

粉草 五錢

益智 去殼

香附子 炒去毛各一兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片烏梅半箇同

煎不拘時溫服

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

朱雀圓治心神恍惚舉事多忘

方見心恙類

虛煩

淡竹茹湯治心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂

及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬 去心

小麥 各二兩半

甘草 炙一兩

人參

白茯苓 各一兩半

半夏 湯洗七次二兩

右剉散每服四錢水二盞生薑七片棗子三枚淡竹

茹一塊如指大同煎食前服虛勞煩悶尤宜服之



迪志文化出版有限公司出版

溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也此藥主之又治驚悸自汗觸事易驚

半夏

竹茹

枳實

各二兩 欸炒去穰

陳皮

三兩

甘草

炙一兩

茯苓

半兩

人參

一兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎食

前服未效加遠志去心薑汁炒北五味子各一兩酸

棗仁一兩蚌粉炒入

酸棗仁湯治霍亂吐下增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不

欽定四庫全書



世醫得效方
卷九

得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁

炒一兩三分

人參

桂心

各一分

知母

茯苓

各三錢三字

石膏

煨半兩

甘草

炙二錢

右剉散煎同上

小草湯治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草

黃耆

去蘆

當歸

去蘆酒浸

麥門冬

去心

石斛

去根各一兩

酸棗仁

人參

甘草

炙各半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎不以時服

神妙散治傷寒後伏暑後煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮

去本二兩

防風

去蘆一兩

甘草

炙半兩

右剉散煎同上

清心蓮子飲治心中蘊積虛熱煩燥

方見消渴類

自汗

風證桂枝湯治傷風脈浮自汗惡風

桂枝

不見火

白芍藥

各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢生薑五片大棗二箇煎不拘時服

欽定四庫全書



世醫得效方
卷九

發汗汗不止者謂之漏風宜加炮熱附子一兩

暑證五苓散 消暑圓

卻暑散治傷暑自汗

方並見傷暑類

濕證朮附湯治傷濕自汗

方見傷濕類

防己黃耆湯治同上

方見四氣相感類

體虛牡蠣散治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常

自汗夜卧即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕短氣煩倦

牡蠣

米泔浸煨取粉

麻黃根

黃耆

知母

各一兩

右為末每服用小麥百餘粒煎湯濃調服一方為散



每三錢水三盞薤白三寸煎一盞半分三服
黃耆湯治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自汗或盜汗不止悉宜服之

黃耆去蘆蜜水灸一兩半 白茯苓去皮 熟地黄酒蒸

肉桂不見火 天門冬去心 麻黃根 龍骨各一兩

五味子 小麥 防風去蘆 當歸去蘆酒浸

甘草炙各半兩

右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發厥自汗

欽定四庫全書 世醫得效方 卷九

加熟附子發熱自汗加石斛未效或多喫麪食則安

撫芎湯治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎 白朮去油畧炒 橘紅各二兩 甘草炙半兩

右剉散每服四錢生薑七片煎溫服

建中湯治表虛自汗

官桂三分 芍藥一兩半 甘草炙半兩

右剉散每服四錢薑五片棗二枚食前服本方加黃

芪一兩名黃耆建中湯治虛勞自汗加當歸一兩名

當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂半兩熟附子半箇名桂枝附子湯每服四錢生薑七片棗子二枚空心煎服

防風散治盜汗

川芎一分 人參半分 防風二分

右為末每服一錢臨卧米飲調下

白朮散治盜汗極驗

白朮不拘多少剉成小塊或稍大

欽定四庫全書 世醫得效方 卷九

右用浮麥一升水一斗煮乾如白朮尚硬又加水一

二升煮取出切作片焙乾去麥不用研為末別用浮

麥湯每服二三錢不以時候

茯苓湯治虛汗盜汗

右用白茯苓為末煎烏梅陳艾湯調下二錢服之神

妙

大建中湯治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸

羸弱口苦舌澁心忪氣短



綿黃耆 炙	遠志 燈心 去心 炙	當歸 洗	澤瀉 各三兩
白芍藥	龍骨	人參 各二兩	甘草 炙一兩
右剉散每服四錢水二大盞生薑五片煎熱服氣弱加炮附子二兩腰痛筋急加去麋皮官桂一兩			
止汗溫粉			
右用川芎白芷藁本各一分為末入米粉三分綿裹撲於身上			
止汗紅粉			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷九			
麻黃根	牡蠣 火燉各一兩	赤石脂	龍骨 各半兩
右為末以絹袋盛如撲粉用之			
虛脫正元散治下虛手冷自汗 方見虛損類			
三建湯治真陽不足上盛下虛面赤自汗小便頻數 方見			
痢冷 類			
耆附湯桂附湯治氣虛陽弱虛汗不止四體倦怠 方見痢冷類			
虛勞麥煎散治榮衛不調夜多盜汗四肢煩痛飲食進			

退肌瘦面黃	秦艽	柴胡 去苗各二兩	大鼈甲 二兩醋炙三五沸去裙襖別用醋徐炙黃
乾漆 炒令煙盡	人參	茯苓	乾葛
川烏 炮去皮尖各一兩	玄參		
右為末每服二錢小麥三十粒煎湯一盞去麥入藥煎食後服如久患後亦宜服此以退其勞倦調理經絡			
青蒿散治虛勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾枯四肢懈			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷九			
脣骨節疼痛心腹驚悸咽燥唇焦頰赤煩燥涕唾腥臭困倦少力肌體潮熱飲食減少日漸瘦弱			
天仙藤	鼈甲 醋炙	香附子 炒去毛	桔梗 去蘆
柴胡 去苗	秦艽	青蒿 已上各一兩	烏藥 半兩
甘草 炙一兩半	川芎 二兩半		
右剉散每服薑三片煎不拘時候溫服小兒骨蒸勞熱肌瘦減食者每一錢水盞半小麥三十粒煎服			
陰汗大蒜圓治陰汗濕癢			



右用大蒜不以多少煨剥去皮爛研同淡豆豉末搜圓如梧子大朱砂為衣每服三十圓棗子燈心煎湯送下

青娥圓治同上每服五十圓酒服大效

方見虛損類

治陰汗溼癢方爐甘石一分真蚌粉半分為粉撲傳

治陰汗不止方小安腎圓臭乾舊醬煎湯入鹽少許吞下方見虛損類

洗方蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

宿食

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

香蘇散治宿食留飲聚積中脘噎臭腐氣心腹疼痛或

臟腑滯泄每服四錢生薑葱白烏梅煎

方見傷寒和解類

盧氏感應丸健脾進食消化宿滯酒食飽後宜服

方見諸積類

類

縮砂香附湯治心膈膨滿噎宿腐氣或時冷疼

方見諸氣類

穀神丸消食健脾益氣進美飲食

人參 縮砂 香附子

炒去毛

三稜 煨

莪朮 煨 青皮 陳皮 神麴 炒



迪志文化出版有限公司出版

麥芽炒 枳殼炒去穰各等分 右為末粳米糊圓梧子大每服三十圓空腹米飲吞下鹽湯亦可

紅圓子磨化宿食止腹痛

方見痰癰類

三稜煎圓治膨滿消食積氣塊及傷食夾臍痛甚

方見諸氣類

類

癆瘵

總說夫骨蒸殄殍復連屍症癆症蟲症毒症熱症冷症

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

食症鬼症皆曰傳屍者以症者注也病自上注下與

前人相似故曰症其變有二十二種或三十六種或

九十九種大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁

髮乾而聾或腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復

數箇或聚或散沈沈默默咳嗽痰涎或咯濃血如肺痿

肺癰狀或復下痢羸瘦困乏不自勝持積月累年以

至於死死後乃症易傍人乃至滅門是也凡疾始覺

精神不爽氣候不調切須戒慎酒色調節飲食如或



迪志文化出版有限公司出版

不然妄信邪師或言鬼祟以致不起慎之慎之又云男女傳尸之病心脅滿悶背膊疼痛兩目不明四肢無力雖欲寢卧卧不得寐脊脅急痛膝腦痠疼多卧少起狀如佯病每至平旦精神尚好日午向後四肢微熱面無顏色喜見人過常懷忿怒纔不如意又便多嗔行立脚弱夜卧盜汗夢與鬼交或見先亡或多驚悸有時咳嗽雖思飲食不能多餐死在須臾精神尚好或時微利兩脇虛脹口燥鼻乾常多粘唾有時唇赤有時欲睡漸成沈羸猶若涸魚不覺死矣

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

尸蟲遊食日辰及治法

大抵六蟲一旬遍遊四穴轉流周而復始具后六代法中自立春一日後食起三日一食五日一醉歸於所歸穴大醉五日故五日蟲醉可以下藥及灸其三日蟲食切不可妄有醫治蟲在人身中一蟲可占十二穴六蟲在人身中共遊七十二穴上旬十日從心至頭遊四穴中旬從心至臍遊四穴下旬從臍至足遊



迪志文化出版有限公司出版

四穴上旬可先服藥後灸所遊穴其蟲頭向上若下火灸蟲如紫蠶苗出在汗中更服藥取之以蟲盡為度便服補藥永得安耳中旬其蟲所遊穴中頭向內可服藥取之下旬蟲在所遊穴中頭向下亦服藥取之不灸也恐蟲覺悟永難取蓋此蟲性已通靈務在精審勿令有悟可也

觀尸蟲色知病淺深法

凡明醫者先須知毒氣與蟲並行政攻人臟腑遇陽日長雄蟲陰日生雌蟲緣先食臟腑脂膏故其蟲色白次食血肉血肉盡故其蟲黃赤次食精髓故其蟲紫色精髓盡故其蟲黑色傳入腎中病人方死須求醫士曉達病源先取其蟲視其色理自知輕重其蟲如白色可三十日服藥補之其蟲如黃赤色可六十日服藥補之其蟲如紫黑色此疾已極可百二十日服藥補之十中可保一二雖不能為一身除害亦可為子孫除害矣服藥仍須一載之中刻意調攝方可痊平

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九



迪志文化出版有限公司出版

如此得命可謂再生於世又云蟲頭赤者食患人肉其病可治頭口白者食患人髓其病難治只得斷後不傳子孫矣

世代傳病及諸蟲形狀

凡治病之道要須藥病相應效同神聖仍在瀉實補虛調治臟腑方得痊愈故三尸九蟲種種靈異莫令知之或似蜣螂或似紅絲馬尾或似蝦蟆或似刺蝟或似鼠形或如爛麪或有足無頭或有頭無足或化精血歸於元陽之內種種形類實難辨之淺學之流難施方劑誤醫甚多枉死不少或則取蟲不補或則淺學妄傳皆是徒費資財終無去病之理遂致夭折豈不悲哉

第一代謂初勞病受其病而不測病源酒食加餐漸覺羸瘦治療蹉跎乃至病重醫人不詳其故誤用湯藥枉而致死



欽定四庫全書

世醫得效方
卷九



迪志文化出版有限公司出版

此蟲在人身中如嬰兒狀背上毛長二寸



此蟲變動形如鬼在臟腑中



此蟲形如蝦蟆變動在人臟腑中

上三蟲在人身中染著之後或大或小令人夢寐顛

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

倒魂魄飛揚精神離散飲食不減形容漸羸四肢酸痛百節勞倦增寒壯熱背搏拘急腦與頭痛口苦舌乾面無顏色鼻流青涕虛汗常多行步艱難眼睛多痛其蟲遇丙丁日食起醉歸心膈穴中四穴輪轉周而復始大醉可醫矣取蟲出後補心當瘥

第二代為覺勞病謂傳受此疾已覺得病覺病者患乃自知夜夢不祥與亡人為伴醒後全無情思似醉神識不安所嗜食味輒成患害或則發氣動風所加四體不



迪志文化出版有限公司出版

和心胃滿悶日漸羸瘦骨節乾枯或嘔酸水或則醋心唇焦口乾鼻塞腦痛背痛酸疼虛汗常出腰膝刺痛如此疾狀須早醫治失時致傷命



此蟲如亂髮可長三寸或似守宮



欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

此蟲形如蜈蚣在人臟腑中



此蟲形如爛麪或長或短或圓或方

上諸蟲在人身中居於腎臟透連脊骨令人思食是物要餐身體汪羸腰膝無力髓寒骨熱四肢枯乾眼見火生或眼多黑暗耳內虛鳴陰汗燥痒冷汗如油夢與鬼交小便赤黃醒後昏沈臍下結硬或奔心胸看物如艷心腹悶亂骨節疼痛其蟲遇丑亥日食起醉歸腎臟穴四穴輪轉周而復始大醉可醫矣蟲出後補腎填精當瘥

取蟲防護法

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

先令病人家用好紙糊一密室不留些罅隙尋一老成人過遞以安息香水洒了過遞人之身又以雄黃雌黃塗其鼻孔耳眼唇上安排鐵鉗一个布巾一幅用香油二斤以鍋盛頓微煎令沸仍用高桶一个以好石灰在桶内生布巾蓋桶口却服取蟲藥五更初一服五更三點時一服服藥後腹中疼痛如刀斧劈不妨至已牌必須下蟲或取下臭穢如膠漆或吐瀉膿血癥塊皆於灰桶中其蟲或從汗出紫蠶苗狀或



於耳鼻口中出或小便中出異般形狀不止一也或青或黑或黃紅大者急用鐵鉗取於油內煎當日將油紙裹蟲入瓦罌內石灰填實埋棄於深山遠僻處免致再染人患人衣服床席並皆棄去醫人分付藥後亦須遠避

神效取蟲青桑枝飲

青桑枝

柳枝

石榴皮

桃枝

梅枝

各七莖並長四寸許

鬼白

五錢

青蒿

一小握

赤箭

五錢

欽定四庫全書



世醫得效方
卷九

右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉煎及一半

去滓別入安息香阿魏各一分再煎至一盞去滓調

辰砂末半錢檳榔末一分麝香一字分作二服調下

五更初一服五更三點時一服至己時必取下蟲紅

者可救青黑不治見有所下即進軟粥飯溫暖將息

不可用性及食生冷毒物合時須擇良日不得令猫

犬孝服穢惡婦人等見一方不用鬼白赤箭

雄黃圓

雄黃 半兩

兔糞 二兩

天靈蓋 一兩酥炙黃

鼈甲

木香 各半兩

輕粉

右為末法酒一升大黃半兩熬膏圓如彈子大朱砂為衣凡此疾先燒安息香烟吸之不嗽非傳尸也不可用此藥若烟入口咳不止乃尸也宜用此藥五更初服勿令人知用童子小便同酒一盞化一圓服之如人行二十里正吐出蟲或如燈心或如爛瓜李或如蝦蟆未效再服以應為度蟲用紅火燒之又用油

欽定四庫全書



世醫得效方
卷九

煎

神授散治諸傳尸勞氣殺蟲

川椒

二斤擇去子并合口者炒出汗

右為末每服二錢空心米湯調下須痺暈悶少頃如不能禁即以酒糊圓如梧子大空心服三五十圓昔人嘗與病勞婦人交婦人死遂得疾遇一異人云勞氣已入臟遂令急服二斤其病當去如其言服之幾盡大便出一蟲狀如蛇遂安續有人服之獲安濟者



多矣

虛證凝神飲子治勞瘵增寒發熱口乾咽燥自汗煩鬱咳嗽聲重唾中血絲瘦劇倦乏

人參去蘆

當歸去尾

白芍藥

白茯苓去木

白茯苓

黃耆去蘆

白朮

半夏麴

五味子

熟地黃洗酒蒸

甘草

蓮肉去心

大麥門冬

去心 桔梗各等分

右剉散每服四錢水一盞半烏梅紅棗各一箇煎服

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

如嗽加阿膠虛極胸滿者加木香濕紙裏煨沈香亦

可不思食加扁豆

劫勞散治心腎俱虛勞嗽時復三四聲遇夜發熱熱過

即有盜汗四肢倦怠體瘦恍惚異夢嗽中有血名曰肺

痿

白芍藥五兩

黃耆

甘草

人參

白茯苓

熟地黃洗酒蒸

當歸去尾

五味子

半夏麴

阿膠蚌粉炒各二兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎與凝神飲相類

黃耆飲子治諸虛勞氣四肢倦怠骨節酸痛潮熱乏力自汗怔忡日漸黃瘦胃脘痞塞不思飲食咳嗽痰多甚則唾血

黃耆蜜炙一兩半

當歸去蘆酒浸

紫宛洗去土

石斛去根

地骨皮

人參

桑白皮去赤

附子炮去皮臍

鹿茸酒蒸

欽冬花各一兩

半夏湯泡七次

甘草炙各兩

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

右剉散每服三錢生薑七片棗子一枚煎不拘時服

此藥溫補榮衛枯燥者不宜進此唾血不止者加阿

膠蒲黃各半兩

十全大補湯治虛勞發熱加北柴胡地骨皮煎方見虛損類

養榮湯 黃耆益損湯治同上

方見虛損類

熱證生犀散

方見前

枳殼半夏湯治嗽甚咽痛失音

方見痰飲類

溫金散治積勞咳嗽喘悶咯痰中有血



甘草 黃芩 桑白皮 防風去蘆各一 兩 茯神半兩 麥門冬一分 杏仁去皮尖米 泔浸一宿取出 握乾畧炒一兩	右剉散每服三錢水一盞入黃蠟一片如指頭大同煎食後熱服	鼈甲地黃湯治熱勞手足煩心怔悸婦人血室有乾血身體羸瘠飲食不為肌肉	柴胡去蘆 當歸去蘆酒浸 麥門冬去心 鼈甲炙醋 欽定四庫全書 世醫得效方 卷九	石斛去根 白朮 熟地黃酒浸 茯苓去皮 秦艽去蘆各一兩 人參 肉桂不見火 甘草炙各半兩	右剉散每服四錢水一盞半生薑五片烏梅少許煎不拘時服此藥專治熱勞其性差寒脾胃快者方可服餌弱甚而多汗者不宜服	阿膠圓治勞嗽並嗽血唾血	阿膠蛤粉炒 生地黃洗 卷柏葉 山藥剉炒 大薊根 五味子 雞蘇各一兩 柏子仁炒別研

人參 防風去蘆 麥門冬去心各半兩 右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼濃煎小麥湯或麥門冬湯嚥下	地仙散治骨蒸肌熱一切虛勞煩燥生津液	地骨皮二兩 防風去蘆一兩 甘草半兩 麥門冬一兩 心去	右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎不拘時候黃連飲治骨節間熱積漸黃瘦	黃連剉一兩 欽定四庫全書 世醫得效方 卷九	右用童子小便一大升浸經宿微煮三四沸去滓食上分二服如人行五里再服	四美圓凡骨蒸莫非是勞脊骨尤屬腎虛髓竭也以局方	黃耆鼈甲散 沈香鼈甲散 秦艽鼈甲散 青蒿鼈甲散 四散和合為末以雄羊脊骨一具斫碎煉汁調和為



圓溫酒吞下治脊痛骨熱漸成蒸疾一劑而效其功全在脊骨膏蓋醫者意也

通治太上混元丹河車者天地之先陰陽之祖乾坤之橐籥鉛汞之匡廓胚暉將兆九九數足我則戴而成之故謂之河車歷驗篇中名曰混沌皮蓋亦生天地陰陽之始為七十二丹之首高士垂慈始開端緒太上云若欲長生當修所生實資於此所以成功靈應非金石草木夜露曉霜之所比倫修真之士服之不輟誠足以返

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

本還元補益之道真得其真

紫河車

一具用初生男子者良蒂子全者以東流水洗斷血脈入麝香二錢在內以錢縫定

用生絹裏懸胎於砂瓶內入好酒五升慢火熬成膏子

沈香

朱砂

各一兩

人參

茯苓酒浸

乳香

各二兩

白茯苓

去皮

安息香

去沙酒熬各二兩

右為末入河車膏子和藥末杵千百下圓如梧子大每服七十圓空心溫酒送下沈香湯尤佳詳此丹以紫河車為主但佐使之藥太輕無病之人久服可以

輕身延年補損扶虛乃若病重之人服之却宜增添之法也一方有天靈蓋一片酥炙黃

治男子真陽耗竭腰背疼痛自汗怔忡痰多咳嗽夢遺白濁潮熱心煩脚膝無力宜於內加

鹿茸

火燎去毛酥炙

川巴戟

去心

鍾乳粉

陽起石

酒炙半日

附子

炮裂鹽水浸

黃耆

桑寄生

生鹿角

龍骨

紫苑

五味子

各一兩

右依法修製和前藥末用膏子為圓

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

治婦人血海虛損榮衛不足多致潮熱心煩口乾喜冷腹脇刺痛腰腿疼痰多咳嗽驚惕怔忡經候不調或閉斷不行宜於內加

當歸

去尾

石斛

去根

柏子仁

紫石英

醋米

淫七

鹿茸

去毛酥炙

鼈甲

醋炙各一兩

卷柏葉

一兩

土

川牛膝

酒浸一兩半去苗

右依法修製和前藥末膏子圓虛寒者加炮附子二兩咳嗽者加紫苑茸二兩



治熱勞尤加	
河車	依前法修治
鼈甲	醋炙半兩
桔梗	
白芍藥	
大黃	煨
甘草	
苦參	
貝母	
知母	
秋石	
豉心	
草龍膽	
黃藥子	
莪朮	煨
犀角鎊	
消石	各半兩
右為末以前膏子圓湯使如前	
蘊合香圓治傳尸骨蒸殭瘕肺痿疰疰鬼氣心痛霍亂	
時氣瘴癘等	
方見中氣類	
欽定四庫全書	
世醫得效方	
卷九	
青蒿散治男子婦人骨蒸勞增寒壯熱	
青蒿	春夏用葉秋冬用子用子不用葉用根不用莖四者相用而反以為癘疾必用童子小便
浸過	使有功
無毒	一握
大鼈甲	炙黃醋淬五次去腥
白朮	濕紙煨
熱	
地骨皮	
白茯苓	
粉草	炙
揀參	去頭
瓜蒌根	
北柴胡	去蘆
桑白皮	蜜炙
各半	
兩	
右為散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候	
加減黃耆建中湯治男子婦人五勞骨蒸者世用神效	

白朮	白茯苓	桔梗	人參
		錢各三	半三錢
秦艽	北柴胡	防風	白芍藥
	蘆去		
甘草	當歸	澤瀉	生乾地黄
	尾去		
熟地黄	地骨皮	肉豆蔻	檳榔
		煨	
縮砂仁	猪苓	黃耆	
錢各五	錢四	兩一	
右為散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候老人更加黃耆一兩或為末蜜湯調服臨期斟酌			
青骨散治男子婦人童男童女初覺勞瘵五心煩熱去			
骨熱如神			
欽定四庫全書			
世醫得效方			
卷九			
北柴胡	生地黃	熟地黄	人參
	兩各二		蘆去
防風	秦艽	赤茯苓	胡黃連
蘆去		兩各一	兩半
薄荷葉			
半錢			
右剉散每服三錢水一盞半煎溫服先服荊蓬煎圓			
一服微泄臟腑後服此			
方見痰飲類			
團魚散治骨蒸潮咳嗽累效			
貝母	前胡	知母	杏仁

北柴胡 各等分 團魚 二箇

右用藥同團魚煮魚熟提起去頭取肉連湯食之却將前藥焙乾為末就用團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥為圓如梧子大每服二十圓煎黃耆湯空心下

病安仍服黃耆益損湯補理 方見虛損類

蛤蚧圓治積勞咳嗽日久不差自汗口中無味

蛤蚧 一兩酥炙 欵冬花 皂角 不蛀者酥炙去皮子弦二片

木香 不見火 熟地黃 酒蒸焙 杏仁 去皮尖童子小便浸一晝夜晒乾蜜炙

欽定四庫全書 世醫得效方卷九

五味子 各一兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服十五二十圓生薑湯

送下食後臨睡服

灸法癸亥夜二更六神皆聚之時解去上體衣服於腰

上兩傍微陷處謂之腰眼直身平立用筆點定然後

上牀合面而卧每灼小艾炷七壯蟲或吐出或瀉下

即安

又法四花穴灸見蘇沈良方及資生經效

又法膏肓肺腧穴每穴各灸九壯仍依前蟲醉日各穴腧多灸為妙灸後百日忌煎燂生冷熱物毒食仍戒房事避風寒減喜怒安心靜處將息若一月猶覺未瘥於初穴上再灸

陰癰

茱萸內消圓治陰癰偏大上攻臍腹痛膚囊腫脹或生瘡瘍時出黃水腰腿沈重足脛腫滿行步艱辛服之

內消不動臟腑

欽定四庫全書 世醫得效方卷九

川楝 三兩剉炒 大腹皮 五味子 海藻 洗

玄胡索 各二兩半 茴香 炒 桂心 川烏 炮去皮臍

吳茱萸 食茱萸 桃仁 各一兩別研

木香 一兩半 桔梗 青皮 山茱萸 各二兩

右為末酒糊圓梧子大每服三十圓溫酒下 木香流氣飲兼服

大戟圓治陰癰腫脹或小腸氣痛

大戟 去皮剉炒黃半兩重 葫蘆巴 四兩炒 木香



附子 炮去皮臍	舶上茴香	訶子 煨去核	檳榔 各一兩
川練 五兩後入	麝香 半錢別研		
右八味為末外留川棟以好酒二升葱白七莖長三寸煮軟去皮核取肉和藥末圓如梧子大五七圓至十圓空心溫酒下薑湯亦可潮發疼痛炒薑熱酒下十五圓			
煉陰丹治陰器下墜腫脹卵核偏大堅硬痛不可忍			
玄胡索 微炒去殼	海藻 洗	昆布 洗	青皮 去穢
欽定四庫全書 世醫得效方卷九			
茴香 炒	川棟 去核	馬蘭花 各一兩	木香 半兩
大戟 酒浸三宿切片焙乾一分	右為末別將礪砂阿魏安息香各一分用酒醋各一升淘去沙石熬成膏入麝香一錢沒藥一分入前藥和圓如菉豆大用綿灰酒下十圓至十五圓空心服兼金圓治熱入膀胱臍腹上下兼脇筋疼痛便燥欲飲水按之痛者		
大黃 濕紙裹煨八錢	硝石	桂心	甘草

桃仁	四十箇 去皮尖
右為末煉蜜圓如梧子大每服五七圓至十圓米飲下婦人血閉疼痛亦宜服之	
應痛圓治敗精惡物不去結在陰囊成疝疼痛不可忍久服去病	
阿魏	二兩 醋和用蕎麥作成餅厚三指裏阿魏慢火煨熟
檳榔	大者二箇刮作瓮子滿盛滴乳香將刮下末用蕎麥麪拌作餅子慢火煨熟
右同研為末入礪砂末一錢赤芍藥末一兩同為麪糊搜和圓梧子大每服十圓至二十圓食前溫酒鹽湯下	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷九	
三白散治膀胱蘊熱風濕相乘陰癰腫脹大小便不利	
白牽牛	畧炒 二兩
白朮	桑白皮 陳皮
木通	各半 兩
右為末每服空心薑湯調下初進一服未覺再進此藥不損臟氣只導利留滯疝方大率多用熱藥此方惟壅熱證宜服之	



金鈴子散治膀胱疝氣閉塞下元大小便不通疼痛不可忍者服之神效分心氣飲吞青木香圓亦效

方見諸病諸氣

金鈴子

四十九箇去核剉如豆大不得碎細用巴豆四十九箇去皮亦不得碎細同炒以金

鈴子深黃色為度去巴豆不用 茴香

炒一兩

右不用巴豆將二味為末每服二錢食前溫酒調下

金鈴圓治膀胱腫硬牽引疼痛及小腸氣陰囊腫毛間水出並能治之

欽定四庫全書



世醫得效方卷九

金鈴子肉

五兩 茴香

炒

馬蘭花

海蛤

兔絲子

破故紙

海帶

各三兩

木香

丁香

各一兩

右為末糊圓如梧子大每服二三十圓空心食前溫

酒鹽湯任下

牽牛圓治膀胱有熱服煖藥攻成壅滯作痛

黑牽牛

三錢

大黃

二錢

白礬

二錢

右用巴豆去皮三十粒先入銚炒焦乾去巴豆入衆

藥炒香為末煨大蒜研細為圓茴香湯送下

荔枝散治腎大如斗不過二劑除根

舶上茴香

青皮

全者

荔枝核

右等分剉散炒出火毒為末酒下二錢日三服

桔核圓治四種癰病

桔核

炒

海藻

昆布

海帶

川楝肉

各一兩

桃仁

去皮尖炒一兩

厚朴

薑炙

木通

枳實

炒

玄胡索

炒

桂心

木香

各半兩

欽定四庫全書



世醫得效方卷九

右為末酒糊圓如梧子大每服六十圓空心鹽湯酒

任下虛寒者加川烏一兩腎腫久不消加礪砂二錢

醋煮旋入有熱氣滯者加黑牽牛大黃各半兩

牡丹散治小兒卵腫偏墜

防風

牡丹皮

右等分為末每服二錢溫酒調服鹽湯亦可

竹皮湯治交接勞後陰囊腫脹痛入腹中

右刮竹青皮一升以水三升煮一半去滓分三服立



愈

灸法關元穴在臍下三寸灸三七壯

大敦穴在足大指甲後三毛上灸七壯

脚氣

陽經表散二香散治男子婦人初患脚氣其病寒熱或頭眩忽然脚弱有筋一條自脚脛骨至臀及腰而起作痛皆因風寒暑溼之氣相感而成先須解散每四錢加檳榔一箇切片木瓜二片生薑三片葱白二根水二盞

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

煎熱服不拘時候大便秘加大黃每服半錢方見傷寒和解類

神秘左經湯治風寒暑溼流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難增寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞大小便秘澀或腹痛嘔吐下利惡聞食氣兩腿頑麻緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺喘滿肩息

麻黃去節

乾葛

細辛去蘆

厚朴薑製

茯苓去皮

防己

枳殼麸炒去穢

肉桂去麤皮

羌活

防風去叉

柴胡去蘆

黃芩

小草

白薑炮

半夏湯洗

甘草

麥門冬去心各等分

右剉散每服薑三片棗一枚煎空心服自汗加牡蠣白朮去麻黃腫滿加澤瀉木通熱甚無汗加桂加橘皮前胡升麻腹痛吐利去黃芩加芍藥及炮附子大便秘加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇所加並等分凡有此病詳認證狀逐一加減無不愈者常服

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

下氣消痰散風濕退腫滿諸師固秘此方雖父子兄弟不傳學者敬之

加味敗毒散治三陽經脚氣流注脚踝上焮熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

前胡去蘆

柴胡去蘆

枳殼麸炒去穢

桔梗去蘆

甘草

人參

茯苓去皮

川芎

大黃蒸

蒼朮米泔浸

右等分剉散每服薑三片薄荷三皮煎熱服不過二



服愈皮膚搔痒赤疹加蟬蛻煎

陰經表散蘇積散以香蘇散五積散合和治證與陽經

同湯使並同未效加金鈴子木香

方見傷寒陰證和解類

加味獨活寄生湯治腎經虛弱坐卧當風著濕所得腰

痛若不速治流入脚膝乃為偏枯冷痺緩弱疼重或腰

攣痛脚重痺正宜服之

獨活 三兩 桑寄生 無真者續斷代

杜仲 製炒去絲

細辛 去苗 牛膝 去酒浸 秦艽 去心 茯苓 去皮

欽定四庫全書 世醫得效方卷九

白芍藥 桂心 火不見 芎藭 防風 去蘆

甘草 炙 人參 熟地黄 洗蒸 當歸 去蘆各二

兩

右剉散每服四大錢水二盞煎空心服氣虛下利除

地黃並治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痺弱不得

屈 此方最除風消血一方有附子一箇無寄生人

參甘草當歸近人將治癰癰風並脚氣流注甚妙為

圓加乳香沒藥酒服效

四蒸木瓜圓治肝腎脾三經氣虛為風寒暑濕搏著流注經絡竭日曠歲治療不痊凡遇六化更變七情不寧必至發動或腫滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗

威靈仙 苦葶同入 黃耆 續斷同入 蒼朮 橘皮同入

烏藥 去本與黃松節同入

右各半兩以大大木瓜四箇切蓋去穰入前件藥仍用

蓋簪定酒洒蒸熟三蒸三晒取藥出焙乾為末研木

瓜為膏搜和搗千杵圓如梧子大每服五十圓空心

欽定四庫全書 世醫得效方卷九

溫酒鹽湯任下世傳木瓜圓最多惟此方有效當敬

之黃松節即茯苓中木

川膝煎治肝腎虛為風寒濕毒所中流注腿膝歷節疼

痛如錐刀鍛刺不可名狀

大烏頭 十箇端正者槌破以紙袋盛用烏豆一斗籍覆蒸一日取出豆不用去皮尖日乾

川牛膝 二兩去蘆煨乾

右二味並不得見銅鐵氣緣肝氣惡之木白搗碎牛

膝同入石磨中磨為末酒糊圓如梧子大每服四十



圓用無灰酒一瓶中樣木瓜一箇切作片子入瓦瓶中浸木瓜爛為度用此酒下不以時服

十全丹治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小腹不仁煩渴小便或秘或利關節攣痺疼痛神效不可具述

茯苓

酒浸

石斛

酒浸

狗脊

火去毛

萆薢

茯苓

牛膝

酒浸

地仙子

遠志

去心炒各

一兩

熟地黄

三兩酒炒

杜仲

去皮剉炒三兩

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒鹽湯任

欽定四庫全書



世醫得效方卷九

下

八味圓治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵

牡丹皮

澤瀉

茯苓

各三兩

附子

炮去皮臍

桂心

各二兩

山茱萸

二兩

熟地黄

八兩

山藥

四兩

右末煉蜜圓如梧子大每服五十圓食前溫酒米湯

任下

神應養真丹治厥陰肝經病邪氣進襲肝臟左癱右瘓

熱潮昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澁頭眩目眩牙關緊急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目下注脚膝體氣凝滯遍身疼痛兼治婦人產後中風角弓反張墜車落馬打撲傷損瘀血在內

當歸

酒浸

天麻

川芎

羌活

白芍藥

熟地黄

各等分

入木瓜炒

阿膠等分

無羌活

右為末煉蜜圓如雞子黃大每服一圓木瓜兔絲子

浸酒下脚痺薏苡仁浸酒下中風溫酒米湯下

欽定四庫全書



世醫得效方卷九

乳香宣經丹治體虛為風濕寒暑襲四氣相搏半身不遂手足頑麻骨節煩疼足脛浮腫惡寒發熱漸成脚氣肝腎不足四肢攣急偏身攻注或閃肭打撲內傷筋骨及風邪內搏男子疝氣婦人經脈不調活血止痛補虛壯筋骨

葳靈仙

去蘆洗

烏藥

茴香

炒

川楝子

橘皮

牽牛子

萆薢

防風

各二兩

五靈脂

乳香

各半兩

草烏

黑豆

青鹽

同煮

為度



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

去皮
半兩

右為末酒糊圓如梧子大每服五十圓鹽酒或鹽湯

下婦人食前醋湯送下

通治紫蘇子湯治脚弱上氣陰陽乖錯清濁不分上重

下虛中滿喘急嘔吐自汗無復紀律

蘇子炒

半夏洗

前胡

厚朴去皮炒

甘草炙

當歸各二兩

槿心不見火

桔梗各三兩

右剉散每服薑七片棗二枚煎食後服虛甚者加炮

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

附子一兩黃芪二兩

茱萸圓治脚氣入腹腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸洗

木瓜去穰切作乾片

右等分為末酒糊圓如梧子大每服五十圓至百圓

酒或米湯任下或以木瓜蒸爛研膏為圓尤妙

蝎烏散治經年腰脚虛弱筋骨疼痛難於屈伸

全蝎半兩

天麻三錢

蒼朮一兩去粗皮炒令黃

草烏二錢生用

黑附子二錢去皮臍



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

右為末每服一大錢已用黑豆炒熱淋酒調熱服藥氣所致麻痺少時其病隨安如骨髓中痛用胡桃去皮研爛入酒調服凡中風亦可服此疾經年累治不效服之如神非尋常脚氣藥比

應痛圓治寒暑風損手脚疼痛方見正骨科止痛類

二仙散治脚下注者因久坐久立陰濕之地當風醉脫

靴鞋皆成脚氣若暑月久立濕熱鬱蒸滯滯不和發冬

月寒氣冷麻或發疼痛悶亂晴陰皆發富貴之家亦有

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

此疾

蓬朮一兩半

玄胡索一兩

蛤粉三兩

陳皮一兩

右為末每服二錢炒黑豆五十粒以湯一盞生薑五

片煎五分去滓調服用之經驗

捲栢散治遠年脚氣難治此方特效體虛人減半服

捲栢隨用先以鹽水煮半日次用冷水煮半日焙乾東向者佳

黑牽牛研末

甘遂檳榔

右各為末不得相雜每服每件各一錢惟檳榔末二

錢五更初濃煎葱白湯下至辰巳時取下惡物如魚
凍隨喫淡粥病安更宜服後藥

大腹皮 三兩 乾宣木瓜 去穰二兩 紫蘇子 微炒

檳榔 荊芥穗 烏藥 橘紅

蘇葉 各一兩 蘿蔔子 炒半兩 沈香 不見火三錢 桑白皮 炙

枳殼 去穰各一兩半炒

右剉散每服三錢薑五片煎不以時溫服

奇方換腿丸治腎經虛弱下注腰膝或當風取涼冷氣

欽定四庫全書 世醫得效方 卷九

所乘沈重少力移步遲緩筋脈攣痛不能屈伸脚心隱

痛有妨履地大治乾濕脚氣赤腫痛楚發作無時呻吟

難忍氣滿喘促舉動艱難面色鰲黑傳送秘澁並皆治之

薏苡仁 石南葉 各一兩 乾木瓜 四兩 肉桂

天麻 去苗 當歸 去蘆 附子 炮去皮臍 羌活 各一兩

檳榔 半兩 防風 去叉 天南星 湯洗薑汁炒

石斛 去根 萆薢 炙 川牛膝 酒浸焙 黃耆

續斷 各一兩 蒼朮 米泔浸焙一兩半

右為末麪糊丸梧桐子大每服三十丸至五十丸空
心溫酒或木瓜湯吞下日一二服常服舒筋輕足永
無脚氣之患昔人有此病服之一月脚力頓愈委有
換腿之功

石南圓治風毒脚弱少力脚重疼痺脚腫生瘡脚下隱
痛不能踏地脚膝筋攣不能屈伸項背腰脊拘急不快風
毒上攻頭面浮腫或生細瘡出黃赤汁或手臂少力或
口舌生瘡牙齒宣爛齒搖髮落耳中蟬聲頭眩氣促心

欽定四庫全書 世醫得效方 卷九

腹脹悶小便時澁大便或難

赤芍藥 二兩 五加皮 三兩 萆薢 四兩 當歸 去蘆

麻黃 去根節 陳皮 赤小豆 各二兩 獨活 去蘆

薏苡仁 杏仁 去皮尖及雙仁者麩炒赤 牽牛子 炒

石南葉 各二兩 木瓜 四兩 大腹皮 川芎

杜仲 剉炒各二兩 牛膝 去苗

右為末以酒浸蒸餅丸梧桐子大每服十丸至十五

二十九木瓜湯下早起日中臨卧各一服 偏風腫滿服之亦效



檳榔湯治脚氣順氣防壅

檳榔

香附子

去毛

陳皮

去白

紫蘇葉

木瓜

五加皮

粉草

各一兩

右剉散每服四錢生薑五片煎八分溫服婦人脚氣多由血虛加當歸半兩室女脚氣多由血實加赤芍藥一兩半大便秘結虛弱者加枳實盛者加大黃一方治脚氣衝心大便秘宜服三和散加土烏藥春夏常服妙

欽定四庫全書



世醫得效方
卷九

木瓜茱萸湯治脚氣入腹困悶欲死腹脹喘急

木瓜乾

大片

檳榔

各二兩

吳茱萸

揀淨一兩

湯洗七次炒

右剉散每服四錢水一盞半煎服食前用木瓜大者二枚吳茱萸五兩湯洗七次二味並用水四碗煎至一椀分作兩服如人行十里久再進一服或汗或吐或瀉即瘥不拘時服

三將軍圓治脚氣入腹衝心大便不通

吳茱萸

去枝梗
湯炮

宣木瓜

去穰

川大黃

各等分大黃或
隨其病加減

右為末米糊圓如菉豆大每服五十圓粳米枳殼湯下末應加圓數再服以通為度

杉木節湯治脚氣入腹衝心或心脇有塊毒勝痰逆痞滿喘急汗流搐搦昏悶上視咬齒甚至垂絕不知人宜此藥以救急

杉木節

一大升

橘葉

一升無
葉用皮

大腹子

十一箇連
皮剉碎

右以童子小便三升煎取一升半分二服若一服得

欽定四庫全書



世醫得效方
卷九

快利停後服

木瓜牛膝圓治寒濕脚氣冷濕下注脚弱無力及腎經虛弱腰膝沈重腿脚腫急筋脈拘攣或時疼痛步履艱難二便不利日見倦乏

木瓜

肉苁蓉

酒浸

石楠藤

當歸

去尾

烏藥

熟地黃

杏仁

去皮尖

川牛膝

去苗

黑牽牛

炒

陳皮

去白

續斷

去蘆

赤芍藥

各等分

分



右為末酒糊圓梧桐子大每服三十圓空心用木瓜煎湯吞下鹽湯亦可未效用羌活木瓜浸酒或加川牛膝溫煖一盞許吞下		木通散治脚氣服熱藥太過小便不通淋閉臍下脹		當歸 梔子仁炒 赤芍藥 赤茯苓		甘草 各一兩		右剉散每服三錢水一盞煎溫服		蒼朮散治一切風寒濕熱令足膝痛或赤腫脚骨間作		熱痛雖一點能令步履艱苦及腰膝臀髀大骨疼痛令人痿躄一切脚氣百用百效		蒼朮 米泔浸一夜鹽炒 黃蘗 去麤皮酒浸一日夜炙焦各四兩		右剉散每服四錢水一盞煎七分溫服日進三四服		透骨丹專治脚氣		木香 一兩半 川烏 煨 羌活 各一兩 白茯苓 二兩		沈香 檳榔 木瓜 川芎		乳香 別研 各一兩	

右為末麪糊圓如梧子大每服六十圓薑湯下		烏藥酒治脚氣發動鄉村無處問藥特效		土烏藥用乾麤布巾揩淨以瓦片刮下屑收於磁器內以好酒一升浸一宿次日空心去藥屑止將磁器內所浸藥酒熱湯上坐溫入生麝香少許九妙一服即安無麝則多服服後澹泄病去		三和散脚氣稍愈常服弱人更宜術附湯壯盛人宜多服		敗毒散 方見諸氣及傷寒陽證類		淋洗方治脚氣用此藥熏蒸淋洗		矮樟葉 石南葉 西江杉片 藿香		大蓼 獨活 白芷 紫蘇		紫金皮 藁本 羌活 各等分		右剉碎加大椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分置盆內令病者以足加其上用厚衣蓋覆熏蒸痛處候溫熱可下手時令他人淋洗	



脚氣蒸法

先以復元通氣散一方用黃芪圓倍加甘草酒糊圓每服三十圓用淡淡酒吞下如人行五里又進一服連進三服却用甘遂細末半兩用好醋調仍以炭三四斤生火於地上烹至十分通紅却去火以脫底桶子一枚或二件圍住患人足決其醋在地上急用被絮裹蓋其足得脚上有汗為妙甚者經再取可去其病根一方以復元通氣散並甘草先以酒服之却取

欽定四庫全書



世醫得效方
卷九

猪腰子一隻分為兩邊用甘遂末二錢頓在腰子上用托兩脚心以片帛扎定仍濃煎甘草湯更服之又方主脚氣流注四肢結成腫核不散赤熱焮痛及療一切腫毒以甘遂細末醋調傳腫處濃煎甘草湯一味服之其腫即散一服未安再用二藥須兩人各買亦不可同處安頓及不許併手修合耳聾亦可煎甘草湯服之以甘遂塊塞耳

脚氣塗法

猪牙皂角 擇不蛀者

大皂角 不蛀者 南木香

右各等分為末黃子醋濃調先於腫之上不腫處用藥圍塗之潤三四寸若圈然截斷毒氣不使衝上次塗下面腫處只留脚尖不塗仍修削脚甲出毒氣時時用醋潤之一方用不蛀皂角為末入平胃散內釀醋調傳一方謂倉卒祇用皂角火上燒灰存性薑汁調傳雖皆可用乃不及上方為妙

脚氣洗法

欽定四庫全書



世醫得效方
卷九

每夜用鹽塗擦腿膝至足甲淹少時却用熱湯泡洗昔有人得脚氣諸方不效後得此春月常用淹洗不再發

近效方

凡脚氣初作兩足伸屈之間或拘牽或痠疼或有赤腫用香蘇散香薷散加蒼朮木瓜大蓼橘葉川椒葱白煎水傾在盆内衣被覆足熏一時取汗再淋洗不可頻用



灸法風市穴可令病人起正身平立垂兩臂直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上是

三里穴在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手尖度取灸之

絕骨穴在脚外踝上一尺亦云四寸以上三穴多灸取效凡病一脚則灸一脚病兩脚則皆灸未效再灸犢鼻穴在膝頭下胛上俠解大筋中以手按之得窟解是或灸肩隅穴在肩骨骨端兩骨間陷者宛宛中

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

舉臂取之曲尺穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中以手拱胸取之足十趾端名曰氣端日灸三壯並有神效

遇間深處按
穴針之亦效

腫滿

虛證復元丹治水腫夫心腎真火能生脾肺真土今真火氣虧不能滋養真土故土不制水水液妄行三焦不瀉氣脈閉塞樞機不通喘息奔急水氣盈溢滲漏經絡支膚溢滿足脛尤甚兩目下腫腿股間冷口苦舌乾心

腹堅脹不得正偃偃則咳嗽小便不通夢中虛驚不能安卧

附子 炮二兩 南木香 煨 茴香 炒 川椒 炒去

獨活 厚朴 去皮剉 薑製炒 白朮 畧炒 陳橘皮

吳茱萸 炒 桂心 各一兩 澤瀉 一兩半 肉豆蔻 煨

檳榔 各半兩

右為末糊丸梧桐子大每服五十丸不以時紫蘇湯下此藥世傳屢驗未嘗示人其間君臣佐使與造物

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

同妙服者自知要當屏去諸藥一日三服先次澣利如傾次乃腫消喘止蓋藥能助真火以養真土運動樞機安平必矣法當禁慾并絕鹽半年乃不再作

禹餘糧圓治十種水氣凡脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆治之

蛇黃 大者三兩以新鐵銚盛入一秤炭火中燒蛇黃與鉗子一般通紅用鉗取銚子出便傾蛇

黃入酸醋二升中候冷取出研極細

禹餘糧 三兩用真乾二五兩先以水淘淨烘乾更用銚子炒乾入禹餘糧一處用米醋二升



就銚內羹醋為度却用銚研藥入一秤炭火中燒通赤傾藥淨磚地上候冷研無聲即止		以三物為主其次量人虛實入下項藥		治水多是取轉惟此方三物既非大戟甘遂芫花之比又有下項扶持故虛老人皆可服		羌活		木香		茯苓		川芎		牛膝		白豆蔻		土茴香		蓬朮		桂心		乾薑		青皮		京三稜		白蒺藜		附子		當歸		欽定四庫全書		世醫得效方		卷九		減半		右為末拌極勻以湯浸蒸餅捌去水和藥再搗極勻丸如梧子大食前溫酒白湯任下三十圓至五十圓唯忌鹽雖毫末許不得入口若無以為味即水病去後且以醋少許調和食不能忌鹽勿服果欲去病切須忌鹽但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病去日日三服兼以溫和調補氣血藥助之真神方也又名萬金丹	

實脾散治陰水先實脾土		厚朴		白朮		木瓜		木香		草果仁		大腹子		附子		白茯苓		乾薑		甘草		右剉散每服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分去滓溫服不以時服		加味腎氣圓治腎虛腰重脚腫小便不利		附子		白茯苓		澤瀉		山茱萸		山藥		車前子		牡丹皮		官桂		川牛膝		熟地黄		右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十丸空心米飲下木香流氣飲治面目虛浮四肢腫滿喘急水道澀赤		熱証神助散		治十種水氣面目四肢遍身俱腫以手按之隨手而起咳嗽喘急不得安卧腹大腫脹口苦舌乾小便赤澀大便不利		欽定四庫全書		世醫得效方		卷九		氣諸	

澤瀉 二兩 椒目 一兩半 黑牽牛 微炒取末二兩半	猪苓 去黑皮二兩 葶藶 炒香入研三兩	右剉散每服以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒	半盞調藥三錢絕早面向東服如人行十里久以漿	水葱白煮稀粥至葱爛入酒五合熱啜量人啜多少	須啜一升許不得喫鹽并麪自早至午當利小便三	四升或大便利喘定腫減七分隔日再服既平之后	必須大將息及斷鹽房室等三年	欽定四庫全書 世醫得效方卷九	加味控涎圓治熱証消浮退腫下水大效 方見喘急類	疎鑿飲子治水氣通身洪腫喘呼氣急煩躁多渴大小	便不利服熱藥不得者	澤瀉 赤小豆 炒 商陸 羌活 去蘆	大腹皮 椒目 木通 秦艽 去蘆	檳榔 茯苓皮	右等分剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至七分	去滓溫服不拘時候

通苓散治腫滿口燥咽乾小便絕少 方見傷暑類	赤小豆湯治年少血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿或煩	或渴小便利	商陸 赤小豆 炒 當歸 去蘆炒 澤瀉	連翹仁 赤芍藥 漢防己 木猪苓 去皮	桑白皮 炙 澤漆 已上各半兩	右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓	溫服不計時候熱甚者加犀角二錢半	欽定四庫全書 世醫得效方卷九	三仁圓治水腫喘急大小便利	郁李仁 杏仁 炮去皮尖 薏苡仁 各一兩	右為末米糊丸如梧子大每服四十丸不拘時米飲	下	分心氣飲治滯氣去浮滿利漩大效 方見諸氣類	三和散和暢三焦治痞脹浮腫加赤茯苓一兩可以和	氣利水 方見諸氣類	封臍膏治水腫小便絕少



地龍 去皮 豬苓 去皮 針砂 各一兩	右為末搗葱涎調成膏敷臍中約一寸高闊絹帛束之以小便多為度日兩易	五皮散治脾水四肢頭面悉腫按之沒指不惡風其腹如故不喘不渴脈不浮	大腹皮 炙 桑白皮 炙 茯苓皮 生薑皮	陳橘皮 各等分	右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓熱服日二	欽定四庫全書 世醫得效方 卷九	三服效 一方用青木香丸每服三十五丸黑牽牛末少許新汲水調吞下二便得利效方見諸病類	麻黃甘草湯治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗	麻黃 去根節四兩 甘草 二兩	右剉散每服三錢水一盞半煮麻黃再沸內甘草煎至八分取汗慎風冷有人患氣促積久不差遂成水腫服之有效但此藥發表老人虛人不可輕用更宜審察

秘傳八方芫花圓治水腫	大巴豆 二十粒去殼 芫花 杏仁 各等分 大黃	右為末米糊丸每服五十丸空心溫酒吞五更早喫下水大效	牽牛湯催發	巴豆 甘遂 各三錢 檳榔 大戟	當歸 各五錢 青皮 黑牽牛 取頭末各一兩	欽定四庫全書 世醫得效方 卷九	右為末用一大錢葶藶子煎湯調下五更初喫下神效	茯苓散用補	木香 五錢 肉豆蔻 煨 肉蓯蓉 酒洗炙各一兩	右為末每服一大錢米飲調下忌生冷油麵烏鯉魚湯治水腫消腫及四肢腫	烏鯉魚 一箇 赤豆 桑白皮 白朮	陳皮各 一兩 葱白 五根



右用水三椀同煮不可入鹽先喫魚後服藥	
郁李仁散治腫滿小便不利	
陳皮	郁李仁 檳榔 茯苓
白朮	各一兩 甘遂 五錢
右為末每服二錢薑棗湯下	
川活散治水氣腫	
羌活	蘿蔔子 各一兩 炒
右為末用酒調下	
紅豆散緊皮	
丁香	木香 各三錢 縮砂 紅豆
白薑	桂枝 陳皮 青皮
桔梗	胡椒 各五錢
右為末每服二錢秋石湯調下	
紫金圓	
白薑	香附子 炒去毛 紫金皮 石菖蒲
青木香	針砂 特煨紅

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九



迪志文化出版有限公司出版

右各等分為末米糊圓用三十圓第一茶清下第二	
商陸根湯下第三赤小豆常喫用好酒吞下秘傳方	
止此	
防風散治風腫皮龕麻木不仁或時疼痛	
麻黃	去節 牽牛 炒 甘草 各分半 杏仁 去皮
防風	半夏 泡 芍藥 辣桂
白芷	防己 當歸 川芎
羌活	獨活 檳榔 各一分
右剉散每服三錢薑四片蘇葉三皮煎服	
茯苓散治諸氣腫等疾	
芫花	醋炒 澤瀉 郁李仁 甜葶藶
漢防己	藁本 各二錢半 陳皮 白茯苓
白檳榔	瞿麥 各半 白滑石 大戟 各七錢半
為末每服一錢桑白皮煎湯空心調下取下碧綠水	
如爛羊脂即差未盡隔日又服腫消如故不服忌鹽	
百日	

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九



迪志文化出版有限公司出版

治脚腫方小續命湯加羌活一倍煎服之遂愈

方見風科虛証

背腫方以煉石塗之立瘥

烏梅醋法治手指甲頭腫

用烏梅槌碎去核肉只取仁研米醋調入指漬之自愈

腮腫方以赤小豆為末傅之立效

陰腫方治男子陰腫大如升核痛人所不能治者

以馬鞭草搗爛塗之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷九

治婦人陰腫堅硬方

枳實半斤碎炒令熟舊帛裏熨冷即易之

灸法足第二指上一寸半隨年壯又灸兩大拇指縫頭

七壯治水氣通身腫滿效大衝腎腧各百壯治虛勞浮

腫效

世醫得效方卷九



欽定四庫全書

世醫得效方卷十

元 危亦林 撰

大方脈雜醫科

頭痛

風證芎芷香蘇散治傷風鼻中清涕自汗頭疼或發熱

方見傷寒和解類

消風散治傷風及風虛嘔惡頭痛風疹浮滿

方見風科熱證類

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十

寒證連鬚葱白湯治傷寒已發汗未發汗頭疼如破

生薑 二兩

連鬚葱白 小切半斤

右用水二升煮令減半去滓分三服服不差者服後

湯

葛根葱白湯治頭痛不止

葛根

白芍藥

知母 各半兩

川芎

生薑

各一兩

葱白 一握

右剉散水三升煎取一升半去滓每服一盞半熱服

暑證茵陳散治感暑自汗面垢脈微頭痛香需散加茵

陳每服三根葱白五寸生薑三片同煎熱服

香需散方見傷暑類

濕證小芎辛湯治風寒在腦或感濕頭重頭痛眩暈欲

倒嘔吐不定

川芎 一兩

細辛 去蘆

白朮 去蘆炒

甘草 炙各半錢

右剉散每服四錢水一盞半薑五片茶芽少許煎至

七分不拘時溫服一方以川芎一兩細辛半兩甘草

二錢防風半夏川白芷各半兩煎同上尋常風濕頭

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十

疼立效

熱證防風散治積熱上衝頭熱如火痛入頂中

防風 去蘆

羌活 去蘆

薄荷 去蘆梗 當歸 去尾

大黃

梔子 去鬚

川芎 各一兩 蟬退 二十箇去足白

粉草 五錢

右為散每服四錢水一盞半燈心二十莖苦竹葉十

皮煎食後服

大陽丹治腦寒之病皆因邪攻於上焦令人頭疼晝夜



引痛不能安寧

腦子 二錢 別研

川芎

甘草

白芷 各一兩

石膏 二兩 別研

川烏 一兩 重者 炮去皮臍

右為末蜜同麪糊圓每兩作十八圓朱紅為衣食後以生葱茶嚼下或用五圓以水磨爛塗患處

洗心散治風熱上壅頭目痛甚 方見積熱類

茶調散治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻

塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

血風攻症太陽穴疼但是感風氣悉皆治之常服清爽

頭目

薄荷 去梗 不見 火四兩

羌活 一兩

川芎 二兩

甘草 炙 一兩

細辛 去蘆 五錢

防風 去蘆 五錢

白芷 一兩

荊芥 去梗 二兩

右為末每服二錢葱白茶清調下用葱涎調貼兩太

陽穴除痛甚者特效又用朴硝末少許吹入鼻中立

愈左痛吹右右痛吹左

芎犀圓治偏頭疼一邊鼻塞不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣如芎蝎等偏服無效服此不十數服或作嚏突出一鉗稠膿即愈

石膏 細研 四兩

生龍腦 別研

朱砂 研飛 四兩 內一兩為衣

生犀屑 一兩

人參 去蘆 二兩

茯苓 去皮 二兩

川芎 四兩

阿膠 碎炒 一兩 半

細辛 去苗 二兩

麥門冬 去心 三兩

甘草 炙 二兩

山梔子 去皮 一兩

右除別研藥後入並為末煉蜜圓每服一圓至二圓

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

細嚼茶酒任下食後服

神芎圓治一切頭痛昏眩利咽膈能令遍身結滯通暢

除痰飲解諸熱

大黃 各二兩

黑牽牛 炒

白滑石 各四兩

黃連 大川芎 薄荷葉 各半兩

右為末水圓小豆大溫水下十圓至十五圓日三服

或煉蜜圓亦可

萊菔汁治偏頭疼用一蜆殼仰卧左痛注右右痛注左



或兩鼻皆注亦可數十年患皆一二注而愈

加減辛夷散治風熱上壅鼻流濁涕或腥臭頭昏眉稜
角痛

右以茶調散加辛夷仁藁本蒼耳子木通各一兩為

末淡茶清調立效

方見前

虛證大芎辛湯治痰厥飲厥腎厥氣厥等證偏正頭疼
不可忍者只以此藥并如聖餅子服之不拘病退但多
服自能作效氣虛高年人仍服養正丹黑錫丹若發熱

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

頭疼却不可服

生附子去皮尖 生烏頭去皮尖 天南星泡洗 乾薑炮

細辛去蘆 川芎各一兩 甘草三分

右剉散每服四錢水二盞薑七片茶芽少許煎至六

分食前服中脘素寒者不用茶芽

如聖餅子治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留
陽經偏正頭疼痛連腦巔吐逆惡心目眩耳聾常服清
頭目消風痰煖胃氣

川烏炮製去皮臍 天南星炮 乾薑炮各一兩 甘草

川芎各二兩 天麻 防風去蘆及股者 半夏湯炮七次半兩

一方加細辛

右為末湯浸蒸餅和圓如雞頭子大捻作餅子曬乾
每服二十餅薑湯或茶任意嚥下須自合糊少及藥
真易效若傷寒得汗尚餘頭痛者濃煎葱白生薑湯
下

消風散治風證頭痛至亟用生抽葉葱白研汁調貼頭

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

上兩太陽穴立驗

方見風科熱證類

大附圓一名葱涎圓 治元氣虛壅上攻偏正頭疼不可

忍

大附子一隻炮去皮臍

右為末葱涎圓如梧子大每服十五圓至二十圓臨

卧茶清送下一方以川烏頭炮去皮尖為末用荳葉

自然汁和圓治風虛痰涎頭疼

四川圓治頭痛如破



大川烏 一个生去皮臍

川白芷

川細辛 去葉

大川芎 各一兩

右為末韭菜自然汁圓黃丹為衣每服一圓細嚼葱

白淡茶清下又名鶴頂丹

硫黃圓治頭痛如破每發則數日不食百藥不療

硫黃 二兩 硝石 一兩

右用水為圓指頭大空心臈茶嚼下一圓或圓如梧

子大每服十五圓暑暍冒者冷水服下咽即豁然

欽定四庫全書 世醫得效方卷十

清爽傷冷即以沸艾湯下

葫蘆巴散治氣攻頭痛

葫蘆巴 微炒 三稜 剉醋泥一宿炒乾各一兩 乾薑 炮等分

右為末每服二錢溫生姜湯或酒調下凡氣攻頭痛

一服即差萬法不愈頭痛如破者服之即愈或瘴瘧

差後頭痛呼號百方不效用此一服如失去小可頭

痛更捷

又方點頭散

川芎二兩香附子炒去毛四兩為末淡茶清調常服除根

附子湯治頭風至驗

大附子 一个生用去皮臍 棗豆 一合

右同入銚子內煮豆熟為度去附子服豆即安

清空膏治諸般火症頭疼惟血虛頭疼不治

川芎 五錢 柴胡 七錢 黃連 酒炒 防風

羌活 各一兩 炙草 一兩五錢 黃芩 酒炒三兩

欽定四庫全書 世醫得效方卷十

右為末每服二錢入茶少許調和臨臥服白湯下

一方治頭風鼻流涕

人參 甘草 天麻 白芍

荊芥 薄荷 乳香 炒去油 沒藥 炒去油

白芷 甘松 甘菊 藁本

白茯苓 北細辛 洗淨各三錢

右共為細末貯瓶中用少許鼻之

奇方治偏腦疼



將新瓦片打做圓片六片要茶鐘口大小在炭火內燒紅淬在陳醋內一兩次用絹包裹熨太陽穴片冷再換第二塊六片熨完用帕扎住避風雨三日永不發

秘方治偏正頭疼

兩前茶 四錢 細辛

川芎 牛膝 各二兩

薏苡仁 一錢五分 甘草 五分

赤白首烏 製一錢五分

右剉散每服五錢水二盞煎七分溫服

欽定四庫全書 世醫得效方卷十

又方治偏頭疼及鼻淵

龜板 酥炙一個

辛夷花

麻黃

藁本 各五錢

右共為細末每服二錢黑沙糖拌陳黃酒下覺醉而止年久者三服即愈

又方治老年人血虛火動頭疼

生地黃 酒洗三錢 山藥

丹皮 各一錢五分 山萸

白茯苓 澤瀉

黃柏 酒炒

知母 各一錢

右剉散水二盞煎七分溫服

白附子散治腦逆頭痛齒亦痛

麻黃 不去節

天南星 炮

烏頭 炮去皮 白附子 炮

朱砂 研

麝香 研

乾薑 各一分 全蝎 去毒足

右為末酒調半錢服訖去枕卧少時

備急圓治積聚頭疼

大黃

乾薑

巴豆 去皮心

右等分為末煉蜜圓如豌豆大米飲下一圓羸人服

半圓菴豆大以大便利為度

欽定四庫全書 世醫得效方卷十

四柱散治大病後及諸虛頭痛

右用水煎將熟時入腦茶一錢服之方見痼冷類

二陳湯治眉心并眉梁骨疼者痰飲也宜用二陳湯煎

飲吞下青州白圓子最驗 方見痰癰及風科通治類

瓜蒂散治胸中有伏痰吐之即愈

瓜蒂末 赤小豆末 各等分

右研勻熱米飲調一錢匕羸服半錢得吐為度痛即止



都梁圓大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏重及血風頭痛服之令人目明凡沐浴後服一二並甚佳暴寒乍暖神思不清頭目昏暈並宜服之

香白芷 大塊者以沸湯泡洗

右為末煉蜜和圓如彈子大每服一圓多用荊芥點

臈茶細嚼下食後常服諸無所忌只乾咽嚼亦可

灸法顙會穴在鼻心直上入髮際二寸再容豆許是穴

灸七壯

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

真頭痛者其痛上穿風府陷入於泥丸宮不可以藥

愈夕發旦死旦發夕死蓋頭中人之根根氣先絕也

面病

栢連散治面上有熱毒惡瘡

胡粉 炒 黃栢 灸 黃連

右等分為末面脂調傳猪脂亦可

又方治面上肺風瘡

右用無灰酒於沙碗鉢內濃磨鹿角尖傳之兼服治

腎臟風黃耆圓即愈

硫黃膏治面部生瘡或鼻臉赤風刺粉刺百藥不效者惟此藥可治妙不可言每臨卧時洗面令淨以少許如面油用之近眼處勿塗數日間瘡腫處自平赤亦消風刺粉刺一夕見效

生硫黃 香白芷 瓜蒌根 膩粉 各半錢

芫青 七个 去翅足 全蝎 一个 蟬退 五个 洗去泥

右為末麻油黃蠟約度如合面油多少熬溶取下離

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

火入諸藥在內如法塗之一方加雄黃蛇床子各少

許

又方治抓破面

右用生薑自然汁調輕粉傳破處更無痕瑕

又方治粉刺

右以白礬末少許酒調塗之

玉盤散洗面藥

白芨 白欬 白芷 甘松



白朮

藁本

芎藭

細辛

零陵香

白檀香

各半兩

皂角

一斤去皮

乾楮實

半升

黃明膠

半斤用牛皮膠四兩亦得灸令通起搗篩餘者炒作珠子又搗取盡

糯米

一升淨搗為粉曬令極乾若微濕則損香

右為末令勻相合成澡豆皂角末別入看澡豆緊慢

添減以洗面不熾為度藥末不可太細

滑石散乾洗頭藥

右用香白芷零陵香甘松滑石四味並不見火等分

欽定四庫全書

世醫得效方卷十

為末摻髮上梳篦

得法染鬚方

右用針砂以井水淘淨濾乾醋浸炒黑為末入百藥

煎少許先一日將蕎麥粉各一半調和打為糊塗在

鬚上以蓮葉包裹更以絹巾兜定次早用肥皂洗淨

後再用訶子五錢好雄沒石子一個醋炒為末百藥

煎少許又以蕎麥粉醋調作稠糊依前封裹其黑如

漆一方加真膽礬入或生麝香入

又方

針砂不以多少用水淘洗以水清為度用柳枝半寸

長數根於銅銚內炒過却用好米醋浸一宿次日再

炒以柳枝成炭為度於地上攤冷另放後八件打和

為末

當歸

甘松

石膏

滑石

各一錢

橡斗子

一兩

酸榴皮

三錢

母丁香

白檀香

各一錢以

上另收各包為末

生麝

少許

沒石子

二個

訶子

四個核

欽定四庫全書

世醫得效方卷十

百藥煎

三錢

白芨

一錢

右用針砂一匙白及二匙八件末半匙餘者皆少許

一處合和好米醋調成膏子塗於鬚鬚之上以荷葉

緊包定勿寬慢次日早洗去即黑却用些核桃淨肉

研爛成油撚放上則光軟五方中此方最勝

又方

漢防己

綠礬

各一兩

桑椹子

一百個須大紫黑者

當歸

去蘆尾二兩



右以磁罐盛用香油十二兩浸以紙數重緊扎定罐口於飯甑上蒸飯熟為度取出埋地下窖一百日用大妙

又方

酸石榴 一个 水銀 半兩

右先将石榴去頂作一竅入水銀在內仍用頂子蓋定再用黃蠟封固放留一月石榴內化作水為度然後以雞內金蘸藥染於鬚上隨手黑

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

又方

用黑桑椹一升科斗子一升 即蝦蟆子 以瓶盛密封

於東屋角百日盡化為黑泥染鬚髮如漆又用桑椹

二七枚和胡桃研如泥拔去白者點孔中則生黑者

洗面藥治面上黑黥風瘡

黑牽牛 半斤 甘松 香附 炒去毛各四兩

右為末作面藥逐日洗之

耳病

秘傳降氣湯加石菖蒲治氣壅耳聾大有神效 方見諸氣類

小清肺飲治上膈有熱耳聾 方見咳嗽類

排風湯治風虛耳聾 方見風科通治類

塞耳丹治氣道壅塞兩耳聾聵

石菖蒲 一寸 巴豆 一粒 全蝎 一个去毒

右為末葱涎圓如棗核大每用一圓綿裹塞耳內

又方治耳卒風腫毒起

右用柳木蛀蟲糞水化取清汁調白礬末少許點入

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

耳內效

蠟彈圓治耳虛聾

白茯苓 二兩 山藥 炒三兩 杏仁 去皮尖炒兩半 黃蠟 二兩

右為末鎔蠟圓如彈子大鹽湯嚼下亦有以黃蠟細

切嚼點好茶送下亦效

乾蝎散治耳聾因腎虛所致十年內一服效

乾蝎 黃色小者并頭尾用四十九个生薑切如蝎大四十九片二味於銀石器內炒令至乾為末



右向晚勿食初夜以酒調作一服至二更以來徐徐		盡量飲五更耳中門百十攢筓響便自此聞聲		解倉飲子治氣虛熱壅或失饑冒暑風熱上壅耳內聾		閉徹痛膿血流出	
赤芍藥		白芍藥		各半 當歸		甘草	
大黃		木鱉子		去殼又 各一兩			
右剉散每服四錢水煎食後臨卧服							
羊腎圓治腎虛耳聾或勞頓傷氣中風虛損腎氣升而							
不降或耳虛鳴							
山茱萸		乾薑		川巴戟		芍藥	
澤瀉		北細辛		兔絲子		酒浸 遠志	
桂心		黃耆		石斛		乾地黄	
附子		當歸		牡丹皮		蛇床子	
甘草		茯苓		酒浸 人參		各二兩 菖蒲	
防風		二兩半 茯苓		半兩			
右為末以羊腎一隻研細以酒煮麪糊圓梧桐子大							

食前鹽酒下三十圓至五十圓立效		安腎圓治虛弱耳聾		大安腎圓		磁石	
				四兩		醋半兩 煨	
右三件為末混合為圓梧桐子大每服四五十圓鹽						石菖蒲	
湯溫酒任下						羌活	
						各半兩	
黃耆圓治腎虛耳鳴夜間睡著如打戰鼓耳內風吹更							
四肢抽掣痛							
黃耆		一兩		白蒺藜		炒	
						羌活	
						各半兩	
						附子	
						一枚	
右為末酒糊圓如梧子大每服四十圓日午空心煨							
葱鹽湯下							
清神散治氣壅於上頭目不清耳常重聽							
乾菊花		白僵蠶		炒去絲 各半兩		荆芥穗	
羌活		木通		川芎		防風	
						各四兩	
木香		一錢		甘草		石菖蒲	
						各錢半	
右為末每服三錢食後臨卧茶清調下							

茯苓圓治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

茯苓切片酒浸焙 山茱萸去核 石龍芮 石菖蒲

免絲子淘淨酒浸蒸焙 川羌活去蘆 石斛去根

鹿茸燎去毛切片酒浸蒸 磁石火煨醋淬七次水飛淨

附子炮去皮臍各半兩 全蝎去毒七個 麝香半字旋入

右為末煉蜜為圓梧桐子大每服七十圓加至百圓

空心鹽酒湯任下

犀角飲子治風熱上壅耳內聾閉塞腫掣痛膿血流出

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

犀角 菖蒲 木通 玄參

赤芍藥 赤小豆炒 甘菊花去核梗各半兩

甘草炙二錢半

右剉散每服四錢生薑汁水煎不拘時溫服

八味圓治耳聾及虛鳴

右用好全蝎四十九枚炒微黃為末每服三錢以溫

酒調仍下八味圓百粒空心只三兩服見效方見脚氣類

小柴胡湯治發熱耳暴聾頰腫脇痛肘不可以運由少

陽之氣厥而熱留其經也方見傷寒陽證類

雄黃圓壯實人積熱上攻耳出膿水不差服雄黃圓瀉

三五行即效方見積熱類

地黃圓治勞損耳聾

大熟地黃洗當歸 川芎 辣桂

免絲子酒浸三日炒乾搗末 大川椒出汗 故紙炒

白蒺藜炒去刺 葫蘆巴炒 杜仲薑汁製炒去絲 白芷

石菖蒲各一分 磁石火燒醋淬七次飛一分半

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

右為末煉蜜圓如梧子大每服五十圓葱白溫酒空

心吞下晚食前又服

芷芎散治風入耳虛鳴

白芷 石菖蒲炒 蒼朮 陳皮

細辛 厚朴製 半夏製 辣桂

木通 紫蘇莖葉 甘草炙各一分 川芎二分

右剉散每服三錢薑五片葱白二根煎食後臨卧服

芍藥散治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出



赤芍藥	白芍藥	川芎	當歸
甘草	大黃	木鱉子	各半兩
右剉散每服四錢煎食後臨卧服			
治耳久聾以九節菖蒲末草麻子為膏綿包塞之			
耳鳴方			
草烏頭	燒帶生	石菖蒲	
右等分為末綿裹塞耳一日三度			
耳熱出汗方			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十			
硝石	爛石膏	天花粉	防風
腦子	少許		各半錢
右為末摻耳立止			
久聾方			
草麻子	二十一箇	遠志	去心
磁石	煨如前	皂角	煨取肉
各一錢	半錠	生地龍	甲者二條
右為末入蠟搗圓柱入耳			
又方甘遂半寸綿裹插放兩耳中却將甘草口中嚼自			

然通聽極效	耳聰方右用白鹽炒熱重帛包熨	又方右以杏仁炒焦研細用綿裹塞耳	驢膏治積年耳聾	以驢生脂和生薑搗綿裹塞耳妙不可言	有人耳痒一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃腎	臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透冰丹勿	飲酒啖濕麪蔬菜雞猪之屬能盡一月為佳不戒無	效	方見風科熱證類	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十	立效散治聾耳底耳有膿不止	真陳皮	燈上燒黑	麝香	少許	右和勻每用少許以綿蘸耳內膿淨却上藥	麝香散治聾耳底耳內膿出	桑螵蛸	一箇慢火炙	麝香	一字	右為末研令勻每用半字摻耳內如有膿先用綿撚	紙以藥摻之一法用染坯枯礬等分為末以葦管吹



入耳中即愈或入麝尤佳

治耳內痛方以鱖魚血滴數點入耳內便愈

百蟲入耳用麻油灌之即出

耳中出血以龍骨末吹入即止

蒼蠅入耳最害人速

皂角子蟲研爛用生鱖血調灌入耳中

通耳法治耳聾無所聞

緊磁石
大一塊
研細如豆

穿山甲
存一大片燒
性為末

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

世醫得效方
卷十

右用新綿裹了塞所患耳內口中銜一片生鐵以綫

繫住覺耳內如風雨聲即愈

透耳筒治耳聾治抽腎氣虛耳中如風水聲或如鐘鼓

聲

椒目
巴豆
菖蒲
松脂

右各半錢為末更以蠟攤金薄候冷捲作筒子塞耳

内一日一易神效

惡蟲入耳



迪志文化出版有限公司出版

桃葉搗細塞耳自出 或以藍青研汁滴入耳

又葱涕灌耳中蟲即出亦治耳聾

又香油稻稈灰汁

又以川椒為末法醋浸一宿滴耳桃葉為枕蟲自鼻

出

蟻入耳猪精肉一指許炙令香置耳孔邊即出

蜈蚣入耳

生薑取汁灌耳中自出
或以韭汁灌耳中即自出

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

世醫得效方

治耳中有物不可出

右以麻繩剪令頭散傳好膠著耳中使其物粘之徐

徐引出效用弓弦尤妙水入耳薄荷汁點經驗

鼻病

茶調散治傷風鼻塞聲重兼治肺熱涕濁

辛夷散治肺虛風寒濕熱之氣加之鼻內壅塞涕出不

已或氣息不通或不聞香臭

辛夷仁
細辛
土洗
葉去
藁本
去蘆
升麻



迪志文化出版有限公司出版

川芎	木通 去節	防風 去蘆	羌活
甘草 炙	白芷 各等分	蒼耳子	
右為末每服二錢食後茶清調服熱者茶調散合和服			
川椒散治流涕			
大紅開口川椒 微炒出汗	訶子 煨取肉	川白薑 生者	
辣桂	川芎	細辛	淨白朮 等分
右為末每服二錢溫酒調下			
南星飲治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物室塞腦氣不宣遂流髓涕			
上等天白南星切成片用沸湯盪兩次焙乾每服二錢用棗七枚甘草少許煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉髓涕自收仍以大蒜華撥末杵作餅用紗襯灸熱貼顙前熨斗火熨透或香附末及華撥末入鼻中			
細辛膏治鼻塞腦冷清涕出不已			

細辛	川椒	乾薑	川芎
吳茱萸	附子	各 去皮臍三分	皂角
		半 屑兩	桂心
			一 兩
猪脂	六 兩		
右煎猪脂成油先一宿以苦酒浸前八味取入油煎			
附子黃色止以綿蘸塞鼻孔			
治久患鼻膿極臭者			
右以百草霜末冷水調服			
芎藭散治鼻中涕清出腦冷所致			
欽定四庫全書			
世醫得效方			
卷十			
通草	辛夷仁	各 半兩	北細辛
			去 苗
			甘遂
桂心	芎藭	附子	各 半兩
右為末蜜圓綿裹納鼻中密封塞勿令氣泄圓如大麻子漸稍加大微覺小痛搗薑為圓即愈此方治腦冷所致然此疾亦有腦熱者亦有肺寒者素問云膽移熱於腦則辛頰鼻淵又曰腦滲為涕肺之液為涕當審治之			
神效方治腦漏			



天麻	甘松	草烏 煨	白芷
白附子 煨去皮	川烏 湯泡	薄荷	細辛
川芎	蒼朮 炒	甘草	防風 各五錢
全蝎 三錢	雄黃 二錢		
右共為細末用寒食麵打糊圓菉豆大每服三十圓			
食後細嚼葱湯送下			
奇方治鼻淵			
右用老刀豆文火焙乾為末每服三錢酒下重者不			
過三服即愈			
又方治同上			
辛夷 五錢	蒼耳仁 二錢五分	白芷 一兩	薄荷 五分
右為末每服二錢水調下			
又方治赤鼻方			
硫黃 豆腐水煮三次淨取二錢	輕粉	白芷	
陀僧 金色各一錢	白礬 五分		
右共為細末以津唾搽之晚搽日洗去			

秘方治鼻中息肉			
右用藕節有毛處一節燒灰存性為細末吹患處			
又方治鼻中流黃水不止			
右用絲瓜近根三五寸燒灰存性酒調服			
又方治赤鼻			
生硫黃 一錢	輕粉 一錢	杏仁 二七個去皮	
右為末生餅藥調臨卧時塗早則洗去			
白圓散治肺風酒瘡等疾			
生硫黃			
乳香			
生白礬			
右同研如粉每用手微爪動患處以藥擦之月日必愈			
梔子仁圓治肺熱病發赤癰即酒瘡			
右以老山梔子仁為末鎔黃蠟等分圓如彈子大空心茶清嚼下忌酒炙一半月立效			
治酒瘡白鹽常擦為妙			
艷鼻細辛散治鼻艷不聞香臭			



瓜蒂	北細辛
右等分為末綿裹如豆大塞鼻中	
通草膏治鼻塞清涕腦冷所致	
通草	辛夷
桂心	細辛
川芎	附子
右等分為末煉蜜圓綿裹納鼻中密封閉勿令氣泄	
圓如麻子大稍加微覺搗薑汁為圓即愈	
雄黃散治鼻鼈	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十	
雄黃 半錢	瓜蒂 二箇
綠礬 一錢	麝 少許
右為末搗些子入鼻亦治息肉	
鼻瘡甘露飲黃連阿膠圓	
又方敷藥	
右用杏仁研乳汁傳之 或以烏牛耳垢傳 或黃	
栢苦參檳榔為末以猪脂研傳 或青黛槐花杏仁	
研傳	
瓜丁散治鼈鼻有息肉不聞香臭此藥傳之即化黃水	

點滴至盡不三四日遂愈不復作	
瓜丁	即瓜蒂也 細辛
右等分為末以綿裹如豆許塞鼻中須臾即通鼻中	
息肉俗謂之鼻痔無不效	
消鼻痔方	
瓜蒂	甘遂 各二錢
草烏尖	各二分半
右為末麻油搜令硬不可爛旋圓如鼻孔大用藥入	
鼻內令達痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日一次	
甚妙	
灸法顙會在鼻心直上入髮際二寸再容豆是穴灸七	
壯又灸通天在顙會上一寸兩傍各一寸灸七壯左	
鼻中去臭積一塊如朽骨臭不可言去此全愈	
凡鼻頭微白者亡血也赤者血熱也酒客多有之若時	
行衄血不宜斷之或出至一二升不已即以龍骨為	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十	



末吹入凡九竅出血皆用此法甚良

腋氣

蜘蛛散治胡臭熏人不可嚮邇者

大蜘蛛

一箇以黃泥入少赤石脂搗細入鹽少許杵煉為一窠蜘蛛在內以火近燒通紅冷剖開

右一味為末臨卧入輕粉一字用酸醋調成膏傅腋
下明早登廁必瀉下黑汁臭穢不可聞於遠僻處棄
埋之免染人神良

六物散治漏腋腋下手掌足心陰下股裏常如汗濕汚

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十

衣

乾枸杞根

乾薔薇根

甘草

各二兩

胡粉

商陸根

滑石

各一兩

右為末以苦酒少許和塗當微汗出易衣更塗之不
過三著便愈或一歲復發又塗之

中毒

石刻方治蠱毒無論年代近遠但煮一鴨卵插銀釵於
內併噙之約一食頃取視釵卵俱黑即中毒也



迪志文化出版有限公司出版

五倍子

二兩

硫黃末

一錢

甘草

三寸半生半炙

丁香

木香

麝香

輕粉

各少許

糯米

二十粒

右用水十分於瓶內煎取七分候藥面生皴皮為熟
絹濾去滓通口服病人平正仰卧令頭高覺腹中有
物衝心者三即不得動若出以盆桶盛之如鯨魚之
類乃是惡物吐罷飲茶一盞瀉亦無妨旋煮白粥補
忌生冷油膩鮮醬十日後服解毒圓三五圓經旬復
解毒圓治誤食毒草并百物毒救人於必死

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十

板藍根

四兩乾者淨洗日乾

貫衆

一兩剉去土

青黛

研

甘草

生各一兩

右為末煉蜜圓如梧子大以青黛別為衣如稍覺精
神恍惚惡心即是誤中諸毒急取藥十五圓爛嚼用
新水送下即解或用水浸炊餅為圓尤妙如常服可
三五圓大能解暑
泉僧方治金蠱蠱毒纔覺中毒先吮白礬味甘而不澁
次嚼黑豆不腥者是也



迪志文化出版有限公司出版

右以石榴根皮煎汁飲之即吐出活蟲無不愈者
礬灰散治中諸物毒

晉礬 建茶 各等分

右為末每服三錢汲新水調下得吐即效未吐再服

保靈丹治蠱毒諸毒一切藥毒神效

朱砂 淨細研 一兩 大山豆根 兩半 雄黃 黃丹

麝香 黃藥子 續隨子 生杵末 各二錢半

川巴豆 肥者取肉不去油二錢半 斑蝥 二錢半 去頭翅足

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

糯米 半炒 半生 赤蜈蚣 二條 一生一灸

右各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修合不令
雞犬婦人見用糯米稀糊圓如龍眼核大陰乾磁合
收每一圓好茶清吞下不得嚼破須臾病人自覺心
頭如拽斷皮條聲將次毒物下或自口出或大便出
嫩則是血老則成鱉或蜣螂諸雜帶命之物藥圓凝
血並下以水洗淨收可救三人如中毒口噤即挑開
下藥或蛇蝎兩汗諸毒以好醋磨傳患處立解服藥

已效如知毒害之家不必研究若訴之其毒再發不
救瘥後更忌酒肉毒食一月惟軟飯可也或急用但
擇吉日精潔修合

萬病解毒圓治蠱毒挑生毒藥毒草毒

文蛤 即五倍子兩半 山茨菰 即金燈花根 一兩洗焙 麝香 二錢

大山豆根 續隨子 取仁去油留 糯米

朱砂 雄黃 各二錢 紅牙大戟 洗兩

右先以五味藥入木臼搗羅為末次研麝續隨子朱

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

砂雄黃夾和糯米糊圓分作三十五圓端午七夕及

冬至日淨室修合每服一圓生薑蜜水磨下井水浸

研傳所患處解毒收瘡救病神妙朱砂雄黃乃攻五

毒第一

青黛雄黃散凡始覺中毒及蛇蟲咬癰疽纔作服此則

毒氣不聚

上好青黛 雄黃 等分

右為末新汲水調下二錢



辰砂圓治蠱毒從酒食中著者端午日合

辰砂

另研

雄黃

別研
水飛

赤脚蜈蚣

續隨子

各一兩

麝香

一分

右為末糯米飲圓如雞頭大若覺中毒即以酒下一

圓蛇蝎所螫醋磨塗之

單方

蠶退紙

不拘多少以麻
油紙撚炒存性

右為末新水調一錢頻服諸中毒面青脈絕昏迷如

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十

醉口噤吐血服之即蘇

甘薺湯治蠱毒多因假毒藥以投之知時宜煮大豆甘

草薺莖汁飲之通治諸藥毒

國老飲治蠱毒

白礬末

甘草末

右等分清水調下或吐黑涎一兩椀或瀉亦驗

解諸毒殺腹內毒蟲

右用藍青葉多研水調服

又方解諸毒

右以黃連甘草節濃煎服效

獨勝散解藥毒蠱毒蟲蛇諸毒

大甘草節

以真麻油浸年
歲愈多愈妙

右取甘草嚼或以水煎服神效

挑生毒升麻湯治肋下忽腫起如生癰癰狀頃刻間大

如碗此即中挑生毒也俟五更以菹豆細嚼試若香甜

則是

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十

川升麻

為細末

右取冷熱水調二大錢連服之若洞泄出如葱數莖

根鬚皆具腫即消縮宜煎平胃散調補兼進白粥

又方治魚肉瓜果湯茶皆可挑生初中毒覺胸腹稍痛

明日漸加攪刺滿十日則物生能動騰上胸痛沈下則

腹痛積以瘦悴此候也

其法在上膈則取之用熱茶一甌投膽礬半錢於中

候礬化盡通口呷服良久以雞翎探喉即吐出毒物



在下脘即瀉之以米飲下鬱金末二錢毒即瀉下乃
擇人參白水各半兩碾末同無灰酒半升納瓶內慢
火熬半日許度酒熟取溫溫服之日一盞五日乃止
在便飲食

奇方治一切毒

白扁豆曬為末新汲水下二三錢頓服得利則安

解砒毒方

右用菉豆半升細搗去滓以新汲水調通口服

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

或用真靛花二錢分作二服以井花水濃調服 紫

河車研水調服 黑鉛井水磨下 濃研青藍汁磨

甘草節同服 生麻油一盞飲之不能飲灌之立見

起死 此毒於肉飯中得之則易治飲酒中得之則

酒氣散歸百脈難治若在胃脘作楚則用稀涎散吐

之若在腹中作楚急服雄黃圓瀉之徐服參苓白朮

散無恙矣仍忌雞鵝肉數日

又方用早禾稈燒灰新汲水淋汁絹中濾過冷服一椀

毒從下利即安

又方用旋刺下羊血鷄鴨血熱服兼解鼠莽毒及丹藥
毒

又方藍飲子解砒毒及巴豆毒用藍根沙糖二味相和
搗水服之或更入薄荷汁尤妙

又方

白扁豆

青黛

甘草

各等分 巴豆 一
邊去殼

右為末以沙糖一大塊水化開調一盞飲之毒隨利

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

之却服五苓散之類

鮮射罔毒以生藍汁大小豆汁服效

解巴豆毒寒水石磨水服效 黃連汁菖蒲屑汁亦效

解天雄附子烏頭毒防風棗肉濃煎湯服

解丹毒地漿服最妙

解一切菌毒掘新地窟取真黃土以冷水於內攪之令

濁澄少頃取飲之可解亦拾楓木菌食之令人笑不

止



又方用芫花生為末每一錢汲新水下以利為准茵之毒者蓋因蛇蟲毒氣熏蒸所致

又解諸毒用玉簪花根搗水服

中諸藥毒用甘草黑豆淡竹葉等分剉散水一碗濃煎服

解鼠莽毒用金線蟲草根磨水服之即愈或用烏柏根

搗水亦好

又方用枯過明礬同極等好茶末少許新汲冷水調服

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

累有效驗

又方用大黑豆煮汁服之如欲試其驗先刈鼠莽苗葉以豆汁澆其根從此敗爛不復生矣

治獬犬傷或經久復發無藥可療者用之極驗

雄黃
色黃而明者
五錢

麝香
五分

右各研和勻用酒調二錢服如不肯服者則撚其鼻而灌之服藥後必使得腫切勿驚起任其自醒候利下惡物再進前藥即見效矣終身禁食犬肉蠶蛹此

毒再發則不可救

又方用斑蝥大者二十一隻去頭足翅以糯米一勺先將斑蝥七隻入米內於微火上炒不令米赤去此斑蝥別入七隻再於前米內炒令斑蝥色變復去之又別入七隻如前法炒米出青煙為度去斑蝥不用以米研為粉用冷水入清油少許空心調服頃又再進一服以小便利下惡毒為度如不利再進一服利後或腹肚疼痛急用冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黃連水亦可不宣便食熱物

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

蜈蚣毒用清油燈心點燈以傷處於煙上熏之其痛即止或用雞糞塗之嚼吳茱萸擦之立效

又方蜘蛛一枚安置於傷處飲出毒氣用冷水一碗在傍如蜘蛛死即投水中救活痛未止再換蜘蛛痛止為度

蜂蠆毒用野芋葉擦之如不便急以手就頭爬垢膩傳之或用鹽擦



斑蝥毒澤蘭葉按汁飲之乾者為末白湯調下

鱔蟹蝦蟆毒生豉一大合新汲水半碗浸令豉水濃頻

服之即瘥此三物令人小便秘臍下蔽痛有至死者

河豚魚毒一時困怠急以清油多灌之使毒物盡吐出

為愈白礬為末湯調服河豚能殺人服此毒自消

蛇傷毒貝母為末酒調令患者盡量飲之頻久酒自傷

處為水流出血水盡却以藥滓傅瘡上若所傷至垂

死但有少氣服此即活

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十

又方惡蛇咬傷傾仆不可療者香白芷為末麥門冬去

心濃煎湯調下頃刻咬處出黃水盡腫消皮合仍用

此藥滓塗傷處

又方治毒蛇所傷北細辛川白芷各五錢雄黃二錢為

末又另研麝香少許每服二錢溫酒調下

又方五靈脂一兩雄黃半兩為末酒調二錢服仍塗傷

處

又方冷水洗後用茱萸二合水一椀研取汁服以滓傅

虎傷生葛汁服兼洗傷處白礬為末納瘡口中痛止立

效

蜘蛛咬嚼薤白傅雄黃亦可遍身腫服藍汁

狗咬杏仁研細先以葱湯洗然後以此塗傷處

又方草麻子五十粒去殼并水研成膏先以鹽水洗咬

處次以此膏敷貼或用虎膏及虎骨末傅

狗咬涎文瘡令人昏悶浸椒水調莽草末塗之

又方白礬為末摻瘡內裏之亦效

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十

馬咬鞭梢燒灰塗之獨鰕栗子燒灰貼亦妙

蚯蚓咬或於地上坐卧不覺咬腎陰腫鹽湯溫洗數次

效

貓咬薄荷汁塗之

蠶咬苧汁塗之

鼠咬貓毛燒灰麝香少許津唾調傅

壁虱蜈蚣萍曬乾燒煙薰之則去青鹽水遍洒床席上

即絕



壁鏡咬毒人必死燒桑柴灰用水煎三四沸濾汁調白礬末塗瘡口兼治蛇毒或醋磨雄黃塗之

蝎螫痛不可忍白礬半夏等分為末釀醋調貼痛止毒出

八脚蟲傷方其蟲隱於壁間以口水射人徧體生瘡如

湯火傷用烏雞翎燒炙雞子白調塗效

灸法凡獠犬所咬未盡其惡血毒者灸上一百壯巴後

灸每日一壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

酒及猪犬肉蛇傷亦灸傷處

諸蟲

烏梅圓治蛇厥令病者靜而復煩臟寒蛇上入膈故煩須臾復上得食而嘔又煩者蛇聞食臭出其人自吐

烏梅 去核 十箇 當歸 川椒 去目 汗 細辛

附子 炮去 皮 臍 桂心 人參 黃蘗 各 六分

乾薑 炮 一兩 黃連 一兩 三錢

右為末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五斗米下熟

搗成泥和藥相得納白中與蜜杵一二百下圓如梧子大食前飲服十圓稍加至二十圓

集效圓治因臟腑虛弱或多食甘肥致蛇蟲動作心腹

絞痛發則腫聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐涎

沫是蛇咬宜服此藥若積年不瘥服之亦愈又治下部

有蟲生痔痒痛

木香 鶴虱 炒 檳榔 訶子 煨 去核

蕪荑 炒 餅 附子 炮去 皮 臍 乾薑 炒 各 七錢 半 大黃 剉 炒 一兩 半

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十

右為末蜜圓梧桐子大每服三十圓食前橘皮湯下

婦人醋湯下

什蟲散

雷丸 二箇 雞心檳榔 二箇 鶴虱 一錢 史君子 七箇 去殼

右為末入輕粉少許分作兩服當晚用豬精肉一兩

切成片以皂角漿浸一宿至五更微火炙熟又用些

清油拭肉候溫取一服藥末摻於肉上略烘過空腹

食之至巳刻蟲自下乃飲食



貫衆酒取寸白諸蟲五更嚼肉一片莫吞俟蟲尋肉其頭向上却吐出肉嚼史君子三箇并輕粉一字少頃以當晚所煎貫衆酒吞解毒雄黃圓七粒即瀉下皆蟲也

下寸白蟲東邊石榴根煎湯調檳榔末服之即下先將猪肉一塊含在口中嚥津下勿食之須臾去肉

救急

救自縊法凡自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

下安被卧又以一人脚踏其兩肩手挽其髮常令弦急勿使緩縱一人以手據按胸上數摩動之一人摩將臂肘屈伸之若已強直但漸屈之并按其腹如此一時頃雖得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以少桂湯及粥清灌令喉潤漸漸能嚥乃止更令兩人以管吹其兩耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可救暮至旦陰氣盛為難

救溺水急解去死人衣帶灸臍中即活令兩人以筆管



迪志文化出版有限公司出版

吹其耳中

又法凡人溺水者救上岸即將牛一頭却令溺水之人將肚橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹內之水如醒即以蘇合香圓之類或老薑擦牙

又方雖溺死一宿尚可救搗皂角以綿裹納下部須臾出水即活又將醋半盞灌鼻中

又法以屈死人兩脚著生人背上以死人背貼生人背

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

擔走吐水即活

又熬熱沙或炒熱灰將溺者埋於其中從頭至脚水出七孔即活

又以酒壘一个以紙錢一把燒放壘中急以壘口覆溺水人面上或臍上冷則再燒紙錢於壘內覆面上去水即活數方皆效奈人不諳曉多以為氣絕而不與救療可憐也其便而用之

救凍死四肢強直口噤只有微氣者用大釜炒灰令暖



迪志文化出版有限公司出版

以囊盛熨心上冷即換之候目開以溫酒及清粥稍與之若不先溫其心便將火灸冷氣與火爭必死又法用氈或藁薦裹之以案繫定放平穩處令兩人對面輕輕滾轉往來如捲氈法四肢溫和即活

救魘死不得著燈火照亦不得近前急喚多殺人但痛咬其足跟大母指甲邊并多唾其面即活如不醒者移動處些子徐喚之若元有燈即得如無燈切不可用燈照又用筆管吹兩耳或以皂角末吹兩鼻內或以鹽湯灌之或搗韭汁半盞灌鼻中冬月掘根研汁用

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

灸法救魘寐一切卒死及諸暴絕證用藥或不效急掐人中穴及兩脚大母指內離甲一薤葉許各灸三五壯即活臍中灸百壯亦效破棺散治魘寐卒死及為牆壁竹木所壓水溺金瘡卒到悶絕產婦惡血衝心諸暴絕證

半夏 湯洗七次去渣不拘多少



迪志文化出版有限公司出版

右為末每一大豆許吹入鼻中即活但心頭溫者一日可活皂角末亦效又方用葱黃心或韭黃男左女右鼻中刺入深四五寸令目中出血即活

又方視上唇裏有如黍米粒以針挑破單方治胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血口中衄血用熟艾如拳大水五盞煮三盞頻服又方鹽一盞水二盞和服以冷水嚥之吐即瘥

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

又方蓬莪朮酒研服一盞

備急散治卒中惡風氣忤迷絕不知人用乾薑大黃各一兩巴豆仁十五粒各研細以水三合灌服雄朱散或到客舍官駟及以無人居冷房睡中為鬼物所魘但聞其人吃吃作聲便令人叫喚如不醒不急救則死

牛黃 雄黃 各一錢
大朱砂 半錢

右為末每排一錢床下燒一錢用酒調灌之



迪志文化出版有限公司出版

又方桃柳枝取東邊者各三七寸煎湯二盞候溫并灌服

又方竈心土搥碎為末每服二錢新汲井花水調灌更挑半指甲許吹入鼻中

朱犀散治中惡中忤鬼氣其證暮夜或登廁或出郊野或遊空冷屋室或人所不至之地忽然眼見鬼物鼻口吸著惡氣驚然倒地四肢厥冷兩手握拳鼻口出清血性命遂巡須臾不救此證與尸厥同但腹不鳴心脇俱

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十

暖凡此切勿移動即令親眷人人圍繞打鼓燒火或燒麝香安息香蘊木樟木之類立候其醒方可移歸

犀角半兩 鎊屑研末 生麝香 大朱砂 各一分

右為末每服二錢新汲井水調灌之

又方雄黃為末每服一錢桃枝葉煎湯調灌下

又方故汗衣須用內衣久遭汗者佳男用女衣女用男衣燒灰為末每服二錢百沸湯調下

又方治客忤中惡多於道路在外得之令人心腹絞痛

漲滿氣衝心胃不急治即殺人

好京墨為末調二錢服或瓦器盛湯用衣襯貼熱湯於肚上轉移溫湯冷別換

骨鯁

骨鯁入喉以縮砂甘草等分為末以綿裹少許嚙之旋吐嚙津久之隨痰出

又方以野苧根淨洗搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以雞羹化下魚骨則以魚汁化下

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十

又方用金鳳花子嚼爛嚙下無子用根亦可口中骨自下便用溫水灌嗽免損齒雞骨尤效

玉屑無憂散治誤吞骨鯁哽塞不下

玄參 貫衆 滑石 縮砂仁

黃連 甘草 茯苓 山豆根

荊芥穗各半兩 寒水石煨 鵬砂各三錢

右為末每一錢先抄入口以新水嚙下

蜜綿法通治諸鯁用薤白煮令半熟以線繫定手捉線



少嚼薤白嚙之度薤至鯁處引鯁即出矣一法綿一小塊以蜜煮用如前法

又方以朴消研細對入雞蘇圓別圓如彈子大仰卧含化不過三四圓自然化之

又方以南鵬砂新汲水滌洗噙化其骨脫然而失

又方以貫衆濃煎一盞半分三服連進片時一咯而骨

出

神效解毒圓收藏年深愈見神效

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

青靛花

六兩

天黃

山豆根

各四兩

朴消

一錢

黃藥子

二兩

白藥

二兩

自然銅

四兩

貫衆

山梔子

宣連

楮實子

山茨姑

各二兩

白滑石

一斤

十兩

鉛光石

芭蕉自然汁

右為末糯米糊和藥一千杵陰乾不可見日不然析去一料可作一千圓却用鉛光石打光 諸般骨鯁井水磨下一圓作勢一吞即下 頰腮焮腫咽喉飛瘍清油調水磨化 酒毒腸風下血薄荷湯 赤眼

腫痛井水金蠶蠱毒黃連水 蛇犬蜂螫蜈蚣毒用水磨塗傷處 誤吞竹木棘刺井水 諸般惡毒用新汲水

魚骨鯁以橄欖食即下無則核搗為末用流水調下又方獺爪於咽喉下外爬自下

獸骨鯁象牙梳或牙笏等磨水嚙下桑木上蟲屑米醋

煎灌嗽自下

備急圓療心腹諸卒暴百病中惡客忤心腹脹滿卒痛

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

如刀所刺氣急口禁

乾薑

一兩

巴豆

去皮油

大黃

二兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓不拘時溫水下

下

誤吞蜈蚣以生猪血令病人喫須臾生清油灌口中惡心其蜈蚣滾在血中吐出繼與雄黃細研水服愈誤吞銅物不能化者濃煎縮砂湯服其銅自下又用生芩薺研爛服其銅自化細研堅炭為末米飲下於大



便內瀉下如烏梅狀

怪疾 得效四十六方

項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲

牛乳自消

寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊之一似鐘磬聲

日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲即愈

大腸頭出寸餘痛苦直候乾自退落又出名為截腸病

若腸盡乃不治但初覺截餘可治用芝麻油器盛之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

以罌坐之飲大麻子汁數升愈

口鼻中腥臭水流以椀盛之有鐵色蝦魚如粳米大走

躍不住以手捉之即化為水此肉壞矣任意饌食雞

肉愈

腹上麻痺不仁多煮葱白喫之自愈

婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效如未盡愈可

用舊幘頭燒灰酒服之

兩足心凸如腫上面生黑色豆瘡硬如釘子釘了履地

不得脛骨生碎眼髓流出身發寒顫惟思飲酒此是
肝腎氣冷熱相吞用炮川烏頭末傅之煎韭子湯服
效

凡腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃為氣脫
用益智子煎濃湯服立愈

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘆
三兩經一宿取出焙乾為末每服二錢酒調下服盡
安

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

玉莖硬不痿精流無歇時時如針狀捏之則脆乃為腎
滿漏疾韭子破故紙各一兩為末每服三錢水一盞
煎至六分每日三次飲之愈則住服

咽喉間生肉層層相疊漸漸腫起不痛多日乃有竅子

臭氣自出遂退飲食用臭橘葉煎湯連服愈

腹中如鐵石臍中水出旋變作蟲行之狀繞身匝啄痒
痛難忍撥掃不盡用濃煎蒼朮湯浴之以蒼朮末入

麝香少許水調服痊



眼前常見諸般禽蟲飛走以手捉之則無乃肝膽經為

疾用酸棗仁羌活玄明粉青箱子花各一兩為末每

服二錢水一大盞煎至七分和滓飲一日三服

大腸蟲出不斷斷之復生行坐不得用鶴虱末水調五

錢服之自愈

眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出

其名曰肝脹用羌活煎汁服數盞自愈

腹中有物作聲隨人語言用板藍汁一盞分五服服之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

又名應聲蟲當服雷丸自愈

有飲油五升以來方始快意長得喫則安不爾則病此

是髮入胃被氣血裹了化為蟲也用雄黃半兩為末

水調服蟲自出如蟲活者置於油中逡巡間連油撥

之長江

治卧於床四肢不能動只進得食好大言說喫物謂之

失說物望病治如說食猪肉時便云爾喫猪肉一頓

病者聞之即喜遂置肉令病人見臨要却不與喫此

乃失他物望也當自睡中涎出便愈

手十指節斷壞惟有筋連無節肉蟲出如燈心長數尺

餘遍身緣毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之

愈

遍身忽皮底混混如波浪聲痒不可忍抓之血出不能

解謂之氣奔以人參苦林青鹽細辛各一兩作一服

水二椀煎十數沸去滓飲盡便愈

眼白人渾黑見物依舊毛髮直如鐵條雖能飲食不語

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

如醉名曰血漬用五靈脂為末二錢酒調下

因著艾灸訖火痴便退落瘡內鮮肉片子飛如蝶形狀

騰空去了痛不可忍是血肉俱熱用大黃朴消各半

兩為末水調下微利即愈

臨卧渾身虱出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痒

痛不可言狀惟喫水卧牀晝夜號哭舌尖出血不止

身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯十數即安

眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅鑊乃目中熱毒氣



結於下焦用白礬滑石各一兩為末作一服水三椀煎至半令不住飲候盡乃安

有蟲如蟹走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化雷丸雄黃各一兩為末摻在猪肉片上炙熟喫盡自安

手足甲忽然長倒生肉刺如錐痛不可忍喫葵菜自愈鼻中毛出晝夜可長一二尺漸漸竈圓如繩痛不可忍雖痛摘一莖即後更生此因食猪羊血過多遂生用乳香硃砂各一兩為末以飯圓梧桐子大空心臨卧

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

各一服水下十粒自然退落

面上及徧身生瘡似貓兒眼有光彩無膿血但痛痒不常飲食減少冬則更甚名白寒瘡多喫魚雞韭葱自愈

脇破腸出臭穢急以香油摸腸用手送入煎人參枸杞淋之皮自全矣喫羊腎粥十日即愈

口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸漸至肩曾與肉相連堅勝金石鐵無由飲食此多因瘡後得



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

之煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈

徧身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血擁若不速治潰而膿出以赤皮葱燒灰淋洗喫鼓湯數盞自安

眉毛搖動目不能視交睫喚之不應但能飲食有經日不效者用蒜三兩取汁酒調下即愈

毛竅節次血出若血不出皮脹膨如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脈溢飲生薑水汁各一二盞即安

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

忽然氣上喘不能語言口中汁流吐逆齒皆搖動氣出轉大則悶絕蘓復如是名曰傷寒併熱霍亂用大黃人參末各半兩水二盞煎至一盞去滓熱服可安口内生肉毬臭惡自己惡見有根線長五寸餘如釵股吐毬出以飲食了却吞其線以手輕捏痛徹於心困不可言用水調生麝香一錢服三日驗

渾身生燎炮如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大泡復生抽盡肌膚肉不可治急用荆三稜蓬莪

術各五兩為末下三服酒調連進愈

頭面發熱有光色他人手近之如火燒人用蒜汁半兩汁調下吐如蛇狀遂安

人自覺自形作兩人並卧不別真假不語問亦無對乃是離魂用辰砂人參茯苓濃煎湯服之真者氣爽假者化也

男子自幼喜飲酒至成丁後日飲一二斗不醉片時無酒叫呼不絕全不進食日就羸弱令其父用手巾縛

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

住其手足不令動搖但扶少立却取生辣酒一壘就於其子口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲取飲堅不可與之須臾口中忽吐物一塊直下壘中即用紙封裏壘口用猛火燒滾約酒乾一半却開視之其一塊如猪肝樣約三兩重週回有小孔如針眼不可數計棄之於江飲食復舊雖滴酒不能飲矣

夜間飲水誤吞水蛭入腹經停月餘日必生下小蛭能食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不進食若不早



迪志文化出版有限公司出版

治能令人死用田中乾泥一小塊小死魚三四箇將猪脂溶攪勻用巴豆十粒去殼膜研爛入泥內為圓菴豆大用田中冷水吞下一圓小兒只用三圓至五圓須臾大小水蛭一時皆瀉出却以正方四物湯加黃耆煎服生血補理

方見婦人科通治類

婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直過小肚痛不可忍危亡須臾名曰乳懸將川芎當歸各二斤半斤剉散於瓦石器內用水濃煎不拘時候多少溫服餘

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

一斤半剉作大塊用香爐慢火逐旋燒煙安在病人面前卓子下要煙氣直上不絕令病人低頭伏卓子上將口鼻及兩乳常吸煙氣直候用此一料藥盡看病證如何或未全安略縮減再用一料如前法煎服及燒煙熏吸必安如用此二料已盡雖兩乳略縮上而不復舊用冷水磨草麻子一粒於頭頂心上塗片時即洗去則全安矣

婦人臨產服催生藥驚動太早未嘗離經而用力太過



迪志文化出版有限公司出版

以致育膜有傷產後水道中垂出肉線一條約三四尺長牽引心腹痛不可忍以手微動之則痛苦欲絕先服失笑散數服仍用老薑三斤淨洗不去皮於石鉢白內研爛用清油二斤拌勻入鍋內炒熟以油乾焦為度先用熟絹一段約五尺長摺作結方令穩重婦人輕輕盛起肉線使之屈曲作一團納在水道口却用絹袋兜裏油薑稍溫傳在肉線上熏覺薑漸冷又用熨斗火熨熱使之常有薑氣如薑氣已過除去又用新者如此熏熨一日一夜其肉線已縮入半再用前法越兩日其肉線盡入腹中其病全安却再服失笑散芎歸湯補理切不可使肉線斷作兩截則不可醫

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

有人患癆瘵兩年諸藥不效一日無肉味其腹痛不可忍又恐傳染移在空房候其自終經停三日病者腹痛氣息將絕思憶肉味之急忽有人惠雞子三枚其病人俛仰取火低頭取瓦銚煎熟吹火屢燃屢滅鼻



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

中如有所碍將熟間忽噎噴一聲有紅線一條自鼻中出牽抽約二尺長趨下瓦銚中病人知是怪物急用椀覆煎銚中盡力燒火不住其銚欲裂方住火開銚視之乃是小蟲一條頭目皆具已煨死如鐵線樣即以示其家人後棄之於江其病即安

居民逃避石室中賊以煙火熏之欲死迷悶中摸索得一束蘿蔔嚼汁下咽而甦又炭煙熏人往往致死含蘿蔔一片著口中煙氣不能毒人或預曝乾為末備

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十

用亦可或新水搗爛乾蘿蔔飲之亦可

自行被擷穿斷舌心血出不止以米醋用雞翎刷所斷處其血即止仍用真蒲黃杏仁去皮尖鵬沙少許研為細末煉蜜調藥稀稠得所嚙化而安

身上及頭面肉上浮腫如蛇狀者用雨滴堦磚上苔痕一錢水化開塗蛇頭立消

世醫得效方卷十

欽定四庫全書

子部
世醫得效方卷十一

詳校官太醫院醫士_臣程泰

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修_臣詹聖脉

校對官侍詔_臣胡士震

謄錄監生_臣王秉鈞

欽定四庫全書

世醫得效方卷十一

元 危亦林 撰

小方科

活幼論

嘗謂木有根莖水則有源根莖盛則枝葉暢茂源深則其流必長小兒稟父母元氣而生成元氣盛則肌膚充實驚疳積熱無由而生風寒暑濕略病即愈元氣虛則

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一

體質怯弱諸證易生所患輕則藥能調治所患重則可治者鮮故試晬之後或不能言或不能行或手拳不展髮不生斯猶可治甚則初生之時臍風撮口弔腸等證鎖肚重舌無聲舌焦偏體青黑如此證狀非急療則百無一活若其餘諸病不一治之之道當觀形察色聽聲切脉觀形則先觀其眼若兩眼無精光黑精無運轉目睫無鋒芒如魚眼猫眼者不治或神藏於內而外若昏困神氣不脫則豈無再活之理察色者若面目俱青眼



睛竄視此為驚邪入肝面紅眼赤惕夜啼則驚邪入心面青惡叫嚙奶咬牙乃驚邪入腎面色淡白喘息氣乏則驚邪入肺面黃嘔吐不食虛汗多睡乃驚邪入脾皆隨其狀而治之若夫聽聲則睡中驚啼聲浮者易治聲沈不響者難痊或聲如鴉中彈者不治至於切脉虛則細而遲實則洪而數次當看紋候男左女右手辨之從虎口內至第一節是風關第二節是氣關第三節是命關第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋微乃火驚黑則水驚兼打撲驚青色乃天雷四足驚內隱青紋微屈則是急風疾紋彎乃停食候第二節氣關紫色紋是驚疳青色紋乃疳傳肝經白則疳傳肺經若黃色乃傳脾經黑色難安第三節命關青黑紋現三關通度斜歸指甲則不治至於驚疳積熱四證驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎來去其瀉必青積漸生風其證有冷熱虛實冷則燥之虛則溫之實則利之熱則涼之是為活法急驚之候通關截風定搐去痰其熱尚作則當下之一泄已

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一



迪志文化出版有限公司出版

後又急須和胃鎮心不可過用寒涼等劑其或口中出血兩足擺跳腹肚搐動摸體尋衣神昏氣促噴藥不下通關不噤心中痛絕忽大叫者難愈慢驚之候宜於生胃氣藥和以截風定搐不可太燥其或四肢厥冷吐瀉加嗽面黯唇慘胃痛鴉聲口生白瘡髮直搖頭喘急涎鳴口眼手足一邊牽引者難愈慢脾十救一二祇當生胃回陽如太衝脉在則取百會穴多灸之若身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁虛痰上攻呼吸氣粗脉來浮數是謂陰盛彊陽錯認陽氣已復直與峻藥下痰痰隨氣下人以醫殺咎之此則覆燈將絕之證雖不藥亦無生意矣又有喉中痰涎聲如拽鋸一兩日間閉目不開此為虛痰飽養其氣凌遽下痰亦不可保蘇合香白圓子輩姑與之

男子婦人有此證亦當守此
二藥以上驚風本證各見後

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一



迪志文化出版有限公司出版

舌犬癰手屈兩足拳攣雞癰搖頭反折

並屬陽

猪癰口吐

涎沫振目視人牛癰目視腹脹鳥癰唇口撮聚手足俱

搖蛇癰身軟頭舉吐舌視人

並屬陰

治法須辨其冷熱順

氣平血豁痰除風其或目睛不轉口噤無聲唇面青黑

肚脹不乳身熱下血厥逆吐痢汗出壯熱不止體軟不

睡眼生白障不治之候天癰者壯熱翻眼手足搐掣如

魚之上釣皆由乳母過食熱毒逆復乳兒兼挾風邪所

致但當解利風熱則應手而愈驚風諸證有不可治者

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

總而論之項筋無力魚口氣粗嚙齒咬人瀉下如瘀血
手足搐搦不停目似開不開身軟口噤不食木舌乾澀
反張脊強顛陷不動啼不作聲冷汗如雨慢脾灸不醒
視物不轉睛眼上赤脉雖盧扁復生亦無如之何若疳
候兒童二十歲已下為疳二十歲以上為癆癆與疳皆
氣血虛憊臟腑受傷故有肝心脾肺腎五疳外有蛔疳
脊疳腦疳乾疳渴疳瀉疳痢腫脹疳勞無辜疳丁奚
哺露治之各有方其病多因乳哺失常腸胃停滯或妄

服吐下藥津液內竭而得之故其為候頭皮光急毛髮

焦稀顛縮鼻乾口淡唇白兩眼昏爛揉鼻擗眉脊聳體

黃鬪甲咬牙焦渴自汗漩白瀉酸肚脹腸鳴癖結潮熱

或身多瘡疥酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土多飲水者皆其

證也惟腎疳害人最速者蓋腎虛受邪熱疳氣奔上焦

故以走馬為喻初作口氣次第齒黑盛則齩爛熱血迸

出甚則齒脫宜急治之縱得全活齒不復生其餘諸疳

如或飲水不已滑泄不休舌上黯黑目睛青筋眼角黑

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

氣小便如乳牙黑骨枯脫肛欬逆氣促身上粟生斑黑
唇白腹高人中平滿抱著手足垂譚無力襯著脚心全
不知疼身體變冷為五絕豈有瘳乎積者面目浮黃臍
腹脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸秘澀小便如油或
便利無禁糞白酸穢此皆其證也其或面黑瀉黑肚脹
泄下不止氣粗手心有瘡瘦弱柔軟亦莫能療熱之為
病有實有虛實者兩臉深紅唇口紅紫燥渴焦煩大小
便難啼叫無時時發極熱虛者面色青白恍惚微潮口



中清冷泄瀉虛汗或乍冷乍溫上壅下利水穀不分乃冷熱不調外有十證熱者潮熱如癰風熱不減乳食積熱多吐傷寒脚手冷耳鼻脚梢手指尖冷乃麻疹之證唇汗口珠乃變蒸候也多瀉多渴痞之為熱面青脉大驚熱的矣脾痛啼聲不息瘧毒瞭然目閉面如丹胎中全不受熱諸吐乳食化面色黑隨食隨吐通身冷則為不治諸瀉日久不宜緊澁之藥卒止先須調氣和中若洞瀉不止乳食不進無有愈期汗多舌出唇紅眼閉搖頭氣粗兩脇動口生血瘡吐瀉得之名曰胃爛夭亡轉盼至於八痢則有魚口噤口五色脫肛臟毒脾毒冷積疳痢無非便下膿血裏急外重臍腹急痛日夜無度治之當何如須究其因先去積寬腸通氣之劑續為之斷下鮮有不愈其或所下如魚腸血水壯熱煩渴不食自汗小便不利未知有瘰瘡疹一證乃表虛裏實其根於臟腑所患重麻疹表實裏虛其根於皮膚所患輕不治亦自愈至若痘疹多因時令不正氣候傳染加之外

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一



迪志文化出版有限公司出版

感風寒內積邪熱而得大抵與傷寒相類發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼耳鼻脚梢手中指俱冷噴嚏呵欠喘嗽痰涎或乍寒乍熱疑似之間當視其耳後有紅脉赤縷及見心胸間細點如粟起為真首尾不可汗下宜溫涼之劑解毒和中安表大要如庖人作竈炊樣務得鬆耳其或熱極生風或發驚搐但當清心散風切不可投冷驚之藥及灼艾蓋灸則火助熱熾投冷驚藥則毒氣內伏反為大害仍忌諸般臭穢煎炒油煙父母行房梳頭等觸犯未發而觸則毒氣入心悶亂而死已發而觸則瘡痛如割以至黑爛切宜禁戒仍燒帶諸香及打醋炭噴葫荑酒於偏房以辟穢濁之氣却不可以田舍兒不忌無恙為常法病此者多不服藥豈知未發已發則合解散正發則合活氣血若依此非惟出疎亦易乾斂且免後慮若不依此則邪盛瘡密收亦費力餘毒為患致生癰疽疥癩赤眼咽喉口瘡之疾至於善惡之證猶當細認如善證則乳食如常大便或一日一次或兩日

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一



迪志文化出版有限公司出版

一次通者祇須用和不冷不熱之藥自保取平全如惡證則春夏屬陽為順秋冬為逆冬月寒腎水得時多歸於腎或先如癰後發渴其瘡色如黯血此腎證也不治春膿疱為金尅木夏黑陷為水尅火秋斑子為火尅金冬疹子為土尅水並逆鼻有黑氣或舌黑瘡已出而譫語燥渴小便澁泄瀉不入食瘡成餅搭黯慘不發其聲焦啞兩眼閉而黑睛矇昧面腫鼻陷目閉頻嚙齒頭面腫大瘡盡抓破或臭不可近或脚冷至膝瘡小黑而焦

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一

風攻頤領唇項腫硬胸高而突以上證狀均不可治外此至於風寒暑濕之感與大人無異治之法特劑量差少耳雜證則隨方備治吁為醫之道大方脉為難活幼尤難以其臟腑脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡如絲脉息如毫易虛易實易冷易熱兼之口不能言手不能指疾痛之莫知非觀察色聽聲切脉究其病源詳其陰陽表裏虛實而能療之者蓋亦寡矣若妄投藥餌即生他證可不戒之



迪志文化出版有限公司出版

初生

拭穢法嬰兒在胎口中有惡物纔生不候聲出急用軟帛或綿裹手指蘸黃連甘草汁拭口惡汁稍定更以蜜少許調朱砂末一字抹入口中鎮心安神解惡物之毒一生免瘡豆之患妊婦臨月預辦之

刺泡法小兒纔生下即死用此法可救活急看兒口中懸癰前腭上有泡以手指摘破用帛揩拭血令淨若血入喉即不可治

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一

煖臍法初生氣欲絕不能啼者必是難產或胃寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置炭火爐中燒之仍作大紙撚蘸清油點著於臍帶上往來徧帶燎之蓋臍帶連兒臍得火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼泣如常方可浴洗了却斷臍帶

通便法初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水漱口了吸啞兒前後心并臍下手足心共七處每



迪志文化出版有限公司出版

一處凡三五次漱口吸啞取紅赤為度須臾自通不

爾無生意有此證遇此法可謂再生

貼顙藥治出胎時被風吹鼻塞服藥不退

右用天南星為末生薑自然汁調或膏貼顙上病去除之

奇方治初生下遍身無皮但是紅肉宜速以白早米粉

乾撲候生皮方止

又治生下遍身如魚泡又如水晶破則成水流滲

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

右用密陀僧研絹羅內羅過乾糝仍服蘇合香圓 見中

氣類

又治七日腎縮乃初生受寒所致

右用硫黃茱萸各半兩為末研大蒜調塗其腹仍以

蛇床子微火燒熏之

噤風

辰砂膏治眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流

毒於心脾故形見於喉舌或為風邪擊搏致之

辰砂 三錢 礪砂 馬牙硝 各一錢半 玄明粉 二錢

全蝎 珍珠末 各一錢 生麝 一字

右為末好油紙封裹自然成膏每服一豆粒許用乳汁調傅乳頭上吮下金銀薄荷湯下亦可有潮甘草湯服

益脾散和胃進乳消痰

白茯苓 人參 草果仁 蘇子 微炒

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

木香 濕紙裹熱 甘草 陳皮

厚朴 去粗皮薑汁炒

右剉散每服一錢生薑一片紅棗一枚末乳前服合

滓乳母服

單方治初生七日口噤

右用牛黃一錢細研以竹瀝調一字灌之更以猪乳

點於口中

臍風



天麻圓治因斷臍後為水濕風冷所乘入於臍流於心脾遂令肚脹臍腫身體重著四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐此藥利驚下痰凡釣腸鎖肚撮口皆可用

南星 二炮錢

白附子 炮

牙硝

天麻

五靈脂

全蝎 焙各一錢

輕粉 半錢

巴霜 一字

右為末稀糊圓麻子大每服一圓薄荷薑錢泡湯送下若臍邊青黑及爪甲黑者不治

立聖散治同上

欽定四庫全書

世醫得效方卷十一

蜈蚣 一條

酒湧去糞汁

瞿麥 半錢

蝎梢 五箇去毒

直僵蠶 七枚

去絲

右為末每一字吹入鼻啼則可醫仍服薄荷調一字

服

麝香散

赤脚蜈蚣

半條酒炙

麝香 少許

川烏尖 三箇

生



迪志文化出版有限公司出版

右為末每服半字金銀器湯調下

治臍腫先用荊芥水洗了葱葉一皮火上炙過地上出火毒以手指甲刮薄內搭放腫處次日便消用通心飲

小驚圓大驚圓 方見後

安臍散治臍中汁出或赤腫譽痛或因水與乳入臍所致

右當歸為末傅蝦蟇燒灰白石脂末油髮灰傅皆可

撮口

欽定四庫全書

世醫得效方卷十一

僵蠶方治面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強唇青聚口撮面飲乳有妨

右用直僵蠶二枚去背畧炒為末蜜調傅唇中效

天麻圓治釣腸鎖肚等撮口內氣引痛腸胃鬱結不通則亟宜疎利此藥特效 方見前

若口出白沫四肢冰冷最為惡候當臘見之尤急又法極驗其兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫湯蘸熟帛裹手指輕擦破即開口便

安臍風同用



迪志文化出版有限公司出版

蝎梢散治胎風及百日內撮口臍風

右用蝎梢四十九箇每一箇用薄荷葉捲定以綿扎

放砂銚中袞轉炒令薄荷乾酥為度再用白僵蠶四

十九箇生薑汁炒乾去絲紫同為末更以腦子生麝

香少許研勻紫雄雞肝二片煎湯調下

不乳

奇方治初生不飲乳及不小便

右用葱白一寸四破之以乳汁銀石器煎灌之立效

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一

又治初生口噤不開不收乳

右用赤足蜈蚣一條去足炙令焦細研如粉每用半

錢以猪乳汁二合和勻分三四次灌之

茯苓圓初生兒拭口不早惡穢入腹腹滿短氣不能飲

乳

赤茯苓

去皮

川黃連

去鬚

枳殼

炒各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每一圓乳汁調灌下

川白薑散治產婦取冷太過胎中受寒令兒腹痛不飲

乳

木香

陳皮

檳榔

各一分

官桂

川白薑

甘草

炙各半分

右剉每取一捻水一合煎以綿蘸與之嘔加木瓜丁

香

變蒸

惺惺散治變蒸變者上氣蒸者體熱輕則發熱微汗其

狀似驚重則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一

者五日解重者七八日解其候與傷寒相似亦有續感

寒邪者但變蒸則耳冷翕冷上唇頭白泡如魚目珠若

寒邪搏之則寒熱交爭腹痛啼叫不已每服一錢麥湯

調下熱甚麥門冬薄荷葉湯下

方見後
外感類

紅霜圓治變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱不歇

及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐嘔先寒後熱者

代赭石

醋浸七遍

赤石脂

各一兩

巴豆

二十粒
壓去油

杏仁

五十粒
去尖

皮



右以二石為末別研巴豆杏仁為膏相和更搗一二千杵當自相得若硬入少蜜再杵之圓如粟米大用密器收每服二圓與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中當小利熱除若未全除明日更與二粒百日兒服五粒以此準定增減此藥兼治驚積痰癖食癰溫壯諸疾無所不治雖下亦不虛人

人參散治變蒸骨熱心煩啼叫

人參

甘草

麥門冬

去心

北柴胡

各一錢

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

錢

龍膽草

防風

各一錢

右剉散每服三字水一盞煎服

當歸散治變蒸有寒無熱

當歸 二錢

木香

官桂

辣者

甘草

人參 各一錢

右剉散每一錢水一盞薑三片紅棗一枚煎食前服

調氣散治變蒸吐瀉不乳多啼

木香

香附

炒去毛

厚朴

去粗皮薑汁炒

人參



迪志文化出版有限公司出版

橘皮 藿香 去土 甘草 炙各一錢
右剉散每服三字水一盞生薑二片紅棗一枚煎溫服以上證狀治之但當以平和之劑微表熱實者微利之或不治亦當自愈

通治

乳哺法凡初乳先須擠去宿乳後與之母欲寐即奪其乳恐睡困不知飽足兒啼未定氣息未調乳母勿遽以乳飲之故不得不停滯胸膈而成嘔吐乳後不與

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

食哺後不與乳脾胃怯弱乳食相併難以化幼則成嘔而結於腹中作疼大則成癖成積成疳皆自此始

護養法小兒肌膚未實若厚衣過煖傷皮膚損血脉發瘡瘍汗出腠理不固風邪易入若天氣和暖抱之使見風日則血氣堅剛肌肉硬可耐風寒不致疾病今人懷抱小兒不著地氣致令筋骨緩弱疾病易生非愛護之法



迪志文化出版有限公司出版

相兒命短長法

凡兒三歲已上十歲以下視其性氣高下即可知其夭
壽兒小時識悟通敏過人者多夭小兒骨法成就威
儀迴轉遲舒稍費人精神雕琢者壽預知人意迴旋
敏速者亦夭初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚
急者不壽啼聲散啼聲深汗不流頭四破小便凝如
脂膏常搖手足頭毛不周匝者並不成人臍中無血
者好臍小者偏身軟弱如無骨者汗血者多厄並不
壽鮮白長大卵縫通達黑者並壽目視不正數動者
大非佳早坐早行早齒早語皆惡性非佳人髮稀少
者強不聽人額上有旋毛妨父母或早貴初生枕骨
不成能言而死尻骨不成能踞而死掌骨不成能匍
匐而死踵骨不成能行而死臍骨不成能立而死身
不收者死股間無生肉者死頤下破者死陰不起者
死陰囊下白者死赤者亦死
四君子湯隨證加味量兒大小用

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一



迪志文化出版有限公司出版

人參

白朮

茯苓

甘草

各等分

右為末每服二錢傷寒麻黃豆豉北柴胡 吐瀉
南木香藿香乾葛 潮熱牛黃鬱金朴硝全蝎薄荷
麻豆牛旁子紫草蟬退荊芥 腹膨枳殼木通蘇
子薑錢 冷瀉扁豆肉豆蔻薑錢棗子 咳逆肉豆
蔻木通 大熱苦竹瀝 積熱上攻茅根淡竹葉甘
草 乳食不下呵子木香 時行咳嗽藿香枳殼薑
錢 暴風燥痒荊芥牛蒡子枳殼高良薑蟬退 鼻
流清涕羌活麻黃防風 泄瀉肉豆蔻木香 滑腸
呵子榴皮 臟毒形如白痢或有血根如魚腦髓豆
蔻地榆粟殼 赤痢粟殼烏梅 白痢粟殼白薑
大便不利大黃朴消 小便不利木通車前子 霍
亂木瓜霍香夏月加香薷 腹痛茴香附子或用澤
瀉郁李仁薑棗或祇用木瓜豆蔻 腹緊積候三稜
檳榔薑湯下 有淋火麻子仁生熟皆可車前子海
金沙亭蓆子下 溺血生地黃瞿麥 渴枇杷葉炙

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一



迪志文化出版有限公司出版

去毛爪根	咳嗽杏仁炒去皮尖貝母知母薑錢蘇
子	夜睡驚啼茯苓酸棗仁 驚邪薄荷朱砂犀角
人參	顛癇甘草朱砂茯苓牛黃乳香犀角人參鉛
白霜	喉痺犀角杏仁當歸豆豉百合大黃 口瘡
雞內金	梔子黃芩朴消苦竹葉 唾血生地黃當歸
藕節	側柏人參蒲黃 血衄蒲黃山梔子淡竹葉
目赤	秦皮菊花苦竹葉甘草 肚蟲檳榔史君子枳
殼苦楝皮	頭昏石膏川芎 癰瘰及腋下氣塊肚
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一	
痛此氣疾也用天雄參稜朴消大黃	五心熱犀角
腦子磨刀水下	氣不升降沈香蘇子 養氣肥兒
檳榔木香紫蘇葉紅棗	
驚候	附天癰
大安神圓又名大驚圓治心熱夜啼煩燥常用安神定	
志去驚	
人參	去蘆 茯苓 各半兩 甘草 一兩 僵蠶 去絲 二錢
半	白朮 半兩 煨 桔梗尾 二錢 辰砂 半兩

全蝎	五箇 去毒 金銀箔 各六片 麥門冬 去心 木香 各半兩
酸棗仁	一兩 湯去皮 炒 大赭石 半兩 南星 圓白 二錢
錢半	
右為末水圓或蜜圓	急驚潮熱竹青薄荷葉 夜
啼竈心土	傷風荊芥湯 疹豆蟬退去足翼 搐
搦防風	常服金銀薄荷 慢驚冬瓜子仁 凡驚
風已退神志未定加琥珀三錢別研遠志半兩去心	
薑汁炒焦為度加入	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一	
星香散治急慢風搐搦竄視涎潮	
南星	圓白者 木香 橘紅 各一錢 全蝎 二枚
右剉散水二盞生薑四片慢煎熟頻灌大便去涎即	
愈	
來復丹治驚風昏塞以二三圓薄荷泡湯研灌下得泄	
即愈凡驚風對證用藥已效若覺未甚蘇省可與服圓	
數酌量	方見虛 損類
又方安神圓定驚	



麥門冬去心 馬牙硝 白茯苓 乾山藥	寒水石各半 朱砂三錢 甘草半兩 龍腦二字	右為末煉蜜圓雞頭大每服半圓沙糖水化下不拘時候	奪命丹治急慢驚風	蛇含石醋淬七次 大赭石淬同上 全蝎五箇去毒	鐵孕粉半兩	右為末每服一錢薄荷煎湯入雄雞冠血少許潮熱	入朱砂病安常用安神圓	涼驚小驚圓	鬱金皂角水浸 黃連 牙硝	木香不見火 藿香 龍膽草各五錢 全蝎去毒	右為末糊圓用雄黃朱砂麝香金銀箔為衣	風痙是驚熱重麻仁蟬退防風 白痢白薑嬰粟殼	赤痢甘草烏梅 潮熱桃柳枝 鎮驚薄荷燈心	吐藿香 瀉木瓜陳米 夜啼燈心薄荷竈心土

精神不爽冬瓜子仁 大便不通枳殼大黃朴消	盤腸疝氣釣藤天疝亦用 嗽烏梅桑白皮 吐	不止丁香末效黃荊葉 常服金銀薄荷並酌量用	通心飲治心氣通小便退潮熱分水穀反治旋螺風	木通去皮節 連翹 瞿麥 梔子仁	黃芩 甘草各等分	右剉散每服二錢水一盞燈心麥門冬去心煎 春	盛蟬退防風夏加茯苓車前子秋加牛蒡升麻冬加	山梔子連翹 疝氣用釣藤川楝子或加白茅根竹	葉 口瘡地黃野苧根湯 旋螺風如赤腫而痛者	先用土牛膝澤蘭煎水洗	大青膏一歲可用甘露飲同服此藥治志驚初作傷寒	不解終日溫熱漸瀉風候	驚風形證不明言其陰證渾身又溫若作陽證又不大	搐乃陰陽不和宜用防風溫膽湯同下大驚圓小驚圓	均可用方並見前後



利驚蟬退散治驚風天癰心熱夜啼驚癇		蟬退 六十箇去土足翼		荊芥穗 一兩		甘草 半兩蜜炙	
大黃 半兩紙裹煨		黃芩 半兩生用		蝎梢 五十箇去毒		右剉散每服二錢水一盞白茅根煎溫服夜啼蟬退疹瘡紫草得利止	
利驚圓急驚身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤抽掣		青黛 各一錢		天竺黃 二錢		黑牽牛 未生	
右同研蜜圓如小豆大一歲一圓食後薄荷水下		人參湯加枳殼防風最能利驚即小柴胡湯 方見大方傷寒類		涼肝圓治同上 方見後		胎驚方兒在胎中受驚故生未滿月而發驚	
右用朱砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口		中入麝香當門子尤妙		急驚			

急驚乃卒然得之初發潮熱目直視牙關緊急手足搐搦面紅盛頭額偏身汗出口中熱氣大小便黃赤其脉浮數宜用通關服通心飲大凡驚風乃心受驚肝主風致筋脉搐搦肝又主筋宜涼肝圓大青膏		涼肝圓專治緣肝主風宜先涼肝而風自退而色青乃肝風作宜用凡是肝疾者使用眼疾屬肝亦宜用又可加減用如眼疾加山梔子龍膽無妨		龍膽草 三錢		大黃		當歸 去蘆		川芎	
山梔子仁		羌活		防風 去叉各五錢		右為末蜜圓沙糖竹葉湯下		大青膏		天麻 一錢	
白附子 一錢半		蝎梢 半錢		朱砂 一字		青黛 一錢		天竺黃 一字		麝香	
烏蛇肉 浸酒		錢 焙半		右為末蜜圓雞頭大每服一錢薄荷斑竹葉煎湯下		加味壽星圓治急驚痰壅目上視手足抽掣昏沈不省					



人事 方見風科
通治類

芎活湯治急驚風角弓反張

人參 黃芩 杏仁 石膏 各一錢

麻黃 甘草 桂心 芎藭

乾葛 升麻 當歸 去尾 獨活 各三錢

右剉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫服

鈎藤飲治一切驚風潮搐眼視昏迷但是驚風變易皆可服之

欽定四庫全書 世醫得效方
卷十一

麻黃 去節 粉草 各三錢 蟬退 五箇 升麻 三錢

龍膽草 二錢 川芎 天竺黃 鈎藤

羌活 獨活 防風 各三錢

右剉散每服二錢竹葉三皮薄荷三皮煎不拘時溫服

塗顛法不但初生但有風證即用

右以麝香蝎梢薄荷葉蜈蚣牛黃青黛共為末研勻用棗肉膏調新綿上塗勻貼火炙煖手頻熨之百日

外兒更可用浴體法

浴體法驚風及傷風不醒漸傳風證僵仆皆可用

右用天麻蝎尾朱砂烏蛇肉酒浸白礬麝香青黛為末每三錢水三碗桃枝一握并葉煎十沸溫熱浴勿

浴背

慢驚

慢驚風證得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼之藥其證眼慢騰騰或露睛手足痠癱面色青白渾身四肢

欽定四庫全書 世醫得效方
卷十一

冷默默不聲其脉沈遲用白朮散益黃散防風冬瓜仁

煎服安神圓冬瓜仁湯磨化 方並見後

南星飲宣利過多脾困眼慢涎盛四肢不舉不思飲食

天南星 三箇炒赤令熟 冬瓜子仁 白扁豆 各一兩

右為末每服一錢生薑二片防風少許煎湯調服

防風圓治慢驚不省手足微動眼上視昏睡

天麻 防風 人參 各一兩 全蝎 去毒七箇



僵蠶 炒斷絲	粉草 各五錢	朱砂	雄黃 各三錢半
麝香 半錢	右煉蜜圓小指頭大人參湯化一圓不以時候冬瓜仁湯尤妙	觀音散治胃氣不和脾困下瀉過多不思飲食乳食不化精神昏慢四肢困冷	人參 紙裏煨
冬瓜子仁 去皮炒	酸棗仁 去皮炒	甘草 炙各半兩	白茯苓
藿香 去穰各半	枳殼 去穰各半	紫蘇葉 少許	木香 不見火
石蓮肉 去必嫩黃耆各半兩	右為末每服一錢烏梅湯冬瓜子仁陳米湯調皆可	五苓散止吐瀉每服一錢紫蘇梗陳米湯調下 方見大傷科	暑類
小鉤藤飲治吐利脾胃虛風慢驚	鈎藤 三錢	蟬退 十箇	防風
麻黃 二錢	僵蠶	天麻	全蝎 去毒
人參 各二錢	防風	人參 各二錢	全蝎 去毒

甘草 各三錢	川芎 少許	麝香 少許	右剉散每服二錢水一盞煎寒加附子少許乳食前服
南附湯治洩瀉虛脫生風名慢驚風及因服冷藥多者	南星 生附子二錢	全蝎 五箇去毒	右剉散每服二錢水一盞薑三片煎五分量大小旋服
丁附湯治吐瀉虛脫成慢驚風	大附子 生或炮去皮臍	右剉散每服一錢水一大盞生薑五片丁香五粒煎五分量大小與之急無丁香亦可屢收奇功	蘇合香圓治風搐搦必須理氣蓋氣下則痰下關竅自通 方見大傷科中
灸法治急慢驚風危極不可救者	先當兩乳頭上男左女右灸三壯次灸髮際眉心顙會三壯手足大指當甲角以物縛兩手作一處以艾		



騎縫灸男近左邊女近右邊半甲半肉之間灸三壯
先脚後手亦可治陰陽諸癇病

艾炷如
麥子大

慢脾

黑附湯治慢脾風面青額汗舌短頭低眼合不開睡中
搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐不收或身冷
或身溫而四肢冷其脉沈微陰氣極盛胃氣極虛十救
一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟
脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚
可療但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志
沈迷痰涎凝滯而然爾世所謂慢風難療者慢脾風是
也

附子

炮去
皮三錢

木香

一錢半

白附子

一錢

甘草

炙半
錢

右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎取一半以匙
送下若手足煖而蘇省即止

川烏散驅風回陽

真川烏

生一分

全蝎

去毒

木香

各半分

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一



右為末每服三字生薑四片煎取其半旋滴入口中
嘔吐加丁香

金液丹青州白圓子祛風回陽理痰二藥等分為末每
服半錢陳米飲調下

方見大方科癇冷類青州
白圓子方見風科通治類

生附四君子湯助胃回陽

右以四君子湯加生附子末四分之一厥逆者對加
每服半錢薑五片慢火熟煎以匙送下

蝎附散回陽氣豁風痰

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

全蝎

七箇
去毒

附子

炮二錢

南星

炮

白附子

炮

木香

各一錢

右剉散每服半錢水一盞生薑四片慢火熟煎旋服
靈砂正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎傷瀉者勿用研為
末以少許米飲調下或糕糍圓如粟米大兒兩三圓米
飲灌下

方見大方
科癇冷類

震靈丹治慢脾風吐瀉不止每服一圓研人參南木香

煎湯乘熱調下

方見大方
科癇冷類



灸法同前

截風

蛇頭圓若見搖搦不已驚狂迷悶角弓反張或昏沈嚙

齒雙目直視頻喚不省變為癰證亟宜服此藥以除之

却不可多進更須以疏風藥相間調理凡服此藥亦須

先以木香烏藥枳殼檳榔末少許灌之却服庶使關節

通透藥力無不到

花蛇頭 酒浸去皮

全蝎 十五箇去毒 紫粉 五錢

欽定四庫全書 世醫得效方卷十一

生麝香 半錢 五靈脂 五錢 朱砂 三錢

真鬱金

沈香 白附子 各五錢

金銀箔 各五

片 蛇含玉 二兩沙鍋煨令赤濃煎甘草湯淬以手撚得酥為度方可用

一方加防風 白蠶 南星

天麻 各五錢 片腦子 半分

右為末煉蜜圓小指頭大每服大者一圓小者半圓

隨證依後大風膏湯引下

大風膏定諸般風搐

花蛇 酒浸方骨蜈蚣酒浸去全蝎五箇去毒 蛇含石 二兩

燒紅醋 大赭石 一兩燒紅 天竺黃 五錢

天麻 三錢 防風 一兩 青黛 紫粉 各三錢

僵蠶 炒去絲 白附子 辰砂 各五錢 麝香 半錢

天南星 三兩薑汁浸焙乾下

右為末煉蜜圓久留用麪糊圓如小指頭大每服大

者一圓小者半圓 慢驚冬瓜子仁煎湯下 搐搦

雞冠血薄荷 急驚斑竹葉薄荷 化涎桑白皮湯

欽定四庫全書 世醫得效方卷十一

退潮熱薄荷磨刀水 止嗽北五味子杏仁 夜

啼燈心竈心土蟬退水濃磨灌下

奪命散大控風痰不問慢驚急驚風痰壅塞咽間其響

如大潮百藥不能過咽命在須臾服此良久藥裏涎隨

大便過如稠涕膠粘乃藥之神效無此證不可服

真青蒙石 焰硝 各一兩

右同入甘鍋內瓦片蓋定鹽泥固濟炭火煨通紅須

待硝盡如炎藥冷如金色取出研細為末急驚痰壅



身熱如火濃煎薄荷湯入蜜少許調勻微溫服之		慢驚慢脾加青州白圓子三粒研為末生薑自然汁		調若稀糊入熟蜜少許調勻溫服		防風溫膽湯消痰順氣疏風		半夏		枳殼 去穢炒		茯苓 各半兩		陳皮		防風 各二錢半		甘草 一錢半		人參 二錢		右剉散每服一錢入生薑紫蘇葉同煎服效		人參羌活散治壯熱涎潮牙關緊急		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一		柴胡 去苗半兩		地骨皮 去土		前胡 去苗各二錢半		天麻 酒浸炙二		獨活 去蘆		羌活 去苗		枳殼 去穢炒		茯苓 去皮		甘草 各半兩		桔梗 二錢半		右剉散每服二錢水一盞薄荷少許煎溫服不拘時		候		銀白散治或吐或瀉涎鳴微喘露睛驚跳		石蓮肉		白扁豆 炒		茯苓 各一分		人參	

天麻		白附子 炮		全蝎 炒		木香		甘草 炒		藿香 各半分		陳米 炒香三錢		右為末每服一錢薑一片冬瓜子仁七粒同煎或用		陳米飲調下 此藥助胃祛風作慢驚通用		開關散		赤蜈蚣 一條炙		直僵蠶		南星 炮各一錢		麝香 一字		猪牙皂角 三錢畧炒存性		右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入		藥兩三點涎出自開		嚏驚散		半夏 生一錢		皂角 半錢		右為末以豆許用管子吹入鼻立惺		諸癇		人參羌活散治陽證風癇身熱啼叫手足抽掣面目牽		引口噤痰壅腹肚緊膨皆由血脉不斂氣骨不聚為風		所傷驚怪所觸 方見前		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一	



牛黃清心圓治躁悶項背強直腰脊反張時發時醒

方見

風科通治類

蛇頭圓治陰證風癰面色黯晦瞪眼直視四肢軟緩身體無熱手足清冷不甚抽掣不啼哭兼治諸癰陰證則除片腦子加綿附子炮切片為末入同圓

方見前

小驚圓治陽證驚癰心熱恍惚驚悸四體抽掣潮熱昏迷乍熱乍醒或為驚怪所觸而致

方見前

南附湯治陰證驚癰體冷強直手足微動昏睡不醒口

欽定四庫全書

世醫得效方卷十一

噤涎流或聲或默

方見前

紫霜圓治食癰肚脹身軟腰脊強直目睛轉緩皆由乳哺失節結癖所致

方見前

得效方治小兒顛癰及婦人心風諸疾

右用甘遂末一錢猪心一箇取三管頭血三條和汁遂末將猪心批作兩片以藥入在內用線縛定外以皮紙包裹水濕入文武火內煨熟不可過度除紙以藥細研辰砂末一錢和勻分作四圓每服一圓猪心

煎湯化下再服別取猪心煎湯神效

養正丹治顛癰連年不瘥濃煎人參湯下

方見大方科癰冷類

猪膽南星散治癰後瘡不能言

右以大天南星濕紙裹煨為末每服一字猪膽汁調下

肥兒圓治小兒心竅有血瘡不能言每服五圓木香陳皮甘草煎湯吞下蓋方內有黃連能去心中惡血

方見後

灸法見慢驚類

欽定四庫全書

世醫得效方卷十一

外感

傷寒傷風鼻塞頭痛或鼻流清涕唇紅面赤焦啼凡傷寒宜解表幼者麥湯散一服發額上有粘汗妙滿口生瘡頻出汗祇在頭上光如油難治

麥湯散治夾驚夾食傷寒氣急嗽聲

滑石 石膏 知母 貝母

麻黃 杏仁 甘草 甜葶藶

炒研

薄機

炒盛 人參 北地骨皮

去骨各等分



右為末每服一錢小麥二十粒煎湯下涎盛氣促桑白皮湯下

惺惺散治風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澁多睡咳嗽氣粗鼻塞清涕兼治變蒸

白朮 桔梗 細辛 人參

甘草 茯苓 瓜蒌根 各等分

右剉散每服二錢水一盞薄荷三葉煎至半盞時時與服古方謂小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷食皆

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

相似未能辨認間但服

香葛湯參蘇飲治同上 方並見大方傷寒類

柴胡散治傷風傷寒熱氣壅涎盛胸膈不利或時行疹痘未分或痢疾潮熱但是一切積熱溫壯皆宜

柴胡 二兩 人參 甘草 黃芩 各一兩

半夏 炮七次 麻黃 去節 各五錢

右剉散每服二錢生薑三片薄荷三皮白竹青少許煎溫服 鼻衄加生地黃 瘧疾薑錢桃柳枝地骨

皮痢疾作熱用 涎盛桑白皮

人參羌活散治傷風傷寒發熱頭痛 方見前

傷暑香需散治身熱惡寒頭痛或往來寒熱如瘧煩燥渴甚嘔吐背寒面垢洩瀉昏悶脉伏每服二錢水一盞

茵陳車前草各二莖煎熱服嘔吐加藿香木瓜洩瀉烏

梅陳米熱瀉黃連每服並各加少許 方見大方傷暑類

五苓散治法湯引同前泄洩不止平胃散合和紫蘇葉烏

梅煎湯下 方並見大方傷暑及脾胃類

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

傷濕香蘇散治身重脚弱關節疼發熱惡寒小便澀大

便泄自汗或浮滿因久在卑濕或為雨露所襲每服二

錢水一盞加炒蒼朮車前子木瓜少許生薑二片煎熱

服小便多是效 方見大方傷寒類

不換金正氣散 治同上

蒼朮 一兩 米泔浸 炒黃色 藿香葉 陳皮 各五錢

半夏 三錢 白茯苓 粉草 各五錢

右剉散每服一錢生薑二片紅棗一枚煎食前溫服



却服

生地黃湯治生下偏體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之疾皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服并略與兒服之

生乾地黃

赤芍藥

川芎

當歸

天花粉

各等分

右剉散每服二錢水一盞煎食後服

骨蒸熱生犀散治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晚潮熱夜有

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

盜汗五心煩燥大病瘥後餘毒不解

犀角

地骨皮

秦朮

麥門冬

去心

枳殼

煨

大黃

煨

柴胡

茯苓

赤芍藥

桑白皮

黃耆

人參

鼈甲

醋炙

知母

各等分

有痰加半夏

右剉散每服二錢水一盞陳青蒿少許煎溫服加桃

枝三寸亦可瘡病熱似骨蒸者及久病後或虛熱時

復來作者用瘡疾亦用

又方

犀角

地骨皮

芍藥

柴胡

乾葛

甘草

各等分

右剉散每服二錢水一盞薄荷五葉煎服瘡疾生薑

一片薄荷五葉煎

實熱導赤飲赤者心也心氣熱以此宣導如熱甚但用

通心飲此藥但可治心熱或虛熱或人怯不宜服熱盛

者用

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

生乾地黃

二兩

木通

四兩

黃芩

甘草

各一兩

右剉散每服二錢水一盞燈心十莖白茅根二莖青

竹葉五皮煎溫服不拘時候

瀉白散治肺氣盛致令鼻塞乳食不下或氣壅喘噎熱

嗽亦治

正地骨皮

桑白皮

甘草

各等分

右為末每服一錢粳米百餘粒煎湯下

瀉黃散治脾經有熱口唇生瘡偷鍼贅等疾



霍香葉	梔子仁	石膏	甘草
防風	各等分		
右用蜜酒微炒香為末每服一錢溫熱水調不拘時服			
涼肝圓解熱疏風	方見前		
寒水石散治凡病多因驚則心氣不行鬱而生涎遂成大疾宜常服利小腸去心熱自少驚涎亦不成疾			
寒水石	白滑石	各二兩	甘草 半兩
右為末量大小暑月冷水調寒月溫湯調被驚及心熱坐卧不安者服之即安			
豆卷散治慢驚後多服熱藥以致別生熱證唇裂口瘡咽乾煩躁以此解之兼治吐蟲			
大豆黃卷	水浸黑豆生芽取之日乾	貫衆	板藍根
甘草	各一兩		
右剉散每服一錢水一盞煎甚者三錢漿水一盞清油數點煎不拘時服			

八正散治蘊聚一切熱毒明心氣利二便			
洗心散治偏身壯熱頭目碎痛背膊拘急大熱衝上夜卧舌乾唇焦咽喉腫痛涕唾稠粘痰壅嚙食有阻心神煩燥眼澁睛疼挾熱傷寒鼻塞語音不出百節疼痛二便不利麩豆瘡時行瘟疫狂語多渴及天癰風夜驚並宜服之			
皂角膏瀉腎氣治腎經有熱陰囊赤腫癰痛大腑秘澀			
大黃	五錢	黑牽牛	半炒半生
猪牙皂角 各一兩			
右為末煉蜜圓綠豆大每服七粒溫水空心下			
葱涎膏治初生肺壅鼻塞乳食不下			
右用牙皂草烏取葱涎杵成膏貼顙上			
虛熱地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱			
知母	柴胡	甘草	人參
地骨皮	赤茯苓	半夏	湯泡各等分
右剉散每服二錢水一盞薑二片煎溫服			
甘露飲子治胃中客熱口臭不思飲食或饑煩不欲食			



齒齬腫疼膿血滿口咽中有瘡赤眼目瞼重不欲開瘡
疹已發未發並宜服之

天門冬去心 焙 麥門冬去心 焙 熟乾地黄 枇杷葉去毛

枳殼麸炒 去穰 生乾地黄 黃芩 石斛去苗

山茵陳 甘草炙 各等分

右剉散每服二錢水一盞煎食後臨卧溫服

人參黃耆散治發熱自汗虛煩

人參 黃耆 揚芍藥各五錢 粉草三錢

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

右剉散每服二錢水一盞生薑二片紅棗一枚麥子

三十粒空心溫服

痰嗽

半夏圓治風壅痰盛咽膈不利

半夏五兩 白礬枯過 一兩二錢半 人參一兩

右為末生薑自然汁糊為圓粟米大每服二十圓食

後臨卧生薑湯下

蕩皮圓治肺壅咳嗽痰多方見後 久嗽不宜卒止先須調

氣用參蘇飲方見大方科 傷寒和解類 秘傳降氣湯蘇子降氣湯方並

諸氣類 並加人參五味子烏梅桑白皮紅棗斟酌用

金沸草散治熱嗽華蓋散治肺感寒邪咳嗽聲重

人參清肺湯治肺胃俱寒咳嗽喘息方見傷寒類

澄清飲治痰壅咳嗽不止

白礬二錢半 南星 半夏 蚌粉

知母 貝母 甘草各五錢 人參三錢

右剉散每服二錢生薑二片烏梅半箇煎澄清徐徐

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

吸服效亦治因飲乳逆氣觸於肺經作嗽久不止壽

星圓兼服方見風科 通治類

靈白圓治風痰上壅

右以靈砂青州白圓子各一十粒薑蘇湯化開服效

紫蘇飲治咳逆上氣因乳哺無度內挾風冷傷於肺氣

或啼叫未定與乳飲之乳與氣相逆氣不得下

真蘇子 訶子去核 蘿蔔子 杏仁去皮 尖

炒 木香 人參去蘆 各一兩 青皮



甘草 各七錢半重	右剉散每服一錢水一盞薑二片煎量大小減益溫服	疹瘡	表解虛證參蘇飲治瘡疹已發未發潮熱痰嗽臉赤手足微冷每服二錢生薑二片葱白一根山楂子根三寸同煎熱服合滓乳母服 方見大方科傷寒類	惺惺散治發熱頭痛欲作疹瘡每服一錢乾桑白皮三寸去赤煎湯調不拘時服 方見前	熱證如聖湯治身熱如火頭痛頰赤面紅呵欠鼻瘡瘡疹已未出時宜服	白芍藥 川升麻 各一兩 甘草 紫草 各五錢	乾葛 一兩 木通 五錢 去皮節	右剉散每服二錢水一中盞入生薑二片葱白二根山楂子根三寸同煎熱服壯熱心煩加人參赤茯苓石膏麥門冬去心	

人參羌活散治疹豆因多服熱藥發而不透身體頭面兩目皆腫連日風搐奮身硬直 方見前	香葛湯治時令不正發為疹瘡解腸胃中一切熱毒皆可服之 方見大方科傷寒類	三豆飲治天行疹豆活血解毒或覺鄉中有此證預防之則不染	赤小豆 黑豆 綠豆 各一升 甘草 半兩	右淘淨水煮熟逐日空心任意服已染則輕解未染服之七日不發	發出紫草飲治豆瘡欲發未發或未透者	紫草 北芍藥 去蘆 麻黃 去節 當歸	甘草 各等分	右剉散每服二錢水一盞煎不拘時服加味四聖散治瘡豆出不快及變陷倒靨小便赤澀餘熱不除一切惡候或被風吹復不見入皮膚內者	紫草茸 木通 去皮節 南木香 黃耆 炒



川芎	甘草	人參	各等分	蟬退	去足翼十
右剉散每服二錢水一盞煎不拘時候溫服大便秘	加枳殼少許大便如常加糯米百粒性解毒能釀而	發之	紫草木香湯治瘡出不快大便泄利	紫草	木香
茯苓	白朮	甘草	炒	各等分	世醫得效方
右剉散每服二錢水一盞糯米三十粒煎溫服蓋紫	草能利大便木香白朮所以佐之也	紫草木通湯治瘡疹出不快	紫草	人參	去蘆
木通	去皮節	茯苓	糯米	各等分	甘草
減半	右剉散每服二錢水一盞煎溫服大便利者可入南	木香去紫草	快斑散治豆瘡出不快		

紫草	蟬退	去足翼	人參	白芍藥	各一
分	木通	一錢	甘草	炙	半錢
右剉散每服二錢水一盞煎溫服	人參羌活散治同上	方見前	活血散治豆瘡已出未出煩燥大人同	北白芍藥	不以多少
右為末白湯調下大能活血止豆瘡脹痛屢用屢效	薑附湯治四肢冷極疹瘡黯色不發或泄瀉不止身熱	重者不宜服	方見大方	科中寒類	世醫得效方
黃芩甘草湯治挾熱作疹瘡不出煩燥不得服	黃芩	七錢半	赤芍藥	甘草	各五錢
右剉散每服三錢水一盞煎溫服若胃中虛冷其人	能食飲水即噦脉浮發熱口鼻中燥或衄加大棗一	枚嘔者加半夏少許生薑三片煎食少者加人參紅	棗煎量大小加減服	萬金散治瘡疹已出未能勻徧色不紅潤	



防風 三錢

人參

蟬退 各二錢

右為末蘿蔔煎湯調下服了急用芥子末白湯調如膏塗兒脚心乾即再傳其毒漸漸復出瘡疹依前紅活

又方治瘡疹出不透腹痛甚或黑靨者

右以蟬退二十五箇去足翼洗淨為末每服一錢熟水調下腹痛立止而出透神效乳母亦可服一錢

又方用乾山楂子為細末湯點服立見出透紅活荔枝

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

殼煎湯溫服亦效

發脹調解散治瘡豆已發或為風冷所折榮衛不和或為宿食所傷內氣壅遏以致冰硬並主之

青皮 去白

陳皮 去白

桔梗 去蘆

枳殼 去穰

當歸 去尾

半夏 湯洗

川芎

木通 去節

乾葛

甘草

紫蘇

紫草 各等分

人參 減半

右剉散每服二錢薑二片棗一枝煎服未效加楂根

三寸

藿香正氣散治疹瘡根脚白色冰粗頂淡紅色而不發加川芎若惡寒加官桂 方見大方傷寒類

龍腦膏子治時疾豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂燥氣

喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不爾毒入

臟必死

生龍腦 一錢

右研細旋滴猪心血和圓如小指頭大每服一圓心

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

順狂燥者用紫草湯化下若瘡子陷伏者溫酒化下

少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息取安或祇

用猪尾血亦可

救陷加味宜風散治腎虛證疹瘡變黑

雞心檳榔 一箇

陳皮 去白

青皮 去穰

甘草 炙各錢半

黑牽牛 二兩半生半炒熟

右為末蜜湯調下氣怯者加南木香一錢先下黑糞

次下楮糞後以四君子湯加厚朴木香陳米湯服和



胃良冬糞黃瘡自微出又以葫荑煎酒傳其身即發起

獨聖散治疹瘡陷入不發黑色而氣欲絕服此漸蘇紅

潤

穿山甲
湯洗淨炒
令焦黃

右為末每服半錢入麝香少許南木香煎湯調下或

紫草煎湯入紅酒少許服

五福化毒丹減毒
方見後

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十一

人齒散治瘡豆初出光壯忽然黑陷心煩性躁氣喘妄

語或見鬼神並宜速治不然毒氣入臟必死

人齒
燒存性

右為末每箇作一服酒調下

靈破酒治疹瘡黑陷不起以好酒磨化三五粒服效

民望方治瘡疹漸黑面陷大便不固乳母同服亦可

人參
白朮
肉豆蔻
麵裹
白茯苓

黃耆
各半
兩
甘草
二錢半

右剉散每服一錢水一盞薑二片棗一枚煎五分乳母倍之若大瀉手足厥冷詳病加炮附子入

催乾犀角地黃湯瘡疹出大盛者以此解之

芍藥
升麻
代之
生地黃
牡丹
犀角屑
無以

右剉散每服二錢水一盞煎溫服欲乾犀角飲
方見後

小驚圓
方見前

如聖湯治疹瘡毒攻咽喉腫痛

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十一

桔梗
甘草
牛蒡子
炒各
一分
麥門冬
去心

一錢半

右為末每服一錢沸湯點服入竹葉煎尤妙

護眼神應膏治疹瘡正發時可用以防豆花入眼生翳

黃蘗
一兩
真綠豆粉
兩半
甘草
四兩
紅花
二兩

右為末生清油調塗兩眼四畔用之瘡豆面上亦少

或但用乾胭脂塗抹亦可

加減四物湯治斑瘡入目或瘡豆收後



當歸尾	芍藥	川芎	蒼朮
白菊花	乾葛	羌活	各等分
右剉散每服二錢水一盞入生地黃少許槌碎同煎半盞量兒大小服之乳食後服忌一切動風毒物雖愈後忌三二月日方可			
蟬菊散治斑瘡入目或病後生翳障			
蟬退	淨洗去塵土	白菊花	各等分
右剉散每服二錢水一盞入蜜少許煎乳食後量兒			
大小與之屢驗			
決明散治疹豆入眼			
決明子	赤芍藥	瓜根	甘草
	錢各半		錢各一
右為末每服一錢蜜水調下			
羌菊散治疹瘡後毒氣不散生翳障并治暴赤眼疼翳障著明			
羌活	蟬退	防風	蛇退
	去足翼土		
菊花	穀精草	木賊	甘草

欽定四庫全書

世醫得效方卷十一



迪志文化出版有限公司出版

梔子	白蒺藜	大黃	黃連
沙苑蒺藜	各半兩		
右為末每服一錢清米泔溫煖調下			
奇方治瘡疹入眼用兔屎焙乾為末茶清調下瘡疹安後方可服多服即愈仍治昏翳			
又治豌豆瘡入目痛楚恐傷眼睛浮萍陰乾為末每服三錢隨記大小以羊子肝半箇入盞內以杖刺碎爛投水半合攪取汁調下食後服不甚者一錢差已傷目者十服差			
蜜蒙花散治疹豆瘡并諸毒氣入眼昏暗生翳膜			
蜜蒙花	青箱子	決明子	車前子
錢半	錢一		各半
右為末白羊肝一片破開作三片摻藥令勻却合作一片以濕紙裹火煨於地上出火毒米泔嚼下空心服			
決明圓治豆瘡入眼雖赤白障翳膜遮漫黑睛但得瞳			

欽定四庫全書

世醫得效方卷十一



迪志文化出版有限公司出版

子不陷者可治之

石決明

煨

川芎

黃蘗

各一兩

蒼朮

半兩
米泔

浸

右為末用兔肝成無以白羯羊肝代之研爛搜和圓如綠豆大每服二三十圓食後臨卧米泔下

又方用穀精草煮白柿喫仍用綠豆根燒灰淋水以上面清者洗下面濃者服之

通聖散治豆瘡入眼生翳

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

綠豆皮

穀精草

去根

白菊花

各一兩

右剉散每服二大錢乾柿一枚生粟米泔一盞同煎候米泔盡祇將乾柿去核食之不指時候日三枚淺者五七日可效遠者半月

決明散浮萍散治斑瘡入眼

方見眼科
通治類

熏藥真穀精草蛤粉各等分每服二錢水一盞入猪肝

二片青竹葉十皮煎熟先熏後服

洗方右以黃連去鬚白滑石銅青用絹帛包泡湯候溫

洗

塞耳丹治疹瘡入眼

右以水銀一錢國丹五錢同圓作六圓入鎔銀窩中圓瓦上蓋濕紙糊護定用香爐盛炭火燒一日後取出以薄綿裹之疹瘡在右則塞右耳在左塞左耳立見墜下

消毒加味犀角飲治毒氣壅遏壯熱心煩瘡疹雖出未能勻透口舌生瘡不能吮乳

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

牛蒡子

三兩

荊芥穗

五錢

甘草

炙一兩

防風

川升麻

各七錢半

犀角

三錢

麥門冬

去心

桔梗

去蘆各五錢

錢

右剉散每服二錢水一盞煎去滓令溫時時令呷或頻灌之大利利不宜服

射干湯治瘡疹後身壯熱大便堅口舌生瘡咽喉腫痛餘毒未盡

鼠粘子

一兩

升麻

甘草

射干

各三錢半



右剉散每服三錢水一盞煎溫服不以時候

連翹飲治瘡疹壯熱小便不通餘毒未解

連翹 瞿麥 荊芥 木通

車前子 赤芍藥 當歸 防風

柴胡 滑石 蟬退 甘草

錢 山梔仁 黃芩 各一錢

右剉散每服二錢加紫草煎溫服

五福化毒丹治瘡疹餘毒上攻口齒及治蘊積毒熱驚

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

惕狂燥頰赤咽乾口舌生瘡夜卧不寧譫語煩渴頭面

身體多生瘡癰朱眼等疾亦名青黛圓

人參 玄參 茯苓 青黛

甘草 桔梗 牙硝 麝香

腦子 各半錢 一方無腦子有金銀箔

右為末蜜圓每兩作十二圓一歲兒一圓分四服用

薄荷湯下瘡疹上攻口齒涎血臭氣生地黃自然汁

化一圓用雞翎刷在口內熱疳肌肉黃瘦瘡自夜不

見物陳粟米泔水化下食後臨睡服

甘露飲解毒殊效 方見前

瘡疹成片方

右用黃牛糞乾傳膿多痛甚者乾淨黃土為末傳之

瘡偏口中痛不能食者五福化毒丹或生蜜浸清黃

柏取汁啖之為愈凡瘡欲成痂頻以面油乳酥清蜜

潤之可揭即揭血出無害若乾硬已久必成癰痕如

茶醋如猪肝猪血之屬妄與食之則已脫之迹必為

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

之黯慘然而瘡痂已脫肌肉成靨外不可盥洗太早亦

不可以手加之葫荑酒能辟惡氣左右所不可無或

蒼朮降真用之亦可曰聖瘡七日熱而發七日泡而

乾又七日則平復如瘡舊矣大抵調順血氣溫和平

胃均平冷熱則瘡出為甚易若實實虛虛損不足而

益有餘則瘡出為甚難調解之法無以逾此

活血散治疹子出多疼痛及體痛時時叫喚 方見前

敗草散治瘡疹抓搔成瘡膿血淋漓



欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一		右用多年蓋屋爛草或蓋牆草不以多少曬乾為末 乾貼無毒若渾身瘡破膿水不絕粘沾衣服難以坐 卧可用三二升攤於席上令兒坐卧少即乾貼以其 草經霜雪雨露感天地陰陽之氣多善解瘡毒或用 蕎麥粉荔枝核燒灰糝瘡上亦好	糝方治水泡豆瘡	苦參 滑石 蚌粉 輕粉	川白芷 各等分	右為末乾糝之立效	通治木香散治發瘡疹身熱作渴	木香 大腹皮 人參 桂心	赤茯苓 去皮 青皮 去穰 前胡 去蘆 阿黎勒 去蘆	半夏 薑製 丁香 甘草 炙 各三錢	右剉散每服二錢水一盞薑二片煎空心溫服	異功散治豆出欲靨未靨之間頭溫手冷腹脹渴瀉急 服此切不可與蜜水

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一		木香 當歸 官桂 白朮	茯苓 各三錢 陳皮 厚朴 去粗皮 薑汁炒 人參 去蘆	肉豆蔻 丁香 各二錢 附子 炮去皮 半夏 薑製 各一錢半	右剉散每服二錢水一盞薑二片棗二枚煎服	白朮散治豆已靨身熱不退清神生津除煩止渴	人參 白朮 藿香葉 木香	甘草 白茯苓 各一兩 乾葛 二兩	右剉散每服二錢水一盞煎不以時溫服	人參麥門冬散治發熱煩渴	麥門冬 一兩 去心 人參 去蘆 甘草 炙 陳皮	白朮 厚朴 薑汁炒 各半兩	右剉散每服二錢水一盞煎不拘時微溫服	消風散治疹豆或發透或未透忽面青暴吼是為風邪 所傷此藥主之疹豆證以耳冷尻冷足下冷及耳後有 紅縷驗之然須見心胸間細點如粟起則為真是加蟬



退末 方見同科熱證類	五苓散治小便赤澀加燈心十莖麥門冬去心車前子	各半錢煎湯調人參湯加枳殼去穰切少許治大便秘	結內煩外熱未效更加四順清涼飲少許 方見大方科傷暑及傷寒	陽證類人參湯即小柴胡湯	四順清涼飲治同下熱實者用 方見大方科積熱類	大如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛	桔梗 生 甘草 生 牛蒡子 炒各一兩 麥門冬 去心	欽定四庫全書世醫得效方卷十一	兩半	右為末每服二錢沸湯點細細呷服入竹葉五皮煎	湯尤妙	枳殼桔梗湯治胸腹脹滿	桔梗 各一兩 枳殼 麸炒去穰	右剉散每服二錢水二盞煎至一盞分二服	二陳湯治痰壅吐食每服二錢生薑二片烏梅半箇煎	服 方見大方科嘔吐類

大方科泄瀉類	理中湯治下利嘔逆加木香熟附子每服各一錢半 方見	豆蔻圓治疹豆滑泄不止水穀不化	木香 兩 縮砂仁 各三錢 白龍骨 各 訶子肉 各半	兩 赤石脂 兩 枯白礬 各七錢半 肉豆蔻 各半	右為末麵糊圓如黍米大每服三十圓至五十圓煎	異功散下或瀉水穀白色淡黃色木香散下 方見前	欽定四庫全書世醫得效方卷十一	蘇合香圓治疹瘡為陰邪穢氣所傷亦令變壞可用醋	炭熏後以蘇湯化服解之 方見大方科中氣類	神妙化毒散治豆瘡欲發未發便服之此藥以毒攻毒	縱然瘡出亦少決無惡證	右於冬月先取人猫猪犬糞各等分於高處黃土窖	五日取出却用沙鍋盛蓋鹽泥固濟日乾於臘月八	日煨令通紅取出去火毒為末入麝香少許每用一	字蜜調勻溫湯化下或挑少許於舌上用乳汁嚥之



此方多秘不湏令病家知之

二參飲治豆瘡後餘熱不退

柴胡

甘草炙

黑參

人參

龍膽草

各二錢半 麥門冬 去心 三錢半

右剉散每服三錢水一盞煎稍熱服不拘時量大小

加減

木筆花散治豆瘡出後有餘瘡生塞鼻中不能睡卧

右用木筆花研為細末加生麝香少許葱白蘸藥入

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

鼻中數次即通

減癰散治豆瘡愈後瘡痂雖落其癰尤黯或凹或凸用

此

韶粉

即水粉 一兩 輕粉 一兩

右同研勻猪脂油調塗

又方

白蜜不以多少塗於瘡上其痂易落且無疤痕亦不

臭穢或用升麻同蜜煎摩痕上并數食之

綿繭散治豆瘡後身體及肢節上生疳蝕瘡濃水不絕

右以出蛾綿繭不拘多少用白礬槌碎塞入繭內令

滿上以炭火燒候白礬汁鹽取出研細每用乾貼豆

瘡內若不早治則潰筋骨以致難治

瘡疾

表解香蘇香薷散治春傷風夏伏暑作瘡其證自汗惡

風先熱後寒或但熱不寒每服三錢生薑三片葱白二

根水一大盞煎服

方並見大方科 傷寒傷暑類

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十一

十神湯治夏傷濕秋傷風作瘡其證寒熱自汗嘔吐身

疼每服三錢水一大盞生薑三片木瓜二片煎秋末感

風冷冬又傷寒或感溫暖之氣先寒後熱亦服

方見大方科時

瘡類

五苓散分陰陽和榮衛用人參少許茵陳車前草各一

根煎湯服弱者木瓜紫蘇湯或服通靈散亦可

方並見大方科

傷暑類

人參湯治熱多寒少每服二錢生薑二片麥門冬十粒



去心淨地骨皮少許煎多服取效 即小柴胡湯方見大方科傷寒陽證類	草果平胃散治寒多熱少 方見大方科痰癰類	爭功散治熱癰多效	知母 貝母 柴胡 常山 去蘆 錢各五	甘草 山梔子 檳榔 蟬退 錢各五 十箇	地骨皮 去骨 五錢	右剉散每服三錢用桃柳枝各五寸煎未效用過路	蒙藤五寸煎服	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一	截癰勝金圓 方見大方科痰癰類	蕩脾圓化痰消積進食駐顏及治氣喘府積	杏仁 一兩去皮尖用 蚌粉炒令黃色	半夏 一兩生薑自然汁 浸一宿次日焙	巴豆 五粒去皮紙出油 膜以皮紙出油	右為末用大好北棗七枚入燈心水蒸去皮核取肉	為圓每服五圓常服燈心棗子煎湯下駐顏檳榔煎	湯消宿食陳米湯空心臨睡服化痰烏梅湯治癰蒜	湯或薤水下消痞癖此方大效

通神餅截癰有功	甘草末 綠豆末 敗荷葉 砒霜 三錢 半錢 各三 生半錢	朱砂 定粉 腦子 麝香 一錢半 半錢 各少 許	金銀箔 十片	右煉蜜圓梧桐子大作餅子用歲半圓或一圓大者	二圓而止一日止一服不可過多服時用井花水或	桃柳枝煎水磨化向北服了忌燒熱飲食亦可繫於	候脉處	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一	參苓白朮散愈後調理脾胃 方見大方科脾胃類	癖氣	紅圓子治血膜包水僻側於脇旁時時作痛發寒熱癰	家中脘多蓄黃水日久結癖亦效	三稜 莪朮 芫花 桃仁 煨 煨 炒 去皮 別研	杏仁 朱砂 烏梅 巴豆 去皮 別研 炒	右為末醋糊圓小綠豆大朱砂為衣米湯空腹下	又方



三稜

莪朮

川練

去核

陳皮

去白

青皮

去白

芫花

右以芫花醋浸一夕炒漸乾入三稜莪朮同炒又入川棟陳皮青皮同炒焦取為末等分如各半兩杏仁亦用半兩去皮尖別研巴豆二十粒去油膜和勻醋糊圓黍米大一歲二圓臨睡米飲下此二方稍相似不若於方中和桃仁與烏梅則尤妙又用蒜湯下蕩脾圓化痰涎一日一服或兩服日用如此服蠲水亦可

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一

木鼈膏貼痞癖

木鼈

多用去殼

獨蒜

半錢

雄黃

半錢

右杵為膏入醋少許蠟紙貼患處

灸法兩乳下一寸各二壯

痞結

枳實理中圓治虛氣痞塞胸膈留飲聚水腹脇或加脹滿手不可近四君子湯加枳實去穰麵炒乾薑泡為末

煉蜜圓綠豆大熱湯化下渴加瓜蒌根下利加牡蠣粉各等分已用經驗

桔梗枳殼湯治熱氣痞滿胸膈兩脇按之則痛

枳殼

去穰

桔梗

去蘆各五錢

半夏

湯洗

黃芩

瓜蒌仁

黃連

去鬚各三錢

右剉散生薑麥門冬去心煎利黃涎沫即安

客忤

蘇合香圓治神氣嫩弱外邪客氣獸畜異物暴觸忤口

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十一

吐青黃白沫水穀鮮雜面色變易喘息腹痛反側痙瘓狀似驚癇但眼不上竄視其口中懸癰左右若有小小腫核即以竹鍼刺潰之或以指爪摘破急作醋炭降真香皂角燻之却服此

方見大方科中氣類

右每服一圓薑湯調開頻頻與服次用豉三合水濕搗為圓如雞子大摩兒顙上及足心各五六徧次摩臍心及頭上良久擘開自有毛即擲之大法宜辟邪正氣散驚定心延久難為力也



雄麝散治客忤腹痛危急

雄黃 一錢 明乳香 半錢 生麝香 一字

右為末每一字刺雞冠血調灌之

犀角散治客忤驚啼壯熱

天麻 犀角 麥門冬 去心 鉤藤

朱砂 各一錢 鐵粉 雄黃 半錢 生麝 少許

右為末每服半錢金銀煎湯調但服安神圓亦可

前

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十一

黃土散治小兒卒客忤

竈中黃土 蚯蚓糞 各等分

右研細水調塗兒頭上及五心良

世醫得效方卷十一

欽定四庫全書

子部 世醫得效方卷十二

詳校官太醫院醫士 程恭

編修 臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修 臣倉聖脈

校對官待詔 臣胡士震

謄錄監生 臣何照隣



欽定四庫全書

世醫得效方卷十二

元 危亦林 撰

小方科

瘡毒

平血飲治風熱積毒聚成發於頭面手足熱者如胭脂色其熱如火輕輕著手痛不可忍加紫草煎與犀角消毒飲相間服赤瘡火瘡紫萍瘡並治壯熱煩渴甚加黃

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

芩麥門冬去心朴硝各半錢

方見後瘡腫
科諸瘡類

內托散

紅內消

當歸

茄片

甘草節

羌活

黃芩

各半兩
麝香半錢

右為末每服一錢茄蒂煎湯調成或生地黄亦可

敗毒散治瘡毒初發如白梅樣遊走遍體燥悶腹脹焦

啼每服二錢水一盞生薑二片紫草少許煎溫服

方見大方

科傷
寒類



迪志文化出版有限公司出版

通治平血飲與敗毒散合和生薑薄荷蟬退

去足翼防

風去蘆細切煎湯加天花粉少許

又方角瘡遊走不定掀然赤腫疼痛用藥角歸手足上為妙後取碎蟬針之

寒水石

石膏

黃連

黃柏
各一兩

右為末水調刷

又方青黛土朱為末井水調入蜜敷角亦可

又方黃丹不拘多少磨刀水調刷

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

又方瘡毒腫痛如火用大黃朴硝為末調塗腫處立效

水苔生地黄菰菜浮萍梔子皆可研爛水調傳

洗方用防風酸車草赤豆竈心土煎水洗

又方洗角後用小驚圓壓邪大驚圓鎮驚

方見前

蟬針法取碎用水蟬數條以青苔蓋覆或濕紙亦可去

血即消未消再用瘡毒滿身徧黑入腹入陰難治

諸瘡

大安神圓治心瘡面黃臉赤煩滿壯熱心燥口瘡虛驚



迪志文化出版有限公司出版

見前

益黃散治脾疳體黃肚大愛喫泥土脹滿氣竈痢下酸

臭方見後

生熟地黃湯治肝疳搖頭揉目白膜遮睛流汗合面而

卧肉色青黃髮立筋青腦熱羸瘦

生乾地黃洗淨蒸各半兩

川芎

半赤茯苓枳殼去穰

杏仁去皮尖川黃連去鬚

半夏麴

天麻

地骨皮

甘草炙

欽定四庫全書世醫得效方卷十二

當歸各二錢半

右剉散每服二錢生薑二片黑豆十五粒水煎臨卧

溫服

清肺湯治肺疳咳嗽氣逆多啼揉鼻咬甲寒熱

桑白皮炒兩半

紫蘇

北前胡

黃芩

當歸去尾

天門冬去心

連翹

防風

赤茯苓

北梗

生乾地黃

甘草炙各一分

右剉散每服二錢水一盞煎溫服不拘候

地黃圓治腎疳極瘦身有瘡疥寒熱作時頭極熱脚冷如水

生乾地黃八錢

錢

澤瀉

乾山藥

山茱萸各四

錢各三

右為末煉蜜圓梧桐子大每用一二圓化開服

胡黃連圓治熱疳潮熱如火大便澀

胡黃連

川黃連各半兩

朱砂一錢半別研

欽定四庫全書世醫得效方卷十二

右黃連為末和朱砂入猪膽內繫定虛懸於釜中煮

一炊時取出研蘆薈青黛乾各二錢半去足蝦蟇灰

二錢麝少許粳米飯圓麻子大每服十圓食後米飲

下

五福化毒丹治熱疳肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米

飲化下方見前

至聖圓治冷疳時時泄瀉虛汗不止

丁香

丁皮各一錢

木香

紫厚朴製見



前	史君子肉 焙 橘紅	肉豆蔻 紙濕
畧煨各二錢		
右為末神麴糊圓麻子大每七圓食前米飲下		
銅青散圓走馬疳口内生瘡牙齦潰爛齒黑欲脫或出血臭氣丈夫婦人同		
川白芷 半兩生 馬牙硝 一錢 銅青 一分 麝香 一字		
右為末乾傳口角及擦齒上妙仍服蟾酥圓效 方見後		
下蟲圓治蛔疳圓食肉太早或腸胃停蓄肥膩為蛔其證多啼嘔吐清沫腹痛脹滿唇口紫黑腸頭及齒痒		
新白苦楝根皮 酒浸焙 綠色貫衆木香		
桃仁 浸去皮焙 蕪荑 各二錢 雞心檳榔 二錢 鶴虱 炒一錢		
輕粉 半錢 乾蝦蟇 炙焦三錢 史君子 畧煨取肉五十箇		
右為末飛羅麵糊圓麻子大每二十圓天明清肉汁下內加當歸川黃連各二錢半治脊疳兼疳勞可擇用		
大蘆薈圓治脊疳蟲蝕脊膂身熱羸黃煩熱下痢脊骨		

如鋸齒十指背瘡頻嚙指甲		
蘆薈蕪荑木香青黛 乾		
檳榔川黃連 淨各一分 蟬退 二十枚 麝 少許		
胡黃連 半兩		
右為末猪膽二箇取汁浸糕圓麻子大每服二十圓米飲下		
龍腦圓治腦疳頭皮光急滿頭餅瘡腦熱髮結身汗顯腫顯高		
龍膽草川升麻苦楝根皮 焙 防風		
赤茯苓蘆薈油髮灰青黛 乾		
黃連 淨各三錢		
右為末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每二十圓薄荷紫蘇泡過下食後仍以蘆薈末入鼻		
保童圓治乾疳瘦悴少血舌乾目睛不轉乾啼身熱手足清冷皮燥大便乾結搭口癡眼乾渴		
黃連 去鬚 白鱧頭草龍膽 去蘆 青橘皮 去穢		



五倍子	蟾頭	夜明砂	苦楝根
雄黃	麝香	青黛	天漿子
熊膽	蘆薈	胡黃連	
		已上各一分	
右為末研令勻糯米糊和圓麻子大一歲兒每服一圓不計時候米飲下日進三服尤佳一方有乾蝸牛			
白朮散又名清寧散治疳渴煩燥引水乳食不進夜則渴甚加烏梅陳米疳瀉停積宿滯水穀不聚頻泄不效			
欽定四庫全書			
世醫得效方			
卷十二			
加肉豆蔻訶子	方見前		
木香圓治疳痢冷熱不調五色雜下裏急外重			
黃連	淨三錢	木香	紫厚朴
	錢		去麤皮薑汁炒
縮砂仁	夜明砂	隔紙炒	訶子肉
	各二錢	錢	炒
錢			
右為末粳米飯圓麻子大每服十五圓乾艾葉生薑煎湯食前溫下			
褐圓子治疳腫脹因虛中有積腹肚緊脹頭面虛浮			

蘿蔔子 一兩炒	陳皮	青皮	好檳榔
黑牽牛 生取仁半炒	北五靈脂	赤茯苓	
蓬莪朮 煨各半兩	木香 二錢半		
右為末飛羅麪糊圓菴豆大每服十五圓紫蘇桑白皮煎湯下			
黃耆湯治疳癆嗽喘不定虛汗骨蒸渴而復瀉乳食遲進			
黃耆 蜜炙	當歸	川芎	白芍藥
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二			
生乾地黄	蝦蟇 去足炙	鱉甲 醋炙焦	人參
白茯苓	橘皮	半夏麴	北柴胡
史君子 畧煨	甘草 各二錢炙		
右剉散每服貳錢水一盞薑二片棗一枚煎食前服			
鱉血圓治疳癆			
人參 半兩	川芎	蕪荑	北柴胡 各一
史君子 二十箇	胡黃連	川黃連 各二	



右用鱉血一盞吳茱萸一兩拌和二連淹一宿次早炒乾透出茱萸鱉血只用二連夾餘藥杵末粟米粉糊圓麻子大每服二十圓食前熟水下

蚶蜋圓治腦後項邊有核如瘰癧狀按之轉動軟而不疼名無辜疔毒兼治諸疔一服虛熱退二服渴止三服瀉痢住

蟾蜍 一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴者其身癩磊者

右取糞蟲一杓置桶中以尿浸之桶上要乾不與蟲

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二

走却將蟾蜍殺之頓在蟲中任與蟲食一日夜次以新布袋盡包繫定置之急浸一宿取出瓦上焙為末入麝一字梗飯揉圓麻子大每服二三十圓米飲下一方白蕪荑黃連胡黃連青黛各半兩蚶蜋一箇只用酒浸炙去骨為末麝糊圓粟米大每服三十圓食後臨卧米飲下日三服立效

又方治無辜疔

右以夜明砂炒為末入諸飲食中與之

通治蟾酥圓治諸疔殺蟲止腹痛退虛熱大效或因病後通泄太過成疔

蟾酥 一箇酥油炙去骨 胡黃連 宣連 去鬚

龍膽草 陳皮 川楝子 去核 木香

史君子 去殼 蕪荑 各一兩 或半錢 不入 巴豆 二七粒去

油 茴香 一兩炒

右為末猪膽汁圓或糊圓青黛為衣常服紫蘇湯下

肥兒圓治諸疔多因闕乳喫食太早或因久患臟腑胃

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二

虛蟲動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神

黃連 神麴 各一兩 大麥蘖 半兩 木香 二錢

檳榔 二箇不見火 史君子肉 肉豆蔻 麝糞煨各半兩

右為末麝糊圓蘿蔔子大每服三四十圓量兒歲數

加減熟水吞下

六神圓捉疔止瀉

丁香 木香 肉豆蔻 去殼各半兩三味用麝糞同入

慢炭火煨令訶子 史君子 蘆薈 各一兩細



入研

右為末棗肉圓麻子大每服五圓至七圓溫米飲下

乳食前服

五疹圓治疳傷肚大

青皮

炒焦黃 乾薑 燒微存性

北五靈脂

蓬莪朮 各一

兩

右為末搜和粳米飯圓麻子大每三五圓米湯不饑飽
研細拌和粳米飯圓麻子大每三五圓米湯不饑飽

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

時下

小黃連阿膠圓治諸疳作熱頻瀉每服二十圓米飲下

方見大方科咳嗽類

疳啞不能發聲方

右以肥兒圓每服十五圓用蘇合香圓一粒入朱砂

五靈脂末各少許石菖蒲煎湯調開下

方見前蘇合香圓大方

科中
氣類

豬肚黃連圓治疳瘡自孩提至弱冠潮熱發瘡乃疳氣

使然疳蟲食其肌膚空虛疳熱流注遍身熱瘡發歇無已

蟾酥圓相間服尤妙

雄豬肚

一具 淨洗 鷹爪黃連 去鬚淨 七兩

右剉作小截少水和納豬肚中用線縫密頓在五升
粳米上蒸十分爛取放白中入些蒸飯搗千餘杵粘
實得所衆手捏圓如小菉豆大每服二十圓米飲下
童子倍之冠者又倍之仍以川芎生地黃茯苓神

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

與之調血清心熱多者間服生犀散

方見前

二十歲

以上潮熱發瘡是為虛勞皆一種病也用藥同前凡
兒童諸病不出於疳則出於熱熱則生痰常須識此
矣

洗方按證用大腹皮苦參川白芷為剉散煎湯淋洗妙
又方甘草黃柏馬鞭草帶鬚葱荊芥煎水洗後却用訶
子連肉核燒灰入麝香輕粉少許和勻傳瘡上效
傳藥治疳後虛熱小便腫



右以韭菜地龍糞煨為末出火毒清油調傳

針法治無辜疳腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有蟲如米粉不速破之則蟲隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體作癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高皆因氣血虛憊所致用針刺破以膏藥貼則愈或因澣濯兒衣露於簷下為飛鳥落羽所污兒著此衣蟲入皮毛亦致斯疾凡曬兒衣須微火烘之

丁奚哺露

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

十全丹治小兒手足極細項小骨高尻削體痿腹大臍突號哭胸陷或生穀癥是名丁奚虛熱往來頭骨分開翻食吐蟲煩渴嘔噦是為哺露二者皆因脾胃以虛不能消化水穀以榮血氣致肌肉銷鑠腎氣不足復為風冷所傷柴骨枯露亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種類之疾並難治宜服

青皮 去穰

陳皮 去白

蓬朮 煨

川芎

比五靈脂

白豆蔻仁

雞心檳榔

蘆薈

各半兩

木香

史君子肉

蝦蟇灰 焙

各三錢

右為末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服三十圓米飲下有熱薄荷湯下

魃病

龍膽湯治孕婦被惡祟導其腹中令兒病也其證下利寒熱去來毫毛鬢髮不悅澤及治婦人有兒未能行時復有孕使兒飲此乳亦作此病

龍膽草

北柴胡

去蘆及苗

黃芩

桔梗

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

鈎藤皮

芍藥

甘草

炙

茯苓

各二錢半

蛻蜋 二枚

大黃

一兩溫紙裏煨

右剉散以水一升煮取五合為一劑十歲已下小兒皆可服若兒生一日至七日分一合為三服八日至十五日分一合半為三服生十六日至二十日分二合為三服二十日至三十日四十日盡以五合為三服皆以得下即止此劑為出腹嬰兒所作若日月長大者以次依此為例必知客忤及有鬼氣可加人參



當歸各二錢半一百日兒加一錢一字二百日兒加二錢半一歲兒加半兩餘准此

積滯

葱湯圓治積神效

巴豆

三十五粒用水浸一宿五更初去水後去皮殼心膜不去油另研 輕粉 半錢

滑石

五錢 鷹糞 五錢

右為末研飯為圓如粟米大周歲以下每用三圓以上四圓未效再加圓數隔上有涎或吐亦無妨如有

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

蟲用苦楝皮少許甘草二寸煎湯五更初先將化蟲藥服了後用此取下春季燈心湯下夏季蘇鹽湯下秋季蘇湯冬季葱白湯下初生兒以一粒放口中乳汁下

消積圓治乳積吐乳瀉乳其氣酸臭此由啼哭未已以乳與兒停滯不化得之

丁香

烏梅 五錢

巴豆 十四箇 縮砂仁 各等

分

右為末麪糊圓每服七圓米飲下
消鐵丹治食積肚硬帶熱渴瀉或嘔皆因飲食無度多餐過飽飽後即睡得之

烏梅

八箇取肉 巴豆 十六粒去殼 青皮 五錢去穰 陳皮 五錢去白

右為末米糊圓粟米大每服七圓米飲下化鐵亦消
盧氏感應圓紅圓子治食積面目腫黃肚熱脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸乾澀小便如泔或便利無禁糞
白酸臭服之大效 方見大方科諸積及痰瘧類

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

蘇感圓治氣積腹痛啼利如蠅涎皆因觸忤其氣榮衛不和淹涎日久得之蘇合香圓感應圓各等分和圓如粟米大紫蘇湯下三十圓立效 方見大方科中氣瀝類
異香散取積後調理

石蓮肉 一兩 蓬莪朮

益智仁

京三稜

甘草 各六兩 青皮 去穰

陳皮 去白

厚朴 薑汁炒二兩

兩

右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗一枚鹽少許



煎通口服鹽湯點鹽酒調亦可不拘時服		史君餅治因喫食麤肥甘生熱肌瘦體虛口吐清涎唇間腫痛腹中絞痛口中出黑色蟲不治		史君子 四十箇 去殼		輕粉 半錢 去殼		右為末用雞鴨卵和蒸為餅先將此藥隔日夜五更時服將葱湯圓取下 方見前		見前		化蟲圓		苦楝根皮 各半兩		酸石榴皮 各一分	
長砂香附湯平胃散合和滋氣和胃消積每服一錢蘇鹽下多服尤妙 方見大方科		殺蟲		雷丸 半兩		青箱子		方見前		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二		鶴虱 一分		鶴虱 去土		胡粉	
史君餅治因喫食麤肥甘生熱肌瘦體虛口吐清涎唇間腫痛腹中絞痛口中出黑色蟲不治		定粉 二分		白礬 半生		方見前		方見前		世醫得效方 卷十二		黃連		檳榔		苦楝根皮 各半兩	
史君餅治因喫食麤肥甘生熱肌瘦體虛口吐清涎唇間腫痛腹中絞痛口中出黑色蟲不治		定粉 二分		白礬 半生		方見前		方見前		世醫得效方 卷十二		黃連		檳榔		苦楝根皮 各半兩	
史君餅治因喫食麤肥甘生熱肌瘦體虛口吐清涎唇間腫痛腹中絞痛口中出黑色蟲不治		定粉 二分		白礬 半生		方見前		方見前		世醫得效方 卷十二		黃連		檳榔		苦楝根皮 各半兩	

右為末以糊圓如麻子大三歲兒三圓漿水入香油三五滴下其蟲小者化為水大者自下加雷丸或用猪瘦肉湯下		碧金散治蛔蟲寸白蟲		苦楝根 一兩		猪牙皂角 三錢 燒灰		好青黛 半兩 麝香一分		右同研勻每服一字用淡猪肉湯食前調		安蟲散治因喫物麤肌膚消瘦蟲生腹中極痛不可忍		真胡粉 炒		白礬 二錢半生用	
右為末以糊圓如麻子大三歲兒三圓漿水入香油三五滴下其蟲小者化為水大者自下加雷丸或用猪瘦肉湯下		鶴虱		檳榔 各半兩		史君子仁 半兩各研 綿羅為末		麝香 一分		方見前		方見前		方見前		方見前	
右為末以糊圓如麻子大三歲兒三圓漿水入香油三五滴下其蟲小者化為水大者自下加雷丸或用猪瘦肉湯下		鶴虱		檳榔 各半兩		史君子仁 半兩各研 綿羅為末		麝香 一分		方見前		方見前		方見前		方見前	
右為末以糊圓如麻子大三歲兒三圓漿水入香油三五滴下其蟲小者化為水大者自下加雷丸或用猪瘦肉湯下		鶴虱		檳榔 各半兩		史君子仁 半兩各研 綿羅為末		麝香 一分		方見前		方見前		方見前		方見前	

尺則能害人一歲兒五圓溫漿水入清油一二點打
勻溫米飲下其蟲小者化為水大者自下

嘔吐

驚吐安神圓治因驚吐妳面色青藿香煎湯化開服

方見

前

硫黃散治吐并驚吐

硫黃 半兩 水銀 一分

右同研無星黑色量大小一字至一錢匕水小點以

欽定四庫全書 世醫得效方
卷十二

指緩緩磨濕添湯調方可服吐立止兼治大人反胃

妙

冷吐益黃散治脾胃傷冷作吐每服二錢水一盞生薑

紅棗煎溫服 方見后 白朮散亦效 方見前

熱吐通心飲治壅熱久傷臟腑作渴發吐每服二錢燈

心藿香葉煎溫服 方見前

涎吐半夏圓治胸膈停痰作吐

方見大方科
嘔吐類下

一方單用

半夏泡七次為末薑湯下效亦能止瀉有熱者人參湯

即小柴胡湯 方見大方
科傷寒類

積吐益黃散治脾胃停食不化所吐酸臭生薑烏梅煎

服 方見后 消積圓 方見前

風吐大青膏治胃脘生風頻吐用黃荊葉一皮煎湯化

開兼服白朮散 方見前 又方風熱吐朴硝白滑石為末

每服半錢漿水半盞清油半兩調勻服必定

吐乳

雪糕圓治吐乳兼下痢不止雪糕圓粟米大米飲下二

欽定四庫全書 世醫得效方
卷十二

十圓 方見大方
科嘔吐類

掌中圓治喫物喫乳便吐下水乳不得飲食不下者

白豆蔻 十四箇去殼
鹽水炒用 甘草 半兩半
生半炙 縮砂 十四箇

右為末逐旋安掌中與他乾噉牙兒乾糝口中

丁香散治吐乳傷食

丁香 石蓮肉 枇杷葉 生薑自然汁塗
炙熟各等分

右為末每服一錢米飲調下

藿香正氣散治外感風寒濕作嘔每服二錢水一盞生



薑二片木瓜一片煎服效

方見大方
科傷寒類

濕熱不時暴嘔香葛湯生薑二片藿香少許煎

方見大
方科傷

寒類

香蘇散治生時洗吐牽涎或嘔加半夏湯洗葱白生薑

各少許煎

方見大方
科傷寒類

交精吐妳四君子湯加藿香木瓜煎湯服又治經年吐

妳不停或成片段眼慢糞多穢氣有筋膜迺父母交感

時喫乳所致益黃散

方見后

保童圓

方見前

兼用

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

吐乳不止恐成脾風方

右以靈砂一粒青州白圓子三粒同研末米飲調下

量大小與之吐久虛甚者對用靈砂親試有效

靈砂
大方

科見冷類
子方見風科通治類

又方蓮心二十一箇香附子三箇吳茱萸七箇丁香七

箇一處新瓦上炒黃研為末以乳汁調付乳頭上令

兒吮食屢用有驗

霍亂

總說吐瀉起於脾胃不調陰陽不順清濁相干或感風

冷之氣傷於脾胃胃氣不調故嘔不食脾氣虛弱臟

腑不調故泄瀉有脾虛傷食外感風冷故先吐而後

瀉有胃熱嘔吐發瀉夏月嘔吐發瀉為霍亂因胃熱

引飲停留胃氣吐瀉發熱用香薷散大凡吐瀉不可

便下止吐瀉藥先調脾氣秋冬之間多是傷食生冷

過度外感風寒多瀉發熱當用醒脾散但吐不瀉因

傷粘物滯脾有胃熱嘔吐渴水不休有胃冷嘔吐面

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

青白四肢逆冷大凡吐瀉先調脾氣此大法也

白朮散治胃氣不和脾氣虛弱發為吐下每服二錢水

一盞生薑二片烏梅半箇紅棗一枚蘇梗三寸煎溫服

方見前

五苓散治陰陽不調或感風邪暑毒霍亂嘔瀉不止每

服二錢蘇葉木瓜食鹽湯調服未效加生薑自然汁少

許服

又方用生薑自然汁為圓麻子大量兒大小米飲下效



六和湯治夏秋冬暑冷相搏嘔泄不止每服二錢水一盞生薑二片木瓜一片煎溫服

以上方並見大方傷暑類

香薷圓治傷暑伏熱躁渴瞤悶頭目昏眩脅膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利

轉筋宜服

方見大方科傷暑類量大小與服

木復丹治陰陽不和脾胃虛損吐下不止凡吐瀉五月內九分下一分補八月內九分補而一分下有熱者先用補脾後退熱竹葉石膏湯主之次用水銀硫黃末主

欽定四庫全書

世醫得效方卷十二

之生薑水調下但霍亂一證吐利交作蓋由飲啖生冷或胃熱之氣中脘節閉揮霍變亂用此能通暢三焦分理陰陽兼治反胃嘔吐中暑昏亂最為切當

方見大方科痢冷類

竹葉石膏湯見大方科傷寒類

金液丹與青州白圓子等分為末理吐瀉之後已覺虛損若因虛發熱必作慢脾風用米飲調下特效須多服若胃氣已生則旋減金液却以四君子湯加陳皮名異功散徐徐調理

方見大方科痢冷及風科通治類異功散方見前

單方治霍亂

右以牛涎一合灌下立效陳大蓼濃煎湯洗手足上

并服濃汁一二合自愈

灸法男左女右第二脚指上如菉豆大艾炷灸三壯即愈

泄瀉

驚瀉安神圓小驚圓白朮散治瀉下青色

方並見前

疳瀉白朮散蟾酥圓史君餅治所瀉爛如泥肚緊

方並見前

欽定四庫全書

世醫得效方卷十二

積瀉消積圓治瀉下極臭穢腹痛

方見前

服後次用益黃散

方見後

平胃散縮砂香附湯補脾即安

方並見大方科諸氣脾胃類

熱瀉五苓散

方見大方科傷暑類

通心飲

方見前

治溏利大便熱每

服二錢並用燈心十莖車前草二根煎服

冷瀉方治臟腑極冷瀉出如破水勻氣散欲變候用

白朮散觀音散冬瓜子仁湯下或脾氣虛益黃散五心

散蘇梗薑錢或誤服冷藥脾虛生風成慢驚南星散生

薑防服湯下瀉極用金液丹為末陳米飲下立住

方並見前



濯中湯治冷瀉不止每服一錢棗湯或鹽湯調方見大類吐	虛寇散治腹痛洞瀉腸胃虛冷	肉豆蔻一枚刺一小孔內滴乳香一塊麪裹煨熱	右為末每服一錢米飲調下	冷熱不調瀉和安散	木香 當歸 川芎 北前胡	柴胡 青皮 北梗 甘草炙	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二	赤茯苓 各等分	右剉散每服一錢水一盞生薑二片棗一枚煎空心	服	枇杷葉散來復丹方見大方科傷暑及痢冷類	養臟湯香連圓方並見大方科泄瀉類	腎洩震靈丹治面鰲黑齒消脫骨力弱小腹痛泄多白	膿	右用三圓為末火鍾乳粉半錢以炒破故紙一錢半

生肉豆蔻一錢大棗二枚煎取清汁乘熱調空心灌下方見大方科痢冷類	梅月天時行瀉香葛湯每服生薑二片豆豉佳粒水一盞煎方見大方科傷寒類	下痢	地榆散治赤痢因大腸停積熱毒得之或點滴鮮紅	地榆 訶子 甘草 各等分	右為末每服一錢鹽米湯調空腹服	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二	又方	地榆 一錢 甘草 二錢 芍藥 一錢 當歸 二錢	右剉散每服一錢水一盞煎溫服	小黃連阿膠圓治腸胃有熱大便秘澀疼痛啼叫下痢	赤黃煩燥多渴腹痛小便不利乃積熱蘊毒為之圓如粟米大方見大方科咳嗽類	四生散	罌粟殼去萼蒂赤類半生半炙 黑豆 一合炒生 甘草 半生炙

生薑 半生半炙	右剉散每服二錢熟煎溫服如嘔食不入加人參少許	大柴胡湯治下痢舌黃口燥脅滿作渴身熱腹脹譫語此必有燥屎服此下之后與止藥 方見大方科傷寒類	木香散治白痢因腸胃虛弱受於寒氣所下不止腹痛不食立效	木香 炮一分 厚朴 薑汁炒十兩 白朮 一分 龍骨	當歸 洗淨炒各半兩 乾薑 炮 訶子肉 各一分	右剉散每服二錢水一盞生薑二片棗一枚煎溫服量大小加減	朴附圓治滑冷下痢不禁	厚朴 附子 乾薑 陳皮 各一兩	右為末糊圓粟米大每服三十圓米飲下日三服	香連圓治赤白痢皆氣血不和為寒熱所傷冷熱相乘	乍赤乍白或赤白相雜裏急后重圓如粟米大 方見大方科泄

瀉類	養臟湯治同下 方見大方科泄瀉類	小駐車圓治冷熱不調或乳哺失節泄瀉不止或下痢鮮紅或赤多白少腹痛后重腸胃虛滑便數減食困倦一切瀉痢並宜服之 方見大方科下痢類	香粟飲治赤白痢	木香 五錢 黃連 去鬚 粟殼 去蒂萼赤一兩	僵蠶 炒去絲五錢 甘草 一兩	右用生薑二兩切同炒為末每服一錢米飲下赤痢生地黃七寸白痢烏梅一錢並煎湯調下如有熱小柴胡湯解之 方見大方科傷寒類	石蓮散治禁口痢因服澁住藥太過傷損胃氣聞食口閉四肢逆冷若穀道不閉黃汁長流不治	蓮肉 去心炒	右為末每服一錢空腹米飲調服	真料參苓白朮散治禁口痢和胃進食或單用山藥細



炒半生半熟為末米飲調服立效

方見大方
科脾胃類

等住圓治瀉瀉并一切瀉痢立效

當歸

硫黃

牡蠣

煅各一分

木香

半兩

右為末麪糊圓粟米大每服二七圓糯米飲入薑汁

一二滴送下

小駐車圓治休息痢因腸胃虛弱紅白相雜兩三點滴

乍發乍止

方見大方
科下痢類

炒雞子治休息痢及疳瀉日久不能安者

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

右用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內鎔以

雞子拌和炒熟空心食之

感應圓治釀臌痢肚大喫食不成肌膚其下如濃粥汁

青白黑為冷黃赤為熱皆積聚所致

方見大方
科秘瀝類

縮砂圓

即蠟匱圓

治積痢

香乳湯治氣痢下如魚眼

二方並見大
方科下痢類

脾胃

白朮散又名清寧散溫脾養胃正氣理泄瀉胃熱煩渴

不問陰陽虛實並宜服之或乳食不進羸困少力因而

失治變成風痼

方見前

為散紫蘇梗煎正脾生薑棗子虛

實熱服涼藥後不能食先用此生胃中津液後服生犀

散退熱

方見前

早涼夜熱不可下只用煎三升許頓服

稍愈後再服三升候不渴無涎又投阿膠散二服即安

白水煎亦可如渴飲水多者多服無時盜汗虛汗亦用

此藥止瀉治痰退熱清神渴倍加白朮渴甚者任意多

飲

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

糯米散阿膠一兩半麪炒鼠粘子一分炒香馬兜鈴半

兩甘草一分杏仁七箇去皮尖糯米一兩為散每服

二錢用水煎服

史君子圓正脾助胃

厚朴

去麤皮
薑汁炒

陳皮

甘草

訶子

去核

史君子

去殼
別研

右為末煉蜜圓菜豆大每服三七圓 疳瀉積瀉米

飲下 熱瀉加青黛米飲 冷瀉薑 中暑瀉香薷



時行瀉桑葉 赤痢藍姑草 白痢烏梅 驚瀉		藍姑草已上並用米飲下 藍姑草竹葉菜是也		六神湯理脾胃虛止吐瀉進飲食養氣		嫩黃耆 白扁豆 炒 人參 白朮		白茯苓 粉草 各等分 或加藿香葉亦可		右為末每服二錢蘇鹽湯正氣生薑棗子湯調下		香黃散治脾胃虛弱吐瀉及治脾疳腹大身瘦此藥補		脾調氣治冷腹痛以冷泄效		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二		陳皮 青皮 訶子肉 甘草 各一兩		丁香 五錢		右剉散每服二錢水一中盞生薑二片煎空腹服		醒脾散		人參 白朮 豆蔻 甘草		乾薑 藿香 各等分		右為末每服一錢或半錢薑湯下如醒脾胃冬瓜子		仁米飲下	

調氣散		桔梗 甘草 乾薑 縮砂		益智子 茴香 藿香葉 各等分		右為末每服半錢水瀉紫蘇木瓜煎湯下調脾胃生		薑棗子煎湯調服		觀音散治脾胃不和 方見前		腹痛		四順清涼飲治挾熱作痛面赤壯熱四肢煩手足俱熱		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二		加青皮枳殼去穰切片入 方見大方 科積熱類		七氣湯治挾冷作痛面色或白或青四肢冷甚		青皮 陳皮 桔梗 蓬莪朮 煨		辣桂 藿香 益智仁 各一兩 香附子 一兩		半 甘草 炙 三分 加半夏 湯洗 三分		右剉散每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎不拘時		候		蘇合香圓與七氣湯兼服治證同上 方見大方 科中氣類	



枳殼桔梗湯治邪正交爭冷熱不調作為腹痛嘔吐

枳殼 去穰
麵炒

桔梗 去蘆

青皮 去穰

陳皮 去白
各伍

錢

木香 三錢

當歸

粉草 各五錢

右剉散每服二錢水一盞生薑二片煎溫服

疝氣

金鈴散治疝氣作痛時先曲腰啼哭眼中無淚脚冷唇

乾額上多汗或外腎釣上陰囊偏大

金鈴子 一兩
去核

縮砂 七錢半
去殼

華澄茄

木香 各五錢

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

右為末每服一錢大者二錢鹽湯或好酒調服

收氣圓治同上但小圓如粟米大每服二七粒金鈴子

煎湯下 方見大方
科痰瘰類

香檳榔圓治疝氣小腹痛引腰脊彎曲身不能直

芫花 醋浸炒

木香

檳榔

三稜 炒各半兩

茯苓

青皮 去白

全蝎

肉桂

附子 炮

硼砂 各一分

右為末將硼砂浸洗去土頓在湯瓶上候成膏子和

糖醋打麪糊圓如菉豆大每服三十圓空心溫酒送

下未效再服

又方金鈴子圓治疝氣小腹痛引腰脊彎曲身不能直

木香

檳榔

三稜

蓬朮 炮

青皮 去白

陳皮

川楝肉

芫花 醋浸炒各

兩半

辣桂

牽牛 生取仁
各三錢

川巴豆肉

不去油
一錢

右為末麵糊圓麻子大每三圓空心午前各一服薑

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

湯下

五苓散治陰核氣結腫大釣痛多因啼怒不止傷動陰

氣結聚不散得之或胎婦啼泣過傷令兒生下小腸氣

閉加以風冷血水相聚水氣上乘於肺故先喘而後疝

痛外腎木硬臍下痛楚不可忍惟利二便則安以木通

葱白茴香食鹽煎湯調下得小便利為效 方見大方
科傷暑類

當歸散治疝氣大腑秘小腹陰囊牽引撮聚痛甚

辣桂

牽牛 炒取仁
各半兩

當歸

北大黃



桃仁 浸去皮焙
各二錢上 全蝎 一錢半

右剉散每一錢入蜜煎溫服以利大便利后以青皮
陳皮茯苓木香縮砂甘草為散生薑煎和胃唇青不

治

鈎藤膏治盤腸內釣腹中極痛乾嘔

明乳香 沒藥 同上
別研 木香 薑黃 各四
錢半

木鱉子 十二箇
去皮研爛

右以木鱉子搜和四味末為圓櫻桃大煎鈎藤湯化

欽定四庫全書 世醫得效方
卷十二

下一歲可服半圓次魏香散

阿魏散用蓬莪朮半兩真阿魏一錢先以溫水化開阿

魏浸莪朮一日夜焙乾為末每服一字或半錢煎蘇

葉米飲空心調下

吐衄

蒲黃散治吐血咯血

生蒲黃 油髮灰 等分

右研細每服一錢煖生地黄汁調下米飲亦可

生地黄汁方治吐血衄血

生地黄汁取一合髮灰半錢調分作兩服食后少頃
灌下

鼻衄方

生蘿蔔汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

腫滿

五苓散香薷散治伏暑感濕腫滿用生薑皮木瓜車前

草山茵陳煎 方見大方
科傷暑類

欽定四庫全書 世醫得效方
卷十二

分氣飲治腫脹作喘氣短而急

北梗 赤茯苓 陳皮 桑白皮

大腹皮 枳殼 半夏麴 真蘇子 炒

紫蘇 甘草 各二錢 草果仁 一錢

右剉散每服一錢半水一盞生薑二片棗子一枚煎
服若臍心凸起掌心平缺盆平背心平不治大喘氣
竈不食乃腎水盈溢上行傍浸於肺亦不治

五皮散神助散相兼服 方見大方
科腫滿類



奇方治熱毒遊腫破草鞋人亂髮燒灰醋調傳熱毒處
三黃散貼腫毒

右用大黃黃柏黃連各等分為末獐猪膽汁調塗頭
心及脚心又方斫石白麪等分研勻井水調睡時塗
脚心效

單方治脚氣腫痛及蠱腫

右商陸不以多少切碎酒煮熟候酒溫連商陸飲喫
腹肚蠱腫同米煮粥喫大人亦可服

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

盜汗

白朮散安神圓小驚圓牡蠣麻黃根煎湯下

方並
見前

又方治心腋汗大人小兒皆有之大人乃心血溢盛面
常發赤者是也小兒因驚得之有人常有盜汗不止氣
弱體羸久醫不可乃心血溢盛為汗非虛也宜用藥收
斂心血

川當歸

人參 各半兩

右剉散用猪心二箇可切三片藥亦分三服每服水



迪志文化出版有限公司出版

一椀猪心一片煎服

黃耆健中湯治盜汗入米糖煎服效

牡蠣散治血虛自汗或病後暴虛津液不固自汗夜卧
愈甚又不止則枯瘦短氣煩倦

方見大方
科自汗類

奇方治脚汗白礬乾葛為散煎水洗效

又方治睡中汗出酸棗仁人參茯苓為細末米飲下半

錢

項軟

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

天柱圓治風氣頸起軟頭不得正或去前或去后

蛇含石

大一塊服七次
用醋淬

川鬱金末 少許

右碾細又入鉢內研極細和前藥米入少麝香和勻
用雪白大米飯圓龍眼大每服一圓荊芥湯化下或
又入生薑汁一二滴或用金銀薄荷湯早晨不拘時
下風熱項軟合用涼肝圓

方見前

五加皮散治頸軟

右用五加皮為末酒調塗傳頸骨上



迪志文化出版有限公司出版

健骨散治以患瘡疾體虛不食及諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟

白殭蠶為末三歲兒半錢薄荷酒調下後用生筋散

貼

生筋散治如前

木鱉子

六個去殼

黃麻子

六拾箇去殼

右研細先拖起顱摩項上令熱津唾調貼之效又方

用附子生用去皮臍天南星切各等分生薑自然汁

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

調貼項軟處

語遲

菖蒲圓治受胎其母卒有驚怖邪氣乘心舌本不通四

五歲長猶不能言

人參

石菖蒲

麥門冬

去心

遠志

取肉薑汁

炒

川芎

當歸

各二錢

滴乳香

朱砂

各一錢別研

右為末煉蜜圓麻子大每服十圓粳米米飲下

聾耳

明礬散治腎經有熱上衝於耳遂使津液壅滯為稠膿為清汁耳內痛亦有沐浴水入耳中濕氣停滯為膿但不疼二證以不瘥變成聾耳

明礬

煨

龍骨

各三錢

黃丹

二錢

胭脂

一錢

麝

少許

右為末先以綿枚取去水次以鵝毛管吹藥入耳本

方加海螵蛸末亦好

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

月蝕耳瘡方胡粉和東方壁土為末傅

又方蝦蟆燒灰存性搗為末和猪膏傅

重舌

傅藥治重舌乃心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之脈絡出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生一物形如舌而短小是也有著頰裏及上腭者曰重腭有著齒斷者曰重斷皆當刺去其血也用真蒲黃傅之或髮灰傅之或馬牙硝傅之或竹瀝浸黃柏點之



燄消亦好

其餘並見大方科舌病類

木舌

紫雪治木舌舌過心之候脾之脈絡於舌臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是為木舌若不急療必至害人每用一字研細竹瀝調下

見方

和劑局方

又方黃蜀葵花研細黃丹半之同研點七次

又方川朴消二分紫雪一分白鹽半分同研每半錢竹

欽定四庫全書



世醫得效方卷十二

瀝井水調傳

滯頤

冷證溫脾圓治滯頤涎流出而潰於頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

半夏

木香

丁香

各半兩

川白薑

生

白朮

青皮

陳皮

各二錢半

右為末糕糊圓麻子大一歲十圓二歲二十圓米湯

灌下

脚拳不展

海桐皮散治稟受腎氣不足血氣未榮脚指拳縮無力不能伸展

海桐皮

牡丹皮

當歸

熟地黃

牛膝

各一兩

山茱萸

補骨脂

各半兩

右為末每服一錢葱白二寸煎食前服

行遲

地黃圓治氣血不充骨髓不滿軟弱不能行或肝腎俱

欽定四庫全書



世醫得效方卷十二

虛肝主筋筋弱不能束所致一方加川牛膝五加皮酒

炙鹿茸妙

方見前

又方虎骨圓

虎股骨

酒炙

生乾地黃

酸棗仁

酒浸去皮炒香

白茯苓

辣桂

防風

當歸

川芎

牛膝

等分右為末煉蜜圓麻子大每五圓酒吞下或木瓜湯

五加皮散治三歲不能行者

真五加皮

分一牛膝

酸木瓜乾

各半分



右為末每服一錢半粥飲調次入好酒兩點再調食
前服日二劑

鶴節

地黃圓治稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露
如鶴之膝乃腎虛得之腎虛則精髓內耗膚革不榮易
為邪氣所襲日就枯瘁其殆鶴脚之節乎本方加鹿茸
酥炙川牛膝各二錢修合服餌並同三歲以下與十圓
三歲以上與十五圓 方見前

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

龜胃

百合丹胸高脹滿其狀如龜此肺經受熱所致也乳母
酒麪無度或夏月熱煩熱乳與兒得之或乳母多食五
辛而亦成此疾

川大黃 三分
焙

天門冬

去心
焙

杏仁

去皮
炒

百合

木通

桑白皮

炒

甜葶藶

紙上
炒

爛石膏

各半

兩

右為末煉蜜圓菴豆大每服五圓食后臨卧熱水化

下

龜背

松藥丹治嬰兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致
之或坐太早亦致偃僂背高如龜多成痼疾

松花

枳殼

防風

獨活

各一兩

麻黃

川大黃

前胡

桂心

各半兩

右為末蜜圓黍米大每服十粒粥飲下量兒加減

灸法肺腧穴第三椎骨下兩傍各一寸半膈俞穴第七

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

椎骨下兩傍各一寸半以小兒手中指中節為一寸

艾炷如小麥大但三五壯而止

髮不生

菴蓉圓治稟受血氣不足不能榮於髮

當歸 去尾

生乾地黄

肉菴蓉

酒洗

揚芍藥

各一

兩

胡粉

五錢

右為末煉蜜圓如黍米大每服十粒煎黑豆湯下兼
磨化塗抹頭上



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

齒不生

地黃散治齒不生齒者由骨之所終髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故齒久不生

川芎

乾地黃

當歸

山藥

白芍藥

各一兩
沈香半兩

粉草三錢

右為末溫鹽湯調服半錢用少許揩齒脚亦佳

瘡毒

濕癬用蛇床子為末先以韭菜根煎湯洗次用臘月猪

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

脂調藥傳之

灸甲散治眉叢中生瘡名曰鍊銀癬

右用穿山甲前膊鱗炙焦為末清油輕粉調傳

漏瘡方鍊成松脂末并髮灰生黃丹填傳

白欽散治凍耳成瘡或痒或痛

黃蘗

白欽各半兩

右為末先以湯洗瘡後用生清油調塗

三物散治鬢邊生軟癬名發鬢有數年不愈者此極妙



迪志文化出版有限公司出版

猪頸上毛

猫頸上毛

各一撮
燒灰

鼠屎

一粒

右為末清油調傳或加輕粉尤妙

生附散治凍爛脚成瘡

生附子

半个去皮臍

右為末麪水調貼之即愈

陰瘡方治陰股間汁出先痒后痛愈後復發及陰囊生

瘡以火灸瘡抓去痴令乾以蜜傳却搜麪作燒餅炙

熟以錫塗於燒餅上乘熱熨之冷則再炙再熨數度

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十二

為妙

胎毒瘡方治一歲二歲內滿頭延及遍身生瘡皆因在

胎中父母恣情交合所致名曰胎蛆經久不瘥先用

化毒丹消毒飲服却用父小便以鵝翎刷洗瘡上青

黛為細末乾糝效

即效方治頭上生瘡及肥疳瘡猪筒骨中髓調輕粉早

傳晚愈又用樹上乾桃燒灰清水調傳效暑毒軟節

皆可



迪志文化出版有限公司出版

疣目瘡方治遍身如魚目無膿又名征膚瘡川升麻剉散煎百一沸入蜜一二匙以磁器盛鵝翎蘸拭瘡上諸惡瘡生頭面南星貝母等分用湯泡七次研為細末入土朱少許乾則清油調搽濕則乾糝

口瘡

瀉心湯治血盛將養過溫心有客熱熏發於上焦遂成

瘡

右用黃連一兩去鬚或加腦子麝香礬砂為末每服

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十二

一字溫水臨卧服

連翹飲治心肺有熱瘡發斑駁如丹身體有熱或熟煮

大栗與食亦佳
方見疹瘡類

洗心散治心熱煩渴作成口瘡每用一字乾糝兒口中

嚙喫亦無妨乳母同服尤妙
方見大方科積熱類

傳藥治滿口瘡爛

黃丹一兩好蜜一兩瓦盞盛甑上蒸一炊久取出以

鵝翎刷瘡上效

貼藥吳茱萸末醋調貼兩脚心移夜即愈藥性雖熱能引熱就下至良

又方天南星密陀僧為末
治口瘡不能吮乳醋調貼兩手心即洗去背熱加薄荷水拭口內

又方生硫黃為末新汲水調貼手心脚心效即洗去

軟癬

猪頭散治軟癬愈而再作用野蜂房一二箇燒灰存性

以巴豆三七粒去殼煎清油三二沸去巴豆以油調

藥敷立效白礬枯為末清油調傳亦效
此藥有驗人猪頭為謝

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十二

遂名之

又方大枳殼一枚去穰令空地上磨令口平以稠麪糊

搽四唇露在癬上自破膿溜出盡更無癰痕

又方治軟癬屢安再作者

右用桑螵消燒炙存性以清油調傳

又方鷄抱卵殼燒灰存性為末入輕粉少許清油調傳

此物難得只以雞子抱退殼如上法用亦可

敷瘡口方



白芨

赤石脂 各一錢 研 當歸 三錢 去蘆

龍骨 少許 研

右為細末乾糝

脫肛

釣腸圓治大腸虛寒或因服涼藥過度或从痢後臟寒

所致圓如粟米大大者細嚼胡桃溫酒送下小者木香

湯下 方見大方科諸痔類

瓜萐圓治初病脫肛鼻梁青脈唇白齒根焦黃从病兩

頰光眉赤唇焦多啼哭

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二

黃瓜萐 一箇 白礬 半兩

右將白礬入瓜萐內固濟火煨為末米糊圓每服三

十圓米湯送下

痢頻脫肛黑色生殼方

右用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴消少許洗軟

用真清油點三滴放三角白礬煨過研爛真龍骨少

許同研糝肛頭用芭蕉葉托上勿令便去出入令大

兒抱定

龍骨散治大腸虛肛門出

龍骨

訶子肉 炒各二錢半

沒石子 大者

二枚

罌粟殼 去頰醋炒 赤石脂 各二錢

右為末每服一錢米飲調下

洗方香附子荊芥皂角煎水洗

又方以葱湯洗令軟用芭蕉葉托上

又方五倍子朴消大腹皮煎水洗以赤石脂末糝在芭

蕉葉上托入

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二

貼方草麻子四十九粒研爛水調作餅子貼腮頂上收

上立有效

水聖散子治脫肛不收

右用浮萍草不以多少杵為細末乾貼患處

紫葳膏治臟熱肛門脫出

右用紫背葳一大握又為魚腥草搗爛如泥先用朴

消水洗參肛門用芭蕉托入却用藥於臀下貼坐自

然致入



又方用新磚一片燒紅以醋澆之氣上即用脚布疊數重壓定使熱氣上透不可過熱令病者以臀坐於布上如覺布溫逐旋減之以常得溫熱為度		灸法頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又灸臍中隨年壯		遺尿		雞腸散治腎與膀胱俱虛冷氣乘之不能約制故遺尿不禁或睡裏自出		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二		辣桂 龍骨 錢各二 半		雞腸 燒		牡蠣灰		白茯苓 真桑螵蛸 各炒 半兩		右剉散每服一錢水一盞薑二片棗一枚煎服		又方		雞脰脰 一具 雞腸 燒		猪胞 炙焦		右為末每服一錢酒調下男用雌雞女用雄雞者		尿白茯苓散治乳哺失節有傷於脾致使清濁色白也		以成疳亦心膈伏熱兼而得之	

京三稜 蓬莪朮 煨		縮砂仁 赤茯苓 半各		兩 青皮 陳皮 滑石		甘草 炙各二 錢半		右為末每服一錢麥門冬燈心煎湯調下		又方大甘草頭煎湯服		淋閉		葵子散治諸淋兼小便不通		葵子 車前子 木通 瞿麥		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十二		桑白皮 炒		赤茯苓 山梔子仁 甘草 炙各 等分		右剉散每服一錢井水一小盞葱白二寸煎食前服		導赤散治血淋仍以米飲調油髮灰少許空心灌下		前		尿血方		生蒲黃 生地黄 赤茯苓 甘草 炙各 等分		右剉散每服一錢水一小盞煎調油髮灰少許食前服	



順經散治十餘歲因驚之候心氣下行小便淋瀝日夕
三四十次漸覺黃瘦宜服

韭子炒

琥珀別研

益智去殼炒

金毛狗脊

毛去

石韋去毛一錢

白茯苓去皮

石燕子火燉細各半兩

醋淬研

石韋去毛一錢

右為末每服一錢韭湯調日二服

大便秘

沒藥散治風與滯血留蓄上焦胸膈高起大便不通

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

沒藥

大黃

枳殼炒

北梗各二錢

木香

甘草炙各一錢

右剉散每服一錢薑二片水一盞煎服

陰腫

三白散治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩

桑白皮

白朮

木通去節

陳皮去白各半兩

右為末每服二錢薑湯調空心服

桃仁圓治啼叫怒氣鬪擊於下結聚不散水竇不行發
為此疾

桃仁浸去皮麩微炒三錢

辣桂

牽牛炒取仁

白蒺藜炒香搗去劑

牡丹皮

北大黃各二錢

錢

右為末煉蜜圓如麻子大每服五圓或七圓青皮木

通葱白鹽少許煎湯灌下或煎大流氣飲研青术香

圓灌下

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

蟬退散治陰囊忽腫多坐地為風或蟲蟻咬著

右用蟬退半兩水一椀煎湯洗腫處其痛立止腫亦

消再溫再洗洗后仍與五苓散加燈心煎服又方用

葱園內蚯蚓糞甘草汁調塗

傳藥地龍膏治外腎腫硬或疝或風熱暴腫及陰瘡

乾地黄不以多少為末先以葱椒湯於避風處洗次

用津唾調傳其上外腎熱者雞子清調傳或加牡蠣

少許



又方地龍糞研生薄荷汁調傳

牡蠣散治外腎腫大莖物通明

牡蠣粉研極細先以津唾塗腫處次用糝傳

又方卵腫研桃仁唾調傳

遇仙方治風熱外腎焮赤腫痛日夜啼叫不數日退皮

如鷄卵殼愈而復作用老杉木燒灰入膩粉清油調

傳效

卒暴

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

捷方治卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半

寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸三壯仍用酒和胡

粉塗其腹

又暴腹滿欲死半夏不以多少微火炮為末酒和為圓

如粟米大三五粒淡薑湯或蜜湯下

又中惡暴死葱白納下部及鼻中立活或用菖蒲末著

舌底及吹入兩鼻兩耳中效

又中蠱欲死甘草濃煎湯服立驗

斷乳

畫眉膏

梔子

三箇燒
存性

雌黃

朱砂

各少許

右為末入生清油輕粉少許調勻候兒睡著濃抹於
兩眉醒來自不喫乳未效再用即驗

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十二

世醫得效方卷十二



欽定四庫全書

世醫得效方卷十三

元 危亦林 撰

風科

論雜風狀

中風大法有四一曰偏枯二曰風疔三曰風懿四曰風痺凡諸急牽病多是風初得輕微人所不悟宜速治之偏枯者半身不遂肌肉偏不用而痛言不變智不亂病在分腠之間溫卧取汗益其不足損其有餘庶可復也風疔者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚即不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞閉木然舌強不能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補於陰後瀉於陽發其汗身轉輒者生汗不出身直者七日死

風痺濕痺周痺筋痺脈痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證候形如風狀得脈別也脈微濇其證身體不仁

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三

中風惡證

口開者心氣閉絕也遺尿者腎氣閉絕也手撒者脾氣閉絕也眼合者肝氣閉絕鼻鼾者肺氣閉絕備此五證尤不可治五證中纔見一證猶當審餘證以救療蓋以初中則眼合者多痰上則鼻鼾者亦多痰惟遺尿口開俱見為惡心為五臟主君腎為一身根本誠不可閉絕也

中風要說

凡中風脈無不大者非熱也是風脈也中風有冷熱陽病則熱陰病則冷冷則用溫風藥熱則用涼風藥不可一概用也凡中風皆不可吐出涎人骨節中皆有涎所以轉動滑利中風則涎上潮喉中作響以藥壓下涎再歸骨節可也不可吐出若吐出涎時閉塞之既久枯了手足不可不戒小兒驚風亦不可吐出涎其患與大人同方其發搐搦之時不可捉住手足捉住則涎不歸手足當不隨但寬抱之可也

中風須大作湯劑方有成效若風歸手足名曰小中不

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三



宜用中風藥深治但用平和湯劑雖不能為全功亦可留連歲月戒之戒之

虛證

通氣驅風湯治男子婦人血氣虛弱虛風攻注肌體顫掉肩背刺痛手足拳攣口眼喎斜半身不遂頭目旋暈痰涎壅盛語言蹇澁行步艱難心忪氣短客風所湊四肢拘急鼻塞聲重頭疼脾胃不和心腹刺痛胸膈不快少力多困精神不爽不思飲食嘔吐惡心霍亂吐瀉胎前產後但是氣虛百病皆可服之

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三

天台烏藥五兩 桔梗去苗

川白芷 川芎

甘草炙

陳皮去白

白朮各三兩半

麻黃去根

枳殼麩炒去穰各兩半

人參去蘆半兩

右為末每服三錢紫蘇木瓜煎湯調下去白朮加乾薑僵蠶名烏藥順氣散卒中風氣不順手足偏枯流注經絡四肢骨節疼痛或身如板片舉動不得筋脈拘攣先宜多服得手足間微汗為妙又脚氣步履艱

難脚膝軟弱婦人血風老人冷氣上攻胸臆兩臂刺痛咳嗽心腹膨脹為散每服四錢生薑三片紅棗二枚煎服或閃挫身體不能屈伸溫酒調服遍身搔癢抓成瘡薄荷煎服常服疎風通滯氣調榮衛進飲食大有神效一方每料加天麻一兩沈香五錢亦效並不拘時候

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三

加減續命湯治中風不省人事漸覺半身不遂口眼喎斜手足顫掉語言蹇澁肢體痿痺神氣昏亂頭目眩重筋脈拘攣不能屈伸骨節煩疼不得轉側亦治脚氣緩弱久服之瘥有病風人常服不可缺以防瘡啞

麻黃去根

人參

黃芩

白芍藥

川芎

甘草

杏仁去皮尖炒

防己

桂各二兩半

防風一兩半

附子炮去皮臍有熟者用白附子良一兩半

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片棗二枚煎不拘時候溫服取汗隨人虛實與所中輕重也 筋急



拘攣語遲脈弦加薏苡仁 治筋急加人參黃耆白芍
藥以避中寒服後稍輕再加當歸全愈 腳氣虛弱
不能轉側心神恍惚加茯神遠志 骨節煩疼有熱
者去附子倍加芍藥 煩燥大便澀去附子倍芍藥
加竹瀝 臟寒大便自利去黃芩加白朮附子 骨
肉冷痛者加肉桂附子煩燥多驚者加犀角嘔逆腹
脹人參半夏 自汗去麻黃 語言蹇澀手足顫掉
石菖蒲竹瀝 大便秘胸中不快枳殼大黃 氣塞
不通沈香 有痰南星數片 發渴麥門冬乾葛瓜
根 身疼秦艽 上氣浮腫喘急防風桑白皮以上
所加各一兩小兒慢驚煎取藥汁一盞入生薑汁再
煎一二沸日三服夜二服夏間又有熱者減桂一半
春加麻黃一兩夏加黃芩一兩秋加當歸四兩冬加
附子半兩風虛加川芎一兩一方加木香縮砂獨活
各一兩川烏炮三分亦效牙關緊用南星末半錢龍
腦一字頻擦牙上令熱即自開

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十三

大省風湯治諸虛風涎潮痰厥神昏頭暈語澀手足搐
搦半身不遂及歷節風痛筋脈攣急
川芎 半夏 防風 各一兩 甘草 炙 兩
全蝎 去毒 三箇 附子 生 去皮 川烏 去皮 臍 木香
南星 各半兩
右剉散每服四錢水一盞半生薑十片煎溫服不拘
時候氣虛加沈香氣逆紫蘇胸膈不利有痰倍加半
夏人參頭暈頭疼加天麻半兩全蝎二錢煎熟入麝
香熱風左癱右瘓口眼喎斜口噤不能言手足頑麻
於本方中去附子川烏
順元散治卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作
聲痰氣上壅六脈沈伏或浮盛兼治痰厥飲厥及氣虛
眩暈
川烏 二兩 天南星 附子 各一兩 並炮 木香 半兩
右剉散每服三大錢水一盞半生薑七片煎稍熱服
感風濕卒中五積散合和服 不省人事細辛皂

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十三



角少許為末或只用半夏為末以蘆管吹入鼻中候噴嚏少蘇然後進藥 痰涎壅盛每服加全蠍五枚仍服養正丹每服三七粒鎮墜之以其用硫黃黑錫皆有益則痰涎隨去矣因氣中者以沸湯化蘇合香圓一粒乘熱灌下仍用前藥汁濃磨沈香汁少許同煎一沸服之 四體冷厥用靈砂丹歲丹二七粒兼服 方並見傷寒類 二香三建湯治男子婦人中風虛極六脈沈伏舌強不能言語痰涎併多精神如癡手足偏廢不能舉動此等證狀不可攻風只宜扶虛

天雄 附子 川烏 並生去皮各一兩

木香 不見火 沈香 濃磨水 半兩 臨熟旋入

右剉散每服四錢水二盞生薑十片煎七分空心溫服

一粒金丹治一切風疾氣血俱虛陰陽偏廢卒暴中風僵卧昏塞涎潮搐搦不省人事失音舌強手足蹻曳口

眼喎斜或癱瘓偏枯半身不遂語言蹇澁舉止錯亂四肢麻痺及治顛癇倒卧目瞑不開涎盛作聲或角弓反張目睛直視口禁悶絕牙關緊急并治風搏於陽經目眩頭暈牙齒疼痛耳作蟬鳴皮膚攣搐頻欠喜睡項強拘急不能回顧及腎臟風虛脚膝疼痛步履艱難偏風流注一邊屈伸不得無問新久並能治之

川烏頭 炮去 大附子 炮去 白附子 炮去 白僵蠶 炒去

白蒺藜 炒去 五靈脂 去石 白礬 枯

沒藥 研各半兩 朱砂 研 細墨 磨汁 麝香 研各二

錢半

右為末用墨汁和藥每兩作六圓窰乾金箔為衣每服一圓生薑半兩和皮擦取自然汁化盡為度用無灰酒半盞溫熱調前藥溫服量病人酒性多少更飲酒一二升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧汗出為效勢輕每服半圓不以時候如有風疾常服尤佳補益五臟固密真元通流關節祛逐風邪壯筋續骨



神效

萬金湯治風補虛順榮衛通血脈并腰脚膝沈重緩弱無力及治手足風累驗

續斷

杜仲去麋皮炙香切 防風

牛膝酒浸焙

華陰細辛

白茯苓 人參

肉桂去麋皮

當歸切焙

甘草炙 川芎

獨活

秦艽去土

熟地黄各半兩切酒拌微火炒

右剉散每服五錢水二盞煎過空腹熱服若左臂不

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三

遂得痊愈後而手指不便無力試諸藥不效者不半

劑可愈血虛體弱加鹿茸肉蓯蓉各半兩

萬病回春湯治一切諸虛不足風疾血氣交攻凝滯脈

絡拘急攣拳氣不升降癱中疼痛痰涎壅盛脾胃不和

飲食不進此藥去風和氣活血大有神效凡治風不可

專用風藥攻之愈急則愈甚服此輕者一月重者二三

月自然愈矣且無再作夫血氣和平榮衛調順則風症

不攻而自去

附子炮

人參

麻黃去節

黃芩

防己

香附子去毛

杏仁去皮

川芎

當歸

各一兩 茯神兩半

陳皮

防風各一兩

白芍藥

五兩 沈香

川烏炮

半夏兩半

桂一兩

白朮二兩

天台烏藥兩半 乾薑一兩

黃耆三兩

甘草

熟地黄各一兩 生乾地黄

一兩

右二十四味八味去風八味和氣八味活血同剉散

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三

每三錢水一盞半薑三片棗一枚煎空心通口服常

服效

真珠圓治肝虛為風邪所干卧則魂散而不守狀若驚

悸

真珠母

三分 當歸

熟地黄各一兩半 人參

酸棗仁

柏子仁各一兩 犀角

茯神

沈香

龍齒各半錢

右為末煉蜜圓梧桐子大朱砂為衣每服四五十圓



金鐵器薄荷煎湯食后吞下	御風膏治口眼喎斜	右用草麻子去殼碾碎塗在手心以一孟子置在手	心草麻子上用熱水置盂中口正則急取孟子左癱	塗右手心右癱塗左手心口眼纔正急洗去藥只隨	病手左右貼亦可又治產難者爛研塗兩脚心纔生	下便洗去	又方用桂心酒煮取汁故紙蘸貼患處左喎貼右右喎	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三	貼左即正	又方括蓐播爛絞取汁和大麥麪搜作餅炙令熱熨如	正便止不令太過	又方大鱔魚一條以針刺頭上血左斜塗右右斜塗左	以平正即洗去鱔放之	虎脰方治諸般風痺手足疼痛步履艱難腿膝緩弱久	服身輕體健行動快捷大和氣血通行榮衛補虛排邪	有益真氣

虎脰骨 酥炙 三兩半	川當歸 酒洗	川附子 炮 去	大川烏 炮去 皮尖 各一兩半	川羌活	川芎 獨活	赤芍藥	白朮	杜仲 去粗皮薑 炒去絲	草薺 防風 去蘆	肉桂 去麤皮 酒洗	川牛膝 酒洗 黃耆 去蘆	金毛狗脊 白茯苓 去皮 白蒺藜 炒 去刺 人參 去蘆	天麻 已上 各二兩	川續斷 一兩	右剉散以生絹袋盛了用無灰酒一斗浸之密封瓶	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三	口春浸三日夏二日秋七日冬十日每服一盃溫過	空心服神效留滓日乾或焙乾為末酒糊圓溫酒下	熱證	金沸草散治卒中風痰上壅頭項強急肢體煩疼筋脈	拘攣偏廢發熱先以解之 方見大方科 傷寒陽正語	人參羌活散治風壅痰實頭目昏暈遍體拘攣頭項強	急肢節煩疼壯熱煩渴	前胡 羌活	人參 防風



天麻	赤茯苓 去皮	薄荷葉	蔓荊子
川芎	粉草	黃芩	枳殼 去穰
桔梗	川獨活 各一兩		
右剉散每服四錢薑三片桑白皮七寸煎不拘時服			
星香散治中風痰盛服熱藥不得者			
南星 八錢	木香 一錢		
右剉散每服四錢生薑十片水一大盞煎溫服			
防風通聖散治一切風熱頭目昏痛肢體煩疼咳嗽喘			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三			
滿涕唾稠粘口苦咽乾腸胃結燥			
防風 二錢半	川芎 半兩	石膏 一兩	滑石 三兩
當歸 一兩	赤芍藥	大黃 各半兩	甘草 炒
荊芥穗 各二錢半	薄荷葉 一兩	麻黃 去根節	白朮
連翹	黃芩	桔梗	牛膝 酒浸去蘆
人參	半夏 薑汁製各半兩	山梔子 三錢	
右剉散每服四錢水一盞生薑三片煎溫服不以時			
候			

麻黃湯治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒不			
欲飲食兼治賊風偏風猥退風半身不遂失瘖不言			
麻黃 去根節	黃耆 半兩	黃芩 三分	獨活
右剉散每服四錢水一盞半煎不以時候服取汗為			
效心熱加大黃半兩氣滿枳實一分氣逆人參三分			
心悸牡蠣三分渴加瓜蒌根寒加附子一枚炮煎熟			
入			
小省風湯治左癱右瘓口眼喎斜口噤全不能言半身			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三			
不遂手足頑麻			
防風 去蘆	天南星 湯泡各三兩	甘草 炙一兩	
右剉散每服四錢生薑十片水一大盞煎熱服			
洗心散治因食熱物過度作成中風其狀手足如火煩			
燥眼赤肌肉瞤動筋脈拘攣痰涎壅塞大小便閉澀依			
證用之大效 方見大方科積熱類			
四順清涼飲治血熱蘊結壅滯遂成風證煩渴喘悶譫			
妄驚狂舌強口噤			



小通聖散治風熱上攻目赤頭痛咽疼齒牙兩頰腫滿	口乾煩燥筋脈攣急併解酒毒	當歸	薄荷	羌活	防風
梔子	粉草	大黃	川芎	防己	桔梗
各一兩					
右剉散每服四錢水一盞半燈心二十莖青竹葉七	皮煎食后服小兒急驚可服二錢	清神散消風壅化痰涎治頭昏目眩心忪面熱腦痛耳	鳴鼻塞聲重口眼瞤動精神昏憤肢體疲倦頸項緊急	心膈煩悶咽嗑不下	檀香
人參	去蘆	羌活	去苗	防風	去蘆
薄荷	去毛	荊芥穗	去毛	甘草	燼
各二兩		石膏	研	細辛	去苗洗焙各五分
右為末每服二錢沸湯點服或入末茶少許食后服	茶調散治同上或加石膏亦可	亦見大方	科頭痛類	川芎芍藥湯治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴痰壅喘	



嗽筋脈拘攣偏枯調理勞復諸病	川芎	芍藥	當歸	山梔子	黃芩
大黃	菊花	荊芥穗	人參	白朮	各半兩
滑石	四兩	寒水石	桔梗	各二兩	甘草
三兩	縮砂仁	三錢	石膏	防風	連翹
薄荷葉	各一兩	水	右剉散每服三錢水一盞食后煎服熱甚者為末冷	消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌	肉蠕動目眩耳鳴眼澁好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻瘙癢
瘰癧疹又治婦人血風頭皮腫痒眉稜骨痛旋運欲倒痰	逆惡心	荊芥穗	甘草	川芎	羌活
人參	茯苓	白僵蠶	炒去絲	蟬退	去足
厚朴	去麤皮	陳皮	去白	各半兩	二兩
右為末每服二錢茶清調下如久病偏風每日三服					



便覺輕減如脫者沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦
疼用荊芥茶清調下溫酒亦可併服之小兒虛風
目澁及急慢驚風用乳香荊芥湯調下半錢並不拘
時候一方治口眼喎斜半身不遂多因下元虛弱為
風所乘先服順氣藥次服補劑却用清茶調此吞青
州白圓子

透冰丹治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞心胃不
利口舌乾澀風毒下注腰脚沈重腫痛生瘡大便秘

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三

小便赤澀中風癱瘓一切諸疾

川大黃 益智仁 白茯苓 茯神

山梔仁 蔓荊子 葳靈仙 天麻

白芷 各半兩 香墨 燒醋淬 麝香 研各一錢一字 仙靈脾 葉

洗 半兩 川烏 二兩 河水浸半月三日一換水
用 切片焙乾用鹽一兩炒黃去鹽

右為末煉蜜搜如麥飯相似以真酥塗杵白搗萬杵
如乾旋入蜜令得所和搜成劑每服旋圓如梧桐子

大用薄荷自然汁同溫酒化下兩圓 卒中風涎潮
昏塞煎皂角莢白礬湯放溫化四圓灌下 癱瘓風
每日服三五圓漸覺有效 常服一圓疎痰利膈溫
酒食后下 小兒驚風入膩粉少許薄荷汁化下半
圓立效 治癰癰葱湯下一圓忌動風毒物
鮮毒雄黃圓治中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并
解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一切熱毒

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三
鬱金 二錢半 巴豆 去皮油 雄黃 別研四錢半

右為末醋煮麪糊圓菜豆大每服七圓用熱茶清下
吐出頑涎立蘇未吐再服如牙關緊閉灌藥不下者
即以刀鐵匙幹開口灌下

川牛膝散治風壅痰盛四體重著或軟癱疼痛或拘攣
麻痺顫掉口乾目赤煩熱睡卧不寧

條參 去蘆 川羌活 去蘆 枳殼 去穰 秦艽 去蘆

赤芍藥 苦梗 去蘆 前胡 去蘆 川芎

白芷 黃芩 薄荷 天麻



桑白皮	去赤	防己	防風	粉草
荊芥穗	赤茯苓	川牛膝	去苗	木瓜
			各等分	
右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎溫服不以時候				
通關散治卒暴中風昏塞不省牙關緊藥不得下咽				
細辛	薄荷葉	牙皂	去子	雄黃
				各一錢
右研為末每用少許銅管吹入鼻中候噴嚏然後進藥或用白梅擦牙更以菖蒲末著舌下牙關即開				
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三				
通治				
解語湯治中風客於心脾二經舌強不能言半身不遂口眼喎斜神氣不清一切風氣並皆治之				
附子	炮	防風	去蘆	天麻
				炒各二兩
羚羊角屑	官桂	各七錢半	甘草	炙
			羌活	各半兩
右剉散每服半兩水二盞煎八分去滓入竹瀝兩匙再煎兩三沸溫服不拘時候				
琥珀南星圓治因事驚憂涎留心包精神不守事多健				

忘狂言妄語如有所見不得安臥或風痰潮作手足抽搐或心虛煩燥				
天南星	三兩	母珍珠	一錢	真琥珀
			五分	枯礬
				五錢
圓白半夏	五兩	大硃砂	細研一兩為衣	
右為末生薑自然汁煮麵糊為圓梧桐子大每服三十五圓淡薑湯下心氣狂甚加鐵膩粉一兩 氣不順人參湯下 驚悸金銀器竈心土湯 上熱煩燥淡竹葉麥門冬湯 寧心定志石菖蒲湯 痰盛喘急桑白皮湯 小兒急驚麥門冬青竹葉湯 慢驚冬瓜仁木香湯下				
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三				
祛風湯治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫肋滿頭眩不聞人聲偏枯筋急曲踠而卧心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食無味夢寐顛倒與亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俯仰				

冷痺骨疼諸有此證令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目通臟腑諸風疾悉主之

白鮮皮 白朮 芍藥 桂心

川芎 當歸 杏仁去皮尖 防風

甘草炙各二兩 獨活 麻黃去節 茯苓各三兩

右剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二枚煎溫服又方治一切風證小兒驚風婦人血風並皆治之

半夏七兩 川烏一兩 白附子二兩 天南星三兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三

天麻一兩 全蝎五錢 防風一兩 生麝香半錢

右為末薑汁糯米糊圓梧桐子大每服一二十圓淡薑湯不以時吞下癱瘓風溫酒下日三服一二日后當有汗便能舒展經三五日頻呵欠是應常服除風化痰治膈壅小兒驚風薄苛湯化二三圓

救急控涎散治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮於上氣閉不通

豬牙皂角四條肥實不注者去黑皮 白礬一兩光明者

右為末輕者半錢重者三字溫水調灌下不至大嘔吐但微出冷涎一二升便醒次緩調治不可大吐恐虛人

苦丁香散治風涎暴作氣塞倒卧或有稠涎諸藥化不下者

甜瓜蒂亦名苦丁香日乾為末

右每用一二錢加輕粉一字以水半合同調勻灌之良久涎自出如涎未出噙沙糖一塊下藥涎即出不

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三

損人

禹功散治卒暴昏憤不知人事牙關緊急藥不下咽

黑牽牛末一錢 茴香二錢半

右用生薑自然汁調藥少許灌入鼻中立醒一方用牽牛木香尤良

又方治暴患痰飲不省人事

右用生清油一盞灌入喉中須臾逐出風痰立醒然

后隨證用藥



又方治中風痰壅不能治

猪牙皂角

胞實者去皮
弦及子二片

延胡索

七箇
青黛二錢

右為末極細用一字以新汲水調成稀糊令患者仰

卧男左女右將藥入病人鼻內覺藥味到喉少酸令

患人坐却令咬筆筒一枚涎盡為度

神柏散治中風不省人事涎潮口噤語言不出手足羈

曳得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人卒有

此證無藥去處用之得力

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十三

柏葉

一握
去枝

葱白

一握
同根

右細研如泥用無灰酒一升同煎一二十沸去滓溫

服不拘時如不飲酒須分作四五次方進他藥

去風丹治癰風癰風大風一切諸風仍治脚氣并攣撲

傷折及破傷風服過百粒即為全人尤能出汗

紫色浮萍

不拘多少

右以七月半旬或望日採萍擇淨者先以盆盛水以

竹篩盛萍於水盆上曬乾研為細末煉蜜圓如彈子

大每服一粒豆淋酒空心食前化下

豆淋酒法用黑豆半升揀洗令淨炒令烟出以無灰酒

三升浸一晝夜去豆取酒用之亦可常服

枳皮酒治中風身體強直不得屈伸反覆

右取枳樹皮細切成片以酒二升浸一宿每日溫酒

飲半升酒盡再作

菜服膏治大人小兒禁口風

皂角

不注者
炙去皮子

蘿蔔

如無以子代之

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十三

右以皂角為末以蘿蔔同礮醋研雞翎蘸藥塗牙齦

即愈

一得散治中風口噤不知人事產後中風同

右用白朮四兩水三升煎一升頓服

又方治中風通身冷口噤不知人者

右用川獨活四兩好酒一升煎至半升分溫服

獨行散治失音

槐花一味炒香熟三更后床上仰卧隨意服亦治咯



血

又方治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復蘇

竈心土五升搗為末以冷水八升和之取汁服口噤

者以竹筒灌下即愈

趁風膏治中風手足偏廢不舉

川山甲

左廢用左足
右廢用右足

紅海蛤

如棋子者

大川烏頭

生用各二兩

右為末每用半兩搗葱白汁和成厚餅約徑一寸半

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十三

貼在所患一邊脚中心用舊絹緊縛定於無風密室

中椅子上坐用湯一盆將貼藥脚於盆內浸仍用人

扶病人恐汗出不能支持候汗出即急去了藥汗欲

出身麻木得汗周遍為妙切宜避風自然手足可舉

如病未盡除半月二十日已后再依此法用一次自

除其根仍服消風通理藥遠慾以自養

乳靈圓治痛風數年不能舉日夜呻吟不數圓大效

川烏

去皮臍
生用半兩

生乾地黄

酒浸一宿
一兩

草烏頭

小者去皮臍
炒半兩去鹽

木香

不見火
二錢半

五靈脂

揀去沙石
微炒

麻黃

去根節
微炒

自然銅

火煅七次
米醋淬七次另研

虎脰骨

死虎尤好
兩酥塗火炙存

性

滴乳香

好者和燈心研二
錢半為末去燈心

敗龜

取市肆間卜筮鑽
過下截龜殼者是

米醋浸三日炙黃色
再用醋淬七錢半

右研細如粉煉蜜去上白沫為圓如龍眼大每一兩

重作十二圓以帶皮生薑自然汁化開一圓熱酒服

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十三

更以酒半盞送下病在下空心食前服病在上食后

停少時服一日二服口有少麻勿疑

追風獨活散治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使上

氣不守致頭目招搖手足顫掉漸成目昏

獨活

正地骨皮

北細辛

大川芎

菊花

防風

甘草

各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎取六分清汁入少竹

瀝再煎食后服



仙桃圓治丈夫婦人手足麻痺時發疼痛腰間氣閉作痛不止或冷地冰身血氣不運打撲閃胸不可忍及癱瘓等疾		生川烏 三兩 五靈脂 四兩 藏靈仙 五兩		右各燒焙同研為末醋糊圓梧桐子大每服七八圓空心白水下		奇方治中風牙已緊無門下藥		天南星末半錢白龍腦一字頻擦令熱牙自開		欽定四庫全書  世醫得效方 卷十三		又治暗風倒地北細辛為末每挑一字搐鼻中		神應方治諸風癰久服其涎自大便中出生白礬一兩研好臈茶半兩煉蜜為圓梧子大三十圓臈茶湯下		烏蝎圓治手足拳攣痛不可忍者		蜈蚣 一條去足炒 乳香 另研 沒藥 另研 地龍 去土		全蝎 去足翅 草烏 各五分 烏藥 炒 麝香 各一錢		川烏 二隻生用去皮尖		右為末麵糊為圓梧桐子大每服七圓至十圓十五	

圓用麝香少許好酒送下空心服服至七日畧利至半月或滿身發風丹經月方沒久服其病安全后常用生川烏沒藥浸酒日二服通氣驅風湯加乳香沒藥生川烏麝香少許酒調服不飲木瓜湯下服此忌熱食一時		四神圓治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急		天麻 各湯洗淨 南星 去蘆各 防風 一兩 薄荷葉 半兩		右為末酒煮薄麵糊圓菜豆大每服二十圓荊芥生薑煎湯送下		欽定四庫全書  世醫得效方 卷十三		腎瀝湯腎虛為厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯腿脚跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利耳聾塞腰背相引		羊腎 一具 黃耆 川芎 桂心		當歸 人參 防風 甘草		五味子 各一兩 磁石 一兩七錢 玄參 芍藥		茯苓 各一兩二錢半 地骨皮 五錢 生薑 二兩		右剉散水一斗煮羊腎取五升下藥取二升分三服	



神效止痛圓治中風癱瘓不遂手足蹻曳口眼喎斜或
 旋運僵臥涎潮搐搦卒中急風不省人事每服二十圓
 黑豆淋酒下風虛眩冒項筋拘急太陽穴疼痛亦用生
 地黃汁調酒下腰脚疼痛重行步艱辛筋脉攣促俯仰不
 利賊風所中痛如錐刺皮膚頑厚麻痺不仁或血脈不
 行肌拘乾瘦生葱酒下或生葱茶亦可風濕脚氣腿膝
 無力或腫或疼不能舉步兩脚生瘡濃血浸漬痒痛無
 時愈而又發溫鹽酒下打撲閃胸筋骨內損已經多年
 每遇天寒時發疼痛沒藥酒下

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十三

乳香

川烏

沒藥

地龍

五靈脂

白膠香

白薑

半夏

五加皮

赤小豆

各等分

右為末糊圓隨證湯引如前並空心服

牛黃清心圓治諸風緩縱不收語言寒澁痰涎壅盛心
 怔健忘或發顛狂並皆治之

白芍藥

半一兩

柴胡

去苗

桔梗

各一兩二錢半

甘草

劉炒五兩



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

山藥 麥門冬 去心 黃芩 黃連 各一兩半
 杏仁 去皮尖取仁麴炒黃 大棗 一百枚 蒸熟去
 神麴 研 蒲黃 炒各二兩 大豆黃卷 炒 肉桂 去皮
 兩七錢半 白斂 七錢半 當歸 去苗 防風 去苗
 白朮 各一兩半 羚羊角末 麝香 龍腦 研各
 人參 去蘆 二兩半 白茯苓 去皮 芎藭 各一兩半 乾薑 炮七
 阿膠 炒一兩半 牛黃 錢一兩二 犀角末 二兩 雄黃 八錢
 金箔 一千二百箔 內四百為衣

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十三

右除棗杏仁金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四

味別為末入餘藥和包煉蜜棗膏為丸每兩作十九

以金箔為衣每服一丸食后溫水化下

烏荊丸治諸風緩縱手足不隨口眼喎斜言語寒澁眉
 目瞤動頭昏腦悶筋脈拘急不得屈伸遍身麻痺百節
 疼痛皮膚瘙癢抓成瘡瘍又治婦人血風渾見痒痛頭
 疼眼暈及腸風臟毒下血血下不止服之尤效久服令
 人顏色和悅力強輕健鬚髮不白

川烏 去皮臍 炮一兩 荊芥穗 二兩

右為末醋麪糊丸梧桐子大每服二十九酒或熱水任下有痰食空時日三四服無痰早一服

青州白丸子治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風並皆治之

半夏 白好者水浸洗過七兩生用 川烏頭 去皮臍 半兩生用

白附子 二兩生用 天南星 三兩生用

右為末以生絹袋盛於井花水內擺出未出者更以

欽定四庫全書  世醫得效方 卷十三

手握令出以滓更研再入絹袋擺盡為度放甕盆中

日曬夜露每日一換新水攪而復澄春五日夏三日

秋七日冬十日去水曬乾如玉片碎研以糯米粉煎

粥清為丸如菉豆大常服二十九生姜湯下不拘時

如癱瘓風溫酒下小兒驚風薄芎湯下三五丸

蘇毒丸和氣字散風痰亦可常服

右以蘇合香丸 方見大方科中氣類 與青州白丸子 方見前 打和

姜蘇湯化下

蛇黃散治暗風忽然仆地不知人事良久方醒

蛇黃 不拘多少 米醋燒滓七次

右為末每服二錢溫酒下數服便愈年深者亦效

琥珀丸治暗風百日內者

天南星 二兩大者掘地坑深尺餘火煨令紅去火安南星在內即以醋沃之瓦盆蓋一伏時

取出先去灰 朱砂 半兩 別研 琥珀 二錢 通明者別研

真金泊 十片

右剉勻以獐猪心血為丸梧桐子大每服十五丸人

欽定四庫全書  世醫得效方 卷十三

參或麥門冬湯下臨卧服

辰砂丸治暗風年深日近發搐不省人事

好辰砂 五錢 好雄黃 三錢 各研極細 再同一處研

右用烏雞心內血和丸梧桐子大每服十丸以煑獐

猪心湯吞下如不省人事則灌下仍灸百會穴九壯

妙應丸治諸風攣急滿體疼痛遊走無定百藥所不效

者

穿山甲 十五片 石灰炒去灰 全蝎 去毒 三七箇 蜈蚣 七條 生用



麝香	一字 別研	草烏	生去皮 一兩	地龍	去土 一兩	沒藥	別研
乳香	各二錢 別研	松脂	半兩	斑蝥	七箇 去頭足	糯米炒	
白僵蠶	姜汁炒 半兩	五靈脂	三錢 去沙石				
右為末酒糊圓菴豆大青黛為衣每服二十圓不拘時溫酒送下忌食熱物							
大九寶飲治挾氣中風已微微去其痰或非重熱氣實者亦可服							
天雄	氣弱者以大附子代	南星	炮	薄荷葉			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三							
地龍	搗去土	木香		全蝎		防風	
沈香	各等分 麝香別入						
右剉散每服四錢水一盞半生姜五片煎熟入麝香啜服不拘時候							
烏附圓去風疎氣							
川烏	二十枚或用草烏一斤第 功效稍劣油燒存性	香附子	半斤 薑汁淹一宿				
右焙乾為末酒糊圓量數服之若只用草烏當防其麻木人也然肌體肥壯之人及有風疾人宜常服							

葳靈仙	圓治腎臟風壅積滯腰膝沈重						
葳靈仙	酒洗酒 浸七日						
右為末煉蜜圓梧桐子大起初服用溫酒下八十圓平明微利惡物如青膿即是風毒積滯也如未動其夜更服百圓后喫少粥補之							
茯神圓主四肢攣縮不伸等證曾有人自幼年酒多長而風痰為酒使痰注骨節四肢不能運動服此有效							
茯神心木	白茯苓 去皮	薑黃		白朮	炒		
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三							
黃耆	羌活	五加皮	川烏	炮去 皮臍			
薏苡仁	木瓜	去皮穰	半夏麴	神麴	炒		
天雄	炮皮	白芍藥	乳香	別研	沒藥	研	
防風	獨活	當歸	延胡索				
桑寄生	海桐皮	去麤皮	木香		陳皮	去白	
枳殼	炮去穰	南星	炮	地龍	搗去土	荊芥穗	各五錢
錢	麝香	一錢					
右用獐肝一具洗淨煮存性研爛同酒麴為糊圓如							

梧桐子大每服三十圓溫酒吞下不飲木瓜湯下	皂角六一圓疎風活血起癰癰除脚疾烏鬚髮注紅顏	肌肉不緊實久生風證切宜此藥	川烏	草烏	猪牙皂角	烏梅	右判如指面大以冬月無灰酒好醋各二升浸一宿	瓦銚內慢火煎乾取出曬焦乾何首烏一味別為末	煑膏六味焙乾為末以前煑藥餘酒醋及何首烏膏	和圓每服三十圓酒吞下	金汞靈丹治卒暴中風奄忽手足拖曳口面喎斜舌強	痰盛搐搦戰掉或角弓反張目睛正視口禁閉絕每日	三服中風數年不能步履服至十圓復舊新中風三服	可無事常服半圓滋養五臟補益真元通流關節祛逐	風邪強筋健骨	金箔	水銀
			兩	各一兩	五錢湯炮	肉厚										二錢半以火烘過用法醋	一兩
			十箇	一升	去皮弦	者去											
欽定四庫全書																	
																	
世醫得效方																	
卷十三																	

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三



迪志文化出版有限公司出版

辰砂		好硫黃		自然銅		生犀角		白僵蠶		烏蛇		白芷		羌活		鹿茸		安息香		右先將二十六味為末却連前五味拌和入安息香		膏搜和再入白中杵五百下每一兩作十圓每服一		圓空心細嚼溫酒吞下		香附湯治十手指疼痛麻木		附子		木香		右等分剉散生薑煎服木香隨氣虛實加減如治足	
半兩		一兩		四兩		半兩		炒去		三兩法酒浸		川芎		去蘆		火燎去毛		半兩															

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十三



迪志文化出版有限公司出版

弱去附子用烏頭甚妙

正舌散治中風舌本強難轉語不正神妙

蝎梢去毒一分 茯苓一兩 龍腦薄荷二兩

右為末每服二錢溫酒下或擦牙頰亦可

仙茅散治背膊手足頭目筋脈虛掣一切風證疼痛不

可忍立有效

仙茅無則好蒼木代之一兩 陳皮 枳殼炮

厚朴製 官桂 秦艽各一錢 當歸

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三

白茯苓 白芍藥 白芷 川芎

半夏餅各一錢半 麻黃不去節二錢半 沒藥 甘草

川烏炮各半兩 白姜 乳香 川獨活各二錢

錢 全蝎七箇 麝香半錢

右除桂芷麝沒乳餘並炒轉色却入不炒藥同為末

每服三大錢炒大黑豆同木瓜蔭酒旋溫調服不拘

時候

活經丹治丈夫元臟氣虛婦人脾血久冷諸般風邪濕

毒之氣留滯經絡流注脚手筋脈攣拳或發赤腫行步

艱辛腰腿沈重脚心吊痛及上衝腹脇膨脹胸膈痞悶

不思飲食衝心悶亂及一切痛風走注渾身疼痛

川烏炮去皮六兩 草烏炮去皮六兩 地龍去土 天南星炮各六兩

乳香 沒藥研二兩二錢

右為末入研藥和勻酒麪糊為圓梧桐子大每服止

十圓空心日午冷酒送下荊芥茶亦可

黑附丹治諸風疾夫風之為病半身不遂口眼喎斜手

足拘攣或生痺曳語言蹇澁心多驚悸其狀多端各隨

所中由氣血俱虛腠理疎弱風邪外中真氣失守邪正

相干而生焉

自然銅一觔好者用生鐵銚子內以炭火一秤漸

成放冷取出如藥有五色者甚妙然後安向淨黃

濕土上著紙先視其藥用盆子合之不得通風一

宿出火毒乳鉢內研細以水淨淘黑汁濃者收新

次更洗淘又取濃者三五度淘澄定去清水用新

瓦盆內將紙蓋著令自乾如黑粉一 川烏炮略四兩

秤六兩候炮製右藥了當却入下味 烏蛇去皮骨炙



厚朴	去麄皮 薑汁炒	防風	蒼朮	麩炒	川芎
陳皮	白芷	白朮	炒黃 各二兩	芍藥	
吳茱萸	各兩 半	南星	半兩		
右為末與自然銅粉相和勻搗細煉蜜圓梧桐子大 臈月合甚妙 男女中風癱瘓半身不遂起止不能 者空心服臨卧豆淋酒下一粒六十日內必瘥 男 女患筋骨腰膝疼痛走注不定坐則刺腰卧則刺背 行即入脚跟亦用豆淋酒下須臾以葱粥一盞投之					
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三					
衣被蓋覆出汗然後更喫一粒必差或患五七日間 未得汗亦如前法服纔入口汗即出便安依法服二 十日定愈 治破傷風頑麻風暗風偏風並用豆淋 酒下一粒至二粒即見功效 丈夫元臟氣虛臍下 撮痛不可忍者以檳榔一箇酒磨一半入生薑自然 汁少許同煎五七沸研二粒服之須臾以小麥麩醋 拌炒熨臍下便止 治瘰癧氣發時有瘡得兩頭相 就者用檳榔一箇中分破半生用半炙黃一處為末					

酒一盞葱白一握同一處煎葱白傾盞內俟酒得所 時先呷兩口檳榔酒葱白和藥一粒爛嚼以煎酒嚥 之但依法服立效須臾間下泄三二度隨即便愈凡 些小風疾即一服瘥忌動風有毒物休食	左經圓治左癱右瘓手足顫掉言語蹇澁渾身疼痛筋 骨拘攣不得屈伸項背強直下注脚膝行履艱難骨節 煩疼不能轉側跌撲閃挫外傷內損並皆治之	草烏 炮 四兩	川烏 炮 去皮 二兩	乳香 研	沒藥 各一 兩
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三					
生黑豆 一升以斑 俟豆漲為皮去斑 發取豆焙乾入	右為末醋糊圓梧桐子大每服三十圓溫酒下不拘 時常服通經絡活血脈疎風順氣壯骨輕身	川芎散治鷄爪風手口搖動不能舉物	五加皮	海桐皮	川烏
川芎	赤芍藥 各五 錢	乾薑	肉桂 各一 錢		
右為末每服三錢水一盞將十口銅錢一箇入清油內 浸每煎藥入錢同煎不拘時服					



枳實酒治遍身白疹瘙癢不止切不可全用風藥治之
蓋寒邪伏於肌膚相搏凝滯而成瘡或天色冷則重或
因患風中若遇天晴日暖則輕宜用烏藥順氣圓為妙
更用此酒服累用神效 順氣散方見前

枳實 不拘多少麪炒黃切片

右剉散每服二大錢用酒浸少時去枳實但飲酒最
後用枳實煎水洗患處佳

秘方芫花散治臂腿間忽一兩點痛著骨不可忍

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三

芫花根研為末米醋調隨大小傳之

天仙膏治卒中風口眼喎斜

南星 大者一箇 白及 一錢 草烏 大者一箇 僵蠶 七箇

右為末用生鱔魚血調成膏傅喎處覺正便洗去

洗方治風損風腫及瘡痔石楠葉馬鞭草貼壁草煎湯
洗

燒竹瀝法新竹截尺許長用兩磚對立相去八寸置竹
在上每截破二片仰安磚上急著火磚外兩頭各置

碗以盛瀝瀝盡以絹濾澄清夏秋須沈冷水中防瀝
酸大熱有風人亦可單服冷煖隨人勿過度荆瀝亦
然

灸法治口喎斜即效

耳垂下麥粒大艾炷三壯左灸右右灸左

又法治痰涎壅塞聲如牽鋸服藥不下宜於關元丹田
二穴多灸之良

治卒中風口噤不開灸頰車二穴在耳下八分小近

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三

前灸五壯隨愈中風失瘖不能言語緩縱不隨先灸

天倉二穴五十壯其穴在頸大筋前曲頰下扶突穴

后動應手陷中息火仍移灸百會穴五十壯其穴在

頂正中心灸畢還灸天倉五十壯始發先灸百會則

風氣不得泄內攻五臟喜閉伏仍失音也所以先灸
天倉次百會佳一灸五十壯悉泄火勢復灸之視病

輕重重者一處三百壯大效凡中風服藥劇者但是
風穴悉皆灸之三壯無不愈也勿疑惑不至心者勿



浪盡灸

癰風

得效癰風方治癰風即大風惡疾癰是也雖名曰風未必皆因風大率多是嗜慾勞動氣血熱發汗泄不避邪風使淫氣與衛氣相干則肌肉不仁勞氣泣濁則肘熱不利故色敗皮膚瘍潰鼻梁闢壞或自作不仁極猥之業所致久則或遍身白皮脫落如蛇蛻狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十三

菉豆漿添熱水三日一浴一日一洗面却用側柏葉

蒸曝乾白膠香各等分為末蜜圓溫水下三七粒日

三服

仙方治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮眉自落鼻梁崩倒肌膚瘡如荅蘚勢若不可救此方特效

右用皂角刺三觔炭火蒸久曬乾為末濃煎大黃湯

下一匕服旬日間眉髮再生肌膚悅潤眼目愈明

解毒雄黃圓治多啖炙燂成此癰風茶清下三四服效

方見大方科積熱類

浴法

麻黃根 地骨皮 草烏頭 二兩

右剉散研朴消二兩勻和每用藥一兩水一桶椒一合葱三十莖艾葉一兩同煎十沸用米醋一中盞又打勻去滓坐溫室中自用手巾搭四肢候湯可浴則浴令汗透面上如珠流更坐室中或睡片時尤佳汗解方著衣避風而出五日再浴如此兩三浴便服換

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十三

骨丹

換骨丹

九肋鱉甲 海蜈蚣 細剉各二兩

右以鹽泥固濟候乾火煨存二分性為末巴豆半兩去皮膜順手研青州棗七枚去核入巴豆膏在棗中火燒令焦存巴豆五分性將棗巴豆研爛如泥入前二味末研勻以醋煮糊圓如棗豆大每服七圓虛中四五圓用溫薑湯下候利惡物如膿血爛魚腸即住



三兩服未利更加三圓次服遇仙丹		遇仙丹	
人參		紫參 各一兩 苦參 二兩 白僵蠶 去	
二兩		右為末麪糊圓梧桐子大每服三十圓溫鹽湯吞下	
食前日二服次服疎風散		疎風散	
山梔子仁 半兩 大黃		白滑石 熟地黃	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三		右為末入朴硝半兩令勻每服一錢食后淡茶清調	
下次以佛手膏		佛手膏去黑紫瘡核	
斑蝥 七箇 去足		巴豆 七粒 去皮	
紅娘子 二七箇 去翅足		杏仁 二十箇 去皮	
韶粉 各半兩		盆硝 一兩	
膩粉 一兩 炒		硫黃	
萊豆 一合		黃丹 各三錢	
槐角 三條		清油 四兩	
亂髮 一兩			

右用油煎令髮化次下紅娘子次下巴豆槐角等逐		味下焦者瀝出方下硫黃盆硝及丹粉等以竿子不	
住手攪令勻滴水成珠為度用時先將針刺瘡核用		藥一粟米大放針處次日擠瘡有黑臭膿血出三兩	
日血漸少次服去毒丹		去毒丹	
赤芍藥 甘草		白滑石 各半 朴硝	
大黃 各一分		巴豆 去皮炒別	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三		黑牽牛 一兩	
半生半炒		右為末麪糊圓萊豆大臨卧服十五圓金銀薄荷湯	
下加至三十圓次服甘草散		甘草散	
甘草		白滑石 各半	
右為末每服一錢蜜湯調下日二服次服解毒圓		山豆根 一兩	
解毒圓		大黃 一分	
瓜蒌根 三兩		甘草 半兩	
大黃 一分		朴硝 一分	

右為末麪糊圓如菴豆大每服二十圓至五十圓白湯下次服福神丹			
福神丹			
訶子	四箇炒	巴戟	炒
赤小豆	四十九粒生	黑牽牛	生各兩
甘遂 三錢			
右為末麪糊圓菴豆大每服十圓至十五圓薄苛湯下次用水膏藥			
水膏藥傳貼破處及面脚上瘡令生肉			
陳皮	去灰土半觔炒紫色	陳米	半觔炒
藿香			
馬蹄香	各一兩	麝香	一錢別研
右為末入麝香用冷水調掃傳瘡上有膿處如損破即煎槐枝湯洗再上藥此十方乃秘傳有驗大要病人猶宜如法將息理會敬而信之			
通天再造散治大風惡疾			
鬱金	一兩半	大黃	一兩炮
白牽牛 六錢半生半炒			
皂角刺 一兩炮經年者			

右為末每服五錢日未出面東以無灰酒下盡量為度晚利黑頭小蟲病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌葷半年但食稠粥軟飯漸漸頭毛皮膚如常甚者不過三兩次須將息不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢騾等肉犯者死不救	
三濟丸治如前	
當歸	熟地黄
川芎	荆芥穗
兩	防風
北細辛	各一兩去葉
欽定四庫全書  世醫得效方 卷十三	
桂心	一分
右剉散先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黃一觔搗汁浸一宿焙乾酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黃汁釋蒸餅為圓梧桐子大用好川烏頭一箇炮裂剉荆芥穗半兩浸酒三升旋溫下藥五十圓	
八葉湯淋洗大風瘡	
桑葉	荷葉
地黄葉	皂角葉

莧葉 蒼耳葉 菖蒲葉 何首烏葉

右等分曬乾燒存性為末如面藥用洗手面身體大風惡疾瘡瘍茶毒膿汁淋漓眉鬢墜落手足指脫頑痺痛痒顏色枯痺鼻塌眼爛齒豁唇揭病證之患無越於斯負此病者百無一生猶且愛戀妻孥復著名利不仁之行死而無悔深可悲傷凡遇此疾切須戒鹽及一切口味公私世務悉宜屏置

瘰癧

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三

排風湯治五臟風瘰癧亦治風毒脚氣腫痛每服三錢

水一盞半生薑四片煎溫服 方見前

加減續命湯治中風諸風迷仆涎潮舌強語蹇或昏潰

痿痺或厥冷拘攣不論表裏淺深服之效 方見前

蘇合香圓理氣氣和則風散 方見大方科中氣散

不換金正氣散服之則氣順血行瘰癧自愈 方見大方科傷寒類

一粒金丹疎風健筋骨 方見前

大鐵強圓治諸風癱瘓

川烏 炮去皮 一兩半 川五靈脂 四兩乳香

沒藥 各一兩 生麝 一錢

右乳香以乾竹葉包裹用熨斗火熨過即研成末餘藥末和勻再研滴水圓彈子大每服一圓薄荷酒磨下

大四觔圓治風寒濕毒與血氣相搏筋骨緩弱四肢痿疼痒痛

天麻 川牛膝 去苗 宣州木瓜 肉蓯蓉 洗切

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十三

片四味各一觔用 熟附子 虎骨 酒炙 好酒五升浸三日

兩 大當歸 三分 乳香 沒藥

五靈脂 各半 生麝香 一錢

右為末浸藥酒煮麪糊圓梧桐子大每服三四十圓

食前溫酒或豆淋酒下未效木瓜湯下亦治脚氣

歷節風

羌活湯治白虎歷節風短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身體魁癭其腫如脫其痛如掣因體虛飲酒當風汗出



入水受風寒濕毒之氣凝滯筋脈蘊於骨節或在四肢肉色不變晝靜夜劇痛徹骨如虎嚙不可忍久不治令人骨節蹉跌一名癘風須大作湯圓救治不可以淺近之劑則無驗

羌活

去蘆二兩

附子

炮去皮臍

秦艽

去蘆

桂心

不見火

木香

不見火

川芎

當歸

去蘆

川牛膝

去蘆

酒浸

桃仁

去皮尖

骨碎補

防風

去蘆各一

兩

甘草

炙半兩

欽定四庫全書



世醫得效方卷十三

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時溫

服

軟痛圓治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭

烏藥

熟地黄

南星

半夏麴

白僵蠶

各半兩

右為末酒糊圓梧桐子大每服五十圓空心日午夜

間溫酒下如跌撲損傷痛甚薑汁和酒研十粒塗傷

處卒中倒薑汁茶清研五七粒灌下立醒

附子八物湯治歷節風四肢疼痛如槌鍛不可忍

附子

炮去皮臍

乾薑

芍藥

茯苓

甘草

炙

桂心

各三兩

白朮

四兩

人參

三兩

右剉散每服四大錢水二盞煎食前服一方去桂心

用乾地黄二兩

烏頭湯治病歷節痛不可屈伸

烏頭

五枚剉以蜜二升並取一升去烏頭

甘草

麻黃

去節

芍藥

黃耆

欽定四庫全書



世醫得效方卷十三

右剉散每服四錢水盞半煎去滓投蜜再煎空心服

或加老薑桂心大棗不用麻黃黃耆治寒疝腹中絞

痛賊風入腹攻五臟拘急不得轉側叫呼發作有時

使人手足厥冷

虎骨散治白虎風肢節疼痛發則不可忍或痒痛不得

屈伸

虎骨

炙酥二兩

花蛇

酒浸取肉

天麻

防風

去蘆

川牛膝

酒浸去蘆

白僵蠶

炒除

川當歸

去蘆

乳香

別研



桂心	不見火 各一兩	甘草	炙	全蝎	去毒 各半兩	麝香	一錢 別研
右為末每服一錢溫酒調不拘時服豆淋酒亦可							
麝香圓治白虎歷節諸風疼痛遊走無定狀如蟲噬晝							
靜夜劇一切手足不測疼痛及脚痛							
川烏	大八角 者三箇	全蝎	二十 一箇	黑豆	二十 一箇	地龍	半頭 並生
用							
右為末入麝香半分以糯米圓菴豆大每服七圓甚							
者十圓							
欽定四庫全書							
世醫得效方							
卷十三							
世醫得效方卷十三							

欽定四庫全書		子部	
世醫得效方卷十四			
詳校官太醫院醫士 _臣 程森			
編修 _臣 倉聖脈覆勘			
總校官降調編修 _臣 倉聖脉			
校對官中書 _臣 李斯咏			
謄錄監生 _臣 李元偁			

欽定四庫全書

世醫得效方卷十四

元 危亦林 撰

產科兼婦人雜病科

濟陰論

夫濟世之道莫先於醫論醫之難濟陰猶急何則婦人之病比之男子十倍難療或云七癥八瘕九痛十二帶下共三十六病雖有名數莫詳證狀推原其理無非血

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十四

病多因經脉失於將理臨蓐不善調護內作七情外感六淫陰陽勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳干忤隨經致濁淋露凝滯為癥為瘕流溢穢惡痛害傷痼以致所患不一而止犯時微若秋毫感病重於山嶽是也故女子十四而天癸至天謂天真之氣降癸謂壬癸水名故云天癸而衝任脉主之衝任者血之海也月水者經絡之餘也蓋婦人以血為本心生血肝行血榮衛四體如環無端灌注百脉餘者為月候以時而行若水溢自

流不自知覺故纖痼不作而氣體充盛而有子矣其有來多不斷或過期不來或未期而先來參差不一而病生當其來時則一二日之前腰腹滿痛或頭疼作熱百節攣急甚於重患過此則發為虛熱自汗加以五心內熱遂為虛勞血少水涸燥氣乘肺則為喘嗽宿寒留滯血與氣搏則為腹痛敗血結塊時發寒熱則為癥瘕或風寒濕滯經血化為水流溢四肢謂之血分脾不能制血與水并浮脹肌肉謂之虛腫或衝任氣虛內慾過度

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十四

風邪冷熱之氣入於胞門穢液與血兼下冷則多白熱則多赤冷熱不調赤白相半或為赤白帶下若衝任勞損經海動傷脾虛胃弱不能約制其血倏然暴下故謂崩中漏下所下五色各應五臟五臟俱虛五色併下以致眩暈煩悶嘔惡怔忡迷亂多忘發狂妄語小便不禁是皆血之為病也復有生於嬌貴之家愛憎在念而氣逆于中故氣有一息不行血有一息不運則胃腹脹痛眩暈嘔噦倦乏不自勝持飲食不為肌膚致成重患治



療之際調氣為上調經次之斯可為定法受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形必傷泥犯者竅必塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣甚至毋殞驗若返掌斷不可忽半產一證非如正產正產如果中粟熟其殼自開兩無所損若半產則比之採斫新粟碎其膚殼損其皮膜然後取得其實半產正類此以其胎臟傷損胞繫斷去而後胎墜下皆因月未滿足誤服藥餌或寒邪熱毒所傷或舉重打傷跌撲或犯禁忌或衝任脉虛漏欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

臨產必難產婦古以陣面健兒為喻可謂危矣臨產之初先脫尋常所穿衣以籠竈頭及竈口則易產不可喧闐宜謹選一熟善坐婆及得力家人扶持無使揮霍致令產婦憂恐惟當食軟飯糜粥之類若腹中痛且令扶行或痛或止名曰弄痛不可便行試水手探聽產母坐卧切須熟忍或服催生符藥却不可曲腰眠睡如連腰引痛眼中如見火色此是兒轉蓋腎則繫於腰胞繫於腎貼於脊更盡脉轉甚弦如急珠者即其驗矣又須令人扶策徐徐而行若行步艱難即凭物立須臾扶策再行直至腰腹相引陣痛頻作又服催生藥勉強扶行痛陣轉甚難於行立認是產時將至然後坐草切勿太早恐子在腹中難於轉側及胞漿先破子道乾澁皆至難產務要產婦惜力若心中熱悶以蜜一匙新汲水調下若熱悶未解以生雞子一箇打破吞服直待兒迫產門頭面端正然後令人抱腰其抱腰之人不得傾斜則兒順其理自然易產又有卧產者須待卧定背平著席體



不偃曲則兒不失其道必無難產之理時當盛暑宜居深幽淨室日色遠處開啟牕戶多貯清水以防血暈血悶血溢妄行血虛發熱之證如冬末春初天色凝寒宜密閉產室糊塞窓隙內外生火常令暖氣如春仍下襲衣服不可去綿方免胎寒血結毋致難產矣及至產訖先令飲童子小便一盞無使就睡且令閉目而坐頃之方可扶置於床宜仰卧立膝勿令伸足睡熟亦宜頻喚醒產室無俾風著其肌致生他疾況產下切未可以得男為喜恐為紅汗之證得女為憂恐致敗血衝心之患惟當頻啜艾醋等湯藥常燂醋煙以防紫悶逡巡進少白粥毋令過飽其有破水之後經日而不產者又當隨證細辨身重躬熱作寒面黑舌青及舌上冷母死子活面赤舌青母活子死唇口俱青吐沫子母俱斃倉皇之間救治不可不審且當預與病家言之若胎衣不下者停待稍久非惟產母疲倦又且血流入胞中為血所脹上衝心胸喘急疼痛必至危篤宜急斷臍帶以少物繫

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十四



迪志文化出版有限公司出版

墜繫墜之時尤宜用心拴繫然後截斷不爾則胞上掩心而死須使其子血脉不潮入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不害人予治療多見之惟欲產母心懷安泰終自下矣未可輕信坐婆妄用手法因此而殂正產後中風口眼喎斜角弓反張六脉緊大自汗過多虛極生風唇青肉冷剛柔二瘕項背彊硬手足攣急咬齒嚼舌血虛眩暈頻發悶絕氣冷口鼻黑起出血不止虛熱變生名胃絕肺眩喉中氣急喘促不息煩渴殊甚惡露斷絕名孤陽絕陰五七日內彊力下床或憂怒太過一月之內或傷於房事或亂行針艾以致眼昏口噤肌肉間搐腰脊彊直語言不出類皆難治猶宜敬謹外此傷寒及諸雜病與男子等當以理血藥為助臨治之際宜以意消息而加減之

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十四

護胎

驗胎法婦人經脉不行已經三月欲驗有胎

川芎 一兩半生用不見火



迪志文化出版有限公司出版

右為末空心濃煎艾湯調下方寸已覺腹內微動則有胎

參蘇飲治外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋或洗項背或當風取涼致令頭目昏痛增寒甚至心胸煩悶妊娠不可輕易投劑止宜用此以散表邪及治痰飲嘈煩忪悸嘔逆不食腹滿此藥至和而且平嘔加白朮腹脹枳實虛煩竹葉煩燥大渴麥門冬知母水停心下微吐逆茯苓頭痛川芎腹疼加白芍藥

方見大方傷寒類

欽定四庫全書

世醫得效方卷十四

香蘇散治妊婦增寒壯熱頭痛身疼加川芎川白芷生

薑葱白煎得微汗解

方見大方傷寒類

石膏湯治妊婦傷暑頭疼惡寒身熱躁悶四肢疼痛背

項拘急唇口乾燥

柴胡

四兩

甘草

二兩炙

石膏

八兩

右剉散每服三錢水一盞生姜五片煎不拘時候溫

服若氣虛體冷加人參二兩

加減安胎飲凡婦人晝眠不起倦於梳飾乾惡心擇食

怕聞飯氣但喜鹹酸止經候明矣氣血弱者宜服此兼進脾藥安胎溫養令母臟氣平和陰陽全備免有損墮之患成者受胎母無疾耳溫胎保養之劑恐非所宜此方兼治胎動不安腹痛漏下或胎奔上刺心短氣大效漏胎下血不可用僭燥熱藥

條參

去蘆

嫩黃耆

去蘆

揚芍藥

大川芎

熟地黃

酒洗炒

川續斷

去蘆

側柏葉

炒

阿膠

麩炒

粉草

當歸

去尾各等分

欽定四庫全書

世醫得效方卷十四

右剉散每服四錢水一盞半生姜三片金銀器各一

半漏下不止加熟艾一握又如胎動口噤唇青下利

不入亦用熟艾一兩酒三盞煮至二盞去滓灌之即

安

桑寄生散治妊娠或因房室驚觸勞力過度傷動胞胎

或食毒物致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治敗血湊

心子母難保日漸胎乾危亡不久

桑寄生

當歸

去蘆酒浸

川續斷

酒浸

川芎



香附子 去炒 毛	茯神 去木	阿膠 剉成珠粉炒
白朮 各一兩	人參	甘草 炙各半兩
青皮 去核半兩	陳艾葉 一兩	
右剉用每服四錢水一盞半生姜五片煎不以時溫服		
治漏胎下血胎上衝手足逆冷欲死		
右用生艾汁二盞阿膠白蜜各二兩煎一盞半稍熱服之無生艾濃煎熟艾一方加竹茹一大塊同煎		
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四		
治胎動出血產門痛用黃連為末酒調一錢日三服		
急救方治漏胎下血不止胞乾子母即死		
生地黃汁一升好酒五盞煎五沸分三服或為末酒服		
黃芩湯治胎孕不安		
黃芩	白朮	縮砂
		當歸 各等分
右剉散每服三錢水一盞半煎溫服		
小安胎飲治妊娠從高墜下或為重物所壓觸動胎氣		

腹痛下血服此後覺胎動極熱胎已安矣		
縮砂	不拘多少	
右於熨斗內炒令熱透却去皮取仁研為末每服二錢熱酒調服不飲煎艾塩湯或米飲不拘時候調服		
加減二陳湯治受胎一月或兩月嘔吐擇食緣中脘宿有痰飲經水止後氣上逆作名曰惡阻		
陳皮	白茯苓	各一兩半
	半夏	一兩
	白朮	七錢半
粉草	三錢	
欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四		
右剉散每服四錢生姜三片烏梅一箇煎食前服未効加生姜汁		
小紫蘇飲		
紫蘇	厚朴	白茯苓
		各五錢
半夏		
甘草	各三錢	
右剉散每服三錢水一盞生姜五片棗二枚煎溫服		
客熱煩渴口生瘡者加知母前胡胞冷下利加桂心		
炒胃中虛熱大小便秘加黃芩頭疼加細辛川芎		



參苓圓治妊娠飲食過度		木香 不見火 三稜 炮		人參		白茯苓 皮去	
分等							
右為末麪糊圓菴豆大每服三十圓熟水下不拘時候							
白朮散治妊娠氣不和飲食不美							
白朮 炒		紫蘇 各一兩		白芷 微炒		人參 各三兩	
訶子皮		青皮 去白		川芎 各二分		甘草 炙一分	
欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四							
右剉散每服三錢水一盞生姜三片煎不拘時候							
紅圓子治惡阻奇效每服三十圓空心薑湯服 方見大方科							
保生圓治妊娠將理失宜或勞役胎動不安腰腹痛重							
胞阻漏胎惡露時下或子臟挾疾久不成胎或受妊不能固養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮							
麻仁 去殼一兩 當歸 半兩微炒		乾薑 炮		肉桂 去皮			
秦椒 去目閉口者炒出汗		石斛 去根		石膏 研如粉			

黃芩		糯米		知母		甘草 炙赤	
大豆黃卷 各一分							
右為末煉蜜圓彈子大每一圓溫酒棗湯化下空心嚼下亦可方內用北黃芩麻仁性寒之藥人疑不服殊不知娠中有風風中有熱風熱既靜其胎必固黃芩能去子熱麻仁能去子風亦可服后參苓白朮散參苓白朮散 方見大方科脾胃類							
杜仲圓治妊娠二三月胎動不安或會受此苦每遇有懷至期損墮可預服此以養胎氣不爾胎墮其危甚於正產							
欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四							
杜仲 去皮剉薑汁炒斷絲		川續斷 酒浸洗焙各二兩					
右為末棗肉煮爛杵和為圓梧子大每服七十圓空心米飲送下日三服							
掃涼節命散治妊娠恣情飲酒或食生果魚羊雞麪毒物致令百節酸疼大小腑秘澁面赤口苦心煩腹脹							
川芎		苧根		揚芍藥		麥門冬 去心	

當歸 去蘆	白朮 各一兩	糯米 半合	甘草 炙兩
右剉散每服三錢水一盞煎溫服不拘時候			
內補圓安胎扶虛助陰滋血			
熟地黃 二兩洗酒拌炒	大當歸 一兩去尾切片微炒		
右為末煉蜜圓梧子大每服三十五圓溫酒下與枳殼散兼服若單服枳殼散恐有胎寒腹痛之疾二藥皆不群隊為妙仍用平胃散蘇鹽湯調助脾進食			
竹茹湯治妊娠嘔吐頭痛寒熱往來五心煩悶四肢不和			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四			
人參 各五錢	陳皮 去白	白朮	麥門冬 去心
甘草 二錢半	厚朴 去麤皮切姜炒	茯苓	
竹茹 各五錢			
右剉散每服三錢水一盞半生姜三片煎不以時溫服			
竹葉湯治妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六月受少陰相火氣以養氣若母心驚膽寒多好煩			

悶名子煩	防風 去叉	黃芩 各三兩	麥門冬 去心三兩	白茯苓 四兩
右剉散每服四大錢水壹盞半竹葉十數皮煎溫服				
方去黃芩加人參半兩				
知母圓治產難及日月未足而痛如欲產者				
知母				
右為末煉蜜圓如雞頭子每服一圓溫酒嚼下日三服				
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四				
榆白皮散滑胎易產治妊娠漏胎去血及臨產驚動太早產時未至穢露先下致使胞胎乾燥臨產艱難並宜服之				
榆白皮	葵根	瞿麥 各一兩	大麻仁 去殼	
木通 半兩	川牛膝	三分去苗酒浸切焙		
右剉散每服三錢水一盞半煎溫服				
知母飲治妊娠心脾壅熱口乾渴苦煩悶				
赤茯苓	黃芩	黃耆 各三兩	知母	

麥門冬 去心 甘草 各二兩		右剉散每服三錢水一盞半桑白皮七寸煎成入竹		瀝一合服不拘時候胎臟受熱最宜服之一方去黃		耆知母加地骨皮犀角屑嫩葛各三分		保氣散安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜偶然		顛仆胎痛漏胎下血兼服芎歸湯枳殼散		大腹皮 紫蘇 枳殼 去穰 桔梗 去蘆		粉草 縮砂 香附子 各等一分		右剉散每服三錢水一盞半煎食前服		冬葵子散治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水		腫		冬葵子 三錢 赤茯苓 二錢		右為末每服三錢米飲調服不拘時候利則住服如		不通恐是轉胞加髮灰少許神效		大腹皮治妊娠大小便赤澀浮腫		枳殼 去穰 炒 大腹皮 甘草 炙 各一錢 赤茯苓 三錢	

右為末每服二錢濃煎葱白湯調下不拘時候		鯉魚湯 治同上		當歸 去蘆 酒浸 白芍藥 各三錢 白茯苓 四錢 白朮 五錢		右剉散每服四錢用鯉魚一尾不拘大小破洗鱗腸		白水煮熟去魚每用魚汁一盞半生姜七片橘皮少		許煎至一盞空心服如胎水未盡再服		八味圓治婦人病食飲如故煩熱不得卧而反倚息以		胞系了戾不得溺故致此病名轉胞但利小便則愈以		此藥中有茯苓故也 方見大方 科腳氣類		赤小豆湯治妊娠手脚腫滿攣急		赤小豆 商陸乾 各等分		右剉散每一兩用水一碗煎七分盞取清汁服		腎著湯治妊娠腰脚腫痛		茯苓 白朮 各四兩 乾薑 甘草		杏仁 湯洗去皮尖各三兩重		右剉散每服四錢水盞半煎食前服	

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四		又治臨產驚恐氣結連日不下		紫蘇飲子治胎氣不和懷胎近上脹滿疼痛謂之子懸		服忌生冷		右劉散每服四錢水一盞半生姜五片煎不以時溫		便數大便滑		安胎和氣散治胎冷腹脹虛痛兩脇虛鳴臍下冷疼小	
白芍藥	連莖 一兩	陳皮	各半兩	甘草	炙 一分	大腹皮	半兩	川芎	各半兩	白芍藥	陳皮	高良薑	炒
麥門冬	通草	滑石	各一錢	當歸	去蘆	燈心	甘草	炙 半兩	人參	細辛	洗 各一錢	右為末每服三錢煎麥門冬湯調不拘時服一方止	用檳榔赤芍藥各等分水煎空心服屢效

桑螵蛸散治妊娠小便不禁	
桑螵蛸	十二箇 炙
右為末每服二錢空心食前米飲調下	
二白散治妊娠遺尿不知出	
白薇	各等分
右為末每服二錢食前酒調服	
當歸芍藥湯治妊娠腹中疼痛下痢心下急滿	
白芍藥	白茯苓
當歸	去蘆酒洗
澤瀉	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四	
川芎	各一兩
白朮	半
右為末每服三錢溫酒或米飲調空心食前服忌生	
家薑黃連圓治妊娠下痢赤白腸鳴後重穀道疼痛	
乾薑	炮
黃連	去鬚
縮砂仁	炒
芎藭	
阿膠	剉焙粉炒
白朮	各一兩
乳香	另研三錢
枳殼	去穢面炒
兩半	
右為末用鹽梅三箇取肉入少醋糊同杵勻圓如梧	
子大每服四十圓白痢乾薑湯下赤痢甘草湯赤白	

痢乾姜甘草湯下不拘時服		雞黃散治懷身下痢赤白絞刺疼痛		雞子 一箇烏者尤妙挖頭作竅傾出青者留黃者		黃丹 一錢入前雞子殼內打令黃勻以厚紙裹黃泥固濟火上煨取焙乾		右為末每服二錢米飲調下一服愈者是男兩服愈者是女奇效		生料平胃散治妊婦兩脚浮腫名曰脆脚因脾衰不能制水血化為水所致每服三錢薑棗煎服為末蘇湯調		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四		亦可 方見大方科脾胃類		百合散治妊娠風壅相交咳嗽痰多心胸滿悶		百合 蒸 紫苑草 洗 貝母 去心 白芍藥		前胡 去蘆 赤茯苓 各一兩 桔梗 去蘆 甘草 炙兩		右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不以時溫服		羚羊角散治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語蹇澁痰涎不消或發搐不省人事名曰子癰宜服	

羚羊角 川獨活 去蘆 酸棗仁 炒去殼 五加皮 去木		錢各二 薏苡仁 炒 防風 去蘆 當歸 去蘆酒浸		川芎 茯神 去木 杏仁 去皮尖 木香 不見火		甘草 炙各二錢半		右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不拘時溫服		人參養胃湯治妊娠作瘧寒多不食 方見大方科傷寒陰證類未效畧加		山常		清脾湯治妊娠作瘧熱多者		青皮 厚朴 去麁皮 白朮 草果仁		柴胡 去蘆 茯苓 半夏 湯洗 黃芩		甘草 人參 各等分 常山 一半		右剉散每服四錢生薑五片正地骨皮少許煎不拘時溫服或加麥門冬去心二十粒 未效服勝金圓方見大方科瘧瘧類		消風散治妊娠頭眩目暈視物不見腮項腫核若加涎壅危在須臾急宜服之	



石膏	甘菊花 去枝 防風 去蘆 荊芥穗
川羌活 去蘆 羚羊角 鎊 川芎	大豆黃卷 炒
當歸 去蘆酒洗 白芷 各一兩 甘草 半兩	右剉散每服四錢水一盞半入好茶半錢煎食後通
口服有一姪婦患此服之病減七八獲安分挽其眼	帶吊起人物不辨後服四物湯加荊芥防風更服天
門冬飲子但以此二藥相間服目漸稍明大忌酒麪	煎炙燒燂鷄羊鵝鴨豆腐辛辣一切毒食并房勞及
欽定四庫全書 世醫得效方卷十四	稍溫藥如不然眼不復明矣蓋此證為懷身多居火
閣衣著裯褥厚蓋伏熱在裏或服補藥因食熱物太	過致令胎熱肝臟熱極風衝入腦所致
天門冬飲子	天門冬 去心 知母
五味子	茯苓
重	川羌活 去蘆 人參 各七錢半
右剉散每服四錢生姜三片煎食後溫服	

治傷寒熱病護胎方	乾浮萍 另研 朴硝 另研 大黃 微炒 蛤粉 炒
藍根 各一兩	右為末水調三錢貼臍上安胎解煩極妙一法伏龍
肝末水調塗臍下乾則換或用井中泥塗心下乾即	換
單胎散治姙娠傷寒大熱悶亂燥渴恐傷胎臟	蚌粉 半兩 嫩卷荷葉 焙乾一兩
欽定四庫全書 世醫得效方卷十四	右為末每服二錢入蜜少許新汲水調下食前服研
家園生葛汁服亦安	治姙娠咳嗽方
麥門冬 去心 紫苑 去土 桑白皮 炙 杏仁 麤炒	尖甘草 炙 桔梗 泔浸一夜
右剉散每服三錢水二盞竹茹一塊鷄子大煎至一	盞入蜜半匙去滓頻服
又方治如前	

貝母	去心剉麩炒令黃	右為末研砂糖拌和令勻圓如鷄頭大含化一圓神效	苦參圓治妊娠小便難飲食如故	當歸	去尾	貝母	炒	苦參	各三兩	滑石	半兩	右為末煉蜜圓如小豆大米飲下二十圓不拘時候	八味圓治法見前	方見大方 科脚氣類	治妊娠大便秘方	欽定四庫全書	世醫得效方 卷十四	防風	二兩	甘草	一兩	枳殼	三兩	去穰麩炒	右為末每服一錢沸湯點食前日二三服	治妊娠洞瀉寒中方	厚朴	乾薑	右為末糊圓梧子大米飲下二十圓食前服	八正散治妊娠心氣壅胎氣八个月散墜手足浮腫急痛不安難產	瞿麥	剉	木通	剉去皮	滑石	大黃	剉麩炒

焙切	篇蓄	一名地 扁竹	車前子	山梔仁	甘草	炙各等分	右剉散每服三錢水一盞茴香一撮同煎熱服	治妊娠失音不語方	奇病論曰人有重身九月而瘖何也岐伯對曰胞之絡脉絕也何以言之胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎絡舌本不能言治之柰何曰無治也當十月復產前軟胯方	欽定四庫全書	世醫得效方 卷十四	甘草	生薑	烏梅	各等分	右剉散水三盞煎服便令胯骨軟產宮受氣痛不攻作	木香調氣散治妊娠氣悶或為喧呼心忪悸亂睡裏多驚兩脇膨脹腹滿連臍急痛坐卧不安氣急逼迫胎驚者效	白茯苓	去皮	川芎	各一兩	麥門冬	去心	黃耆	去蘆 蜜炙	當歸	去蘆酒 浸一兩	木香	不見火	條參	一兩

甘草 各半兩

右剉散每服肆錢水一盞半生姜五片煎溫服不拘時候常服至分娩亦無恙安養胎氣甚佳

救生散安胎益氣易產令子緊小令母無病

人參 訶子 煨 麥蘗 炒 白朮 炒

神麴 炒 橘紅 炒 各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎空心服

枳殼散瘦胎易產抑陽降氣兼治胎中一切惡疾

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

枳殼 小 厚 突 弦 者 麴 粉草 一兩 炒 去穰 二兩 重

右為末每服二錢沸湯調空心日三服至七月方可服忌登高廁大便秘澀加防風體弱加大當歸去尾木香各等分胎肥壅滯動止艱難臨產難生加乳香髮灰效枳殼能逐水消脹滿逆氣若臨月多服則當產之時無脹滿逆氣產道順而易生誠有補於世也又治腸中諸疾下氣寬膈加炒去毛香附子一兩為末薑湯調下冷氣攻刺脅肋疼痛葱白湯脾寒血氣

成塊作痛熱酒調大小便不通白牽牛為末加入熱湯調服

治兒在腹中哭方多年空屋下鼠穴中土一塊令產母

噙之即止一方川黃連濃煎汁母呷之

治腹脹如抱一甕方

茱萸 川烏 去皮 臍 秦艽 柴胡

白僵蚕 洗 好 者 川巴戟 生 用 巴豆 去 殼 芫花 醋 煮 各 一 兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七粒蜜酒吞下惡物即時取下愈

轉女為男法

論曰陰施陽化所以有娠遇二陰所會多生女子但懷娠三月名曰始胎血脉不流象形而變是時男女未定故令於未滿三月間服藥方術轉令生男也其法以斧置姙婦床下繫刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此置窠下一窠盡出雄雞此雖未試亦不可不



知凡受胎二月逐物變化故古人立胎教能令生子良
善長壽忠孝仁義聰明無疾蓋須十月之內常見好境
象無近邪僻真良教也

月遊胎煞所值正月床二戶三門四竈五母身六竈七
碓八厠九門十戶十一爐十二床

日遊胎煞所值甲巳日門乙庚碓磨礮丙辛井竈丁壬
厨解戌癸米倉子丑中堂寅卯辰酉竈巳午門未申籬
下戌亥房

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十四

保產

收生法凡橫逆等證則當以手法為活收生之人擇揀
老成良善臨期須心平氣和施以妙手亦宜直言叮嚀
詳盡其意乃可不可用燥性之徒恣其麓愚因而傷命
如橫產謂兒先露手或臂者治法當令產母安於仰卧
收生之人徐徐先推兒下截令直上漸通手以中指摩
其肩推上而正之漸引手攀其耳令頭正候兒身正門
路順却投催生藥安詳上草自然易產若逆產謂兒先

露足者治法亦令產母仰卧分毫不得用力亦不得驚
恐收生之人徐徐推其足就一邊直上候兒自順若良
久不順又漸漸推兒頭就一邊令其順下待兒身轉順
門路正當却用催生之藥即產又如偏產謂兒頭偏拄
一傍雖逼近產門初非露正頂止露額角者治法亦令
產母仰卧收生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒
頭頂端正向產門又有兒頭后骨偏拄穀道者當以綿
衣炙焙令熱裹手急於穀道外傍徐徐推之漸漸近上

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十四

然後上草至如礙產謂兒頭雖正產門而不能生下者
或因兒轉臍帶攀挂其肩致不能生者治法令產母仰
卧收生之人輕手推兒近上徐徐通手引中指按兒兩
肩理脫臍帶兒正即產又有坐產謂兒將欲生產母疲
倦不能行立久坐椅蓐抵兒生路不能下生者治法當
於高處懸吊手巾或絹帛一條令產母手攀輕輕屈足
良久兒即順生更有盤腸產者臨分娩產腸先出兒即
隨產俗用冷水嚙產母面其腸自收此法虛弱之人切



不可用恐驚怯成病或即脫絕舊法以草麻子四十九粒研爛塗腦頂自然收上如收上即以水洗去頂上草麻又有久而其腸為風吹乾不能收者以磨刀水少許火上溫過以潤其腸煎好磁石湯一盃令產母服其腸自收矣		補中湯養新血去瘀血補虛扶危治月未滿半產		乾薑 炮 阿膠 剉蛤粉炒 芎藭 五味子 各一		兩 白朮 黃耆 去蘆蜜水炙 當歸 去蘆酒浸		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四		赤芍藥 各一兩半 人參 木香 不見火 杜仲 去皮炒		甘草 炙各半兩		右剉散每服四錢水一盞半煎通口服不拘時候		神妙佛手散治姙娠自四五月至七月因而築心氣疾欲絕用此探之若不損則痛止子母俱安若胎已損即便墜		當歸 去蘆酒浸 芎藭 各一兩		右剉散每服四錢酒一盞煎令欲乾却入水一盞再	

煎三二沸溫服如口噤者徐徐灌下如人行五七里再進一服不過三服便生也		神應黑散最治難產因緣自有難易其如橫逆皆因坐草太早努力過多兒轉未逮或已破水其血必乾若先露手謂之橫或先露足謂之逆養生方云倉皇之間兩命所係不可不知此藥之功也人多不服以為極賤之藥大槩產難或一日兩日未免水血先下如舟坐灘殊不知香白芷百草霜再固其血服之如魚得水決自轉生兼治月水不調崩中等疾		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四		香白芷 百草霜 各等分		右為末每服二錢童子小便米醋各半呷許沸湯澆入六七分點服見功甚速再服即分娩矣或用蜀葵子四十九粒白滑石末三錢順流水煎湯調空心二服如人行五里即下		龍蛻散催生秘傳		蟬退 一兩燒存性 大蛇蛻 火燒存性一條 滑石 半兩 葵子 一兩微炒	

右為末每服一錢順流水微溫煖調下不可使熱湯遇仙雄黃丹催生

雄黃 不夾石者 朱砂 各一錢半 草麻 十四個去皮 大蛇蛻 一尺

右為末漿水飯和圓彈子大臨產時先用椒湯淋洗臍下次安藥於臍內用蠟紙數重傳藥上以闊帛繫之須臾即生急取下藥一圓可用三遍

加味芎歸湯治產五七日不下垂死者及矮小女子交骨不開者

欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四

右用川芎當歸各一兩自死乾龜殼一個酥炙多男
女者婦人頭髮一握燒存性共為散每服三錢水一盞半煎服屢効約人行五里生胎死胎俱下无自死
龜殼用鑽龜廢殼亦可

勝金散治難產逐敗血即自生若橫逆則轉活子死腹中則胎軟臄寬即產祖宗秘傳千金不授用者敬之

王不留行 酸漿 死胎倍用 茺蔚子 白蒺藜 去刺

五靈脂 行血宜生用

右各等分為散每服三錢 取坤方水一盞半入白花劉寄奴子一錢同煎溫服

催生方催生隨其便而用之

右用清油同蜜等分少許湯調頓服 蜀葵子炒為末順流水溫煖調亦下死胎 好京墨新汲水濃磨服之墨水裏兒出立效 敗筆頭二个燒以藕節研自然汁溫酒調下效

催生湯治妊娠欲產痛陣尚踈難產經三兩日不生胎

欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四

死腹中或產母氣乏萎頓產道乾澁纔覺痛密破水后便服

蒼朮 二兩米泔浸洗切炒黃色 小厚枳殼 去作切面炒

白梧梗 薄陳皮 去白 揚芍藥 川白芷

大川芎 各一兩 大當歸 去尾 交趾桂 去粗皮不見火

半夏 湯洗 粉草 麻黃 去節 軍薑 去皮

厚朴 去粗皮薑汁炒 南木香 不見火 杏仁 去皮尖別研 白茯苓 各五錢



右為末每服二錢順流水溫煖調下若覺熱悶白蜜湯下或剉散入真米醋一合煎方內用楊芍藥肉桂能開通子宮其餘藥味皆助氣之盛關竅自通麻黃內通陽氣陽氣盛側血行即產矣外却寒邪去積聚皆得其宜寒月用之甚為的當隆暑之時恐難輕服但以五苓散用葵子燈心煎湯調下卻暑清魂滑胎易產胞漿先破則胎乾難產用白蜜清油或以熱酒令得所滋養胎氣既潤即分娩矣

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

催生丹治產婦生理不順產育艱難並宜服之

十二月兔腦髓去皮膜 研如泥 通明乳香一分 研細

母丁香末一錢 麝香一字 研細

右拌停以免腦髓圓如雞頭穰大陰乾用油紙密封貼每服一圓溫水下即產

烏金散治難產熱病胎死腹中或因頓仆或從高墜下或房室驚搐或臨產驚動太早觸犯禁忌產時未到經血先下惡露已盡致胎乾子死身冷不能自出但視產

婦面赤舌青是其候面青舌赤母死子活唇青吐沫子母俱斃又有雙懷或一死一活其候猶難知須臨期觀變

熟地黄洗切焙 乾酒炒 真蒲黃 大當歸

交趾桂 揚芍藥 軍薑去皮 粉草各一兩

小黑豆四兩 百草霜五錢

右為末每用二錢米醋半合許沸湯六七分侵起溫服疑二之際且進佛手散酒水合煎三二服探之若

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

未死子母俱安若胎已死立便逐下的知其胎死進此藥後更進香桂散須臾如手椎下常用催生更加好滑石末半兩葵子五十粒搥損黃柞葉七八皮葱白二寸順流水煎湯調下方內用滑石能利小便黃柞葉行氣逐血葱白內通陽氣氣盛血行即產祖宗以來用此藥救療不知其幾

香桂散下死胎

麝香半錢 別研 官桂末三錢



右和勻作一服溫酒調下須臾如手推下真珠研末酒調一匕服亦効未効再多服

奪命圓專治小產下血至多而子死腹中其人增寒手指唇口爪甲青白面色黃黑或胎上搶心則絕悶欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物誤服草藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安胎已死服之即下

牡丹皮 去骨 白茯苓 去黑皮 桂枝 辛辣者刮去麋皮

桃仁 湯浸去皮尖麋皮炒去麋不用 赤芍藥 各等分

欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓細嚼淡醋湯下速進兩圓至胎腐爛腹中危甚者亦出

養正丹治難產子死腹中昏沉脉微每服一百二十粒濃煎乳香湯服兩手更把石燕子各一枚即當胎下人活或只用朴硝末每服二錢童便好酒調下效 方見大方科瘕

冷類

備急圓治妊婦熱而大便秘脉實死胎昏不知人溫水下

下七圓即活 方見大方科救急類

蛇蛻散治妊婦欲產時不肯伸舒行動多是曲腰眠卧忍痛兒在腹中不能得轉故脚先出謂之逆生須臾不救母子俱亡

右用烏蛇蛻一條蟬脫皮七箇血餘一握並燒為炭分二服溫酒調併進二服仰卧霎時或用小絹針於兒脚心刺三七刺用鹽少許擦刺處即時順生母子俱活

妙聖散臨產腰疼方可服之

欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四

延胡索 沒藥 白礬 白芷

薑黃 當歸 桂心 各等分

右為末臨產陣痛時燒鋒刃鉄 牛頭是也 令通赤滓酒調

下三錢服一二盃立產

乳珠丹

右用乳香研細以猪心血為圓梧桐子大朱砂為衣日乾每服一粒如催生冷酒化下良久未下再服一粒若大段難產以蓮葉心蒂七箇水二盞煎至一盞



放溫化下一粒良久未下可再服之效驗如神無有不下者如胞漿先下惡水來多胎乾不得卧時須先與四物湯及通真圓補養其血氣方見次更濃煎葱湯放冷令坐婆洗產戶須是欸曲洗令氣上下通暢後更用酥調滑石末塗產戶裏次服前催生藥則萬全矣如胎死不下者用黑豆三合好醋半升煮令豆爛取汁一盞放溫化下藥一粒須臾下矣萬一未下亦可再服如胎下胞衣不下者服此亦便下若胎橫逆不順即先服神應黑散再服此藥復以催之合藥時要五月五日午時極妙或七月七日三月三日及初上辰日亦可

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十四

神驗散

產婦坐草時取路傍舊草馬一隻用鼻絡小耳繩燒灰溫酒調服如得左足者男右足者女覆者兒死側者有驚自然理也似非切要之藥催生極驗如意散臨產腰疼方可服之

人參為末乳香各一錢辰砂二錢右同研臨產時急用雞子清一箇調藥末再生薑自然汁調開冷服如橫生倒生即時端順子母平善一字神散治子死胎不下胞破不生此方累效救人幾萬數鬼白不以多少黃色者去毛碾為末及細如粉不用羅以手指撚之每服二錢用無灰酒一盞同煎至八分通口服立生如神

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十四

療難產日久氣力乏不能生兼惡露出盡胞乾不產

右用赤小豆二升以水九升煮熟取汁入炙了明阿膠一兩同煎少時一服五合未效再服不過三四服即產此古方用之極驗

又方救產難經日不生

右用雲母粉半兩溫酒調服入口當產不順者即產神效

治橫生逆產神方手足先出或子死腹中



右以伏龍肝細研每服一錢酒調服兒頭戴出妙更用搽產母臍中亦效或用兔絲子末車前子末酒調服一方取其父名書其足上即順生

治死胎不下方其證指甲青舌青脹悶甚者口中極臭先以平胃散一貼作兩服每服酒水各一盞同煎至一盞却投朴硝半兩研細再煎三五沸傾出候微溫服盡其胎即化血水而下

方見大方科脾胃類

治產難胞衣不出方兒死腹中欲絕半夏白欬各一兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

為末酒服一錢若產難只一服橫生二服倒生三服兒死四服或加代赭瞿麥各二兩為佳

單方治難產日月未至而痛如欲產者

右以知母二兩為末蜜圓雞頭大溫酒化一圓服

如聖方治難產胎衣不下及生產數日併死胎不下者效

右用草麻子一兩去殼雄黃二錢研細成膏塗母右腳心纔下即速洗去不洗則腸出用此膏子塗頂上

腸自入如聖之妙

奪命丹治產訖血流入胎衣中為血所漲不得下治之稍緩脹滿腹中上衝心脅疼痛喘急服此以逐去衣中之血血散脹消胎衣自下

附子 半兩炮去皮臍 牡丹皮 一兩乾漆一分搗碎炒煙盡

右為末酸醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥圓如梧子大溫酒不拘時下五七圓

牛膝湯治產兒已出胞衣不下臍腹堅脹急痛甚及子死腹中不得出者

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

牛膝 酒浸 瞿麥 各一兩 滑石 二兩 赤小豆 二兩合

半 當歸 酒浸 木通 各一兩 葵子 一兩錢

半

右剉散每服三錢水二盞煎不拘時服

花蘆石散治胞衣不下及惡露不行服之神效

方見太方科失

灸法治橫生逆產諸藥不效灸右腳小指尖頭三壯艾



壯如小麥大下火立產		方中戒忌不可便飲酒及多以酒調藥服之酒散五臟		四肢致成百病凡一切藥止用水煎為上一兩服後		方可		產後		黑神散治產後惡露不盡或胎衣不下攻衝心腹胸膈		痞滿或臍腹堅脹撮痛及神昏血暈眼花口噤產後瘀		血諸疾 又名烏金散		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四		熟地黃 生亦可用 蒲黃		當歸		乾薑 炮		甘草 半兩		黑豆 半升 炒去		芍藥		桂心 皮		右為末每服二錢酒半盞童便半盞同煎調下或去		蒲黃用綿附量虛實用之		黑龍丹治產後一切血疾產難胞衣不下危急惡疾垂		死者但灌藥得下無不全活神驗不可言因驚敗血上		衝心痛頭痛欲死大效	

當歸		五靈脂		川芎		良薑		熟地黃 各一兩		右細剉以沙合盛赤石脂泔縫紙筋鹽泥固濟炭火		十斤煨令通赤去火候冷取開看成黑槽色取出細		研却入后藥 百草霜 五兩		硫黃		乳香 各一錢半		琥珀		花藥石 各一錢		右細研與前藥再研和勻米醋煮麪糊為圓如彈子		大每服一圓炭火燒令通赤投於生薑自然汁與童		子小便入酒漉出研細用其酒調下		坤順丹治婦人胎前產後諸般病症		益母草 帶子 三兩		南木香		紫蘇 莖帶子		阿膠 蛤粉炒		人參		雲南琥珀 栝子仁煮去栝子仁 不用各二錢五分		川牛膝 各二錢五分		砂仁 炒		甘草 生用 各一		北香附 童便 炒		白朮 去皮 炒		白芍		沉香 要沉水者 洗		烏藥		全當歸 酒洗		川芎 薑汁洗		生地 薑汁洗		忌見火	



熟地

薑汁洗

條芩

酒洗

橘紅

鹽水洗各五錢

右共為細末和勻煉蜜為圓蜜煉滴水成珠為度每圓二錢五分用蠟為殼包之以全其藥味所用藥引開後

嗽喘杏仁桑白皮湯下 嘔吐淡薑湯下 泄瀉米

湯下 不思飲食身體羸瘦手足厥冷骨節酸軟白

滾水下 遍身虛腫赤小豆湯下 氣疼木香湯下

氣血虛麥冬歸身湯下 遍身脹痛溫米湯下

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十四

黃腫燈心木通湯下 乳腫蒲公英金銀花湯下

兩脇疼艾湯下 氣衰血敗經水不調當歸地黃湯

下 氣喘咳嗽口吐酸水遍身虛腫兩脇疼痛動止

無力黃酒下 眼暗血暈口渴煩躁狂言亂語不省

人事二便不通薄荷湯下或童便下 大便後下紅

黃連生地黃湯下赤白痢疾連翹湯下如久痢滑肛

訶子肉豆蔻湯下 大便秘結陳皮湯下 小便不

利木通燈心湯下 赤白帶阿膠艾湯下 經脉閉

桃仁紅花歸尾湯下 行經時身腰疼痛防風羌活

湯下 求孕歸身白朮白芍湯下 胎前疾病童便

陳酒下 胎動下血阿膠湯下 胎前臍腹刺痛胎

動不安下血不止糯米湯下 臨產五六日前又服

一二圓免產後諸疾或水或酒下 橫逆難產葵子

湯下 包衣不下童便下 橫生子死腹中炒鹽湯

下 產後惡血不盡臍腹刺痛童便下 產後不能

飲食山查麥芽湯下 產後閉結郁李仁湯下 產

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十四

後惡血上衝心胸疼悶結瘀血塊臍腹刺痛發寒熱

自汗不止薄荷紫蘇湯合童便陳酒下

自汗不止禁
用薄荷紫蘇

產後中風牙關緊閉半身不遂失音不語童便酒

下 產後血崩漏下糯米湯下或荊芥蒲黃湯下

產後血暈不省人事用當歸湯合童便下 產後調

理去瘀生新木香當歸香附湯下

以上所用藥引一味者用六分如三四味亦止用六

分用水一茶鍾煎至六七分外加重童便酒二三和



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

開丹藥服之用藥之後忌大葷氣惱生冷		參蘇飲治婦人產後血暈不省人事面黑氣喘		人參 三錢或五錢 蘇木 劈碎三錢		右二味煎濃入童便一小鍾攪入藥內攪開產婦口灌之即甦		加減四物湯治因產勞傷血氣蓋血屬陰氣屬陽血氣兩傷陰陽不和以致乍寒乍熱		當歸 人參 芍藥 川芎		乾薑 炮各一兩 甘草 四錢		右剉散每服四錢水一盞生姜三片煎熱服不拘時候		五苓散治產後煩渴潮熱枇杷葉去白毛蜜塗炙麥門冬二十粒去心煎湯服 方見大方傷暑類		黃耆金損湯治產後血虛自汗痰嗽寒熱口淡微泄服燥劑不得者宜服 方見大方科虛損類		竹葉防風湯治產後傷風發熱面赤喘而頭痛	

淡竹葉 半把 防風 人參 桂枝		苦梗 甘草 各半兩 葛根 一兩半		右剉散每服三錢生姜三片紅棗一枚煎溫服使汗出頸項強用附子炮去皮臍剉如豆大抄一錢同煎嘔加半夏少許		陽旦湯治產後傷風十數日不解頭微痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出		桂枝 芍藥 各一兩半 甘草 炙 黃芩 一兩		右剉散每服三錢水一盞生姜三片棗子一枚煎不拘時候溫服自汗多加炮熟附子一枚渴者去桂加括蕒一兩半下痢去芍藥加乾姜一兩半心下悸去芍藥加茯苓二兩虛勞裏熱者正藥主之煎時入少膠飴一匙服脉浮緊無汗發熱者勿與服		生乾地黄湯治產後惡露方下忽然斷絕晝日明了暮則譫語寒熱往來如見鬼狀此由熱入血室不即治之諸變不測	



北柴胡	去蘆 二兩	半夏	溫洗	條參	去蘆	黃芩	各一兩
粉草	五錢	生乾地黄	二兩				
右剉散每服四錢水一盞半生姜三片紅棗一枚煎服未效再服四物湯加北柴胡有痰加半夏							
神效白散子治產后瘀血結滯發為潮熱心胸如火煩燥口乾諸藥不效							
大川烏	去皮	南星	半夏	白附子	各一兩		
羌活	去蘆	黃芩	各五錢				
右生用剉散每服三錢生姜五片水一盞半煎服效							
大調經散治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未平所致							
大豆	炒去皮 一兩半	茯神	一兩	真琥珀	一錢		
右為末濃煎烏豆紫蘇湯下喘急煩滿小便不利者亦效							
枳朮湯治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣							

枳實	麩炒去穢 一兩半	白朮	三兩				
右剉散每服四錢水一盞半煎溫服腹中軟即當散也							
奪魄散治產後虛腫喘促利小便則愈							
生薑	三兩 取汁	半夏	湯洗 去滑	白麩			
右用姜汁搜麩裏半夏為七餅手炙焦熟為末熟水調一錢小便利為效							
大調經散治產後因驚敗血上干於心乍見鬼神言語顛倒昏悶發狂煩燥卧起不安							
沒藥	別研	琥珀	別研	桂心		赤芍藥	
當歸	各一兩	細辛	去葉	麝香	半錢		
右為末每服半匕加上龍腦少許生薑自然汁溫酒少許調勻服服後三藥亦效							
大聖散加朱砂酸棗仁湯下效							
蘇合香圓量便調服即醒							



妙香散生乾地黃當歸湯調立效		方見大方科心恙方
又大聖散治產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪搏		
之則變 痙 口噤不開背強而直如發癰狀搖頭馬鳴身		
反折須臾一發氣息即絕宜速斡開口此藥灌之稍緩		
即汗出如雨手拭不及不可治宜加大川烏細辛防風		
嫩黃耆	此方見后	
大豆紫湯治產後百病或中風痙 痙 背強口噤有時煩		
熱		
欽定四庫全書		世醫得效方卷十四
獨活	一兩半	大豆半升黃酒二升
右以酒先浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦煙出急		
投酒中密封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈		
日數十服此湯能去風消血結在妊娠折傷胎死腹		
中服此差		
獨活寄生湯治產後血虛生風手足抽掣筋脉攣急時		
發譫語手足不遂或因勞役太早風邪乘間而入服之		
立效後再服加味壽星圓		方見大方科腰痛及風科通治方

濟老上丹治產後所下過多虛極生風唇青肉冷汗出		
目瞑命在須臾却不可用正風藥亟投此		
乳香	硫黃	五靈脂
石		陳皮
卷柏		桑寄生
各等分		阿膠
右將前四味同研勻石器內微火炒勿令焦了再細		
研後入餘藥為末用生地黃汁圓梧子大溫酒或當		
歸酒下二十圓食前服		
麻黃根散治產後虛汗不止		
當歸	黃耆	麻黃根
人參	粉草	牡蠣
各等分		末為
右剉散每服四錢水一盞煎溫服不拘時候		
立效方凡產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也		
破雞子三枚吞之便醒若未醒可與童子小便一升		
甚驗丈夫小便亦得切不得用病人者		又若久不
識人或時復發者此為有風因產血氣暴虛風行脉		
欽定四庫全書		世醫得效方卷十四

中故也若產後去血多者又增此疾與雞子不醒者可急作竹瀝汁一服五合須臾不定再與五合頻與三五服差	七珍散治產後虛弱敗血停積上閉心竅舌強不語	人參 石菖蒲 生乾地黄 川芎 各一兩	細辛 一錢 防風 朱砂 別研一各半兩	右為末每服一錢薄荷湯調下	解語散治產後閉目不語白礬一錢熟水調服	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四	聖功散療產後中風口禁牙關緊急手足痲癱	舉卿 古拜 即荊芥也	右畧焙為末每服二大錢酒調下有神聖之功或用荊芥加當歸煎頓服甚則煎一盆濃湯坐病者其中先熏后淋沃名荊芥湯角弓反張以豆淋酒下尤快交加散治產後中風	生地黄 五兩研取汁	生薑 五兩研取汁	右交互以汁浸滓一夕次日各炒黃漬盡為度乾為

末酒調服平日腹痛酒下三錢產後猶不可缺女人榮衛不通經脉不調腹痛如撮氣多血少結聚為瘕及血風口禁項強頭痛壯熱運悶並皆治之用少酒尤速產后血衄血悶築心眼倒欲亡者如上湯引服噤甚灌之立效	趁痛散治產後身體疼痛不能轉側手足不能動搖	當歸 黃耆 牛膝 肉桂	白朮 各半兩 甘草 一分 獨活 二分	右剉散每服五錢水五盞煎濾作二服或入薤白二箇生薑三片 此證產后百節開張血脉流走遇氣弱則經絡分肉之間血多留滯累月不散則骨節不利筋脉急引故腰背不能轉側手足不能動搖身弱頭痛若以傷寒治之則汗出而筋脉搖動手足厥冷變生他疾服此可默除之	又方再加桃仁木瓜煎治產後餘血不盡流入腰脚疼痛至甚 即加味五積散方見后	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

五香連翹湯除大黃入竹瀝少許煎治惡露方行忽然斷絕腰痛兩股如錐刀刺痛皮膚或有堅赤腫處恐為癰瘍急服此散效	方見瘡腫科癰瘍類
抵聖湯治產後腹脹滿悶嘔吐不定	
赤芍藥 半夏 澤蘭葉 人參	
陳皮 各一分 甘草 一錢	
右剉散每服一劑用水一椀生薑焙乾半兩煎至半碗分三服熱服	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四	
產後嘔逆不止方	
橘紅 一兩 半夏麴 甘草 各半兩 藿香 三兩	
右剉散每服二錢水一盞生薑三片煎不拘時溫服	
產後霍亂三方渴而飲水者五苓散不飲水者理中圓	
虛冷者加附子來復丹亦效	方見大方科傷暑及油瀉痢冷類
芎附散治產後敗血作梗頭痛諸不效者	
大附子一枚醃醋一椀用火四面炙透蘸醋令盡去	
皮臍川芎一兩同為末每服二錢茶清調下虛人最	

效	
川芎茶調散治產後虛熱頭痛	方見大方科頭痛類
芎烏散治產後挾氣頭痛不可忍	
右用大川芎天台烏藥皮為末秤錘燒淬酒調下	
二母散治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服如傷風痰喘却以尋常傷風藥治之	
白芍 貝母 白茯苓 人參 各一	
桃仁 杏仁 並生去皮尖各一分	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四	
右剉散每服三錢水一盞半煎不以時溫服如覺腹痛併服之立有神效	
旋覆花湯治產後血風感寒暑濕喘促痰涎壅盛咳嗽坐卧不寧	
旋覆花 赤芍藥 前胡 半夏麴	
荊芥穗 五味子 茯苓 甘草 炙	
麻黃 杏仁 各一分	
右剉散每服四錢姜五片棗一枚煎食前溫服	



人參思散治產后血入于肺面黑發喘欲死名孤陽絕陰		人參 各一兩 別為末 思木 二兩		右用水二碗煮取一大椀去滓調參末隨時加減服		大發煮芎湯治產后榮血暴絕氣急喘促 方見前 即佛手散		四物湯治產後血乾痞悶心煩去地黃加人參烏梅 方見		人參散治產后惡露淋瀝不絕心悶短氣四肢之弱不		思飲食頭目昏重五心煩熱面黃體瘦		牡蠣 川芎 熟地黃 白茯苓		龍骨 各一兩 續斷 當歸 炒 艾葉 酒炒		人參 五味子 地榆 各半兩 甘草 一分		右剉散每服二錢生姜三片棗一个煎食前溫服		正氣子散治產后臍下痛名兒枕痛不可忍此神藥也		延胡索 桂心 各半兩 當歸 一兩		右為末每服二錢熱酒調下或用童便溫煖調尤快	

又方五靈脂慢火炒為末溫酒服二錢		千金丸治產後惡露不快腰痛小便如刺時作寒熱頭痛不思飲食及瘀血月水不調黃瘦不思飲食久有悉治之		五靈脂 月淫去召焙 乾秤炒為末 員蒲黃末		右以好米醋調五靈脂末慢火熬成膏子次以蒲黃末搜和圓如櫻桃大每服一丸水與童便各半盞煎令化溫服少頃再一服惡露即下久有瘀血成塊月信不利者並用酒磨下及治心腹痛欲死百藥不效		羊肉湯療虛及產婦腹中痛虛眩不去支持兩脇當臍急痛氣上衝前后相引痛治之如神		精羊肉 四兩 當歸 川芎 各半兩 生姜 一兩		右剉散以水十盞煎三盞掠去沫去滓分四服空心熱服一日來日再作二日滓合為一日煎當一劑服		經效方療產后血氣脇肋脹滿		當歸 八錢 芍藥 苦梗 檳榔	



枳殼 錢各四	桂心	青木香	柴胡 錢各三
右剉散水二升煎取八合空心分溫二服			
人參當歸散治產後陰虛生內熱煩悶不安			
人參	當歸 去尾	麥門冬 去心	乾地黄
桂心 各一兩	芍藥 二兩		
右剉散每服四錢水二盞先將粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去米葉入藥併棗三枚煎食前服地黄用生乾者虛甚則用熟者			
欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四			
麻黃散治產後虛煩必效			
蒲黃不以多少紙上炒每一錢東流水調不拘時服			
地黄湯治產後虛渴不止少氣脚弱眼昏頭眩飲食无味			
熟乾地黄 一人參三兩	麥門冬 去心	栝樓根 四兩	
甘草 半兩			
右剉散每服四錢水二盞糯米一撮生姜三片棗三枚煎食前服			

當歸芍藥散血渴 方見前			
草果飲子治產後瘧疾寒熱相半者或多熱者			
半夏 湯洗			
川芎	陳皮	白芷 各二錢	青皮 去白
良姜	紫思 各一錢	乾葛 四錢	
右剉散每服三錢生姜三片棗二枚水一盞半煎當發日早連進三服死不安者			
生熟飲子治產後瘧疾多寒者			
欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四			
肉豆蔻	草果仁	厚朴 生去皮	半夏
陳皮	甘草	大棗 去核	生姜 各等分
右剉散和勻一半生一半以溫紙裹煨令香熟去紙與生者和勻每一服主水二盞煎食前一服食后一服			
床子湯治產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色痿黃名蓐勞			
猪腎 一雙去脂膜四破	香豉 或無用	葱白	



粳米				當歸	芍藥	各二兩
右剉散勻作兩劑用水三升煮取一十碗分三服或用人參無芍藥						
人參驚甲散治產後蓐勞皆由在產內未滿百日體中虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成蓐勞其狀虛弱乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉重在牀服此大效						
人參		桂心	桑寄生	當歸	去尾	
欽定四庫全書  世醫得效方 卷十四						
白茯苓		白芍藥	桃仁	去皮尖		
麥門冬		甘草	各半兩		續斷 一分	
驚甲		黃耆	各一兩		牛膝 三分	
右為末每服先以猪腎一對去脂膜用水二大盞生姜半分棗三枚煎至一盞去猪腎姜棗入藥末二錢葱三寸烏梅一個荊芥五穗煎空心晚食前溫服神妙						
人參散治產後虛羸脾胃乏弱四肢無力全不思飲食						

心腹脹滿	
黃耆	人參
附子	各一兩
白朮	當歸
白茯苓	甘草
木香	桂心
陳皮	去白
良薑	阿黎勒皮
各半兩	
右剉散每服四錢生薑三片棗一枚煎不以時溫服	
羚羊散治產後風虛勞後羸瘦不思飲食四肢疼痛	
黃耆	白朮
木香	羚羊角屑
欽定四庫全書	
世醫得效方	
卷十四	
人參	當歸
去尾	桂心
白芍藥	甘草
一分	
川芎	白茯苓
各半	
右剉散每服三錢生薑三片紅棗二枚煎不以時溫服	
小調經散產後性理鬱發喘急桑白皮杏仁煎湯調下	
見前	
丁香散治產後心煩咳逆不止	
丁香	白豆蔻仁
各半兩	伏龍肝
一兩	

右為末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里再服

石蓮散治咳逆嘔吐心怔目暈可思飲食

石蓮肉炒兩半白茯苓一兩丁香半兩

右為末每服三錢米飲調不以時服

固經圓治產後血崩不止或因殮極酸鹹物過度

艾葉赤石脂煨補骨脂

木賊各半兩附子一個

欽定四庫全書世醫得效方卷十四

右為末陳米飲圓梧子大食前溫酒下二十圓米飲

亦可蓋此證非輕病況產后有此是謂重傷恐不止

鹹酸不節而致多因驚憂恚怒臟氣不平或產后服

斷血藥太早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中此藥

自難責效不若大料煮芎藭湯加芍藥候定續次隨

證諸藥治不為得小腹滿痛肝經已壞難治局方大

杏仁酸醋煮附子依等分入效

加味五積散治產後因食動傷腹痛至甚水穀不化洞

泄腸鳴除麻黃加高良薑熟綿附生薑烏梅紅棗煎後見方

四君子湯治產後腹微疼泄瀉不止烏梅陳米煎湯調

服方見小方科通治類

的奇散治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉

分過則愈雖洞泄不禁下青黑色物亦驗

大荆芥四五穗於盞內然火燒成灰不得犯油火入

麝香少許研沸湯一二呷調下此藥雖微能愈大病

欽定四庫全書世醫得效方卷十四

勿忽

黃連阿膠圓治產後熱證下痢全赤煩渴發熱小腑不

利每服三十圓陳米烏梅湯下方見大方科咳嗽類

理中湯治產後虛證下痢純白腹痛裏急外重手足冷

加木香煨肉豆蔻每服三錢陳米塩烏梅煎空心服方見

大方科泄瀉類

真人養臟湯產後虛弱冷熱不調下痢赤白或有膿血

裏急後重臍腹疼痛日夜無度宜服方見大方科泄瀉類

阿膠枳殼圓治產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足大便秘澀

阿膠 蚌粉炒 枳殼 各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大別研滑石為衣溫水下二十圓半日未通再服又一方蜜兌法 見大方科秘澀類

又方用葱涎調好茶為圓復以茶吞下必通或用葱白頭十數莖濃煎點茶連葱嚼服神效不動真氣

活血養臟湯去熟地黃用生地黃加青皮去穰煎服效

欽定四庫全書 世醫得效方卷十四

生液方治產後有三種疾鬱胃則多汗汗則大便秘難

於用藥以此方效 方見大方科秘澀類

木通散治產後小便不通

木通 大麻仁 葵子 滑石

檳榔 枳實 甘草 各半兩

右剉散每服三錢水一盞半煎溫服不拘時候

灸法治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒緣未產之

前內積冷氣遂致產時尿胞運功不順用塩於產婦

臍中填可與臍平却用葱白剥去麤皮拾餘根作一束切作一指厚安塩上用大艾炷滿葱餅子大小以火灸之覺熱氣直入腹內即時便通神驗不可具述

茅根湯治產后諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之

白茅根 四兩 瞿麥穗 白茯苓 各二兩 葵子

人參 各一兩 蒲黃 桃膠 滑石

甘草 各半兩 紫貝 五個 石首魚頭中石 十個

右剉散每服四大錢生姜三片燈心二十莖煎溫服

欽定四庫全書 世醫得效方卷十四

或為末木通煎湯調下二錢如氣壅木通橘皮煎湯

調下

桑螵蛸散治產後小便數及遺尿

桑螵蛸 十五個 鹿茸 酥炙 黃耆 各一兩半 牡蠣 煨

人參 去蘆 厚朴 去麤皮 赤石脂 各一兩

右為末空心粥飲調下二錢一方無厚朴有甘草

治陰瘡與男子妬精瘡略同

右用黃丹枯白礬扁蓄蘖本各一兩硫黃半兩白蛇



皮一條燒灰荊芥蛇床子各半兩研為末別以荊芥蛇床子煎湯溫洗軟帛挹乾清油調塗濕則乾搽	又方青黛黃丹冰粉五倍子肉鋪上拭肉巾燒灰為末用小絹巾入陰中挹乾如乾用荊芥薄荷柏葉煎水洗再挹乾清油調藥塗上	又方先用黃芩海桐皮白礬韭菜根煎湯洗後用敗鼓皮燒存性細研入輕粉在內刮下鷄腸上膏調塗瘡上如蟲喫入陰內用雞子一箇煮熟去殼塗藥末於	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四	上綿子兜入陰中向火灸患處得痒即蟲行若身微作寒服霍香正氣散二三服	又方真平胃散加貫衆末每用二錢熟煮猪肝納藥入陰戶內數日可安	治疳瘡月后便行房致成湛濁伏流陰道疳瘡遂生瘡瘡無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却後服藥	赤石脂	龍骨	黑牽牛	免絲子
									炒	酒浸

黃耆	鹽水灸	沙苑蒺藜	炒	右為末蜜圓梧子大每二十圓燕窠蒸酒澄上清者吞下	治陰中生瘡如蟲咬痛可生搗桃葉綿裹納陰中日三四易	黃芩散治陰門生瘡	右用黃芩當歸川芎白礬黃連剉散煮水熏洗即安	治陰門腫方	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四	右以甘菊苗研爛百沸湯淋洗熏后洗	月經不行說	二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲魯鈍通行則陰陽和合始能生子行年十四歲當時二十歲不行命如風燭朝不保暮有病發則死間有不死百中無一致令一生多病未嘗一日安裕然有四李行亦可又有一年數次者亦不甚佳或一生不循正道而行者晚年有僻疾則難治

洗心散方見前治陰中生一物所大牽引腰腹膨痛至甚了減飲食皆因多服熱藥及煎燂或犯非理房事兼意淫不遂名陰挺每服二錢生地黃湯調仍用金毛狗五倍子白礬水楊根魚腥草山黃連各一兩重為散分作四服以有觥瓦罐煎熟預以銀錫作一長小筒下透罐觥上貫挺端慢慢熏之以挺收入為度其或血氣不足熏過後羸瘦不復常者宜服

人參 赤芍藥 川芎 菖蒲炒各五兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

當歸 二兩 熟地黃 五兩 烏梅肉 三兩

右為末蜜搜杵數千下圓如梧子大每服五十圓至一百圓溫酒或米湯下食前服

單方治產婦腹脹痛不可忍煮鼠粘根為飲一服愈

捷徑方治用毒藥攻胎藥毒衝心外證牙關緊急口不能言兩手強直握拳頭低自汗身微熱外證與中風相似但其脉浮而較十死一生醫多不識若作中風治之必死无疑用白扁豆二兩生為末新汲水調下即效

內灸散治婦人產前產後一切血疾血崩虛憊腹脇疼痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積塊硬刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅脹瀝血腰疼口吐青水頻產血衰顏色青黃勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血運血瘕時發疼痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷惡露不乾體虛多汗手足逆冷並宜服之

藿香葉 丁香皮 熟地黃洗焙 肉桂去麤皮各

半一兩 甘草炙赤 山藥 當歸洗去蘆

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十四

白朮 白芷各八兩 藁本去蘆剉 乾薑炮

川芎 黃耆去黃各二兩 木香一兩 陳皮去白四兩

白芍藥十兩 茴香一兩半

右剉散每服三錢水一大盞入生姜五艾一團同煎至八分空心食前熱服為末溫酒調下亦得如產後下血過多加蒲黃煎服惡露不快加當歸紅花煎服水瀉加肉豆蔻末煎服嘔吐加藿香生姜煎上熱下冷加荊芥煎但是腹中虛冷血氣不和並宜服產後



每日一服則百病不生丈夫虛冷氣刺心腹疼痛尤宜服之

下乳汁

奇效方麥門冬不拘多少去心焙為末酒磨真犀角約一錢同麥門冬末二錢溫酒調不過二服便下不以時候

漏蘆散治乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯乳內脹痛留蓄邪毒或作癰腫服此自然內消乳汁通行

欽定四庫全書



世醫得效方卷十四

漏蘆 二兩半

蛇蛻 炙十條

瓜萋 十个

急火燒存性

右為末每服二錢溫酒調不以時服仍喫熱羹湯助之

成鍊鍾乳粉治乳婦氣少血衰脉澁不行乳汁絕少

右一味研細每服抄二錢濃煎漏蘆湯調下

母猪蹄湯治如前

母猪蹄 一隻

治如食法

通草

四兩

右以水一斗浸煮得四五升取汁飲不下更作服了

用梳頭木梳於乳上梳下效

青來膏治乳硬作痛

嫩桑葉左採研細米飲調攤紙花貼病處此證四十已下可治五十已上不可治治之則死不治則自得

欽定四庫全書



世醫得效方卷十四

世醫得效方卷十四



欽定四庫全書

子部
世醫得效方卷十五

詳校官太醫院醫士 臣 舒岱

編修臣 倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣 倉聖脈

校對官助教 臣 羅萬選

臚錄監生 臣 李玠

欽定四庫全書

世醫得效方卷十五

元 危亦林 撰

產科兼婦人雜病科

通治

四物湯

隨證加味宜酌量入

當歸

川芎

熟地黄

洗焙
酒炒

白芍藥

各等
分

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前熱

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十五

服為末服亦可若平常血氣不調及常服只用本方

春加當歸夏加芍藥秋加川芎冬加地黄各一兩半

日二三服 妊婦作惡生寒面青不思飲食憔悴陳

皮枳殼白朮茯苓甘草 產后敗血築心地骨皮芍

藥 潮熱黃芩地骨皮柴胡 咳嗽桑白皮半夏生

薑人參甘草北五味子地骨皮 損孕下血不止頭

痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致黃芩荊芥生地黃生薑

赤芍藥 虛寒潮熱柴胡地骨皮白朮茯苓甘草秦

芡知母黃芩麥芽貝母人參烏梅棗子 心腹脹滿
枳殼青皮 虛汗麻黃根 產後潮熱北柴胡白朮
甘草牡丹皮地骨皮有熱黃芩汗加浮麥 腸風下
血槐角槐花枳殼荊芥黃芩大腹皮紅內消地榆石
楠皮白雞冠花為散煎一半為末空心鹽湯舊酒調
下 鼻衄吐紅竹青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花
紅棗飛羅麪白茅根蚌粉 妳癰連翹茨菰子紅內
消白芷菰片荊芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏蘆生地
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

黃 血風兩脇築疼或盤腸成塊大黃華櫟乳香
胎動漏下不止黃耆側柏阿膠甘草續斷平常經血
淋瀝不斷或多或少或赤或白非時漏下可多服有
效 月水不通野苧根牛膝紅花蘇木舊酒水同煎
臨產小腹緊痛紅花滑石甘草燈心葵子 閉經枳
殼大黃荊芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔
子車前子 安胎及胎漏下血阿膠大艾甘草蒲黃
炒過 產後腹痛血塊攻腸大艾沒藥好酒 產後

病眼北細辛荊芥羌活甘草菊花木賊石決明草決
明 女人赤眼頭風疾薄荷清茶 赤眼生風防風
黃芩 產後浮腫氣急腹大喉中水雞聲牡丹皮荊
芥白朮桑白皮赤小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生
薑葱白薄荷 月水不調血崩或多少或前後嘔逆
心膨陳艾黃耆 血弱生風四肢痺疼行步艱難乳
香人參沒藥麝香甘草五靈脂羌活獨活防風荊芥
地龍南星白附子澤蘭為末蜜圓木瓜鹽湯下 血
氣膨脹甘草木香枳殼馬兜鈴葶藶紫蘇藿香地黃
空心服 補血住崩百草霜敗棕灰月綿灰蒲黃炒
過龍骨白薑 血成片地黃藕節 黑血片人參白
朮 白血片龍骨 青黃木瓜 五色生麝香好酒
鮮紅溫酒鹽湯 風瘡赤腫荊芥牛蒡子何首烏甘
草防風羌活地黃鹽酒 帶下肉桂蒲黃百草霜甘
草黑荳白朮玄胡索白薑龍骨空心鹽酒 血寒甘
草烏梅柴胡桃柳枝 感風勞嗽欵花知母阿膠半



夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏仁柴胡姜錢訶子烏梅
月經久閉肉桂甘草黃耆姜錢棗子木通紅花大
便下血四肢寒膨脹乃腸胃有風槐花枳殼漏蘆荊
芥木香白雞冠花木通紅內消紫草石榴皮陳皮黃
芩青皮甘草白茅根槐角 虛瀉人參川芎白芷蒲
黃炒阿膠白朮茺莢續斷乾薑黑附子肉桂黃耆赤
石脂甘草蜜丸鹽梅湯下 白帶用龍骨酒 胎前
產後痢後風乳香龍骨茺莢木香肉桂蒼朮牡丹皮
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

白薇人參甘草澤蘭大椒茴香煉蜜為圓木瓜酒下
亦治帶下 赤白痢陳米飲 心腹膨炒薑酒 血
氣艾醋湯 渾泉勞倦為末炒薑酒陳青蒿鹽和調
下 虛證四肢黃甘草牡丹皮澤蘭白薇蒼朮桂心
茴香蜜丸鹽湯溫酒下 嘔逆飲食不入加白朮丁
香甘草人參縮砂益智仁胡椒 經行腹痛腰背痛
薑薑牛膝紅花吳茺莢藺甘草銀器燈心熱服
虛渴人參乾葛烏梅瓜萋根 受胎小腸氣痛木香

銀器 胎前嗽枳殼甘草欵花知母馬兜鈴半夏木
通葶藶人參苦梗麥門冬 腳腫大腹皮赤小豆茯苓
苓皮生薑皮 產後不語失音訶子人參砂蜜百藥
煎 陰陽交合經脉行赤石脂黃耆肉桂百草霜敗
棕灰肉苳蔻當歸木香龍骨白朮茯苓地榆藕節
胎氣衝肝腰脚痺行步艱難枳殼甘草木通連 荊
芥地黃羌活獨活山梔子燈心空服 氣築小腹
痛玄胡索煎效 常服加茺莢陽臟少使陰臟多用
義術湯 隨證加味宜酌量入
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

當歸 去尾 川芎 義術 煨 甘草
楊芍藥 熟地黃 酒蒸 茴香 白芷
右為末每服二錢鹽酒調下 月經不調銀器燈心
安胎黃耆生地黃 補虛調氣生薑紅棗 遍身虛
腫當歸 小便不通滑石末 心虛發狂朱砂研調
敗血衝心腹痛如刀刺燒秤錘紅焯酒不退五靈脂
酒 血閉身疼炒薑酒 吐酸水丁香七粒煎湯



血風上攻眼目浮腫荊芥 小腹痛木瓜 渾身浮腫薑湯或蔥湯 胃惡藿香 頭面腫赤荳荊芥湯 下血不止木香湯 冷嗽桑白皮乾柿 頭痛川芎 細辛 血風熱潮生薑紅棗 虛汗麻黃根吐不止 陳青蒿 血風腰疼雲臺子搥碎 女人血結不通 手發攣急不知苦薺菜一握順流水柳汁 手足痺 樟柳根浸酒 血海虛冷大艾 腹脹不消芝麻一 合炒薑酒 月水不勻當歸浸酒 女人血氣成塊

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十五

築心銀子燈心 血崩赤白帶真龍骨末好紅酒調

血風中心狂言亂語渾身壯熱桃柳枝七寸 血刺

成塊不散菴蘭 女人癖氣膈氣炒茴香酒 婦人

不問虛熱傷風血氣潮熱憎寒一切百病先以參服

隨證湯引投之服以他藥調理無不應驗 冷嗽猪

血 心燥猪肝酒 催生順流子滑石禹餘糧榆白

皮坯子乳香葵子酸車草汁煎湯 黃柞葉垂下者

胎衣不下再加莪朮地黃竹青 行血菴蘭生地黃

紅花蘓木陳艾減揚芍藥加赤芍藥梢 加味五積散

厚朴

薑汁炒 去麤皮

半夏

洗

楊芍藥

枳殼

炒 去穢

木香

肉桂 各一兩

陳皮

白薑

三錢 兩

蒼朮

六兩 米泔浸炒

桔梗

香附子

炒 去毛

茴香

炒

粉草

人參 去芦

茯苓

去皮

川芎

當歸

去尾

川白芷

各一兩

右剉散生薑木瓜入鹽煎服 陰證傷寒生薑附子

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十五

血脉不勻紫蘇 氣嗽烏梅姜錢 勻經棗子姜錢

補益血海蘇鹽 產後生薑醋炒陳艾 胃冷不納

食陳皮縮砂 赤白帶陳米 冷氣疾木香茱萸

心燥背筋急頭暈腰脚痠生乾地黃當歸 脾虛蘇

葉粉草 月中被驚或因爭觸心頭結塊五膈五噎

茴香棗子 口苦舌乾吞酸噫氣此為胃冷生薑鹽

腰痛桃仁木瓜杜仲川續斷 身疼秦艽 諸虛脾

胃不和羸瘦冷氣蘇鹽 冷瀉炒過生薑烏梅肉荳



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

寇陳米

芎歸湯治產前產後腹痛體熱脅疼及諸疾纔差了未進藥即先服此能除諸疾逐敗血生新血

川芎 二兩 川當歸 三兩

右剉散每服三錢水一盞酒二分煎溫服為末亦可將產先安排兩服煎產了速進之三日內日二服三日外日一服 諸證失血傷胎去血產後去血崩中去血金瘡去血拔牙去血不止及一切去血過多心

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉治若

產後眩暈宜加楊芍藥 產後腹痛不可忍者加桂

心酒與童子小便合煎立效 臨月服之則縮胎易

產兼治產後諸疾 虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱

吸吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服用精

豬肉一兩薑十片水二盞煎溫服 婦人室女心腹

疝痛經脈不勻水煎 妊婦胎氣不安產後諸疾酒

煎 婦人血氣上喘下腫等分為末二錢空心煎艾

湯 產後及損娠敗血衝 腹脹氣絕者神效

難生倒橫子死腹中先用黑荳一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥四錢煎至一盞以上分為二服未效再作 產後惡血注心迷悶喘急腹痛依前用黑荳加生薑自然汁半合煎服 兼治臟毒每服一錢半入炒槐花半錢水一盞煎不以時服三日取下血塊即愈 產後頭痛荊芥 吐血亦宜服

通真丸 隨證加減

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

當歸 去尾 蒼朮 切炒 肉桂 防風

川芎 人參 白芍藥 白薇 去土

熟地黃 酒炒 牡丹皮 茴香 白朮

白茯苓 桔梗 附子 炮 澤蘭葉 各等

右為末蜜丸每服一丸 血崩經脈不勻赤白帶下

炒當歸酒下 血風癢疼瘙痒或痛薑下 冷氣塊

築心腹嘔逆反胃炒鹽湯下 腸風瀉血赤白痢月

信不止米飲下 血風勞倦青蒿酒 頭疼眼花荊



芥茶下	月信不行室女紅脉不通產後諸風中風
不語迷悶五九紅花蘇木湯	胎漏下血氣刺心腹
脹滿炒薑酒下	
白薇散	隨證酌量用湯引
白薇	去土
川芎	熟地黄 酒炒 桂心
牡丹皮	去骨
甘草	當歸 去尾 澤蘭葉
蒼朮	切炒 芍藥 各等分
右為末每服三錢	氣刺心脅痛艾醋澤蘭湯 頭
痛心燥米泔米飲	氣虛土芎湯 頭痛荊芥湯
胎前潮熱氣急心悶生地黃燈心	產後腹膨吐逆
藿香胡椒	胎氣不安陳艾 下血不止糯米地榆
陳艾	產後血刺脇痛艾醋湯 小腹疼地黃薑汁
好酒	產後腰腿疼背膊痛木瓜白膠香沒藥好酒
月經不勻百草霜溫酒若過多藕節酒煎又用陳艾	
阿膠月水不通杜牛膝野苧根蘇木紅花酒下	脅
腰痛沒藥	白帶黃耆切和鹽炒酒浸喫十服 胎

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十五



迪志文化出版有限公司出版

衣不下順流水酸車草	產後血氣當歸鹽炒好酒
產後勞嗽糯米桑白皮	熱嗽生地黃芭蕉水 產
前產後浪熱桃柳枝	臨產小腹緊痛桑白皮葛根
立便追生	產前產後臟腑結枳殼 下血地榆
心神亂銀器	大小便秘麻仁蘇子 血風脚膝腫
痛寒熱生薑黃水柳根	血崩竹青藕節霜梅 熱
吐紅山梔子竹青藕節	妳癰蔓荊子酒煎調
大烏鷄圓治胎前產後諸般疾患並皆治之	
烏雄雞	烏藥 五錢
石牀	五錢
肉桂	去麁皮 一兩
人參	白朮 各半兩
黃耆	牡丹皮 各半兩
川烏	炮 陳皮 紅花 各一兩
肉苳蔻	各二錢半 蒼朮 米泔浸切 七錢半
右剉散用烏雄雞一隻湯擇去毛及腸肚將藥安置肚	中用新甕瓶好酒一斗同煮令乾去鷄骨以油單盛
海桐皮	一兩
草果	二錢半
熟乾地黃	洗焙 三錢半
附子	去皮臍 一兩
木香	二錢半
蓬莪茂	
玄胡索	
琥珀	二錢半

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十五



迪志文化出版有限公司出版

焙乾為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九 胎前產	後傷寒蜜糖酒服 胎前氣悶壯熱炒薑酒 赤白	帶下生薑地黃煮酒 產後敗血攻心童子小便炒	薑酒 產後血塊築痛玄胡索酒 胎前嘔逆薑湯	催生炒蜀葵子研入酒 安胎鹽酒 室女紅脉當	通不通四肢疼痛煎紅花研入酒 血氣攻刺心腹	疼痛煎當歸酒 血暈棕櫚燒灰入酒 血邪研朱	砂麝香入酒 血悶煎烏梅湯入朱砂末 子宮叉	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五	冷溫酒或棗湯空腹日一服 血風勞人參酒 小	便疔痛炒茴香食鹽入酒 血散四肢遍身虛浮黃	腫赤小荳研細入酒 常服溫酒醋湯並空心吞服	大效活血圓治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣臍腹	拘急痛引腰面白脫色嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩	倦手足寒熱頭重目眩不思飲食或勞傷衝任內積風	冷崩中漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急	痛及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

真蒲黃 炒三分半	阿膠 蛤粉炒成珠	乾薑 甘草	白芷 白朮 各三兩	吳茱萸	右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓食前溫酒	下漸加至五十圓一方加杜仲鹿茸肉蓯蓉北五味	子	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五	養榮衛湯治榮衛不調血氣虛弱面色痿黃四肢無力	手足倦怠盜汗併出皮肉枯痺骨肉羸瘦飲食不進日	漸著床病後不能調理變成崩漏用之神效	木香 丁香	紫蘇葉 白茯苓	附子 沉香	茴香 山藥	右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗煎溫服
當歸 川續斷	芎藭 附子	肉桂 去麤皮	白芍藥 各三兩						巴戟 去心	蒼朮 肉荳蔻	苦梗 粉草	白荳蔻 偏荳				

止瀉加黑荳炒 止痢加粟殼蜜炒

神應圓治月水過期不通以無嗣息血癖氣痛四肢浮腫嘔逆心疼虛煩鬱悶面色痿黃崩漏帶下寒熱蒸勞頭疼齒痛血下無度淋瀝諸疾產前安胎臨產催生產後胎結疼痛傷寒煩渴瀉痢血暈血勞筋攣痰盛頭疼敗血上衝血刺泄瀉咳嗽喘急咯血血塊起伏氣痞氣膈血滯腰痛小便不禁子死腹中傷寒汗不出血風脚手痺頑凡產後諸疾並皆治之

欽定四庫全書

世醫得效方卷十五

牡丹皮去骨 川蘘本 人參去蘆 川當歸去尾

白茯苓 赤石脂 香白芷 交趾桂去麤皮

白薇去土 川芎 玄胡索 白芍藥

白朮米泔浸一宿各一兩 甘草炙 沉香不見火

右件並用溫水洗淨藥乾搗羅為末煉蜜丸如彈子大每服一丸空心溫酒下凡妊娠臨月服此五六丸即易產如以無子息服二十九當月有子并治積年血風光身不遂種種血疾不問年深日以皆療神效

大聖散治血海虛冷以無子息及產後敗血衝心中風口禁子死腹中擘開口灌藥須臾生下無恙并治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血暈血癖血滯血崩血入四肢一應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐逆咳嗽寒熱麻木遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡瘡胎產虛冷數曾墮胎崩中不定因茲成疾及室女經脉不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病丈夫五勞七傷虛損一切疾證亦治之

欽定四庫全書

世醫得效方卷十五

治之

澤蘭葉 石膏研各二兩 白茯苓去皮 卷柏去根

栝子仁炒 防風去蘆 厚朴去麤皮 細辛去苗

人參去苗 蘘本去苗 乾薑炮 五味子

白芷 川椒去目及開口者炒出汁 白朮各三分

當歸去芦 蕪荑炒 甘草炙 川芎各一兩

生乾地黄一兩半 官桂去皮一兩一分 黃耆去苗三分

芍藥一兩三分 白薇半兩 桔梗一兩 川烏三分



人參湯治經水適斷熱入血室寒熱如瘧日晡最甚加		生乾地黃每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎		溫服不拘時候		方見大方科傷寒類即小柴胡湯		桂枝紅花湯治傷寒發熱惡寒四時拘急口燥舌乾經		水凝滯不得往來		桂枝		赤芍藥		甘草		各一兩半		紅花		一兩		右剉散每服五錢水一盞半生薑四片紅棗二枚煎		溫服良久汗出而解		欽定四庫全書				世醫得效方		卷十五		海蛤散治傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近		海蛤		滑石		甘草		各二兩		芒硝		一兩		右為末每服二錢雞子清調下小腸通利則胃膈血		散腫中血聚則小腸壅既壅則腫中血不流行宜服		此若小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈		三黃丸治陽毒傷寒棄衣而走不避親疎妄言罵詈以		朱砂為衣新汲水下十九粒即效未效再服		方見大方科積熱類		喘嗽	

人參散治血風勞嗽乍寒乍熱傷寒咳嗽起坐不能	
人參	知母
秦艽	欵冬花
麻黃	杏仁
苦梗	馬兜鈴
寒水石	南星
地骨皮	粉草
半夏	各等分
右剉散每服三錢水一盞半麥門冬二十粒去心煎溫	
服喘嗽加烏梅氣急桑白皮	
噲化丸治患肺熱久嗽身如炙鬻將成肺勞	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五	
枇杷葉	去毛
桑白皮	欵冬花
木通	
紫苑	杏仁
各等分	大黃
減半	
右為末煉蜜丸如櫻桃大食後夜卧食化一丸	
貝母湯治諸嗽久不差	
貝母	生薑汁浸半日
北五味子	黃芩
乾薑	熱者減半
陳皮	各一兩
半夏	桑白皮
桂心	
北柴胡	各半兩
熱甚	木香
甘草	各一分
右剉散每服五錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎之	



生薑二片煎熱服

金不換散治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠年日近一切喘嗽諸藥不效者並治之

罌粟殼半兩去膜蜜炒乾 枳殼四錢 杏仁去皮尖 甘草各三錢

右剉散每服三錢水一盞生薑三片烏梅半個煎食後臨卧漸漸熱服

千緡湯治痰喘數服瘥

欽定四庫全書  世醫得效方卷十五

齊州半夏七枚炮裂四片破之

皂角去皮炙一寸 甘草炙一寸

生薑如指頭大

右以水一碗煮去半頓服

調經

煮附圓治婦人室女一切血氣經候不調臍腹疔痛面色痿黃心忪乏力腹脹脇疼頭暈惡心飲食減少崩漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治療若以其名人人言之耗氣不喜此藥世訛之以不肯服者甚多殊不知獲

效非常古方所載婦人仙藥不可輕忽修製相感豈同日而語哉服之自顯其功耳

右以香附子不拘多少先搗去毛淨用好醋煮半日出焙碾為末醋糊圓梧桐子大每服三四十圓米飲吞下不以時候婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此藥尤妙一方加陳艾亦有加當歸鹿茸

滋血湯治血熱氣虛經候澁滯不通致使血聚肢體麻木肌熱生瘡渾身疲倦將成勞瘵不可妄投他藥但宜

欽定四庫全書  世醫得效方卷十五

以此滋養通經

馬鞭草 荊芥穗 牡丹皮去骨 赤芍藥

枳殼去穰炒 肉桂 當歸去尾 川芎各等分

右剉散每服四錢水二盞烏梅一個煎至一盞空心日四五服有此證服至半月或一月經脉自通百病皆除

涼血飲治血熱經水不調心煩口乾煩燥或遍體生瘡

赤芍藥 黃芩 川芎 甘草



荆芥		生乾地黄去土 麥門冬去心 瓜根
右剉散每服三錢水一盞半燈心十莖淡竹葉十張煎溫服不拘時有寒熱加秦艽北柴胡此濟陰為第一方		
紫石英圓治月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說得陰勝陽陽勝陰服藥所以少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水不成流故令乍少在月後若陽乘陰則血流散溢所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多兩在月前當知其陰陽調其血氣使不相乘以平為福		
紫石英細研水飛 人參	龍骨	川烏頭炮
桂心	禹餘糧醋煨 杜仲炒去絲 遠志去心	
澤瀉	當歸 桑寄生 菝葜酒浸	
乾薑炮 五味子 石斛去各一兩 牡蠣煨		
甘草炙 川椒去目及閉口炒出汗各半兩		
右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十至五十圓空心		

米飲下		當歸散治天癸已過期經脉不勻或三四月不行或一月再至腰腹疼痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經脉不應時者血有餘也不可止之但令得應時不腰痛為善
白朮半兩 黃芩	山茱萸湯泡取肉 當歸	
川芎 楊芍藥六味一證若冷去黃芩加桂		
右為末每二錢酒調空心日三服養胎益血安和子臟通經圓治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕		
桂心 青皮去白 大黃炮 乾薑炮		
川椒炒出 蓬蘽炮 乾漆炒去煙 川烏炮		
當歸去蘆 桃仁炒各等分		
右為末取四分用米醋熬成膏和餘六分末成劑白中治之圓如梧桐子大略曬乾每服二十圓至三十圓用醋湯溫酒空心下尋常血氣凝滯疼痛數服立效		



鹿茸附子圓補氣固血治木臟因虛生寒月經行多或少或及期腹痛怯風臟腑不和	
鹿茸	五味子 茯苓 杜仲
赤石脂	吳茱萸 附子 乾薑
兩各 炮	
黑龍骨	肉苳蔻 白茯苓 乾地黃
各半 兩 一兩	
右為末酒煮麪糊為丸梧桐子大空心食前熱米飲下五七十九一月血氣已安去龍骨加沉香半兩可以常服中年以後婦人最宜服此	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五	
三稜丸治紅脉不通氣痛滯下兼治血瘕形如鎌鐵樣	
當歸	川芎 牛膝 芫花
去尾 去苗	
三稜	莪朮 蒲黃 玄胡索
煨	
牡丹皮	乾薑 菴闍 白芷
去泥土酒浸 炒各一兩	
地龍	大黃
去泥土酒浸 炒各一兩 二兩為末米醋一升文武火熬成膏	
右為末入大黃膏和研杵爛為丸每服二十九氣痛淡醋湯下炒薑酒亦可未通紅花酒下	
治經脉不利方緣經滯即為水水流走四肢悉皆腫滿	

名曰血分其候與水相類醫作水治之非也宜此				
人參	當歸	大黃	熟地黃	白芍藥
		濕紙裹三斗米下蒸米熟去紙切焙		各半
桂心	瞿麥穗	赤芍藥	白茯苓	各半
各半				
亭蘚	炒別研一分			
右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸至三十九丸				
空心米飲送下				
獨勝方治月信退出皆為禽獸之狀似來傷人先將綿				
塞陰戶只須服				
欽定四庫全書		世醫得效方		
卷十五				
右以沒藥一兩作丸散皆可服即愈				
調氣阿魏丸大聖散兼服治經行腹痛不可忍者立效				
紅丸子亦效	阿魏丸大方科心痛類	大聖散方見前		
紅丸子大方				
艾煎丸治婦人室女經候不調臍腹冷痛惡心腹常脹				
滿至晚則增				
食茱萸	湯洗	當歸	各七錢半	熟地黃
白芍藥				
石菖蒲	炒	川芎		人參
各一兩				熟艾
四兩糯				米飲調
焙	作餅			

右為末煮酒糊丸梧桐子大調縮砂香附湯送下五		十丸		方見大方科諸氣類	
濟陰丹治經水不時或崩中漏下一切血疾				方見前	
杜牛膝散治婦人室女血閉不通五心煩熱		紅花		二錢半	
		大當歸		杜牛膝各五錢	
		桃仁		去皮尖炒研二	
右為末每服二錢空心溫酒下				錢半	
大油煎散治經候不調臍腹脹腰腿無力煩渴潮熱身					
欽定四庫全書				世醫得效方	
體拘倦日漸羸瘦				卷十五	
海桐皮		五加皮		牡丹皮	
桑白皮		各等分		地骨皮	
右剉散每服四錢生薑三片紅棗一枚清油數點水					
一盞半同煎空心溫服					
血氣					
抽刀散治血風血氣等疾					
五靈脂		炒一兩		莪朮	
		桂心		藜蘆子	
				炒半兩	

右為末每服二大錢酒半盞煎八分疾作熱服		二神圓治血氣不和作痛不止及下血無時月水不調		真蒲黃	
				炒	
				華撥	
				鹽炒	
右等分為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空心溫		酒送下不飲米飲下一二服即止			
沒藥散治一切血氣臍腹撮痛及產後惡露不行兒枕		塊痛			
血竭		沒藥		火煨細研	
欽定四庫全書				世醫得效方	
蒲黃		紅花		木香	
乾漆		炒		赤芍藥	
				各等分	
右為末每服二錢食前熱酒調下					
玄胡索湯治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心腹		作痛或連腰脇或引背脅上下攻刺甚作搐搦經候不		勻但是一切血氣疼痛並可服之	
當歸		去蘆酒浸剉炒		玄胡索	
		炒去毛		蒲黃	
				炒	
官桂		不見火炒		片子薑黃	
		洗		乳香	
				沒藥	

木香 不見火 各三錢 甘草 炙 二錢半		右剉散每服四錢水一盞半生薑七片煎食前溫服		吐逆加半夏橘紅各半兩		寄奴圓治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍腹痛不可忍及惡露不下血上攻心迷悶不省應有血氣腹痛並		牡丹皮 去木 赤芍藥 蓬莪蘆 剉 荆三稜 剉用		劉寄奴 去梗 熟地黃 酒炒 玄胡索 炒 當歸 酒浸		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五		烏藥 官桂 不見火 各一兩		右用前五味以烏荳一升生薑半斤切片米醋四升同煮荳爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調空心食前服		最神圓治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經行澁少或經事不調以致疼痛		橘紅 二兩 玄胡索 去皮 醋 當歸 去蘆 酒浸 剉 畧炒 各一兩		右為末酒煮米糊為圓梧桐子大每服七十圓加至	

一百圓空心艾湯或米飲送下		失笑散治血氣心腹刺痛欲死諸藥不效服此頓愈		五靈脂 蒲黃 微炒 各等分		右為末先用二錢醋調熬成膏入水一盞煎七分食前熱服		奇方治血氣痛遊走及腰痛		右用莪蘆切片乾漆打碎各二兩同炒令漆焦香取出漆不用只以莪蘆為末溫酒調下三錢腰痛胡桃		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五		酒下遊走痛冷水調下		手拈散治血氣刺痛不可忍者及諸般氣痛 方見前大類		二神圓治血氣絞刺痛方 見前		大效煎圓治血氣痞滿刺痛大效 方見大方科諸氣類		血瘕		桃仁煎治血瘕血積經候不通		桃仁 大黃 各一兩 蟲虫 半兩 炒黑 川朴硝 一兩		右並為末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取一升	



五合下大黃桃仁等不住手攪欲下手圓下朴硝更		不住手攪良久出之圓如梧子大前一日不喫晚食		五更初用溫酒吞下五圓取下如赤荳汁或如雞肝		蝦蟆水狀未下再作如鮮血來即止續以調血氣藥		補之虛人酌用		琥珀圓治血瘕腹中有塊攻刺小腹痛重或腰背相引		為痛久而不治黃瘦羸乏	
琥珀		另研		白芍藥		川烏		炮去皮		川牛膝		去蘆酒浸	
欽定四庫全書													
													
世醫得效方													
卷十五													
蟹甲		蓬莪朮		炮		當歸		去蘆酒浸		梓厚朴		薑炒各一兩	
木香		不見火		澤蘭葉		官桂		不見火		麝香		另五分	
右為末酒糊圓梧桐子大每服七十圓空心溫酒米飲													
下													
通經圓治室女月經不行臍下堅結大如杯升發熱往來此名血瘕加紅花													
方見前													
黑神圓													
神麴		茴香		各四兩		木香				川椒		炒出汗	

丁香	各半兩	檳榔	四枚	漆	六兩半生半	重湯煮半兩
右除椒漆餘五味皆半生半炒為末用生熟漆和圓						
如彈子大茴香末十二兩鋪陰地陰乾候外乾并茴						
香收器中極乾去茴香						
膀胱瘕癖及疝墜五膈血						
崩產後血虛或下赤白並一圓分四服						
死胎一圓						
舊綿灰酒下						
難產炒葵子四十九粒搗碎酒煎下						
一圓 諸疫不過三服瘕氣十服膈氣癥癖五服血						
瘕三圓當差						
欽定四庫全書						
						
世醫得效方						
卷十五						
血蠱						
木香散治脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱						
木香	沉香	乳香	炮	甘草	炙	各一分
川芎	胡椒	陳皮	人參			
晉礬	各半兩	桂心	乾薑	炮	縮砂	各一兩
茴香	大茄	五兩赤小者	乾秤			
右洗焙為末每服二錢空心陳米飲調下忌羊肉						
菜萸圓治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心愁						

憂思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切疾病有以懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不愈者		吳茱萸 湯洗七次 焙炒半兩		桔梗 半兩		柴胡	
菖蒲		紫苑 去苗 葉土		黃連 去鬚		肉桂 去麤皮	
茯苓		蜀椒 去目及閉口 者炒出汗		人參 去蘆			
厚朴 去麤皮 薑汁炒		巴豆 去皮心膜 出油炒研		皂莢 去皮子 各半兩			
川烏 炮去皮臍二兩半							
欽定四庫全書		世醫得效方					
卷十五							
右為末入巴莖和勻煉蜜圓梧桐子大每服二圓生薑湯下食後臨卧漸加至五七圓							
血癖							
紅圓子治經水不調腹中癖聚成塊流走作痛肌膚消瘦腹滿不敢食用烏梅濃煎湯入鹽少許服之薑湯下亦可							
亦可 方見大方科痰癰類							
大麝香圓治瘰癧冷氣兼疰氣心腹痛不可忍							
麝香 半兩 另研		阿魏 一分 麪裏煨 麪熟取出		五靈脂			

桃仁	去皮尖	三稜	各三分	芫花	醋炒	檳榔	各一兩
義茂	煨	桂心		沒藥	另研	木香	
當歸	各半兩						
右為末入麝香令勻用粳米軟飯為丸梧桐子大每服十丸不以時淡薑湯下							
神效方治瘰癧及血氣							
右以獐猪肝一具可及十兩者用巴豆五十粒去大皮剉入肝內用驢醋三盃慢火熬令肝爛熟去巴豆							
欽定四庫全書		世醫得效方					
卷十五							
入砂鉢內研極爛入荊三稜末和就得所丸如梧桐子大每服五丸食前熱酒下							
小烏鷄煎丸治瘰癧瘰癧血氣塊硬發歇刺痛甚則欲死或塊如小盤每作痛要人伏定方少止數年不愈者與							
蔥白散間服即效							
吳茱萸	良薑	白薑	當歸	去頭			
赤芍藥	延胡索	破故紙	川椒				

生乾地黄	劉寄奴	蓬莪蘆	橘紅				
青皮	川芎	各一兩	荷葉灰	四兩	熟艾	二兩	
右為末醋煮麪糊丸梧桐子大每服三五十九熱酒下							
川芎散治產前後腹痛胎不安或血刺痛百兼治血臟							
宿冷百節倦疼肌體怯弱勞傷帶癖久服盡除婦人一							
切疾病最宜服之							
川芎	當歸	去尾	枳殼	厚朴	去麤皮	薑汁炒	
桂心	乾薑	芍藥	舶上茴香				
青皮	苦楝子	木香	熟地黄	酒炒			
麥芽	三稜	莪蘆	煨	茯苓	去皮		
神麴	人參	各等分					
右為末每服三錢連根蔥白二寸擘破鹽半錢煎服							
如大便不利入大黃煎却不入鹽若大便自利入訶							
子煎							
腸覃							
烏啄丸治腸覃病因寒氣客於腸外與胃氣相搏正氣							

不勝繫瘕內著惡氣乃起其生也始如鷄卵久久乃成							
狀如懷胎按之堅推之即移月事時下故曰腸覃亦治							
乳餘疾大小便不利并食有伏蠱臚服癰疽毒腫久寒							
邪氣							
烏啄	炮去皮	半夏	湯洗	石膏	炮	藜蘆	炒
牡蒙	即紫參	茯苓	酒浸	乾薑	炮	桂心	各一錢
巴豆	六七粒	研膏					
右為末煉蜜圓菴荳大每服三五丸食後酒或飲送下							
亦治男子疝痛							
食積							
三稜煎治血癥血瘕食積痰滯							
三稜	煨	莪蘆	煨	各二兩	青橘皮	去白	半夏
麥芽	炒	各一兩					
右以好醋六升煮乾焙為末醋糊圓梧桐子大每服							
三四十圓淡醋湯下痰積多以薑湯送下							
紅圓子治食積作塊膨痛面黃							
方見大方科痰癰類							

膈氣五膈寬中散分心氣飲沉香降氣湯方並見大方科諸氣類

血風

人參荊芥散治血風勞氣身體疼痛頭昏目澁心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍腹疔痛瘰癧塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即著牀常服除一切風虛勞冷孕婦莫服

荊芥穗

人參

桂心

生乾地黄

欽定四庫全書世醫得效方卷十五

北柴胡

去苗 鱉甲醋炙

酸棗仁炒

枳殼去穰

羚羊角屑

另為末

白朮各七錢半

川芎

當歸

防風

甘草各半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎熱服日二服

單方治血風攻頭腦旋倒地不知人事

右以嫩蒼耳草心不拘多少陰乾為末不以時服一

錢效

小黑神圓治血風走注攻刺半身不遂麻痺瘙痒急風

口眼喎斜言語蹇澁手足拘攣

烏頭一個

芫花

乾薑各五錢

右為末醋煮令乾更杵為末再入桂心二錢天麻一錢海

桐皮一錢黑荳為末入前藥和勻別用黑荳煮極爛研

如泥以荳汁調和前末研合為圓每服七圓至十圓

以黑荳淋酒下忌一切毒物

大芎藭散治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思

飲食

欽定四庫全書世醫得效方卷十五

川芎一兩

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁炒

桂心

當歸去尾

木香

川牛膝各三分

羌活

枳殼去穰

甘草各半兩

右剉散每服三錢水一大盞薑三片煎不拘時熱服

羚羊角散治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑

酸棗仁炒

生乾地黄

檳榔各一兩

五加皮

防風去叉

赤芍藥

當歸

骨碎補

炒去毛 海桐皮

川芎各三分

甘草半兩



右為末每服二錢溫酒調下

歷節風

麝香圓治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲嚙晝

靜夜劇及一切手足不測痛

大八角川烏頭二十三個去一粒皮臍生 生全蝎二十一個

生黑荳 生地龍去土淨半兩

右為末入麝香一字同研停勻糯米糊圓菴荳大每服

七圓甚者十圓夜卧令膈空溫酒吞下微出冷汗便瘥

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

血虛

大補血虛湯治頭痛發熱多汗六脉虛細尺脉或絕作

血虛治之服後藥見效

術附湯加川芎先服方見大方濕類 十全大補湯加附子

次服大方科虛損類 又服萬安圓大方科虛損類 神術散大方科傷寒類 內

補圓 芎歸湯方見前

靈砂丹有婦人頭痛惡風發熱六脉沉取無根浮取却

有乃是虛證方見大方科痼冷類

右用人參一二兩銀銚煎湯空心下二十粒五更又下二十粒天明而愈

鹿膠湯治血虛勞倦

鹿角膠 當歸去尾 黃耆鹽炙 肉桂

乾地黄酒炒 石斛 木香 白朮

白茯苓 鱉甲醋炙 秦艽 川巴戟

柑子皮各一兩 牡丹皮 天仙藤 甘草各半兩

人參二錢 枳殼三錢

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

右剉散每服水盞半生薑九片薤白三寸煎空心溫

服

性香散治脾胃虛弱并脾血久冷

草荳蔻去殼用 甘草 高良薑剉炒 白朮

縮砂仁各一兩 青皮去穢炒黃 訶子肉各半兩 肉桂一分

生薑切炒乾 厚朴去麁皮薑汁炒 棗肉切三味各一兩水一碗煮令乾同符為圓

焙乾

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點空心服及療腹



痛又治冷瀉尤妙腹痛最難得藥此方只是溫補藥耳特工止痛理不可知

顛狂

加味逍遙散治患顛疾歌唱無時踰牆上屋乃榮血迷於心包所致加遠志去心桃仁去皮尖蘇木紅花各一錢水一盞半煎方見後服後病退却用平胃散內減厚朴三分之二加生蒼朮二倍川升麻等蒼朮一半水一盞半煎一盞服之全安須常服以絕其根方見大方科脾胃類

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十五

小柴胡湯治血熱顛狂加生薑生地黃同煎日三服須服百餘服即安凡婦人顛狂未可頓服補心藥多方見大方

科傷寒類

煩熱

油煎散治血風勞形憔悴肢節困倦喘滿虛煩噯噯少氣發熱汗多口乾舌澀不思飲食

五加皮

牡丹皮

去骨

赤芍藥

當歸

去蘆各一兩

右剉散每服三錢水一盞將青銅錢一文蘸油入藥

同煎溫服煎時不得攪喫不得吹日三服常服能肥婦人

逍遙散治血虛勞倦惡心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又主室女血弱陰虛榮衛不和瘵嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓

白朮

去蘆

當歸

去蘆酒浸半日微炒

白芍藥

北柴胡

去各一兩

甘草

炙兩半

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十五

右剉散每服三錢水盞半薑三片麥門冬二十粒去

心煎不拘時服一方加知母地骨皮

清心蓮子飲治同上

方見大方科消渴類

春雪膏涼心退煩悶熱極壅盛

寒水石

石膏

滑石

赭石

朴硝

各五錢

甘草

三錢

右為末每服二錢井水調下

朱砂膏治心臟驚熱甚至不省人事



朱砂	鵬砂	燄硝	各二錢半	金銀箔	各五片
寒水石	五錢	腦子	一字	石膏	五錢
粉草	三錢				
右為末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調					
敗毒散治但惡寒發熱煩燥緣表中寒邪故也服之立					
效方見大方科傷寒類					
黃耆散治熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不食					
人參	黃芩	黃耆	大當歸	各七錢半	
北柴胡	去蘆	麥門冬	去心	地骨皮	赤茯苓
					各一兩
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五					
生地黃	赤芍藥	甘草	各五錢		
右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎溫服					
心痛					
九痛圓治九種心痛一蠱二疰三風四悸五食六飲七					
冷八熱九種去來此悉主之又治連年積冷流注心胸					
疼痛并療冷氣衝上落馬墮車瘕血等疾					
狼毒	半兩	乾薑	人參	各一兩	附子
茱萸	一兩	炒	巴豆	去皮心	脫炒
			乾取	一兩	

右為末煉蜜和圓梧桐子大每服一圓空心溫酒下					
卒中惡心腹脹痛口不能言者服二圓立安					
奇方治血刺心痛					
右用玄胡索不以多少新瓦上炒微黃不可焦為末					
每服三錢酒一盞煎服或陳米飲不炒亦可用酒服					
效速					
又治急心痛用南康真蚱粉為末炒赤以酒調熱服					
腹痛					
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五					
北亭圓治久積冷氣腹痛傍攻兩脇或上心間刺痛發					
歇無時羸弱減食經年不愈或加嘔吐					
方見大方科虛損類					
當歸運中湯亦效					
方見大方科腹痛類					
奇方治臍腹刺痛不省人事一服立止若因為心氣痛					
誤矣					
白芍藥	五靈脂	木通	去皮用		
右剉散每服四錢醋一盞煎一二沸再入水一盞再					
煎三沸去滓空心溫服					



脇痛

木通散治脇肋苦痛

木通 去皮節 青皮 去白 川棟子 錢用皮用各一兩三

炒黃去巴豆不用 蘿蔔子 炒 舶上茴香 炒一兩

莢蘧 木香 滑石 各半兩

右為末煎蔥白酒調三錢一服愈甚者再服

腸氣散治兩脇刺痛攻心 方見大方科諸氣類

風痺

欽定四庫全書 世醫得效方卷十五

三痺湯治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆治之

川續斷 去蘆 杜仲 去皮切 防風 桂心

華陰細辛 去葉 人參 白茯苓 白芍

當歸 甘草 各一兩 秦艽 生地

川芎 川獨活 各半兩 川牛膝 黃耆 各一兩

右剉散每服五錢水二盞生薑三片棗子二枚煎一

盞不以時熱服但腹稍空服有人病左臂不隨後已

痊平而手指不便無力試諸藥不效服此纔半而安

臂痛

舒經湯治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子薑黃 兩四 甘草 羌活 各一兩 白朮

海桐皮 當歸 去尾 赤芍藥 各二兩

右剉散每服三錢水一盞煎溫服如腰以下病空心

腰以上食後服

交加散乃五積散敗毒散合和治弱者或兩臂或一臂

冷痺作痛起手甚艱每服四錢薑三片棗二枚木瓜

欽定四庫全書 世醫得效方卷十五

二片水一盞半煎不拘時服未效再加川牛膝 方見大方科傷

寒類 仍間服通氣驅風湯 方見風科

稱保圓治因食酒毒熱物過度痰飲與氣富聚所作臂

痛每服二七粒柿蒂湯下得利或不利皆效 方見大方科諸氣類

三痺湯治血滯作臂痛加紅花煎 方見前

搐搦

白薇圓治手足搐搦痰涎壅盛不省人事多因血虛七

情所感而生先將蘇合香圓溫酒化開多服後服此



白薇	紫石英	火燉醋淬七次	琥珀	別研
白芍藥	桂心	不見火	川續斷	酒浸
山茱萸	取肉	當歸	酒浸	防風
牡丹皮	去木	木香	不見火	麝香
右為末	生薑自然汁打米糊	圓梧桐子大	每服七十	
圓空心	食前溫酒或米飲下			
澤蘭圓	治女子血實七情所感	卒然手足搐搦狀類癇		
證却不可作癇治之	先多以蘇合香圓酒服却投此立			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五				
效	當歸	去蘆酒浸	澤蘭葉	琥珀
牡丹皮	去木	防風	各一兩	麝香
生地黃	赤芍藥	各半	鐵粉	橘紅
右為末	煉蜜圓梧桐子大	每服七十	圓空心	食前溫
酒或米飲下				
湛濁				
二莖散	治耳鳴心燥腰脚疼重腹內虛鳴臍下冷痛頻			

下白水如泔名湛濁證	肉苳蔻	白苳蔻	丁香	巴戟
丁皮	白茯苓	蒼朮	桂心	
黑附	火燉	白朮	人參	山藥
桔梗	茴香	粉草	各五錢	
右剉散	每服三錢水一盞	半生薑三片	紫蘇葉三皮	
煎空腹溫服				
勝金圓	治渾身壯熱頭疼臍下疔痛下淡紅水			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五				
當歸	去尾	白芍藥	鹿茸	酒炙
川芎	白朮	大艾	炒	側柏葉
赤石脂	醋燉	川白芷	烏賊魚骨	各等分
右為末	蜜圓如龍眼大	每服一圓	空心鹽酒下或敗	
棕燒灰	調酒吞下			
餘糧散	治心燥四肢痠疼所下五色腰脚臍中緊痛			
禹餘糧	醋燉	地榆	阿膠	赤石脂
紫金皮	茴香	粉草	側柏	各等分

右為末每服二錢米飲調下		烏金散治身熱口燥頭痛如破氣塊築痛下黃水如葵汁	
百草霜	砂內炒煙盡為度	紫金皮	米泔浸煮熟炒焦色
右為末每服二錢艾湯調或用淡醋湯空心服		粉草	炙
又方加入 住紅蘇根金櫻子根 心嘈猪血入鹽炒		酒 吐紅飯飲 勻月水木瓜當歸浸酒 赤白帶	
下蔥白連根煎酒 血海虛冷下白不止用鯉魚一		箇去腸肚不去鱗將油髮一塊入魚肚內黃泥固濟	
炭火內燒煙淡留性去泥礪為末後入當歸頭甘		草炒為末每服一錢用舊酒調下	
白濁		一氣正元丹	方見大方科虛損類
秘精圓		方見大方科淋濁類	
四七湯吞青州白圓子		方見大方科喘急類及風科通治類	
崩漏		鎮宮圓治崩漏不止或五色或赤白不定或如荳汁或	

狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久久不止令人黃瘦口乾胸煩不食		代赭石	火煨醋淬七次
香附子	去毛醋煮各二兩	紫石英	製同上
鹿茸	燎去毛醋蒸焙	陽起石	煨紅細研
蒲黃	炒各一兩	阿膠	蛤粉炒
右為末艾醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心米飲下		當歸	去蘆酒浸
川續斷湯治憂思過度勞傷心經心主血心虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患		芎藭	去木
當歸	去蘆酒浸	茯苓	去木
阿膠	蛤粉炒	鹿茸	燎去毛酒蒸焙
甘草	炙半兩	栢子仁	炒各一兩
右剉散每服四錢水盞半生薑五片煎空心食前溫服		川續斷	酒浸一兩半
秘方龍骨圓治半產後及下虛數月崩漏不止		香附子	二兩



白牡蠣	北赤石脂	大赭石	並煨白龍骨
伏龍肝	海螵蛸	五靈脂	側柏葉
棕櫚	不拘多少	真蒲黃	多加入
右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十五圓以十全			
大補湯三錢加嫩鹿茸去毛酒炙阿膠蚌粉炒各一			
錢半薑三片棗二枚烏梅二箇煎吞服立效			
平胃散治脾血不固崩漏溫酒調下	方見大方		
滋榮圓治勞傷過度致傷臟腑衝任氣虛不能約制或			
欽定四庫全書	世醫得效方		
暴下崩中或下鮮血或瘀血連日不止淋瀝不斷形羸			
氣劣倦怠困乏並皆治之			
赤石脂	海螵蛸	去殼側柏	去梗各五兩
右為末醋糊圓梧桐子大每服三十圓飯飲送下空			
心日三服神效			
加味四物湯治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛			
寒熱加人參茱萸生薑紅棗煎兼用熟附圓	四物湯		
熟附圓	方見前		

大川芎	當歸	赤石脂	白龍骨
木賊	熟附子	各等分	
右用醋米糊圓梧桐子大每服五十圓米飲吞下漸			
安			
金華散治經血得熱崩漏不止口苦咽乾經候不通宜			
服			
延胡索	瞿麥穗	川當歸	牡丹皮
乾葛	各一兩	石膏	一兩
		蒲黃	半兩
		桂心	
欽定四庫全書	世醫得效方		
葦靈仙	各三分		
右為末每服二錢水一盞薑三片煎食前溫服日二			
三服			
黃芩湯治崩中下血諸藥多用止血補血之劑此是陽			
乘陰前所云天暑地熱經水沸溢是也			
右用黃芩不以多少為末燒秤錘淬酒調下			
又方			
黃芩	黃檗	各一錢	黃連
			三錢
			去毛

又方陳槐花一兩百草霜半兩為末燒紅科錘泔酒下服		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五	
又方治積年血崩一服而愈	右以草血竭嫩者蒸油鹽姜淹喫小酒嚥下或收為末薑酒調服血竭草生於磚縫井頭少在地上	活血散治血崩不止用鹽梅七箇燒灰為末空心米飲	服
煎溫溫分三服空心腹痛加梔子三錢亦可	右用水四盞煎取一半去滓入炒阿膠末五錢滓再	五倍子散治血崩帶下	大艾 一兩醋炙 五倍子 二兩炒赤 烏梅 半兩去核 川芎 半兩
又方治積年血崩一服而愈	右為末每服二錢空心米飲下兩服止	奇效四物湯治有熱久患血崩一服稍安八服無恙	當歸 頭尾用 熟乾地黃 洗焙 白芍藥 大川芎
又方治積年血崩一服而愈	右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎空心溫服	荳花散治白崩不止 白扁荳花焙乾為末 紫者不用 炒米	大艾葉 阿膠 蛤粉炒如珠 黃芩 去爛者各半兩

灸飲入燒鹽少許空心數服即效	又方用棕櫚絲爪燒灰等分為末鹽酒或鹽湯下	灸法治白崩小腹樸文當臍空直下百壯又灸內踝上三寸左右各百壯名三陰	治漏下不止或赤或白灸交儀穴在內踝上五寸	帶下	白欽圓治衝任虛寒帶下純白	鹿茸 二兩醋蒸焙 白欽 金毛狗脊 燎去毛各一兩	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五	右為末艾煎醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服五十圓空心溫酒下	當歸煎治赤帶不止腹內疼痛四肢煩疼不欲飲食日漸羸瘦	當歸 去蘆酒浸 赤芍藥 牡蠣 火燬取粉 熟地黃 酒蒸	阿膠 剉蚌粉炒 白芍藥 續斷 酒浸各一兩 地榆 半兩	右為末醋糊圓梧桐子大每服五十圓空心米飲送下



卷栢圓治腹臍冷熱相攻心腹絞痛腰腿俱疼赤白帶下面色痿黃四肢羸乏

黃耆 去蘆蜜水炙 熟地黃 洗各半兩 卷栢 醋炙 赤石脂 煨醋淬

鹿茸 醋炙 白石脂 芎藭 代赭石 煨醋淬

艾葉 醋炒 桑寄生 鱉甲 醋炙 當歸 去蘆酒洗炒

地榆 各一兩 木香 不見火 龍骨 各半兩 乾薑 炮一分

右為末醋煑糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心

食前米飲送下

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

溫經散治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不斷腰

腹重痛凡是五色帶疾並皆治之

禹餘糧 煨醋淬細研 赤石脂 煨 龍骨 煨石器研

白芍藥 川芎 附子 熟地黃

當歸 各一兩 乾薑 肉桂 各半兩

右為末每服二錢入麝香少許空心米飲調日二服

香附散治赤白帶下

百草霜 一兩 當歸 香附子 紫金皮

烏藥 八錢 伏龍肝 一兩

右為末以水牛膏同茴香炒舊酒調三大錢不拘時候通口服忌卵魚腥母猪等肉

白芷圓治婦人帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿

白芷 一兩 單葉紅蜀葵根 二兩即爭荅古梅根無則以蘇木節代之

亦可 白芍藥 白礬 燒枯別研各半兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

右為末蠟圓如梧桐子大空腹米飲下十圓或十五

圓候膿盡仍以他藥補之

白芍藥散治赤白帶下臍腹疼痛神效

白芍藥 一兩 乾薑 半兩

右為末微炒黃色每服二錢空心米飲下脫又服半

月效

秋霜丹治赤白帶下

真秋石為末北棗去皮煑爛為圓梧桐子大每服五



十圓空心醋湯下

求嗣

溫經湯治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來或崩中去血過多不止小腹有寒久不受胎曾經損娠瘀血停留小腹急痛發熱下痢手足煩熱唇口乾燥

吳茱萸 三兩湯洗十次炒

半夏 二兩半洗七次 桂心 去麤皮

人參 去蘆

白芍藥

牡丹皮

當歸 去蘆

阿膠 搗破蚌粉炒

川芎

甘草 炒各二兩

麥門冬 去心兩半

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎空心熱服經

事來多不斷以此吞服暖宮圓亦效

暖宮圓治婦人無子暖子宮冷服之神效

附子 炮去皮臍一枚

杜仲 炒斷絲

地榆

桔梗

白薇 去土

川牛膝 去苗

川白芷

黃耆

沙參

厚朴 去麤皮薑汁炒各四錢

北細辛 去葉

乾薑

蜀椒 各二錢半

右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓鹽酒下服之

一月自然有孕局方四物湯羊肉圓多服亦效

抑氣散治氣盛於血所以無子尋常頭暈膈滿體痛怔忡皆可服之香附子乃婦人之仙藥不可謂其耗氣而勿服

香附子 炒杵淨四兩

茯神 去木一兩

橘紅 二兩

甘草 炙一兩

右為末每服二錢食前沸湯調服仍兼進紫石英圓

灸用

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

小溫經湯治經血不調血臟冷痛此方甚平易用藥且

不多

當歸 去尾

附子 炮去皮臍

右為末每服三錢水一盞半煎空心溫服

秦桂圓治婦人無子經進有效

秦艽

桂心

杜仲 炒斷絲

防風

厚朴 各三分

附子 生

白茯苓 各一兩半

白薇

乾薑

沙參

牛膝

半夏 各半兩



人參 一兩 細辛 二兩一分

右並生礪為末煉蜜圓如赤荳大每服三十圓空心食前醋湯或米飲下未效更加圓數次覺有孕便不可服

陽起石圓治丈夫真精氣不濃不能施化是以無子

陽起石 火煨紅研極細

鹿茸 燎去毛酒煮焙

兔絲子 水淘淨酒浸蒸焙別研

天雄 炮去皮韭子 炒

肉蓯蓉 酒浸已上各一兩

覆盆子 酒浸石斛 去根

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

桑寄生 沉香 別研

原蚕蛾 酒炙五味子 各半兩

右為末酒煮糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心

鹽湯或鹽酒下

濟陰丹治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脉

虛損胞內宿挾疾病經水非時暴下不止月內再行或

前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小

便白濁心上疾訂皆令孕育不成以致絕嗣 方見前

灸法婦人絕子灸然容五十壯在內踝前直下一寸

又法絕嗣胞門閉塞灸關元穴三十壯通之

婦人妊子不成數墮腹痛漏下灸胞門五十壯在關

元左邊二寸是也右邊二寸名子戶

雜方

厚朴圓治婦人胃冷嘔吐不下食

厚朴 去麤皮切薑汁炒三兩

附子 去皮剉如荳三兩

右以生薑汁一升水五合煮令汁盡焙乾為末以酒

煮神麴為圓梧桐子大每服三十圓不拘時溫酒下

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

芎歸湯治頭暈痛諸脉平和惟肝脉獨弱可預見有崩

疾來及治血虛頭暈 方見前即佛手散

橄欖圓止渴潤咽乾

川百藥煎 烏梅 甘草 石膏 各等分

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓噙化

橘歸湯治肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失常

經以致如此服之神效

橘皮 二兩 當歸 一兩



乾再取甘濕散薄傳瘡上使徧可經半日又以湯搨

搨訖如前敷藥

甘濕散用五月五日蝦蟆青木香石硫黃鋪精為末生麝香臨時加入

藿香養胃湯治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

藿香

白朮

白茯苓

神麴

炒

烏藥

去木

縮砂仁

薏苡仁

半夏麴

人參

各半兩

華澄茄

甘草

炙各三錢半

右剉散每服四錢水盞半薑五片棗二枚同煎不以

時

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十五

妳癰瘡

黃瓜萐

一二箇連皮穰子剉碎

右用無灰常酒一二升於沙瓶內煮存一升去滓時

時溫服酒盡再煮滓服如覺初時便服此藥即時止

痛更不成瘡如已成瘡服之其瘡自穿而痛自止

又方尚未成瘡纔覺腫硬作痛以蔥白熨之其法用中

樣小海味瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填之

不封口用蔥葉及蔥白槌損令徧覆瓶口以手帕子

裏定倒執將瓶口向腫處任意輕輕熨之有驗

治茄子疾心燥連綿黃水易治白水難愈烏金二豆散

薑棗子煎溫服

方見前

又方生枳殼為散煮熏洗却用綃帛包枳殼滓納入陰

中即日漸消

圓方茄皮白礬馬稻頭根朴硝澤蘭煮水熏洗加入炒

茄灰少許

敷藥朴硝為末黃瓶柴燒瀝調敷或用濃鉄漿水敷

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十五

丁疽病心燥四肢痠癢輪冷痛或腹中絞刺小嘉禾

散猪肝蒜片煎服

方見前

又方硫黃一兩大鯉魚一箇去頭皮納入藥故紙裏黃

泥固濟火煨煙盡為末米糊圓梧桐子大每二十圓

溫酒下如下疽生蟲所下如柿汁臭穢心中疔痛悶

絕虛煩甚者不可治

磁石散治子宮不收名癰疾有痛不可忍者

磁石

酒浸火煨



右為末糯米糊圓梧子大每服二十圓空心滑石湯下

鐵粉散治同前

當歸 磁石半兩酒浸 鐵粉

右為末米飲調下隔夜用角藥次日服此角藥用錢粉螺青為

末磨刀水調塗產門上

熏洗方荆芥穗藿香葉臭椿樹皮煎湯熏洗即入

三萸圓

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

食茱萸 吳茱萸湯洗微炒 桔梗水浸一伏時取出漫火焙

白蒺藜 青皮去白 山茱萸去核取肉

舶上茴香湯去砂炮各一兩 五味子淨揀 海藻

大腹皮酒浸過 川練子去核 玄胡索各一兩二錢半

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十五圓木通湯下下虛加川烏炮去皮肉桂去麤皮各一兩腰腹疼夏用桃仁去皮尖麤炒別研青皮去白枳實去穰各一兩為南木香七錢半

一捻金圓服前藥未效却用

玄胡索 舶上茴香 吳茱萸炒 川練子

青木香各二兩

右為末粳米糊圓如梧桐子大每服三十五圓空心

木通湯服又用梅花腦子半錢鐵孕粉一錢水調刷

上如陰畔生疤以涼血飲每服三錢加凌霄花少許

煎空心服見前

四物湯治產有艱難或一歲一產可以此少間之每服

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十五

三錢加薑臺子一撮於經行後空心服又方用

對麻葛根湯二兩加瞿麥乾土牛膝栝蒌根豆豉炒各

半兩為散分作八服空心一日二服

世醫得效方卷十五



欽定四庫全書

世醫得效方卷十六

元 危亦林 撰

眼科

總論

人有雙眸如天之有兩曜乃一身之至寶聚五臟之精華其五輪者應五行八廓者象八卦凡所患者或因生食五辛多啖炙燂熱滄麪食飲酒不已房室無節極目

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

遠視數看日月頻視星火夜讀細書月下觀書抄寫多年彫鏤細作博奕不休久處煙火泣淚過多刺頭出血多若此者俱喪明之本復有馳騁田獵衝冒塵沙日夜不息者亦傷目之媒又於少壯之時不自保惜逮至四十以漸昏蒙故善衛養者纔至中年無事常須瞑目勿使他視非有要事忽宜輒開則雖老而視不衰大抵榮衛順則斯疾無由而生榮衛衰則致病多矣且傷風冷則淚出虛煩則昏蒙勞力則眚赤白腫則脾家受毒生



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

瘡則風熱侵肺黃乃酒傷於脾血灌瞳人及赤色俱是心家有熱羞明見紅花為午令黑花則腎虛青花膽有寒五色花為腎虛兼熱不可一槩為治若虛不補而實不瀉亦難收效然上虛乃肝虛下虛乃腎虛肝虛則頭暈耳聾目眩腎虛則虛壅生花耳作蟬鳴大宜補肝益腎其有熱淚交流兩臉赤痛乃肝之極熱迎風有淚為腎虛客熱涼肝瀉腎必得其宜至於五臟各以類推虛則生寒實則生熱補瀉之用須在參詳毫釐之差千里之謬餘則無非有所觸動或大病之後所患不一至如暴赤一證多因泛熱衝上或眠食失時飽食近火得之加以勞役失於調攝過食毒物變成惡證醫者不原本始但知暴赤屬陽或以散血之劑或以涼心之藥縱使退散遂致脾經受寒飲食不進頭目虛浮五臟既虛因成內障亦有見其不進飲食俾更服熱藥遂致三焦暴燥熱氣上攻昏澁眵淚或犯盛怒辛苦重勞遂生努肉心氣不寧風熱交併變為攀睛證狀不一是為外障又




迪志文化出版有限公司出版

若讀書博奕等過度而致疾者名曰肝勞不可但投以治肝之劑及作他證治之卒於莫效惟須閉目珍護不極遠視度乎可廖若夫患風疹者必多眼暗先攻其風則暗自去婦人胎前產后用藥亦須避忌小兒所患切宜慎治惟畧加淋洗披鑱針灸端不可施猶須戒其用手頻揉或因茲睛破至於莫救以上諸證專是科者宜留意焉

五輪之圖

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六



白屬肺	氣之精氣輪
黑屬肝	筋之精風輪
上下脰屬脾胃肉之精肉輪	
大小背屬心	血之精血輪
瞳仁屬腎	骨之精水輪

風輪病因喜怒不常作勞用心晝凝視遠物夜勤讀細書眼力既勞風輪內損其候背頭尤澁睛內偏疼視物不明胞胬緊急宜去風藥

血輪病因憂愁思慮悲喜煩勞內動於心外攻於目其候赤筋纏背白障侵睛胞腫難開昏暮多澁日久不
治失明愈深宜洗心涼血藥

肉輪病因多食熱物好喫五辛遠道奔馳駐睛驟騎食飽耽眠積風痰壅其候胞胬赤腫暴赤昏蒙眼淚常

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六


盈倒睫澁痛瘀血侵睛宜服醒脾藥

氣輪病因凌寒冒暑吸飲寒漿肌體虛疎寒邪入內或痛或昏傳在白睛筋多腫赤視日如隔霧觀物生煙日久不治變成白膜黑暗難開

水輪病因勞役不止嗜慾無厭大驚傷神大怒傷志加之多食酒麪好啖鹹辛因動腎經通於黑水冷氣淚鎮流於臉上飛蠅相趨於睛前積聚風虛或澁或痒結成翳障多暗多昏宜補腎藥



八廓之圖



天廓	傳道	肺大腸
地廓	水谷	脾胃
火廓	抱陽	心命門
水廓	會陰	腎
風廓	養化	肝
雷廓	闕泉	小腸
山廓	清淨	膽
澤廓	津液	膀胱

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

天廓病因雲中射鴈月下看書多食腥膻侵冒寒者致

目廓有病內動視物生煙背疼難開不能辨認

地廓病因濕漬頭上冷灌睛眸致令有病眼眩緊急瘵

血生瘡

火廓病因心神恐怖赤脉侵背血灌瞳人熱淚如傾其

證臉頭紅肺睛內偏疼熱淚難開

水廓病因大勞努力爭鬪擊棒開弓驟騎強力致令生

病常多暗二睛眩淚多



迪志文化出版有限公司出版

風廓病因枕邊牕穴有風不能遮閉坐卧當之腦中邪
風攻於風廓以致黑睛多痒兩臉常爛或昏多淚
雷廓病因失枕睡卧酒後行房血脉溢滿精宣閉滯風
虛內聚上攻故令背頭赤腫臉內生瘡倒睫拳毛遮
睛

山廓病因撞刺磕損致令肉生兩臉翳閉雙睛若不早

治永沉昏暗瘵血侵睛

澤廓病因春不宣解冬聚陽毒多喫脂肥過飧熱物致

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

令腦脂凝聚血淚攻潮有如霧籠復見飛蜂繚繞黑

花常滿難於瞻視

七十二證方

內障

圓翳第一

圓翳者黑珠上一點圓日中見之差小陰處見之則大

或明或暗視物不明醫者不曉以冷藥治之轉見黑花

此因肝腎氣虛而得也宜服後藥



迪志文化出版有限公司出版

地黃湯		熟地黃		白茯苓 去皮		家菊		細辛 各半兩	
芍藥 三分		柏子仁 一分		甘草 半錢炙		防風 一分			
北柴胡 一兩去蕾		右剉散每服三錢水一盞半煎食后服							
補腎圓		巴戟 去心		山藥		破故紙 炒		茴香	
牡丹皮 各半兩		肉苁蓉 一兩酒浸		枸杞子 一兩		青鹽 一分后入			
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六									
右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空心鹽湯下									
冰翳第二									
冰翳者如冰凍堅實傍觀目透於瞳人內陰處及日中看之其形一同疼而淚出此因膽氣盛遂使攻於肝而得之宜服後藥									
通肝散									
山梔子		蒺藜 炒去尖		枳殼 去白		荊芥 各半兩			
車前子		牛蒡子 各一分炒		甘草 五錢炙					

右為末每服二錢苦竹葉湯調食後服	
滑翳第三	
滑翳有如水銀珠子但微含黃色不疼不痛無淚遮繞	
滋翳第四	
滋翳微如赤色或聚或開兩傍微光瞳人上如凝脂色時復滋痛而无淚出	
散翳第五	
散翳形如鱗點或瞼下起粟子而爛日夜痛楚瞳仁最疼常下熱淚	
前件三訂並是肝肺相傳停留風熱宜服	
八味還睛散	
白蒺藜	炒去尖
防風	
粉草	炙
木賊	
山梔	炒去設
草決明	一兩炒
青箱子	一分微炒
蟬退	一分炒
右為末麥門冬去心煎湯食後調下	
橫開翳第六	
此證上橫如劒脊下面微白甚薄不赤不痛病此希少	



浮翳第七

此疾上如水光白色環遶瞳人初生自小背頭至黑珠上不痛不痒無血色相潮

沉翳第八

此病白藏在黑水下向日細視方見其白或兩眼相傳疼痛則早輕夜重間或出淚

偃月翳第九

此疾膜如凝脂一邊厚一邊薄如缺月其色光白無瑕

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十六

疵

前件諸證並不可治皆是宿生注受當有此病縱強用藥終無安日

棗花翳第十

此候周回如鋸齒四五枚相合赤色刺痛如針視物如煙夜輕而晝則痛楚迎風多淚昏暗不見

白翳黃心十一

此候四邊皆白但中心一點黃大小背頭微赤時下澁

淚員團在黑珠上

前件亦是肝肺相傳停留風熱宜服前還睛散后墜其風熱

黑花翳十二

此候其狀青色大小背頭澁痛頻頻下淚口苦不喜飲食蓋膽受風寒宜服

涼膽丸

黃連
洗
不見火

荊芥

黃芩
草龍膽
各半

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十六

兩

蘆薈

防風
各一兩
黃柏
去皮

地膚子
一分

右為末蜜圓梧桐子大每服三十九薄荷湯下

胎患十三

此候初生二三歲觀物則近看轉睛不快至四五歲瞳人潔白昏蒙不見延至年高無藥可治蓋胎中受熱致損其目莫能治之

五風變十四



五色變為內障其候顏色相間頭疼甚却無淚出兼毒風腦熱所致日中如坐暗室常自憂歎

雷頭風十五

此候熱毒之氣衝入眼睛中年牽引瞳人或微或大或小或視全不見

驚振十六

此候因病目再被撞打變成內障日夜疼痛淹淹障子赤膜遠目不能視三光亦如久病內障

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十六

前件四證設有患者俱不可治所謂針刀難下手藥力並無功若強治之不過還睛散然終難愈

綠風十七

此病初患則頭旋兩額角相牽瞳人連鼻鬪皆痛或時紅白花起或先左而後右或先右後左或兩眼同發或吐逆乃肺之病肝受熱則先左肺受熱則先右肝肺同病則齊發先服羚羊角散後服還睛散

方見前

羚羊角散

家菊

防風

川芎

羌活

車前子

川烏

炮去皮尖
各半兩

半夏

泡

羚羊角

薄荷葉

各一分
細辛一兩

右剉散生薑煎或為末食後荊芥茶清調下

烏風十八

此眼雖痒痛而頭不旋但漸漸昏暗如物遮定全無翳障或時生花此肝有實熱宜服

瀉肝散

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十六

郁李仁

荊芥

各一分

甘草

炙

大黃

各半兩

右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服

黑風十九

此眼與綠風候相似但時時黑花起乃腎受風邪熱攻於眼宜涼腎

青風二十

此眼不痛不痒瞳人儼然如不患者但微有頭旋及見生花或勞則轉加昏蒙



前件二證宜服還睛散 方見前

肝虛雀目二十一

雀目者肝臟虛勞時時花起或時頭疼年深則雙目盲小兒患者因疳得之

高風雀目二十二

雀目二證病狀雖同中有異處蓋高風纔至黃昏便不見經年瞳子如金色所謂黃風者即此也

前件二證均不可治

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

肝虛目暗二十三

此病遠視不明眼前花子頻起背目皆赤痛有時看一成二此乃肝虛宜服補肝散稍稍加涼劑與之 方見前
外障

肝臟積熱二十四

眼先患赤痛腫疼痛自淚澁難開忽生翳膜腫或初患一目不見以致兩目齊患此因作勞用力肝膈熱勞宜服

大決明散

石決明 炒一兩 草決明 炒 羌活 山梔子 各半

兩

木賊 五錢

大黃 煨

荊芥 各一分

青箱子 炒 芍藥 各半錢

右為末每服二錢麥門冬去心煎湯調食後服

傷寒熱病後目昏二十五

傷寒病安後眼目疼痛紅腫或食毒物過多壅熱上衝熱淚交流澁痛難開兼生翳膜宜服前決明散后春雪

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

膏點之

混睛二十六

此候白睛先赤而後痒痛迎風有淚閉澁難開或時無事不久又發年深則睛變成碧色滿目如凝脂赤路橫赤如絲此毒風積熱宜服

地黃散

生地黄 一兩 芍藥 半兩 土當歸 半錢 甘草

右剉散每服三錢水一盞半煎食后溫服



弩肉攀睛二十七

此證或先赤爛多年肝經為風熱所衝而成或用力作勞有傷肝氣而得或痒或痛自兩背頭努出心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛或起筋膜宜服

二黃散

黃芩

大黃

防風

薄荷

各半兩

右剉散每服三錢水一盞半蜜少許煎食后臨睡溫服

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

定心圓

石菖蒲

甘菊

枸杞子

各半兩

辰砂

二錢

遠志

一分
去心

麥門冬

一分
去心

右為末蜜圓梧桐子大每服三十圓食后熟水下

兩臉粘睛二十八

此乃爛眩風是也雙目赤爛粘滯經年不安或痒或痛宜服消風散桑白皮煎湯調下

方見風科熱證類
仍用驅風湯洗

膜入水輪二十九



迪志文化出版有限公司出版

此因黑珠上生瘡稍安其痕疤不沒侵入水輪雖光未絕終亦難治

釘翳根深三十

此因心肝滯留偏熱致使眼疼痛生翳膜經久其色如銀釘釘入黑睛此證不可治

黑翳如珠三十一

此起在黑水上如小黑豆疼痛而淚出不可用點藥此乃腎虛受風熱而得之宜先服羚羊角散後服補腎圓

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

方見前

花翳白陷三十二

此白翳旋遶瞳仁點點如花白鱗砌者乃因肝肺伏藏積熱又喫熱物因而得之宜膏藥點後服前羚羊角散

水瑕深翳三十三

此乃黑水內橫深瑕盤青色沉沉深入痛楚無時蓋五臟俱受風熱宜服

二荆散



迪志文化出版有限公司出版

蔓荊子	荊芥	苦竹葉	甘草	各半兩
山梔子	一分			
去皮				
右剉散每服三錢水一盞半薄荷七葉煎溫服				
玉翳浮滿三十四				
此證黑珠上浮玉色不疼不痛翳根不紅不宜針割但服前還睛散磨翳膏點之即愈	方見後			
因他病後生翳三十五				
眼內他病得時漸漸不見初則微生翳膜後則遍睛俱白患此者無可治矣				
順逆生翳三十六				
翳自上而生下者為逆自下生上者為順逆則難治順則易安宜用點藥				
磨翳膏				
空青	二錢	片腦	三錢	薤仁
				一兩
				口含
				去皮殼
右於乳鉢內研合盛旋點之				
鷄冠蜆肉三十七				



醫生在瞼內如鷄冠蜆肉或青或黑須翻出看之阻礙痛楚怕日羞明蓋脾經先受熱后有所傳宜服決明散						
瞼生風粟三十八						
兩瞼上下初生如粟米夫漸漸大如米粒或赤或白不甚疼痛堅硬者蓋肝壅瘀血所成宜服						
大黃散						
大黃	半兩	煨	牛旁子	一分	甘草	一分
			炒			
右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服						
胞肉膠凝三十九						
眼胞皮肉有似膠凝腫高如桃李者時時出熱淚乃風毒所注宜消風散及花草膏點之	方見風利熱證類及見后					
漏睛膿出四十						
背頭結聚生瘡流出膿汁或如涎水粘睛上下不痛仍無翳膜此因心氣不寧并風熱停留在瞼中宜服						
白薇圓						
白薇	半兩		防風		白蒺藜	去角
					炒	石榴皮



羌活

右為末米粉糊圓如梧桐子大每服二十圓白湯下

蟹睛疼痛四十一

此證如大豆出黑珠上疼痛不可忍又名損翳亦不可用點藥宜服前決明散

突起睛高四十二

風毒流注五臟不能消散忽然突起痒痛熱極所致宜服前瀉肝散

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

風起喝偏四十三

偏風牽引雙目喝斜淚出頻頻却無翳膜不痒不痛宜服消風散用荊芥湯下

方見風利
熱證類

倒睫拳毛四十四

此疾淚出涓涓翳膜漸生乍愈乍發多年不安眼皮漸急睫倒難開如刺刺樣痛腫人不安此乃脾受風熱先服瀉肝散後服

五退散

蟬退

洗

蛇退

醋炙

荊芥

猪蹄退

一分

燒存性

穿山甲

燒存性

川烏

炮去皮

粉草

各半兩

蚕退

二錢半

右為末鹽湯調下二錢

風牽臉出四十五

上下臉俱赤而或翻出一臉在外此亦脾受風毒宜服前五退散若患年深臉內俱赤則不可治之

神崇疼痛四十六

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

舊無根因忽然疼痛或如針刺或如火炙及太陽穴掣痛早輕晚重先宜求福却服決明散

方見前

旋螺尖起四十七

目疼痛生翳膜尖起而赤似旋螺宜服前通肝散次服前決明散

鵝眼凝睛四十八

輪硬而不能轉側此為鵝眼凝睛此不可治

轆轤轉關四十九



此乃睛藏上下瞼不能歸中所以言之為轆轤也其證亦難治然當且服後藥

天門冬飲子

天門冬

芫薺子

知母

各二兩

五味子

防風

各一兩

人參

茯苓

羌活

各兩半

右剉散每服三錢水一盞煎食後服

瀉肝散

麥門冬

去心二兩

大黃

黃芩

細辛

欽定四庫全書

世醫得效方卷十六

芒硝

各一兩

黑參

桔梗

各兩半

右剉散每服三錢水一盞煎食后服

被物撞打五十

目被撞打疼痛無時瞳人被驚昏暗濛濛眼眶停留瘀

血用地黃膏貼去血次服前决明散

地黃膏

生地黄

一合

黃連

一兩

黃柏

寒水石

各半兩

右地黄研自然汁和藥成餅子要用時以紙貼目上非但是撞打可用凡風熱赤目熱淚出等眼皆可用以其性涼能逐去熱毒耳

撞刺生翳五十一

因撞刺生翳疼痛無時經久不安者復被物撞之兼為

風熱所攻轉加痛楚昏暗不見宜服

經效散

大黃

當歸

芍藥

各半兩

北柴胡

一兩

欽定四庫全書

世醫得效方卷十六

粉草

連翹

各一分

犀角

一錢后入

右剉散每服三錢水一盞煎食后服仍用后磨翳膏

點之

血灌瞳人五十二

瞳人為血灌注其痛如錐刺皆無翳膜覩物不明者或

因有損或由肝氣閉血無所歸而得宜引血歸肝

通血圓

生地黄

焙

赤芍藥

各半兩

川芎

一兩

甘草

五錢



防風

荊芥

當歸尾 各一兩

右為末煉蜜圓如彈子大食后荊芥薄荷茶嚼下血既散而歸肝又恐眼自生花須再用前還睛散服之

眯目飛塵五十三

塵埃飛揚入目粘睛不脫或被飛絲所侵或被沙石所苦疼痛引澁揩碎不開宜用後瞿麥散敷

天行赤目五十四

目忽然赤腫晨昏痛澁此天行時疾或長幼傳染不安

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

雖因熱氣相傳方有輕重宜服前瀉肝散即安虛人則用后五行湯洗

暴赤眼後忽生翳五十五

此證輕則無妨重則疼痛而白睛紅花乃生翳膜者是五臟積熱宜先用前地黃膏次服前瀉肝散

胎風赤爛五十六

小兒初生下便有此證至三四歲雙目紅而眵邊赤爛曉復痒痛經年不安先服消風散桑白皮煎湯調下仍

以后湯泡散洗

風赤目疾五十七

此症臉似朱砂塗而生瘡黑珠端然無所染此因風熱生於脾臟若經久不治則生翳膜宜服前五退散次湯泡散洗

衝風淚出五十八

風證至冬月極甚發作不休此因肺虛受風遇風冷發宜服

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

白僵蠶散

白僵蠶

直者去
絲青炒

粉草

細辛

各半兩

旋覆花

蒸熟焙
半兩

荊芥

一分

木賊

半兩

黃桑葉

一兩
嫩者

右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服

暴風客熱五十九

眼為暴風熱所攻白睛起障覆黑珠瞼腫痒痛宜服前藥



瞼硬睛疼六十

瞼中紅赤而堅硬眼睛疼痛而淚出無時怕日羞明宜服前通肝散若有障膜用後春雲膏點之

痛如針刺六十一

睛忽然疼痛如針刺雙目根緊急坐卧不安此因熱毒在心服洗心散次服前還睛散

方見大方
科積熱類

痒極難任六十二

眼痒極甚瞳子連背頭皆痒不能收瞼此因清淨腑先

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十六

受風熱得之宜服

消風一字散

川烏 半兩
炮
去皮尖 羌活

防風 各一分 川芎

荆芥

右為末每服二錢食后薄荷湯調下

起坐生花六十三

凡起坐生花或覺頭旋而悶耳內蟬鳴此乃腎虛兼受客熱不節房事宜多服補腎圓



迪志文化出版有限公司出版

瞳人乾缺六十四

此證其睛乾澁全無淚液或白或黑始則疼痛后來稍定而黑不見此證不可治療

黃膜上衝六十五

黑睛從下生其黃膜上衝疼痛至甚閉澁難開此乃脾經受風食毒傷胃而得之宜服

犀角飲

犀角 二兩

黃芩 半兩

白附子 一分
炮
去皮尖

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十六

麥門冬 一分
心 車前子

羌活 各半兩

右剉散每服三錢水一盞半煎食后溫服

赤膜下垂六十六

眼中有膜自上垂下遮黑睛或名垂簾膜望風淚出怕日羞明此乃客熱上衝用後明上膏點之次服前通肝散

小背赤脉六十七

小背中生赤脉漸漸衝眼急宜早治此蓋三焦積熱得



迪志文化出版有限公司出版

之宜服前犀角飲兼戒忌辛酸熱毒等物及房事方安

小兒通睛六十八

嬰兒雙眼睛通者欲觀東邊則見西畔若振掉頭腦則睛方轉此肝受驚風宜服

地黃膏

牛黃 一錢

犀角 二錢

金銀箔 各五片

甘草 一分

右為末蜜圓菜豆子大每服七圓用薄荷湯吞下

小兒斑瘡入眼六十九

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

眼胞患斑瘡熱氣衝透睛中疼痛淚出翳如銀片腫澀

難開宜服

柴胡散

柴胡

黃芩

芍藥 各半兩

甘草 一分

右剉散每服三錢水一盞煎大人小兒加減服兼以

藥墜洗之

餘方見後

小兒臉中生贅七十

眼臉中生贅子初生如麻子大日漸如豆懸垂臉內乃

脾經風熱所攻宜加減服前五退散

小兒疳眼七十一

小兒疳眼初生則澀痒久而生瘡翳腫難開怕見光明時時出淚此因肝風所攻或因瀉痢後虛熱上衝不可點宜服前還睛散

餘方見小方
科諸疳類

小兒青盲七十二

胎中受風五臟不和嘔吐黃汁兩眼一同視物不明無方可治

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

右七十二證方藥條陳于前毋謂其畧蓋眼科中用藥不可太繁或有好奇鳩撮衆藥合為一方不問虛實涼熱悉與服之羣隊爭功豈知補瀉溫涼之性各異其為害也不少可不戒之

虛證

三味磁朱圓丹砂之畏磁石猶火之畏水今合用之砂法火入心磁法水入腎心疾各得其養則目自然明蓋目疾多因脾胃有痰飲漬侵於肝久則昏眩神眇倍於



二味用以建脾胃消痰飲極有方効

神麴 四兩 辰砂 一兩 磁石 二兩 煅醋 淬柴 炊

右為末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓食前米飲日

進三服常服益眼力一方加夜明沙

大補腎圓治腎氣不足眼目昏暗瞳人開縮漸成內障

可服

磁石 煅醋 淬 染 兔絲子 酒蒸 研 各二兩 五味子

熟地黄 枸杞子 楮實 覆盆子

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六

茯苓 車前子 酒浸 石斛 去根 各一兩 沉香

青鹽 研 各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每七十圓空心食后鹽湯

下

養肝圓治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力

當歸 酒浸 車前子 酒浸 防風 白芍藥

薤仁 熟地黄 川芎 楮實 各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十圓不以時溫水

下

錦鳩圓治肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出怕日羞

明胞眩痒痛瞻視茫茫多見黑花或生翳膜並治之

草決明子 二兩 取粉 黃連 去鬚 杜蒺藜 炒 去

尖 防風 去蘆 甘菊花 煉淨 肉桂 去皮 各五

兩 薤仁 羌活 去蘆 瞿麥 各三

蔓菁子 二升 淘洗 絹袋盛 飯上 蒸一伏時 取出 曬乾 白茯苓 去皮

四兩 細辛 去苗 五兩 羯羊肝 一具 批 炙令焦

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六

斑鳩 一隻 去皮毛 腸背爪 用文武火 連骨炙乾

右為末煉蜜和杵五百下圓如梧桐子大每十五至

二十圓空心溫酒或得水下日午臨卧日三服如久

患外障眼服諸藥未效者漸加服五十圓必效暴赤

服疼痛食后用荊芥湯下二十圓

駐景圓治肝腎俱虛眼常黑暗多見黑花或生障翳旋

螺

兔絲子 酒浸 炒 取 末五兩 熟地黄 洗 三兩 車前子 三兩



右為末煉蜜圓梧桐子大每服五十圓空心溫酒下

青鹽圓巴戟圓治並同上

各見大方
科虛損類

錦鳩駐景青鹽巴戟四件合和鹽湯吞下二三十圓久
久服除昏花增目力大效

花草膏治患眼腫痛澁痒昏淚羞明

羯羊膽

一枚飯
上蒸熟

右以冬蜜研和入朱砂末少許頻研成膏食后臨卧

匙抄少許含嚥亦可點目

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

椒目圓治久年眼生黑花不可耐者

椒目

炒一兩

蒼朮二兩炒

右為末醋糊圓梧桐子大每服二十圓醋茶下十日

可效

黑神散治血壅赤腫臨卧酒調服

方見產科
產后類

神效參附正氣散治男子婦人痛不生糞此便是元氣

憊腎經虛夜間小便二三次耗傷陽氣致生內障腦中

有風致鼻流清涕或腦脂流下或瞳人開散此皆腎憊

黑水散也加炮附子枸杞子去生炒揀菊花葉生姜紅

棗煎食前空心服仍以錦鳩青鹽山藥八味等圓對和

食前溫酒服及四柱散十全大補湯去熟地黃加附子

枸杞子菊花蕊藿香正氣散並用薑棗煎服婦人服冷

藥過多或崩或白帶致令眼昏不見亦可服此急救

大方科諸氣類餘
方並見虛損傷寒類

熱證

清涼散治心熱衝眼赤腫時流熱淚羞明每服三錢水

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

一盞半燈心二十莖苦竹葉七皮生地黃二根桑白皮

七寸煎食后臨睡服

方見大方科積
熱類即八正散

聖效散治諸般風熱風痒熱毒大人小兒生翳生膜生

血筋但是外障熱眼並可服若內障是虛則不宜服

黃芩

北細辛

甘草

熟地黃

大黃

山梔子

赤芍藥

當歸尾

極細

者

牛蒡子

桑白皮

各二兩有翳
膜加一兩用

菊花

五兩
去梗



右剉散每服四錢水一盞半煎溫冷服合滓煎早食
午食晚間臨卧各一服忌鷄魚酒麪糯米鹹酸熱油
諸般毒物眼乃一身之主如不能忌已藥亦無功自
陷此身也每日惟白煑精猪肉米飯或山藥蘿蔔菜
果山查梨柿子銀杏土瓜榧子生葛可喫
地黃圓素問云久視傷血血主肝故勤書則傷肝而目
昏肝傷則自生風而熱氣上湊目昏益盛不宜專服補
藥當益血鎮肝而目自明

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

熟地黃

兩半

黃連

去鬚

決明子

各一兩

防風

甘菊花

羌活

桂心

朱砂

研

沒藥

研各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大食后熱水下三十圓日三

服

決明散治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤
脉努肉或澁痒羞明多淚或始則昏花漸成內障但是
一切暴風客熱並宜服之

黃芩
甘草
石膏
蔓荊子
石決明
右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎食后服
敗毒散治熱眼澁痒昏蒙每服三錢加薄荷桑白皮煎
方見大方
科傷寒類

羊肝圓治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羯羊肝

一具生用

黃連

去項別研為末

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

右先將羊子肝去筋膜於砂盆內搗爛入黃連末杵

和為丸梧桐子大每服五十圓不拘時候熱水下

五行湯治眼暴赤時行赤腫作痛

黃蘗

用力畧去粗皮取
內皮不以多少

右以濕紙裹黃泥包煨候泥乾取出每用一彈子大

紗帛包水一盞浸飯上蒸熟乘熱熏洗極效此方有

金木水火土故以名一圓可用二三次

退赤膏治赤眼



右用生地黃肥者洗淨研細絹帛包之仰卧以藥搭在眼上初似碍而痛少頃清涼小兒赤眼黃連為末水調貼脚心其赤自退

又方治血灌瞳人生障膜

右用生地黃研細和大黃末成膏以帛鋪二寸揜在眼上可再易之

黃連湯治火眼

鷹爪黃連

七莖去毛節

杏仁

七粒去皮尖

北棗

七枚大者

欽定四庫全書



世醫得效方卷十六

右用新瓦盆存貯入水八分以紙覆蓋慢火熬存二

三分放在地上去火毒候冷存在湯瓶上蒸溫不要

熱病者仰卧令人滴藥汁在眼尖角近鼻者候口中

有苦味即是藥透如未知苦則一面滴數次即安其

效如神

蔓荊散又名小洗肝散治赤腫澀痛多淚

瓜根

蔓荊子

荊芥

梔子

甘草

右剉散每服三錢水一盞煎先熏後服食后用之點眼方治眼目赤腫翳障羞明

鵬砂

三錢

腦子

一錢

通明朴硝

五錢

右為末入乳鉢研再用細絹羅過每用一小錢光弦者點津液沾藥末入目中閉霎時令藥自方開眼淚出效

神針散治全前

木賊

五錢去黑不用陳者

香附子

去毛

細辛

洗淨日乾

欽定四庫全書



世醫得效方卷十六

菊花

去梗蒂

羌活

各五錢

右為末每服二錢用好茶少許同點食后服

又方治眼有血紅或有紅線及生糞此是熱眼服前經效散

又方治眼開不得羞明怕日此是風熱牽閉所致芎芷香砂散加前胡連根葱白三莖煎服若臟腑閉加大黃

小兒翳障及瘡疹不得開加生桑白皮七寸同煎根新

能瀉肺膜不生翳便退

方見大方傷寒類



石決明散治眼生外障不問男女小兒皆治先服經效散不退却進此藥

石決明 一兩 火煨 蒺藜 炒去刺 二兩 薄荷葉 一兩

人參 蜜炙 五錢

右各於地上出火毒研末每服二錢沙糖冷水調食

后服

食治方治眼赤腫及治每睡起時赤須臾又白名血熱非肝病也

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六

右以生地黄自然汁以粳米半斤三次浸三次曝乾

用磁瓶煎湯一升令沸下地黄及米煮成薄粥半飽

飢飲一兩盞即睡三次立效

貼藥治眼痛十分甚者

右以生薑自然汁調飛過白礬貼眼胞上痛即止

又方治風熱上衝弩肉攀睛

右用青萍少許研爛入片腦子少許貼眼上頓效

風證

消風散治昏澁風痒加荊芥煎湯服 方見風利熱證類

撥雲散治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜

蟬退 去足 木賊 去節童便 浸一宿 白蒺藜 炒 搗

去刺 羌活 各三兩 甘菊 去四兩

甘草 各二兩

右為末每服二錢食后茶清調下

白蒺藜散治腎經風毒攻眼昏淚澁痒

白蒺藜 炒去刺 防風 甘草 各一兩 甘菊 去一兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六

半 生直殭蠶 炒去青 一兩 天南星 半兩

用黑豆二合青鹽半兩水煮透焙去鹽豆

右為末每服二錢沸湯少鹽點服

蟬花無比散治風眼氣眼昏淚痒翳膜或頭風牽引眼

小胞爛並治之

石決明 用東流水入鹽煮 一伏時細研如粉 當歸 防風

羌活 各一兩 菊花 洗晒 甘草 炙各一兩 荊芥

細辛 蛇皮 皂角水洗新 瓦焙各半兩 茯苓 二兩



蒺藜 炒去刺 四兩 芍藥 蒼朮 童尿浸二宿去皮切碎各一兩	右為末每服二錢米泔或茶清食后調下	荊芥散治風熱攻眼赤腫	荊芥穗 梔子仁 牛蒡子 蔓荊子	甘菊花 細辛 甘草 炙 防風	白蒺藜 玄參 川芎 大黃	黃芩 木賊 去節童尿浸 草決明 各半兩 蒼朮 米泔宿焙一兩	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六	右為末每服二錢紫蘇或蜜湯調食后臨卧服	祛風散治風毒攻眼昏淚癢	蒼朮 日換童便浸二宿剉晒 防風 二兩 白蒺藜 炒搗	去刺二兩 荊芥穗 一兩半 甘草 鹽水炙七錢半	右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服或用消風散	夾和尤佳 方見風科熱證類	龍膽湯治爛眩風赤浮翳努肉攀睛澁痒眵淚	防風 去蘆 龍膽草 各五錢 銅青 三錢 五倍子 二錢

淡竹葉 一粒去根	右為末每服半錢熱湯一合泡停冷澄清洗捷效	取蟲方治爛眩風此眼有蟲絲其絲色赤而長滋生不已	覆盆子葉 不以多用	右洗淨研自然汁以皂紗帛蒙在眼上以筆蘸藥汁	於二下眼眶當有細蟲出於紗上或研細著藥於紗	上便蒙亦可此方治眼暗不見及冷淚浸淫不止乃	青盲者其法搗取自然汁澄陰乾入飲男子乳化開	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六	點入目中即仰卧更入少許腦子尤好三四日間視	物如年少	捷效方治爛眩風眼痒痛淚漬兩瞼皆成瘡百藥不效	用此點之須臾淚下從瘡中流出其間有小蟲立愈	黃連 淡竹葉 各一兩 相樹皮 半濕用	右剉散以二升水煎至五合稍冷用滴目內兩背及	洗爛處日三四次	洗方治爛眩風赤眼



五倍子

搥碎去
蛀末

蔓荊子

揀淨

右用水煎澄清溫熱洗或用桑枝灰淋水洗亦效

又方青礬火煅研出火毒每用半匕熱湯一盞泡洗爛
眩筋及拳毛倒睫效

又方治眼痒多因布巾拭破了眼眩致成爛眩風不得

乾

白礬 一兩煨過

銅青 三兩

右同研細和勻如色白再加銅青每用半錢熱湯一

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

合泡汀清以手蘸開眼如法洗必澁不可拭乾但閉

目坐待澁止自然眼開如藥冷將紙蓋蓋面于湯瓶

上坐溫又洗一日洗四五次即效

氣訂

木香流氣飲治因怒氣或食熱物或飲酒而致目赤眼

胞紫内生赤脉加大黃煎服復加川芎治氣眼浮軟上

壅

分心氣飲治同上挾熱者服之特效

方並見大方
科

石膏羌活散治久患雙目不覩光明遠年近日內外氣
障瞳人昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活

治內熱
頭風

蜜蒙花

治羞明
見日

木賊

退翳
障

川白芷

清
頭

北細辛

去葉
除風

蘿蔔菜子

起倒睫

麻子

起拳毛

川芎

治頭風

黃芩

洗心
退熱

石膏

清頭
目墜

痰

藁本

治頭風
頭疼

甘草

解諸藥毒
各等分

右為末每服二錢食后臨卧蜜水一盞調下或茶清
或淘米第二遍泔水調日進三服至十日漸明二十

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

日大效

翳障

神醫散治目內翳障兼治瘡疹后餘毒不散目生翳膜

真蛤粉

細研一兩

穀精草

一兩為末

右和勻每服二錢用生猪肝一片三手指大批開摻

藥在上捲定再用麻子一札濃米泔一椀煮肝熟為

度取出稍冷食后臨卧細嚼却用元煮肝米泔送下

忌一切炙煇毒物



名方治目赤后暴生翳

右以鵝不食草塞鼻中立瘥

觀音夢授方治內障及因病赤眼食減物而得者

夜明沙

洗淨

當歸

去尾

蟬退

去足

木賊

去節
淨各

三兩

右為末用白羯羊肝四兩湯煮爛搗如泥入藥末丸

如梧桐子大食后溫熱水下五十丸百日眼如故矣

羊肝丸治翳障青盲服之眼可復明

方見前

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

眼藥方治外障眼

亦名一方

右以猪膽一枚用銀石器煎成膏入冰片腦子少許

點入眼中微覺翳輕又用猪膽白蘇皮陰乾合作小

鳳頭釵大小止用一頭燒作灰待冷點翳數日后翳

退

葛仙翁方治內障有效

生熟地黃

川椒

去目及閉口
者微微炒

右等分為末煉蜜圓梧子大空心鹽湯米飲下五十

圓

又方治瘡疹入眼及昏暗翳尤妙

右用兔子糞焙為末每服用好茶清調下即安須待

瘡瘡安后服此

重明散治風熱內外障氣眼疾

川獨活

去蘆

川羌活

去蘆

川芎

射干

仙靈脾

防風

去蘆

甘草

片泉石

蒼朮

各五錢

草決明

丹參

白朮

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

石決明

右剉散每服三錢水一盞半煎溫服食后臨卧日三

服

小五退散治內障眼

蟬退

蛇蛻

蚕紙

烏雞卵殼

男子髮

右火燒存性研為末每用一錢和羊肝湯喫不以時

常服



熟地黄圓治內障眼

熟地黄 麥門冬 車前子

右等分旋焙旋研煉蜜圓用酒送下二三十圓屢效

退翳圓治眼目昏翳

蟬退 洗晒 蒼朮 童子尿浸 熟地黄

川芎 白蒺藜 炒杵去刺 芫薺子

羌活 木賊 去節童尿浸 甘菊

荊芥 石決明 煨存 杏仁 去皮 兔絲子 酒研

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六

浸焙 蛇皮 酒浸洗 防風 各五錢

右為末煉蜜圓如彈子大每一圓食后細嚼薄茶下

黃連膏治遠年近日翳膜遮障睛瘀肉連眶赤爛視

物昏暗不觀光明隱澁多淚迎風難開治之神效

盧甘石 鍋子盛火煨七次入黃連水細研飛過候澄在

黃連 石以多少搥碎水浸一宿去滓將粉紅盧甘

下去上面水曝乾再用乳 桑柴 燒存

浸極細羅過方可用三錢 龍膽草 不以多少洗淨日乾不

細末 錢 見火細研為末一錢

好黃丹 不以多少 水飛淨

右件同白蜜四兩一處入在一紫黑磁器內文武火

慢熬以竹篦子攪如漆色不粘手為度切勿犯生水

仍不用鉄器熬藥藥成依舊以磁器盛頓每服用如

皂角子大新冷水半盞化開洗三日不用每日洗數

次無妨藥盞須用紙蓋不可犯灰塵截赤目極有功

效

神仙照水膏治障翳

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六

黃蠟 黃丹 水飛 各一兩 蛇蛻 一分 燒 水銀 一錢

初生烏雞殼

右以柳木槌研細滴蠟為餅臨卧用之候天明將水

照眼藥投水中其氣上達自能退翳

聖水丹神驗點翳

朱砂 半錢 海螵蛸 一錢

右入乳鉢內同研細水飛過澄取又用少許黃蠟溶

旋入藥待要用時就火旋圓如蘿蔔子大臨卧用一



圓點入眼角緊合眼睡著次日用溫湯洗下未全退者更用一服極妙

通治

點眼膏子治眼目諸疾

右用羊膽一枚入蜜一錢在內線扎定甘鍋內蒲入水煮熟冷水內浸取出候乾傾入瓦罐內竹筴點眼四角效

洗方湯泡散治肝虛風熱攻眼赤腫羞明漸生翳障

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

當歸尾

赤芍藥

黃連

去鬚

杏仁

各五錢

銅青 二錢

薄荷葉 三錢

防風 五錢

右剉散每用二錢極沸湯泡乘熱先熏后洗冷則再煖每日兩三次又方沸湯白鹽入少許閉目沃洗鹽亦散血

水淋法治眼睛腫脹突出新汲水沃眼中數換水睛目入仍以麥門冬桑白皮山梔仁煎湯通口服之

明目膏治遠年日近不覩光明內外障眼攀睛瘀肉眩

眶赤爛隱澁難開怕日羞明多眵有淚視物茫茫時見黑花或瞼生風粟或翳膜侵睛時發痒痛並皆治之此藥神妙兼治口瘡塗之立愈

白沙蜜 一斤 黃丹 四兩

硃砂

乳香

青鹽

輕粉

鵬砂

腦子

各二錢並

別研

麝香

半錢別研

金星石

銀星石

井泉石

雲母石 各一兩

黃連

去須

烏賊魚骨

各半兩

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十六

右件藥於淨室中不得令雞犬婦人見用銀石器慢火先炒黃丹令紫色次下蜜候熬得沫散其色皆紫次入臘月雪水三升再熬二十餘沸將餘藥研成末一處同熬用筴滴於指甲上成珠不散為度以厚紙三張鋪在筴箕上傾在紙上濾過再用瓶子盛放在新水內浸三晝夜去火毒其水日一易之看病眼輕重臨晚用筴蘸藥點大背頭以眼澁為度若治內障用麪水和成條捏作圈子臨卧置眼上傾藥在內如



此用之一月見效

治赤眼後生翳膜方

右以蘭香子淨洗曬乾每用一粒以筋點大背頭閉目即覺藥在目內團圓旋轉藥力過即不轉須臾自隨眵淚出若翳膜在上如魚眼然再易一粒以退病為度

洗眼方

韶粉

防風

馬牙硝

餅子銅青

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

右為末每用一字溫湯調不拘時洗立效

小決明散治斑瘡入眼

草決明

青箱子

乾葛

槐花

敗荷葉

水上者
一皮

右為末食後米泔水調下二錢如四五十日病只此

藥若半年日久則眼老睛懸宜合后藥

香白芷

香門子

連翹

甘草

蟬退

右剉散每服二錢水一盞煎去滓調前藥服仍忌熱味

浮萍散治斑瘡入眼大人小兒皆可用之

浮萍

陰乾
為末

右每服二錢以生羊子肝半箇入盞內以杖子刺碎投水半合絞取肝汁調下食后不甚者一服差已傷目者十服見效

黃連膏治眼瘵肉攀睛風痒淚落不止

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

朴硝

一升以水半盞
淘去土陰乾用

白丁香

半升以水半盞
淘去土攪細用

黃連

二兩
為末

右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出控乾以紙作袋盛風中懸至風化將黃連末熬清汁曬乾稍用猪膽羊膽和加蜜點之尤效
滌昏膏治風眼疼痛不可忍者洗之妙

好崖蜜

半斤

黃連

五錢

沒藥

二錢

黃丹

四錢
炒紫

色



右以蜜同熬黑煎黃連成稠汁入二味藥內煎熬稠更入沒藥末同熬數沸濾去滓洗仍用后通天散搐鼻

通天散治偏正頭疼一切壅滯明目

赤芍藥

川芎

黃連

黃芩

玄胡索

草烏頭

當歸

乳香

別研各等

分

右為末每服少許紙撚子蘸藥搐鼻神效

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

飛絲入眼腫痛方

右用青菜汁點如神 刮指甲上細屑筋頭點津液

點爪屑入眼甲其絲自聚拔去 又方飛絲害左目

以石菖蒲搗破塞右鼻中右目即塞左鼻中百發百

中

運墨法治飛絲入眼令人睛脹突出痛不可忍

新筆兩三管濡好墨更換頻運眼上飛絲纏筆而出

即安



迪志文化出版有限公司出版

灸法目中痛不能視上星穴主之其穴在直鼻上入髮際一寸陷中是灸七壯仍先灸諱諱穴其穴在肩膊內廉第六椎兩傍三寸其穴抱肘取之灸二七壯次灸風池其穴在顓顓髮際陷中與中府正相當即是側相去各二寸

青盲無所見遠視瞋瞋目中淫膚白膜覆瞳子巨窞主之穴在鼻孔下俠水溝傍

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十六

愈佳至驗

風翳患右目灸右手中指本節頭骨上五壯炷如小

麥大左手亦如之

目卒生翳灸大指節橫紋三壯在左灸右在右灸左

良

針法目不明淚出目眩瞢瞳子痒遠視瞋瞋昏夜無見

目瞤動與項口叅相啞僻口不能言刺承泣穴在動

十七分直瞳子



迪志文化出版有限公司出版

拾遺十六方

關明圓治年深日近翳障昏蒙寂無所見一切目疾

熟地黃兩半酒洗 兔絲子酒洗 車前子 麥門冬去心

蕤仁去皮 決明子 地膚子 菴蔚子

枸杞子 黃芩 五味子 防風去蘆

澤瀉 細辛去葉不見火 杏仁炒尖 北亭蘼炒

青箱子各一兩 桂皮半兩 羊肝須用白者只用肝薄切瓦上焙乾

研作末或只以肝煮搗藥為圓底可久留少則以蜜湊之

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六

右為末圓如梧桐子大每服三十圓熱水下日三服

仍戒忌生姜糟酒炙燂等熱物

當歸圓治頭疼腦虛眼目昏矇

生犀 人參 白朮 當歸

芍藥 木香 茯苓 丁香

牛膝酒炒 菴蓉 天麻各半兩 腦麝少許

右為末好酒三升生羊膽一枚熬成膏圓如梧桐子

大每服三十圓麝香酒下

明眼地黃圓治肝腎虛熱風毒黑花眵淚補肝益腎大見效

石斛去苗 防風去蘆各二兩 枳殼去穰炒二兩 生乾地黃

酒洗 熟乾地黃洗焙各半斤 川牛膝去蘆

酒浸一兩半 杏仁去皮尖炒另研一兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓食前溫酒或

米飲鹽湯亦可忌一切動風毒等物

菊花散治目赤腫麻因傷寒后服熱藥并毒食腫痛如

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十六

桃子大不得開者

黃芩 大黃 菊花 甘草

防風各一兩 土當歸半兩

右剉散十歲已下每服二錢水一盞煎空心服

貼藥治小兒赤熱腫目

川大黃 白礬 朴硝

右為末冷水調作掩子貼目上

搐鼻藥治風熱腫赤難開



雄黃	水透過	辰砂	各二錢	細辛	半兩	腦麝	少許
右為末口含水以少許搐鼻中							
決明圓治諸般眼患因熱病後毒氣攻目生翳膜遮障服此漸漸消退免使針刀							
青箱子	炒	防風	枳殼	各一兩	茺蔚子		
細辛	各半兩	枸杞子	澤瀉		生乾地黄		
石決明	燒各半兩	土當歸	酒浸二兩	宣連	半兩去須	車前子	炒
麥門冬	去心各二兩						
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓食后麥門冬煎湯送下							
洗藥治目生翳膜内外障							
海螵蛸		生龍膽草	少許				
右為末極細用熱湯侵起以銅筋點五七次							
點藥暑月行路眼昏澁者							
生龍膽草汁	一合	黃連	三寸切爛				
右用生絹捫出汁點入目中							

蜜蒙花散	治十六般內障多年昏暗或近日不明淚出眩爛一切目疾並皆治之	羚羊角	一兩水煮剉炒乾	人參	一兩	蜜蒙花	二兩
覆盆子		蟾蜍	醋浸各一兩	茺蔚子		析明子	半各
北膚子		甘草		枸杞子	各一兩		
菊花		槐花	各半兩				
右為末食后用飯飲調下二錢							
點眼藥							
右用大田螺一箇淨養去泥然後入瓦合中以腦麝少許入田螺內揜中封起候三日餘開即便成水點之							
洗眼碧霞散							
銅青	三錢	滑石	一錢	石膏	半兩	輕粉	
麝香	各少許						
右為末每用少許湯泡洗							
敷藥瞿麥散							



右以瞿麥炒令黃色為末用鵝涎調逐時塗背頭即開

墜翳圓

青羊膽

青魚膽

鯉魚膽

各七枚

熊膽

一分

牛膽

半兩

麝香

少許

石決明

一兩

右為末麪糊圓梧桐子大空心茶下十圓

消翳散

龍腦

曾青

水晶

各半兩

真珠末

欽定四庫全書

世醫得效方卷十六

琥珀

各一分

右為末夜后以少許點立效

空青圓治微翳細看方見其病最深

空青

二錢

五味子

車前子

細辛

各一兩

防風

生乾地黄

知母

各二兩

石決明

一兩

別研

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服十圓空心茶送下

世醫得效方卷十六

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷十七

詳校官太醫院醫士 臣舒岱

編修 臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修 臣倉聖脈

校對官助教 臣羅萬選

騰錄監生 臣姚培敦



欽定四庫全書

世醫得效方卷十七

元 危亦林 撰

口齒兼咽喉科

總說

口為身之門舌為心之官主嘗五味以布五臟焉心之別脈係於舌根脾之絡脈係於舌傍肝脈絡於舌本三經為四氣所中則舌卷不能言七情所鬱則舌腫不能

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十七

語至如心熱則舌破生瘡肝壅則出血如湧脾閉則白胎如雪此舌之為病也口則又稍不然蓋熱則口苦寒則口鹹虛則口淡脾冷則口甜宿食則酸煩燥則澀乃口之津液通乎五臟臟氣偏勝則味應乎口或勞鬱則口臭凝滯則生瘡生瘡者夜不可失睡晝不可就寢違此必甚唇乃全屬於脾唇有病則多宜隨證以治脾也齒乃骨之餘腎主營養呼吸之門戶也故腎衰則齒豁精盛則齒堅又手陽明大腸脈入於牙齒灌於大腸壅

則齒亦浮腫虛則宣露挾風則上攻面目瘡蠱則齧直
切牙蛭為脫為痔皆當隨證治之喉者候也咽者嚥也

咽接三筌以通胃故以之咽物候通五臟以系肺故以之候氣氣喉喉穀喉皎然明白人諸臟熱則腫寒則縮皆使喉閉風燥亦然五臟久咳則聲嘶聲嘶者喉破也非咽門病若咽腫則不能吞乾則不能嚥多因飲啖辛熱或復嘔吐咯傷咽系乾枯之所致也自與喉病不同又有懸癰暴腫閉塞喉嚥亦如喉閉狀但懸癰在上腭及

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十七

關下俗謂之鸞翁又謂之蛾聚俗語聲訛須以後一十八種證辨之

口病

洗心散合四順清涼飲治心脾有熱口瘡

甘露飲治血熱口瘡

已上方並見大方科積熱類

雞蘇圓治胸中鬱熱口臭煩渴

方見大方科失血類

黃連阿膠圓治口破生瘡米飲下

方見大方科咳嗽類

秘傳降氣湯治虛熱上壅口瘡生薑蘇葉煎食前吞黑



錫丹每服二十粒方見大方科諸氣及痢冷類

龍石散治上膈壅毒口舌生瘡咽噤腫痛少許摻患處
嚙津

寒水石煅三兩辰砂二錢半生腦子半字

右為末日夜數次用小兒瘡疹攻口先以五福化毒
丹掃却用此摻立效方見小方科疹瘡類

綠雲膏治口瘡臭氣瘰癧久而不差

黃蘗半兩螺青二分

欽定四庫全書世醫得效方卷十七

右為末臨卧置一字在舌下不妨嚙津遲明差一法
以銅綠易螺青

升麻散治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍藥 人參洗 桔梗去蘆

乾葛各一兩甘草生用半兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎溫服不拘
時候一方加薄荷黃芩

碧雪治一切壅熱咽喉閉腫不能嚙物口舌生瘡舌根

強言語不正腮項腫痛

蒲黃 青黛 鵬沙 焰硝 甘草各等分

右為末每用手指捻摻於喉中津嚙或呷少冷水送
下頻頻用之

換金散治毒熱口瘡或下虛邪熱

右用乾薑黃連為末摻瘡上初若不堪應手而愈

赴筵散治口瘡

黃蘗蜜塗炙紫色 滑石研各半兩 五倍子小嫩者一兩

欽定四庫全書世醫得效方卷十七

右為末和勻每服半錢許乾摻瘡上良久可飯食奇
效

傅方治滿口瘡爛方見小方科口瘡類

杏粉膏治口瘡以涼藥傅之不愈者

杏仁十粒去皮尖 輕粉一字

右研杏仁調勻臨卧傅瘡上少頃吐之勿嚙

青黛散治口瘡臭氣瘰癧久不差者

右用黃柏半兩青黛一錢為末臨卧安舌下



芎芷膏治口氣熱臭

香白芷 川芎 各等分

右為末煉蜜圓如鷄頭大食後臨卧噙化一圓

益智散治心氣不足口臭

右用益智去殼加甘草為末時復乾嚥下或沸湯點立效

鵬砂圓治口臭口乾口舌瘡

寒水石 燒紅十兩 鵬砂 二兩 腦子 麝香 各二錢

馬牙硝 四分 甘草 浸汁熬膏二兩

欽定四庫全書 世醫得效方卷十七

右為末甘草膏搜為圓麻子大用噙嚥

又方香附子炒去毛為末早晚以少許揩牙上

遠智散治口瘡立效

五倍子 遠志 去心各半兩

右為末摻少許於舌上吐出而瘡已效

又方朴硝寒水石各一錢為末朱砂少許和勻傳瘡上

又方生薑自然汁漱口數次涎出而效

獨勝散治口瘡

縮砂殼火煨存性為末摻口內瘡上即安

立效散治口吻邊生瘡浸淫不愈

檳榔火煨為末入輕粉用飯甑上滴淚調傳瘡上立效

效

茱萸散治口瘡及咽痛

地龍 去土炙 吳茱萸 去浮者各等分

右為末米醋入生麴調塗足心神效

貼足方右以茱萸為末水調傳足心效最宜治小兒口

欽定四庫全書 世醫得效方卷十七

瘡不肯服藥者一貼而愈

濯足法治下虛上壅口舌生瘡

右以白礬為末用湯化以濯足

唇病

菊花丸治脾肺氣虛憂思過度榮衛不和唇裂瀟緊或

口吻生瘡容色枯槁男子失精女子血衰悉宜服之

甘菊花 肉蓯蓉 酒浸洗切 枸杞子 巴戟 去心各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三五十圓菜湯下



瀉黃飲子治風熱蘊於脾經唇燥瀹裂無色		白芷 升麻 枳殼 黃芩 防風 去蘆		半夏 湯泡七次 石斛 去根各半兩 甘草 二分		右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不以時服		薏苡仁湯治風腫在脾唇口瞶動或生結核或為浮腫		薏苡仁 防己 赤小豆 炒 甘草 炙各三分		右剉散煎同上		橄欖散治唇緊燥裂生瘡		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十七		右以橄欖不拘多少燒灰為末以猪脂和塗患處		白灰散治口緊唇小不能開合飲食不得不急治則死		此亦奇病以此方治之得效名曰緊唇又名瀹唇		用白布作燈炷如指大安斧刃上燃炷令斧上汗出		拭取傳唇上日二三度故青布亦佳或青布灰以酒		服亦可和猪脂塗傳 又以蛇皮揩拭為灰傳之		又以蟬螬燒灰末猪脂調傳 又燒亂髮蜂房六畜		毛燒灰用脂調傳 莧實條亦名馬齒莧煮汁洗緊	

唇		灸法治緊唇不能開合灸虎口男左女右又灸承漿三		壯穴在頤前唇下足陽明之會		舌病		升麻柴胡湯治心脾虛熱上攻舌生瘡舌本強頰兩邊		腫痛		柴胡 升麻 芍藥 梔子仁 木通 各一兩		黃芩 大青 杏仁 去皮尖各二分 石膏		欽定四庫全書 世醫得效方 卷十七		右剉散每服四錢薑五片煎食後服 寒重者八正散方見大方科中		金沸草散治風寒傷於心脾令人增寒發熱齒浮舌腫		方見大方科 傷寒陽正類		正舌散治中風舌本強難轉語音不正神效		蝎梢 去毒一分 茯神木 剉殼炒一兩 龍腦薄荷 焙乾二兩		右為末每服一二錢溫酒調食後服		五福化毒丹治唇舌腫破生瘡煩渴 方見小方科疹瘡類	



礬石散治風濕寒舌強不能語

枯礬 桂心 各二分

右為末每用一錢安舌下或用正舌散治之

治木舌腫滿口中氣不得吐

右用臘茶陳白梅巴豆七粒去殼同搗如膏薄荷水

調稀羽刷口中得下咽片時即瀉一二行以粥補之

舌已平矣又方以薄荷水洗之

又方

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十七

右以釜底黑煤研勻內外塗舌良久平 又方真蒲

黃海螵蛸為末內外皆塗之

又方治大人小兒重舌腫起舌下

右用朴消研水敷咽喉外其內用成塊者含涎出乃

平 一方地蟬蛭和薄荷研汁帛包蘸舌下腫處

重舌極證用指去瓜先於舌下筋上擦至根漸深深

擦入如此三次又用指蘸水取項後燕窠小坑中筋

自上趕下至小窟深深捺入亦三次小兒若飲乳勝

前則病去矣

黑散子治血熱舌忽然腫破

右以釜底煤醋調傳舌上下脫去更傳能先決出血

竟傳之尤佳一法用鹽等分調

薄荷蜜治舌上生白胎乾澁語話不真

白蜜 薄荷自然汁 各等分

右以生薑片先蘸水揩洗竟用朱砂雄黃鵬砂腦麝

為末傳之良未效更加玄明粉

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十七

文蛤散治熱壅舌上出血如泉

五倍子 洗 白膠香 牡礪粉 各等分

右為末每以少許摻患處或燒鉄令熟烙孔上

必勝散治舌衄

真蒲黃 略炒 螺兒青 各等分

右為末每用少許擦患處少待濕鹽水漱之

醋飲喉舌生瘡方治連月飲酒咽喉爛舌生瘡

右以水中螺蛳肉用葱豉薑椒煮汁飲三盞差



治重舌新蒲黃為細末數傳之吐去又傳凡五七次愈
亦治舌腫滿口不能聲傳之立安

又方五靈脂米醋一椀同煎逐旋漱口立安

舌無故出血名舌衄炒槐花為末摻之而愈

治舌腫脹好鵬砂為末用薄批生薑蘸藥揩腫處漸退

治舌強腫起如猪胞以針刺舌下兩邊大脈血出即消

切勿刺著中央脈令人血不止則以火燒銅筋烙之

不止則殺人或以釜下墨醋調傳舌上下脫去再傳

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十七

須臾而消此患人多不識失治則死

烙腫法凡舌腫舌下必有噤垂狀如螻蛄卧蚕有頭有

尾頭小白可燒鉄烙頭上即消

治失音槐花新瓦上炒香熟三更後床上仰卧隨意而

食亦治咯血

齒病

安腎圓八味圓治虛壅牙齒疼痛浮腫

方並見大方
科虛損類

嘉禾散治齒疼壞齒者疣去而齒之左右上下非痛非



迪志文化出版有限公司出版

腫不能嚼食食後生薑煎一服次以地骨皮煎湯漱之
空心以羊腰一對切片不令斷以葱絲椒子青鹽蒺藜
末固之再用嘉禾散二錢和勻擦腰子內荷葉包煨熟
食之而愈

方見大方
科脾胃類

玉池散治風虫牙疼腫癢動搖牙齦潰爛渲露出血口
氣等疾悉能治之

地骨皮 香白芷 川升麻 防風 細辛

川芎 槐花 當歸 藁本 甘草 各等分

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十七

右末每用一字許揩牙或痛甚即取二錢用水一盞

半黑豆半合薑三片煎溫漱候冷吐之數服亦無妨

或用金沸草煎湯漱亦佳

蟾酥圓治牙疼不可忍者

蟾酥 字一生 附子角 如豆大為末 巴豆 一粒去殼去沾 麝香 少許

右為末研勻蒸餅為圓如黍豆大以新綿裹一圓噙

之有涎即吐去

蝎附散治同上



迪志文化出版有限公司出版

蝎梢

附子臍

蜈蚣頭

去毒

川烏頭尖

錢各二

右為末先用竹杖刺痛牙齦次以紙撚上藥一粟米

許在痛處甚者不過兩三次效

細辛散治風虫牙疼牙齦宣爛牙齒動搖腮頰腫痛

草烏

白芷

兩各二

細辛

荊芥

兩各一

紅椒

牙皂

鶴虱

華撥

縮砂仁

兩各半

右為末每用少許擦痛處有涎吐出不得嚥少時以

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十七

溫水漱口頻頻擦用立效

二陳湯加細辛枳殼用生薑棗子烏梅煎治毒痰齒痛

仍以片子薑黃華撥等分井水煎候溫以舌浸其中涎

自流出

方見大方
科痰症類

煎脂醋治惡血齒痛

右用川五靈脂米醋煎汁含嚥

甘露飲治毒血齒痛加入升麻煎

方見大方
科頭熱類

荊槐散治牙宣出血或痛

右用槐花荊芥穗等分為末擦牙仍前點服

鬱金散治齒出血

鬱金

白芷

細辛

錢各等分

右為末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含嚥或

炒鹽傳

治牙宣鮮紅者甘露飲瘀紅者雙和湯仍以鹽泥炒為

末揩牙上

方見大方
科虛損類

搐鼻方治牙疼

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十七

雄黃

沒藥

錢各一

乳香

錢半

右為末若左邊疼用少藥搐入左鼻又吹入左耳如

右疼搐右鼻吹入右耳

塞耳方

蒲黃末

乳香末

白芷末

錢各半

雄黃末

錢一

右和勻以帛蘸藥一字緊塞耳內隨左右仍用荊芥

咬在痛牙上

揩牙方



鶴虱 細辛 白芷 甘松 各等分

右為末每用少許揩痛牙上如有蛀孔用藥點入孔

中效

治牙齒痛

右以蕪荑仁安蛀齒上有縫就室之立效

治風虫牙疼

馬夜眼上以刀兒薄起一片子扱在所患牙縫中或

咬在痛處瀝出風涎即止不可嚙

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十七

乳香膏治虫牙痛

光明白礬 枯過 滴乳香 各等分

右為末溶蠟量多少和成膏旋圓看虫牙孔子大小填

之其痛立止神效又方入胭脂少許和令深桃紅色

只作散遇牙疼痛用一字以揩擦良久溫鹽湯漱口

治牙痛

白僵蚕直者不以多少用生薑片切同炒候赤黃色

為度去薑不用為末每用取不虫皂角剝去黑皮以

手指蘸湯於皂角黃上擦取汁調僵蚕末揩痛處即止

逡巡散治風牙疼痛不拘新久一服立效

高良薑 一塊約二寸 全蝎 一枚瓦上焙乾

右為末以手指點藥搽齒上仍須擦令熱徹須臾吐

出少涎以鹽湯漱口大妙亦治腮頰腫痛

牢牙散治一切齒痛不問久新風疼痛立效

全蝎 七枚去毒 細辛 洗淨三錢 草烏 二箇去皮 乳香 二錢別研

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十七

右為末每用少許擦患處須臾以溫鹽水灌漱

莽草散治風壅熱氣上攻齒齲浮腫或連頰車疼痛或

宣露血出

莽草 川升麻 柳枝 槐角子 鶴虱

地骨皮 藁本 去蘆 槐白皮

右剉散每服一兩水一椀入鹽少許煎熱含冷吐之

防風散治牙疼

防風 鶴虱 各等分



右剉散濃煎噙漱立效老鶴虱草研爛塞痛處亦可

消風散治齒熱痛斷腫有汁先傳以消風散又以朴消

傳其上又法用川升麻煎湯漱嚥解毒

方見風利熱證類

香椒散治冷證齒痛

香附子 紅川椒 故紙

炒各華撥一錢

右為末和炒鹽二錢擦傳

川芎散治面腫牙疼不可忍

川芎 白芷 細辛

各等分

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十七

右為末擦兩三次鹽湯漱立止

秘方揩牙散治牙疼遇喫冷熱獨甚

良薑 細辛 大椒 草烏尖

右為末以指蘸少許揩牙上噙少時開口流出涎妙

牙痛有四證

熱者怕冷水用牙硝薑黃雄黃荊芥 冷者怕熱湯

用乾薑華撥細辛 不怕冷熱乃風牙用猪牙皂角

殭蚕蜂房草烏 有竅者蛀牙用雄黃石灰沙糖用

藥了並用溫水灌漱之為佳

取蟲方治牙有蠱而痛

韭菜頭連根洗淨爛搗同人家櫬枝上泥和勻搽痛

處腮上用紙貼之一時頃取下細細蟲在泥上可以

絕根

揩漱方治無故牙動牙宣出血

香附子去皮毛剉碎用薑汁浸一宿曝乾為末漱口

揩齒齒堅無動無血矣

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十七

已驗方治牙疼

露蜂房 爪萋皮

右等分燒灰去火毒擦牙或以烏柏根韭菜根荊柴

根葱根四味煎湯溫漱

甘松香散治一切牙疼

甘松香 莽草 川烏

去皮各三錢

北細辛

去葉二分

硫黃

半錢 香附子

炒去毛二錢

右為末以手指蘸少許揩牙上立效後用鹽湯灌漱



妙

秘方治經歲牙疼

楓香脂為末入些焚香爐內灰再篩過常日洗面時用揩牙上永無斯疾更臨睡以溫水淨漱為佳

小薊散治牙齒宣露出血

百草霜 小薊 香附子 炒去毛 真蒲黃 各五錢

右為末揩牙齒上立愈

芫花散治牙疼

欽定四庫全書 世醫得效方卷十七

陳芫花一握甘草節五錢細剉各煎先用芫花湯噙

唾去次用甘草水噙少時效

治蛀牙痛莽草為末擦三五次蟲即無

治風蛀牙痛

霜殺老絲瓜燒存性為末擦痛處立止

治血風蛀牙

雄黃 乳香 各一錢研如粉 麻黃 半錢 白芷 一字

右為末研勻痛時先以荊芥穗咬在痛處口涼去之

次用皮紙撚津濕之點藥少許隨痛邊塞耳內

又方露蜂房炒川椒一錢為末每二錢煎入少鹽乘熱漱之

又方風蛀痛牙用針刺杏仁清油燈上煙熏乘熱認定病牙以杏仁搭之又復熏搭七次絕不痛但其病牙逐時落去斷根

治蟲蛀牙痛

細川椒 三錢 明乳香 一錢

欽定四庫全書 世醫得效方卷十七

右同研細溶蠟圓如麻子大每用一圓塞孔中

敷藥退腫

大花粉 白芷 赤小豆 鬱金 薄荷

荊芥 各等分

右件日乾為末蜜水調塗痛處

常用齒藥牢牙去風冷蚰蟥宣露不問老少用之甚效

槐枝 柳枝 各長四寸一握切碎 皂角 不蚰者七莖 鹽 四兩

降真香 白膠香 各兩半



右同入甕瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細用如常法

牙齒日長方

牙齒逐日長漸漸脹開口難為飲食蓋髓液所致只服白朮愈及煮水灌漱

齒間肉壅方多因食鹹熱物而得

生地黃汁一椀猪牙皂角數鋌火上灸熱蘸冷汁盡為度或為末傅壅內上隨即消縮或朴硝末傅上即

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十七

消

灸法以線量手中指至掌後橫紋折為四分去三分將一分於橫紋后臂中灸三壯隨左右一方以兩手交叉以中指頭盡處是穴灸七壯永不疼手背上又灸眉顙七壯隨左右又法灸耳垂下牙盡骨上三壯末效加壯數

又法治口齒蝕生瘡者

承漿一穴在頤前唇下宛宛中可灸

又方治唇吻強齒齬痛

尤端一穴在唇上端鍼入二分可灸三壯

導引方治牙齒痛

東向坐不息四通上下琢齒三十六下

頰車開不可合飲令大醉睡中搐鼻嚏則自正

又南星末生薑汁調傅帛縛合一宿愈去風也

又法一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出其指恐嚙傷

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十七

灸法治失音頰車蹉灸背第五椎一日二七壯又灸足

內踝上三寸宛宛中或二寸五分名三陰交穴

喉病

秘傳咽喉一科

一十八種喉風證

一單蛾風其形圓如小筋頭大生於咽喉關上或左或

右舌關下難治

二雙蛾風有兩枚在喉關兩邊亦圓如小筋頭大關下



難治

三蟬舌風自舌下再生重舌者是

四牙耆風牙齦上聚成癰毒者

五木舌風其舌相似煮熟猪舌不能轉動者

六舌黃風自舌上腫痛黃色者是

七咬牙噤口風近牙窮頭作響口噤不開者

八魚口風如魚吸水者不治

九聚毒塞喉風喉關聚毒涎唾稠實發寒熱仍分上下

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十七

三十關破毒下關難治

十玄者蠱毒風上睢食掩水外溢形如雞卵者

十一搶食風一名飛絲毒口中或作穢惡發泡者

十二獵頰風腮臉結腫者是從牙窮頭碎此毒若成須

要半月調理

十三纏喉風風自耳邊過順下赤兔者是也亦有寒熱

如甚者傷人命

十四松子風口內滿喉赤如猪肝逆張吞則關閉塞飲

食不能者是用藥後口內散點松子樣腫則喉關響如雷則不治

十五崩砂甘口風自舌上牙齦上下腮赤口內作響如

湯熱牙齦漸爛甚者亦能脫齒

十六連珠風自舌上作毒或初成一箇碎而又作一箇

以至三五七九箇者是

十七蜂子毒或在腮臉洋爛或在喉關舌下作響如黃

荊蜂者是

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十七

十八走疰癰癰風頸項結核五七箇皮膚赤腫作寒熱者

針灸法

第一穴風府穴腦後入髮際一寸治咽喉諸證及毒氣

歸心等項惡證並皆治之無有不效

針入四分穴高主暈恐傷人不

可不知須令人扶護乃針

第二穴少商穴在手大指表近虎口一邊指甲與根齊

離爪如韭葉許針入二分病甚則入五分咽喉諸證



皆治

第三穴合谷穴法口授治牙關不開則陽靈穴應針

各刺一刺出血入二分關竅即開又有一證潮熱者

有作寒者於合谷穴用針左轉發寒右轉發熱

第四穴是上星穴在頂前入髮際一寸治頰腫及纏喉

風等證又氣急者實熱針足三里虛熱灸足三里以

手約膝取中指稍盡處是穴

根脚咽喉常發者耳垂珠下半寸近腮骨灸七壯二七

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十七

尤妙及灸足三里穴在膝下三寸斷骨外

赤眼挑耳後紅筋針攢竹穴即安穴在兩眉頭陷中

實熱

一用敗毒散加黃芩半夏連翹倍用桔梗用生薑薄

荷煎痰盛者加石膏同煎即效凡服此藥早晨服則

午時攻作午後則子時攻作天明退用針則無此攻

作若服此藥后自利即換作虛熱醫后藥不可用服

敗毒散后失聲即服加減秘傳降氣湯

方見大方傷寒陽證及諸

氣類

二用生料消風散加玄參全蝎薄荷白水煎服

三用前二藥不退用生料洗心散更加一二味去風

毒藥為妙

方見風科熱證及大方科積熱類

四用前三藥不退用防風通聖散立效

方見風科熱證類

虛熱

一用雙解散乃升麻葛根湯消風散加玄參黃芩薄

荷煎

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十七

二用秘傳降氣湯加生薑黃芩

以上方見大方科傷寒陽證及風科熱證

諸氣類

三如痰盛用桑白皮湯磨沉香吞養正丹仍用枳梗

半夏湯冷朮附湯等藥調理

方見大方科痢冷及痰瘧中濕類

又一證上秘下瀉用秘傳降氣湯吞碧雪衣附子理

中圓如無用桑白皮湯亦可

方見諸氣類及見前併痢冷類

虛實盪漱藥

用消毒飲水煎時時盪漱

方見小方科瘡毒類



咽喉生瘡冷閉聲不出者秘傳降氣湯去陳皮加黃芩煎仍於喉下咽管口灸三壯即愈

方見大方科諸氣類

勝金散治咽喉腫痛氣急諸項等證於內麝香旋入有孕者不可用麝不問冷熱虛實並皆通用若痰盛者如煎藥內所用不應於中畧加膽礬少許立效或吐無妨

鬱金 三兩 大朱砂 南雄黃 其色勝於朱砂者妙各五錢

麝香 乾胭脂 萊豆粉 各二錢半 白礬 半生半枯

光粉 各五錢

欽定四庫全書 世醫得效方卷十七

右為末研薄荷汁同研少許調服

防風散虛者少用實者多用

防風 去蘆一兩 羌活 黃藥子 白藥子 蜜炙

殭蚕 炒 鵬砂 大黃 希裏煨令香熟 荊芥 細辛

川芎 紅內消 鬱金 山豆根 甘草 以上各五錢

牙硝 三錢 薄荷葉

右為末研薄荷汁同蜜少許調藥

玄明粉用朴硝十斤防風一斤煎水泡溶却用布荷花

葉紙澄濾七遍却於霜下露天露一夜却取內牙硝再用防風水淋漕淨用瓦鉢熬煎成鹽却再入鼎內用鹽泥固濟炭火燒一時通紅為度出火去毒研為末每一斤用甘草三兩每服一茶匙溫熱水調如實熱煩渴口乾燥作煩者可略加鵬砂腦子入口噙化乾喉風立效

追風散

黃丹 朴硝 猪牙皂角 燒灰 縮砂殼 灰各五錢

欽定四庫全書 世醫得效方卷十七

右為末每服少許以鷲毛蘸入口中舌上下及腫處

用水盥漱如喉間毒已破瘡口痛者用猪腦髓蒸熟

淡薑醋喫立效

如病將可有身體痛於所服藥內加川秦艽同煎效

死候

毒氣歸心胃前腫滿氣煩促下部洞泄不止

重舌木舌川烏尖巴豆為末米醋調刷患處即效木舌

須先服勝金散開關竅

又方見舌病類



帝鍾風即喉間帝鍾長腫有長數寸者虛實用前藥外以食鹽煨過鴉毛蘸下即消不須掛破破則傷人

煮針法

烏頭一兩去尖 巴豆一兩 硫黃半兩 麻黃五錢

木鼈子十箇 烏梅

右用藥同入甕石器內水煮一日洗擇之再用止痛藥沒藥乳香當歸花蕊石各半兩又如前水煮一日取出用皂角水洗再於犬肉內煮一日仍用瓦屑打

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十七

磨淨端直松子油塗常近人氣為妙

合瘡口白礬黃丹麝香為末以銅筋點瘡口上

又方滑石黃丹為末點瘡口效仍用黃丹一兩二錢甘草二錢為散煎服尤妙

破毒妙方

白礬 巴豆去殼 紅內消 草烏尖

猪牙皂角 薄荷各二錢

右為末好酸醋調鴉毛刷入口內勿吞仍以鹽湯盥

漱

雄黃散治纏喉風喉閉先兩日脅膈氣緊取氣短促忽然咽喉腫痛手足厥氣閉不通頃刻不治

巴豆七粒研熟者去殼燈上燒存性 乾桑黃茹

雄黃一塊透明者細研 鬱金一枚蟬肚者研為末

右再研勻每服半字茶清少許下如口噤咽塞用小

竹管納藥吹入喉中須臾吐利即效

又方川升麻四兩剉碎水四碗煎至一碗灌下

又方皂角三根槌碎接水一盞灌下或吐或不吐即安

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十七

取喉中涎

草烏尖 殭蠶 紫貝根 嗽唧 紅椒

白礬 山豆根 皂角各等分

右為末用霜梅拌藥為圓如指頭大含化一圓取下

涎然後用鹽湯盥漱吐出不可吞

開關潤喉蓬萊雪

梅花腦子 生麝香各一字 鵬砂三錢 朴硝五錢 以

薄荷葉 百藥煎 全蝎去毒 防風去叉



粉草 各五錢 以上並研 明乳香 沒藥 各三錢 葉或火燬另研 蘆	右為末每服少許以小匙挑乾糝咽間及瘡上如在關下糝舌上並旋旋嚥下仍用薄荷桔梗甘草煎水	噙漱或用生薄荷研自然汁調成膏入口噙化亦妙	開喉關	薄荷 山豆根 各五錢 麝香 腦子 各半錢	朱砂 三錢 甘草 青鹽 川烏 各五錢	右為末每用半錢臘月內菰菜汁夏月黃麥採水或葛水調如涕唾稠粘用芭蕉水調下或蜜圓指頭大	含化	去涎方 併碎法	草烏尖鴨嘴青膽礬為末先用釀醋煮皂角調鵝翎刷傳赤腫處開口流去涎即將綿毯一指頭大以布線繫定蘸前藥末吞嚥至腫毒處即抽出凡如此一二次其毒即破開口流出去盡涎血却以前合瘡口藥點上停久溫鹽水盥漱後進食亦可

又開喉關	南星 半夏 川烏 草烏 甘草 各五錢	右為末用米醋煎成膏傳毒上	宣利方	巴豆 三笨粒 去殼 雄黃 鬱金 猪牙皂角	大黃 各五錢	右為末飯圓如菰豆大每服七丸五更三點以冷茶清吞下如未利再下四五圓	通後補助	紫蘇 藿香 甘草	右剉散每服四錢水煎空心服	乾喉風	朴硝 川烏 當歸 牛膝 各五錢 麝香	腦子 各半錢 鵬砂 三錢 荊芥 薄荷 甘草	葛粉 各五錢 全蝎 七箇 去毒	右為末用清米泔調春用菰菜汁調夏黃麥汁調如

不能吞用豆腐切如棊子塊蘸藥入口內含化或新
艾汁調下立效

搶食風

桔梗 川烏 草烏 防風 甘草

大青根 錢各五 全蝎 錢七 紫河車 錢五

右為末每服用酒一盞連根葱一莖紅椒七粒燈心
七莖同煎三四沸食後熱服如不安再用酒一盞入
茱萸五粒同煎少時熱服之未效用蕉湯調下如落

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十七

心肺間刺痛用宣藥利下如久不治則變為飛絲勞
毒能傷人命

潤關住痛生薄荷研蜜調成膏送入喉咽下立效如涎
多未退再用如更不開可通頂又用葱頭兩個搥碎
安牙窮頭處立開妙

治誤吞銅鉄金石竹木刺雞鵝魚諸骨哽

川山豆根 山蜈蚣 山茨菇 葳靈仙 鉄脚

滑石 馬牙硝 金星鳳尾草 各一 急性子 二

苧麻根 錢五 菴豆粉 錢五 甘草節 三錢
製一年 兩 中 侵三宿

右為末白芨五兩與糯米糊一處和劑成錠子如梧
桐子大每用一錠冷水磨化即下骨哽若金石銅鉄
則以生薑汁磨化下

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十七

世醫得效方卷十七



欽定四庫全書

世醫得效方卷十八

元 危亦林 撰

正骨兼金鑑科

秘論

骨節損折肘臂腰膝出白蹉跌須用法整頓歸元先用
麻藥與服使不知痛然後可用手

凡脚手各有六出白四折骨每手有三處出白脚亦三

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

處出白手掌根出白其骨交互相鎖或出白則是剝出

鎖骨之外須是搦骨須鎖骨下歸窠或出外則須搦入

內或出內則須搦入外方入窠白若只用手拽斷難入

窠十有八九成痼疾也

手六出白四折骨 凡手臂出白此骨上段骨是白下

段骨是杵四邊筋脉鎖定或出白亦挫損筋所以出白

此骨須拽手直一人拽須用手把定此間骨搦教歸窠

看骨出那邊用竹一片夾定一邊一邊不用夾須在屈

直處夾才服藥後不可放定或時又用拽屈拽直此處

筋多喫藥后若不屈直則恐成疾日後屈直不得

肩胛上出白只是手骨出白歸下身骨出白歸上或出

左或出右須用春杵一枚小凳一箇令患者立凳上用

杵撐在下出白之處或低用物簞起杵長則簞凳起令

一人把住手尾拽去一人把住春杵令一人助患人放

身從上坐落骨節已歸窠矣神效若不用小凳則兩小

梯相對木棒穿從兩梯股中過用手把住木棒正稜在

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

出白腋下骨節蹉跌之處放身從上墜下骨節自然歸

白矣

脚六出白四折骨 或脚板上交胛處出白須用一人

拽去自用手摸其骨節或骨突出在內用手正從此骨

頭拽歸外或骨突向外須用力拽歸內則歸窠若只拽

不用手整入窠內誤人成疾

脚膝出白與手臂肘出白同或出內出外不用一邊夾

定此處筋脉最多服藥後時時用屈直不可定放又恐



再出窠時時看顧不可疎慢

脚大腿根出白 此處身上骨是白腿根是杵或出前或出後須用一人手把住患人身一人拽脚用手盡力搦歸窠或是剝開又可用軟綿繩從脚縛倒吊起用手整骨節從上墜下自然歸窠

背脊骨折法 凡剝脊骨不可用手整頓須用軟繩從脚吊起墜下身直其骨使自歸窠未直則未歸窠須要墜下待其骨直歸窠然后用大桑皮一片放在背皮上

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

榆樹皮兩三片安在桑皮上用軟物纏夾定莫令屈用藥治之

脚手骨被壓碎者須用麻藥與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒便不衝破肉或有粉碎者與去細骨免膿血之禍然後用大片桑白皮以二十五味藥和調糊藥糊在桑白皮上夾在骨肉上莫令差錯三日一洗莫令臭穢用藥治之又切不便輕易自恃有藥便割便剪便弄須要詳細審視當行則行尤宜子細或頭上有傷或

打破或刀傷骨碎用藥糊角縛不使傷風切須記之用藥治傷則用糊藥封角切不可使風入之浮腫其惡血自消散不攻瘡口

正骨金瘡脈候

正骨金瘡須看脈候如傷臟腑致命處一觀其脈虛促危矣傷處淺命脈虛促亦為後慮傷至重命脈和緩永無慮也脈有虛有實有去來有疏密或被傷臟脈不死者必關脈實重則無慮或傷至死處其關脈無別脈洪

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

大則難醫如用兩件藥後脈不轉動急急住藥若脈漸漸隨藥轉此則可治無慮或血出甚者脈不要洪大只要平正重實其血不曾出者亦無惡血在內者其脈欲洪大不要疎密亦不要進退來去恐其變凶看傷脈每與內科脈不同或傷內或致命或難醫處被傷者命脈便已去矣此等切勿治之

十不治證

擗撲損傷或被傷入於肺者縱未即死二七難過 左



脇下傷透內者 腸傷斷一半可醫全斷不可治 小腹下傷內者 證候繁多者 脈不實重者 老人左股壓碎者 傷破陰子者 血出盡者 肩內耳後傷透於內者皆不必用藥

用藥加減法

傷有淺深隨其吉凶用藥如折骨者則用後二十五味接骨方治之再加自然銅白芷乳香沒藥川芎各五錢立效 若傷臟腑用清心藥加川芎當歸赤芍藥各三

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

錢 或肚腸傷破加白芨五錢同後清心藥服 或被傷浮腫不退加皂角黃栢皮半兩入紫金皮散內傳之 或頭破傷風亦用紫金皮散加皂角黃栢皮傳之立退 或筋斷接筋者用二十五味加斷續半兩 或諸處傷痛不止者仍用二十五味加川芎五錢 或惡血汚心不下用后清心藥加大黃枳殼五錢 或氣觸痛加木通丁香藿香三錢同二十五味服之 凡加減末者加末散者加散其餘只依本方不用加減 孕婦擷



撲傷損先用安胎藥後服二十五味接骨去草烏川芎餘依本方

腸肚傷治法

肚上被傷肚皮俱破腸出在外只腸全斷難醫傷破而不斷者皆可治療 腸及肚皮破者用花蕊石散傳線上輕用手從上縫之莫待糞出用清油撚活放入肚內 肚皮裂開者用麻縷為線或槌桑白皮為線亦用花蕊石散傳線上須用從裏重縫肚皮不可縫外重皮留

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

外皮開用藥摻待生肉

又用藥加減法

凡損若不折骨不碎骨則不可用自然銅於藥內除去無瘡處不用半夏 老人有傷者骨脈冷每用加當歸川芎川烏木香丁香人參五錢去白芍藥生地黃此亦是二十五味內加減老人即服此 或傷臟腑者不問老少如有血并痰從口中出者用清心藥加丁皮川芎半夏入二十五味內同服 退腫角血或皮冷加乾薑五



錢入退重藥內糊腫上腫及血自然退散或皮膚熱者加黃栢皮皂角五錢入腫藥內角腫處自然退

用麻藥法

搥撲損傷骨肉疼痛整頓不得先用麻藥服待其不識痛處方可下手或服後麻不倒可加曼陀羅花及草烏五錢用好酒調些少與服若其人如酒醉即不可加藥被傷有老有幼有無力有血出甚者此藥逐時相度入用不可過多亦有重者若見麻不倒者又旋添些更未倒又添酒調服少許已倒便住藥切不可過多

用摻藥法

瘡口血出不止則用方中止血藥傳之如洗開後瘡孔大甚且先用降真香龍骨沒藥摻之內即生上瘡孔上須用油單貼待膿血汁出莫待蔽塞如夏月用藥以薄荷葉貼瘡孔一日一度湯洗又用藥摻如肉上滿瘡口用手搥不痛如好肉一般即用收瘡口藥傳上却莫貼待風稍瘡口立收若未生實肉切不可先收瘡口裏面

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十八



迪志文化出版有限公司出版

恐為患也

傷破肚皮用藥法

如傷孔大肚腸與脂膏俱出放入內則用縫如孔小只有膏出先用清心藥與服用手擘去膏不用縫此膏出者已無用了不可復入肚中反成禍只須擘去不妨此是閑肉但放心去之肚肉被傷者重用退利大小腸不可待秘恐成重患

打擷及樹木壓偏身痛者

打擷樹木壓或自高處擷下者此等傷皆驚動四肢五臟必有惡血在內專怕惡心先用清心藥打血藥及通大小腸藥次第先服臨服加童子小便入藥內立效專用大小腸洗利恐作隘塞利害之甚清心藥加前方通利大小腸藥服之自然俱通無悶煩無惡血污心以次用止痛藥服之即止

去惡血法

搥撲傷刀石傷諸般傷撲至重者皆先服清心藥次服

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十八



迪志文化出版有限公司出版

清小便藥三服去血藥或被傷者血未結打從瘡口中
出或結在內用藥打入大腸時即泄出或被打破擗被
木壓惡血未積者用藥打散四肢或歸臟腑者或歸上
膈者打從口中吐出或歸中膈打入大腸泄出先用此
急救次服止痛藥 止痛藥即二十五味藥中加減用

用藥湯使法

凡藥皆憑湯使所使方先但用清心藥煎後用童便一
盞同服 或止痛重傷者則用薑湯燈心藥調二十五

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十八

味藥服之薄荷湯亦可 凡傷或刀傷及損內臟腑恐
作煩悶崩血之患如折骨者用薑酒服接骨藥傳之如
骨碎被重打重擗重木及石壓者皆用先服湯使法並
未用酒服如輕擗撲損傷則用薑酒調下二十五味藥
立效

通治

擗撲刀傷接骨方

服

臘月猪脂

五兩
黃蠟

半斤
以洗煎

鉛丹

羅

自然銅

四兩
研



迪志文化出版有限公司出版

密陀僧

四兩
研

朱砂

一兩
研

右用新鐺鼎先鎔脂次下蠟於冷處下密陀僧鉛丹
自然銅緩火再煎入水中不散更出鼎於冷處下諸
藥用柳篋攪勻瀉入甕器內不住手攪至凝圓如彈
子大且用笋皮之類襯之極冷方收 凡傷碎骨者
木石壓碎骨者先用此藥火化開糊骨上然後夾定
用此藥服之須作小圓如梧桐子大每服十圓葱酒
調下或傷損深者撚成條入孔中淺者用油單為膏

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十八

藥貼之甚者燈心裏木夾之如藥力散再覺痛更一
服痛即止又痛甚者貼之即止

又方二十五味 服 治擗撲損傷骨折筋斷刺痛不

問輕重悉能治之大效

香白芷

醋炒
加減

紫金皮

醋炒

劉寄奴

川當歸

煨鹽
水炒

赤芍藥

白芍藥

米水
浸炒

黑牽牛

生地黄

鹽水
浸炒

川芎

米水
浸

川牛膝

茶水
炒

乳香

可加
減

沒藥

可加
減

破故紙

醋炒

木通

去節

自然銅

骨不碎
用臨好時用

木香

茶水
炒



迪志文化出版有限公司出版

藿香 木賊 官桂 可加減 羌活 獨活

半夏 五錢水炒無痰不用 骨碎補 草烏 醋炒孕婦不用

川烏 火煨孕婦則不用各一兩

或加土當歸熟地黃 鹽水炒 杜牛膝 茶水炒 土芎 米水炒 尤

妙 金刀傷剉出白者去自然銅骨碎骨折者用之然須於此方內且去自然銅臨欲好時却入用之早服成他疾右先擇出自然銅官桂沒藥乳香不炒者其餘藥或炒或火焙或日曬乾皆可然後入不炒四

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十八

味同研為末用蜜糊圓如彈子大用黃丹為衣或被擲撲傷損金刀箭鏃不問輕重每服一圓如被刃傷全斷損內重者以薄荷湯或木瓜湯薑湯燈心湯吞下皆可或擲碎骨及折骨用自然銅其他不用如骨折碎刺痛不止加乳香沒藥白芷川芎各五錢入諸藥中生薑酒下或不作圓為末亦可功效如神

又方 服傳 治擲撲接骨刀傷

川當歸 半兩洗淨別搗 鉛粉 半兩洛粉為上 鵬砂 二錢



右為末每服二錢濃煎蘇木汁調下若損在腰上先喫淡麪半碗後服藥若在腰以下先服藥後喫淡麪仍不住呷蘇木汁更以糯米為粥入藥末三錢半和攤在紙上或絹上封裏損處如骨碎更須用竹木夾定以紙或衣包之

清心藥方 服

降真香 香白芷 醋炒 蘇木 鹽水炒 枳殼 水浸去心

藿香 清油炒 丁皮 鹽水炒 紫金皮 木香 茶水炒

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十八

丁香 米泔水炒 木通 去節 山梔子 大黃 蓮子肉 酒煮

沉香 人參 當歸 濕紙煨 川芎 煨 羌活 獨活

花蕊石 醋炮 烏豆 燈心 少許 赤芍藥 各等分

右為末或大小腸不通服此亦可用五膈寬中散同服立效或惡血污心或煩悶暴死每服二錢薄荷湯或燈心湯調下或童子小便尤好為散水煎服亦可如痰血口中出加半夏

自然銅散治打擲折骨損斷正骨科中經驗方也



乳香 沒藥 蘇木 降真香 川烏	去皮
松明節 自然銅	火煨米醋拌七次各一兩地龍炒去土清油
真血竭 三龍骨	生用半兩土狗十枚油浸焙為末本草名蝮蛇
右為末每服五錢用無灰酒調下如病在上食後服	
病在下空心服服之自頂心尋病至下兩手再周遍	
一身下及兩足遇病處則颯颯有聲患人自覺藥力	
習習往來	
又方	
欽定四庫全書 世醫得效方 卷十八	
自然銅	累累然相綴如亂絲者最佳一兩重
右研細水飛過同當歸沒藥各半錢和勻每服三錢	
酒調服仍以手摩痛處	
導滯散治重物壓迫或從高墜下作熱吐血下血血出	
不能禁止或瘀血在內胸腹脹滿喘麤氣短兼能打去	
惡血	
當歸 大黃	各等分炒過
右為末每服二錢不以時溫酒調下	

雞鳴散凡墜壓死者急安好處以手袖揜其口鼻上一	
食頃瞑開先與熱小便若初覺氣絕不能言急擘開口	
以熱小便灌之打撲悶絕亦先用以此利去瘀血	
活血丹治患者血脈不和筋急行步不可服之寬筋	
乾地黄	酒煮二兩當歸 白芍藥 續斷 炒 麪水
白朮	煨 川芎 醋炒各一兩
右為末麪糊圓梧子大每服三十圓溫酒下	
大嶽活血丹治男子婦人外傷內損狗傷虫咬車馬撲	
墜手足折傷一切疼痛腹中瘀血刺脇築心左癱右瘓	
走住疼痛癰疽痔漏及婦人冷氣入腹血脉不通產後	
敗血灌注四肢及吹癰腫痛	
花桑枝	如臂大者燒烟 栗楔 薄切日乾各一斤
細墨	半斤一半用車麻三兩細研塗墨上塗盡紙
火兩時	一半用醋化礶 皂角刺 一斤燒赤淬
砂塗墨上	火炎令乾 亂髮 二斤皂角水淨洗用
大黑豆	一斤濕布揩去 淨黑皮焙乾秤 亂髮 二斤皂角水淨洗用
焦即止	乳香 四兩通明滴乳者細
為末	研入米醋一碗熬熟



右和為末杵三千下圓如彈子大如膏乾更入醋糊
圓痛甚一圓輕者半圓以無灰酒一盞乳香一豆大
先磨乳香次磨藥盡煎三五沸臨卧溫服以痛處就
床欲汗則被覆仍用藥塗傷處切忌一切動風物婦
人服入當歸末一錢孕婦勿服

當歸散救急療墜馬落車被打傷腕折臂呼叫不絕服
此呼吸之間不復大痛三日筋骨相連

當歸炒令香 桂心 甘草炙 蜀椒去汗各三分

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十八

芎藭六分炒 附子炮去皮 澤蘭炒各一兩

右為末酒服二三錢日三服如小兒被奔車馬所損
傷其膝皮肉決見骨節絕死少蘇啼不可聽聞服之
便睡十數日便行走其神驗如此忌海藻菰菜生葱
猪肉冷水

花蕊石散治一切金刀斫傷箭鏃及打撲傷損身體猫
犬咬傷或至死者急於傷處搽藥其血化為黃水再搽
藥便差更不疼痛如內損血入臟腑熱煎童子小便入

酒少許調一大盞服之立效若牛舐腸出不損者急內
入細絲桑白皮尖茸嘗線縫合肚皮縫上糝藥血止立
活如無桑白皮用生麻蘇亦得並不得封裏瘡口恐生
膿血如乾瘡以津潤之然後糝藥

方見大方科失血類

內損

大紫金皮散治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或瘀血
停積於內心腹脹悶

紫金藤皮 降真香 續斷 補骨脂

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十八

無名異燒紅酒淬七次 琥珀研別 蒲黃 牛膝酒浸一夕

當歸洗焙 桃仁去皮炒 大黃紙裹煨 朴梢別研各一兩半

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調并進三服利
即安

沒藥散治打撲內損筋骨疼痛

沒藥 乳香 芍藥 川芎 川椒去子及合目者

當歸各半兩 自然銅二錢半炭火燒

右為末用黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻圓如



彈子大每服一圓用好酒煎開乘熱服之隨痛處臥
霎時運進有效

打撲傷損

加味芎藭湯治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆
汁

芎藭 當歸 白芍藥 百合 水浸一日 荊芥穗 各等分

右剉散每服四錢水一盞酒半盞煎不以時服

木香勻氣散治從高墜下或打撲傷損腰脇心腹作痛

欽定四庫全書 世醫得效方卷十八

加紅麴末少許童子小便同酒調空心熱服如無紅麴

紅酒亦可 方見大方科諸病類

麝香散治從高墜下及打撲損傷

麝香 水蛭 各一兩

右用水蛭剉碎炒至煙出研為末入麝再研勻每服

酒調一錢若當下蓄血未效再服其應如神又治折

傷用水蛭熱酒調一錢食須知痛更進一服痛止便

將折骨藥封直至安平方去

平胃散治打撲傷損不問抓破與暗傷悉能治之用冷
水調塗則愈 方見大方科脾胃類

雙烏散治諸傷百損如被打破傷損久後時時疼痛雖
新被傷縱不破皮而內損者尤宜服此

川烏 草烏 略炮各三錢 當歸 白芍藥 蘇木

大黃 生乾地黄 紅麴 炒各半兩 麝香 少許

右為末用酒煮一瓦瓶放冷服如覺痺麻無害但二

烏頭生用有力恐太猛所以用溫火畧炮

欽定四庫全書 世醫得效方卷十八

救急方療墜馬落車傷腕折臂

當歸 炒 桂心 甘草 炙 蜀椒 炒出汗各七錢半 川芎 兩半

附子 炮 澤蘭 炒各一兩

右為末每用酒服二錢立效忌海藻菰菜生葱冷水

等物

洗心散治傷損瘀血凝滯大痛大便亦痛 方見大方科積熱類

黑神散治傷損大吐血或因酒食飽低頭胸損吐血至

多竝血妄行鼻口俱出但聲未失無不效者



百草霜 蚌粉 各等分

右為末每一二錢糯米飲調下側栢枝研汁尤妙速鼻衄搗一字皮破灸瘡出血舌上出血並乾糝立止墜馬方細研銅末服之頓愈

蘇合香丸治從高墜下挾驚悸血氣錯亂昏迷不省急

服大效 方見大方科中氣類

接骨散治打撲傷損折骨

半兩古文錢不拘多少以鉄線貫之用鉄匣盛以炭

欽定四庫全書 世醫得效方卷十八

火煨通紅椀盛好酒米醋各半升鐵冷開匣取錢於酒醋中淬盡澄去滴醋以溫水淘洗如此三次淘洗數多尤妙火毒不盡令人患啞既淨焙乾研細入乳香沒藥水蛭等分同為末每服半字或一字生薑自然汁先調藥次用溫酒浸過服若不傷折即時嘔出若損折則藥徑下如金絲如弓上筋神效初服忌酒三日

刀斧棒杖傷

禁聲飲子治棒杖刀斧傷疼痛不可忍者

防風 去蘆南星湯洗

右剉散每服三大錢水酒各半盞生薑搥碎同煎通口服甚者不過三服立效

龍骨膏治金瘡

真龍骨 海螵蛸 五倍子 赤石脂

黃丹 煨過或不用只使血竭尤佳 石亭脂 一方不用只用麝

右斟酌或等分用如傷大先以冷鹽水洗淨却用黃

欽定四庫全書 世醫得效方卷十八

桑生漿塗四圍待水乾皮斂即乾數百發百中若小

小傷只以冷鹽水略洗便敷此且絕妙甚

奪香散治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積

心腹疼痛大小便不通

紅蛭 用石灰慢火炒令乾黃色半兩 大黃 黑牽牛 各二兩

右為末每服二錢用熱酒調約人行四五里再用熱

酒調牽牛末二錢催之須下惡血成塊以盡為愈

單方治打撲傷金瘡悶絕



右用蒲黃不以多少為末熱酒灌下

取箭鏃

灰牛散

天水牛

一個獨角者尤妙以小瓶盛之用礪砂一錢細研水少許化開浸天水牛自然成水

右以藥水滴箭鏃傷處當自出

神仙刀箭藥妙不可言

右以桑葉陰乾為末乾貼如無旋熨乾貼之

又方土狗數箇搗取汁滴上三五度箭頭自出

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十八

治箭鏃入骨不可拔

巴豆

半粒 大者一箇
去足翅

右各去殼同微熬研勻塗傷處斯須痛定必微癢且忍

之候不可忍便撼動拔之立出以黃連貫衆溫湯洗

了用牛膽製風化石灰傳之

針灸傷

內托黃耆圓治針灸傷經絡膿流不止

黃耆

八兩 當歸 三兩

肉桂

木香

沉香



迪志文化出版有限公司出版

乳香

別研各一兩

右為末用菉豆粉四兩薑汁煮糊圓梧桐子大每服

五十圓不拘時候熱水下

消煩

四聖散治傷重煩悶欲死者用此打血利大小便

花蕊石散

黑神散 二方見前

大聖散

蒲黃散

以上二方

並見婦人科

當歸

煨

牛膝

川芎

米水炒

白芷

醋炒

蘇木

大黃

各半兩

蓮子肉

酒煮半兩

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十八

右為末和圓童子小便調服或木通湯亦可惡血立

下

傳藥

活血散治打撲傷損手足

右用菉豆粉新鉄銚內炒令真紫色新汲水調令成

膏厚傳損處須教徧滿貼以紙花將杉木皮一片縛

定其效如神

治刀傷磕損血不止痛難禁用葱白一大握炒熟搗爛



迪志文化出版有限公司出版

乘熱縛定痛與血隨止葱冷再易立效

治傷損用生骨碎補研爛取汁以酒煎服滓傳傷處數

日平復及被笞捶身無全膚用之大效

治折骨傷筋痛不可忍生地黃一斤切藏瓜糟薑一斤

生薑四兩炒令勻熟以布裹罨傷處冷則易之奇效

腫重加赤小豆半升

地黃膏治打撲傷損臂白脫出及一切癰腫未破令內

消用生地黃研如膏木香為末以地黃攤紙上糝木香

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

末一層又再攤地黃貼上明旦痛即止效

單方治刀傷血出不止欲死用花藥石散無效則用絕

好降真香一片用瓷瓦片刮下石碾碾細傳之大效

又方白滑石二兩黃丹五錢為末乾糝

歛金瘡止疼痛

右以劉寄奴為末糝之立效

又方以門扉後塵傳之

鉛粉散治手足折傷可服可敷半日後痛止手足堅牢

立愈

右以川當歸鉛粉各半兩鵬砂二錢同研細蘇木煎

汁調化一大錢損若在上先喫淡粥却服損在下先

服藥後食仍頻呷蘇木汁別作糯米飲拌和藥攤貼

損處以絹帛裹之骨碎用竹木同夾甚妙

白灰散治惡瘡刀斧傷見血

白石灰末不以多少韭菜汁調陰乾為末少許傳上擦少

時血止便安如腸潰出桑白皮線縫合罨之帛繫定效

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

又方晚蚕沙生用為末糝勻綿裹之隨手瘡愈血止

黃丹散治金瘡并一切惡瘡

上等黃丹

軟石膏

不以多少
火煨通紅

右研細和勻如桃花色糝傷處甚妙

又方胡孫頭草黃花子如蒺藜骨錄者村人謂之草血

竭以其能止血也用其子爛研或爛嚼傳傷處血立止

又方

黃蘗
半斤 半夏四兩



右為末每用半兩生薑半兩生地黃取自然汁調塗
搨處如折斷用絹帛封縛次用杉木皮扎定乾則頻
上薑地黃汁潤

又方治金刃或打傷及碎首血出不止

降真香五倍子鏡面上削下銅青各等分為末傳傷

處效

又方治刀斧傷

隔年四月苧麻採令極軟覆在傷處縛定血止用野

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

苧葉亦可

又方水龍骨

即船上多
年油灰

為末傳傷處用帛片扎定皮裂

開以桑白皮線縫合用蘇木五倍子末封之

又方治傷至重但不得透膜者

海味中鹹白鰓揀大片色白而有紅絲者成片鋪在

傷處以帛子扎之血止如膏脂出不傷內膜者即剝

去傷人頂心髮以熱熨斗不令其知於新剝頂上一

燙膏脂即入以桑白皮線縫合用血竭草木臘葉磁

石為末乾傳瘡上即合

又方五月五日採馬鞭草缺盆草血見愁

即草
血竭

搗爛同

風化石灰為末塗之即愈

治血聚皮不破方蘿蔔葉研細罨傷處以帛縛之

滅痕方治打撲有痕傷瘀血流注

半夏為末調塗傷處一宿不見痕

又方治瘀血流注紫黑或傷眼上血紫黑

大黃為末用薑汁調塗一夜一次上藥一宿黑者紫

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十八

二宿紫者即白矣

洗方

荊葉散治從高墜下及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑荊葉

兩

蔓荊子

白芷

細辛
去苗

防風

去蘆

桂心

川芎

丁皮

羌活

各一
兩

右為末每用一兩鹽半匙連根葱白五莖漿水五升

煎五七沸去滓通手淋洗痛處冷即再換宜避風

破傷風



玉真散治風自諸瘡口入為破傷風強項牙關緊欲死者

防風去蘆 天南星湯泡各等分

右為末每服三錢童子小便一大盞煎熱服

香膠散治破傷風口噤強直

魚膠澆十分許 麝香少

右研勻每服二錢酒調不飲米飲下一方蘇木煎酒

下

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十八

急風散治久新諸瘡被傷中風項強背直腰反折口噤

不語手足抽掣眼目上視喉中鋸聲及取箭頭

麝香研 丹砂一兩 生黑豆一分同草烏為末

草烏三兩半生用半燒存米泔同淬

右為末和勻破傷風以酒一盞調半錢服神效如出

箭頭先用酒一盞調服半錢却以藥貼箭瘡上

破傷濕

牡蠣散治破傷濕口噤強直

牡蠣取末粉傳瘡口仍以末二錢煎甘草湯調下

舒筋法

舒筋法治破傷後筋變縮不能伸他病筋縮亦可用大

竹管長尺餘鑽一竅繫以繩掛于腰間平坐貼舉足

搓袞之勿計工程久當有效

退腫

蒼朮散治打撲損傷皮不破浮腫者及角血用此退之

紫金皮 蒼朮 猪牙皂角鹽醋炒

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十八

雞脚風葉 骨碎補各等分

右為末糊水調糊腫處

紫金皮散治一切打撲損傷金刃箭鏃浮腫用此效

紫金皮醋炒 天南星 半夏 黃柏鹽炒 草烏炮

川烏 川芎茶炒 川當歸煨 杜當歸 烏藥

川白芷鹽水炒 破故紙 劉寄奴 川牛膝

桑白皮各等分

右為末生薑薄荷汁兼水調糊腫處或傷處皮熱甚



加黃柏皮生地黃五錢有瘡口者勿封其口四畔用此糊之

麻藥

草烏散治損傷骨節不歸窠者用此麻之然後用手整頓

猪牙皂角 木鼈子 紫金皮 白芷 半夏

烏藥 川芎 杜當歸 川烏各五兩 舶上茴香

坐拏酒煎熱 草烏各一兩 木香 三錢

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十八

傷重刺痛手近不得者更加坐拏草烏各五錢及曼它羅花五錢入藥

右並無煨製為末諸骨碎骨折出白者每服二錢好紅酒調下麻到不識痛處或用刀割開或用剪去骨鋒者以手整頓骨節歸元端正用夾夾定然後醫治或箭鏃入骨不出亦可用此麻之或用鉄鉗拽出或用鑿鑿開取出後用鹽湯或鹽水與服立醒

合瘡口

松皮散治金刃箭鏃傳瘡口兼能生肉

老龍皮二分 生石灰取古礦者用瓦盛上用瓦蓋炭火四畔上下煉一夜至曉

取研細

右為末傳之止血收瘡口立效

又方合瘡口黃丹白滑石研細傳之

又方黃連木香檳榔為末傳之

又方

降真香 牛膝 石灰 人骨炒醋 真龍骨

老松皮各一兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十八

右用黃牛膽一枚將小竹管插膽中以石灰末從管中入膽內掛高處日乾要用刀破開同諸藥為末傳瘡肚中不痛自愈
太乙膏治金瘡箭鏃不問輕重用此傳之并治癰疽癰毒

白芷 乳香製火 沒藥 蒼朮 白膠香

石膏醋炒 黃丹各五錢

右為末用真清油四兩桐油真者亦可以黃蠟一兩



先煎油柳枝攪次入白芷等四味煎少頃却入膠香		石膏得同煎試欲成珠却入蠟同煎片時用生布濾		過瓦器收藏用油單攤之損傷傳瘡口自然肉不痛		速愈		止血收瘡口方藏血用此瘡大者以燈心蘸入孔中		白膠香 老松皮 白芷 龍骨 血竭 各一兩		右為末傳之		又方		土朱 二兩用瓦盛瓦上火煉一日		人骨 火煉者		老松皮		龍骨 各等分		右為末傳之妙		又方雞內金焙為末傳之立止		乳香膏老金瘡杖瘡神效		乳香 七錢 沒藥 七錢 白芷 當歸 羌活 獨活		川牛膝 川芎 自然銅 石膏 劉寄奴		黑牽牛 黃栢皮 破故紙 白膠香	

生地黄 熟地黄 赤芍藥 白芍藥		黃丹 紫金皮 各五錢 黃蠟 一兩		右為末用真清油四兩煎沸却入藥同煎留膠香黃		蠟黃丹末入用柳枝不住手攪試將欲成膏却入三		味更試成膏生布濾淨用瓦器盛水傾在水中用油		單攤開貼傳瘡口孔深者撚成膏條穿入孔中不問		淺深放瘡上作熱加輕粉梅花腦子朴硝入膏內貼		又留可再用瓦下盛須封裏		斷筋		小香膠散		白膠香末傳之又方金沸草根搗汁塗筋封之可相		續		止痛		乳香散治打撲傷損痛不可忍者		白朮 炒 當歸 炒 粉草 川白芷 沒藥 另研		交趾桂 明乳香 另研	



右為末入別研藥令服二錢酒調不以時服

應痛圓治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼術 半斤半 破故紙 半斤半 舶上茴香 六兩

骨碎補 半斤 穿山甲 去腹桑灰炒服

生草烏 半斤 劉如麥大

右用草烏半斤用生薑一斤連皮生薑一斤搗爛草

烏一處淹兩宿焙乾連前藥同焙為末酒煮下糊圓

梧桐子大每服五十丸酒或米飲下忌熱物片時麻

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十八

無妨

止痛圓止痛清心行氣活血如神

草烏 去皮生用 乳香 火熨 沒藥 火熨 五靈脂 各三兩

生麝香 炒

右為末酒糊丸如指頭大朱砂五錢研為衣每服用

薄荷生薑研汁磨化痛止

世醫得效方卷十八

欽定四庫全書

子部 世醫得效方卷十九

詳校官太醫院醫士 臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修臣倉聖脈
校對官助教 臣羅萬選
謄錄監生 臣毛紀



欽定四庫全書

世醫得效方卷十九 外科精要

元 危亦林 撰

瘡腫科

總說

人之一身血氣周流則平若冷熱不調喜怒不常飲食不節稍有壅聚則隨所發見癰癤屬表易治疽癌癰癰發屬臟腑發於腦背頤上最為難治徑一寸二寸為癰

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

三寸五寸腫圓赤為癰八寸為疽癌癰癰名各不同其色亦異有圖見之凡初覺壅聚結熱疼痛腫赤痕癰闊硬或見或不見治之如拯溺救焚不可緩也若按而後痛者其膿深小按即痛者其膿淺按之軟而復者有膿按之強而不復者無膿焮赤腫高者為實軟慢冷腫者為虛初作宜宣熱拔毒外以洗滌角傳以斂其痕癰是大要法也已潰則排膿止痛朝夕亦洗滌以舒其毒氣膿盡則生肌傳痂次第施治不可愴惶失序亦不可拘



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

一酌量輕重形證逆順寒則溫之熱則清之虛則補之實則泄之導以針石灼以艾炷破毒攻堅以平為期其有五善證者飲食如常一善實熱而小便澀二善肌肉好惡分明三善用藥如所科四善外無雜證五善七惡證者渴而喘大小便滑一惡內未潰肉黑而陷二惡已潰青腐筋骨黑三惡發背透膜四惡未潰肉先潰面青五惡發痰六惡發吐七惡所謂五善見三必瘥七惡見四必危外證形候不治者亦五缺盆平滿背脊平滿掌心平滿脚心平滿臍頭凸出逆證者有五大渴痛不止一逆聲細色脫二逆服藥嘔吐三逆睛細白大四逆肩胛全身轉不得五逆難治者亦有六證兩臉紅似坯染心病深得之从全不腫起亦不覺痛乃臟腑受病深病處硬如牛領之皮又如石榴之狀用藥三五日不軟者病深病人無時喜笑迺神氣脫病深口小內閣常出青白膿汁不疼痛內壞病深病處貼膏藥後出鮮血黑血間雜血瘡深又云初發疽時一粒如麻豆大身體便發

熱生疽處肉亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫此為外發雖大若盆碗如用藥有理則全活必矣初發疽時不拘大小身體無熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日之間漸漸開大不腫不高不疼不痛低陷而壞爛破後肉紫色黑此為內發未作之先臟腑已潰爛則不治矣復有心腎肺癰腸癰附骨疽證心癰者乃心經有熱或好飲酒或嗜熱物積聚成熱久而不散重發於皮膚之外氣血不流凝滯而生雖曰原道頗險而實可治宜用托裏活血之劑攻出外來腫高不陷可保無虞若陷入裏亦不可恃如不飲食急須扶脾能食瘡破穿見肉膜亦未為害但要洗滌淨潔以生肉藥摻四畔自然而愈腎癰乃與內腎相對皆由腎氣衰敗而成突起皮赤者易安陷入皮黑者難瘥如精神清爽顏色紅潤飲食不減多起少卧此為善美也顏色黑黃飲食全減斯為可憂惟須詳審速療肺癰乃將理失宜勞傷氣血風寒之氣乘間而入內舍於肺及挾邪熱其氣結聚或作寒

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九



迪志文化出版有限公司出版

熱脉數而實是也腸癰乃榮衛相乖氣為敗濁小腹如腫大小便或澀或復汗出或復寒熱是也若腹皮急按之濡身無熱乃陰冷所成小腹堅痞按之痛身有熱乃結熱所成脉數膿已成不可下脉遲緊膿未成或下瘀血而愈附骨疽痛深按之無疼著骨而生膿水腐潰碎骨出盡方愈治之宣熱去毒又當溫腎未可專用涼劑更在針烙其病務詳淺深刺拔其根則易愈不爾則順脉流走偏身洪腫卒致不救惜哉至於所患之時猶或多於外證未潰已前發渴乃臟腑焦燥痢下乃引飲無度已潰而渴則膿血去多津液中乾或復腸胃暴虛遂成下痢體虛受寒則嗽聲不息氣逆挾熱則痰盛於胃熱毒不泄為二便秘澀毒氣迫心為嘔噦驚悸陰陽交爭血氣不和寒熱併作臟腑傷敗便血迸出毒氣攻外煩燥異常惟須大方科藥同治可也至於諸瘡猶當舉其大畧丁瘡含蓄毒氣瘡頭黑硬如釘四畔帶赤如火癰根突起痛癢異常隨變焦黑未幾腫大而光轉為濕

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九



迪志文化出版有限公司出版

爛深孔透肌如大穿針之狀外證心驚頭疼拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間赤黑點點如珠若毒入腹心則煩悶嘔逆恍惚癡眠其斃可立而待治之當清心行血破毒拔丁則或愈矣癰癰生於項腋之間凡人少小以來動輒蓄怒或憂思驚恐抑鬱不伸遂致結核日積月累風熱毒氣聚焉於是腫濕開瘡起伏無已甚則牽連腋下延蔓心膈外證寒熱往來或痛或不痛治之須用斑蝥地膽使其根從小便中出或如粉片或如

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

塊血或如爛肉皆其驗也治療不早則無及矣漏瘡之由多發於項腋陰僻肛門之間治之失時即生寒熱凡癰疽諸發隨所在處苟有宿膿敗肉朽骨停蓄其間皆謂之漏治法溫散風冷收水生肌用室塞之藥必得痊平惟須戒房事耳癰疹為病風熱在表天時炎暄而燥氣乘之則為赤疹天時寒涼冷氣折之則為白疹治之須疎風行氣氣行則消矣其有疥癬等瘡各自不同浸淫不已皆由脾肺風熱或心腎以虛所致熱則平血解

毒冷則清心溫腎又何患其不瘳矣

五發形圖

發癰


腫赤高起 此疾或在婦人乳旁上為血宮積滯氣壅血凝而成也內有膿血其病易治內有白膿其病難治



或長或大

發疽

腫赤堅硬 此疾初發之時毒氣在皮作熱堅硬百節疼痛虛渴不已昏沉不省人事破后疽出血如蚕多口出膿汁七日之后急用藥有鮮血難治



發癰

內闊大色 此疾初發之時不寒不熱腫處疼痛紫黑色不破裏面壞爛二十以前者積熱所生四十以后者皆血氣衰也須早為治十可全一二也



不變


欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

六



癰發



四畔生牛

此疾初發之時疼痛二十已后四十以

前者皆積傷之毒入胃壅聚而成四十

以后六十以前者乃血閉不能行壅熱

唇黑硬

積血得之如出清水汁難治

此疾發時渾身壯熱手足不遂增寒頭

痛虛渴多汗嘔逆四肢沉重五臟煩悶

是其候若出米泔津者難治

癰發



欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

秘傳十方

治一切癰疽不問發肩發背作瘡疼痛並宜服此即便
消散其效如神是名前鋒正將

荊芥

薄荷

山蜈蚣

老公鬚

天花粉

菇荑

菇片

敗荷心

川白芷

猪牙皂角

切

赤芍藥

以上各

淮烏

大者一
筒煨

紅內消

倍其

甘草

每十五分

入一

分喜甜加用

右為末每服二錢薄荷茶清調下欲快利用酒調效



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

若服經日未見效恐是涼藥澀血可加當歸羌活如

熱重雄黃酒調乳癰加荳草根研汁調其餘候止用

酒下不飲麥門冬去心煎湯亦可但較緩耳

凡用內消先用此藥退潮止渴解熱是名引兵先鋒以

升麻葛根湯表散後服此

木通

瞿麥

荊芥

薄荷

白芷

天花粉

甘草

赤芍藥

麥門冬

去心

生乾地黃

山梔子

車前子

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

連翹

各等分

活

右剉散每服二錢燈心生地黃煎熱潮加淡竹葉煎
溫服上膈食前下膈空心老人氣虛者宜加當歸羌
活

荊芥

和根
剉碎

赤芍藥

大栢皮

土當歸

山大黃

土白芷

天南星

赤小豆

商陸乾 即中舊根剉片子焙	白欬	右為末生地黃自然汁調角四畔或苦蘆根汁腫用	商陸根研汁未潰則滿體塗上或有尖起處則留出	瘡口	洗方諸發已破未破皆洗如成膿潰爛最要洗淨去故	肉生新肉洗后淨乾再用角貼摻藥一日一次名水師	晶明	欽定四庫全書 世醫得效方 卷十九	大柏皮	赤芍藥	獨活 各等分	右剉麤散用水一斗入葱白大椒橘葉同煎熏洗如	已爛入猪蹄下膝爪骨肉煎可免乾痛淨洗為度	替針丁香圓	草烏尖	右為末酸醋調點將破者令速潰但有急則無如刀
白芨	寒水石 煨或炒各等分								澤蘭	山大黃					硃砂	
赤欬									莽草	土白芷	土當歸				堅者	
									荊芥							

為快蟬針一法亦妙見后	內護治癰發已成未成服內消三五日不效或年四十	以上氣血衰弱成者速潰未成者速散服至瘡口合而	止內能固濟去舊生新是名固壘元帥又名加味十奇散	當歸 酒浸	香白芷	甘草 五文	右前八味各等分同為末每服二錢酒調日三服病	愈而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯	治諸發已潰去舊生新老人氣血虛弱宜補之此潰後	服至愈而止是名護壁都尉	防風 去蘆	黃耆 炙各半兩	當歸 各三錢	右為末每服二錢空心溫鹽酒調服至瘡口合後更	服為佳不飲酒木香湯兼服降氣湯尤妙 方見前	
桂心 不見火	防風 去蘆	乳香 另研	沒藥 另研	厚朴 去粗皮姜汁炒	厚朴 去粗皮姜汁炒	桔梗					厚朴 製同上	川芎	人參 二錢			
土芎											苦梗	白芷	甘草	柳桂		

生肉神異膏治癰疽壞爛及諸瘡發毒

雄黃 五錢 滑石 倍用

右為末洗后摻瘡上外用綿子覆蓋相護凡洗后破爛者用此貼之

止痛拔毒膏治一切瘡發臭爛不可近未破則貼破已破則生肉杖瘡丁瘡皆用之

斑蝥 四十箇 柳根 四十條 木鱉子 七箇 乳香

沒藥 麝香 少許 松脂 三錢

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十九

右用真清油十四兩煎黑柳條焦枯濾去渣入黃丹

五兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪及勻入磁器

中收了后用神妙

斂瘡口黃丹散

黃丹 煨 白礬 枯 龍骨 寒水石

乳香 木香 不見火 黃連 黃芩

檳榔 膩粉 各三錢 腦子 少許

右為末隨瘡乾濕用之乾則用濕鹽湯洗濕淨乾却

摻其上用不可太早須膿血去盡臨好方用不然則

又譽作

通治

車螯散治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等急宜宣毒利下熱退為度大人小兒四季皆可服之

紫背車螯 一隻鹽泥固濟火煨 輕粉

甘草 各二錢 大黃 五錢 黃芩 漏蘆 去須

瓜根 各半兩

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十九

右為末每服二錢薄荷湯下速利酒亦可

單煮大黃湯治同上氣血衰者不可用

大黃 甘草

右剉散每服三錢水一盞半煎空心服利下熱毒

五香散升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱治陰

陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癤而非

使人頭痛惡心寒熱氣急

木香 丁香 沉香 乳香



藿香 各等分

右剉散每服三錢水一盞半煎食後溫服

五香連翹湯治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

青木香
木即船
香上

沉香 丁香

薰木香
香即乳
麝香

升麻
桑寄生

獨活
連翹

射干
木通
兩各二

大黃
蒸三兩

右剉散每服四錢水二盞煎一盞空心熱服半日以

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

上未利再服利下惡物為度未生肉前服不妨以折

去熱毒之氣本方有首深芒硝恐泥者不能斟酌故

缺之知者自當量入

平補散利後不止手足冷此藥補之溫脾正氣

白朮
甘草
白薑
陳皮
錢各二

茯苓
木香 各一錢
肉豆蔻 二箇煨

右為末服前藥後則可服鹽湯調二錢日三四服利

止手足溫食進却住服

加味十全湯治老人虛極瘡疾臨愈宜服

黃耆
生乾地黃
當歸
酒並浸
川芎

人參
白茯苓
粉草
白芍藥

桂心 不見火
烏藥
白朮 米泔浸
麩炒 陳皮

北五味子
微炒
各五錢以上

右剉散每用一兩水一椀薑五片北棗一枚同煎分

作二服渣可曬乾再為末服

真方不換金正氣散治疽瘡未安之間遍身寒熱或先

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

寒後熱先熱後寒或連日作或間日作必先嘔痰而後

寒熱大汗出然後止服此却寒邪正脾氣痰飲自消寒

熱不作

蒼朮 米泔浸半日炒令黃色

大厚朴 紫色者去粗皮用薑汁炒各二

兩
粉草 炙一兩
真橘紅 半水以洗上淨四去味並兩

入鍋內炒
去火毒

半夏
湯洗七次

藿香葉

人參
去蘆

木香 去蘆
白茯苓 去皮各一兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎

八分入鹽少許溫服不拘時候

阿膠飲子治一切癰疽發背挾癰瘡癰癰癰毒並治之

明阿膠

劉蚌粉炒如珠子出火毒一兩

真橘皮

半兩

粉草

一兩

右剉散分作三服水一椀煎候溫病在上食後服病在下空心服累效

忍冬酒治癰疽發背初發時便當服此不問疽發何處婦人乳癰若鄉村或貧乏無得藥材者虔心服之大有

神效

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十九

忍冬藤

五兩
不犯鐵

大甘草節

一兩

右各生用水二椀慢火煎一椀入無灰酒一大椀再煎十數沸去滓分三次溫服如無生者用乾者終力淺更生取葉一把搗爛入餅子酒少許生餅酒尤佳調和稀稠得所傳瘡四面中心大留一口泄毒蠟礬圓治癰疽發背癰癰漏瘡惡瘡衛護內膜驅解諸毒自然內消

通明白礬

生用二兩

右為末以黃蠟一兩二錢鎔汁就爐上入礬拌和衆手圓如梧桐子大每服十五丸熱水或冷酒下常服之漏瘡用油髮灰和雞內金末外塞

粉乳托裏散癰疽初發便服或毒氣入裏衝心煩悶吃嘔喘嗽以至泄瀉急用頻服托裏返出毒氣自內發起達外又能消已發未發皆可服之神效

真葦豆粉心

二兩

明乳香

半兩
以蘆葉盛蓋火熨

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十九

攤冷
研

右為末每服二錢新熟水調下或生甘草煎湯調食後少時細呷常要藥味在胃膈間則毒氣不能攻心或瘡已沉晦用當歸一錢辣桂二錢煎湯調下仍以加味不換金正氣散為佐小兒痘瘡陷入亦能救之癰癰攻心嘔悶亦用五味子湯治腎水枯竭運用不上致令口中乾燥舌上堅硬或如鷄內金



北五味子 去蘆 綿黃耆 去蘆 條參 去蘆 麥門冬 去心	半 各兩 粉草 半兩	右剉散每服半兩水盞半煎不以時溫服日夜五次	神白膏貼五發未破	南星 大黃 草烏 白欽 各半兩	蚌粉 大栢皮 各一兩 小赤豆 一合	右為末取芭蕉頭研取油調角四畔加乳香沒藥尤妙	乳香膏止痛	木鱉子 去殼 當歸 各一兩 柳枝 二尺寸 剉之同	煎令黑色 次用 乳香 各半兩 沒藥 各半兩 白膠香 明淨	者四兩同研細入油 煎化用綿子濾之	右先事治辦煉藥銚令極淨再傾煎藥油蠟在內候溫入黃丹一兩半以兩柳枝攪極得所再上火煎不住手攪候油沸起住攪注在水中成珠不散為度

秋冬欲軟春夏欲堅傾在水中出火毒搜成劑收之	追毒丹治瘡疽黑陷者用針刀開瘡內追毒丹使之潰	然後去敗肉排膿隨證治之癰疽疔瘡附骨疽並皆治之	巴豆 十粒去油研似泥 白丁香 輕粉 各一錢	雄黃 黃丹 各二錢	右件研和加白麵三錢滴水為圓如麥狀針破瘡內之覆以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不去	不可治亦以此追毒去死肌乃養肉令愈疾小者用一粒大者加粒數用之	太乙膏治五發癰疽一切惡疾軟癰年深日遠已成膿	未成膿貼之即效蛇虎蝎大刀斧所傷並可內服外貼	發背先以溫葱湯水洗瘡拭乾用帛子攤藥貼仍用水	下血氣不通酒下赤白帶下當歸酒下咳嗽喉閉纏喉	風並綿裏含化一切風赤眼貼太陽穴後用山梔子湯	下打撲傷損貼藥仍以橘皮湯下腰膝痛貼之鹽湯下



唾血桑白皮湯下諸漏先以鹽湯洗若諸瘡癰並量大
小以紙攤藥貼之並每服一粒旋圓如櫻桃大以蛤粉
為衣其藥可收十年不壞愈以愈烈神效

玄參

川白芷

川當歸

去蘆

官桂

去粗皮

赤芍藥

大黃

生乾地黃

各一兩

右剉如大豆大用清油二觔浸春五夏三秋七冬十
日濾去渣油熬得所次下黃丹一觔滴油入水中不
散為度

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

善應膏治諸般惡瘡腫毒發背腦疽癰子牙腫打撲接
骨閃肭刀斧傷杖瘡蛇蟲毒狗馬咬湯火漆瘡疥癬貼
之即愈又治婦人吹乳以藥圓如梧桐子大新汲水下
二十圓肺癰腸癰亦可為圓吞服溫酒米飲或北梗甘
草煎湯皆可不可犯葷手及火焙

上等黃丹

八兩研極細

白膠香

明沒藥

滴乳香

並別研

大當歸

川白芷

杏仁

去皮尖

大黃

草烏

川烏

赤芍藥

檳榔

生乾地黃

土芎

滴青

別研入

亂髮

淨洗以
上各一兩

右除乳香沒藥外將磁石銚盛香油一觔浸藥一宿
慢火煎熬諸藥黑色再入葱白亂髮煎少時用生絹
帛濾去滓留下一兩藥油復將所濾油於慢火上熬
却將黃丹入油內用長柳條槐條不住手攪候有微
煙起提起藥銚將柳條點滴在水面上凝結成珠不
散方成膏如不成珠再熬直待成膏提起藥銚攪無

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

煙出却入乳香沒藥白膠末攪勻傾出磁器內將元
留下浸藥銚一併收入器內用新汲水一日一換將
藥器坐放水內三日出火毒方可用之如膏藥硬約
量加黃蠟清油入膏內攪勻得所熬膏極難於火候
須耐煩看火緊慢火猛則藥中火發不特失藥性又
燎傷製藥人面目

玄武膏治癰疽發背丁腫內外癰瘡陰疰下諸惡瘡及
頭項癰腫不問已潰未潰皆可用大能排膿散毒止痛



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

生肌累有神驗若丁腫先用銀篦或鹿角針於丁瘡中間及四畔針破令惡血出以追毒餅如小麥大擦入孔中却以此膏貼之如瘡壞爛至甚難藥貼則將皂角二三片煎油調勻此膏如稠糊薄傅之膿水或轉多不數次傅之乾愈妙

大巴豆

去殼膜

木鱉子

去殼各兩淨

黃丹

四兩研細

真清油

十兩

槐柳嫩枝

各七寸長七條剉細

右依前法煎熬成膏貼用

欽定四庫全書

世醫得效方卷十九

金不換治傷筋動骨損痛閃肭風毒惡瘡風濕筋寒諸

病

當歸尾

川白芷

杏仁

去皮尖

玄參

猪牙皂角

去皮弦

草烏

生剉用各三錢

白膠香

明者

八兩

蓮鬚葉葱

肥者十根

滴青

明者半觔

乳香

沒藥

別研為末各半兩

黃蠟

明者一兩

男子亂髮

洗淨援如雞子大

右用清油半觔將七味依前法熬濾却入膠香滴青



迪志文化出版有限公司出版

攪勻下黃蠟又攪無煙方下乳香沒藥

貼膏法如瘡有膿血不淨痂癰閉礙須用藥水洗淨拭乾候水氣乾却用膏貼貼後有黃水膿血出流用紙揩從側畔出一日一換黃水膿血止兩日三日一換貼至愈

蟻針正法治癰癰不問老少初發腫作覺見稍大便以紙一片冷水浸搭瘡上視其上一點先乾者即是正頂先以大筆管一箇安於正頂上却用大馬蟻一條

欽定四庫全書

世醫得效方卷十九

本草名

安其中頻以冷水灌之馬蟻當吮其正穴膿

血出毒散是效如無大蟻小須用三四條方見功效

若吮著正穴蟻必死用水救活其瘡即愈累試奇效

乃去毒之一端也血不止以藕節上泥止之白茅花

亦效

追毒餅治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿脹痛不可忍用此捻成小麥子大入放瘡中永不閉膿水自出瘡自乾好



迪志文化出版有限公司出版

極好信石 半錢 雄黃	雌黃 各一錢 輕粉 少許
大硃砂 一錢	
右研為細末糯米糊圓如麥子大若瘡口閉合生膿將藥入內仍以膏藥貼之	
內追毒丹清心解毒散潮	
大硃砂 雄黃各五錢 生麝香 一錢 生犀角	
琥珀 以上並別研細 黑角沉香 各五錢	
右為末煉蜜圓梧桐子大每服二十圓燈心薄荷湯下	
雜證乾葛飲治發背作渴	
黃芩 朴硝各五錢 乾葛 一兩	
右剉散每服三錢用枇杷葉去背上白毛淨洗同煎不拘時服	
蘇子降氣湯縮砂香附湯 並見大方科諸氣類	
人參敗毒散參苓白朮散 方見大方科傷寒陽證及脾胃類	
以上諸藥升降散毒理脾和氣凡諸發臨愈皆可投	



數服癰疽緣氣凝血滯氣聞香則行初發亦宜縮砂香附湯	
六一湯諸發愈後宜服	
黃耆 六兩炙 甘草 一兩	
右剉散每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎空心服	
八味圓老人血氣衰弱發背作渴不止宜服 方見大方科虛損類	
嘉禾散治疽後氣弱不食 方見大方科脾胃類	
乳香圓治發背及一切疽瘡潰爛痛不可忍者	
當歸 川芎 交趾桂 川香芷	
真菉豆粉 各五錢 羌活 獨活	
五靈脂 乳香別研 沒藥 別研各三錢 白膠香 五錢	
右為末煉蜜為圓如彈子大每服一圓用薄荷湯嚼下手足諸般損痛不能起者加大草烏一味用木瓜鹽湯細嚼下	
黑附圓治氣虛血弱老人疽發後四肢倦怠無力或燥	



渴好飲水不止者	
黑附子	一箇九錢 煨鹽水浸
白茯苓	五錢 去皮
川練子	一兩
核	去皮
茴香	一兩 炒
破故紙	一兩 炒
熟地黃	淨洗
切酒炒	一兩
交趾桂	五錢 粗皮去
大當歸	一兩
尾	去
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓空心鹽湯或鹽酒下如覺脾虛食減亦用參苓白朮散兼服	
消腫法凡春初雷始發聲時急以兩手指雷聲聲止乃止後七日勿洗手此後有一切腫及蝎螫惡注腫瘡摩之隨手即消	
乳癰	
瓜萋散如不愈者並依前方治之	
瓜萋	
明乳香	
右為末每服二錢溫酒調下熱者加石膏末少許	
又方	
草烏	
七箇	
小赤豆	
七粒	
拒霜葉	
一兩陰乾	

右為末井花水調塗角四畔黃頂用前敷藥亦妙	又方仙人掌草一握小酒糟一塊生薑一大塊搗爛入桂末少許炒酒服留滓罨腫處即止更不成瘡	乳勞癰
火炊草	皂角刺	川山甲
黃蜂窩		
右各燒存性為末入輕粉生清油調勻敷瘡上	又方赤小豆一升酒研爛去滓溫酒服留滓敷患處	又方蔓荊子搗爛炒酒服滓貼患處
欽定四庫全書	世醫得效方	卷十九
又方乳勞癰爛見心者貓兒腹下毛甘鍋內煨存性為末乾摻或清油調入輕粉少許	吹乳結實疼痛陳皮一兩甘草一錢水二椀煎一椀分二次服次用荊芥羌活獨活煎湯薰之溫則洗之安	又方消毒飲加連翹三錢黃瓜萆仁三十粒搥損每服四錢水一盞半煎食後溫服
方見小方科	又方皂角刺燒灰蛤粉明乳香少許為末熱酒下揉散亦可	



妳頭裂取秋後冷露茄子花裂開者陰乾燒存性灰水調敷未秋時但裂開者亦可用

灸法

癰疽高腫堅硬不破名曰石癰當上灸百壯

諸癰疽毒開闊不止疼楚殊甚以灸炷四枚圍著所作處同時下火各灸七壯多至十一壯佳

大蒜頭橫切如錢貼其中心頓小艾炷灸之五壯而上若形狀稍大以黃稈紙蘸酒敷貼認先乾處為筋

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

脚於先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而止又法屈指從四圍尋按遇痛處是根就此重按深入自覺輕快即此灸之

凡癰疽展大如龜形且看頭向上下先灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長須盡處灸之須留頭并後兩脚勿灸若盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無所走散又攻入裏也或辨認不明以白芷三分漢椒桑白皮各一分葱白十莖水一椀煎入酸醋半盞淋洗少



迪志文化出版有限公司出版

頃其筋自現可以辨認

心癰

涼血飲即引兵先鋒方治心肺有熱或作寒熱口乾好飲水渾身疼腹內作熱頭面赤色

次用內托散即前鋒正將方治同上兼用敷角洗貼已潰多服加味十奇散

以上二方並見前

腎癰

八味圓治腎虛嗜慾過度外挾寒邪發為癰腫不可施

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

以涼劑宜服

方見大方
科虛損類

加味十奇散治同上兼用葱白橘葉椒葉猪蹄湯淋洗仍貼金絲膏

方並見前

肺癰

桔梗湯治男子婦人欬而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出濁唾腥臭名肺癰小便赤黃大便多澁實者先投參蘇飲四服虛者先投小青龍湯四服並用生薑棗子煎却服此

二方見大方
科傷寒
和鮮類及通治類



迪志文化出版有限公司出版

桔梗	去蘆	貝母	去心	大當歸	酒浸	瓜蒌仁
枳殼	去穰炒	薏苡仁	微炒	桑白皮	炒	甘草節
防己	去粗皮 各一兩	百合	蒸半兩	黃耆	一兩半	知母
正地骨皮	去骨	杏仁		北五味子		甜葶藶子
兩	各半					
右剉散每服四錢水一盞半生薑五片煎不以時溫服咳不利加百藥煎熱加黃芩大便秘不利加煨大黃少許小便澁甚加木通車前子煎煩躁加白茅根咳而疼甚加人參白芷						
甜葶藶子	二兩半 紙炒赤色	百合	炒	白附子		
北五味子	炒	甘草節		羅參		欵冬花
百藥煎	各一兩	大朱砂	五錢 八研	紫苑	去木 一兩	
右為末每服二錢燈心湯調下						
牡丹散治肺癰胸乳間皆痛口吐膿血氣作腥臭						
川升麻		苦梗		薏苡仁		地榆

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九



迪志文化出版有限公司出版

黃芩		赤芍藥		牡丹皮		甘草	各等分
右剉散每一兩水一升半五合溫溫日三服							
補肺散治肺癰已吐出膿血以此潤護							
真鍾乳粉	一兩	白滑石	二兩				
右為末每服三錢米飲調下							
理肺膏治肺癰正作咳唾不利胸膈迫塞							
訶子	去核	百藥煎		五味子	微炒	條參	去蘆
欵冬花藥		杏仁		知母		貝母	
甜葶藶子		紫苑		百合		甘草節	以上
錢	各五						
右為末用白茅根淨洗秤三觔研取自然汁入磁石器中熬成膏更添入好蜜二兩再熬勻候冷調和前藥為圓如梧桐子大溫水吞下							
加味敗毒散治上膈壅熱而成肺癰兼感風寒重者加入黃芩瓜蒌仁薄荷當歸川白芷半夏烏梅桑白皮每半料各五錢生薑生地黃燈心白茅根煎熱甚加大黃							

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九



迪志文化出版有限公司出版

內護排膿散理肺癰吐膿後宜服排膿補肺

嫩黃耆 二兩 川白芷 北五味子 炒 人參 各一兩

右為末煉蜜圓如小指頭大偃仰入口噙化旋旋嚥

下食後服臨卧服

葦葉湯

薏苡仁 瓜瓣仁 桃仁 去皮尖各一兩

右剉散每服四大錢水二盞先以葦葉一握煎取一

盞去滓入藥煎六分食後服或吐膿血勿怪

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十九

五香白朮散寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食

沉香 木香 明乳香 丁香

藿香葉 各半兩 白朮 羅參 白茯苓

薏苡仁 山藥 扁豆 桔梗

縮砂 白豆蔻 粉草 蓮肉 各一兩

右為末蘇鹽湯調空心服棗湯亦可有汗加浮麥煎

雲母膏治一切內外癰瘡依和劑方修合煎北梗甘草

湯吞服服畢便就枕有熱者善應膏亦可圓服湯引同

上方見前

加味十奇散治肺癰已散不咳不疼服此去舊生新內

能固濟 方見前

肺癰證始萌易治膿成難治診其脉數而實已成微而

濇漸愈面色白嘔膿而止者自愈有膿而嘔食面色

赤吐膿如糯米粥者不治男子以氣為主得之十救

二三婦人以血為主得之十全七八歷試屢驗

灸法治肺癰正作吐膿血不已肺膺灸二七壯在二椎

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十九

下三椎上各去脊一寸半及灸諛諱二穴二七壯其

穴在肩膊內脇第六椎兩傍三寸抱肘取之

腸癰

敗醬散治脉數身無熱腹無積聚按之濡此為腸癰久

積陰冷所成宜服

薏苡仁 二兩 附子 炒半兩 敗醬 一兩一分

右剉散每服四錢水一盞半煎空心服小便利為效

牡丹湯治腸癰小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時



時發熱自汗出復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血洪數者膿已成不可下

大黃 蒸

桃仁 去皮尖各半兩 牡丹皮 一錢一字 瓜蒌子 三分

芒硝 二分

右剉散作一服水三盞煎八分去滓入芒硝再煎沸

頓服不拘時候未效用敗毒散 方見大方科傷寒類

薏苡湯治腸癰腹中疝痛煩毒不安或脹滿不食小便

澁婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服

欽定四庫全書 世醫得效方卷十九

就有差互亦無害

薏苡仁 五兩 牡丹皮 桃仁 各三兩 瓜蒌仁 四兩

右剉散每服四錢水一盞半煎不拘時服

蠟礬圓治腸癰內托神妙 方見前

附骨疽

蟾蜍膏治附骨疽久不差膿汁敗壞或骨從瘡孔出

大蝦蟇 一枚 亂髮 一握如雞子大 猪脂油 四兩

右以猪脂油煎前項藥濾去滓凝如膏貼之凡貼先

以桑白皮烏豆煎湯淋洗拭乾煨龍骨為粉摻瘡口四畔令易收斂却用貼之

焦鯽膏治附骨疽未破已破或膿出不盡者

右用黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令腹滿用線縛定用水一盞銅石器中煮水盡乾焦為末用猪油調敷已破者乾摻少痛勿怪

赤木圓治附骨疽膿汁淋漓久而不瘥已破未破皆可用

用

欽定四庫全書 世醫得效方卷十九

赤木 一觔 白 泔浸去油用川椒

破故紙 炒 川練子 剉炒 茯苓 土茴香

川白芷 桃仁 去皮尖炒

右為末老人加黑附子煉蜜圓梧桐子大每服五十

圓溫酒或鹽湯吞下

便毒

雙解散治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼

痛



辣桂	川大黃	白芍藥	澤瀉
牽牛 炒取末	桃仁 去皮炒	甘草 半分	
右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎食前日二服先小便快熱從小便出後大便利皆是稠毒			
五香連翹湯治便毒腫結因敗精搏血留聚而成立效			
方見前			
復元通氣散便毒初發用此	方見前		
癰疹			
欽定四庫全書	世醫得效方		
神木散治因浴出腠風冷徧身癰疹搔之隨手腫突及昏暈嘔噦			
白朮 一兩	神麴 二兩炒	甘草 一分	
右為末每服二錢米飲調下一方以土朱研炒冷酒調下二錢不飲以茶調下			
消風散治癰疹瘙癢神效	方見風科		
茶調散治風熱癰疹	方見大方科頭痛類		
胡麻散治風氣挾熱癰疹瘙癢			

胡麻子 五兩	苦參	荊芥穗	何首烏 各二
兩	葳靈仙	防風	石菖蒲
牛蒡子 炒	菊花	蔓荊子	蒺藜 炒去刺
甘草 炙各兩半			
右為末每服二錢食後薄荷湯或好茶清下			
治徧身癰疹疼痛成瘡			
白殭蠶一兩炒黃色為末分四抄酒調服			
傅藥明礬朴硝為末井水調雞羽掃敷			
欽定四庫全書	世醫得效方		
又方赤小豆荊芥穗碾為末雞子清調薄敷			
洗方蚕沙以新水煎密室溫洗			
諸瘡			
熱證平血飲治徧身生瘡膿血瘡腫極痛且癢			
乾葛	赤芍藥	升麻 各一兩	粉草 五錢
加天麻	蟬蛻		
右剉散與人參敗毒散合和生薑薄荷生地黃麥門冬去心煎不拘時候大效	敗毒散見傷寒陽證類		



小牛黃圓治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩
瘙癢難忍時出黃水及大風手足壞爛眉毛脫落一切
風疾

玄參 荆芥穗各四兩 苦參半觔 大川烏

宣連各一兩 真牛黃二錢

右為末水糊圓梧桐子大每服三十圓熟水或茶清
下一方加麻黃防風皂角末為膏入煉熟蜜為圓妙

牛黃清心圓 方見風科通治類

欽定四庫全書 世醫得效方卷十九

天麻煎治風毒入胃及心腎經絡攻注百節疼痛頭目
虛腫痰涎不利下注腰脚弱緩生瘡婦人血風男子癩
風乃風濕脚氣攻注皮膚瘙癢癰疹偏正頭風

川烏頭淨洗灰炒去皮臍 草烏頭水浸三日洗去皮各二兩

荆芥穗四兩 乾薄荷二兩 杜當歸水浸三日曬乾八兩切

右為末醋糊圓如梧桐子大茶清下三十圓

酒蒸黃連圓治同上 方見大方科諸氣類米飲下三十圓

荆黃湯治惡瘡生背脇頭腦四肢要害處連進一二服

得利即效未利再服 方見大方科積熱類

當歸飲治心血凝滯內蘊風熱發於皮膚偏身瘡疥或
腫或癢或膿水浸淫或發赤疹痞癰

當歸去蘆 白芍藥 川芎 生地黄洗

白蒺藜炒去尖 防風去蘆 荆芥穗各一兩 何首烏

黃耆去蘆 甘草炙各半兩

川芎 當歸 地黃 甘草

芍藥各等分 防風 荆芥 鳳尾草酌量

欽定四庫全書 世醫得效方卷十九

加 入

右剉散每服三大錢水一盞半煎服經驗

五香連翹湯治風氣風癰瘡除升麻大黃獨活木通乳

香五味忌食冷物服後小水必通 方見前

五苓散加瞿麥大畧治同上此方得之艱用之取效

敷藥合掌散治偏身生瘡百藥不效

檳榔五箇為末 硫黃五錢生者研細末 膩粉半錢

右和勻每服一錢安於手心內油調夜卧時塗外腎



不得洗手但擦手令乾可也一二日瘡即愈

通治多年惡瘡不瘥爛搗馬齒莧敷之亦治反花瘡其

形如花開之狀燒灰以豬脂塗敷 又方雞腸草研

細取汁拂其瘡以渣蓋之或為末豬脂調敷極效

赤小豆方治善惡瘡疥或赤腫無不愈者

右用赤小豆七七粒為末敷之愈或以水調敷瘡及

四傍赤腫處落則再敷又方剉散每服二錢水一盞

煎服仍用新汲水調藥敷緣赤豆粉粘物即乾難揭

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十九

則用苧根為末和之便不粘此法尤佳

殺蟲方

雞心檳榔 一兩 黃連

川山甲 十箇 燒存性

射香 半錢

右為末用腦茶末調塗三五日後用葱湯洗

惡瘡方

苦練皮燒灰以豬脂調敷

青黛散治中部生濕瘡熱癢而痛寒熱大小便澀食亦

減身面微腫多食魚蝦發風熱物得之

馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有神

效仍服八正散日三服 方見大方科積熱類

洗方苦參湯

苦參 蛇床子 白礬 荊芥穗

右等分用水煎放溫洗

驅風散

紅椒 開口者 七粒 連根葱頭 七箇

欽定四庫全書 世醫得效方 卷十九

右同煮水淨洗用絹衣浥乾即愈

指縫搔癢成瘡有竅出血不止多年糞桶籬篾乾燒灰

敷之即安

火氣入瘡黃栢皮為末摻之立愈薄荷煎塗亦可 方見大方

科積熱類

漆毒成瘡磨鐵槽中泥塗之即愈又方蟹黃塗之效

癰瘡神降散治走皮癰用桑寄生一小把本槲桑根取

皮一握白芷黃連煎湯溫和以帛蘸洗候露出盡拭乾



傳之

滿尺皂角

去弦核
燒存性

麻竹大籜

燒存性

厚黃栢

鷹爪黃連

爪樟葉

乾

白芷

右等分為末清油調敷神效慎勿喫醋

凍瘡以茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

又方治足上凍爛生瘡黃丹為末用猪脂調敷

人面瘡用貝母為末小葦筒灌其瘡口數日成痂而愈

白癩瘡每旦瘡上退白皮一升許如蛇蛻宜服解毒雄

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

黃圓三四服即安

方見風科
熱證類

甲疽瘡綠礬散

綠礬

半兩
炒熟

蘆薈

一錢半

一字

右研如粉以絹袋盛藥納指於袋中線扎定瘡為度

月蝕瘡胡粉散

胡粉

炒微黃

白礬

煨

黃丹

煨

黃連

淨

輕粉

各二錢

胭脂

一錢

麝香

少許

右為末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥乾則用清油

調

癩頭瘡先用本人小便燒秤錘令紅投於小便中方與

洗瘡皮皆去然後以帛拭乾用滴清五文細研用油

魚三箇以盞燒成油調滴青塗之三日效

頭上風屑極癢用藜蘆根不拘多少為末先洗頭須避

風候稍乾時用藥粉定須要藥入髮至皮方可緊縛

兩日夜

腎臟

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

活血驅風散治肝腎虛為風毒所入濕痒生瘡

當歸

去尾

川芎

白芷

華陰細辛

白蒺藜

炒去刺

桃仁

浸去皮
尖焙

白芍藥

半夏

洗

五靈脂

甘草

各三錢

蒼朮

炒

杜仲

去粗
皮薑

汁炒
斷絲

辣桂

天麻

薏苡仁

橘紅

檳榔

厚朴

去粗皮
薑汁炒

枳殼

去穰
切炒

各四兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚煎去



滓入乳香末少許以佐心氣使心腎相交挾熱去桂乳香加黑豆煎服

青木香圓踈導腎經風水腎虛挾邪浮腫多用安腎圓

少用青木香圓夾和鹽湯下屢效

方見大方科諸病及虛損類

小牛黃圓治腎虛挾熱陰囊癢痛多瘡

方見前

烏荊圓治肝腎風癢

方見風科通治類

神妙丹治外腎濕癢

方見風科歷節風類

不換金正氣散踈導脾腎濕氣

方見大方科時疫類

欽定四庫全書



世醫得效方卷十九

莖物腫爛淫汁方大腹皮一升苦參荊芥各二兩煎湯

溫洗拭乾以津液塗潤次用油髮燒存性入白芨末少

許敷逐日煎湯密室洗換或加乳香末仍服蠟礬圓以

髮灰末米飲調吞下

方見前

腎臟風發瘡疥

雞心檳榔

二箇破開以黃丹三錢合在內用濕紙裹煨

全蝎

六箇

明硫黃

四錢

右為末入輕粉半錢麝香少許青黛末半錢於磁器

內收每用少許清油調抹兩掌揜外腎女以兩掌揜兩乳各睡至醒次日又用經驗

又方大紅川椒去目水蘸濕半日夾生杏仁研膏擦手

如上法亦效

外腎疳瘡用抱雞卵殼鷹爪黃連輕粉各等分為末煎

過清油調敷香附子白芷五倍子煎水洗

陰莖瘡

豆粉

一分

蚯蚓

二分

欽定四庫全書



世醫得效方卷十九

右用水研塗上乾又敷之

陰囊上瘡

甘草煎湯溫洗却用腦茶末就敷貼

陰頭生瘡

右用溪螺殼溪港中螺舊者為妙乾鍋中煨過為末

先以鹽水洗五七次後以前藥敷之

妬精瘡

右用大田螺兩箇和殼煨過存性為末入輕粉搽所



患處即可安

又方治年少陽道興起當泄不泄不泄強泄脹斷嫩皮
初如針眼大畏疼不敢洗刮日以攻入皮肉連莖潰
爛一二寸許用荊芥黃栢皮馬鞭草甘草生葱煎湯
洗去膿靨以訶子燒灰入麝香少許乾摻患處仍斷
房事數月臨睡喫冷水兩三口勿令陽道興起脹斷
瘡靨堅後即安矣

津調散治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

黃連

欵冬花 各等分

右為末以地骨皮蛇床子煎湯用軟帛浥乾津調藥
塗之最忌不得用生湯洗諸瘡皆然

癩子滑石粉

綠豆粉 二兩
焙透 軟滑石 一兩
研

右為末和勻以綿撲子蘸撲仍以膩粉佐之

蛇纏瘡用雄黃為末醋調塗仍用酒服凡為蛇傷及蜂
蟻蜈蚣毒蟲顛犬所傷皆可用又方用鏡面草入鹽

搥爛敷瘡頭上立效

癩子痒痛方

新汲井水擲青蒿汁調蛤粉敷之雪水尤妙

洗方治諸般惡瘡

黃栢茵陳荊芥葱白藿香煎水溫溫淋洗

癬瘡

胡粉散治一切癬神效

胡粉 一分
砒霜 半分

大草烏 一箇
生用 硫黃 一分
研

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

蝎稍 七枚

雄黃 一分
別研

斑蝥 一箇

麝香 少許

右為末先以羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處
烏頭圓治宿患風癬遍身黑色肌體麻木痺痛不常

生烏頭一觔刮洗去皮令極淨攤乾用清油四兩鹽

四兩同藥入銚內炒令深黃色取出剩油只留鹽并

藥再炒令黑色煙出為度取一箇劈破心內如米一

點白者恰好白多再炒趁熱羅為末醋糊圓如梧桐

子大每服三十圓空心溫酒下然草烏性差熱難製



五七日間以烏豆煮粥解毒	
通身牛皮癬方	
川烏	草烏
	去皮尖
何首烏	
白芷	
蘇木	各等分
右截小片臘月猪脂油煮焦候冷入鹽少許磁器收時常挑一匙空心酒調下	
又方雌黃末入輕粉猪脂調抹	
又方斑蝥	燈上燒米醋內淬再燒再淬
凡三兩次就燒為灰存性	
欽定四庫全書	世醫得效方
卷十九	
右用紅棗一枚湯泡剥去皮核與藥同研爛先以手抓破癬然後搽藥不可犯好肉恐有毒	
昨葉荷草散治一切癬無問風濕氣血與夫相染而生者	
昨葉荷草	一兩瓦
	上日乾
枯礬	一錢
雄黃	半錢
右為末以羊蹄菜根先蘸醋揩癬上令痒破即以藥末乘濕塗傳不過三兩次而愈更服局方何首烏散	
虛者消風散合和服	
方見風科	

打撲而成者其瘡口狹皮內極闊皮薄如竹膜極痒痛終日黃水流延蔓而生甚者數年不愈又易於染過他人患此者須忌房室則易愈內外賺瘡皆治之

韭菜地上地龍糞乾為末入輕粉清油調敷白犬血亦可

又方治脚肚上生瘡初則如粟漸大爪搔不已成片包脚相交黃水出痒不可忍久成痼疾最難愈

百藥煎研細津唾調逐連塗敷自外而入先以貫衆

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

煎湯淋洗後用藥

又方石榴皮煎取濃汁稍冷拂瘡上冷如冰雪即成痂

又方用鱔魚數條黃色者尤妙打死先用清油塗其腹

下置瘡上盤屈令徧帛子繫定食頃覺瘡痛不可忍

然後取鱔魚看腹下有針眼大竅子皆蟲也如未盡

再以數條依上再縛蟲去盡却用死人脚脛骨燒灰

清油調敷或以骨灰一兩入好茶末二錢同調亦可

又方亦可治打撲脚脛上成瘡此最難愈

檳榔 半兩

龍骨 一分

輕粉 半錢

乾猪屎 半兩

性 燒存

右為末先以甘草鹽湯淨洗瘡口軟綿拭乾清油調敷一日一換五日定差忌無鱗魚魚鮓熱麵

又方治冷賺瘡鹿角灰髮灰乳香為末清油調敷

又方治足上生瘡臭穢潰爛漏藍子一枚燒為末入膩

粉少許井水調塗效

檳榔散治同上

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

全蠋 七箇

斑蝥 十四箇

巴豆 十四粒

檳榔 一箇

先用清油兩半慢火煎先入全蠋次斑蝥次巴豆隨

下檳榔見巴豆黑色方入黃蠟一兩候溶去藥滓不

用只用蠟油入後藥

黃蘗皮 炙

蛇床子 各研

錢二

雄黃 研

硫黃 研生者

黃丹 火飛

海螵蛸 各一

白膠香

黃連

杏仁

輕粉

清油 膠香與油先溶

右為末同入清油中調敷瘡上立效



單方治癰瘡成舊累月不乾

上好砂糖先用鹽湯淋洗後綿帛拭乾以津唾塗却以此敷上三日愈神效

粉麝散治外癰瘡臭爛數十年不愈者

生龜一箇

烏者打死去肉取殼酸醋一碗炙醋盡為度仍煨令白烟盡存性用盤蓋地上

出火毒

右為末入輕粉麝香拌勻臨用先以葱水洗乾方用

藥

欽定四庫全書

世醫得效方卷十九

牡礪散收斂瘡口令乾

牡礪一塊

用破草蓆包裹入火內煨令通紅去火候冷取出研

右隨用時旋入枯飛過白礬少許拌和敷瘡口上

秘方治脚脛骨上作瘡久爛黑或發孔或臭穢不可近

用地龍十數條小竹簽穿定瓦上焙乾為末真清油

調敷劃時取效

秘方隔壁膏用多年老杉木節燒灰真清油調箬葉盛

隔貼在瘡上以絹帛繫定不數貼而愈

洗藥用海桐皮石榴皮等分煎湯淋洗令淨然後用薰藥

熏藥用牛蒡子半兩研為末入紙撚之內燒熏之然後

塗藥

手足裂腫

白及膏治斷根皸用頭髮一大握桐油一椀於瓦器內

熬候油沸頭髮溶爛入川白芷白及松脂末出火攤

冷以瓦器收貯不容灰入每用百沸湯泡洗皸裂令

欽定四庫全書

世醫得效方卷十九

軟拭乾敷其上即安或加少水粉

秘方五倍子為末用牛骨髓填縫內即愈

又方手足皸裂春夏不愈者

生薑汁

紅糟

鹽

猪膏

臘月者佳

右同研爛炒熱擦入縫內一時雖痛少頃皮軟縫合

仍再用之即安

治久行脚心腫痛方蚯蚓糞塗腫處高擱起脚一夕即

愈



又方行路脚跟腫痛用草烏甘遂各等分為末新汲水調敷露出腳爪甲

黃蠟膏治冬月手足拆裂

清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎候溶入

光粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯洗

火上烘乾即用藥敷薄紙貼之

傳藥治遠行腳腫用之可行千里輕便甚妙

防風

北細辛

草烏

各等分

欽定四庫全書



世醫得效方卷十九

右為末摻鞋底內如著草鞋即以水微溫過然後摻

藥

漏瘡

蠟礬圓治癰疽發背瘰癧漏瘡惡瘡衛內膜驅解諸毒

自然內消神效

方見前

解溫散溫散漏瘡風冷

藿香葉

厚朴

去粗皮薑汁炒

半夏麴

橘皮

蒼朮

炒

細辛

川芎

白芷

各一分

辣桂

川白薑

主

甘草

炙各半分

右剉散每服三錢水一盞生薑棗子煎服

豬腎酒通行漏瘡惡水自大腸出

黑牽牛研細去皮取末一分入豬腎中以綫扎青荷

葉包慢火煨熟細嚼溫鹽酒下

食治方治漏瘡肛門周匝有孔十數諸藥不效用熟犬

肉蘸濃藍汁空心食之不食犬肉驢肉代之七日自

安

欽定四庫全書



世醫得效方卷十九

桂附圓治氣漏冷漏諸瘡

桂心

附子

炮裂米醋中浸再炮

厚朴

去粗皮薑

汁炒

甘草

炙

白朮

各一兩

木香

一分

乳香

二錢另研

右為末煉蜜圓梧桐子大空腹米飲下三五十圓

乳香雲母膏治漏瘡效

穿山甲

浸一宿去肉用一百片

真蚌粉

同炒候香熟起泡去粉以甲為

末細研



右入乳香末一錢麝香半錢夾和雲母膏十五貼為		圓梧桐子大每服三十圓溫酒下仍以鹿角膠調鹽		酒服神授散 方見大方科癆瘵類		安腎圓山藥圓二藥多服調養 方並見大方科虛損		代赭石圓治痔變為瘰癧血不止		代赭石 煨醋研 磁石 煮米醋數沸 白礬 煨		牡礪灰 龍骨 研 蛭皮 炙焦 皂莢刺 燒		猪後蹄垂甲 燒各存性 赤石脂 川椒 焙		木賊 焙 蜂房 炒各等分		右為末神麴糊圓如小豆大每服五十圓食前艾并		生薑煎湯下漏血處以熟艾搜和血竭塞日三換		雄黃膏治積年冷漏黃水不止		雄黃 硫黃 研細各一分 頭髮 黃蠟 各半兩		右用清油二兩煎熬頭髮溶盡去滓次入雄黃硫黃		碎片黃蠟慢火上用枝頻攪為膏攤生絹貼用藥先		以赤甘草頭煎湯洗或露蜂房白芷煎湯常洗常貼	

黑靈散漏瘡通用		露蜂房 剉二分 牡礪粉 黃丹 硫黃 各一分研		右同炒令煙盡為末入髮灰一分麝少許拌和敷患		處麝能引藥透達亦殺虫		又捷效方用信石新瓦上火煨過為末以津液潤紙撚		子蘸少許推入瘡孔內如瘡孔多不可齊上藥免使		害人		血竭散治痔漏痛不可忍		血竭 牡蠣灰 髮灰 各等分		右為末入麝香少許自以津唾調敷如更痛研杏仁		膏調藥敷之		洗漏瘡方漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨每用白		芷及露蜂房煎湯洗或大腹皮苦參湯洗洗畢候水		出拭乾用向東石榴皮晒為末乾摻		以冷漏瘡用活鱧魚五六條擲地以竹針貫之覆瘡良	



以當有蟲出如線復之使盡用檳榔黃連末數明日以乾艾作湯投白礬三二錢洗不一月全愈

瘰癧

白花蛇散治九漏瘰癧發於項腋之間增寒發熱或痛或不痛

白花蛇

酒浸軟去皮骨焙乾取二兩

生犀角

鎊半青皮半兩

黑牽牛

生半兩炒半兩

右為末每服一錢入膩粉半錢研勻五更糯米飲調

欽定四庫全書



世醫得效方卷十九

下已時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一

服忌發風壅熱物如已成瘡一月可效用之神靈

四聖散治瘰癧用花蛇散取轉後用此補之永去根本

海藻

洗

石決明

煨

瞿麥穗

羌活

各等分

右為末每服二錢米湯調下日三服下清水盡為妙

牽牛圓立效

荊芥穗

僵蚕

各五錢

斑蝥

二十八箇去頭翅足用糯米炒

黑牽牛

五錢

右為末皂角末熬膏為圓菜豆大臨睡時先用米飲調滑石末一錢服半夜時再一服五更初却用溫酒吞二七丸服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服更以燈心湯調琥珀末一錢服之以小便內利去惡毒是其應也

連翹圓治瘰癧結核或破未破者

薄荷

新者二觔搗取汁

皂角

二挺水浸去皮搗取汁

欽定四庫全書



世醫得效方卷十九

以上二味於銀石器內熬成膏次入

連翹

半兩

半炒

皂角子

慢火炮去皮取仁搗羅為末各

青皮

陳皮

各一兩

半兩

右為末用前膏為丸梧桐子大煎連翹湯食前下三

十丸

三聖圓治瘰癧

丁香

五十箇

斑蝥

十箇

麝香

一分另研

右為末用鹽豉五十粒湯浸爛如泥和藥令勻丸如



菖豆大每服五七丸食前溫酒送下日三服至五七日外覺小便淋瀝是效即加服或便下如青筋膜之狀是病之根忌濕麵毒食

必勝圓治瘰癧不以年深日近及腦後兩邊有小結核連復數箇兼勞瘵腹內有塊

鯽魚一箇去腸肚并子入雄黃一塊雞子大礪砂一錢於腹內仰安魚於炭火上燒煙盡取出以全蜈蚣一條蓬朮半兩梔子五箇皂角二並燒草麻五箇去皮燈上燒黃明膠三錢皂角二挺去皮酥炙

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十九

右為末別用皂角二挺去皮槌碎以水三椀揉汁去滓煮精羊肉四兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研成膏和藥末丸如菖豆大朱砂為衣溫酒侵晨十九日一服至晚下肉疙疸子若項有五箇則以五服藥取之視其所生多少以為服數既可更進數服如熱毒瘡癰未有頭頂者亦用消散一方加巴豆三七粒燒存性入

旱蓮子圓治少長臟氣不平憂怒驚恐諸氣抑鬱結聚

瘰癧滯留項腋及外傷風寒燥濕飲食百毒結成諸漏發作寒熱遍於項腋無問久近悉驗

旱蓮子 連翹子 葳靈仙 何首烏

蔓荊子 三稜醋濕紙裹熟煨 赤芍藥以上各一兩

南木香二兩不見火 大皂角三挺括去皮脂炙無則用羊脂

右為末米糊圓梧桐子大茶清下三十九至五十九日三服小兒量與之食後服

破毒雄黃圓治瘰癧久作不愈寒熱往來項筋攣急已

欽定四庫全書
世醫得效方
卷十九

破未破皆可服之立見逐下惡物自小便中來

通明雄黃 顆塊大朱砂 各三錢 水銀 二錢

斑蝥二十八箇去足翼用糯米炒黃

右先以斑蝥為末續以雄黃朱砂另研為末再入水銀細研合和用雞子清和糯米稠糊為丸菖豆大每服二七丸米飲或溫酒下如惡物未見半朝再一服已驗方治瘰癧已作者

烏雞子 七枚 斑蝥 四十九箇去頭翅足



右每雞子一箇去頂用筯攪勻入斑蝥七粒以紙糊蓋於飯上蒸熟取開去斑蝥食雞子每食一箇煎生料五積散嚥下服不過四五已破者生肌未破者消散

海菜圓治癰生於頭項上交接名蛇盤癰宜早治之

海藻菜

蕎麥炒去殼

白殭蚕

炒斷絲

右為末取白梅肉泡湯為丸梧桐子大每服六七十丸臨卧米飲送下其毒當自大便泄去忌豆粉雞羊

欽定四庫全書



世醫得效方卷十九

酒麵日五六服

經效方治癰癰久年不愈者

不蛀皂角子一百枚用米醋一升礪砂二錢同煮醋

盡炒令酥看數癰子多少如生一箇服一枚生十箇

服十枚細嚼米湯下酒浸煮服亦可

立應散治癰癰神效已破未破皆可服

連翹

赤芍藥

川芎

當歸

甘草

炙

滑石

研各半兩

黃芩

三錢

白牽牛

生取

末
和米炒黃為度秤三錢
川烏尖
土蜂房
蜜水洗飯上蒸日乾各二錢半
地膽
去翅足

右為末每服一大錢濃煎木通湯調下臨卧服毒氣從小便中出澀痛不妨如粉片塊血爛肉是也如未效後再服繼以薄荷湯解其風熱且地膽性帶毒濟以烏尖或衝上麻悶不能強制嚼葱白一寸茶清下以解之如小便澀燈心煎湯調五苓散服瘡處用好膏藥貼若療癰疽用此宣導惡毒本方去黃芩不用

欽定四庫全書



世醫得效方卷十九

皂角散

不蛀皂角不以多少每三十條作一束以棕櫚裹之縛定於溷缸內浸一月取出却於長流水內再浸一月死水不能浣洗不可用去棕櫚曬乾不得焙搗羅為末每一兩入麝香半錢全蝎七箇研細拌勻每服一二錢溫酒或湯飲調下一兩服愈

粉乳托裏散治癰癰攻心嘔吐發出其毒

方見前

蠟礬圓治癰癰神效

方見前



蝸牛散治瘰癧已潰未潰皆可貼

蝸牛

不拘多少以竹篦串尾上曬乾燒存性

右為末入輕粉少許猪骨髓調用紙花量病大小貼之一法以帶殼蝸牛七箇生取肉入丁香七粒於七殼肉燒存性與肉同研成膏用紙花貼之

燒灰散

大田螺并殼肉燒存性已破者乾貼未破者清油調敷

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

洗傳方白芷煎湯泡荊芥候溫軟帛蘸洗拭乾好膏藥敷貼濃汁惡肉出盡用後藥傳

半夏

南星

血竭 一錢

輕粉 少許

右為末以津唾調敷一方用五倍子海螵蛸檳榔雷丸五靈脂麝香為末乾用清油調搽濕則乾摻

天傳方治瘰癧初作未破作寒熱

木鱉子二箇草烏半兩以米醋磨入搗爛葱白連根蚯蚓糞少許調勻敷瘰癧上以紙條貼令通氣孔尤妙



迪志文化出版有限公司出版

欽瘡口

血竭

一字

棗子

燒灰半錢

麝香

少許

右灰研津唾調敷

灸法

以手仰置肩上微舉肘取之肘骨尖上是穴隨患處左即灸左右即灸右艾炷如小筋頭大

再灸如前不過三次永無恙如患四五年者如或用藥壓不退辰時著火申時即落所感稍深若三作即

欽定四庫全書



世醫得效方
卷十九

三灸平安又法只以蒜片貼在瘰癧上七壯一易蒜多灸取效

瘤癰

南星膏治皮膚頭面上瘡瘤大者如拳小者如粟或軟或硬不疼不痛宜服

右用天南星一枚細研稠糊用米醋五七滴為膏如無生者用乾者為末醋調如膏先將小針刺痛處令氣透却以藥膏攤紙上象瘤大小貼之



迪志文化出版有限公司出版

治小瘤方先以甘草煎膏筆蘸糊瘤傍四圍乾後復糊凡三次後以藥傳

大戟
芫花
甘遂

右為末米醋調別筆蘸傳其中不得近著甘草處次日縮小又以甘草膏再小暈三次中間仍用大戟芫花甘遂如前法自然焦縮凡骨瘤肉瘤膿瘤血瘤石瘤皆不可決惟脂瘤決去其脂粉則愈

治治則
殺人

蓋六種瘤肉尤不可

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

蠟礬圓治同上

方見前

繫瘤法兼去鼠妳痔真奇藥也

用芫花根淨洗帶濕不得犯鐵器於木石器中搗取汁用線一條浸半日或一宿以線繫瘤經宿即落如未落不換線不過兩次自落后以龍骨訶子末傳瘡口即合繫鼠妳痔依上法累用大效如無根只用花炮濃水浸線

黃丹末治鼻瘡癰子及面上雀兒斑



迪志文化出版有限公司出版

黃丹
礪砂
巴豆
餅藥
各二錢

右為末入生礪石灰末一錢雞子清調勻酒瘡用鵝翎刷上雀兒斑竹針刺破挑藥點之纔覺痛及微腫

可洗去

丁瘡

秘方治丁瘡

防風
細辛
甘草節
白殭蚕

青皮
黃連
羌活
獨活

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

蟬退
赤芍藥
各平兩

右剉散每服五錢先將一服入澤蘭葉少許薑一兩搗極爛熱酒沖服後用酒水各半盞生薑三片煎服病勢退減後再入大黃少許煎服下一兩洗蕩去餘毒更用白梅蒼耳子研爛貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀之甚若不疾然有效驗速累試之

秘方治魚臍丁瘡

絲瓜葉
連鬚葱
韭菜

即虞刺葉



迪志文化出版有限公司出版

右同入石鉢內搗爛如泥以酒和脹並貼腋下如病在左手貼左腋下右手貼右腋在左足貼左胯右足貼右胯如在中則貼心臍並用布帛包住候肉下紅絲處皆白則可為安如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒則難救矣		酒煎方治丁瘡		赤烏柏根 水柳根 水楊梅根 葱頭根		紅內消 香白芷 各等分		右多為剉散酒煎旋入通明雄黃研爛同服如瀉時瘡勢畧退時只喫此藥若不瀉再服通利藥		通利藥		黑牽牛 炒一兩 巴豆 十五箇 去油 大黃 五錢 生用		右為末米糊圓如菉豆大初服七九次五九第三服三九如瀉不止喫白米粥及冷水洗五心如一服即瀉住服量人虛實與服如人盛服前二藥通再服後藥人十分實者	

通藥		芫花 巴豆 大黃 荊芥 各等分 用		右剉散白水煎一沸便濾過空心服可留藥滓再煎服若要瀉住再服一服便住		連翹散瀉後用此		連翹 當歸尾 羌活 獨活		防風 赤芍藥 小赤豆 各五錢 大黃 二錢		木香 茵陳 茯苓 薄荷		紅內消 杜白芷 升麻 甘草		忍冬草 各三錢 若潮不退加黃芩葩子仁 各三錢 朴硝		右為末酒調服不拘時候薄荷湯亦可喘加人參大病三四服愈如煩嘔甘草半兩豆粉一兩為末酸蘆水下如割瘡去了疔子止血用毛鐵甲為末傳之立效	



角瘡口方

霜梅 十箇

大黃 五錢

右為塊子用石灰炒過去石灰入黃丹三錢為末乾
摻瘡口上

蟬蛻散治丁瘡最有功效用蟬蛻殭蚕為末酸醋調塗
四畔留瘡口俟根出稍長然後拔去再用藥塗瘡

蟾蜍散治丁瘡取蟾酥以白麵黃丹搜作劑圓如麥顆
狀用指甲爬動瘡上插入重者針破患者以一粒內

欽定四庫全書

世醫得效方
卷十九

之仍以水沉膏貼之取蟾酥法用癩蛇蟻於眉稜上
以手按出酥於油紙上或桑葉上用新瓦盛下然後
插在背陰菜及諸毒物切忌

灸法治諸癰灸大空穴三七壯又灸肩髃左右相當宛
宛處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯
穴在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之
又灸兩耳後髮際共百壯

世醫得效方卷十九

欽定四庫全書

子部
世醫得效方卷二十

詳校官太醫院醫士 臣舒斌

編修 臣倉聖脈覆勘

總校官降調編修 臣倉聖脈
校對官助教 臣羅萬選
謄錄監生 臣顧裕涇



欽定四庫全書

世醫得效方卷二十

孫真人養生書

元 危亦林 撰

養性序

夫養性者欲所習以成性性自為善不習無不利也性既自善內外百病自然不生禍亂災害亦無由作此養性之大經也善養性者則治未病之病是其義也故養性者不但餌藥食霞其在兼於百行百行周備雖絕藥

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

餌足以遐年德行不充雖服玉液金丹未能延壽故老子曰善攝生者陸行不遇虎兇此則道德之佑也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以制藥餌者以救過行之人也故愚者拘病歷年而不修一行纏痼沒齒終無悔心嵇康曰養性有五難名利不去為一難喜怒不除為二難聲色不去為三難依味不絕為四難神慮精散為五難五者必存雖心希難老口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能不迴其操不夭其年也五者無於胸中則信順

日躋道術日全不祈善而有福不求壽而自延此養生之大指也

黃帝問於歧伯曰余聞上古之人春秋皆度百歲而動作不衰今時之人年至半百而動作皆衰者時代異耶將人失之耶歧伯曰上古之人其知道者法於陰陽和於術數飲食有常節起居有常度不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去今時之人則不然以酒為漿以妄為常醉以入房以慾竭其精以耗散其真

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

不知持滿不時禦神務快其心逆於生樂起居無節故半百而衰也夫上古聖人之教下也皆為之虛邪賊風避之有時恬澹虛無真氣從之精神內守病安從來是以人之壽夭在於樽節若消息得所則長生不死恣其情慾則命同朝露也人年四十而陰氣自半也起居衰矣年五十體重耳目不聰明也年六十而陰痿氣力大衰九竅不利下虛上實涕泣俱出故曰知之則強不知則老仲長統曰王侯之宮美女兼千卿士之家侍妾數



百晝則以醇酒淋其骨髓夜則房室輸其血氣耳聽淫聲目樂邪色醺內不出遊外不返王公得之於上豪家馳之於下及至生產不時字育太早或童儒而擅氣或疾病而構精精氣薄惡血脈不充既出胞臟養護無法又蒸之以綿纈爍之以五味胎傷孩病而脆未及堅剛復縱情慾重重相生病病相孕國無良醫醫無審術奸佐其間過謬常有會不一疾莫能自免今少百歲之人者豈非所習不純正也抱朴子曰或問所謂傷之者豈色慾之門乎荅曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年當少壯而知還陰丹以補髓采七益於長俗一作谷者不服藥物不失一二百歲也但不得仙耳不得其術古人方之於凌杯以盛湯羽苞之蓄火又且才所不逮而強思之傷也力所不勝而強舉之傷也深憂重患傷也悲哀憔悴傷也喜樂過度傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也沈醉嘔吐傷也飽食即卧傷也跳走喘乏

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十



迪志文化出版有限公司出版

傷也懽呼哭泣傷也陰陽不交傷也積傷至盡盡則早亡盡則非道也是以養性之士唾不至遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不久處立不至疲卧不至懽先寒而衣先熱而解不欲極飢而食食不可過飽不欲極渴而飲飲不欲過多飽食過多則結積聚渴飲過多則成痰癖不欲甚勞不欲甚佚不欲流汗不欲多唾不欲奔走車馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風不欲數數沐浴不欲廣志遠願不得規造異巧冬不欲極溫夏不欲窮涼不欲露卧星月不欲眠中用扇大寒大熱大風大霧皆不欲冒之五味不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛多則傷肝鹹多則傷心甘多則傷腎此五味尅五臟五行自然之理也凡言傷者亦不即覺也謂久則損壽耳是以善攝生者卧起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有偃仰之方祛疾閑邪有吐納之術流行榮衛有補瀉之法節宣勞佚有與奪之要忍怒以全陰抑喜以養陽然後先服草木以救

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十



迪志文化出版有限公司出版

虧缺後服金丹以定無窮養性之理盡於此矣皇甫隆令日常聞道人蒯京已年一百七十八而甚丁壯言人當朝朝服食玉泉琢齒使人丁壯有顏色去三蟲而堅齒玉泉者口中唾也朝旦未起早漱津令滿口乃吞之琢齒二七遍如此者名曰練精嵇康曰穰歲多病饑年少疾信哉不虛是以關中土地俗好儉嗇廚膳餽饌不過菹醬而已其人少病而壽江南嶺表其處饒足海陸鮭鯖無所不備土俗多疾而人早夭北方仕子遊宦至

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

彼遇其豐贍以為福佑所臻是以尊卑長幼恣口食噉夜長醉飽四體熱悶赤露眠卧宿食不消未逾朞月大小皆病或患脚氣脹滿霍亂或寒熱瘧痢惡核丁腫或癰疽痔漏或偏風猥退不知醫療以至於死凡如此者比肩皆是惟云不習水土都不知病之所由靜言思之可為太息也學者先須識此以自誠慎抱朴子曰一人之身一國之象也胃腹之位猶宮室也四肢之別猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也氣猶民



迪志文化出版有限公司出版

也知治身則能治國也夫愛其民所以安其國惜其氣所以全其身民散則國亡氣竭則身死死不可生也亡者不可全也是以至人消未起之患治未病之疾醫之於無事之前不追於既逝之後夫人難養而易危也氣難清而易濁也故能審威德所以保社稷割嗜慾所以固血氣然後真一存焉三一守焉百病却焉年壽延焉

道林養性

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

真人曰雖常服餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道常欲小勞但莫大疲及強所不能堪耳且流水不腐戶樞不蠹以其運動故也養性之道莫久行久立久坐久卧久視久聽蓋以久視傷血久卧傷氣久立傷骨久坐傷肉久行傷筋也勿汲汲於所欲勿悃悃於懷忿恨皆折壽命若能不犯則得長生也故善攝生者常少思少念少慾少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十二少者養性之都契也多思則神殆多



迪志文化出版有限公司出版

念則志散多慾則志昏多事則形勞多語則氣之多笑則臟傷多愁則心懾多樂則意溢多喜則忘錯昏亂多怒則百脈不定多好則專迷不理多惡則憔悴無權此十二多不除則榮衛失度血氣妄行喪生之本也惟無多無少者幾於道矣是知勿外緣者真人初學道之法也若能如此者可居瘟疫之中無憂疑矣既屏外緣會須守五神肺 肝 心 脾 腎從四正言 行 坐 立言最不得浮思妄念想欲事惡邪大起故孔子曰思無邪也了了分明勿輟也

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

仍於每旦初起面向午展兩手於膝上心眼觀氣上入頂下達涌泉旦旦如此名曰通氣常以鼻引氣口吐氣小微吐之不得開口復欲得氣少出入氣多每欲食送氣入腹每欲食氣為主人也凡心有所愛不用深愛心有所憎不用深憎率皆損性傷神亦不用深讚亦不用深毀常須運心於物平等如覺偏頗尋改正之居貧勿謂常貧居富莫謂常富居貧富之中常須守道勿以貧富易志改性識達道理似不能言有大功德勿自矜伐



迪志文化出版有限公司出版

美樂勿離手善言勿離口亂想勿經心常以深心至誠恭敬於物慎勿詐善以悅於人終身為善人所嫌勿得起恨事君盡禮人以為諂當以道自平其道之所在其德不孤勿言行善不得善報以自怨仇居處勿令心有不足若有不足則自抑之勿令得起人知止足天遺其祿所至之處勿往多求則心自疲而志自苦若夫人之所以多病當由不能養性平康之日謂言常然縱情恣慾心所欲得則便為之不拘禁忌欺罔幽明無所不作自言適性不知過後一一皆為病本及兩手摸空白汗流出口唱皇天無所逮及皆以平生粗心不能自察一至於此但能少時內省身心則自知見行之中皆畏諸病將知四百四病身手自造本非由天及一朝病發和緩不救方更誹謗醫藥無效神仙無靈故有智之人愛惜性命者當自思念深生愧恥誠勅身心常修善事也至於居處不得紛靡華麗令人貪婪無代乃患害之源但令雅素淨潔無風雨暑濕為佳衣服器械勿用珍

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十



迪志文化出版有限公司出版

玉金寶增長過失使人煩惱根深厨膳勿用脯肉常令
儉約為佳然後行作鵝王步語作含鐘聲眠作獅子卧

右勝脇著
地坐脚也

每日自詠歌云美食須熟嚼生食不粗吞問

我居止處大宅總林村胎息守五臟氣至骨成仙又歌
曰日食三箇毒不嚼而自消錦繡為五臟身著糞掃袍

修心既平又須慎言語凡言語讀誦常想聲在氣海中

臍下
是也

每日初入後勿言語讀誦寧待平旦也旦起欲專

言善事不欲先計較錢財又食上不得語語而食者常

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二十

患胃背痛亦不用厭卧多言笑寢不得語言者言五臟
如鐘磬不懸則不可發聲行不得語若欲語須住脚乃
語行語則令人失氣冬至日止可語不可言自言曰言
荅人曰語言有人來問不可不荅自不可廢言也仍勿
觸冷開口大語為佳言語既慎仍節飲食是以善養性
者先飢而食先渴而飲食欲數而少不欲煩而多則難
消也常欲令如飽中飢飢中飽耳凡飽則傷肺飢則傷
氣鹹則傷筋酸則傷骨故後學淡食但當熟嚼使米脂

入腹勿使酒脂入腸人之當食須去煩惱

暴數為煩如
侵觸為惱

如

食五味必不得暴噎多令人神驚夜夢邪怪每食不用
重肉喜生百病常須少食肉多食飯及少菹菜并勿食
生菜生米小豆陳臭物勿飲濁酒食麪使塞氣孔勿食
生肉傷胃一切肉惟須煮爛停冷食之食畢當漱口數
過令人牙齒不敗口香熱食訖以冷酢漿漱口者令人
口氣常臭作蠱齒病又諸熱食鹹物後不得食冷酢漿
水喜失聲成尸咽風熱食汗出勿當戶發瘧疼痛令人

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二十

目澁多睡每食訖以手摩面及腹令津液通流食畢當
行步躊躇計使中數里來行畢使人以粉摩腹上數百
遍則食易消大益人令人能飲食無百病然後所修為
真快也飽食即卧乃生百病不消或積聚飽食仰卧成
氣痞作頭昏寒熱來者寒未解食熱食成刺風人不得
夜食又云夜勿過醉飽食勿精思為勞苦事有損餘虛
損人常須忌在巳時食訖則不須飲酒終身無乾嘔勿
食父母本命所屬肉令人命不長勿食自己本命肉令



人魂魄飛揚勿食一切腦大損人茅屋漏水墮諸脯肉上食之成瘕約暴肉作脯不肯乾者害人祭神肉無故自動食之害人飲食上蜂行住食之必有毒害人腹內有宿病勿食鯪鯉魚肉害人濕食及酒漿臨上看視不見人物影者勿食之成卒注若已食腹脹者急以藥下之每十日一食葵菜滑所以通五臟擁氣又是菜之主不用合心食之又飲酒不欲使多多則速吐之為佳勿令至醉即終身百病皆除久飲酒者府藏積毒致令蒸筋傷神損壽醉不可以當風卧不可令人扇涼皆即得病也醉不可露卧濕地當風取涼凡人醉不可強食或發癰疽或發瘡或生瘡醉飽不可以走車馬及跳躑醉不可接房醉飽交接小者面憔悴嗽大者傷絕臟脈損命凡人飢欲坐小便若飽則立小便慎之無病又忍尿不便膝冷成痺忍大便不出成氣痔小便勿努令兩足及膝冷大便不用呼氣及強努令人腰癢自蟲宜任之佳凡遇山水塢中出泉者不可久居常食作癭病又深

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十



迪志文化出版有限公司出版

陰地冷水不可飲必作瘕瘕飲食以調時慎脫著凡人旦起著衣反著便著之吉衣光者三振之曰殃去吉溼衣汗衣皆不可久著令人發瘡及風瘙大汗能易衣佳不易者急洗之不爾令人小便不利凡大汗勿偏脫衣喜得偏風半身不遂春天不可薄衣令人傷寒霍亂食不消頭痛脫著既時須調寢處凡人卧春夏向東秋冬向西頭勿北卧及牆北亦勿安牀凡欲眠勿歌詠不祥睡起下牀先須左足卧勿當舍脊下卧訖勿留燈令魂魄六神不安多愁怨人頭邊勿安火爐日久引火氣頭重目赤及鼻乾夜引當耳勿有孔吹人即耳聾夏不欲露面致令人面皮厚喜成癬或作面風冬夜勿覆頭得長壽凡人眠勿以脚上懸高處久成腎水及損尻足冷人每見十步直牆勿順牆面風利吹人發癩及體重人汗勿跂牀懸脚久成血痺兩足背腰疼又不得晝眠令人失氣卧勿大語損人氣力暮卧常習閉口口開即失氣且邪惡從口入久而成消渴及失血色屈膝側卧益

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十



迪志文化出版有限公司出版

人氣力勝正偃仰按孔子不尸卧故曰睡不厭踧覺不厭舒凡人尸睡則有鬼痛魔邪凡眠先卧心後卧眼人卧一夜常作五度反覆逐更轉凡人夜魔勿燃燈喚之定死無疑暗喚之吉亦不得近前急喚夜夢惡不須說且以水面東持刀嚙之呪曰惡夢著草木好夢成珠玉即無咎矣又夢之善惡並勿說為吉衣食寢處皆能順時者吉始盡養生之道故善攝生者無犯日月之忌無失歲時之和須知一日之忌暮無飽食一月之忌晦無

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

大醉一歲之忌暮無遠行終身之忌暮無燃燭行房暮常護氣也凡氣冬至起於湧泉十一月至膝十二月至股正月至腰名三陽成二月至膊三月至項四月至頂純陽用事之月也每冬至日於北壁下厚堆草而卧云受元氣每八月一日已後即微火煖足勿令下冷無生意常欲使氣在下不欲泄於上春凍未泮衣欲下厚上薄養陽收陰繼世長生養陰收陽禍則滅門故云冬時天氣閉血氣伏藏人不可作勞出汗發泄陽氣有損於

人也又云冬日凍腦春秋腦足俱凍此聖人之常法也春欲晏卧早起夏及秋欲侵夜乃卧早起冬欲早卧而晏起皆益人雖云早起莫在雞鳴前晏起莫在日出後凡冬月忽有大熱之時夏日忽有大涼之時皆勿受之人有患天行時氣者皆由犯此也即須調氣息使寒熱平和即免患也每當臘日勿歌舞犯者必凶常於正月寅日燒白髮吉凡寅日剪手甲午日剪足甲又燒白髮吉

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

居處法

凡人居止之室必須周密勿令有細隙致有風氣得入小覺有風勿強忍久坐必須急急避之久居不覺使人中風立來忽得偏風四肢不隨或如角弓反張或失音不語者皆由忽此耳身既中風諸病總集邪氣得便遭此致卒者十中有九是以大須周密無得輕之慎焉慎焉所居之室必基井及水漬令安龍神凡在家及外行卒逢大飄風暴雨震電昏暗大霧此乃會諸龍鬼神行



動經過所致宜入室閉戶燒香靜坐安心以敬避之待過後乃出不爾損人或當時雖未苦於後不佳矣又陰霧中不可遠行凡家中有經像行來先拜之然後拜尊長每行至則安坐焉凡居家不必數沐浴若沐浴必須密室不得大熱亦不得大冷皆生百病冬浴不必汗出霖霖沐浴後不得觸風冷新沐髮訖勿當風勿濕縈髻勿濕頭卧使人頭風眩悶髮禿面黑齒痛耳聾頭生白屑飢忌浴飽忌沐沐訖須進少許食飲乃出夜沐髮不食即卧令人心虛饒汗多夢又夫妻不用同室沐浴常以晦日浴朔日沐吉凡炊湯經宿用洗體成癬洗面無光洗脚即疼痛作甌畦瘡熱泔洗頭冷水濯之作頭風飲水沐頭亦作頭風時行病新汗解勿冷水洗浴損心包不能復凡居家常戒約內外長幼不快即須早道勿使隱忍以為無苦過時不知便為重病遂成不救小有不好即按摩按擦令百節通利泄其邪氣凡人無問有事無事常須日別蹋脊背四肢一度頭項若令熱蹋即

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

風氣時行不能著人此大要妙不可具論凡人居家及遠行隨身常有熱艾一升備急圓辟界圓藥生肌藥甘濕藥丁腫藥水銀大黃芒硝甘草乾薑桂心蜀椒不能更蓄餘藥此等常不可缺一兩卷備急藥方并帶辟毒蛇蜂蝎等藥隨身凡人自覺十日以上康健即須灸三數穴以泄風氣每用必須調氣補瀉按摩導引為佳勿以康健便為常然須常安不忘危預防諸病也灸法當須避人神凡畜牛馬驢騾春秋皆須與轉瀉藥一度則不中天行時氣也

按摩法

天竺國按摩此是婆羅門法

兩手相捉細掄如洗手法 兩手淺相叉翻覆向胸
兩手相捉共按脛左右同 以手如挽五石力弓左右
同 兩手相重按脛徐徐掄身左右同 作拳向前築
左右同 作拳却頓此是開胸左右同 如拓石法左
右同 以手反撻背上左右同 兩手據地縮身曲脊



向上三舉 兩手抱頭宛轉脰上此是抽脅 大坐斜身偏欹如排山左右同 大坐伸兩脚即以一脚踏向前虛掣左右同 兩手拒地迴顧此是虎視法左右同立地反拗身三舉 兩手急相義以脚踏手中左右同起立以脚前後虛踏左右同 大坐伸兩脚用相手勾所伸脚著膝中以手按之左右同

右十八勢但是老人每日能依此三編者一月後百病除行及奔馬補益延年能食明眼輕健不復疲乏

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

老子按摩法

兩手擦脰左右換身一七遍 兩手捻脰左右細肩二七遍 兩手抱頭左右紐腰二七遍 左右挑頭一七遍 兩手托頭三舉之 一手抱頭一手托膝三折左右同 一手托頭一手托膝從下向上三偏左右同 兩手攀頭下向三頓足 兩手相捉頭上過左右三偏 兩手相義托心前推却挽三偏 兩手相義著心三偏 曲腕築肋挽肘左右亦三偏 左右挽前後拔各



迪志文化出版有限公司出版



迪志文化出版有限公司出版

三編 舒手挽項左右三編 手摸肩從上至下使偏左右同 兩手空拳築三編 兩手相義反覆攪各七偏 外振手三編內振三編覆手振亦三編 摩紐指三編 兩手反搖三編 兩手反義上下紐肘無數用十呼 兩手上聳三編 兩手下頓三編 兩手相義頭上過左右伸筋十編 兩手拳反背上掘脊上下亦三編 兩手反捉上下直脊三編 覆掌搦腕內外振三編 覆掌前聳三編 覆掌兩手相義交橫三編 覆手橫直即聳三編 若有手患冷從上打至下得熱便休 舒左脚右手承之左手擦脚聳上至下直脚三編右手擦脚亦爾 前後換足三編 左換足右換足各三編 前後却換足三編 直脚三編 紐脰三編 內外振脚三編 若有脚患冷者打熱便休 紐臂以意多少頓脚三編 却直脚三編 虎據左右紐肩三編 推天托地左右三編 左右排山負山拔木各三編 舒手直前頭伸手三編 舒兩手兩膝

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

亦各三編 舒脚直反頓伸手三編 捩內脊外脊各三編

調氣法

彭祖曰道不在煩但能不思衣食不思聲色不思勝負不思曲直不思得失不思榮辱心無煩形勿極而兼之以導引行氣不已亦可得長年千歲不死凡人不可無思當以漸遣除之彭祖曰和神導氣之道當得密室閉戶安牀煖席枕高二寸半正身偃卧瞑目閉氣於胸膈

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

中以鴻毛著鼻上而不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思如此寒暑不能侵蜂蠆不能毒壽三百六十歲此鄰於真人也每旦夕者是陰陽轉換之時凡旦至名曰陽息而陰消暮日入後冷氣至凝與眼關是上生氣至名曰陽息而陰消暮日入後冷氣至凝與眼關是上生至牀坐睡倒是下生氣至名曰陽消而陰息旦五更初暖氣至暮日入後冷氣至常出入天地日月山川河海人畜草木一切萬物體中代謝往來無一時休息一進一退如晝夜之更迭如海水面向午展兩手於脚膝上徐徐按擦肢節口吐濁氣鼻引清氣凡吐者出故氣亦名死氣吞者取新氣亦名生氣故老子經云玄牝之門可以出納陰陽死生之存用之不勤言口鼻天地之間可以出納陰陽死生之



迪志文化出版有限公司出版

也氣良久徐徐乃以手左托右托上托下托前托後托瞑目張口叩齒摩眼押頭拔耳挽髮放腰咳嗽發揚振動也雙作隻作反手為之然後掣足仰振數八九十而止仰下徐徐定心作禪觀之法閉目存思想見空中太和元氣如紫雲成蓋五色分明下入毛際漸漸入如雨初晴雲入山透頂皮入肉至骨至腦漸漸下入腹中四肢五臟皆受其潤如水滲入地若徹則覺腹中有聲汨汨然意轉思存不得外緣斯須即覺元氣達於氣海須臾則自達於湧泉則覺身體振動兩脚蹠曲亦令牀坐有聲拉拉然則名一通二通乃至日別得三通五通則身體悅懌面色光輝鬢毛潤澤耳目精明令人食美氣力強健百病皆去五年十歲長存不亡得滿十萬通去仙不遠矣人身虛無但有遊氣氣息得理即百病不生若消息失宜即病競起善攝養者須知調氣方焉調氣方療萬病大患百日生眉鬚自餘者不足言也凡調氣之法夜半後日中前氣生得調日中後夜半前氣死不

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十



迪志文化出版有限公司出版

得調調氣之時則仰卧牀鋪厚軟枕高下共身平舒手展脚兩手握大拇指節去身四五寸兩脚相去四五寸數數叩齒飲玉漿引氣從鼻入腹足則停止有力更取久住氣悶從口細細吐出盡遠鼻細細引入出氣一准前法閉口以心中數數令耳不聞恐有誤亂兼以手下籌能至千則去仙不遠矣若天陰霧惡風猛寒勿取氣也但閉之若患寒熱及患癰疽不問日中疾患未發前一食間即調如其不得好瘥明日依式更調之若患心

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

冷病氣即呼出若熱病氣即吹出若肺病則噓出若肝病則呵出若脾病則唏出若腎病則呬出夜半後八十一雞鳴七十二平旦六十一日出五十四辰時四十五巳時三十六欲作此法先左右導引三百六十徧病有四種一冷痺二氣疾三邪風四熱毒若有患者安心調氣此法無有不瘥也凡百病不離五臟五臟各有八十一種疾冷熱風氣計成四百四病事須識其相類善以知之心臟病者體冷熱相法心色赤患者夢中見人著



迪志文化出版有限公司出版

赤衣持赤刀杖火來怖人療法用呼吹二氣呼療冷吹治熱肺臟病者胸背滿脹四肢煩悶相法肺色白患者喜夢見美女美男詐親附人共相抱持或作父母兄弟妻子療法用噓氣出肝臟病者憂愁不樂悲思及頭眼疼痛相法肝色青夢見人著青衣捉青刀杖或獅子虎狼來恐怖人療法用呵氣出脾臟病者體上遊風習習偏身痛煩悶相法脾色黃通土色夢或作小兒擊搏人擲掄人或如旋風團欒轉治法用唏氣出腎臟病者體

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

冷陰衰面目惡痿相法腎色黑夢見黑衣及獸物捉刀杖相怖用呬氣出冷病者用大呼三十徧細呼十徧呼法鼻中引氣入口中吐氣出當令聲相逐呼字而吐之熱病者用大吹五十徧細吹十徧吹如吹物之吹當使字氣聲似字肺病者用大噓三十徧細噓十徧肝病者用大呵三十徧細呵十徧脾病者用大唏三十徧細唏十徧腎病者用大四五十徧細呬三十徧此十二種調氣法若有病依此法恭敬用心無有不瘥皆須左右導



迪志文化出版有限公司出版

引三百六十徧然後乃為之

服食法

論曰凡人春服小續命湯五劑及諸補散各一劑夏大熱則服腎瀝湯三劑秋服黃耆等圓一兩劑冬服藥酒兩三劑立春日則止此法終身常爾則百病不生矣俗人見淺但知鈎吻之殺人不信黃精之益壽但識五穀之療飢不知百藥之濟命但解施洩以生育不知固秘以頤養故有服餌方焉郝惜曰夫欲服食當尋性理所

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

宜審冷暖之適不可見彼得力我便服之初御藥皆先草木次石是為將藥之大較也所謂精粗相代階粗以至精者也夫人從少至長體習五穀卒不可一朝而遺之凡服藥物為益遲微即無充飢之驗然積年不已方能骨髓填實五穀居然而自斷今人多望朝夕之效求目下之應腑臟未充便欲絕粒穀氣如除藥未有用又將御女形神與俗無別以此致弊胡不怪哉服餌大體皆有次第不知其術者非止交有所損卒亦不得其力



迪志文化出版有限公司出版

故服餌大法必先去三蟲三蟲既去次服草藥好得藥力次服木藥好得力訖次服石藥依此次第乃得遂其藥性庶可安穩可以延齡矣

去三尸蟲圓

生地黃汁三斗東向竈葦火煎三沸內清漆二升以荆匕攪之日移一尺內黃丹三兩復移一尺內瓜子汁三升復移一尺內大黃末三兩微火勿令焦候可圓圓如梧桐子大先食服一圓日三濁血下鼻中三十日諸蟲皆下五十日百病愈面色有光澤

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

又方

漆二升 蕪菁子三升 大黃六兩 酒二升半

右以微火合煎令可圓如梧桐子大先食服三圓十日濁血下出鼻中三十日蟲皆爛下五十日身光澤一年行及奔馬消息四體安穩乃可服草藥

服天門冬方

天門冬曝乾搗下篩食后服方寸匕日三可至十服



迪志文化出版有限公司出版

小兒服尤良與松脂煉蜜圓服之益善惟多彌佳

又千搗取汁微火煎取五斗下白蜜一斗胡麻炒末

二升合煎攪勿息手可圓即止火下大豆黃末和為

餅徑三寸厚半寸一服一枚日三百日已上得益此

方最上妙包衆方一法釀酒服始傷多无苦多即吐

去病也

天門冬酒釀法

取天門冬淨洗去心皮令人利搗壓取汁二斗漬麵

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

二升麴發以糯米二升準家釀法造酒春夏宜極冷

下飯秋冬溫如人肌此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣

但服之久停則香美餘酒皆不及封四七日佳凡八

月九月即少少合至十月多擬到來年五月三十日

以來相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒

時若再得天門冬去心皮曝乾為細末以上件酒服

方寸匕日三加至三匕久服長生補中益氣愈百病

也治虛勞等傷年老衰損羸瘦偏枯不隨風濕不仁

冷痺心腹積取惡瘡癰疽腫癰疾重周身膿壞鼻柱

敗爛服之皮脫蟲出顏色肥白髮黑齒落再生入水

不濡二百日後恬泰疾損拘急者緩羸劣者強三百

日身輕三年走及奔馬至十年心腹痼疾皆去

服地黃法

生地黃五十斤熟搗絞取汁澄去滓微火上煎減過

生白蜜五升棗脂一升攪令相得可圓乃止每服如

雞子一枚日三令人肥白

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

又方

地黃十斤細切以醇酒二斗漬三宿出曝乾反覆內

漬取酒盡止與甘草巴戟取厚朴乾漆覆盆子各一

斤搗下篩食后酒服方寸匕日三加至二匕使人老

者還少強力無病延年

作熟地黃法

採地黃去其鬚葉及細根搗絞取汁以漬肥者著甑

中蒸之熟時出曝燥更浸汁中又蒸汁盡止便乾之



亦可直切蒸之半日數以酒洒之使周匝至夕出曝乾可搗為末煉蜜圓服之

種地黄法

先擇好地黄赤色虛軟者深耕之臘月逆耕凍地彌好擇肥大好地黄根切長四五分至三寸許一斛可種一畝二三月種之作畦畔相去一尺生後隨鉏壅數芸之

黃精膏方

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

黃精用一石去鬚毛洗令淨潔打碎蒸令好熟壓得汁復煎去上遊水得一斗內乾薑三兩桂心末一兩微火煎看色鬱鬱然欲黃使去火待冷盛不津器中酒五合和服二合常未食前日二服舊皮脫顏色變光花色有異鬚髮更改欲長服者不須和酒内生大豆黃絕穀食之不飢渴長生不老

服烏麻法

取黑皮真檀色者烏麻隨多少水拌令潤勿過濕蒸

令氣偏即出曝乾如此九蒸九搗去上皮未食前和水若酒服二方寸匕日三漸漸不飢絕穀久服百病不生常服延年不老

餌柏實方

柏子仁二升搗令細醇酒四升漬攪如泥下白蜜二升棗膏三升搗令可圓入乾地黄末白朮末各一升攪和圓如梧桐子大每服三十圓日二服二十日萬病皆愈

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

餌松子方

七月七日採松子過時即落不可得治服方寸匕日三四一云一服三合百日身輕二百日行五百里絕穀服昇仙渴飲水亦可和脂服之若圓如梧桐子大服十圓

服松脂方

百鍊松脂下篩以蜜和內笥中勿令中風日服如博棊子大博棊長二寸方一寸日三漸漸月別服一斤不飢延年



亦可醇酒和白蜜如錫日服一二兩至半斤凡取松脂老松皮自有聚脂者最第一其根下有傷折處不見日月者得之名曰陰脂彌良惟衡山東行五百里有大松皆三四十圍乃多脂又法五月刻大松陽面使向下二十四株一株可得半斤亦取其老節根處有脂得用仙經云常以三月入衡山之陰取不見日月松脂煉而餌之即不召而自来服之百日耐寒暑二百日五臟補益服之五年即見西王母仙經又云

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

採松脂法

以日入時破其陰以取其膏破其陽以取其脂脂膏

等分食之可以通神靈鑿其陰陽為孔令方五寸深五寸還以皮掩其孔無令風入風入則不可服以春夏時取之取訖封塞勿洩以泥塗之東北行丹砂穴有陰泉水可飲此弘農車君以元封元年入此山食松脂十六年復下居長安東市在上谷牛頭谷時往來至秦嶺上年常如三十者

煉松脂法

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

松脂七斤以桑灰汁一石煮脂三沸接置冷水中凝復煮之凡十徧脂白矣可服今谷在衡州東南攸縣界此松脂與天下松脂不同

餌茯苓方

茯苓十斤去皮酒漬密封下十五日出之取服如博棋日三亦可屑服方寸匕凡餌茯苓皆陽煮四五沸或以水漬六七日

茯苓酥方

茯苓

五升灰汁煮十徧漿
水煮十徧清水煮十徧

松脂

五斤煮如茯苓法
每次煮四十徧



生天門冬

五斤去心皮
曝乾作末

蠟

牛酥

各三十斤
鍊

白蜜

三斤煎
令沫盡

右各搗篩以銅器重湯上先內酥次蠟次蜜消訖內藥急攪勿住手務令大均內甕器中密封勿令洩氣先一日不食欲不食先須喫好美食極飽然後絕食即服二兩二十日後服四兩又二十日後八兩以圓之以咽中下為度第二度以四兩為初二十日後八兩又二十日二兩第三度服以八兩為初二十日二兩二十日四兩合一百八十日藥成自后服三圓將補不服亦得恒以酥蜜消息之美酒服一升為佳合藥須取四時旺相日特忌刑殺厭及四激休廢等日大凶此彭祖法

茯苓膏方

茯苓

淨去皮
松脂二十斤

松子仁

柏子仁

各十斤

右皆依法鍊之松柏仁不鍊搗篩白蜜二斗四升內銅器中湯上微火煎一日一夕次第下藥攪令相得

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二十

欽定四庫全書



世醫得效方
卷二十

枸杞酒方

微火煎七日七夜上圓如小棗每服七圓日三欲絕穀頓服取飽即得輕身明目不老服枸杞根方主養性還齡枸杞根切一石水一石二斗煮取六斗澄清煎取三升以小麥一斗乾淨擇內汁中漬一宿曝二往返令汁盡曝乾根末酒服方寸匕日二一年之中以二月八月各合一劑終身不老

枸杞根一百二十斤切以東流水四石煮一日一夜取清汁一石漬麴一如家醞法熟取清貯不津器中內乾地黃末二斤半桂心乾薑澤瀉蜀椒末各一斤商陸末二升以絹袋貯內酒底緊塞口埋入地三尺堅覆上三七日沐浴整衣冠再拜平曉向甲寅地日出處開之其酒赤如金色旦空腹服半升十日萬病皆愈三十日癰痕滅惡疾人以水一升和酒半升分五服愈



餌雲母水方

上白雲母二十斤薄擘以露水八斗作湯分半洮洗雲母如此再過又取二斗作湯內芒硝十斤以雲母木器中漬之二十日出絹袋盛懸屋上勿使見風日令燥以水漬鹿皮為囊揉挺之從旦至日中乃以細絹下篩復揉挺令得好粉五斗餘者棄之取粉一斗內崖蜜二斤攪令如粥內生竹筍中薄削之漆固口埋北垣南崖下入地六尺覆土春夏四十日秋冬

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

三十日出之當如澤為成若洞洞不消者更埋三十日出之先取水一合內藥一合攪和盡服之日三水寒溫盡自在服十日小便當變黃此先療勞氣風疹也二十日腹中寒癖消三十日齟齬除更新生四十日不畏風寒五十日諸病皆愈顏色日少長生神仙吾自驗之所以述錄

鍊鍾乳粉法

鍾乳一斤不問厚薄但取勻淨十分好者即任用非

此者不堪用先泥鉄鐺可受四五斗者為竈貯水令滿去口三寸內乳著金銀甕內任有用之乃下鐺中令水沒甕上一寸餘即得常令如此勿使出水也微火燒日夜不絕水欲竭即添成暖水每一周時輒易水洗鐺并洮乳七日七夜出之淨洮乾內瓷鉢中玉椎縛格少著水浸之一日一夜急著水攪令大濁澄取濁汁其乳粗者自然著底作末者即自作濁水出即經宿澄取其粗著底者准前法研之凡五日五夜皆細逐粉作粉好用澄鍊取曝乾即更於銀鉢中研之一日候入肉水洗不落者佳

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

鍾乳散

鍾乳粉成煉者 上黨人參 石斛 乾薑 各三分

右四味搗下篩三味與乳合和相得均分作九貼平旦空腹溫淳酒服一貼日午後服一貼黃昏後服一貼三日後准此服之凡服此藥法皆三日一劑三日內止食一升半飯一升肉肉及飯惟爛不得服葱豉



問曰何故三日少食勿得飽也荅曰三夜乳在腹中熏補臟腑若此飽食反推藥出腹所以不得飽食也何故不得生食由食生故即損傷藥力藥力既損脂肪亦傷所以不得食生食也何故不得食葱豉葱豉殺藥故不得食也三日服藥既盡三日內須作羹食補之任意所便仍不用葱豉及鞭食也三日補訖還須准二服藥如前盡此一斤乳訖其氣力當自知耳不能具述一得此法其後服十斤二十斤任意方便

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

可知也

西嶽真人靈飛散方

雲母粉 一斤 茯苓 八兩 鍾乳粉 柏子仁

人參 續斷 桂心 各七兩 菊花 十五兩

乾地黄 十二兩

右九味為末生天門冬十九斤取汁搜藥內銅器中蒸一石二斗黍米下米熟曝乾為末先食飲服方寸匕日一三日力倍五日血脈充盛七日身輕十日面



迪志文化出版有限公司出版

色悅澤十五日行及奔馬三十日夜視有光七十日白髮盡落故齒皆去更取二十一七白蜜和搗二百杵丸如梧桐子大作八十一枚曝乾丸皆映徹如水晶珠欲令髮齒時生者吞七枚日三服即出髮未白齒未落者但服散五百年乃白如前法服已白者餌藥至七百年乃落入山日吞七丸絕穀不飢余得此方以來將踰三紀頃者但美而悅之疑而未敢措手積年詢訪屢有好名人曾餌得力遂服之一如方說

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

但能業之不已功不徒棄耳

黃帝雜忌法

旦起勿開目洗面令人目澁失明饒淚清旦常言善事勿惡言聞惡事即向所來方唾之吉又勿嗔怒勿叱咤咄呼勿嗟嘆勿唱奈何名曰請禍勿立膝坐而交臂膝上勿令髮覆面皆不祥勿舉足向火勿對竈罵詈凡行立坐勿背日吉勿面北坐久思不祥起凡欲行來常存魁罡在頭上所向皆吉若欲征戰存斗柄在前以指敵



迪志文化出版有限公司出版

吉勿面北冠帶凶勿向西北唾犯魁罡神凶勿咳唾唾不欲遠成肺病令人手足重及背痛欬嗽亦勿向西北大小便勿殺龜蛇勿怒目視日月喜令人失明行及乘馬不用回顧則神去人不用鬼行踏粟凡遇神廟慎勿輒入入必恭敬不得舉目怒意顧瞻當如對嚴君焉乃享其福耳不爾速獲其禍亦不得返首顧視神廟忽見龍蛇勿興心驚怪亦勿注意瞻視忽有鬼怪變異之物即強抑之勿怪呪曰見怪不怪其怪自壞又路行及衆

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

中見殊妙美女慎勿熟視而愛之此當魑魅之物使人深愛無問深山曠野稠人廣衆之中皆亦如之凡山水有沙風處勿在中浴害人欲渡者隨驢馬後急渡不傷人有水弩處射人影即死欲渡水者以物打水其弩即散急渡不傷人諸山有孔云入采寶者惟三月九月餘月山閉氣交死也凡人空腹不用見尸臭氣入鼻舌上白起口常臭欲見尸者皆須飲酒見之能辟毒遠行觸熱塗中逢河勿洗面生烏點



迪志文化出版有限公司出版

房中補益法

論曰人年四十以下多有放恣四十以上即頓覺氣力一時衰退衰退既至衆病蜂起久而不治遂至不救凡人氣力自有盛而過人者亦不可抑忍久而不洩致生癰疽若年過六十強有數旬不得交合意中平平者自可閉固也昔正觀初有一野老年七十餘詣余云數日來陽氣益盛思與家嫗晝寢春事皆成未知垂老有此為善惡耶余荅之曰是大不祥子獨不聞膏火乎夫膏

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

火之將竭也必先暗而後明明止則滅今足下年邁桑榆久當閉精息欲茲忽春情猛發豈非反常耶竊為足下憂之子其勉歟後四旬發病而死此其不慎之效也如斯之輩非一旦疏一人以勗將來耳所以善攝生者凡覺陽事輒盛必謹而抑之不可縱心竭意以自賊也若一度制得則一度火滅一度增油若不能制縱情施瀉即是膏火將滅更去其油可不深自防所患人少年時不知道知道亦不能信行之至老乃知道便以晚矣



迪志文化出版有限公司出版

病難養也晚而自保猶得延年益壽若年少壯而能行道者神仙速矣或曰年未六十當閉精守一為可爾否曰不然男子不可無女女不可無男無女則意動意動則神勞神勞則損壽若念真正無可思者則大佳長生也然而萬無一有強抑鬱閉之難持易失使人漏精尿濁以致鬼交之病損一而當百也交會者當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑大雷電大霹靂天地晦冥日月薄蝕虹霓地動則損人神不吉損男有

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

倍令女得病有子必顛癡頑愚瘡癰聾瞶跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月星辰火光之下神廟佛寺之中井欄圍廁之側塚墓尸柩之傍皆所不可夫交合如法則有積德大智善人降託胎中仍令性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中仍令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之應有如影響此乃必然之理可不再思之若欲求子者但待婦人



迪志文化出版有限公司出版

月經絕後一日三日五日擇其王相日如春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸以生氣時夜半後乃施瀉有子皆男必壽而賢明高爵也以月經絕後二日四日六日施瀉有子必女過六日後勿得施瀉既不得子亦不成人人有所怒血氣未定因以交合令人發癰疽又不可忍小便交合使人淋莖中痛面失血色及遠行疲乏來入房為五勞虛損少子婦人月事未絕而與交合令人成病得白駁也

欽定四庫全書

世醫得效方
卷二十

世醫得效方卷二十



迪志文化出版有限公司出版